

HIVERNAGE D'UN BECASSEAU DE TEMMINCK
(*Calidris temminckii*) EN LOIRE-ATLANTIQUE

Par Michel QUAINTENNE

0017

Le premier novembre 1990, dans le marais de Guérande, dans un bassin fréquenté à marée haute par les limicoles des traicts du Croisic (44), je remarque un Bécasseau de Temminck dans un groupe de 40 Bécasseaux minutes. Il est bien remarquable par ses pattes jaunâtres et secondairement, à distance, par l'aspect plus foncé de son dos, comparé aux minutes. Il se montre peu farouche et vient à quelques mètres : poitrine grise délavée, dos gris foncé sans marques, rémiges plus sombres, bec uniformément noir. Cet oiseau est étroitement associé aux Bécasseaux minutes. Ils se nourrissent ensemble, s'envolent simultanément à la moindre alerte, se reposent en marge du groupe principal de limicoles : Bécasseaux variables, Grands Gravelots...

Le 29 décembre 1990, à ma grande surprise, un Bécasseau de Temminck est toujours présent, au même endroit, avec la même bande de 40 Bécasseaux minutes!

Premier janvier 1991. Bonne année en Bretagne pour le Temminck, fidèle au poste, avec 60 Bécasseaux minutes cette fois. On pourrait facilement suivre ses évolutions si les bécasseaux n'avaient cette fâcheuse habitude de ne pas rester plus d'une minute sans décoller pour se reposer dans un autre coin de la vasière...*Calidris minuta* !

Une nouvelle visite le 6 janvier me permet de revoir le Temminck et les 60 Minutes.

Enfin, le 23 février, malgré la vague de froid qui a touché la région au début du mois, il est encore là, accompagné de 40 Bécasseaux minutes.

Cette série d'observations présente un double intérêt. Bien que les Traicts du Croisic soit un site privilégié pour l'hivernage du Bécasseau minute en Bretagne (Annézo, 1991), l'effectif présent durant l'hiver 90-91 apparaît néanmoins exceptionnel (maximum 40 en janvier 1982) et fait suite au passage remarquable de l'automne 1990. Mais surtout elle semble constituer la première mention de l'hivernage du Bécasseau de Temminck en Bretagne. Cette espèce hiverne normalement en Afrique, au nord de l'équateur, et Hayman et al. (1986) ne signalent qu'occasionnellement sa présence en Europe, en période hivernale.

Bibliographie

Annézo, J.P. 1991. A propos des limicoles hivernants en Bretagne entre les années 1977 et 1989 : le Bécasseau minute. Ar Vran, 2 (2): 18-21.

Hayman, P., Marchant, J. et Prater, T. 1986. Shorebirds: an identification guide to the waders of the world. Croom Helm ed. 412pg.

Michel Quaintenne
22 allée de Maurepas
35700 Rennes

