

**SYNTHESE DES OBSERVATIONS  
ORNITHOLOGIQUES BRETONNES  
ENTRE LES 16/07/1988 et 15/07/1989**

\*\*\*

Par Guillaume GELINAUD

0015

En guise de préambule à cette nouvelle série d'observations ornithologiques bretonnes, il ne semble pas superflu de préciser que :

- cette synthèse ne concerne qu'une sélection, assez large certes, des espèces observées au cours de l'année en Bretagne. Les critères qui ont guidé notre choix sont, comme l'an passé, d'une part les nouveautés et modifications de statut, d'autre part l'importance des données disponibles pour décrire certains phénomènes.

- nous ne nous sommes pas étendus sur le cas des limicoles dont les dénombrements hivernaux font l'objet d'une synthèse jusqu'à janvier 1989, en cours de préparation.

Nota : Les tableaux récapitulatifs des recensements BIROE concernant certains limicoles, n'ont pas pris en compte les chiffres relatifs aux effectifs rassemblés sous l'intitulé "reste Bretagne sud". De façon générale, il s'agit d'effectifs réduits.

Enfin ce travail s'appuie sur les publications d'observations concernant la Bretagne ainsi que des observations inédites, dont les auteurs figureront avec la bibliographie, dans la suite de cette synthèse lors de notre prochaine publication.

**PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata***

L'espèce est signalée du 20 octobre : 1 en baie de Douarnenez (29), au 24 mai : dernier hivernant en baie de St-Brieuc (22).

- Les principales concentrations sont notées fin Décembre et en janvier : 10 entre le 16 novembre et le 29 mars en baie de St-Brieuc ; 10 le 30 décembre en rade de Brest (29) ; 30 le 31 au Croisic (44) ; 20-25 le 1er janvier en baie de Douarnenez et 30 le 19 janvier à Erdeven (56).

- Observations sporadiques ailleurs : 1 le 11 décembre à l'étang de Combou (35) ; 1 le 24 à St-Thurial (35) ; 2 dans le Trégor et 2 entre le Cap Fréhel et Lancieux (22) à la mi-janvier ; 1 le 5 mars à Béganne (56) et 3 le 31 mars à Hoëdic (56).

**PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica***

1 le 15 octobre en baie de Lancieux (22) ; la rade de Brest (29) est toujours le principal site d'hivernage en Bretagne : 5 le 1er novembre... 115-120 le 7 janvier... encore 46 le 27 mars... derniers : 8-9 le 16 avril.  
 Hormis 10 le 20 décembre au Croisic (44) et 6 dans le Trégor (22) à la mi-janvier, les autres observations concernent moins de 5 ind. ; Cap Fréhel (22) : 4 le 5 mars, baie de Goulven (29) : 1 le 8 janvier, Brignogan (29) : 1 le 20 novembre, Guissény (29) : 1 le 16 avril, Douarnenez (29) : 2-3 le 14 janvier, Erdeven (56) : 4 le 19 janvier.

**PLONGEON IMBRIN *Gavia immer***

L'espèce est signalée du 8 octobre au 19 mai dans les parages de Houat et de Hoëdic (56), localités, semble-t-il, privilégiées pour l'hivernage de l'Imbrin : maxi 20 le 27 mars ; seules 3 autres localités accueillent des effectifs substantiels : 7-8 le 9 mars en rade de Brest (29) ; 6 à la mi-janvier dans le Trégor (22) et 5 le 19 janvier à Erdeven (56). Les autres observations ne concernent que 1-2 ind. : Rance (35-22) ; Morieux (22) ; Goulven (29) ; Guissény (29) ; Ouessant (29) ; Douarnenez (29) ; Plouhinec (56) ; presque-île de Quiberon (56) et littoral de Loire-Atlantique.

**GREBE HUPPE *Podiceps cristatus***

Quelques chiffres : 200 le 1er novembre en baie de Morieux (22) ; à la mi-janvier, 224 en Ile-et-Vilaine dont 108 sur les étangs de la région de Vitré, 608 sur le littoral des Côtes d'Armor dont 196 en Rance, 570 dans le Golfe du Morbihan. Une espèce à compter plus systématiquement.

**GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis***

L'espèce est signalée du 17 juillet au 19 avril en baie de St-Brieuc (22). Les principaux sites sont : la Rance (35-22) : 165 à la mi-janvier ; la baie de la Fresnaye (22) : 20 le 10 novembre ; l'anse d'Yffiniac (22) : 15 à la mi-janvier ; la rade de Brest (29) : 1250-1350 le 7 janvier ; le golfe du Morbihan (56) : 1010 à la mi-janvier et le Croisic : 60 le 20 octobre.

**GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus***

Les premiers sont signalés le 4 septembre puis le 5 novembre en Rance (35). Principales localités (effectifs >10) : littoral entre Lancieux et le Cap Fréhel (22) : 20 à la mi-janvier ; littoral du Trégor (22) : 12 à la mi-janvier ; St-Pol de Léon (29) : 12 le 29 janvier ; rade de Brest (29) : 30-35 le 12 février. Autres localités : St-Coulomb (35), St-Malo (35), baie de St-Brieuc (22) ; St-Jean du Doigt (29), Plougasnou (29), baie de Morlaix (29), baie de Goulven (29), baie de Douarnenez (29), Locmariaquer (56) et le Croisic (44). Dernier le 9 avril à Plouhinec (56).

**GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena***

24 observations entre le 9 octobre et le 4 avril, concernant essentiellement des isolés, sur la Rance (35-22), à St-Jacut (22), au Val-André (22), à Morieux (22), à Lannion (22), à Port-Blanc (22), en baie de Goulven (29), en rade de Brest (29), à Plouhinec (56), à St-Pierre-Quiberon (56), à Locmariaquer (56) et à Sarzeau (56). Quelques observations se distinguent : 3 le 29 janvier à Penvénan (22), 2 le 14 à Plougasnou (29), 5 le 29 janvier et 2 le 5 février à Roscoff (29) ; 1 le 11 février, 10 le 27 mars, 2 le 29 et 3 le 31 mars à Hoëdic (56). Enfin 4 localités intérieures accueillent l'espèce : 3 le 9 octobre à la Chapelle-Ebrée (35) ; 1 le 4 novembre à Vitré (35) ; 1 le 13 novembre au Vioreau (44) et 1 du 16 novembre au 2 décembre dans les gravières de Bruz (35).

**OCEANITE CULBLANC *Oceanodroma leucorhoa***

1 les 1er et 9 octobre à Ouessant (29) ; 1 le 8 octobre au Conquet (29) ; 1 au sud de Belle-Ile (56) et 1 à la Turballe (44) le 16 octobre.

**OCEANITE TEMPETE *Hydrobates pelagicus***

Les observations de l'automne se répartissent du 22 juillet au 16 octobre et concernent uniquement 2 zones :

- Ouessant (29) : 7 données dont 17 W/30 mn le 26 août, 14 W/20 mn le 7 octobre et 40 W/15 mn le 8 octobre.

- Morbraz (56-44) : 1 le 22 juillet, 54 le 26 août et 111 le 16 octobre près du banc de Guérande. 10 données autour de Hoëdic du 15 août au 9 octobre dont 50-60 W/1 h le 23 septembre. Au printemps, l'espèce n'est notée que sur les zones de reproduction : 150-200 couples dans l'archipel de Molène (29) ; présence décelée à Keller/Ouessant (29), aux Roches de Camaret (29) et à Rohellan/Erdeven (56).

**PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis***

Passage noté à Ouessant (29) du 23 au 28 septembre (46 en plus de 20 h d'observation) puis les 23 et 24 octobre. 1 seule observation ailleurs : 9 en 1 h le 23 septembre à Hoëdic (56).

**PUFFIN CENDRE *Calonectris diomedea***

1 le 12 août à Ouessant (29), seule observation de l'automne ! 1 le 15 mars, toujours à Ouessant.

**PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus***

Important passage à Ouessant (29) cette année. Les observations débutent le 28 juillet et culminent à la mi-septembre (180 en 45 mn le 13, 144 en 25 mn le 14...) puis à la fin de ce mois (676 en 3 h 40 le 28). L'espèce est régulièrement notée jusqu'au 28 octobre puis 4 en 1 h 05 le 10 novembre.

Ailleurs : 2 le 15 août à Hoëdic (56), 21 à Plougasnou (29), 5 le 27 entre St-Gilles et la Chaussée aux Boeuf (44), 1 le 11 septembre à Brignogan (29), 1 le

13 à St-Malo (35), 1 le 18 en baie de St-Brieuc (22), 4 le 23 à Hoëdic, 1 le 26 au Conquet (29), 1 le 8 octobre en baie de St-Brieuc, 1 le 11 à Hoëdic, enfin 1 le 19 aux Sept-Iles (22).

#### PETIT PUFFIN *Puffinus assimilis*

Ouessant (29) fournit une série d'observations exceptionnelles : 1 les 26 et 28 août et 2 septembre, 4-5 le 23 septembre puis 1 les 27 et 28 septembre.

#### GRAND CORMORAN *Phalacrocorax auritus*

Arrivée des hivernants essentiellement en octobre et novembre : au dortoir de Kerhuon (29) : 25-30 le 1er septembre, 45 le 17, 80 le 5 octobre, 110 les 22 octobre et 12 novembre. Au dortoir de la Rance (35) : 90 le 2 octobre, 190 le 30, 180 le 7 novembre. En période hivernale, seule la Loire-Atlantique fournit un recensement précis : 2300 ind. à la mi-janvier en 7 dortoirs (île Dumet, Banc de Bilho/St-Nazaire, lac de Grand-Lieu, Mazerolles/Sucé, île Perdue/oudon, île Neslet/Le Fresne sur Loire, la Poitevinière/Raillé). Pour le reste de la région seulement 2 dortoirs dénombrés : 90-100 à Kerhuon de novembre au 16 février, départ échelonné jusqu'à la mi-avril (15-20 le 12) et 390 le 19 janvier à Erdeven (56). Au printemps, 183-190 couples à l'île des Landes et 52 couples au Grand Chevret/Cancale (35), 34 couples en baie de Morlaix (29) et 30 couples au lac de Grand-Lieu (44).

#### BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris*

1 le 22 octobre à St-Cyr en Retz (44), 1 le 18 décembre à Séné (56), 2 le 10 janvier à St-Aignan de Grand-Lieu (44), 1 le 11 février à Ploemeur (56) et 1 en mars à Marcillé-Robert (35).

Reproduction établie à Trunvel/Tréogat (29) : 1 jeune trouvé mort.

#### BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus*

2 chanteurs le 28 mai à Trenvel/Tréogat (29).

#### BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax*

1 le 4 septembre, 1-2 du 10 au 20 septembre puis 1 le 1er novembre à Tréogat (29) ; 1 en mars dans les gravières de Bruz (35) ; 1 le 20 mai à Hoëdic (56) puis 1 le 1er juin ; 2 le 6 et 1 le 19 juin à Séné (56).

#### AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*

Compte-tenu des différences de statut, nous considérerons séparément les Côtes nord et sud de la Bretagne. Sur la côte sud, les observations concernent essentiellement des regroupements post-nuptiaux et la nidification : aucune information exploitable pour l'hivernage. 150 + le 16 juillet en rivière d'Etel (56), ..., 120 le 15 août à Banastère/Sarzeau (56), 150-200 le 15 août à Séné (56)...

Augmentation des nicheurs dans les marais de Guérande et de Mesquer (44) : 119 + nids en 2 colonies. Découverte de deux nouvelles colonies dans le Morbihan : 20 nids à Le Tour du Parc et 6 nids à Port-Louis. 200-250 le 2 juillet en rivière d'Etel... 110-120 le 15 juillet à Kerboulico/Sarzeau (56). La dispersion post-nuptiale touche la côte nord durant la deuxième quinzaine de juillet, le 19 en Rance (35), le 23 en rade de Brest (29)... En Rance, le maximum est atteint début septembre : 38 le 9 et 37 le 13. A la mi-novembre ne subsistent que 3 à 6 hivernants.

Les observations de décembre et janvier permettent de situer grossièrement les effectifs hivernants : très probablement plus de 100 ind., 15 le 8 décembre en dortoir à St-Malo (35), 36 dont 32 sur le littoral du Trégor à la mi-janvier dans les Côtes d'Armor, 20 le 28 décembre et 10-15 le 15 janvier en baie de Goulven (29), 10 le 15 janvier à Guissény (29)... 7 + en rade de Brest (29)...

Dernière (?) le 1er avril en baie de Goulven.

#### CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides*

1 du 13 au 15 mai à Hoëdic (56), 1 le 21 et 2 le 28 mai à Tréogat (29). Addendum 1988 : 1 du 2 au 12 mai à Ouessant (29) et 1 le 12 juin au Petit Mars (44).

#### GRANDE AIGRETTE *Egretta alba*

La régularité de l'espèce se confirme : 1 le 13 novembre à la Mézières sur Couesnon (35), 1 les 30 décembre et 14 janvier puis 2 le 25 janvier à Juigné des Moutiers (44), 1 du 19 au 30 janvier à Locmiquélic (56) et 1 du 5 au 13 février dans le Yeun Elez (29), 2 à la mi-janvier au lac de Grand-Lieu (44).

#### HERON CENDRE *Ardea cinerea*

3 colonies regroupent 310 couples dans les marais de Guérande et Mesquer (44). 2 nouveaux sites de nidification dans le Morbihan : 2-3 nids à Le Tour du Parc et 1 nid à Port-Louis.

Première nidification de l'espèce sur la côte nord de la Bretagne : 3 couples à Le Conquet (29).

#### HERON POURPRE *Ardea purpurea*

Noté le 29 juillet à Ancenis (44), au Vioreau (44), et à St-Fiacre sur Maine (44), 1 le 15 août à Le Tour du Parc (56), 1 le 23 dans les gravières de Bruz (35) et 1 le 8 septembre à Tréogat (29). 1 le 26 avril à Ouessant (29). Nidification possible à Trunvel/Tréogat.

#### HERON GARDE-BOEUF *Bubulcus ibis*

1 le 12 Novembre à Lanneufret (29).

#### IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*

1 le 22 novembre à Marcillé-Robert (35).

# SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*

Le passage post-nuptial s'amorce dès juillet : à Séné (56) 1 jusqu'au 19 puis 5 le 2 août ; 10 du 3 au 17 dont 6 s'attardent jusqu'au 27. Les effectifs maxi sont notés en septembre mais de nombreuses observations d'isolées ou de petits groupes ( < ou = 4 ) sont réalisées jusqu'à début novembre : 36 le 5 septembre à Guérande (44) ; 10 le 9 à Anetz (44) ; 6 le 11 à Tréogat (29) ; 8 le 18 à Séné... 2 le 24 en baie du Mont-St-Michel (35)... 2 à Sarzeau (56) et 2 à Damgan le 10 octobre... 3 le 30 en baie de Goulven (29). Quelques spatules prolongent leur halte : 4 de septembre à décembre à Molène (29) ; 2 le 7 novembre puis 3 du 15 au 26 novembre à Sarzeau (56).

## Hivernage

- en rade de Brest : 1 du 5 septembre au 24 avril
- en rivière d'Etel : 2 le 30 octobre, 4 le 18 décembre, 5 le 18 janvier puis 4 jusqu'au 1er mai
- 1 le 8 février à Fouesnant (29) annonce le début du passage prénuptial, noté jusqu'au début juin à Séné (cf tableau) où 4 ind. estivent.

| Décades>>> | 1  | 2 | 3  |
|------------|----|---|----|
| MOIS       |    |   |    |
| Février    | 0  | 2 | 12 |
| Mars       | 11 | 3 | 4  |
| Avril      | 11 | 3 | 0  |
| Mai        | 2  | 3 | 0  |
| Juin       | 4  | 0 | 1  |
| Juillet    | 3  | 4 | ?  |



Effectif maximum de Spatules, par décade, à Séné (56)

Signalons 2 observations sur la côte nord ce printemps : 4 le 8 mai à Port-Blanc (22) et 2 le 15 mai au Cap Fréhel (22).

# CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra*

3 du 2 au 24 août puis 2 jusqu'au 28 août à Séné (56), 1 le 9 août à St-Martin des Champs (29) ; 1 le 1er septembre à St-Herblon (44) et 1 le 21 septembre à Anetz (44). Plus inhabituel, 1 fin mars à St-Allouestre (56).

# CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia*

Augmentation sensible des observations à l'automne : 1 le 10 août à St-Herblon (44), 2 le 21 à St-Mars de Coutais (44), 2 le 11 septembre sur la Loire (44) et 1 du 23 au 30 septembre à Eréac (22).

Quelques oiseaux de passage sont notés au printemps : 1 le 18 mars à Plédéliac (22), 1 le 19 mars à Locoal-Mendon (56), 1 en avril à Plouagat (22), 1 le 7 mai à Sévignac (22) et 2 le 25 mai à Plouzané (29). Nous retiendrons surtout de ce printemps la nidification de l'espèce en Loire-Atlantique : 1 couple mène 3 jeunes à l'envol à Remouillé et 1 couple mène 2 jeunes à l'envol à Lavau, en Basse-Loire.

# CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus*

1 en vol le 12 octobre à Ouessant (29).

# OIE CENDREE *Anser anser*

Premiers migrateurs le 7 septembre puis fin septembre en Loire-Atlantique mais ce passage se déroule essentiellement en un mois, de la deuxième décennie d'octobre à première décennie d'octobre, surtout en Ile-et-Vilaine et Loire-Atlantique (cf. tableau).

Effectif cumulé Oies grises / décennie et % Dpt 35 + 44.

| Septembre |   |      | Octobre |      |      | Novembre |     |      |
|-----------|---|------|---------|------|------|----------|-----|------|
| 1         | 2 | 3    | 1       | 2    | 3    | 1        | 2   | 3    |
|           |   | 100  |         | 1021 | 4652 | 240      | 10  | 4    |
|           |   | 100% |         | 92%  | 88%  | 98%      | 80% | 100% |

1 du 11 décembre au 13 janvier à Châtillon en Vendelais (35), 30 à la mi-janvier au Lac de Grand-Lieu (44). Peu d'informations disponibles pour le printemps : 110 le 18 février à Châtillon en Vendelais, 1 du 10 au 21 mars à Séné (56), 2 le 9 mai à Yffiniac (22) et 1 le 22 juin à La Chapelle de Brain (35).

# OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

5 vers le sud le 29 octobre à Tréogat (29)

# OIE A BEC COURT *Anser brachyrhynchus*

4 les 4 et 7 octobre et 1 le 14 octobre à Ouessant (29). Ces observations correspondent à l'époque de migration de la population islandaise vers les quartiers d'hivernage des îles britanniques.

**OIE RIEUSE *Anser albifrons***

5 du 8 janvier au 9 février à Châtillon en Vendelais (35), 1 le 4 mai à Brest (29).

**BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis***

10 en mue le 24 juillet à Sains (35). On peut s'interroger sur l'origine de ces oiseaux.

**BERNACHE CRAVANT DU PACIFIQUE *Branta bernicla nigricans***

1 le 16 novembre à Louannec (22) et 1 le 26 novembre dans le golfe du Morbihan.

**BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla***

Les effectifs de Bernaches culminent à 38 865 ind. en novembre en Bretagne. A cette époque, près de 100 000 ind. sont dénombrés sur le littoral français. A partir de décembre, on observe l'habituelle diminution des effectifs du littoral sud-breton avec un report sur les côtes du nord de la région d'une part et sur le sud du littoral atlantique français d'autre part.

| TOTAL Bretagne |          |          |         |         |      |
|----------------|----------|----------|---------|---------|------|
| Octobre        | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars |
| 16917          | 38864    | 25473    | 23431   | 20934   | 7844 |
| % Bretagne Sud |          |          |         |         |      |
| 91%            | 80%      | 61%      | 41%     | 37%     | 43%  |

**Principales localités :**

- golfe du Morbihan : 26 600 en novembre
- anse d'Yffiniac (22) : 4 000 en janvier
- baie du Mont-St-Michel (35) : 3770 en février
- baie de Vilaine (56) : 3050 en décembre
- baie de Quiberon (56) : 1960 en novembre
- traicts du Croisic (44) : 1750 en décembre
- estuaire Penzé (29) : 1360 en février
- baie de St-Jacut (22) : 1050 en janvier

**TADORNE CASARCA *Tardorna ferruginea***

1 le 31 août à Plounéour-Trez (29), 1 le 27 novembre à Yffiniac (22) et 1 femelle le 9 juillet à Erdeven (56)

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

Pour les différentes espèces d'anatidés, les résultats des dénombrements en Rance, ont été arbitrairement rattachés au total des Côtes d'Armor.

Recensement BIROE - Janvier 1989

| 35   | 22   | 29  | 56   | 44   | Total Bretagne |
|------|------|-----|------|------|----------------|
| 2702 | 1749 | 499 | 2893 | 2550 | 10393          |

L'effectif hivernant se maintient à un niveau élevé. Pas de modification notable en matière de répartition. Principaux sites : baie du Mont-St-Michel (35) : 2700, estuaire de la Loire (44) : 1830, golfe du Morbihan : 1730, Rance (35-22) : 749, traicts du Croisic (44) : 720...

CANARD SIFFLEUR D'AMERIQUE *Anas americana*

1 mâle le 13 novembre à Lopérhet (29).

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

L'espèce séjourne dans la région du 25 août : 1 à Châtillon en Vendelais (35) au 4 avril : 4 en baie de Goulven (29).

Recensement BIROE - janvier 1989

| 35   | 22  | 29   | 56   | 44   | Total Bretagne |
|------|-----|------|------|------|----------------|
| 1115 | 897 | 3426 | 1306 | 1166 | 7910           |

Principaux sites : baie du Mont-St-Michel (35) : 700, Yffiniac (22) : 870, Baie de Goulven (29) : 1100, rade de Brest (29) : 1072, golfe du Morbihan : 810, Lac de Grand-Lieu (44) : 700.

A noter 400 sur les étangs de la région de Vitré (35).

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

Recensement BIROE - janvier 1989

| 35  | 22  | 29   | 56   | 44   | Total Bretagne |
|-----|-----|------|------|------|----------------|
| 642 | 510 | 1951 | 2485 | 6686 | 12274          |

Principaux sites : Basse-Loire (44) : 5600, golfe du Morbihan : 2140, baie de Goulven (29) : 900. Certains sites enregistrent des effectifs supérieurs :

- en automne : 750 le 5 novembre contre 2 à la mi-janvier en baie du Mont-St-Michel (35).
- en fin d'hiver : 900 à la mi-janvier et 1500 le 12 février en baie de Goulven.

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

Des concentrations sont notées sur les sites de nidification en fin d'été : 30 le 19 août, 50-60 début septembre à Tréogat (29), 400-500 le 21 septembre au lac de Grand-Lieu (44). Alors que les effectifs diminuent à Tréogat en octobre-novembre, l'espèce apparaît sur les sites d'hivernage : le 2 octobre à Etel (56), le 27 à Paintourteau (35), le 28 à Châtillon en Vendelais (35)...

Recensement BIRCE - janvier 1989

| 35 | 22 | 29 | 56 | 44 | Total Bretagne |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 15 | 19 | 77 | 14 | 72 | 197            |

Derniers hivernants le 11 mars en rade de Brest (29).

Au printemps, 2 mâles le 24 avril à Kerlouan (29), 1 mâle le 19 mai en baie de Goulven (29), 2 couples parquent le 27 mai à Kerboullico/Sarzeau (56).

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

Recensement BIRCE - janvier 1989

| 35   | 22   | 29   | 56   | 44   | Total Bretagne |
|------|------|------|------|------|----------------|
| 4664 | 1649 | 3331 | 4250 | 8439 | 22333          |

Principaux sites : baie du Mont-St-Michel (35) : 2800, golfe du Morbihan : 3158. Basse-Loire (44) : 2685, lac de Grand-Lieu (44) : 3330,

CANARD PILET *Anas acuta*

Les effectifs hivernants apparaissent particulièrement faibles cette année : à peine 1900 Pilets à la mi-janvier.

Recensement BIRCE - janvier 89

| 35 | 22  | 29  | 56   | 44  | Total Bretagne |
|----|-----|-----|------|-----|----------------|
| 11 | 255 | 122 | 1154 | 355 | 1897           |

Principaux sites : golfe du Morbihan : 1050, Basse-Loire (44) : 312, Anse d'Yffiniac (22) : 252.

Présence tardive au printemps en baie de Goulven (29) : 1 femelle le 5 mai, 1 mâle et 1 femelle le 17 juin.

### SARCELLE D'ETE *Anas querquedula*

Pas d'information en provenance des principaux sites, Loire-Atlantique et sud-Finistère. 7 le 26 mars à Locoal-Mendon (56), 1 couple le 4 avril à Bosméléac (22), 2 le 5 à Kernouës (29), 1 couple le 10 à Yffiniac (22), 1 le 21 à Lanrivoaré (29), 1 le 1er mai à Plouhinec (56) et 1 le 4 mai à Locmiquélic (56). 2 à 3 couples dans l'Etier de Caden/le Tour du Parc (56) : 1 femelle couve le 27 mai, 1 couple avec poussins et 3 ad. le 26 juin.

### CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

Cette année encore, les sites d'hivernage bretons ne font pas le plein : 3600 Souchets dénombrés à la mi-janvier.

Recensement BIROE - janvier 89

| 35 | 22 | 29 | 56  | 44   | Total Bretagne |
|----|----|----|-----|------|----------------|
| 87 | 2  | 54 | 417 | 3046 | 3606           |

Principaux sites : lac de Grand-Lieu (44) : 2200, Basse-Loire (44) : 780, golfe du Morbihan : 360. En période de reproduction : 1 le 23 avril puis 2 le 17 juin à Kerlouan, (29), 2 le 17 mai à Plougasnou (29), 3 mâles paradant le 13 mai à Locmiquélic (56).

### NETTE ROUSSE *Netta rufina*

1 le 21 septembre au lac de Grand-Lieu (44), 1 du 21 septembre au 13 novembre à Tréogat (29), 1 les 20 et 22 janvier à Lanrelas (22), 1 le 15 mars à Marcillé-Robert (35).

### FULIGULE MILOUIN *Aythya ferina*

Situation normale en hiver doux, tant pour les effectifs que pour la répartition.

Recensement BIROE - janvier 1989.

| 35  | 22  | 29  | 56   | 44   | Total Bretagne |
|-----|-----|-----|------|------|----------------|
| 434 | 343 | 637 | 1887 | 1342 | 4643           |

2 sites accueillent la majorité des hivernants : l'étang au Duc/Vannes (56) avec 1710 et le lac de Grand-Lieu (44) avec 1200.

### FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

1 juv. le 1er novembre puis 1 mâle (imm ?) le 30 décembre en rade de Brest (29), 1 les 26 décembre et 18 janvier à Rennes (35).

## FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula*

Un hiver sans surprise !

Recensement BIRCE - janvier 1989

| 35  | 22  | 29  | 56  | 44  | Total Bretagne |
|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 131 | 136 | 563 | 214 | 463 | 1507           |

## FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

Premiers le 29 octobre en baie du Mont-St-Michel (35), le 1er novembre en rade de Brest (29)... A l'étang de Kerhuon (29) le pic hivernal est atteint fin décembre avec 40-45 le 26. Seulement 954 Milouinans sont dénombrés à la mi-janvier en Bretagne en raison d'une forte diminution en estuaire de la Vilaine (56) : 848. Ailleurs : 59 en Rance (35-22), 30-35 le 13 janvier à Kerhuon où les derniers hivernants sont notés le 30 mars.

## EIDER A DUVET *Somateria mollissima*

Cette année est marquée par une remarquable abondance de l'Eider. Les premières arrivées sont notées en septembre : 1 le 14 à Hillion (22), 1 le 22 à Ploemeur (56), 5 le 25 à Carantec (29)... mais surtout en octobre et novembre où l'on note également une augmentation des effectifs : 28-30 le 20 octobre en baie de Douarnenez (29), 29 le 8 en baie de l'Arguenon (22), 30 en novembre à Ploemeur (56)... Par la suite, de nouvelles arrivées ne sont pas exclues mais la trame lâche des observations ne permet pas de le distinguer des mouvements locaux. En janvier, au moins 450 Eiders sont dénombrés sur le littoral breton : 150 en Basse-Loire (44), 48 sur le littoral de la Turballe à Mesquer (44), 71 en baie de Vilaine (56), 50 en baie de Quiberon (56), 60 en baie de Douarnenez (29), 17 en baie de St-Brieuc (22), 20 entre le Cap Fréhel et la baie de Lancieux (22)... De forts contingents stationnent encore dans la région au printemps : 45 le 8 avril à Morieux (22) dont 7 restent jusqu'en juillet, 30 le 19 mai à Houat (56), 26 le 21 juin en baie de la Baule (44)...

La nidification est d'ailleurs de nouveau observée sur ces deux derniers sites : 1 nid à Houat et 1 nid à la Pierre-Percée (44). L'Eider a, en outre, niché dans un nouveau site : 1 couple en Rance maritime (35).

Cet afflux d'Eiders en Bretagne au cours de l'automne 88 n'est pas un cas isolé. Il s'intègre dans un mouvement de grande ampleur, de type "irruption" qui a mené plusieurs milliers de jeunes Eiders à quitter la Baltique pour l'Europe centrale et la Méditerranée d'une part, le sud-ouest de l'aire d'hivernage habituelle d'autre part, c'est-à-dire le nord et l'ouest de la France. Pour plus de détails à ce sujet, se référer à la synthèse de Géroutet (1991).

## EIDER A TETE GRISE *Somateria spectabilis*

1 imm. les 10 et 18 décembre à la Turballe (44). Il s'agit de la 3ème observation en France, au cours du 20ème siècle, de cette espèce arctique.

## HARELDE DE MIQUELON *Clangula hyemalis*

Cette année aura également amené un nombre remarquable d'observations de Hareldes. Comme pour l'Eider, l'amorce du phénomène est décelé en octobre-novembre, et le maximum de janvier est sans doute à attribuer à l'intense activité ornithologique au moment des recensements BIROE.

Octobre : 1 le 2 à Plounéour-Lanvern (29)

Novembre : 1 le 2 à St-Jacut (22), 2 à 3 du 4 novembre au 3 décembre à Erbrée (35 intérieur), 1 le 11 en baie de Daoulas (29), 1 les 23 et 28 à Damgan (56), 2 le 27 à Pénestin (56)

Décembre : 1 les 9 et 11 à Goulven (29), 1 du 13 au 21 janvier à Vannes (56), 1 le 27 à Lopérhet (29)

Janvier : 4 le 1er à Lampaul-Plouarzel (29), 1 le 5 à St-Pierre-Quiberon (56) ; 12 le 7 et 16 à la mi-janvier en baie de Douarnenez (29), 5 du 12 au 21 à Sarzeau (56), 1 le 17 à Taden (22), 1 en Penzé et 1 en rade de Brest (29), 2 au lac de Grand-Lieu (44) à la mi-janvier, 1 du 29 janvier au 5 février à St-Pol de Léon (29).

Février : 10 le 11 entre Houat et Hoëdic (56)

Mars-avril : 5 le 31 mars à Hoëdic, 2 le 14 avril à Lanmodez (29) et 1 le 23 à Goulven

## MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca*

L'espèce est notée en nombre inhabituel cette année, à partir de novembre : 1 le 2 à Pleudaniel (22), 9 le 4 Erbrée (35 intérieur), 1 le 9 à Planguenoual (22)... 11 à St-Nicolas de Redon (44 intérieur). Les plus forts effectifs sont enregistrés en janvier, à l'occasion des recensements BIROE : 16 entre Lancieux et le Cap-Fréhel (22), 25 à Planguenoual (22), 4 en Penzé (29), 14 en rade de Brest (29), 6 en baie de Douarnenez (29), 10 à la Turballe (44). Dernières : isolées le 6 avril en rade de Brest (29), le 7 à Ouessant (29) et le 18 avril à Pleudaniel (22).

## MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*

L'abondance de cette espèce est à rapprocher de celle des autres canards marins : à la mi-janvier, 861 dans les Côtes d'Armor dont 365 entre Planguenoual et le Cap-Fréhel, 2500 en baie de Douarnenez (29), 1000 à Erdeven (56), 520 en baie de Quiberon (56), 320 en baie de Vilaine (56)... Passage du 26 mars au 2 avril à Ouessant (29). A cette époque, 1200 en baie de Morieux (22). Halte migratoire ? De petits groupes s'attardent dans la région jusqu'à la fin de la période : 40 de mai à juillet à Planguenoual, 8-10 le 19 mai, 15 le 16 juin en rade de Brest (29), 9 vers NW le 16 juin à Ouessant.

## GARROT A OEIL D'OR *Bucephala clangula*

837, à la mi-janvier, en Bretagne, dénombrés pour l'essentiel dans le golfe du Morbihan : 730, et en Rance (35-22) : 52. On note 3 ind. pour le reste des Côtes d'Armor, 19 en Finistère, 26 pour le reste du Morbihan et 7 en Loire-Atlantique.

# HARLE PIETTE *Mergus albellus*

1 mâle et 1 femelle le 26 novembre à Sizun (29), seule observation de l'hiver.

# HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

14 observations, principalement dans l'intérieur de la région : 2 du 15 au 20 novembre à Erbrée (35), 2 le 9 décembre à Hédé (35), 1 du 18 décembre au 8 janvier à Sizun (29), 1 en Penzé et 1 au Yeun Elez (29) à la mi-janvier, 5 à St-Gilles (22) et 1 à Ploemeur (56) le 19 février, 1 le 20 mars à Lanrivoaré (29) et une donnée non datée : 3 à Cancale (35).

# HARLE HUPPE *Mergus serrator*

1er le 29 octobre à Cancale (35).

Recensement BIROE - janvier 1989

| 35 | 22  | 29   | 56   | 44 | Total Bretagne |
|----|-----|------|------|----|----------------|
| 1  | 255 | 1352 | 2024 | 39 | 3671           |

La Bretagne accueille 80% des Harles huppés dénombrés en France en 1989, principalement dans le golfe du Morbihan : 1590 ; en rade de Brest (29) : 1250 ; en baie de Vilaine (56) : 260...

Dernières observations : 2 le 24 avril en rade de Brest et 1 le 19 mai à Hoëdic.

# ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis*

1 femelle le 20 janvier à Canihuel (22).

**MILAN ROYAL *Milvus milvus***

4 observations précoces, en Loire-Atlantique : 2 le 4 août à la Turballe, 1 le 7 à Port-St-Père et 1 le 15 à Ancenis, et en Morbihan : 1 le 18 à Séné. La Loire-Atlantique recueille ensuite 9 données jusqu'au 9 février. Dans le reste de la région, les observations reprennent en octobre : 1er le 15 à Tréogat (29) et culminent en novembre : 5 données. On note ensuite 1 observation par mois, sauf en février et mai, jusqu'au 8 juin, date de la dernière observation à La Martyre (29) : Cesson-Sévigné et Erbrée (35), forêt de Lorge et Ploeuc sur Lié (22) où 1 oiseau, victime de la chasse, est découvert le 29 janvier.

**MILAN NOIR *Milvus migrans***

... 1 le 25 janvier à Nantes (44).

**PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla***

1 le 30 octobre à Surzur (56).

**CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus***

1 le 21 mai à Braspart (29), 1 le 25 juin à Parigné (35) et 1 fin juin à St-Allouestre (56).

**BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus***

... 1 couple à Ouessant (29) ce printemps mais pas de preuve de reproduction.

**BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus***

... 11 couples dénombrés dans les Monts d'Arrée (29)...

**BUSARD CENDRE *Circus pygargus***

... 16-17 couples dénombrés dans les Monts d'Arrée (29).

**AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis***

3 observations de migrateurs : 1 les 15 septembre et 4 novembre à Tréogat (29), 1 le 14 novembre à Ouessant (29).

Les autres observations sont réalisées sur des sites favorables à la reproduction : 1 les 7 août et 30 octobre en forêt de Fougères (35), 1 le 26 novembre à Lanouée (56), noté à deux reprises en janvier à la Meilleraye de Bretagne (44), 1 couple le 12 mars en forêt du Gâvre (44) et 1 couple pendant tout le printemps en forêt de Loudéac (22).

# EPERVIER *Accipiter nisus*

Passage post-nuptial noté du 3 septembre au 3 novembre à Ouessant (29) avec un maximum à partir du 11 octobre. Un faible passage y est décelé au retour, du 15 mars au 13 avril.

# AIGLE CRIARD *Aquila clanga*

2 le 12 février, en Brière, à St-Malo de Guersac (44).

# BALBUZARD PECHEUR *Pandion haliaetus*

11 observations d'isolés, du 10 août en rivière de Pénerf (56) au 20 septembre à Meslin (22), puis 1 le 14 octobre à Ouessant (29) et 1 le 28 octobre sur le golfe du Morbihan. 1 enfin le 2 mai à l'Île-Grande (22).

# FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

1 mâle imm les 12 et 28 mai à Tréogat (29), 1 mâle imm. le 31 mai et 1 femelle le 1er juin à Guérande (44).

# FAUCON EMERILLON *Falco colombarius*

Passage post-nuptial du 13 septembre au 5 novembre à Hoëdic (56) et du 20 septembre au 30 octobre à Ouessant (29). Dans les deux cas, maximum durant les deux dernières décades d'octobre. Encore 1 le 16 et 1 le 30 novembre à Ouessant où 1 femelle hiverne jusqu'au 25 avril... Sur ces deux îles, un faible passage de printemps est perçu fin mars : 1 le 20 et 1 le 31 à Ouessant, 1 femelle les 28 et 29 et 1 mâle le 30 à Hoëdic. Encore 1 femelle les 8 et 22 avril à Erdeven (56) et 1 femelle le 15 mai à Goulven (29).

# FAUCON GERFAUT *Falco rusticolus*

1 le 13 octobre à Ouessant (29).

# FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

Premiers migrants après la mi-septembre : le 14 à Tréogat (29), le 21 à Ouessant (29)... Le rush migratoire se produit en octobre. Le nombre d'observations se stabilise de novembre à février. A cette époque des oiseaux se cantonnent sur certains sites pour l'hiver, comme à Goulven (29), en rade de Brest (29), en baie de Morlaix (29), en baie du Mont-St-Michel (35). Départ massif des hivernants en mars.

| MOIS         | Sept | Oct | Nov | Dec | Janv | Fev | Mars | Avr | Mai | ju |
|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|----|
| Nbre données | 3    | 15  | 11  | 9   | 10   | 8   | 3    | 2   | 4   | 1  |

Derniers : le 1er mai en baie de Morlaix (29), le 8 en rade de Brest (29), le 19 à Erquy (22), le 20 au Cap Fréhel (22). Enfin 1 le 18 juin à Séné (56).

#### CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix*

... 1 le 14 octobre à Ouessant (29), 1 le 30 octobre à Petit Mars (44).  
1989, année faste pour la Caille, bien que les données partielles dont nous disposons ne reflètent qu'imparfaitement la situation. Des migrateurs sont notés à Hoëdic (56) : 2 les 14 et 15 mai, 3 le 20 et à Ouessant (29) : 5 le 18 et 2 le 24 mai. Par la suite, 18 données dans les Côtes d'Armor, notée à Berrien, Commana, Guimaëc, Bolazec, Le Cloître St-Tégonnec, Plougasnou, Morlaix, Scrignac, Plounéour-Ménez, Botsorhel et Hanvec pour le Finistère, à St-Vincent et St-Martin-sur-Oust et à St-Jean la Poterie pour le Morbihan.

#### MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana*

Passage notée du 8 août, 1 à Ancenis (44) au 20 octobre, 1 à Ouessant (29), mais principalement en août cette année : 4 données sur 8. Signalons également 3 observations de Marouettes indéterminées à Ouessant entre le 25 octobre et le 3 novembre. 1 le 17 mai à Marcillé-Robert (35).

#### FOULQUE MACROULE *Fulica atra*

Renseignement BIROE - Janvier 1989.

| 35   | 22  | 29   | 56   | 44   | Total Bretagne |
|------|-----|------|------|------|----------------|
| 1354 | 802 | 1801 | 5660 | 2712 | 12528          |

Principaux sites : golfe du Morbihan (56) : 3245, rivière d'Etel (56) : 1440, lac de Grand-Lieu (44) : 1200, étangs de la région de Vitré (35) : 1080.

#### GRUE CENDREE *Grus grus*

2 le 23 octobre à Hoëdic (56).

#### OUTARDE CANEPETIERE *Tetrax tetrax*

1 le 30 septembre à Ouessant (29).

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus*

Recensement BIROE - janvier 89

| 35   | 22   | 29   | 56+44 | Total Bretagne |
|------|------|------|-------|----------------|
| 9336 | 7221 | 3599 | 4137  | 24293          |

Les effectifs sont du même ordre que ceux de janvier 1988. La baie du Mont Saint-Michel et l'anse d'Yffiniac avec respectivement 9060 et 4650 individus, regroupent un peu moins de 60% des effectifs dénombrés en Bretagne à la mi-janvier 1989. A la même époque, 1150 oiseaux en baie de Morlaix, 700 en estuaire de la Penzé, 600 en baie de Goulven, 790 en baie de Quiberon, 1100 en baie de Vilaine, 1100 aux Traicts du Croisic et 723 en Basse-Loire.

ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus*

Première le 18 mars à Séné (56) ; le printemps 89 est manifestement une bonne année pour les Echasses en Bretagne, ce qui se traduit par :

- des effectifs nicheurs importants sur les sites traditionnels : 40 couples à Séné (56), 10+ couples en rivière de Pénérif (56) où l'on note également des regroupements en fin de reproduction : 50 le 22 juin.
- des observations sur la côte nord : 9 le 1er mai à Penvénan (22), 2 le 10 mai à Jugon-les-Lacs (22) et de plus la nidification de 3 couples à Antrains (35).

AVOCETTE *Recurvirostra avosetta*

Augmentation sensible des effectifs par rapport aux 3 hivers précédents. A noter en particulier, le développement de l'hivernage en rivière de Pont-l'Abbé (29).

Recensement BIROE - 1989

| 35 | 29  | 56   | 44   | Total Bretagne |
|----|-----|------|------|----------------|
| 37 | 107 | 1450 | 2700 | 4294           |

Principaux sites : estuaire de la Loire (44) : 2240, baie de Vilaine (56) : 940, golfe du Morbihan : 510, traicts du Croisic (44) : 460, rivière de Pont-l'Abbé : 84. 60-70 couples au printemps 89 à Séné (56).

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus*

Régulièrement noté à Plouhinec (56) en août (max 10 le 29) et dernier le 2 octobre. 1-2 les 15 et 16 août à St-Herblon (44). 1-2 couples à Plouhinec et 1 à Erdeven (56) au printemps 89.

**GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula***

Quelques stationnements importants à l'automne : 1200 le 8 août à Gâvres (56), 5-600 le 9 à Damgan (56)... 2000 le 11 septembre en baie de Goulven (29), 400+ le 28 à St-Brévin (44)... 500 en rivière de Daoulas (29) et 800 dans l'estuaire du Jaudy (22) le 19 novembre. L'hivernage bat tous les records cette année avec 10385 individus dénombrés en Bretagne à la mi-janvier.

**Recensement BIROE - 1989**

| 35  | 22  | 29   | 56+44 | Total Bretagne |
|-----|-----|------|-------|----------------|
| 415 | 939 | 6415 | 2616  | 10385          |

**GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus***

3 sites accueillent des regroupements post-nuptiaux importants : 160 le 19 juillet à Tréogat (29), 270-300 le 8 août en mer de Gâvres (56), max 260 le 13 août en baie de Goulven (29).

**PLUVIER GUIGNARD *Eudromias morinellus***

1 du 18 au 22 août à Goulven (29), au moins 5 le 8 et le 20 septembre puis 1 les 18 et 20 octobre à Ouessant (29). 1 le 4 mai à Plouguenast (22), 1 femelle le 20 juin à Ouessant (29).

**PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva***

1 le 4 septembre à Tréogat (29).

**PLUVIER DORE *Pluvialis apricaria***

1 le 22 juillet à l'Ile-Grande (22). Début du passage en septembre, le 7 à Ouessant (29), le 11 à Châtillon-en-Vendelais (35), le 13 à Tréogat (29)... Arrivée massive après la mi-octobre : 100 le 16 à Goulven (29), 105 le 20 à St-Nic (29)... 7-800 le 23 en rivière de Daoulas (29)...

**Principales concentrations hivernales (décembre-janvier) :**

- 22 : 250 le 19 janvier à Runan
- 29 : 2500 le 26 décembre en rivière de Daoulas, 300 le 30 à Pleyber-Christ, 500 à la mi-janvier en Penzé, 600 le 21 à Goulven et 3-400 à Ploudaniel, 510 le 29 à St-Pol-de-Léon.
- 56 : 1395 à Moréac et 100 au Moustoir-Remungol le 6 janvier, 1015 à Bréhant-Loudéac (22) le 23, 250 à Croixanvec et 375 à Noyal-Pontivy le 25...
- 44 : 800 à la mi-janvier à Ancenis.

Derniers hivernants le 18 mars à Goulven. Encore quelques attardés à Ouessant jusqu'au 12 mai et 1 le 24 à Roscoff (29).

**PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola***

Hivernage record avec près de 12000 pluviers dénombrés à la mi-janvier sur le littoral breton.

Recensement BIROE - janvier 1989

| 35   | 22   | 29   | 56   | 44  | Total Bretagne |
|------|------|------|------|-----|----------------|
| 2852 | 1691 | 2992 | 3731 | 620 | 11886          |

Principaux sites : baie du Mont-St-Michel (35) : 2840, golfe du Morbihan : 2400, Trégor (22) : 1126, rade de Lorient (56) : 830, baie de Goulven (29) : 800.

**VANNEAU HUPPE *Vanellus vanellus***

Citons quelques chiffres concernant la mi-janvier :

- 35 : 1500 en baie du Mont-St-Michel, 2700 autour des étangs de la région de Vitré.
- 22 : 2826 dénombrés dans l'intérieur dont 800 à Runan, 600 à Perret, 500 à Merléac...
- 29 : 4500 dénombrés dans le nord du département dont 763 en rade de Brest, 2000 dans les Abers, 1200 en baie de Goulven...
- 56 : 1500 sur le littoral et 5700 sur les communes de Moréac, Moustoir-Remungol, Pluméliau, Kerfourn, Noyal-Pontivy, St-Gérard, Croixanvec, Bréhan-Loudéac et Lanouée.
- 44 : 4500 à Ancenis.

**BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus***

Recensement BIROE - janvier 1989

| 35  | 22   | 29 | 56 | 44 | Total Bretagne |
|-----|------|----|----|----|----------------|
| 930 | 2438 | 96 | 96 | 10 | 3570           |

3 sites regroupent plus de 90% de la population hivernante : l'Anse d'Yffiniac (22) : 2000, la baie du Mont-St-Michel (35) : 930 et la baie de St-Efflam-Lannion (22) : 370. On notera particulièrement l'effondrement des effectifs de la baie du Mont.

**BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba***

Recensement BIROE - janvier 1989

|    |     |      |     |    |                |
|----|-----|------|-----|----|----------------|
| 35 | 22  | 29   | 56  | 44 | Total Bretagne |
| 10 | 384 | 3398 | 193 | 4  | 3989           |

La baie de Goulven se distingue encore par des effectifs remarquables durant la migration post-nuptiale : 1010 dès le 29 juillet, maximum 1500 le 11 septembre. Nouvelle augmentation sensible des effectifs dénombrés en hiver, et toujours une prépondérance du littoral du nord-Finistère (3060 ind).

**BECASSEAU SEMIPALME *Calidris pusilla***

1 ad. les 16 et 17 juin à Ouessant (29). Deuxième observation de cette espèce américaine, à une époque surprenante.

**BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta***

Passage post-nuptial très étalé : du 22 juillet au 18 novembre à Séné (56). De façon générale, les groupes les plus importants sont notés de fin août à mi-septembre : 11 le 27 août à Goulven (29),... 7 à 22 entre le 5 et le 17 septembre à Guérande (44)... 13 le 8 à Lancieux (22), 14 le 10 à St-Coulomb (35)... 28 le 18 à Goulven, encore 14 le 1er octobre en baie du Mont-St-Michel (35). En hiver, 1 le 18 décembre à Erbrée (35) et 11 à la mi-janvier en baie du Mont-St-Michel (35). 2 les 21 janvier et 12 février et 4 le 5 mars en baie de Goulven (29), 1 les 22 février et 8 mars en baie de St-Brieuc (22).

Observations sporadiques au printemps, surtout durant :

- la première quinzaine d'avril : 6 données, max 7 les 12 et 14 à Séné (56)
- la première quinzaine de mai : également 6 données, max 5 le 11 à Séné.

**BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii***

1 le 30 juillet à St-Suliac (35), 1 le 13 septembre à Ouessant (29), 1 du 26 avril au 2 mai puis 2 le 3 mai à Brest (29), 1 le 4 et 2 le 6 mai à Séné (56).

**BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos***

1 les 1er et 8 octobre à Plonéour-Lanvern (29) ; 1 le 5 juin à Brest (29).

**BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea***

Premiers migrants le 22 juillet à Séné (56), le 29 sur la Loire (44) et à St-Benoît des Ondes (35)... Passage important de juvéniles à partir de fin août, culminant à la mi-septembre : 33 le 4 septembre à Mesquer (44), 15 le 7 septembre, 52 le 9, 40 le 18 et 33 le 23 à Locquénoé (29), 15 le 10 et 57 le 11 septembre dans l'anse d'Yffiniac (22), 16 à Séné du 11 au 18,... Encore quelques

groupes en octobre : 25-30 le 8 en baie de Morlaix (29), 15 le 21 en baie de Goulven (29). Dernier le 13 novembre à Riaillé (44).

Petit passage du 1er au 14 mai (max 3) à Séné (56), 1 le 6 mai en baie de St-Brieuc (22).

#### BECASSEAU VIOLET *Calidris maritima*

1er le 26 août à Ouessant (29) où l'espèce devient régulière à partir du 7 septembre. L'île accueille 9 hivernants dont le départ se situe fin mars-début avril. Par la suite, un passage est décelé du 18 avril au 26 mai (max 67 le 11). Bien peu de données par ailleurs : 110 recensés sur le littoral breton à la mi-janvier.

#### BECASSEAU VARIABLE *Calidris alpina*

Recensement BIROE - janvier 1989

| 35    | 22    | 29    | 56    | 44   | Total Bretagne |
|-------|-------|-------|-------|------|----------------|
| 35260 | 23621 | 43858 | 43400 | 8810 | 154949         |

Principaux sites : baie du Mont-St-Michel (35) : 35100, golfe du Morbihan : 23000, estuaire de la Penzé (29) : 7800, baie de Vilaine (56) : 7200, baie de Goulven (29) : 6500, baie de Morlaix (29) : 6300, rade de Lorient (56) : 6300.

#### BECASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus*

3 ad. les 9 et 10 mai à Séné (56). Si les dates sont habituelles pour la France, l'effectif est tout à fait remarquable pour la région.

#### BECASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis*

1 le 8 septembre à Ouessant (29).

#### BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus*

2 dès le 22 juillet à Ancenis (44), 1 le 25 septembre à Gosnée (35) puis passage à Ouessant (29) du 12 octobre au 4 novembre (10 données pour 16 ind.).

#### LIMNODROME A LONG BEC *Limnodromus scolopaceus*

1 juv. le 20 octobre à Goulven (29) ; 1 ad. à partir du 3 juillet à Séné (56).

**BARGE A QUEUE NOIRE** *Limosa limosa*

Recensement BIROE - janvier 1989

| 35  | 22 | 29 | 56 | 44  | Total Bretagne |
|-----|----|----|----|-----|----------------|
| 415 | 0  | 83 | 0  | 250 | 748            |

L'hivernage de cette espèce en Bretagne, et surtout en baie du Mont-St-Michel (35), devient de plus en plus marginale. Rappelons que ce site accueillait 6000 barges au début des années 70. 1 couple dans les marais de Séné (56).

**BARGE ROUSSE** *Limosa lapponica*

Recensement BIROE - janvier 1989

| 35  | 22  | 29   | 56  | 44  | Total Bretagne |
|-----|-----|------|-----|-----|----------------|
| 600 | 962 | 1348 | 136 | 160 | 3206           |

Principaux sites : baie de Goulven (29) : 800, anse d'Yffiniac (22) : 700, baie du Mont-St-Michel (35) : 600, baie de Morlaix (29) : 240.

**COURLIS CORLIEU** *Numenius phaeopus*

... 3-5 hivernants de novembre à février à Ouessant (29), 2 le 30 novembre au 27 février à Plouzané (29), 2 du 10 au 26 décembre puis 1 jusqu'au 11 mars en rivière de Daoulas (29), 1 le 12 février en baie de Goulven (29).

**COURLIS CENDRE** *Numenius arquata*

| 35   | 22   | 29   | 56  | 44  | Total Bretagne |
|------|------|------|-----|-----|----------------|
| 1970 | 1230 | 1619 | 840 | 260 | 5919           |

Principaux sites : baie du Mont-St-Michel (35) : 1950, anse d'Yffiniac (22) : 684, estuaire de la Penzé (29) : 400, baie de Morlaix (29) : 320, golfe du Morbihan : 310.

**CHEVALIER ARLEQUIN** *Tringa erythropus*

73 à la mi-janvier avec 2 pôles principaux : la baie de Goulven (29) avec 45 et les marais de Séné (56) avec 15. Par ailleurs, 12 sur le reste du littoral du nord Finistère et 1 à Paimpol (22).

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

Recensement BIROE - janvier 1989

| 35 | 22  | 29   | 56  | 44 | Total Bretagne |
|----|-----|------|-----|----|----------------|
| 17 | 646 | 1994 | 696 | 80 | 3433           |

Principaux sites : littoral du Trégor (22) : 458, baie de Morlaix (29) : 370, baie de Goulven (29) : 350, golfe du Morbihan : 320, estuaire de la Penzé (29) : 250, Baie de Vilaine (56) : 240.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

1 le 16 août à La Forêt-Landerneau (29) ; 1 le 8 mai à Jugon-les-Lacs (22).

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*

La migration post-nuptiale semble maximale en août en Ile-et-Vilaine et en Morbihan. Derniers le 17 septembre en Ile-et-Vilaine, le 24 en Loire-Atlantique. Enfin, 1 attardé le 2 novembre à Pleudaniel (22).

Passage de printemps très faible, uniquement en mai : 1 le 7 à Larmor-Baden (56) et à Séné (56)... 1 le 27 à Kerlouan (29).

Arrivée bien marquée après la mi-juin : 1 le 17 à Goulven (29), 1 le 21 à Séné (56)... 10-15 le 8 juillet à le Tour-du-Parc (56).

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos*

Le 10 juin, 1 ad accompagné de 4 poussins sont observés sur un îlot de la Loire à Varades (44), ce qui constitue la première preuve de reproduction de l'espèce en Bretagne !

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres*

Recensement BIROE - janvier 1989

| 35  | 22  | 29   | 56  | 44  | Total Bretagne |
|-----|-----|------|-----|-----|----------------|
| 384 | 774 | 3775 | 794 | 360 | 6087           |

Principaux sites : estuaire de la Penzé (29) : 900, baie de Quiberon (56) : 583, baie de Morlaix (29) : 500, littoral du Trégor (22) : 476, les Abers (29) : 401, baie de Goulven (29) : 400.

### PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus*

3 observations d'isolés dans le sud-est de la région : le 23 septembre à Pénestin (56), le 23 à Bourgneuf (44) et le 25 septembre à Piriac (44).

### PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*

Observé uniquement à l'automne et surtout à Ouessant (29) : 1 le 26 août, 1 le 23 septembre, 10 le 7 octobre, 1 le 10, 7 le 11 puis 1 le 30 octobre. 1 le 8 octobre à Tréogat (29) et 1 cadavre découvert en octobre en Brière (44).

### LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*

1 le 21 août à Plougasnou (29). A Ouessant, le passage noté du 8 septembre au 10 novembre culmine de fin septembre à fin octobre. Toutes les autres observations sont réalisées en octobre sauf 2 W le 20 novembre à Brignogan (29).

### LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus*


Passage post-nuptial du 22 août au 29 octobre à Ouessant (29) mais surtout du 13 au 28 septembre puis du 5 au 12 octobre. Dans le reste de la région, les observations concernent la même plage de temps et des effectifs réduits (1-2 ind.) sauf 4 le 13 septembre à St-Malo (35), 12 le 21 en baie de St-Brieuc (22) et 3 le 11 octobre au Cap Fréhel (22). Au printemps, Ouessant fournit 4 données entre le 30 mars et le 14 avril pour 5 ind. 1 les 11 et 27 avril en rade de Brest (29) et 1 le 30 avril à St-Philibert (56).

### GRAND LABBE *Stercorarius skua*

A Ouessant (29), le passage d'automne qui s'étale sur 2 mois et demi (du 18 août au 31 octobre) culmine durant la deuxième décade de septembre et la première quinzaine d'octobre. Très peu ensuite. 2 le 20 novembre à Brignogan (29), 1 à 2 les 1er et 6 décembre et 5 janvier à Ouessant, 1 le 22 janvier à Bréhat (22). 1 ind. épuisé le 4 avril à Chauvigné (35), à plus de 20 km de la mer. Ouessant fournit 2 observations à cette époque : 12 le 5 avril et 3 le 11.

### MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*

| Dpt          | 35 | 22 | 29 | 56 | 44 |
|--------------|----|----|----|----|----|
| Nbre données | 2  | 26 | 39 | 5  | 3  |



Cette année encore on note une prépondérance des observations en Côtes d'Armor et Finistère. La répartition temporelle des observations montre :

- un net maximum en septembre-octobre
- une remontée prénuptiale très étalée voire partiellement masquée par des estivages, notamment en baie de St-Brieuc (22) : 5 données en juin et juillet.

La baie de Douarnenez (29) accueille les plus forts effectifs : 15-20 le 20 octobre, 35 le 8 janvier.

#### MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla*

1 premier hiver le 23 août à Goulven (29) ; 1 juv. le 28 août à Ouessant (29).

#### MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan*

1 ad. du 1er au 13 décembre à Ouessant (29).

#### MOUETTE DE SABINE *Larus sabini*

Passage noté de début septembre à fin octobre essentiellement à Ouessant (29) : 9 données/14 entre le 26 septembre et le 28 octobre dont 8 individus le 7. Ailleurs, 2 le 3 septembre à St-Bihy (22), en centre Bretagne, 1 le 6 à Tréogat (29), 5 les 26 septembre et 2 octobre au large du Croisic (44) et 3 le 16 octobre au large de Belle-Ile (56).

#### GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis*

1 (2ème année) le 25 août, 2 (1er hiver) le 6 novembre en baie de Goulven (29). 3 observations concernant peut-être 1 seul ind : 1 ad le 10 septembre à Batz-sur-Mer (44), 1 ad (le même) le 17 septembre, 1 ad le 1er octobre à la Turballe (44). 1 imm. donne également lieu à de nombreuses observations à Brest (29) du 24 janvier au 6 février puis du 16 mars au 9 avril entre Kerhuon et Plouzané (29).

#### GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*

Addendum. 6 couples nicheurs cette année à Rennes (35). La première preuve de nidification y a été observée au printemps 88 : 2 à 4 couples.

GOELAND LEUCOPHEE *Larus cachinnans*

... 250 le 21 août à St-Michel-Chef-Chef (44). La forme "cantabrique" est identifiée le 27 août à Batz-sur-Mer (44) et le 25 octobre à Ouessant (29).

GOELAND MARIN *Larus marinus*

... 348 couples à l'île de Keller/Ouessant (29), plus grosse colonie française.

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*

1 ad. le 29 août à Ouessant (29) ; 2 le 22 juin à Le Tour du Parc (56).

STERNE CASPIENNE *Sterna caspia*

1 ad. du 20 au 23 juillet à Séné (56) ; 1 le 30 septembre au Cap Fréhel (22).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*

1390-1459 couples dans les réserves de la S.E.P.N.B. dont 551-600 à la Colombière/St-Jacut (22) ; 500 en baie de Morlaix (29) et 330-380 à Trévorc'h/St-Pabu (29).

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*

1 ad. nourrit 1 juv. volant le 2 août à la Colombière/St-Jacut (22). Migration post-nuptiale notée uniquement en août : 4 le 4, 2 le 7 et 5-6 le 17 à Larmor-Baden (56), 9 le 11 à Plérin (22), 1 le 21 à Préfailles (44), 1 le 25 à Plounéour-Trez (29) et 2-3 le 30 à Brest (29). 5 le 9 mai entre Quiberon et Houat (56). Les réserves de la S.E.P.N.B. accueillent près de 110 couples cette année : 1 couple à l'îlot Notre-Dame en Rance (35), première preuve de reproduction pour le site, 1 couple à la Colombière, 105 couples en baie de Morlaix (29), 1-2 couples à Trévorc'h/St-Pabu (29) et 1 couple en rivière d'Etel (56).

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

2 le 19 février à Plouhinec (56) ; 800 à 850 en zone protégée par la S.E.P.N.B. dont 128 à 140 à la Colombière/St-Jacut (22) ; 180 en baie de Morlaix (29), 135 à 150 à Trévorc'h/St-Pabu (29), 80 dans l'archipel de Glénan (29) et 160 à 180 en rivière d'Etel (56).

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea*

L'espèce est identifiée à 15 reprises, entre le 16 août et le 10 octobre, principalement dans le Finistère et le Morbihan (6 données chacun). Les observations concernent des isolées, sauf 2 le 16 et le 20 août à Hoëdic (56) ; 2 le 7 septembre, 4 le 15 et 2 le 8 octobre à Ouessant (29), 4 le 10 octobre au Cap Fréhel (22).

**GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus***

Un faible passage est ressenti de fin août à mi-septembre : 1 le 26 août à Tréogat (29), 2 le 29 et 3 le 18 septembre sur la Rance (22-35), 1 le 16 septembre à Ouessant (29). 2 le 3 mai et 1 le 7 juillet à Séné (56).

**GUILLEMOT DE TROIL *Uria aalge***

47 couples à Goulien (29), 17 à 22 aux Roches de Camaret (29), 79 au Cap Fréhel (22).

**PINGOUIN TORDA *Alca torda***

Présence notée aux Roches de Camaret (29) en période de reproduction ; 11 couples au Cap Fréhel (22).

**GUILLEMOT A MIROIR *Cepphus grylle***

1 (1er hiver) les 28 mars et 2 avril entre Molène et Ouessant (29).

**MACAREUX MOINE *Fratercula arctica***

... 14 couples à Ouessant (29) dont 10 sur l'Ile Keller, 11 à 12 couples en baie de Morlaix (29)...

G.GELINAUD

A SUIVRE.....