

DEUXIEME OBSERVATION RELATEE DU PLONGEON  
A BEC BLANC (*Gavia adamsii*)  
EN BRETAGNE

\*\*\*

Par Bernard CADIOU

026

Le 23 janvier 1992, je suis depuis 9h20 dans les falaises de Goulien / Cap Sizun (Finistère sud) pour observer l'arrivée des premières Mouettes tridactyles de la saison. En attendant que les quelques unes qui sont rassemblées en radeau sur l'eau se décident à s'envoler vers les falaises, je lis tranquillement le "Canard enchaîné". Vers 10h, baissant mon journal, mon regard est soudain attiré par un "gros oiseau" sur l'eau à une cinquantaine de mètres. A l'oeil nu, il a une allure de jeune Grand cormoran. Un coup de jumelle m'apporte l'identité de l'oiseau. Il s'agit d'un Plongeon, mais ce specimen ne correspond ni à l'arctique (*G. arctica*), ni au catmarin (*G. stellata*), compte tenu de la taille et de la tête anguleuse. Les conditions d'éclairage sont excellentes : Le ciel est bleu et l'oiseau se trouve dans la zone non éclairée au pied des falaises, d'où l'absence de reflet. Le bec blanc et anguleux me fait bondir sur ma longue-vue et mon crayon. Je l'observe pendant 15 minutes environ, le temps d'en faire un croquis précis. Il plonge une première fois pour réapparaître un peu plus loin, puis une deuxième fois et je le perds de vue. De nouvelles recherches vers 13h ne m'ont pas permis de le relocaliser.

En résumé, plusieurs détails caractéristiques peuvent être mentionnés :

- la silhouette est massive et la tête est très anguleuse ;
- le bec est blanc-jaune uniforme et anguleux ;
- une zone de plumes au-dessus du bec apparaît bien nettement (plumage maxillaire) ;
- l'oeil est bien isolé de la calotte ;
- le dos est légèrement écailleux, blanc-gris sur brun-gris ;
- le reste du dos, les flancs, la tête et le cou sont brun clair ;
- enfin, la délimitation n'est pas nette entre le blanchâtre et le brun sur le cou ;

Tous les détails notés concordent avec les critères d'identification de l'espèce (Monnat, 1977 ; Cramp & Simmons, 1977 ; Dubois, 1987). Il s'agit d'un individu en plumage de premier hiver. Par ailleurs, les photographies des ouvrages de Harrison (1987) et de Dubois & Duquet (1992, p.150) reflètent tout à fait l'oiseau observé (mis à part le dos un peu plus écailleux sur les photographies).

Il s'agit de la dixième mention française de l'espèce et la date concorde parfaitement avec celles des observations de deux immatures en 1987 (Boulogne sur Mer/Pas de Calais : du 17 au 24 janvier ; Antifer/Seine Maritime : du 18 au 25 janvier ; Dubois & Yésou, 1992).

#### BIBLIOGRAPHIE

- CRAMP, S & SIMMONS, K.E.L. (1977). - Handbook of the birds of Europe the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic. Volume I Ostrich to Ducks. Oxford University Press.
- DUBOIS, P.J. (1987). - Plongeurs... d'hiver. L'Oiseau Magazine 9 : 51-53.
- DUBOIS, P.J. & DUQUET, M. (1992). - La passion des Oiseaux. Sang de la Terre, Paris.
- DUBOIS, P.J. & YESOU, P. (1992). - Les oiseaux rares en France. E. Chabaud, Bayonne.
- HARRISON, P. (1987). - Seabirds of the world. A photographic guide. C. Helm, London.
- MONNAT, J.Y. (1977). - Un plongeur à bec blanc *Gavia adamsii* en Bretagne : première donnée française. Alauda 45 : 231-234.

Bernard CADIOU  
Le Bourg  
29770 GOULIEN