

**TENTATIVE DE CAPTURE D'UN CHIROPTERE PAR UN  
EPERVIER (*Accipiter nisus*)**

\*\*\*

Par Jacques ROS

07

Le 24 mars 1988, à la nuit tombante, 3 à 4 chauves-souris, probablement des Oreillardes sp (*Plecotus* sp.) virevoltent joyeusement autour des frondaisons d'un arbre dans un parc d'Arradon (Morbihan). Soudain, leurs ébats sont interrompus par l'arrivée brutale d'un épervier mâle en quête d'un encas vespéral. La chauve-souris visée par cette attaque s'esquive par d'habiles crochers, serrée de près par notre intrépide rapace. Hélas pour lui, la chauve-souris s'éclipse rapidement dans le feuillage, lui abandonnant le terrain. Conscient du ridicule de la situation, l'oiseau disparaît pour ne plus revenir.

La capture de chiroptères dans leurs gîtes par des rapaces nocturnes, en particulier l'effraie, est un fait connu ayant fait l'objet d'une assez abondante littérature (voir par ex Hainard 1987, Bersuder et Kayser 1988).

Il n'en va pas de même pour les rapaces diurnes. Il est vrai que les chauves-souris sont essentiellement nocturnes, ce qui constitue pour les falconiformes un facteur limitant... On trouve néanmoins mention de prédatons réussies de chiroptères par le Faucon hobereau *Falco subbuteo* (Géroutet 1965, Cramp et Simmons 1979, Juillard et Bassin 1985, Dronneau et Wassmer 1987) par le Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (Géroutet 1965, Duquet et Morlet 1986, Noblet 1987) et de tentative par le Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (Schimmings 1985) ; Hainard (1987) cite également le Milan royal *Milvus milvus* et la Buse variable *Buteo buteo*.

Quant à l'épervier, Géroutet (1965) signale que les chiroptères sont pour lui des proies occasionnelles ; Hainard (1987) le note également. Par contre, Cramp et Simmons (1979) ainsi que Joncour (1986) ne mentionnent pas les chauves-souris dans son régime alimentaire.

Il s'agit, dans tous les cas, de captures de chiroptères s'aventurant en plein jour (fait peu courant) ou sortant à la tombée de la nuit. Les animaux sont alors saisis en plein vol.

Sans exclure les phénomènes de spécialisation (Creutz 1974 sur la Sérotine Commune *Eptesicus serotinus*, Dronneau & Wasmer 1987 sur Noctule *Nyctalus noctula*), il est donc normal que ces prédateurs restent assez exceptionnelles. Par ailleurs, les chances de réussite sont limitées du fait de l'agilité des chauves-souris, y compris pour l'épervier dont les performances de chasse au vol sont connues. Le triste échec relaté ici en est un exemple.

# BIBLIOGRAPHIE

- |                                          |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BERSUDER, D. & KAYSER, Y. (1988).        | - La prédation des chiroptères par la Chouette effraie ( <i>Tyto alba</i> ) en Alsace et dans les contrées limitrophes. Ciconia 12 (3) 135-152. |
| CHAMP, S. & SIMMONS K.E.L. et al (1979). | - The Birds of the Western Palearctic. Vol 2, Oxford University Press.                                                                          |
| CREUTZ, G. (1974).                       | - Zur Ernährungsweise des Baumfalken. Der falke 6 : 200-201.                                                                                    |
| DRONNEAU, C. & WASSMER, B. (1987).       | - Chasses aux chauves-souris par le Faucon hobereau, ( <i>Falco subbuteo</i> ). Nos oiseaux, 39 : 159-162.                                      |
| DUQUET, M. & MORLET, L. (1986).          | - Capture d'un chiroptère par le Faucon pèlerin. Nos oiseaux, 38 : 297.                                                                         |
| GEROUDET, P. (1965).                     | - Les rapaces diurnes et nocturnes d'Europe. Delachaux & Niestlé. Ed. Neuchatel.                                                                |
| HAINARD, R. (1987).                      | - Mammifères sauvages d'Europe. Ed. Delachaux & Niestlé. Neuchatel 109-110.                                                                     |
| JUILLARD, M. & BASSIN, P. (1985).        | - Capture d'un chiroptère par le Faucon hobereau, ( <i>Falco subbuteo</i> ). Nos oiseaux, 38 : 34                                               |
| JONCOUR, G. (1986).                      | - L'épervier d'Europe. Etude d'une population en Basse-Bretagne. Ed. Fonds d'intervention pour les rapaces. La Garenne-Colombes.                |
| MOBLET, J.F. (1987).                     | - Les chauves-souris. Atlas visuel Payot. Lausanne.                                                                                             |
| SHIMMINGS, P. (1985).                    | - Kestrel attempting to catch bat in mid air. British Birds 78 : 109.                                                                           |

Jacques ROS