

**SYNTHESE DES OBSERVATIONS
ORNITHOLOGIQUES BRETONNES
ENTRE LES 16/07/1989 et 15/07/1990**

Par Guillaume GELINAUD

0031

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*

L'espèce est signalée entre le 6 octobre [1 à Plouézoc'h (29)] et le 30 avril [1 en rade de Brest (29)]. Un estivant est encore présent en rade de Brest du 18 juin au 15 juillet.

Les effectifs sont restés faibles cette année. Maxima enregistrés : 10 le 15 janvier entre St-Maurice et Fréhel (22), 5 à 10 le 7 janvier en baie de Douarnenez (29), 4 le 17 janvier à Ploëmeur (56) et 3 le 4 mars à Plouhinec (56). Toutes les autres localités n'ont accueilli que 1 à 2 ind.: Cancale (35), le littoral de Fréhel à Lancieux (22), Locquirec (29), Brignogan (29), la rade de Brest (29), Erdeven (56), Quiberon (56), Hoëdic (56) et le Croisic (44).

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica*

4 le 15 octobre, 5 le 22 octobre... maximum 60 le 1er janvier en rade de Brest (29)... derniers : 9 le 30 avril.

55 le 3 mars à Plouha (22) et 19 le 14 mars au Conquet (29), effectifs inhabituels pour ces localités indiquant peut-être un passage.

Autres sites ayant accueilli 1 à 2 ind.: le littoral entre Fréhel et Lancieux (22), la baie de St-Brieuc (22), Plestin-les-Grèves (22), Plougasnou (29), les Abers (29), la baie de Douarnenez (29), Ploëmeur (56) et Larmor-Plage (56).

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer*

L'espèce séjourne dans les parages de Houat et Hoëdic (56) du 22 octobre au 14 avril. C'est toujours de cette zone que nous proviennent les observations concernant les plus forts effectifs : 12 le 22 octobre, 17 le 29... 11 le 18 février à Hoëdic et 9 le 20 février entre Hoëdic et Quiberon.

On note également 8 le 17 décembre à Belle-Ile (56) et 3 le 18 entre Belle-Ile et Quiberon, 9 le 15 janvier en presqu'île de Quiberon (56), 5 le 15 janvier entre Plestin-les-Grèves et le Trieux (22), 5 le 4 février à Guissény (29), 3 le 2 mars en baie d'Audierne (29), 2 le 20 janvier à Carantec (29) et 1-2 le 25 décembre en rade de Brest (29).

Pour le reste essentiellement des isolés : en Rance (35), à Trébeurden (22), à Plougasnou (29), à St-Pol-de-Léon (29), à Santec (29), dans les Abers (29), à Ouessant (29), en baie de Douarnenez (29), à Lanester (56), à St Gildas-de-Rhuys (56), au Croisic (44).

GREBE HUPPE *Podiceps cristatus*

Progrès sensible de la connaissance des effectifs hivernants, sauf en Finistère.

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
363	988	78	1183	178	2790

Principaux sites : golfe du Morbihan (56) : 640, littoral de Fréhel à Lancieux (22) : 553, littoral de Morieux à Fréhel (22) : 280, baie de Vilaine (56) : 260, étangs du nord de la Loire-Atlantique (44) : 164, baie de Quiberon (56) : 160, étangs de la région de Vitré (35) : 111.

Au moins 12 couples dans le Yeun Elez (29).

GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis*

Dispersion post-nuptiale sensible à partir de fin juillet : 7 le 25 en rivière de Noyal (56), 1 le 29 à Hillion (22), mais surtout en août : 24 le 4 à Pordic (22). Arrivée massive en rade de Brest (29) en octobre : 100 les 16 et 23 septembre, 2600-2700 le 15 octobre.

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
43	33	2247	1084	26	3433

Principaux sites : rade de Brest (29) : 2200, golfe du Morbihan (56) : 1030, Penzé (29) : 32, Rance (35) : 31.

1 les 13 et 24 mai à Erbrée (35).

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus*

Premier le 11 novembre à Pléneuf-Val-André (22)

Le recensement de la mi-janvier permet d'atteindre un total de 48 ind. dans les Côtes d'Armor : 13 entre Plestin-les-Grèves et le Trieux (22), 1 entre Morieux et Fréhel (22) et 34 entre Fréhel et Lancieux (22). Dans le Finistère, maximum de 4 ind. le 18 février en Penzé, de 3 le 3 mars en baie de Goulven, de 15-20 le 30 décembre en rade de Brest. Enfin 1 le 15 janvier en baie de Douarnenez. Du Morbihan, retenons 1 le 17 décembre à Belle-Ile, 7 le 21 en presqu'île de Rhuys et 30 le 15 janvier en presqu'île de Quiberon.

Dernier le 6 avril à Trébeurden (22)

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

Le littoral du Morbihan fournit le plus grand nombre de données. Premier le 17 octobre entre Houat et Hoëdic (56), 2 le 28 octobre et 1 le 19 février à Hoëdic. Toutes les autres données concernent des isolés : le 25 octobre à Ouessant (29), le 18 décembre à Belle-Ile (56), le 27 décembre à Etel (56), le 29 décembre à St-Pierre-Quiberon (56), le 16 janvier sur la Rance (35), à Locmariaquer (56) et à Port-Blanc (22) le 20 janvier, le 21 janvier à Damgan (56), le 18 février à St-Pol-de-Léon (29).

Dernier le 1er mai à Châtillon-en-Vendelais (35)

PETREL FULMAR *Fulmarus glacialis*

... 1 couple parade le 28 mai à l'île de Cézembre (35), nouvelle localité.

OCEANITE CULBLANC *Oceanodroma leucorhoa*

C'est de loin l'espèce la plus affectée par les tempêtes de la deuxième moitié de décembre. Elle apparaît sur le littoral dès le lendemain de la première tempête qui a atteint un maximum d'intensité dans la nuit du 16 au 17 : 1 le 17 décembre à Guidel (56), 3 entre Belle-Ile et Quiberon (56) et 1 à Ouessant (29) le 18. L'espèce est particulièrement abondante à la côte du 20 au 25, après le passage d'une seconde dépression : 7 à Ouessant et 76 en trois points de la côte de Guidel le 20 ; 5 à Guidel, 20 à Lorient (56), plusieurs dizaines ou centaines au large de Sarzeau (56), 1 à Séné (56) et 12 à Ploëmeur (56) le 21 ; 1 à Sarzeau, 45 à Yffiniac (22) et 6 à Ploëmeur le 22. 6 le 24 à Ploëmeur, 1 à Plouharnel (56), 1 à Brest (29) et 30 à Guidel le 25 ; encore 4 le 26 et 2 le 27 entre Quiberon et Belle-Ile. Le premier cadavre est découvert dès le 17 à Tréogat (29), puis 1 à Pléneuf (22) et 1 à l'île-Grande (22) le 20. Les plus importants échouages sont observés sur le littoral du Morbihan : 10 à Guidel (56) et 1 à Lorient (56) le 21, 63 le 22 à Guidel, 4 à Plovan (29) le 23, 3 à Erdeven (56) le 24, 1 à Brest (29) le 25, 5 à Erdeven le 29, 3 à Tréguennec (29), 4 à Plouhinec (56) et 6 à Ploëmeur (56) le 30, 1 à Plovan le 31 et 1 à Sarzeau (56) le 1er janvier.

Bien que de nouvelles tempêtes sévissent en janvier, l'espèce n'est pratiquement plus signalée : 1 ou 2 le 22 en rade de Brest (29) et 1 mort le 29 à Etel (56).

Plusieurs observations font état d'une forte proportion d'oiseaux en mue des rémiges parmi les pétrels morts mais aussi parmi les oiseaux vivants, ce qui explique peut-être la plus grande sensibilité de l'espèce aux tempêtes de décembre.

OCANITE TEMPETE *Oceanodroma pelagicus*

Passage post-nuptial noté essentiellement dans les parages de Houat et Hoëdic (56), ainsi qu'à Ouessant (29). A Hoëdic, 1 le 8 août, 4 le 11, 1 le 14, 6 le 15 et 1 le 26 août. Plusieurs centaines au nord de Houat (56) le 14 août et 1 le 22 octobre entre Quiberon et Houat ; à Ouessant (29), 3 le 17 août, 1 les 31 août, 3 septembre et 12 novembre. Egalement 2 à 3 le 16 août à Sarzeau (56). Les tempêtes de la deuxième moitié de décembre donnent lieu à des observations en nombre exceptionnel pour la saison : 1 à Sauzon et 1 à Ploëmeur (56) le 17 ; 3 à Ouessant le 18 ; 2 à Guidel (56), 1 à le Tour du Parc (56) et 35 à Ouessant le 20 ; plusieurs dizaines à Sarzeau (56) et 4 à Ploëmeur le 21, 10 le 25 entre Guidel et Ploëmeur, 1 le 26 entre Quiberon et Belle-Ile (56). Cadavres notés dès le 17 : 2 à Tréogat (29), 4 le 22 à Guidel, 2 le 23 à Plovan (29), 1 le 24 et 2 le 29 à Erdevén (56), 2 à Ploëmeur et 1 à Plouhinec (56) le 30.

PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis*

1 le 14 août au nord de Houat (56), 1 les 14 et 20 septembre puis le 5 octobre à Ouessant (29).

PUFFIN CENDRE *Calonectris diomedea*

2 le 11 août à Hoëdic (56), 1 les 15 et 23 août, puis le 14 octobre à Ouessant (29).

PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus*

Après un premier individu le 1er août, la présence de l'espèce dans les eaux ouessantines est surtout notée du 22 août au 1er septembre, du 15 au 28 septembre et enfin du 5 octobre au 2 novembre, avec un maximum de 110 ind. observés en 55mn le 22 septembre.

Ailleurs, 1 vers l'est le 10 août à Plougasnou (29), 1 le 21 août en Manche, 1 le 22 août à Hoëdic (56) et 1 vers le S en 45mn le 21 octobre à Argenton (29).

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus*

... quelques migrants sont encore observés début novembre à Ouessant (29): 6 en 8h30 le 2... 1 en 10mn le 6.

Cinq observations hivernales, sans lien évident avec les tempêtes : 2 le 24 novembre à Ploëmeur (56), 1 les 14 décembre, 6 et 28 février à Ouessant (29), 1 le 14 janvier à Morieux (22).

Début de la migration pré-nuptiale le 15 mars à Ouessant. Des mouvements sont signalés jusqu'à début juillet.

PUFFIN DES BALEARES *Puffinus yelkouan*

Premiers passages le 17 juillet au Cap Fréhel (22), régulièrement noté à Ouessant (29) jusqu'au 1er novembre.

Une donnée hivernale : 1 le 2 janvier à Ouessant.

L'espèce réapparaît autour de l'île à partir du 6 juin, puis en Manche début juillet : 11 le 9 au Cap Fréhel (22).

PETIT PUFFIN *Puffinus assimilis*

A Ouessant (29), 1 les 20 et 21 octobre, puis 1 vers le NW le 23 mars.

FOU DE BASSAN *Sula bassana*

Aucun mouvement particulier, semble-t-il, au moment des tempêtes de décembre et janvier. Les effectifs les plus élevés sont notés dans le Finistère mais, du moins à Ouessant (29), ne se distinguent pas du reste de l'hiver.

7700 couples aux Sept-Iles (22).

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo*

250-270 couples à l'île des Landes/Cancale (35), 33 nids au Grand Chevret/Cancale (35), 81 couples au Verdelet/Pléneuf-Val-André (22), 48 couples en baie de Morlaix (29).

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris*

1 du 24 septembre au 2 octobre à Séné (56), 1 le 11 octobre à Paimpont (35) et 1 le 20 novembre à Trébeurden (22).

1 couple à Tréguennec (29).

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus*

1 mâle le 12 juillet à Tréogat (29).

BIHOREAU GRIS *Nyctocorax nyctocorax*

1 le 21 septembre à Ouessant (29) et 1 le 8 avril à Mordelles (35).

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*

Un afflux d'aigrettes à partir de la fin juillet est évident dans toute la région. Les effectifs concernés et des observations dans les îles suggèrent une remontée d'aigrettes ayant niché plus au sud.

Maxima de 134 le 18 juillet et 129 le 20 août à Séné (56), 20 le 20 juillet à Goulven (29), 1 les 31 juillet et 2 août, 18 le 3, 40 le 7...à Tréogat (29), 10 dont 9 vers l'ouest le 2 août, 7 le 11, puis 1 du 14 août au 30 octobre à Hoëdic (56), 7 le 14 août à Bosméléac (22), 4 vers l'ouest le 15 août, 1 le 7 septembre et 1 à 2 du 11 septembre au 14 décembre à Ouessant (29). En automne, une diminution intervient plus ou moins tôt selon les localités suivies du Finistère : plus que 18 le 12 août, 11 le 24 août... 3 le 26 septembre à Tréogat, 35-40 le 12 novembre et 4 le 14 décembre à Goulven (29), 8-10 le 13 novembre et 3 le 25 décembre en rivièrre du Faou, 10-15 le 15 octobre, 2 le 26 novembre, 4 le 6 janvier, 5 le 13 janvier, en rivièrre de Daoulas...

Malgré ces diminutions automnales, des effectifs supérieurs aux années passées restent hiverner sur la côte nord. A la mi-janvier en Ile-et-Vilaine, 4 en Rance 3 à Dinard et 4 à St-Briac. Au même moment 93 aigrettes sont dénombrées dans les Côtes d'Armor, principalement sur le littoral du Trégor (81 entre Plestin-les-Grèves et le Trieux). Au moins 55 dans le nord du Finistère dont 7 en baie de Morlaix, 7 en Penzé, 16 à Roscoff, 12 à Guissény et 10 en rade de Brest. Il est regrettable que l'espèce ne soit plus dénombrée sur la côte sud à cette saison.

Quelques oiseaux restent pendant le printemps sur la côte nord : 1 à 3 entre le 12 mai et le 9 juin à Goulven (29), 9 le 18 avril, 2 le 28 avril et 1 le 2 juin à Guissény (29),..., 2 ad le 31 mai en Rance (35).

153 nids au Haut-Villeneuve (44), 19 au Bois de Quilfistre (44) et 9 au domaine de Trévaly (44) ; ce sont les seules informations au sujet de la reproduction.

3 le 6 juillet à Tréogat (29) et 1 le 15 juillet à Erbrée (35) annoncent le début de la dispersion post-nuptiale.

GRANDE AIGRETTE *Egretta alba*

1 en baie de la Fresnaye et 1 dans l'anse d'Yffiniac (22) le 10 octobre, 1 imm. en décembre dans les gravières de Bruz (35), 1 le 7 janvier à Marcillé-Robert (35), 1 le 16 novembre puis 2 du 17 novembre au 24 décembre et 1 le 21 mai à Locoal-Mendon (56). Enfin 1 fréquente la rivièrre de Noyalo à partir du 13 mars, d'abord à l'étang de Noyalo puis à Séné du 19 mai à la fin de la période.

HERON CENDRE *Ardea cinerea*

Première nidification dans le nord du Finistère : 2 à 3 couples au Conquet.

HERON POURPRE *Ardea purpurea*

1 juv. le 8 août à Tréogat (29).

Passage de printemps inhabituel à Ouessant (29) : 3 les 21 et 22 mars, 1 le 26, 1 les 7 et 9 avril, 1 le 26 mai. Passage également bien marqué en baie d'Audierne (29) : 1 les 24 mars, 1er et 7 avril, 2 le 14, 1 le 15 à Tréogat puis 1 le 19 à Plovan. Egalement 1 imm. les 28 et 30 mars à Noyalo (56).

CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra*

2 le 27 août à Sarzeau (56) et 1 en vol vers l'ouest le 5 septembre à Pleudihen (22).

1 le 6 mai à Commana (29)

CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia*

1 du 12 au 17 août à Séné (56), 8 le 29 septembre à St-Julien (22).

Le passage pré-nuptial semble de plus en plus marqué : 1 le 9 avril aux Brulais (35), 9 le 27 avril à Plaintel (22), 5 vers l'ouest le 3 mai à Ouessant (29), 1 les 4 et 5 mai à Salmières (35), 4 les 6 et 7 mai à Tréméheuc (35), 1 en vol le 6 juin à Redon (35).

OIE CENDREE *Anser anser*

... 1 le 13 janvier à Botmeur (29), 80 à la mi-janvier au lac de Grand-lieu (44)... encore 1 attardée le 18 avril à Sarzeau (56).

OIE A BEC COURT *Anser brachyrhynchus*

3 le 9 octobre à Ouessant (29).

OIE RIEUSE *Anser albifrons*

4 à la mi-janvier en baie du Mont St-Michel (35) et 1 le 16 mars à Sarzeau (56).

BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis*

2 du 27 janvier au 26 mars à Châtillon-en-Vendelais (35).

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis*

1 le 30 octobre à Penvénan (22) et 1 le 11 novembre en baie du Mont St-Michel (35).

BERNACHE CRAVANT DU PACIFIQUE *Branta bernicla nigricans*

1 le 16 novembre à Louannec (22).

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

1 le 27 juillet à Lézardrieux (22), 1 le 10 août à Sarzeau (56)... premières arrivées début octobre : 7 le 3 octobre à Goulven (29). Augmentation rapide des effectifs ensuite : 10254 en octobre sur l'ensemble du littoral, 30766 en novembre, 29308 en décembre, 24238 en janvier, 16528 en février, 6844 en mars. Peu ou pas de jeunes parmi les hivernants.

LOCALITES	MAXIMUM	MOIS
Golfe du Morbihan (56)	20300	novembre
Baie de St-Brieuc (22)	3600	janvier
Baie du Mont St-Michel (35)	3380	février
Baie de Vilaine (56)	3250	décembre
Baie de Quiberon (56)	2410	décembre
Baie de St-Jacut (22)	1215	janvier
Estuaire de la Penzé (29)	1130	février
Rade de Lorient (56)	972	janvier
Baie de Paimpol (22)	865	janvier
Traicts du Croisic (44)	770	février
Baie de Morlaix (29)	640	janvier
Baie de Goulven (29)	450	mars
Estuaire du Trieux (22)	432	février
Rance maritime (35)	425	février
Estuaire du Jaudy (22)	340	mars
Rivière de Pont-l'Abbé (29)	247	janvier

Dernière le 29 mai à l'île-Grande (22).

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*

1 du 1er au 27 août, jour de l'ouverture de la chasse, à Séné (56), 1 pendant tout l'été en baie de Plouharnel (56), observé pour la dernière fois le 15 septembre, enfin 1 le 5 octobre à Vannes (56).

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
3064	887	741	3525	2850	11067

Principaux sites: la baie du Mont St-Michel (35): 2566, le golfe du Morbihan (56): 2390, la Basse Loire (44) : 2170, les traicts du Croisic (44) : 680 et la baie de Vilaine (56) : 590.

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

Premier le 25 août à Ouessant (29)... effectifs les plus forts notés en novembre et décembre dans le Finistère : 2750 le 13 novembre en rade de Brest, 900 le 9 décembre en baie de Goulven.

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
512	363	3630	2164	718	7387

Principaux sites : rade de Brest (29) : 2350, golfe du Morbihan (56) : 1900, rivière de Pont l'Abbé (29) : 600, lac de Grand-lieu (44) : 460, baie de St-Brieuc (22) : 350, étangs de Vitré (35) : 310, baie de Goulven (29) : 300, les Abers (29) : 300.

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

... 1100 le 19 novembre, 3000 le 2 décembre, 900 le 9 décembre, 78 le 15 janvier en baie de Goulven (29), 925-1025 le 13 novembre, 2400 le 19 novembre, 3000 le 3 décembre et 1800 à la mi-janvier en rade de Brest (29).

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
275	513	2946	1237	10190	15161

Principaux sites : Basse-Loire (44) : 8170, rade de Brest (29) : 1800, lac de Grand-lieu (44) : 1200, golfe du Morbihan (56) : 1050.

En période de reproduction, 1 le 16 avril sur le Yeun Elez (29), 1 couple le 6 mai à Lanrivoaré (29), 1 mâle le 9 mai à Plounérin (22).

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

1 couple avec 3 poussins le 8 août à Tréogat (29).
20 le 18 novembre dans l'anse d'Yffiniac (22), 15 le 25 novembre à Tréogat (29), 17 le 3 décembre en rivière de Daoulas (29).

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
23	40	91	16	77	247

Principaux sites : lac de Grand-lieu (44) : 50, rivière de Pont-l'Abbé (29) : 48, rade de Brest (29) : 25, baie de St-Brieuc (22) : 40.

3 à 4 couples en baie d'Audierne (29), dont 1 femelle avec 4 pulli le 11 juin à Tréogat.

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
7932	3682	5516	5068	13007	32205

Principaux sites : lac de Grand-lieu (44) : 6000, baie du Mont St-Michel (35) : 3548, étangs du Nord de la Loire-Atlantique (44) : 3545, golfe du Morbihan (56) : 2950, Basse-Loire (44) : 2780, baie de Goulven (29) : 1750, rade de Brest (29) : 1750, lac de Guerlédan (22) : 1374.

CANARD NOIRATRE *Anas rubripes*

1 femelle du 24 au 26 juillet à Morlaix (29).

CANARD PILET *Anas acuta*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
16	220	131	730	312	1409

Principaux sites : golfe du Morbihan (56) : 580, traicts du Croisic (44) : 245, baie de St-Brieuc (22) : 220, baie de Vilaine (56) : 150 et la rivière de Pont-l'Abbé (29) : 107.

Derniers le 9 avril à Séné (56).

SARCELLE D'ETE *Anas querquedula*

1 les 6 et 7 septembre, 3 le 8, 4 le 11, 2 le 13 et 1 le 14 à Ouessant (29).

Premières le 16 mars : 5 à Erbrée (35) et 2 à Séné (56).

Le passage semble mieux marqué cette année, ce qui se traduit par le nombre de localités donnant lieu à des observations (7 pour les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan) mais surtout par les effectifs : 10 le 24 mars à Tréogat (29), 20 le 30 mars à Ploemeur (56), 11 le 31 à Tréguennec (29), 17 le 2 avril à Plovan (29), observations régulières pour un maximum de 7 ind. à la mi-avril à Séné. 1 à 2 couples jusqu'à la fin mai à Séné, 3 à 4 couples en baie d'Audierne.

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
65	0	32	449	2797	3343

Principales concentrations : lac de Grand-lieu (44) : 1750, Basse-Loire (44) : 846, golfe du Morbihan (56) : 395.

Nidification : 1 couple le 12 mai à Goulven (29), 1 couple le 27 mai à Port-Blanc (22) et 1 couple nicheur à la Folie/Antrain (35).

NETTE ROUSSE *Netta rufina*

1 le 29 novembre à Ploëmeur (56).

FULIGULE MILOUIN *Aythya ferina*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
462	648	675	2234	2464	6483

Principales concentrations : lac de Grand-lieu (44) : 2300, Vannes (56) : 1740, Kerhuon (29) : 464, Taden (22): 378.

1 mâle le 5 mai à Guissény (29), 1 mâle le 27 mai à St-Bihy (22),

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

1 les 6 août, 20 septembre et 19 octobre à Tréogat (29), 2 le 24 décembre à Châtillon-en-Vendelais (35), 3 à Sains (35) et 1 femelle à Vannes (56) le 14 janvier.

FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
159	118	536	201	444	1458

Principales localités : Kerhuon (29) : 404, lac de Grand-lieu (44) : 400, Ploëmeur (56) : 130, Guerlédan (22) : 81, Plonéour-Lanvern (29) : 80.

1 mâle le 14 avril à Lanrivain (22), 1 couple le 5 mai à Guissény (29), 1 le 12 mai à Goulven (29), 2 les 20 et 25 mai puis 1 mâle le 17 juin à Tréogat (29), 1 mâle le 27 mai à Loguivy-Plougras (22).

FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris*

1 femelle du 5 novembre au 26 avril à Tréogat (29).

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

1544 dénombrés en Bretagne à la mi-janvier dont 1540 dans l'estuaire de la Vilaine (56)!

EIDER A DUVET *Somateria mollissima*

Petits groupes signalés dès l'été : 1 femelle le 8 août et 10 le 31 août en baie de St-Brieuc (22), 7 les 6 août et 3 septembre.... Augmentation sensible à partir d'octobre : 50 dont 10 mâles le 17 octobre à Hoëdic (56), 20 le 15 novembre en rade de Brest (29)...

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
201	38	62	41	52	394

Principales localités : baie du Mont St-Michel (35) : 200, baie de la Baule (44) : 52, Abers (29) : 45, baie de Vilaine (56) : 23, littoral de Morieux à Fréhel (22) : 20, baie de Quiberon (56) : 16, baie de Douarnenez (29) : 13.

Quelques stationnements conséquents jusqu'en avril : 85 le 16 mars, 23 le 23 et 14 le 28 avril à Cancale (35), 50-60 le 28 mars en baie de Morieux (22). Encore 2 mâles le 20 avril à St-Jacut (22), 5 le 5 mai à Groix (56), 1 femelle/imm. le 26 mai à Morieux (22) et 1 mâle imm. estive en baie de Morlaix (29).

Nidification : 1 couple sur le Rocher de Cancale (35), 1 nid à la Pierre Percée/La Baule (44) et 15 ad. dont une femelle accompagnée de 7 à 8 poussins le 6 mai à Houat (56)..

HARELDE DE MIQUELON *Clangula hyemalis*

2 le 10 août, 1 le 1er octobre et 1 le 22 décembre à Sarzeau (56), 1 le 21 octobre à Ouessant (29), 3 le 26 décembre à Ploëmeur (56), 1 femelle/imm. les 26 et 29 décembre ainsi que et le 20 janvier à Guissény (29), 1 le 15 janvier au Croisic (44), 2 le 4 février à Guidel (56), 1 femelle le 6 mars à Trébabu (29).

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca*

Bien peu observée cette année : 1 le 29 octobre en baie de Morieux (22), 15 le 11 décembre et 5 le 15 janvier en baie du Mont St-Michel (35), 3 le 27 décembre et 2 le 16 janvier sur la Rance (35), 7 le 15 janvier en baie de Douarnenez (29), 4 le 15 janvier entre Morieux et Fréhel (22), 7 le 15 janvier au Croisic (44), 2 le 7 avril à Tréogat (29).

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*

4-5000 dès le 20 septembre en baie du Mont St-Michel (35)...

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
4001	580	700	600	570	6451

Principales concentrations : baie du Mont St-Michel (35) : 4000, baie de Douarnez (29) : 700, baie de St-Brieuc (22) : 382, baie de Vilaine (56) : 260.

GARROT A OEIL D'OR *Bucephala clangula*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
24	15	26	727	3	795

Principales concentrations : golfe du Morbihan (56) : 710, Rance (22-35) : 37, Penzé (29) : 13.

HARLE PIETTE *Mergus albellus*

1 mâle le 13 janvier à Paimpont (35), 1 le 15 janvier à Grand-lieu (44).

HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

3 mâles le 10 décembre à Châtillon-en-Vendelais (35), 1 mâle le 14 janvier à Argentré du Plessis (35), 1 le 15 janvier en Penzé (29), enfin 1 femelle le 20 avril à Paimpont (35).

HARLE HUPPE *Mergus serrator*

1 les 6 août et 3 septembre à Logonna-Daoulas (29).
Arrivée début novembre : 5 le 12 novembre en rivière de Daoulas (29).

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
40	126	2266	2077	10	4519

Principales concentrations : rade de Brest (29) : 2150, golfe du Morbihan (56) : 1470, baie de Quiberon (56) : 210, baie de Vilaine (56) : 210, presqu'île de Rhuy (56) : 160.

Dernier le 5 mai à Guissény (29).

MILAN ROYAL *Milvus milvus*

1 du 5 septembre au 1er octobre à Séné (56), puis 1, sans doute le même, le 10 octobre à Noyal (56). 1 le 7 novembre à Port-à-la-Duc (22), 1 le 27 décembre à Châtillon-en-Vendelais (35) et 1 le 1er avril à Vieux-Bourg (35).

MILAN NOIR *Milvus migrans*

1er le 26 mars à Landaul (56).

En période de reproduction, l'espèce est toujours notée sur le littoral du Morbihan : autour de la rivière de Noyal où deux sites sont occupés, max 5 le 30 avril sur la décharge de Theix. Au moins deux couples également dans les parages de la rivière d'Etel.

Autre observations : 1 le 14 avril à Marcillé-Robert (35), 1 le 25 avril à Liffré (35), 1 le 4 mai à Langonnet (56), 1 le 19 mai à Languidic (56), 1 le 3 mai à Henon (22), 1 le 27 mai à la Poterie (22).

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus*

1 le 12 novembre au Cap Fréhel (22) et 1 le 12 juillet à Séné (56).

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus*

Nidification dans les Monts d'Arrée (29) à proximité des landes du Gragou et tentative infructueuse d'un mâle apparié à 2 femelles à Ouessant (29).

BUSARD CENDRE *Circus pygargus*

Premiers le 28 avril à Roudouallec (56), 1 les 4, 29 et 30 mai à Ouessant (29). 4 à 5 couples dans les Montagnes Noires (22-56) et 1 couple à Grand-Champ (56).

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis*

1 le 16 septembre à Tréogat (29).

1 mâle parade le 8 mars au Faouet (56), 1 observation en avril en forêt de Rennes (35), 1 couple pendant tout le printemps en forêt de Loudéac (22) : des parades sont observées.

BUSE VARIABLE *Buteo buteo*

1 les 11 et 26 janvier, 1 le 15 avril à Ouessant (29).

BALBUZARD PECHEUR *Pandion haliaetus*

1 le 23 août à Locoal-Mendon (56), 1 du 28 au 30 août, du 8 au 15 octobre puis le 26 novembre à Noyal (56), 1 le 30 septembre à Rieux (56).
1 le 29 avril à Séné (56), 1 le 4 mai au barrage de l'Arguenon (22), 1 le 2 juin à St-Fiacre (22).

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

1 femelle du 23 au 25 mai à Ouessant (29).

FAUCON EMERILLON *Falco columbarius*

1 juv. dès le 22 août à Hoëdic (56). A Ouessant (29), le passage d'automne se déroule essentiellement du 6 septembre à la fin octobre, seulement 8 données pour 1 à 2 ind. en novembre et 1 les 5 et 14 décembre à Ouessant (29).

Quelques observations à Hoëdic (56) reflètent l'existence d'un faible passage au printemps : 1 femelle les 7 et 11 avril, 1 mâle le 13 avril.

FAUCON HOBÉREAU *Falco subbuteo*

Dernier le 23 octobre à Ouessant (29).
1 le 21 avril à Plouhinec (56)...

FAUCON D'ELEANORE *Falco eleonora*

1 probablement immature le 29 septembre au Croisic (44).

FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

1 juv. le 19 août mais passage observé avant tout du 9 au 31 octobre à Ouessant (29), 2 à 3 ind. entre le 25 septembre et le 3 novembre à Hoëdic (56).

Sur le continent passage et installation des hivernants difficiles à distinguer. Les arrivées semblent se situer fin septembre début octobre : 1 le 24 septembre à Séné (56), 1 les 6 et 7 octobre à Tréogat (29), 1 le 8 octobre à Noyal (56), 1 le 10 octobre en baie de la Fresnaye (22), 1 imm. le 13 octobre et 1 ad. les 22 octobre à Goulven (29)...

Observé en période hivernale (décembre-février), avec plus ou moins de régularité selon les sites : à Châtillon-en-Vendelais (35), à Nantoir (22), en baie de Morlaix (29), à St Pol-de-Léon (29), en baie de Goulven (29), en rade de Brest (29) et dans le golfe du Morbihan (56).

1 ad les 30 mars et 1er avril, 1 femelle imm. les 20 et 21 avril à Séné (56), 1 le 13 avril à Hoëdic (56), 1 V/N le 28 avril au Cloître St-Thégonnec (29) et 1 le 26 mai à Goulven (29).

CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix*

Encore trois observations faisant suite à l'exceptionnel printemps 89 : chanteurs en trois localités de Morlaix (29) les 16, 19 et 23 juillet.

1 le 11 octobre à Tréogat (29)

1 les 4 et 16 mai à Ouessant (29), 1 chanteur le 7 mai à Plovan (29).

Chanteurs notés à Lanfains, 1 à Pléhédél (22), Plourhan, Bréhec et l'île d'Er (22), à Guégon (56), à St Jean-Brévelay (56)

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana*

1 juv. le 8 septembre à Rénéal (22), 1 le 22 et 1 le 23 octobre à Ouessant (29).

1 le 9 janvier à Kernansquillec (22).

FOULQUE MACROULE *Fulica atra*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
3074	612	1272	5519	2471	12948

Principales concentrations : golfe du Morbihan (56) : 3610, lac de Grand-lieu (44) : 1090, étangs de Vitré (35) : 1085, rade de Lorient (56) : 707, rivière d'Etel (56) : 569, Kerhuon (29) : 482.

GRUE CENDRÉE *Grus grus*

1 imm. le 7 octobre à Locmiquélic (56).

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus*

2500 le 11 juillet, 2000 le 17 décembre à Yffiniac (22)

550 le 15 octobre dans le Jaudy (22), 520 le 3 novembre au Sillon du Talbert (22)

650 le 12 novembre en baie de Goulven (29), 5-600 le 17 septembre à Guissény (29)

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
8745	3726	3498	1613	1560	19142

Cet hiver reste dans la lignée des années 1977 à 1989, mais marque un recul sensible (près de 30% de baisse) par rapport à la situation de 1985-89, surtout évident sur la côte nord. Principaux sites : baie du Mont St-Michel (35) : 8640, anse d'Yffiniac (22) : 2000, traicts du Croisic (44) : 1450, baie de Morlaix (29) : 1200.

ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus*

Dernière : 1 ad. le 17 septembre à Séné (56).
Premières le 30 mars à Séné (56), 25 couples nicheurs.
1 mâle le 7 et 1 femelle du 11 au 14 avril à Hoëdic (56).

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avocetta*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
15	1	127	1625	2200	3968

Principaux sites : estuaire de la Loire (44) : 1400, baie de Vilaine (56) : 1020, traicts du Croisic (44) : 800, golfe du Morbihan (56) : 605, rivière de Pont-l'Abbé (29) : 108.

Janvier 90 confirme le reprise décelée en 89. Avec près de 4000 ind. l'avocette retrouve un niveau d'abondance comparable à celui du début des années 80, c'est à dire antérieur aux hivers froids. Au niveau local, la situation demeure contrastée : diminution en estuaire de la Loire alors que les autres sites enregistrent des augmentations, particulièrement marquées dans le golfe et en rivière de Pont-l'Abbé.

Max. 300 ind. fin mars sur les marais de Séné (56) où nichent 80-100 couples cette année.
Signalons aussi des stationnements du 1er avril au 2 juin en baie d'Audierne (29) : max. 8 ind.

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus*

1 couple produit 2 jeunes à l'envol à Erdeven (1990)(56).

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

... Isolés le 14 septembre à Priziac (56), le 16 septembre à Botmeur (29), le 17 septembre à Kerlouan (29).
Premiers retours le 1er avril à Tréogat (29), le 3 à Séné (56).

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

Pour le passage post-nuptial, signalons seulement les maxima de quelques localités de la côte nord. Dans les Côtes d'Armor, 100 le 3 septembre à Hillion, 200 le 12 en baie de la Fresnaye, 150 le 21 à St-Jacut, 350 le 15 octobre dans le Jaudy. Dans le Finistère, probablement plusieurs vagues migratoires dépassant le millier de gravelots en baie de Goulven : 1000 le 19 août, 1850 le 3 septembre, 1050 le 29 septembre, 1500-1700 le 8 octobre et 1300 le 11 novembre. Egalement 850-900 le 25 août, 1100 le 8 octobre et 800 le 3 novembre à Guissény, 250-300 le 29 août à Argenton, 300-350 le 6 septembre au Conquet, 150 le 15 octobre à Brest, 350 le 21 octobre en rivière de Daoulas.

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
341	1247	4278	2152	55	8073

Sans égaler le record de janvier 1989, les effectifs de Grands gravelots restent élevés, nettement supérieurs à la moyenne de 1985-89 : 8073 contre 6960.
Principaux sites : littoral du Trégor (22) : 864, baie de Vilaine (56) : 710, Aber Roscoff (29) : 700, baie de Goulven (29) : 650, Guissény (29) : 539, Penzé (29) : 530, rade de Lorient (56) : 520.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*

Peu d'observations sur la migration post-nuptiale. Déjà 42 le 31 juillet à Hoëdic (56) où le maximum est noté le 8 août avec 84. Diminution rapide ensuite : 44 le 20... 9 le 27... 2 le 13 septembre. 120 le 13 août à Erdeven (56), 45 le 16 août à Sarzeau (56), 120 le 26 août... 30 le 13 octobre mais encore 60 le 12 novembre en baie de Goulven (29).

A la mi-janvier, 2 en Penzé (29), 2 dans l'Aber Roscoff (29), 1 à Cléder (29), 8 à Plounévez-Lochrist (29), 7 à Guissény (29) et 1 dans les Abers (29) pour la côte nord. 6 en baie de Quiberon (56) et 2 au Croisic (44) pour la côte sud.

Informations très fragmentaires concernant les nicheurs. Dans les Côtes d'Armor, 1 couple le 13 juin à l'île d'Er, 4-5 couples le 10 juin au Sillon du Talbert, 2 le 27 mai à Port-Blanc. Dans le Morbihan, 1 couple au Loch/Guidel, 3 couples au Magouëro/Plouhinec, 1-2 couples Hoëdic, 1-2 couples à Groix, 15-20 couples sur les dunes de Plouharnel-Erdeven.

PLUVIER GUIGNARD *Eudromias morinellus*

1 le 5 septembre et 1 du 19 au 22 septembre à Ouessant (29), 1 le 9 septembre à l'île-Grande (22).

PLUVIER DORE *Pluvialis apricaria*

1 les 21 et 23 août, 4 le 12 septembre, 1 du 30 au 3 octobre, puis passage régulier du 4 au 29 octobre pour un max. de 16 le 16 à Ouessant (29).

Sur le continent, mis à part 1 le 18 septembre à Goulven (29), premières observations début octobre : le 7 en rade de Brest (29), le 8 octobre à St-Jacut (22), le 10 octobre en baie de la Fresnaye (22), mais arrivées et/ou passage principalement durant la première quinzaine de novembre : 60 le 7 octobre, 325 le 22 octobre, 1150 le 12, 1300 le 19 novembre, 600 le 3 décembre en rivière de Daoulas (29), 10-15 le 22 octobre, 600 le 18 novembre à Goulven (29).

Les hivernants semblent négligés cette année, surtout dans le centre de la Bretagne où l'on signale uniquement les concentrations suivantes : 500 le 8 janvier à Bodilis (29), 350 le 23 décembre à Bosméléac (22) et 250 le 22 janvier à St-Thégonnec (29). 1736 dénombrés sur le littoral à l'occasion du recensement BIROE à la mi-janvier, dont 120 en baie de St-Brieuc (22), 250 en baie de Goulven (29), 400 dans les Abers (29), 800 en rade de Brest (29), 140 en baie de Vilaine (56), auxquels il faut ajouter 800 le 21 janvier Tréogat (29).

2 le 9 mai à Ouessant (29) et 1 le 13 mai à Tréguennec (29).

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
3270	1125	2311	2239	530	9475

Un hiver tout à fait conforme à la moyenne des années 85 à 89 pour l'effectif total compté et les principaux sites... baie du Mont St-Michel (35) : 3200, golfe du Morbihan (56) : 1560, littoral du Trégor (22) : 920, baie de Goulven (29) : 450.

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
5660	2420	63	237	0	8380

L'ampleur des fluctuations inter-annuelles apparaît surprenante (5100 en 87, 7400 en 88, 3500 en 89, 8400 en 90), d'autant plus qu'elles s'accompagnent de profondes modifications de la distribution entre les trois principales localités bretonnes (baie du Mont st-Michel, Yffiniac et St-Efflam).

Principaux sites : baie du Mont St-Michel (35) : 5660, anse d'Yffiniac (22) : 1800, baie de St-Efflam (22) : 620, golfe du Morbihan (56) : 210.

Max. hivernal atteint à la mi-janvier à St-Efflam (22) avec 620 ind., atteint en février en baie de St-Brieuc (22) avec 4000 ind.

BECASSEAU SANDERLING *Calidris sanderling*

Encore de gros stationnements cet automne sur les côtes du nord du Finistère : 600 le 19 août, 1200 le 29 septembre... 1100-1200 le 22 octobre, 900 le 3 novembre,..., 8-900 le 9 décembre en baie de Goulven (29), max. 900 le 3 novembre à Guissény (29).

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
0	530	3044	182	0	3756

Bon hivernage comme en témoigne l'effectif total qui demeure parmi les plus forts dénombrés dans la région, ainsi que les effectifs des principaux sites, eux aussi élevés : baie de Goulven (29) : 800, Santec (29) : 530, baie de St-Efflam (22) : 510, Abers (29) : 388, baie de Douarnenez (29) : 350, Guissény (29) : 349.

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta*

1 le 5 août à Tréogat (29), mais le passage ne débute réellement que fin août début septembre : 3 le 28 en baie de la Fresnaye (22), 4 le 29 à Séné (56), 8 le 1er à St-Brieuc (22)... Maximum enregistré autour de la mi-septembre : 23 le 10 et 16 le 17 à St-Brieuc, 7 le 17 septembre à Kerlouan (29), 7 le 21 septembre en baie de la Fresnaye (22), 15 le 22 septembre à Noyal (56)... encore quelques attardés en novembre et décembre : 1 le 12 novembre à Goulven (29), 6 le 30 novembre et 4 le 6 décembre à Noyal (56).

Hivernage important : 4-5 le 21 décembre à Ploëmeur (56), 16 en baie du Mont St-Michel (35), 1 à Guissény (29) et 10 au Croisic (44) à la mi-janvier, 1 les 29 janvier et 6 février à Séné (56).

Passage pré-nuptial diffus : régulièrement observé à Séné (56) entre le 5 mars et le 16 mai pour un max. de 4 ind., 1 les 19 mai et 9 juin à Tréogat (29), 1 le 23 mai à l'île-Grande (22), 1 le 3 juin à Ouessant (29).

1 le 12 juillet à Séné (56) indique peut-être l'inversion des courants migratoires et le début du passage post-nuptial.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

1 le 28 août à la Chapelle-Erbrée (35) et 1 le 30 août à Ouessant (29).

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*

2 ad. le 15 août à Plouhinec (29), 1 le 20 septembre à Ouessant (29) et 1 juv. le 1er octobre à la Chapelle-Erbrée (35).

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*

Passage d'automne extrêmement réduit ne concernant probablement que des adultes vu les dates d'observation (autour de la mi-août) : 1 à Larmor-Baden (56) et 1 à Hoëdic (56) le 8 août, 1 ad. le 10 août à Séné (56), 2 le 13 août à l'île-Grande (22) et 1 ad le 19 août à Goulven (29).

Noté du 24 avril au 31 mai pour un max. de 2 ind. à Séné (56). Egaleme nt 4 le 11 mai et 1 le 13 à Tréogat (29), 1 le 27 mai à l'île-Grande (22).

BECASSEAU VIOLET *Calidris maritima*

Premiers le 7 septembre à Ouessant (29) où les principales arrivées se produisent fin octobre et début novembre : 55 le 27 octobre, 70 le 7 novembre et 50 ensuite jusqu'à la fin de l'année.

Le recensement de la mi-janvier fait état de 93 Bécasseaux violets dénombrés sur la côte nord et de 56 dénombrés sur la côte sud. Il faut y ajouter 75 ind. le 16 janvier à Ouessant, localité ne figurant pas au recensement BIROE.

A Ouessant, le départ des hivernants est sensible après la mi-mars. Un passage est nettement ressenti de la fin avril à la fin mai : 23 le 17 avril, 60 le 18, 63 le 14 mai... 22 le 22, 2 les 29 et 31 mai.

BECASSEAU VARIABLE *Calidris alpina*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
40900	14134	38381	42160	10100	145.675

Principaux sites : baie du Mont St-Michel (35) : 35800, golfe du Morbihan (56) : 25400, rade de Brest (29) : 7300, Penzé (29) : 7000.

BECASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis*

1 du 11 au 18 septembre à Botmeur (29) et 1 juv. du 22 au 24 septembre à Hoëdic (56).

BECASSEAU COMBATTANT *Philomachus pugnax*

Quelques observations de début décembre concernant sans doute encore des migrants : 3 le 6 décembre à Noyal (56) et 70 le 9 décembre à Goulven (29).

Châtillon-en-Vendelais (35) accueille le principal groupe d'hivernants cette année : 90 le 27 novembre et 70 en dortoir le 16 janvier. Signalons également 6 ind. en baie de St-Brieuc et 2 en baie de Goulven (29) à la mi-janvier.

Passage pré-nuptial noté du 16 février à la mi-mai à Séné (56) : max. 60 fin mars et début avril. Premiers mouvements post-nuptiaux à la mi-juin.

BECASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus*

1 les 13 et 25 octobre à Ouessant (29), 1 le 25 février à Louvigné du Désert (35).

LIMNODROME A LONG BEC *Limnodromus scolopaceus*

L'adulte découvert le 3 juillet à Séné (56) séjourne jusqu'au 19 août.

BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
750	0	55	0	82	887

Encore un hiver à effectif réduit de 1180 ind. nettement inférieur à la moyenne de 1981 à 89.

Principaux sites : baie du Mont St-Michel (35) : 750, estuaire de la Loire (44): 82, Abers (29) : 30, baie de Morlaix (29) : 18.

Premières le 11 février,..., 13 le 8 mars, max. de 33 le 16 mars, 35 le 27 mars et 53 le 2 avril à Séné (56)... 94 le 11 mars dans les marais de Sougeal (35).

2 couples à Séné ce printemps.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
183	580	578	43	96	1480

Les principaux sites sont les mêmes que les années passées : anse d'Yffiniac (22) : 500, baie de Goulven (29) : 450, baie du Mont St-Michel (35) : 180. Mais l'effectif est réduit de moitié : 1480 ind. dénombrés en Bretagne contre plus de 3000 en moyenne de 1977 à 1989. Seule la baie de Goulven accueille les barges en nombre normal.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

124 le 24 juillet en rivière d'Etel (56), 121 le 28 juillet dans les marais de Basse-Vilaine (56)... 100 le 13 août dans le Jaudy (22)...

Observations de décembre et janvier : 1 en Rance (35) à la mi-janvier, 1 les 17 et 28 décembre à Plougasnou (29), 3-5 hivernants à Ouessant (29).

COURLIS CENDRE *Numenius arquata*

Encore 1 ad. et 1 juv. à Plougonven (29) et 1 à Scrignac (29) le 21 juillet.

Effectif surprenant : 1500 le 3 novembre au Sillon du Talbert (22)

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
2452	641	1648	1016	630	6387

Principaux sites : baie du Mont St-Michel (35) : 2400, anse d'Yffiniac (22) : 480, Penzé (29) : 415, estuaire de la Loire (44) : 410.

A noter aussi l'hivernage dans l'intérieur de l'Ille-et-Vilaine : 120 en dortoir le 16 janvier à Châtillon-en-Vendelais.

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

Maxima en baie de Goulven (29) : 50 le 4 octobre, 55 le 13 octobre, 50-55 le 3 novembre.

Encore 1 le 3 décembre en rivière de Daoulas (29)... 1 le 21 février à Yffiniac (22), 1 le 8 janvier à Binic (22), 3 en Penzé (29), 15 en baie de Goulven (29), 3 à Guissény (29) et 21 dans le golfe du Morbihan (56) à la mi-janvier.

Passage pré-nuptial peu marqué.

Migration post-nuptiale à partir de la mi-juin à Séné (56) : 14 le 18... 18 le 2 juillet, 20 le 12.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

Quelques effectifs automnaux : 550 le 26 août en baie de Morlaix (29), 550 le 12 novembre en baie de Goulven (29), 800 le 13 novembre en rade de Brest (29).

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
48	473	1735	743	50	3049

Principaux sites : baie de Morlaix (29) : 400, littoral du Trégor (22) : 372, golfe du Morbihan (56) : 330, rade de Brest (29) : 260, Abers (29) : 248, Penzé (29) : 240, baie de Vilaine (56) : 240.

30-32 couples à Séné (56).

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia*

Principaux stationnements post-nuptiaux en baie de Goulven (29) : 75 le 5 août, 100 les 19 août et 3 septembre, 50 le 10 septembre... 50-60 le 22 octobre... 25-30 le 9 décembre.

A la mi-janvier 8 à Perros-Guirec (22), 15 en baie de Goulven (29), 4 à Guissény (29), 1 dans les Abers (29), 3 en rade de Brest (29), 2 en rivière de Pont-l'Abbé (29) et 7 en rivière d'Etel (56).

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

1 le 26 août à Goulven (29) et 1 le 18 mars au Petit-Mars (44).

GRAND CHEVALIER A PATTES JAUNES *Tringa melanoleuca*

1 les 18 et 19 novembre à Locmariaquer (56)

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*

...stationnement de 1 à 2 ind. jusqu'au 2 septembre à Tréogat (29)... 1 les 17 et 18 septembre à Goulven (29), 1 le 21 septembre à Noyal (56), 2 le 22 septembre à Kerlouan (29), enfin 2 le 14 octobre à Séné (56).

Quelques migrateurs sont signalés au printemps, mais uniquement dans le sud-est du Morbihan : 1 le 2 mai à Pénestin, 1 les 10 et 11 mai à Séné et 3 le 17 mai à Guidel (56).

1 les 3 et 14 juillet, 2 le 15 à Séné (56).

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres*

Recensement BIROE - janvier 1990

35	22	29	56	44	Total Bretagne
141	1441	3278	374	70	5304

Le total dénombré à la mi-janvier figure parmi les plus forts jamais enregistrés en Bretagne, résultat d'une bonne couverture du littoral mais aussi d'un niveau de population élevé. En témoignent les chiffres des principaux sites : littoral du Trégor (22) : 1088, Penzé (29) : 920, Abers (29) : 905, baie de Morlaix (29) : 600.

PHALAROPE A BEC MINCE *Phalaropus lobatus*

1 juv. le 17 septembre dans l'enrochement du port de St-Brieuc (22).

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*

1 juv. le 25 août à Hoëdic (56), 1 les 30 septembre et 28 octobre, 8 le 2 et 1 le 3 novembre à Ouessant (29).

1 mort le 6 janvier à Groix (56) et 1 le 3 février à Guidel (56).

PHALAROPE INDETERMINE *Phalaropus sp*

32 le 22 septembre et 2 le 27 septembre à Ouessant (29).

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor*

1 le 24 septembre à Antrain (35).



Guillaume GELINAUD
3, rue LE HELLEC
56000 VANNES.