

**NOUVELLE OBSERVATION**  
**D'UN COUCOU-GEAI *Clamator glandarius***  
**EN BRETAGNE.**

Par Patrick LE MAO

0054

**1 - L'OBSERVATION.**

Le 25.03.1996, le temps était beau et calme sur la côte d'Ille-et-Vilaine. Les ajoncs en fleurs égayaient les landes de la pointe du Meinga et les chants des alouettes et pipits formaient une voûte sonore. Soudain mon attention fut retenue par un gros oiseau perché bien en évidence au sommet d'un buisson.

La détermination fut rapide : la tête gris-clair, à gorge blanche, était surmontée d'une huppe ; le dessus du corps brun taché de blanc contrastait avec le ventre blanc-crème ; la très longue queue sombre, étagée, était bordée de blanc... Tous ces critères désignaient immédiatement un Coucou-geai *Clamator glandarius*. Les parotiques nettement grises indiquaient qu'il s'agissait d'un oiseau adulte (JONSONN, 1994).

Houspillé par un couple de Pipits farlouses, le Coucou-geai s'envola vers le sud-ouest, en direction du Havre de Rothéneuf, d'un vol rapide et direct. La longueur de la queue était particulièrement remarquable en vol.

Dans l'espoir de le retrouver, je parcourus la presqu'île de l'île Besnard, sans succès. C'est en observant les colonies d'oiseaux marins de l'îlot du Grand-Chevreuil que je le retrouvai posé sur un rocher au milieu de la colonie de goélands. Chassé par deux Goélands bruns, il partit en direction du nord, au-dessus des étendues marines.

## 2 - LE COUCOU-GEAI EN BRETAGNE.

Comme beaucoup d'oiseaux méditerranéens migrateurs, le Coucou-geai peut s'égarer au printemps et au nord de son aire de répartition (phénomène d'"overshooting"). De même, à l'automne, l'erratisme postnuptial peut amener de jeunes oiseaux dans des régions septentrionales.

Les observations de Coucou-geai restent cependant très rares en Bretagne. Une recherche dans la littérature ornithologique ne permet que d'en recenser cinq.

<u>DATE</u>	<u>SITE</u>	<u>n</u>	<u>SOURCE</u>
16.04.1947	Ouessant (29)		MEINERTZHAGEN, 1948
12.02.1958	Bruz (35)	1 ad.	GIELFRICH, 1958
28.08.1969	Ste-Marine/Combrit (29)		DE KERROS, 1969
3 et 4.04.1984	Apothicaiererie/Sauzon (56)	1 im.	AR VRAN, XI (2)
14.09.1986	Brest (29)		AR VRAN, 1 (2)

L'espèce est plus fréquente en Poitou-Charentes et en Vendée où elle a d'ailleurs niché en 1992 (C.O.G., 1994). Elle n'a par contre, pas encore été rencontrée en Loire-Atlantique (G.O.L.A., 1992).

BIBLIOGRAPHIE

- C.O.B. (1985). - Actualités Ornithologiques du 16 mars 1984 au 15 juillet 1984. Ar Vran, XI, fasc.2 : 4-87.
- GIELFRICH, G. (1958). - Présence en Ille-et-Vilaine d'un Coucou geai (*Clamator glandarius*) L'Oiseau et R.F.O., 28 : 265-266.
- G.O.B. (1990). - Actualités Ornithologiques du 16 juillet 1986 au 15 juillet 1988. Ar Vran (nouvelle présentation), 1, fasc.2 : 03-41.
- G.O.G. (1994). - Coucou-geai in YEATMAN-BERTHELOT D. et JARRY, G., Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs en France. S.O.F., 384-385.
- G.O.L.A. (1992). - Les Oiseaux de Loire-Atlantique du XIX è siècle à nos jours. Nantes, 288 p.
- JONSSON, L. (1994). - Les Oiseaux d'Europe, d'Afrique du nord et du Moyen-Orient. Nathan, 559 p.
- KERROS (DE), G. (1969). - Le Coucou-geai en Bretagne. L'Oiseau et R.F.O., 39 (1): 73.
- MEINERTZHAGEN, R. (1948). - The birds of Ushant, Britany. Ibis, 90 : 553-567.

Patrick LE MAO  
84, rue des Antilles  
35 400 - ST-MALO.