

AR VRAN

publication du Groupe
Ornithologique
Breton



Volume 8 - N°1
juin 1997

ISSN 0180-3875

SOMMAIRE

0059 Yvon CAPITAINE

CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE
SUR LA BIOLOGIE DE REPRODUCTION
DE L'EPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus*
EN BRETAGNE :
Note sur une population de la presqu'île de Crozon

Page 67

0060 Jacques MAOUT

SYNTHESE DES OBSERVATIONS
ORNITHOLOGIQUES BRETONNES
ENTRE LES 16/7/1992 et 15/07/1993.
(deuxième partie)

Page 71

**CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE SUR LA BIOLOGIE DE
REPRODUCTION DE L'EPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus*
EN BRETAGNE :**

NOTE SUR UNE POPULATION DE LA PRESQU'ÎLE DE CROZON


Par Yvon CAPITAINE

0059

A l'exception des indications pour les Côtes d'Armor en Basse-Bretagne entre 1977 et 1983 (JONCOUR, 1986) , les éléments disponibles sur la répartition des couples d'Éperviers d'Europe *Accipiter nisus* en Bretagne demeurent rares. Ce premier constat, et la conviction d'observer actuellement une population florissante en presqu'île de Crozon m'ont incité à rédiger la présente note.

Les observations ont été réalisées dans le Finistère et plus précisément dans la partie sud-ouest de la presqu'île de Crozon. La zone concernée est actuellement constituée essentiellement de friches et de pinèdes. Ces derniers milieux sont largement favorisés par le dépeuplement et progressent sur tout l'ensemble de la presqu'île. Les habitations y sont très disséminées, mais à partir du mois de juillet l'activité humaine devient plus importante. Le suivi réalisé au cours des mois de juin et juillet 1997 a permis de découvrir cinq aires sur une surface d'environ six kilomètres carrés. La densité ainsi calculée (1 couple/120 ha) à partir d'une zone aussi réduite n'est sans doute pas significative de la véritable densité des couples d'éperviers en presqu'île de Crozon, mais elle n'en demeure peut être pas très éloignée. Parmi les cinq aires repérées, quatre étaient situées dans des pins maritimes et une dans un bois de sapins. Pour des raisons de commodités, les cinq aires ont été repérées sur la figure 1 et dans le texte, par les lettres de A, B, C, D et E.

Figure 1 : Répartition de cinq aires d'Epervier d'Europe sur un secteur de la presqu'île de Crozon en 1997



Légende :

- Aire de Buse variable (*Buteo buteo*)
- Aire d'Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Aire de Hibou moyen-duc (*Asio otus*)

Résultats de la nidification :

Aire A (bois de sapins) : 4 jeunes à l'envol

Aire B (bois de pins) : 3 jeunes à l'envol

Aire C (bois de pins) : Echec (mort des poussins au nid, manque de nourriture suite à la disparition du mâle ?)

Aire D (bois de pins) : 3 jeunes à l'envol

Aire E (bois de pins) : 3 jeunes à l'envol

Discussion

Tableau 1 : Densités moyennes de couples d'Eperviers d'Europe en France et dans les Iles Britanniques

Région	Année	n couples	Surface km ²	Densité moyenne	Références
Basse-Bretagne	1977/1983	107	592	1 couple / 553 ha	JONCOUR, 1986
Limousin	1977 et 1983	6 et 7	160	1 couple / 1900 ha	NORE in JONCOUR, 1986
Ile d'Oléron	1981/1983	20/25	175	1 couple / 637 ha	BAVOUX in JONCOUR, 1986
Pays d'Auge	1977/1980 et 1983			1 couple / 1000 ha	PEREZ in JONCOUR, 1986
Iles Britanniques				1 couple / 104 ha 1 couple / 714 ha	NEWTON 1986 in JONCOUR, 1986
Presqu'île de Crozon	1997	5	6	1 couple/120 ha	présente note

La densité relevée à partir des cinq aires suivies dans un secteur de la presqu'île de Crozon (1 couple/120 hectares), apparaît fort élevée en comparaison des valeurs connues dans les autres régions françaises dans le début des années 80 et se trouve ainsi seulement comparable à la meilleure densité relevée sur les îles Britanniques dans la même décennie (tab.1). L'échantillon concernant la presqu'île de Crozon est cependant insuffisant pour évoquer avec certitude une tendance chiffrée. Cependant il est certain que l'Epervier d'Europe a bénéficié des différentes mesures françaises prises en faveur de tous les rapaces depuis 1972 et plus particulièrement de l'interdiction de l'emploi des insecticides organo-chlorés. La tendance ainsi relevée par l'intermédiaire de ce petit échantillon pourrait être l'illustration d'une situation générale par ailleurs signalée au niveau national pour la fin de la décennie 80-90 (CHARTIER, 1994). De façon plus locale, le dépeuplement et la progression des friches et des pinèdes déjà évoqués pour la presqu'île de Crozon, ont probablement été un facteur favorable. Entre Crozon et Morgat, la population semble actuellement prospère et les aires sont très souvent installées dans des propriétés privées et fermées, limitant ainsi les possibilités de recensement. Il demeure évident au terme de cette petite réflexion que seule une étude plus importante nous permettrait de mesurer la situation actuelle des populations d'Epervier d'Europe en Bretagne.

BIBLIOGRAPHIE

- CHARTIER, A. (1994).**- Epervier d'Europe *Accipiter nisus* in Yeatman-Berthelot. (D.) & Jarry (G.). *nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France, 1985-1989*. Paris, S. O. F., pp : 192-193.
- JONCOUR, G. (1986).** - *L'Epervier d'Europe*. Etude d'une population de Basse-Bretagne F.I.R., La Garenne-Comombes, 191 p.

REMERCIEMENTS

Je remercie Guy Joncour pour ses précieux conseils, ainsi que Didier Clec'h, qui m'a vivement encouragé à rédiger cette note et qui a bien voulu apporter quelques précisions sur la première rédaction de celle ci. Je remercie également Jacques Garoche pour ses critiques et pour les améliorations apportées au manuscrit initial.

Yvon CAPITAINE
6, rue Léonard de Vinci
29200 BREST

**SYNTHESE DES OBSERVATIONS
ORNITHOLOGIQUES BRETONNES
ENTRE LES 16/7/1992 et 15/7/1993.**

Par Jacques MAOUT

0060

Avertissement :

La compilation présentée ci-après constitue la suite de la synthèse publiée dans le fascicule précédent (Ar Vran Vol. 8 N°1, Juin 1997, J. MAOUT. 0056 : 2-42)

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*.

Le passage est nettement plus faible que celui de l'année précédente, l'espèce n'apparaissant que sur trois sites : la pointe du Grouin/Cancale (35) à plusieurs reprises en août et septembre, au Diben/Plougasnou (29) le 5 septembre et à Ouessant (29) du 1er septembre au 28 octobre avec un maximum de 4 le 1er septembre.

1 à Ouessant (29) le 9 juin.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus*.

Le faible passage d'automne, qui s'inscrit entre le 3 août et le 25 octobre, culmine en septembre, maximum 11 le 5 au Diben/Plougasnou (29).

Une rare mention hivernale nous est parvenue des Côtes-d'Armor : 2 le 11 janvier dans l'anse d'Yffiniac.

Trois données printanières, et particulièrement étalées, sont originaires d'Ouessant (29) : 1 le 5 mars, 3 le 2 mai et 1 le 1er juin.

LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus*.

1 cadavre de juvénile est trouvé lors de la deuxième quinzaine d'août à Damgan (56).

GRAND LABBE *Stercorarius skua*.

En automne, les observations s'échelonnent du 25 juillet au 5 novembre. Sur le continent, les données sont remarquablement groupées entre le 24 et le 30 août alors que sur Ouessant (29), elles s'égrènent assez régulièrement tout au long de la période avec un maximum de 35 le 5 octobre.

Quelques données hivernales de décembre et janvier toujours à Ouessant.

1 tardif à Ouessant le 9 juin.

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*.

Reproduction : 1 couple élève deux jeunes à Trunvel/Tréogat (29), 3 couples échouent à Falguérec/Séné (56), 150 couples environ à Liberge/Donges (44), 90+ nids dans deux colonies en Brière (44), 1 couple au Bois-Vert/Varades (44), 40 nids au marais de Petit-Mars (44).

Total Bretagne : 285+ couples (partiel).

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*.

L'espèce est notée régulièrement du 19 septembre au 5 avril. Il est bien évident que les données en notre possession sont trop parcellaires pour pouvoir donner lieu à interprétation.

Le maximum n'est que de 12 le 29 janvier au Ri/Douarnenez (29).

3 adultes et 1 immature sont présents dans la colonie de Mouettes rieuses *Larus ridibundus* du marais de Liberge/Donges (44) où une ébauche de nid est notée. Après une dernière observation le 16 mai, les oiseaux disparaissent !

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus*.

La première est notée le 14 août à Carnac (56) mais les données restent très peu nombreuses tout au long de la fin de l'été et de l'automne. Tout au plus peut-on noter un afflux entre la fin octobre et le début décembre, maxima quelques dizaines à Plouha (22) le 15 novembre, 50 au Verdelet/Pléneuf-Val-André (22) le 3 décembre.

En hiver, une bande de 60 est notée lors d'une tempête à la pointe du Croisic (44) le 10 janvier.

Le passage pré-nuptial se déroule du 13 mars au 1er juin avec un maximum bien marqué lors de la deuxième quinzaine de mars : 160 à Trunvel/Tréogat (29) le 20, 50 à Audierne (29) le 23. 44 sont encore au Croisic le 13 avril.

MOUETTE DE SABINE *Larus sabini*.

En dehors des 40 individus présents le 8 septembre à la pointe du Halguen/Pénestin (56), nous avons quatre données d'isolées, toutes originaires d'Ouessant (29), les 24 et 28 août, le 23 septembre et le 20 avril.

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis*.

Additif à la période précédente : 1 immature de « 2 ou 3ème année » à l'étang de Gourveaux/Saint-Gilles-du-Vieux-Marché (22) le 22 mars 1992. Il s'agit de la première mention pour les Côtes-d'Armor.

L'oiseau adulte de Pénestin (56) est au rendez-vous du 19 septembre au 3 novembre. Un autre adulte (le même ?) est vu à peu de distance, au Croisic (44), le 16 octobre.

Le traditionnel adulte de Pont-l'Abbé (29) séjourne du 7 décembre, (et non 24 comme retenu par le C.H.N.), au 28 mars.

D'autres observations traditionnelles ont été effectuées plus tard : 1 adulte au Ri/Douarnenez (29) du 5 au 26 janvier, 1 adulte au Stang Alar/Brest (29) le 25, 1 adulte à Saint-Nazaire (44) du 19 au 26 février.

Quelques nouveautés : 1 ind. 2ème hiver à Ouessant (29) le 17 décembre, 1 ind. 2ème hiver au Ri du 30 janvier au 20 février et 1 ind. 2ème hiver à Guissény (29) le 12 avril.

GOELAND CENDRE *Larus canus*.

1 couple transporte des matériaux le 16 mai puis s'accouple le 20 à Liberge/Donges (44) avant de disparaître.

GOELAND BRUN *Larus fuscus*.

Deux couples sont découverts pour la première fois sur les toits de la ville de Rennes (35). 15-18 couples sont également repérés sur les toits de la ville de Brest (29).

Nous indiquons les résultats des recensements de quelques-unes des principales colonies, effectués en 1993, tout en rappelant les données de 1987/88 (nombre de couples) :

Colonies	Dépt	1993	1987/88
Baie de Morlaix	29	147	84-85
Trévorc'h	29	100	8-10
Balaneg	29	1 000	1 049
Banneg	29	230	1 272
Réserve de Groix	56	32	30
Golfe du Morbihan	56	264	235
Archipel d'Houat	56	371	523
Dumet	44	250	240-325

L'échantillon des colonies recensées cette année illustre bien l'incertitude devant laquelle on se trouve avant d'émettre un avis sur l'évolution de la population bretonne de cette espèce.

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*.

En ville (nombre de couples) : # 580 à Brest (29), # 110 à Saint-Brieuc (22), 30++ au Croisic (44), 12 à Rennes (35) et 3 à Dinan (22).

Nous indiquons les résultats des recensements de quelques-unes des principales colonies, effectués en 1993, tout en rappelant les données de 1987/88 (nombre de couples):

Colonies	Dépt	1993	1987/88
Grand Chevrete	35	650	703-750
Baie de Morlaix	29	1 390	1 420
Trévorc'h	29	100	50
Banneg	29	120	662
Balaneg	29	500	539
Roches de Camaret	29	495-510	692-728
Réserve de Goulien	29	376	566
Réserve de Groix	56	356	554-600
Golfe du Morbihan	56	851	470
Archipel d'Houat	56	545	1 541-1 565
Dumet	44	7 000	5 347-5 850
La Jonchère/Le Croisic	44	130+	113
Marais de Guérande	44	225	10

L'échantillon recensé en 1993 indique une baisse assez généralisée par rapport au dernier grand recensement, mais il n'est pas certain que le travail ait été mené de manière exhaustive sur tous les sites. Une exception de taille, la Loire-Atlantique, pour laquelle l'expansion semble se poursuivre même si la colonie Dumet arrive à saturation.

GOELAND LEUCOPHEE *Larus cachinnans*.

Les données sont plus nombreuses cette année avec un passage automnal concentré entre le 1er août et le 12 octobre.

En hiver : 3 adultes le 19 janvier au Croisic (44).

Il n'y a aucune observation en période de reproduction.

La dispersion estivale est évidente en Loire-Atlantique : 80 le 19 juin, 300 le 3 juillet sur la Loire, en amont d'Oudon.

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides*.

1 ind. 1er hiver mourant le 27 octobre à Brignogan (29), 1 subadulte le 14 février aux Bougrières dans les gravières du sud de Rennes (35).

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*.

1 oiseau âgé d'un an à Ouessant (29) les 26 et 27 octobre.

GOELAND MARIN *Larus marinus*.

Nous indiquons les résultats des recensements de quelques-unes des principales colonies, effectués en 1993, tout en rappelant les données de 1987/88 (nombre de couples):

Colonies	Dépt	1993	1987/88
Enez Plat	22	46	9
Baie de Morlaix	29	115	109
Banneg	29	64	76
Roc'h Hir	29	63	71
Balaneg	29	33-35	36
Trielen	29	36	31
Enez ar Christienn	29	10	4
Morgaol	29	12	7
Roches de Camaret	29	40-45	51-52
Réserve de Goulien	29	19	15
Archipel d'Houat	56	50	33
Dumet	44	15-20	7

Quelques nouveaux sites sur l'île même d'Ouessant (29).

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla*.

Nous indiquons les résultats des recensements (en nombre de nids construits) de quelques-unes des principales colonies :

Colonies	Dépt	1993
Fréhel	22	+
Sept-Iles	22	31
Ouessant	29	200
Keller	29	29
Roches de Camaret	29	133
Réserve de Goulien	29	814
Pointe du Raz	29	64
Groix	56	28
Belle-Ile	56	+
Total	56	1 299+

La reproduction a échoué à Fréhel du fait de la prédation par les Corneilles noires *Corvus corone*. La tendance est plutôt à la hausse.

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*.

1 le 28 juin à Séné (56).

STERNE CASPIENNE *Sterna caspia*.

A Châtillon-en-Vendelais (35), 1 les 6 et 7 septembre puis 2 le 11 ; à Thouaré (44), 1 le 6 mai.

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*.

Reproduction : 354 couples à La Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22), 1000 sur l'île aux Dames/Carantec (29), 103-105 sur Ledenez Balaneg et 2-3 sur Enez ar Christienn/Archipel de Molène (29), 105-110 sur l'île aux Moutons/Fouesnant (29).

Total Bretagne : 1 564-1 572 couples. Un tel niveau n'avait pas été atteint depuis 1982.

Une tentative de reproduction a été notée sur l'îlot de Vilin Izella/Guimaëc (29).

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*.

En fin d'été, deux belles concentrations sont notées : la première, située à proximité de l'île aux Dames (29), est suivie jusqu'au 1er septembre au Dourduff/Plouézoc'h, le maximum de 20 à 25 individus est atteint les 19 et 22 juillet et les derniers juvéniles sont vus le 22 août ; la seconde, située à Berder/Larmor-Baden (56) et aux alentours, culmine à 41 individus le 20 août, les derniers juvéniles étant notés le 25 août et les derniers adultes le 28 septembre.

Toujours au passage post-nuptial : 2 le 14 août à la pointe Saint-Gildas/Préfailles (44), 3 le 16 à Méaban/Arzon (56), 1 juv. le 12 septembre au Croisic (44) et 1 adulte le 14 à Goulven (29).

Au printemps, 1 individu est observé le 21 juin sur la colonie de Sternes pierregarin *Sterna hirundo* de l'île au Moine/Saint-Jouan-des-Guérets (35).

Reproduction : 80 couples sur l'île aux Dames/Carantec et 3 couples à La Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22).

Total Bretagne : 83 couples.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*.

Le passage post-nuptial culmine à la fin-août, 250 à Goulven (29) le 29, mais persiste jusqu'à la fin septembre. Les trois dernières sont à Arzal (56) le 18 octobre.

Les premières sont notées en Loire-Atlantique le 3 avril.

Colonies	Dépt	1993 (nombre de couples)
Ile au Moine	35	140
La Colombière	22	126
Bréhat-Paimpol	22	76-78+
Sillon de Talbert	22	0
Sept-Iles	22	0
Baie de Morlaix	29	173
Trévorc'h	29	0
Guénioc	29	3
Archipel de Molène	29	118-124
Saint-Renan	29	3
Pont-Croix	29	3
Trunvel	29	14-15
Les Moutons	29	65-70
Rivière d'Étel	29	63
Golfe du Morbihan	56	18-24+
Rivière de Pénerf	56	6
Mesquer/Assérac	44	35
Marais de Guérande	44	190
Bois-Vert/Varades	44	29
Total		1 062-1 082

La population maritime bretonne est estimée à 1 200 couples (B. CADIOU, comm. pers.)

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisea*.

Une dizaine d'observations s'échelonnent entre le mois de juillet et le 30 septembre. Au Diben/Plougasnou (29), 25 passent le 22 août et 10 le 12 septembre.

L'événement du printemps est la reproduction de l'espèce en Bretagne pour la première fois depuis 1984 : un couple produit un poussin, qui ne semble pas s'être envolé, à Béniguet/Archipel de Molène (29) et un oiseau couve une ponte dans le marais de Guérande (44). Dans ce dernier cas, le partenaire n'a pu être identifié, il n'est donc pas possible d'affirmer qu'il s'agit d'un couple pur.

En l'occurrence, le marais guérandais devient le point de nidification le plus méridional pour l'espèce en Europe.

STERNE NAINE *Sterna albifrons*.

Le passage automnal, régulier, est relevé du 4 août au 9 octobre avec un maximum de 20 le 21 août à Arzal (56).

Au printemps, l'espèce est notée à partir du 30 avril à Pornichet (44), mais le l'essentiel des effectifs arrive dans les jours suivants.

Reproduction en nombre de couples : 0 au Sillon de Talbert (22), 41 sur Enez ar Christienn et 8-10 sur Béniguet/Archipel de Molène (29), 2 à Sein (29), 18 à Varades (44).

Total : 69-71 couples.

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*.

Quelques données nous parviennent de Châtillon-en-Vendelais (35) entre le mois de juillet et le 11 septembre.

Des observations sont faites sur des plans d'eau d'Ille-et-Vilaine (Châtillon, La Folie/Antrain et Paintourteau/Erbrée) entre le 25 et le 29 avril.

1 le 31 mai à Kergalan/Plovan (29).

4 couples en Brière (44).

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*.

Le passage automnal s'étend du 8 août au 4 octobre et culmine en septembre : 10 à Penzornou/Carantec (29) le 3 septembre, 10 au Drennec/Sizun(29) le 6, 45 au Vivier-sur-mer (35) le 24.

Une est présente à Liberge/Donges (44) le 10 avril mais le passage s'échelonne du 1er au 12 mai, tout aussi concentré que celui de l'an passé, avec quelques beaux maxima : 40 à Trunvel/Tréogat (29) le 7 et 77 dans les gravières de Rennes (35) le 9.

1 immature stationne à Trunvel du 5 juin au 3 juillet.

Reproduction : 55+ couples en Brière (44), soit près de 60% des effectifs français. Les premiers juvéniles « volants » sont observés le 9 juin.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*.

1 juvénile du 3 au 10 septembre à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (35) ; 1 adulte en plumage nuptial dans une colonie de Guifettes noires *Chlidonias niger* en Brière (44) le 22 juin.

GUILLEMOT DE TROIL *Uria aalge*.

Colonies	Dépt	1993 nombre de couples
Cézembre	35	3
Cap Fréhel	22	?
Sept-Iles	22	15-20
Roches de Camaret	29	?
Goulien	29	37
Total		55-60+

Les recensements sont très incomplets, mais on peut retenir que 150 oiseaux étaient posés dans la falaise de Fréhel le 15 janvier.

PETIT PINGOUIN *Alca torda*.

Colonies	Dépt	1993 nombre de couples
Cézembre	35	4
Cap Fréhel	22	?
Sept-Iles	22	19-20
Total		23-24+

GUILLEMOT A MIROIR *Cepphus grylle*.

1 adulte à Trévignon/Trégunc (29) le 27 décembre, sans doute revu le 10 janvier.

MACAREUX MOINE *Fratercula artica*.

Colonies	Dépt	1993 nombre de couples
Sept-Iles	22	261-289
Baie de Morlaix	29	7-9
Keller	29	6+
Yourc'h	29	1
Total		275-305+

Le fait intéressant est l'installation de l'espèce, avec 4 à 9 couples, à Bono aux Sept-Iles. Les efforts de dératisation en cours en sont, peut-être, à l'origine.

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*.

A l'automne, le passage se déroule entre le 2 et le 29 octobre à Ouessant (29) avec une intensité marquée du 11 au 15, maximum 101 le 12. Au même moment, une belle bande est visible à l'étang de Kerhuon/Guipavas (29) : 100 le 8 puis 120 le 9.

En hiver, on peut remarquer 100 à la Chevrolière (44) le 3 janvier.

Dans le Nord-Finistère, l'expansion se poursuit et il est notable et symbolique qu'une ferme en ruine de Guiclan, occupée jusqu'en 1992 par la Chouette chevêche *Athene noctua*, le soit désormais par le Pigeon colombin. Signalons simplement : 15-20 dans la carrière de Kerfaven/Ploudiry le 9 mai, 5 chanteurs au moins dans le parc de Kérouzéré/Sibiril le 8 juillet.

Ailleurs, l'espèce est signalée en période de nidification d'Allineuc, Loguivy-Plougras, Pléhédél, de la forêt de Coëtquen (22), de Ploeren (56), de Thouaré et de Varades (44). Un nid occupé par un couveur est découvert dans le moulin de Beffou/Loguivy-Plougras le 20 avril, il est abandonné le 10 mai.

TOURTERELLE DES BOIS *Streptotelia turtur*.

Les dernières sont vues le 15 octobre à Ouessant (29) et à Hoëdic (56).

La première est vue le 10 mars à Petit-Mars (44).

PERRUCHE A COLLIER *Psittacula krameri*.

1 le 27 septembre en baie de Lancieux (22).

COUCOU GEAI *Clamator glandarius*.

1 adulte le 12 avril le long du canal de la Taillée à Donges (44). Il s'agit de la première donnée pour ce département. Soulignons que l'espèce s'est reproduite en Vendée en 1992.

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*.

Dernier à Ouessant (29) le 23 août.

Premier le 5 mars à Plouharnel (56).

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops*.

A la suite de l'observation du 15 juillet, 1 ind. est entendu le 17 juillet et 1 ind. est vu le 6 septembre à L'Ile-Grande/Pleumeur-Bodou (22).

CHOUETTE CHEVECHE *Athene noctua*.

Communes où l'espèce a été contactée :

- en **Ille-et-Vilaine** : Le Rheu.

- dans les **Côtes-d'Armor** : Guingamp, Plaintel, Pleudihen, Pléguen, Pleumeur-Bodou, Plumieux, Saint-Samson-sur-Rance, Saint-Donan, Trébeurden.

- dans le **Finistère** : Clohars-Carnoet, Concarneau, Goulien, Henvic, Landéda, Lopérec, Pleyben, Plogastel-Saint-Germain, Plogoff, Plouvorn, Riec-sur-Belon, Sainte-Sève, Trégarvan.

- dans le **Morbihan** : Auray, Baud, Billo, Brec'h, Cruguel, Erdeven, Guégon, Languidic, Lorient, Ploemeur, Plouharnel, Sérent.

- en **Loire-Atlantique** : Grandchamp-des-Fontaines, Gétigné, Guérande, Le Bignon, Montbert, Saint-André-des-Eaux, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Nazaire.

On retiendra les 7 sites recensés sur Saint-Donan (23 km²), les 19 sites du Haut-Léon (29) et surtout les 300 contacts obtenus en Loire-Atlantique (0,39 mâle chanteur au km²).

HARFANG DES NEIGES *Nyctea scandiaca*.

Encore un oiseau au printemps, 1 mâle le 2 mai, à Ouessant (29).

CHOUETTE HULOTTE *Strix aluco*.

A remarquer simplement les 10 cantons de chant relevés sur la commune de Saint-Donan (22) (23 km²) au printemps.

HIBOU MOYEN-DUC *Asio otus*.

La reproduction est constatée en forêt de Lorge, à Saint-Brandan (22), Landunvez, Ploudalmézeau (29), Châtillon-en-Vendelais (35), Erdeven (56), Montbert et Vieilleville (44). L'année 1993 a été moins « faste » que la précédente, semble-t-il.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*.

Le passage est ressenti sur les îles, essentiellement Ouessant (29), du 11 au 21 octobre : 8 à Ouessant le 12.

L'espèce est très bien représentée en hiver en Loire-Atlantique avec quelques beaux dortoirs : 20 le 4 février à Moisdon-la-Rivière, 24 le 11 en forêt du Gâvre.

Au printemps : 1 à Ouessant le 14 avril, 1 à Surzur (56) le 18 et 1 à Romazy (35) le 20 mai.

Reproduction : 1 couple et 2 à 3 jeunes à Machecoul (44) le 4 juillet.

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*.

Le dernier est à Kerfrézec/Sainte-Hélène (56) le 1er septembre.

Le premier est le 23 avril à Basse-Goulaine (44).

Les localités occupées en 1993 sont la forêt de Lorge, le cap d'Erquy (22), Camaret, Plougouven, Quimper (29), le camp de Coëtquidan, La Bosse, Guipry, Saint-Just, Tresbœuf (35), Erdeven (56), Clisson et la forêt du Gâvre (44).

On notera les 8 chanteurs des landes de Cojoux/Saint-Just, les 15 chanteurs du camp de Coëtquidan et les 40 chanteurs de la forêt du Gâvre.

MARTINET NOIR *Apus apus*.

Très peu d'oiseaux sont vus après la fin août : 1 à Vannes (56) le 4 septembre et 2 à Ouessant (29) le 21.

Après deux précurseurs de passage à Batz-sur-Mer (44) le 12 mars, les arrivées s'effectuent à partir du 9 avril.

MARTINET A VENTRE BLANC *Apus melba*.

2 le 24 avril au cap Fréhel (22) et 1 le 29 à Belle-Ile (56).

MARTIN PECHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis*.

Le passage se déroule entre le 4 août et le 1er novembre à Ouessant (29).

L'espèce se reproduit ou tente de le faire à Plaintel, Planguenoual, Saint-André-des-Eaux, Saint-Norgant (22) et Saint-Armel (56).

A Saint-André-des-Eaux, la construction du nid est en cours le 6 mars et le nid repéré à la Cotentin/Planguenoual est situé dans la partie inférieure d'une falaise maritime.

Il nous semble nécessaire de transmettre toutes les données de reproduction pour cette espèce au statut incertain.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*.

10 vers le sud le 21 août à Lambour/Pont-l'Abbé (29).

Les premiers sont vus en baie d'Audierne (29) le 8 mai.

1 le 8 juin à Ouessant (29).

HUPPE FASCIEE *Upupa epops*.

Deux oiseaux sont observés à Ouessant (29) les 15 et 23 septembre et les deux derniers le 27 à Arzal (56).

La première mention printanière est du 11 mars, toujours à Ouessant.

Quelques données intéressantes sont obtenues en dehors de l'aire d'abondance, toute relative : 1 le 28 mai à Port-Blanc/Penvénan (22), 1 le 7 juin sur l'île Penfret aux Glénan/Fouesnant (29) et 1 le 13 aux Forges en forêt de Lanouée (56).

Des preuves de reproduction sont obtenues à Tréguennec et Plomeur (29).

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*.

Le passage automnal est tout à fait remarquable : il s'inscrit entre le 9 septembre et le 16 octobre et culmine en septembre.

Au printemps, des chanteurs sont entendus en forêt de Rennes (35) les 29 et 30 mai, dans les landes de Cojoux/Saint-Just (35) le 31 et à Saint-Philbert-de-Grandlieu (44) le 3 juin.

Dans le Trégor (22), 1 chanteur est entendu à l'Île-Grande/Pleumeur-Bodou les 23 mai et 9 juin. Cette donnée est à rapprocher de celles de l'an passé dans le même secteur. En tout état de cause, l'oiseau n'est pas resté ...

PIC CENDRE *Picus canus*.

2 ou 3 chanteurs en forêt de Rennes (35) en 1993 constituent les seules données nous étant parvenues.

PIC NOIR *Dryocopus martius*.

La reproduction est prouvée en forêt de Quénécan (56) : nourrissage de 2+ juvéniles le 2 mai à la Forge Neuve/Sainte-Brigitte.

Dans les Côtes-d'Armor, de nouvelles localités sont découvertes : 1 (1 loge) le 15 février en forêt de Loudéac, 1 (3 loges) le 27 février en forêt de Boquen. Un individu, sans doute erratique, est observé dans les landes de Plourivo en janvier.

Le site, découvert l'an passé, de la forêt de Coëtquen (22) est occupé : 1 le 10 mai.

En Loire-Atlantique, la population de la forêt du Gâvre est de plus de 5 couples.

PIC MAR *Dendrocopos medius*.

L'espèce est notée en dehors de l'aire d'abondance : forêt de Coëtquen, forêt de Lorge, l'Hôpital/Pleudihen, coteau de Grilmont/Lanvallay (22), forêt du Cranou, Loperhet, forêt de Toulfoen (29).

En forêt de Quénécan, un « noyau dense » est noté autour des Forges/Sainte-Brigitte (56) : 6 chanteurs le 14 février.

Quelques remarques sur deux des nouveaux sites repérés : à Pleudihen, il s'agit d'un bois, à Lanvallay, le parc d'un château.

Des précisions seraient bien utiles quant à l'individu noté à Loperhet le 11 mars, tant l'espèce est localisée dans le Finistère.

En forêt du Gâvre (44), 35 couples et 26 individus sont contactés le 21 février.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla*.

A Erdeven (56), 2 le 5 août.

A Ouessant (29), 1 les 19 et 20 octobre.

Au printemps, un passage est ressenti fin avril-début mai : 1+ le 24 avril et 2 le 25 à la Torche/Plomeur (29), 3 le 27 et 1 le 30 à Ouessant, 1 le 9 mai à Nérizelec/Plovan (29).

Il n'y a aucune donnée relative à la reproduction.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*.

Quatre données sont originaires du Morbihan : 1 les 27 mars, 2 et 7 avril au port de commerce/Lorient, 1 le 12 avril à Pen Mané/Locmiquélic.

En Loire-Atlantique, l'espèce est notée à La Plaine-sur-Mer, Machecoul, Remouillé, Saint-Brévin, Saint-Nazaire. Le site de Remouillé, situé au sud-est du département, est plus particulièrement intéressant.

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*.

Le passage est noté à Ouessant (29) entre le 6 et le 25 octobre.

En fin d'hiver, 1 est à Ouessant le 15 février et un groupe de 17 individus stationne du 4 au 9 mars à Guergam/Lanvellec (22), y-a-t-il hiverné ?

Dans les Côtes-d'Armor l'espèce est repérée en période de reproduction à Loguivy-Plougras (2 sites) et surtout sur un coteau de la vallée du Gouët/Plaintel, site inédit où un chanteur est cantonné fin mars-début avril.

Dans le Morbihan, des contacts sont obtenus en zone littorale à Noyal et Vannes. Les autres données sont originaires de l'intérieur de la partie orientale de ce département.

Dans le Finistère, l'espèce n'est contactée qu'autour du massif forestier d'Huelgoat.

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*.

Le passage automnal prend place entre la fin de septembre et la première semaine de novembre à Ouessant (29) ; sur ce même site, un mouvement est, pour la première fois, détecté au printemps, du 11 au 13 mars.

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*.

1 ind. le 6 janvier en baie du Mont-Saint-Michel (35) et 1 ind. le 11 mars à Ouessant (29).

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*.

Dernière à Ouessant (29) le 11 octobre.

Au printemps, les premières sont observées le 10 mars à Pont-Croix (29).

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*.

La dernière est observée le 26 novembre à Treffiagat (29).

Premières à Gétigné (44) le 3 mars.

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbica*.

Dernière à Ouessant (29) le 19 octobre.

Première le 18 mars au Croisic (44).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardii*.

A Goulien (29), 1 le 29 septembre ; à Ouessant (29), 3 à 6 individus sont contactés entre le 7 et le 28 octobre.

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*.

Le passage est extrêmement groupé : au moins 22 oiseaux sont recensés sur nos côtes entre le 10 septembre et le 2 octobre avec un maximum très marqué entre le 15 et le 21.

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*.

Le passage automnal se déroule du 31 août au 28 octobre à Ouessant (29). Sur deux sites de nidification des Côtes-d'Armor, des oiseaux sont encore présents les 8 et 22 septembre, mais rien n'indique qu'il s'agit de nicheurs locaux.

Au printemps, l'espèce est contactée moins rarement qu'à l'accoutumée dans le Petit Trégor (29), sur les communes de Plougasnou, Lanmeur et surtout Garlan où un chanteur est présent à Langolvas, dans les faubourgs de Morlaix, le 3 juillet. Rappelons que cette population est en limite d'aire de répartition.

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*.

A Ouessant (29) le passage automnal prend place entre le 3 septembre et la mi-octobre avec un maximum marqué de la fin septembre au 10 octobre, également bien ressenti sur le quart nord-ouest de la région.

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*.

1 les 8 et 14 octobre puis 2 le 15 à Ouessant (29).

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*.

Deux mentions concernent des individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce nordique *A. p. Littoralis* : 1 le 11 octobre au Diben/Plougasnou (29) et 1 le 22 mars à Penzornou/Carantec (29).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*.

Présence entre le 26 octobre et le 15 avril.

Deux belles bandes en Ile-et-Vilaine : 30 le 18 janvier en Rance maritime et 39 le 12 mars dans le marais de Sougeal.

BERGERONNETTE PRINTANIERE/FLAVEOLE *Motacilla flava/flavissima*.

Nous retenons ici les données générales sans précision d'espèce (ou de sous-espèce ?).

A Ouessant (29), le passage se déroule entre le 31 août et le 17 octobre avec un maximum entre le 17 septembre et le 1er octobre (165 ind. le 17).

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*.

1 ind. *M. f. thunbergi* est à Ouessant (29) le 22 septembre.

Première le 1er avril à Liberge/Donges (44).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 14 septembre au 1er décembre.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba alba*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 2 septembre au 4 novembre à l'automne et du 8 mars au 26 mai au printemps.

Un dortoir urbain compte déjà 20 individus le 14 juillet à Morlaix (29). Il est remarquable qu'il soit alors constitué de *M. a. alba*, alors qu'en hiver il ne semble compter que des *M. a. yarrellii*.

BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrellii*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 5 octobre au 16 novembre à l'automne et du 2 mars au 27 mai au printemps.

Peu de recensements de dortoirs hivernaux ont été effectués : 960 à Saint-Brieuc (22).

1 couple mixte avec un mâle Yarrell produit 2 jeunes au Vivier-sur-Mer (35).

Au Croisic (44) une Bergeronnette de Yarrell de sexe indéterminé nourrit deux juvéniles volants le 14 juillet. Même si on peut exclure un comportement d'aide au nourrissage, il semble bien s'agir du premier cas de reproduction de cette sous-espèce pour la Loire-Atlantique. Déjà, en 1992, une femelle Yarrell était cantonnée avec un mâle type dans le marais guérandais (44).

ROUGEGORGE FAMILIER *Erithacus rubecula*.

Le passage automnal débute le 27 août à Ouessant (29) avant de culminer lors de la dernière décade de septembre. Au printemps, les départs s'effectuent massivement en mars.

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*.

A Ouessant (29) : 1 les 10 août et 4 septembre ; à Hoëdic (56), 1 le 15 septembre.

Trois contacts printaniers sont obtenus dans l'est du golfe du Morbihan (56), à Séné et au Hézo.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica*.

La dernière est observée à Sarzeau (56) le 14 septembre.

La première est notée à La Turballe (44) le 17 mars.

Au printemps, l'espèce est signalée le 12 avril aux portes de Lorient (56), à Pen Mané/Locmiquélic (56).

L'espèce progresse dans le marais de Redon : 12 chanteurs le 22 mai dans le marais de Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35) et 1 chanteur en juin sur un nouveau site, plus en amont, le marais de la Cour/Sainte-Anne-sur-Vilaine (35).

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*.

A Ouessant (29), le passage automnal se déroule du 10 octobre au 16 décembre et le passage printanier du 11 mars au 8 avril avant une donnée décalée du 8 mai.

Des chanteurs sont repérés en période de reproduction dans les Côtes-d'Armor à l'est d'une ligne Guingamp-Quintin. Il n'y a aucune mention relative à la nidification en provenance du Finistère.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*.

Le passage se déroule entre le 20 août et le 30 octobre à Ouessant (29). Dans le reste de la région, les données s'échelonnent du 13 septembre au 9 octobre.

Le premier est à Saint-Julien-de-Concelles (44) le 27 mars.

Au printemps, des migrateurs sont contactés à Ouessant les 13 avril et 12 mai, à Fréhel (22) le 15 avril et à Belle-Ile (56) le 9 mai.

Deux chanteurs sont présents en forêt de Coëtquen (22) le 20 avril alors qu'un individu transporte (des matériaux ?). Par ailleurs, la reproduction est rapportée de Saint-Nazaire (44).

L'espèce n'est pas retrouvée en période de reproduction dans le Finistère et en particulier dans son « fief » de la forêt d'Huelgoat.

RUBIETTE DE MOUSSIER *Phoenicurus moussieri*.

La femelle observée le 14 mai à Ouessant (29) constitue une première française pour cette espèce originaire d'Afrique du Nord.

TARIER D'EUROPE *Saxicola rubetra*.

Le passage se déroule du 10 août au 31 octobre et culmine lors de la deuxième quinzaine de septembre : 100+ à Ouessant (29) le 28.

Le premier est noté le 17 mars à Guérande (44).

TARIER PATRE *Saxicola torquata*.

L'analyse des mouvements sur l'île d'Ouessant (29) est particulièrement intéressante : après de nombreux départs en septembre, des mouvements de transit sont ressentis en octobre ; il ne reste ensuite qu'une dizaine d'hivernants ; les retours s'effectuent entre la deuxième décade de février et le début avril. On remarque également la forte progression des nicheurs : 45-46 couples contre 25 l'année précédente et 12 en 1991.

1 ind. 1er hiver présentant les caractères de la sous-espèce orientale *S. t. maura/stejnegeri* à Ouessant le 9 octobre.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*.

A Ouessant (29), le passage post-nuptial se déroule du 3 août au 21 octobre avec un maximum du 10 septembre au 14 octobre.

Le passage pré-nuptial est noté à Ouessant du 8 mars au début juin ; 6 individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *O.o. leucorrhoa* sont observés sur l'île entre le 25 avril et le 3 juin.

2 sites sont découverts dans les Monts d'Arrée (29) en 1993, au Ménez Mikel/Saint-Rivoal et dans les ardoisières de Ménez Kerohant/Commana.

1 mâle alarme les 9 et 10 juillet au Diben/Plougasnou (29), en limite de répartition. Dans les Côtes-d'Armor, le GEOCA attend une preuve de reproduction depuis la création de son fichier, en 1983 !

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*.

A l'automne, l'espèce n'est notée qu'à Ouessant (29), durant un laps de temps très court, du 5 au 19 octobre avec deux regroupements notables : 31 ind. le 8 et 17 ind. le 9.

Au printemps, quatre localités accueillent onze migrateurs entre le 17 mars et le 6 mai. Une donnée intérieure est recueillie à Lanfains (22) avec 1 mâle et 1 femelle le 11 avril.

MERLE NOIR *Turdus merula*.

A Ouessant (29), le passage est ressenti du 6 septembre au 14 octobre.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*.

A Ouessant (29), le passage se déroule essentiellement lors de la deuxième quinzaine d'octobre
L'hivernage a été très faible dans le Finistère et les Côtes-d'Armor.

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 4 septembre à la mi-octobre.

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 4 octobre au 19 novembre.

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 13 septembre au 27 octobre.

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*.

Deux données de passage à Ouessant (29), les 26 et 29 octobre.

Deux données quantitatives relatives à la reproduction : 25-30 couples à Trunvel/Tréogat (29) en 1993 et 67 chanteurs sur 5 kilomètres de bordure de marais à La Chapelle-des-Marais, en Brière (44), le 12 avril.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*.

La Cisticole a repris sa progression après la pause occasionnée par le froid de l'hiver précédent. Ce phénomène est marqué en particulier en Loire-Atlantique où l'espèce reconquiert la Brière et la presque île guérandaise.

Nous donnons la liste des localités nouvellement signalées par rapport à l'an passé : Pleurtuit, Saint-Malo, Saint-Just (35), Pleumeur-Bodou, Plounérin (22), Riantec, Rieux, Séné (56), Guérande, Saint-Nazaire (44).

12 cantons de chant ont été dénombrés à Trunvel/Tréogat (29) en 1993.

1 individu construit au Moulin Neuf/Plounérin, site intérieur, les 28 et 29 août, mais la tentative échoue.

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*.

1 alarme le 25 juillet au Grinec/Plounéour-Ménez (29).

Le passage automnal, faible, est noté du 23 septembre au 14 octobre.

A noter au printemps : 1 chanteur le 12 avril à La Chapelle-des-Marais (44), 1 chanteur le 19 mai à Kerdreux/Crozon (29). Par ailleurs, des contacts ont été obtenus en presqu'île guérandaise et au Massereau/Frossay (44) dans un département où cette Locustelle est très localisée.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE *Locustella luscinioides*.

Dernière à Trunvel/Tréogat (29) le 23 septembre.

Première le 27 mars, toujours à Trunvel, où se reproduisent 12 à 15 couples.

2 à Landrezac/Sarzeau (56) le 25 juin.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*.

108 captures à Trunvel/Tréogat (29) entre le 1er août et le 25 septembre. Ailleurs, trois observations de juvéniles isolés : le 15 août à Laoual/Plogoff (29), le 16 au Curnic/Guissény (29) et le 23 à Poulguidou/Plouhinec (29).

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus*.

1 779 oiseaux sont capturés à Trunvel/Tréogat (29) avec un maximum marqué en août alors que le dernier est noté le 1er octobre. A Ouessant (29), le passage se déroule entre le 4 août et le 27 septembre.

Les premiers sont notés à Trunvel le 27 mars.

Quelques recensements au printemps : 12 couples à Trunvel, 7 couples à Ouessant, 40 chanteurs sur 5 kilomètres de bordure de marais à La Chapelle-des-Marais, en Brière (44), le 12 avril, 38 chanteurs dans le marais de Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35) le 22 mai.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*.

Trois à l'automne à Ouessant (29), les 10 septembre, 7 octobre et 29-30 octobre.
Aucune donnée relative à la reproduction.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 28 août au 5 novembre avec un maximum du 15 au 25 septembre.

Les retours s'effectuent à partir du 17 avril.

Quelques estimations : 69 chanteurs dans les marais de Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35) le 22 mai ; 50+ chanteurs à l'étang de Marcillé-Robert (35) ; 800 à 1000 couples à Trunvel/Tréogat (29).

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus*.

Première le 16 avril en Loire-Atlantique, où l'espèce n'est contactée que sur la rive nord de l'estuaire de la Loire.

Au cours du printemps 1993, des chanteurs ont été notés dans le Morbihan, 1 à Suscinio/Sarzeau le 7 mai et 1 à Pomper/Baden le 7 juin, et dans le Finistère, 1 chanteur à Trunvel/Tréogat en mai et jusqu'au 6 juin.

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*.

A Ouessant (29), le passage se déroule entre le 9 septembre et le 8 octobre avec une intensité un peu plus marquée à la mi-septembre. C'est à ce moment-là, le 13, qu'un individu est observé à Kerloc'h/Clédén-Cap-Sizun (29).

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*.

Sur les îles, le passage automnal s'inscrit entre le 9 septembre et le 14 octobre.

Premier le 19 avril à Pommeret (22).

Au printemps, des données sont obtenues en limite de répartition : 1 chanteur les 16 et 29 mai à Pors Moguer/Plouha (22) et 1 chanteur le 18 mai à Quimper (29).

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata*.

A Ouessant (29), un passage est nettement ressenti lors de la deuxième quinzaine d'octobre.

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantilans*.

A Ouessant (29), 1 les 18 août et 30 septembre.

FAUVETTE ORPHEE *Sylvia hortensis*.

1 le 12 octobre à Ouessant (29).

FAUVETTE EPERVIERE *Sylvia nisoria*.

1 juv. à Ouessant (29) du 23 au 25 septembre.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*.

A Ouessant (29), la migration se déroule du 24 septembre au 30 octobre.

Deux données au printemps dans les Côtes-d'Armor : 1 à Tréveneuc le 19 mai et 1, sans précision de date, au bois de la Salle/Pléguien. Dans ce dernier cas, il s'agit de la première mention intérieure départementale.

Première mention pour la Loire-Atlantique : 1 chanteur, apparemment de passage, le 18 avril au Grand Pâtis/Saint-Mars-du-Désert.

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*.

A Ouessant (29) le passage est noté du 10 août au 29 octobre.

Première le 26 mars à Plérin (22).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*.

A Ouessant (29), le passage d'automne se déroule entre le 1er septembre et le 30 octobre avec un maximum du 16 septembre au 20 octobre.

Première le 11 avril au Fort la Latte/Fréhel (22).

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 17 septembre au 19 novembre avec un maximum du 7 au 20 octobre.

Sur Ouessant toujours, la première est de retour le 11 mars.

POUILLOT VERDATRE *Phylloscopus trochiloides*.

1 à Ouessant (29) le 8 octobre.

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*.

35 à 40 individus transitent par Ouessant (29) entre le 4 octobre et le 19 novembre avec une arrivée marquée du 16 au 22 octobre (13 individus différents le 20).

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*.

L'espèce est contactée en période de reproduction en Ile-et-Vilaine dans les forêts de Rennes, de Haute-Sève et d'Araize. Dans ce même département, 1 chanteur aurait été contacté le 20 juin à Saint-Malo !? L'auteur de cette observation pour le moins excentrée serait bien inspiré de nous faire parvenir des précisions.

Il est remarquable qu'aucune observation n'ait été faite en Loire-Atlantique depuis 1988. Qu'en est-il vraiment ?

1 à Ouessant (29) le 3 mai.

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*.

A Ouessant (29) : 3 oiseaux entre le 16 septembre et le 15 octobre.

Le premier est signalé le 18 avril au Cloître-Saint-Thégonnec (29).

5 à 10 sites sont occupés le 3 mai en forêt du Cranou (29), ce qui traduit une forte érosion par rapport aux 35 sites de l'année précédente.

Ailleurs en Basse-Bretagne : une localité dans les Côtes-d'Armor, dans la forêt de Beffou ; six localités dans le Finistère, à Brasparts, Huelgoat, Locmaria-Berrien, Lopérec, Plounéour-Ménez et au Cloître-Saint-Thégonnec.

En Loire-Atlantique, une seule donnée provient de la forêt du Gâvre. Rappelons que dans ce département l'espèce a toujours été localisée.

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*.

Le passage se déroule du 15 septembre au 19 novembre à Ouessant (29).

Des oiseaux présentant les caractéristiques des sous-espèces scandinaves et orientales sont notés du 8 octobre au 1er décembre.

Le passage de printemps débute le 18 février à Ouessant et dure jusqu'au 13 mai.

Un individu de type sibérien à Kerbrat/Plougoulm (29) le 7 mars.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*.

Le passage s'étend du 4 août au 4 novembre à Ouessant (29).

Le premier est noté à Vannes (56) le 26 mars alors que le passage printanier s'inscrit entre le 9 et le 30 avril sur Ouessant.

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*.

Le passage est enregistré à Ouessant (29) entre le 22 septembre et le 4 novembre avec un maximum de 190 oiseaux le 13 octobre.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU *Regulus ignicapillus*.

Le passage se déroule entre le 16 septembre et le 5 novembre à Ouessant (29).

Un migrateur chante dans une haie à La Chapelle-Neuve (22) le 12 mars.

Aucune donnée de reproduction ne nous est parvenue en dehors de la forêt de Rennes (35).

GOBEMOUCHE GRIS *Musicapa striata*.

Le passage se déroule du 10 août au 30 octobre à Ouessant (29).

Premier le 25 avril à Sion-les-Mines (44).

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva*.

7 ou 8 oiseaux passent à Ouessant (29) entre le 29 septembre et le 30 octobre.

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*.

Le passage post-nuptial est ressenti du 10 août au 15 octobre à Ouessant (29), Hoëdic (56) ainsi qu'à Rennes et Vitré (35).

1 ind. le 10 avril à Pont-Saint-Martin (44).

MESANGE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*.

1 ind. à Ouessant (29) les 29 et 30 octobre.

20 couples à Trunvel/Tréogat (29).

MESANGE NOIRE *Parus ater*.

Bon passage à Ouessant (29) du 10 au 30 octobre avec un maximum de 10 oiseaux au 15, ce mouvement est ressenti au même moment en Loire-Atlantique.

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*.

L'espèce n'est pas contactée en dehors de la forêt de Rennes (35).

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus*.

1 ind. le 11 octobre à Trunvel/Tréogat (29).

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*.

Après deux oiseaux bien hâtifs le 16 mars à Châtillon-en-Vendelais (35), un beau passage est noté sur les îles bretonnes entre le 9 mai et le 4 juin.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*.

1 ind. le 21 septembre à Quiberon (56) et 1 le 23 à Ouessant (29).

Première le 5 mai à Saint-Etienne-de-Montluc (44).

A la remontée, en dehors de la Loire-Atlantique, 2 oiseaux isolés sont à Ouessant les 19 et 28 mai et 1 ind. à Cesson-Sévigné (35) le 2 juin.

Au printemps, toujours en dehors de la Loire-Atlantique : 6 couples dans le marais de Dol (35) le 14 mai et 1 couple dans les landes rennaises/Campénéac (56) ; aucune observation n'est faite dans les Monts d'Arrée (29).

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*.

Deux données nous proviennent du marais de Dol (35) : 7 (!) le 14 février et 1 le 11 mai.

En Loire-Atlantique : 1 ind. à Bouée le 2 février et 1 ind. à Plessé le 21.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator*.

1 ind. à Tréguennec (29) le 1er août.

A Ouessant (29), 1 ind. le 19 avril et 1 ind. du 23 au 26 avril.

CRAVE A BEC ROUGE *Pyrhacorax pyrrhacorax*.

A l'automne, une observation est faite bien loin des sites de reproduction : 2 à la pointe Minard/Plouézec (22) le 16 septembre.

Une seule donnée relative à la nidification : 10-11 couples à Ouessant (29) avec une bonne production.

Ailleurs, on retiendra une bande de 12 oiseaux à la pointe du Van/Beuzec-Cap-Sizun (29) le 27 septembre, la présence d'oiseaux sur la côte sud du Léon (29) (Plouzané et Locmaria-Plouzané) ainsi que 6 ou 7 à la grotte de l'Apothicaierie/Belle-Ile (56) le 19 juin.

CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus*.

5 nids dans l'unique colonie costarmoricaine à Kerohou/Maël-Pestivien.

En Léon (29), quelques recensements ont été opérés : 38 nids dans le bourg de Ploudalmézeau, 25+ au Kerno/Ploudaniel, 20 environ à Trébodennic/Ploudaniel, 25 à Kerandraon/Saint-Pol-de-Léon.

La colonie de Trébodennic a la particularité de voir tous les nids regroupés dans un seul et énorme pin de Monterrey *Pinus insignis*.

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone*.

2 nids sont installés en 1993 dans les falaises d'Ouessant (29).

GRAND CORBEAU *Corvus corax*.

Nous avons reçu des nouvelles de 10 sites de reproduction occupés, en revanche, l'avant-dernier nid situé sur le littoral de l'arrondissement de Morlaix (29) est abandonné en cours de saison.

ETOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris*.

Le maximum du passage se déroule lors de la troisième décade d'octobre à Ouessant (29).

ETOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*.

1 juvénile à Hoëdic (56) les 26 septembre et 5 octobre.

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*.

L'espèce est notée surtout en Bretagne centrale, à Bignan, Naizin, Pluméliau (56) et Saint-Thélo (22), et en Loire-Atlantique, où elle est beaucoup mieux représentée.

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs*.

Le passage se déroule du 22 septembre au 19 novembre à Ouessant (29) avec un maximum du 11 octobre au 5 novembre.

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla*.

Le passage se déroule du 8 octobre au 19 novembre à Ouessant (29) avec un maximum du 11 au 30 octobre.

L'hivernage a été très faible, au moins dans le quart nord-ouest de la région : aucune donnée dans la région de Morlaix (29), quatre mentions pour les Côtes-d'Armor dont une, il est vrai, sort de l'ordinaire : 500 ind. à Quévert le 2 février.

Dernier à Saint-Brandan (22) le 21 avril.

SERIN CINI *Serinus serinus*.

A Ouessant (29), un petit passage se déroule du 9 septembre au 30 octobre.

Deux données intérieures pour la Basse-Bretagne : 1 chanteur au Faouët (56) le 10 avril et 1 chanteur à Plounéour-Ménez (29) le 3 juillet. Ce dernier cas appartient à une série de chanteurs découverts en début d'été dans des sites inhabituels de la région morlaisienne. Ce phénomène a déjà été constaté par le passé et semble traduire une dispersion post-nuptiale.

CHARDONNET ELEGANT *Carduelis carduelis*.

L'espèce n'hiverné pas sur l'île d'Ouessant (29) et les nicheurs s'installent entre le 11 mars et la fin avril au moins.

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*.

Le passage semble se dérouler entre le 7 octobre et la mi-novembre. Le maximum est noté le 30 octobre à Ouessant (29).

En février, un mouvement est sensible : 50 à Nantes (44) le 1er, 100 à Trégueux (22) le 17, 53 en forêt de Lorge (22) le 21, 150 au Petit-Mars (44) le 22 et 120 à Nantes le 28.

LINOTTE MELODIEUSE *Carduelis cannabina*.

A Ouessant (29), l'espèce est absente du 1er décembre au 13 mars. En fait, le plus gros des effectifs a quitté l'île à la fin d'octobre et les retours ne se font véritablement sentir qu'à la fin mars.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*.

A Ouessant (29), 1 le 7 octobre.

BEC-CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*.

1 le 21 août à Groix (56).

Une invasion s'annonce à la fin de la période : 9 à Moustoir-Ac (56) fin juin et en juillet, 8 à Goulrien le 7 juillet et à Saint-Brandan (22), après quelques observations en début juillet, l'espèce devient fréquente à partir du 15.

GROSBEC CASSE-NOYAUX *Coccothraustes coccothraustes*.

En dehors de la Loire-Atlantique, l'espèce n'est notée que dans la région de Dinan (22) : en forêt de Coëtquen 2 (1 couple ?) les 8 et 11 avril ; à la Maison Blanche/Quévert, 1 couple élève au moins 1 jeune, la famille étant observée le 4 juin.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*.

La migration d'automne prend place entre le 13 septembre et le 30 octobre. Le maximum est enregistré entre les 7 et 19 octobre à Ouessant (29).

Une seule donnée d'hivernage : 64 le 24 janvier en baie du Mont-Saint-Michel (35).

BRUANT DES NEIGES *Plectophenax nivialis*.

A Ouessant (29), le passage post-nuptial, faible, s'inscrit entre les 10 et 30 octobre avec un maximum du 25 au 30 octobre (30 le 26). Sur l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22), 2 le 30 octobre.

Les données hivernales sont particulièrement maigres : 1 à la Groue/Saint-Pol-de-Léon (29) le 3 janvier, 15 en baie du Mont-Saint-Michel (35), et encore dans la partie normande, le 6, 1 à l'île Grande de janvier à mars.

BRUANT FOU *Emberiza cia*.

1 ind. aurait été vu à Plouharnel (56) le 20 octobre.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*.

Douze observations sont réalisées entre le 10 septembre et le 7 octobre à Ouessant (29) avec un maximum de 5 le 11 septembre. A Hoëdic (56) l'espèce est contactée les 16 et 17 septembre.

Une femelle est vue à Ouessant le 7 mai.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla*.

1 ind. le 1er novembre à la Ville Ger/Pleudihen (22) et 1 le 12 avril à Hoëdic (56). Et rien à Ouessant (29)...

BRUANT ELEGANT *Emberiza elegans*.

1 mâle à Ouessant (29) du 13 au 18 avril. Il s'agit d'une première pour la France, mais cet oiseau asiatique n'est probablement pas d'origine sauvage.

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 5 octobre au 5 novembre.

BRUANT PROYER *Miliaria calandra*.

A Ouessant (29), 1 ind. le 29 septembre et 1 ind. du 26 au 30 octobre.

80 oiseaux à Plomodiern (29) le 1er janvier.

Au passage : 1 ind. les 20 et 27 avril à Ouessant et 1 ind. le 5 mai au Légué/Saint-Brieuc (22).

Au printemps, l'espèce est contactée dans le Nord-Finistère sur trois sites : les dunes de Saint-Pabu (2 chanteurs le 6 mars et 2 le 12 avril), Lesteven/Ploudalmézeau (1 chanteur le 9 mai), le Curnic/Guissény (1 chanteur le 14 juillet).

Une intéressante donnée de 6 chanteurs provient de Saint-Tugen/Esquibien (29) le 30 avril. Qu'en est-il plus au nord, dans le Cap Sizun ?

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

- BEUGET, A., CAMBERLEIN, G. & LE ROY, R. (1994).-**
Sillon de Talbert - Suivi ornithologique 1993 - Synthèse des résultats, *Le Fou*, 33 : 5-9.
- CADIOU, B. (1995).-**
Observatoire des oiseaux marins nicheurs. CREN-SEPNB. *Annuaire de réserves 1995* : 133-154.
- CHOQUENÉ, G.-L. (1994).-**
L'étang de Châtillon-en-Vendelais ; bilan de dix années de suivi. *Le Grèbe*, 7 : 44-55.
- CHOQUENÉ, G.-L. (1996).-**
Une nouvelle espèce nicheuse dans le département : la Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*). *Le Grèbe*, 8 : 8-9.
- DUBOIS, PH.J. & le C.H.N. (1994).-**
Les oiseaux rares en France en 1992. *Ornithos*, 1 : 2-24.
- DUBOIS, PH.J. & le C.H.N. (1995).-**
Les oiseaux rares en France en 1993. *Ornithos*, 2 : 1-19.
- DUBOIS, PH.J. & ROUGÉ, A. (1992).-**
Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 29 : 52-53.
- DUBOIS, PH.J. & ROUGÉ, A. (1993).-**
Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 30 : 52-53.
- DUBOIS, PH.J. & ROUGÉ, A. (1993).-**
Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 31 : 52-53.
- DUBOIS, PH.J. & ROUGÉ, A. (1993).-**
Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 32 : 52-53.
- DUBOIS, PH.J. & ROUGÉ, A. (1993).-**
Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 33 : 52-53.
- GAROCHE, J. (1993).-**
Espèces occasionnelles dans le département des Côtes-d'Armor. *Le Fou*, 31 : 6-17.
- G.O.B. Observateurs du Finistère Nord.-**
Bulletins : « Ornithologie de Basse Bretagne ».

- G.O.B. MORBIHAN (1992).-** Observations ornithologiques pour la période du 16 mars 1992 au 15 novembre 1992. *Ar Vran Morbihan*, 6 : non paginé.
- G.O.B. MORBIHAN (1993).-** Observations ornithologiques pour la période du 16 mars 1993 au 15 novembre 1993. *Ar Vran Morbihan*, 7 : 53.
- G.O.L.A. (1992).-** Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIXème siècle à nos jours, Nantes, 288 p.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR (1993).-** Actualités ornithologiques du 16 juillet 1992 au 15 novembre 1992. *Le Fou*, 30 : 45-60.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR (1993).-** Actualités ornithologiques du 16 novembre 1992 au 15 mars 1993. *Le Fou*, 31 : 47-64.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR (1994).-** Actualités ornithologiques du 16 mars 1993 au 15 juillet 1993. *Le Fou*, 32 : 47-61.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR (1994).-** Actualités ornithologiques du 16 mars 1993 au 15 juillet 1993. *Le Fou*, 33 : 37-39.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE.-** Notes d'informations.
- GUERMEUR, Y. (1992).-** Bulletin du Centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 9 : 5-28.
- GUERMEUR, Y. (1993).-** Bulletin du Centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 10 : 5-29.
- GUERMEUR, Y. & MONNAT, J.-Y. (1981).-** *Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne*. S.E.P.N.B & C.O.B. Ar Vran, Brest, 240 p.
- LE ROY, R. (1993).-** Notes d'ornithologie en Côtes-d'Armor du 16 juillet 1990 au 27 septembre 1992. *Le Fou*, 30 : 19-24.
- L.P.O. 44 (1995).-** Chronique ornithologique de Loire-Atlantique en 1993, pp 162-200.

- MAHÉO, R. (1993).**- Bernache cravant - Stationnements en France - Saison 1992-93. Université de Rennes 1.
- MAHÉO, R. (1993).**- Limicoles séjournant en France : janvier 1993. Rapport de convention ; O.N.C.- Université de Rennes 1.
- MAUVIEUX, S. (1994).**- Sortie Forêt de Lorge du 20/3/93. *Le Fou*, 33 : 27.
- ROCAMORA, G. MAILLET, N. & LE BIROE FRANCE (1994).**- Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France - janvier 1993. *Ornithos*, 1 : 58-66.
- S.E.P.N.B. (1993).**- Annuaire des réserves 1993. S.E.P.N.B. 128 p..
- S.E.P.N.B. (1994).**- Travaux des réserves, tomes X et XI, 1993-1994. S.E.P.N.B. 113 p.
- S.E.P.N.B. (1996).**- Etude sur les oiseaux nicheurs de la forêt de Rennes. 14 p.
- YÉSOU, P., D'ESCRIBENNE, L.G., NISSER, J. & HELLIO, J.F. (1993).**- La Sterne arctique a niché sur Béniguet. *Penn ar Bed*, 150 : 28-29.

NOTES INEDITES

B. BARGAIN, D. CARCREFF, A. DESNOS, E. DE KERGARIOU, P. LE MAO, R. MAHÉO, J. MAOUT, J.-Y. PÉRON, P. PULCE, G. RAULT & J.-F. ROBIC.

Jacques MAOUT
16 rue du Croissant
29 600 Morlaix

