

**SYNTHESE DES OBSERVATIONS
ORNITHOLOGIQUES BRETONNES
ENTRE LES 16/7/1993 et 15/7/1994.**

Par Jacques MAOUT

0064

Avertissement :

La compilation présentée ci-après, constitue la suite de la synthèse publiée dans le fascicule précédent (Ar Vran Vol. 9 N°1, Juin 1998, J. MAOUT. 0062 : 8-60)

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*.

Après un oiseau précoce le 18 juillet à Hoëdic (56), il faut attendre la fin août pour recontacter l'espèce. Le pic migratoire est centré du 16 septembre au 2 octobre mais quelques observations sont ensuite faites jusqu'au 29 octobre.

Il y a deux mentions hivernales dans le Morbihan dont l'une nous semble être une erreur (de transcription ?). Pour l'autre, 1 individu a été noté le 24 décembre à Kerjouanno/Arzon.

Trois données printanières à Ouessant (29) : 1 le 25 avril, 2 le 5 mai et 1 le 21 juin.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus*.

Le passage automnal, déjà plus important que celui de l'année précédente, est accentué par la tempête du 13 septembre. Les mouvements débutent le 5 août et cessent le 21 octobre.

La côte sud est la première concernée par cet afflux : à Penvins/Sarzeau (56), 10-15 le 8 septembre, 10 le 11, des dizaines le 13, 10+ le 14, 9 le 5 octobre ; à Lespoul/Pont-Croix (une station d'épuration !), 7 le 12 septembre ; au Halguen/Pénestin (56), 25 le 13 septembre.

Le lac de Grandlieu (44) est le lieu d'une observation le 13 septembre ainsi que de l'unique donnée printanière, le 23 avril.

LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus*.

Trois données de juvéniles ont été effectuées au cours de l'automne 1993 : 1 cadavre à Loctudy (29) le 30 août, 1 à la pointe du Grouin/Cancale (35) le 1er septembre et 1 à Molène (29) le 15 octobre.

GRAND LABBE *Stercorarius skua*.

En automne, le passage s'inscrit entre le 24 juillet et le 14 novembre avec une intensité plus marquée du 9 septembre au 24 octobre, maximum 13 le 10 septembre à Ouessant (29).

1 à Penvins/Sarzeau (56) le 9 décembre, 2 à Porsguen/Ploudalmézeau (29) le 24, 1 au Diben/Plougasnou (29) le 25.

A Ouessant, 1 le 22 mars, 2 le 31, 1 les 6,7 et 8 avril ; au Diben, 1 le 10 avril ; au Cap Fréhel (22), 1 le 12 mai.

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*.

62 000+ au dortoir en baie du Mont-Saint-Michel (35) le 11 novembre.

Reproduction : 52 nids à Codilio/Redon (35), 1 couple élève un jeune à Trunvel/Tréogat (29), 3 couples échouent à Falguérec/Séné (56), 3 couples dans le marais de Batz-sur-Mer (44), 300 à 400 individus s'installent à Liberge/Donges (44) le 28 février, 145+ nids dans trois colonies en Brière (44), 3-4 couples au Bois-Vert/Varades (44).

Total Bretagne : 350-400+ couples.

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*.

L'espèce est présente tout au long de l'année, mais le passage post-nuptial n'est véritablement ressenti qu'à partir de la mi-octobre.

Trois secteurs retiennent des bandes importantes : la côte occidentale de la baie de Saint-Brieuc (22), 11 le 14 mars aux Moulins/Etables ; la baie de Douarnenez (29), 31 le 7 novembre et 35 le 12 février au Ri/Douarnenez-Kerlaz ; le Pays Bigouden (29), 28 le 16 janvier à Kerity/Penmarc'h.

Reproduction :

1 couple et 1 immature sont présents dans la colonie de Mouettes rieuses *Larus ridibundus* du marais de Liberge/Donges (44) du 14 avril au 20 mai puis disparaissent, **mais l'événement attendu se produit au lac de Grandlieu (44) : 1 couple couve, sans succès toutefois, à la Boulogne/Saint-Philbert-de-Grandlieu. Il s'agit d'une première pour la Bretagne.**

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus*.

L'espèce se montre beaucoup plus abondante que lors de la période précédente.

La première est notée le 12 août à Penvins/Sarzeau (56) mais un premier petit afflux ne survient que lors du coup de vent du 13 septembre. Par la suite, les oiseaux seront notés assez régulièrement jusqu'au 24 octobre avec deux données intéressantes recueillies sur la côte nord, 35 au Val André (22) le 23 septembre et 31 à Cancale (35) le 3 octobre.

Après un creux en novembre, l'espèce réapparaît en force en décembre, 30 à Saint-Malo (35) le 2 ... 80 au Roselier/Plérin (22) le 24 En janvier, les données sont nombreuses même si les effectifs sont moins imposants.

Après un « blanc » du 22 janvier au 20 février, les Mouettes pygmées reviennent en force : ... 100-150 en baie de Bourgneuf (44) les 25 et 26 février ... puis le passage se renforce entre le 25 mars et le 19 avril : 111 à Ouessant (29) le 25 mars, 500 à Grandlieu (44) du 4 au 10 avril, 57 à Guérande (44) le 12, 130 à Ouessant le 18.

L'espèce ne disparaît pas pour autant après cet afflux, des observations sont encore réalisées ici ou là de mai à juillet.

Reproduction :

2 adultes sont observées dans une colonie de Mouettes rieuses *Larus ridibundus* au lac de Grandlieu (44) durant le mois de mai. En juin, ces oiseaux parquent, s'accouplent, construisent un nid, alarment et simulent, pour le moins, la couvaison. Le 20 juillet, 2 adultes sont observés avec deux jeunes au vol mal assuré.

Pour le moins, il s'agit de la première nidification de l'espèce en France et la reproduction semble très probable au vu des éléments recueillis.

MOUETTE DE SABINE *Larus sabini*.

La fin de l'été et le début de l'automne sont marqués par un afflux exceptionnel de Mouettes de Sabine tant sur les côtes bretonnes que sur celles du Golfe de Gascogne. Ce mouvement est consécutif à l'arrivée d'une grosse dépression le 12 septembre.

Après deux isolées à Ouessant (29) les 27 août et 9 septembre, l'espèce apparaît massivement dans les eaux bretonnes à la faveur de la dépression de la mi-septembre. Des oiseaux sont alors notés de l'Île Grande/Pleumeur-Bodou (22) jusqu'aux confins de la Vendée : 50 à La Turballe (44) le 12 ... 200+ dans l'estuaire de la Vilaine (56), 20 dans le port de Douarnenez (29) le 13 ... des dizaines en Vilaine et entre Hoëdic (56) et le Croisic (44), 1 au lac de Grandlieu (44) le 14 ... 11 en rivière de Vannes (56) le 15 ... 30-50 en Vilaine le 16 ... 100+ entre le Croisic et le plateau du Four (44) le 18 ... 100+ entre le Croisic et les Grands Cardinaux (56) le 19 ...

Les données deviennent moins abondantes à partir du 19 septembre mais on note encore 15 à la Mine d'Or/Pénestin (56) le 25. En octobre, 11 observations sont encore faites, principalement à Ouessant (29), jusqu'au 21.

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis*.

1 adulte à Pénestin (56) du 19 au 24 septembre puis le 9 janvier ; 1 adulte à Saint-Nazaire (44) du 23 octobre au 12 mars (2 ad. le 20 février) ; 1 adulte au Stang Alar/Brest (29) du 20 janvier au 15 mars ; 1 adulte à Pont-l'Abbé (29) le 5 février ; 1 adulte à Quélisoye/Larmor-Plage (56) du 5 au 14 mars.

GOELAND BRUN *Larus fuscus*.

Nous indiquons les résultats des recensements de quelques-unes des principales colonies, effectués en 1994, tout en rappelant les données de 1987/88 et de 1993 :

Colonies	Dépt	1994	1993	1978/88
Baie de Morlaix	29	127	147	84-85
Réserve de Groix	56	38	32	30
Rohellan	56	60-80		140
Méaban	56	246		901
Golfe du Morbihan	56	115	264	235
Koh Kastell	56	1 600		3 715
Archipel d'Houat	56	566	371	523

Quelques « colonies » urbaines ont été recensées :

Colonies	Dépt	1994	1978/88
Rennes	35	1	0
Dinan (*)	22	1	0
Saint-Brieuc (*)	22	1	0
Brest	29	60	3-10

(*) localité nouvelle.

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*.

Nous indiquons les résultats des recensements de quelques-unes des principales colonies, effectués en 1994, tout en rappelant les données de 1987/88 et de 1993 :

Colonies	Dépt	1994	1993	1978/88
Grand Chevet	35	650	650	703-750
Baie de Morlaix	29	1 540	1 390	1 420
Réserve de Goulien	29	369	376	566
Réserve de Groix	56	400	356	554-600
Rohellan	56	500+		560
Méaban	56	655		1 794
Golfe du Morbihan	56	691	851	470
Koh Kastell	56	400		955
Archipel d'Houat	56	1 020	545	1 541-1 565

Quelques « colonies » urbaines ont été recensées :

Colonies	Dépt	1994	1978/88
Rennes	35	17-18	2+
Dinan	22	3-4	0
Saint-Brieuc	22	160-170	28-35
Etables	22	4	0
Brest	29	800-850	101-150 (89)
Pont-l'Abbé	29	4-5	0

Un oiseau de 2ème été présentant les caractéristiques de la sous-espèce nord-américaine *L. a. smithsonianus* est observé le 9 juin à 30 km au SSO de Penmarc'h (29). Il s'agit de la deuxième mention française et de la première pour la Bretagne.

GOELAND LEUCOPHEE *Larus cachinnans*.

Le passage automnal est circonscrit entre le mois de juillet et le 2 octobre, mais il ne concerne que quelques individus en dehors de la Loire-Atlantique, maximum 80 le 28 septembre à Thouaré (44).

Les données hivernales sont épisodiques même si 18 individus sont contactés en Loire-Atlantique lors des recensements d'oiseaux d'eau de la mi-janvier.

Il n'y a aucune observation en période de reproduction.

La dispersion post-nuptiale est spectaculaire dans l'est de la Loire-Atlantique dès le début de l'été: 300+ le 3 juillet et 600 le 6 sur la Loire en amont d'Oudon.

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides*.

1 1er hiver à Porz ar Biliec/Locquirec (29) le 2 janvier, 1 1er hiver à Saint-Guénolé/Penmarc'h (29) du 15 janvier au 19 avril, 1 1er hiver à Erquy (22) le 24 février et 1 1er/2ème hiver à Kergurun/Plovan (29) le 4 avril.

La donnée d'Erquy est la première pour les Côtes-d'Armor.

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*.

1 ind. 1er hiver en baie d'Audierne (29) le 25 septembre, 1 3ème hiver à Port-Navalo/Arzon (56) du 16 au 21 janvier, 1 1er hiver à Saint-Guénolé/Penmarc'h (29) du 17 mars au 9 avril, 1 1er hiver à Saint-Vio/Tréguennec (29) le 27 mars et 1 1er été au Croisic (44) le 12 avril.

GOELAND MARIN *Larus marinus*.

Nous indiquons les résultats des recensements de quelques-unes des principales colonies, effectués en 1994, tout en rappelant les données de 1987/88 et de 1993 :

Colonies	Dépt	1994	1993	1978/88
Sept-Iles (sauf Bono)	22	75		53-58
Baie de Morlaix	29	110	115	109
Réserve de Goulien	29	21	19	15
Méaban	56	10+		12
Archipel d'Houat	56	55+	50	33
Dumet	44	14		7

2 couples nichent sur les toits de Brest (29).

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla*.

Nous indiquons les résultats des recensements (en nombre de nids construits) de quelques-unes des principales colonies :

Colonies	Dépt	1994
Fréhel	22	25-50+
Sept-Iles	22	34
Ouessant	29	+
Keller	29	non recensé
Roches de Camaret	29	130
Réserve de Goulien	29	824
Pointe du Raz	29	125
Groix	56	20-30
Belle-Ile	56	165-190
Total	56	1 323-1 383+

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*.

1 ind. le 31 mai à 2,5 km au sud de l'île de la Pierre Percée/La Baule (44).

STERNE CASPIENNE *Sterna caspia*.

Un regroupement d'observations est notable en août : 2 le 16 à Ouessant (29), 1 le 20 à Sissable/Guérande (44) et 1 le 29 à Châtillon-en-Vendelais (35).

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis*.

1 adulte à Pen Bron/La Turballe (44) le 20 mars. Il s'agit de la première donnée bretonne certaine, l'observation réalisée le 12 septembre 1981 au Collet/Moutiers-en-Retz (44) étant maintenant considérée comme douteuse, la confusion avec une Sterne élégante *Sterna elegans* étant possible (FRÉMONT in G.O.L.A., 1992).

STERNE A BEC ORANGE *Sterna maxima/bengalensis/elegans*.

Un individu, observé en baie de Morlaix (29) en juin, fréquente la colonie de sternes de l'île aux Dames les 30 juin et 3 juillet. Il s'agit très probablement de la Sterne élégante *Sterna elegans* qui fréquentera ultérieurement l'île aux Moutons/Fouesnant (29).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*.

Reproduction : 50-60 couples sur La Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22), 800 sur l'île aux Dames/Carantec (29), 22 sur Kéménez et 6+ sur Béniguet/Archipel de Molène (29), 265-280 sur l'île aux Moutons/Fouesnant (29).

Total Bretagne : 1 143-1 168+ couples.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*.

Comme l'an passé, la Sterne de Dougall fréquente la baie de Morlaix (29) et le golfe du Morbihan (56) après la période de reproduction. Sur le premier site, les oiseaux disparaissent dès le 7 août alors qu'à Berder/Larmor-Baden l'espèce apparaît le 2 août. Peut-être y-a-t-il eu un transfert ? A Berder, les effectifs progressent ensuite pour culminer à 56-60 individus le 9 septembre. Les 7 dernières sont encore sur ce site le 18 septembre.

Des oiseaux en migration sont notés par ailleurs : 2 le 14 août au Diben/Plougasnou (29), 1 le 7 septembre à Penvins/Sarzeau (56) et 3 le 19 à Plouha (22).

Reproduction : 1 couple sur un rocher du Kerpont/Bréhat (22), 70-90 couples sur l'île aux Dames/Carantec et 6 oiseaux dont 1 couple paradant fréquentent l'île aux Moutons/Fouesnant (29), apparemment sans suite.

Total Bretagne : 71-91 couples.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*.

Le passage post-nuptial est soutenu en août puis décline en septembre avec toutefois un maximum de 450 le 21 à Saint-Jacut-de-la-Mer (22). Trois données sont encore obtenues en octobre : 2 le 2 à Châtillon-en-Vendelais (35), 2 le 6 à Houat (56) puis 1 le 16 au Ri/Kerlaz (29).

Les premières sont notées en Bretagne-sud le 8 avril.

Colonies	Dépt	1994
Ile au Moine	35	180+
La Colombière	22	59-61
Bréhat-Paimpol	22	50-65
St-Gildas-Penvénan	22	8-10
Sept-Iles	22	0
Baie de Morlaix	29	160
Archipel de Molène	29	75-100
Brest	29	+
Pont-Croix	29	2
Trunvel	29	15
Les Moutons	29	85-100
Rivière d'Etel	29	107
Golfe du Morbihan	56	7+
Mesquer/Assérac	44	30
Marais de Guérande	44	154+
Loire	44	12-20
Total		944-1 011+

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisea*.

Le passage automnal, débuté le 1er août, est marqué par un afflux inhabituel, 25 données, essentiellement au mois de septembre. Il semble bien que le coup de vent des 13 et 14 septembre a favorisé ce phénomène. On remarque que les données sont relatives à des isolés ou à des petits groupes, que les oiseaux sont souvent des juvéniles et que les sites intérieurs ont fait l'objet de nombreuses mentions. Les dernières disparaissent au début d'octobre : 1 ind. le 1er au Moulin Neuf/Plounérin (22) et 1 autre le 3 à Arzal (56).

Deux données à la remontée : 1 le 4 avril dans le marais de la Folie/Antrain (35) et 1 sans précision de date au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44).

Un couple tente à nouveau de se reproduire, sans succès, sur l'île de Béniguet/Archipel de Molène (29).

STERNE NAINE *Sterna albifrons*.

Le passage automnal se déroule du 2 août au 4 octobre avec une affluence de 37 ind. le 23 août en baie de Vilaine (56). Les données sont plus particulièrement nombreuses pendant la période de tempêtes de la mi-septembre.

Les premiers retours sont signalés le 5 avril dans les Traicts du Croisic (44). 40 sternes sont présentes le 30 avril au sillon du Talbert (22) mais il n'y a pas de suite.

Reproduction en nombre de couples : 20-23 sur Béniguet/Archipel de Molène (29), 13+ au Bois Vert et 1 au Pavillon/Varades (44).

Total : 34-37+ couples.

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*.

2 ind. à Sissable/Guérande (44) le 21 août, 5 à Grandlieu (44) le 16 septembre et 1 juvénile sur les étangs du Guic/Guerlesquin (29) et du Moulin Neuf/Plounérin (22) du 5 au 12 octobre. Cette dernière observation, très tardive, est faite dans un contexte très particulier puisque les deux plans d'eau vont accueillir simultanément les trois espèces de Guifettes. Le régime perturbé de secteur sud avec des températures très douces voire chaudes a peut-être « déplacé » des oiseaux vers le nord. Ceux-ci seront assez souvent vus « moucheronner » à 15 ou 20 mètres de hauteur avec les Mouettes rieuses *Larus ridibundus* et les Etourneaux sansonnet *Sturnus vulgaris*.

Premières le 12 mai en Brière (44) ; 1 le 30 mai dans les gravières du sud de Rennes (35).

Reproduction :

3 couples en Brière (44) et 60 couples à Grandlieu (44).

Total Bretagne : 63 couples.

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*.

Le passage automnal s'étend du 20 juillet au 24 octobre et culmine en septembre, maximum 32 le 18 au Migron/Frossay (44).

La première est de retour le 4 avril à Grandlieu (44) et dès le 23 plus de 100 sont présentes en Brière (44).

Reproduction : 141+ couples en Brière (44) et 20 couples à Grandlieu.

Total Bretagne : 161+ couples, soit 70% de la population française.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*.

2 oiseaux, 1 subadulte et 1 adulte, sont observés sur les étangs du Guic/Guerlesquin (29) et du Moulin Neuf/Plounérin (22) du 9 au 12 octobre en compagnie d'individus des deux autres espèces de Guifettes (voir le commentaire concernant la Guifette moustac *Chlidonias hybridus*).

1 ind. très tardif, aurait été vue le 24 novembre au lac de Grandlieu (44).

GUILLEMOT DE TROIL *Uria aalge*.

Seules deux des cinq colonies connues ont été totalement recensées en 1994.

Colonies	Dépt	1994
Cézembre	35	?
Cap Fréhel	22	100+
Sept-Iles	22	15
Roches de Camaret	29	3+
Goulien	29	37
Total		155+

PETIT PINGOUIN *Alca torda*.

Pour cette espèce aussi, les recensements sont très incomplets.

Colonies	Dépt	1994
Cézembre	35	?
Cap Fréhel	22	non recensé
Sept-Iles	22	12-13
Total		12-13+

MERGULE NAIN *Alle alle*.

Deux observations automnales proviennent d'Ouessant (29) : 1 le 13 octobre puis 1 le 19.

Les tempêtes hivernales donnent l'occasion d'assister à un regroupement des observations : 1 le 18 décembre à Plouhinec (56), 1 mort le 20 à Port-Louis (56), 1 le 14 janvier à la Torche/Plomeur (29), 1 le 15 à Ouessant, 1 le 16 à la Groue/Saint-Pol-de-Léon (29), 1 du 16 au 29 à Lesconil/Plobannalec (29), 1 le 18 à Ouessant, 1 le 6 février à Léchiagat/Treffigat (29).

1 ind. le 8 avril à Ouessant.

MACAREUX MOINE *Fratercula artica*.

Colonies	Dépt	1994
Sept-Iles	22	182-191
Baie de Morlaix	29	10-11
Keller	29	4-5
Yourc'h	29	0
Total	56	196-207

L'espèce a disparu du Yourc'h/Ouessant et subit une nette diminution d'effectif aux Sept-Iles à la suite, semble-t-il, d'une pollution par les hydrocarbures en mars et avril.

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*.

A l'automne, le passage se déroule, de façon classique, du 10 octobre au 2 novembre à Ouessant (29) avec un afflux du 15 au 26, maximum 55 le 20. Au même moment, 23 passent vers le sud à Guerlesquin (29) le 9 octobre.

En dehors du Nord-Finistère, l'espèce est signalée en période de nidification à Calanhel, Langueux, Loguivy-Plougras, Pléhédel, Plounérin, Quintin, Saint-Brandan (22), Goulien, Kerlaz (29), Assérac (44), Ploéren, Séné (56).

Deux nichées, comprenant chacune deux jeunes, s'envolent d'un trou de mur de moulin à Beffou/Loguivy-Plougras vers les 15 septembre et 15 juillet.

TOURTERELLE DES BOIS *Streptotelia turtur*.

La dernière est vue le 22 octobre à Ouessant (29).

Les premières sont contactées le 24 avril en baie de Daoulas (29).

COUCOU-GEAI *Clamator glandarius*.

1 individu est noté en baie d'Audierne (29) les 7 et 26 mai.

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*.

Un cadavre est récupéré à la station de soins de la L.P.O. à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22) le 25 octobre.

Le premier est de retour à Saint-Bihy (22) le 27 mars.

EFFRAIE DES CLOCHERS *Tyto alba*.

Cette espèce est le rapace nocturne qui semble bien le plus exposé au risque de collision avec les automobiles, pour preuve ces 28 cadavres dénombrés entre Saint-Nazaire et Varades (44) le 30 octobre !

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops*.

1 le 20 août à Saint-Christophe-des-Bois (35).

CHEVECHE D'ATHENA *Athene noctua*.

Nous donnons à la suite la liste des communes où l'espèce a été contactée.

- **Côtes-d'Armor** : Guingamp, Pléguien, Pléhédel, Pleumeur-Bodou, Pleumeur-Gautier, Pludual, Quemper-Guézennec, Saint-Donan, Trégastel.

- **Finistère** : Clohars-Carnoët, Douarnenez, Irvillac, Plogoff, Plonéour-Lanvern, Plouvorn, Taulé, Trégarvan.

- **Morbihan** : Cruguel, Erdeven, Guégon, Lanouée, Larmor-Plage, Le Saint, Quiberon, Séné, Sérent.

- **Loire-Atlantique** : 150 chanteurs sont localisés dans le cadre d'une enquête spécifique.

20 sites sont découverts dans le Haut-Léon (29) ; 32+ jeunes sont produits sur 17 d'entre eux.

HIBOU MOYEN-DUC *Asio otus*.

En Loire-Atlantique, des deuxièmes nichées sont découvertes à Vieillevigne le 18 juillet et à Montbert en août. A Vieillevigne, c'est le même nid qui est réutilisé.

Trois dortoirs hivernaux importants sont signalés : 20 à Varades (44) et 23 au Grand Auverné (44) en décembre, 25-30 le 2 janvier au Minez Du/Langonnet (56).

La reproduction est constatée à Langonnet, Merlevenez et Belle-Ile (56) au printemps 1994.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*.

3 familles sont découvertes lors de l'été 1993 en Loire-Atlantique à Machecoul, Aigrefeuille-sur-Maine et Vieillevigne.

1 oiseau précoce est présent le 14 septembre à Tascon/Saint-Armel (56) mais le passage se déroule du 16 octobre au 5 novembre.

Deux observations suivent encore : 1 le 22 novembre à Penvins/Sarzeau (56) et 1 le 11 décembre à Tascon.

En hiver : 6 ind. en dortoir le 7 février à Fresnay-en-Retz (44), 1 le 13 à Ouessant (29), 1 le 14 à Loc'h ar Stang/Tréguennec (29), 1 le 5 mars à Locqueltas/Sauzon (56).

Au printemps : 2 couples en Loire-Atlantique dont un dans le marais breton.

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*.

Les localités occupées sont le cap Fréhel, la forêt de Lorge, Plélan, Plourivo (22), Plougouven (29), Dréféac, la forêt du Gâvre (44), Campénéac et La Gacilly (56).

53 chanteurs cantonnés sont recensés dans la forêt du Gâvre en 1993 et en 1994 soit 1 pour 85 hectares.

MARTINET NOIR *Apus apus*.

Le dernier est à Anetz (44) le 1er septembre.

Les arrivées normales s'effectuent à partir de la mi-avril, mais elles ont été largement précédées par quelques précurseurs peu ordinaires : 1 à Saint-Malo-de-Guersac (44) le 1er mars et plusieurs à Lorient (56) le 1er avril.

MARTIN PECHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis*.

Le passage se déroule entre le 2 août et le 3 novembre à Ouessant (29).

Le nombre de données relatives à la reproduction est notablement faible, un seul site est signalé, l'étang de Saint Jean/Locoal-Mendon (56). Au moins dans le nord-ouest de la région, le nombre de couples reproducteurs est extrêmement réduit. Cette espèce mériterait une enquête spécifique.

A Saint-Jean, deux nichées successives sont suivies ; les nourrissages au nid sont notés du 29 mars au 15 avril pour la première, ce qui laisse penser que la ponte a été déposée au début de mars.

GUEPIER DE PERSE *Merops superciliosus*.

1 ind. de 1ère année le 15 octobre à Ouessant (29). Il s'agit de la première donnée bretonne et de la cinquième donnée française.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*.

En baie d'Audierne (29), les derniers sont vus le 20 août et les premiers le 1er mai. Sur ce site, il y a 14-19 couples en 1994.

1 ind. le 26 mai à Goulien (29) et 1 le 4 juin à l'île Motte/Cordemais (44).

HUPPE FASCIEE *Upupa epops*.

L'essentiel des oiseaux a disparu pour la fin août mais quelques retardataires sont encore vus ici ou là et deux individus sont tout particulièrement tardifs : 1 à Ouessant (29) les 2 et 3 novembre et 1 à Joué-sur-Erdre (44) le 4 décembre.

La première mention printanière, très hâtive, est du 27 février à Riaillé (44), mais l'essentiel des effectifs arrive fin mars et en avril.

Quelques mentions proviennent de sites intérieurs : 1 le 14 avril à Glomel (22), 2 le 5 mai à Moustoir-Ac (56), 1 le 12 mai à La Trinité-Langonnet (56) et surtout 1 couple accompagné de ses 3 jeunes le 26 juin dans les landes rennaises/Campénéac (56).

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*.

Le passage automnal se déroule du 16 août au 15 octobre avec un afflux traditionnel en septembre.

1 le 11 mai à Machecoul (44), 1 chanteur cantonné le 18 juin à Coëtquidan/Forêt de Paimpont (35), 1 le 29 juin « près de Brest » (29) et 1 le 12 juillet à Landrellec/Pleumeur-Bodou (22).

PIC CENDRE *Picus canus*.

En dehors des données classiques de la forêt de Rennes (35), deux observations très étonnantes sont faites aux deux extrémités de l'aire de reproduction : 1 femelle posée dans une prairie de fauche à Clisson (44) le 23 juillet et 1 chanteur à Bel Orient/L'Hermitage-Lorge (22) au printemps 1994.

La donnée ligérienne, totalement excentrée, a motivé des réserves de la part de la rédaction de la revue de la L.P.O. 44. La donnée costarmoricaine est, quant à elle, totalement incontestable et ranime l'espoir de trouver une population relictuelle dans le centre des Côtes-d'Armor.

PIC NOIR *Dryocopus martius*.

5 couples en forêt de Rennes (35).

De nouvelles localités sont découvertes : la Motte/Pleslin-Trigavou, la forêt de Coëtquen, le Chêne Ferron/Léhon, le bois du Four/Plédéliac, la forêt de Lorge (22), la forêt du Cellier (44) et le bois de Lochrist/Ploërdut (56).

Le site de Ploërdut, où une alarme est entendue le 19 juin, remplace le point d'avancée le plus occidental qui était constitué par les Forges/Sainte-Brigitte (56). A quand la première donnée finistérienne ?

PIC EPEICHE *Dendrocopos major*.

Trois oiseaux passent à Ouessant (29) entre le 2 septembre et le 15 octobre.

PIC MAR *Dendrocopos medius*.

L'espèce est notée en dehors de l'aire d'abondance : forêt de Coëtquen, bois du Four/Plédéliac, forêt de Lorge (22), forêt du Cranou, forêt de Carnoët (29).

Au Cranou, 8 sites sont occupés le 23 mai, ce qui ne signifie pas forcément qu'il y a 8 couples !

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla*.

1 du 28 avril au 2 mai à Ouessant (29) et 1 le 1er mai à la Torche/Plomeur (29).

1 chanteur le 13 mai à Kerhillio/Erdeven (56).

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*.

L'espèce n'est notée que sur la côte sud entre Lorient (56) et la Plaine-sur-Mer (44).

Trois sites sont contrôlés dans le Morbihan : le port de commerce de Lorient, maximum 6 dont 2 chanteurs le 19 février, la rivière d'Etel/Etel, 1 couple le 13 mai et Kerhillio/Erdeven, 1 adulte plus 2 jeunes le 18 août.

Le Cochevis est bien représenté à Saint-Nazaire, Préfailles et La Plaine-sur-Mer (44).

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*.

Le passage automnal, très marqué, se déroule du 11 septembre à la fin octobre avec une intensité accrue lors de la deuxième quinzaine d'octobre : ... 21 à Ouessant (29) le 18 puis 16 le 19 ... Il est tout à fait intéressant de remarquer qu'un de ces migrants ouessantins chante le 19.

En hiver, on peut noter 1 à Goulien (29) les 25 novembre et 1er mars et 8 à Kernon/Loguivy-Plougras (22) le 3 janvier.

Dans les Côtes-d'Armor la Lulu se reproduit à Kernon où 1 transport de nourriture est noté le 6 mai. Sinon 1 chanteur est contacté au bois d'Yvignac le 2 juin.

Dans le Finistère, 5 cantons de chants et/ou couples sont recensés dans le massif forestier d'Huelgoat.

En Loire-Atlantique, les mentions sont nombreuses mais mal circonstanciées. Dans ce département, le schéma de répartition de l'espèce est peu clair.

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*.

Les mouvements migratoires sont bien ressentis à Ouessant (29) comme dans les Côtes-d'Armor entre le 10 octobre et le début novembre.

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*.

1 les 18 et 19 octobre à l'île de Sein (29), 1 le 13 novembre, 2 le 31 décembre et 2 du 13 février jusqu'à la fin de ce mois en baie du Mont-Saint-Michel (35-50), 1 le 19 décembre à la Clarté/Herbignac (44).

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*.

Dernière à Ouessant (29) le 16 octobre.

Les arrivées sont particulièrement précoces puisque l'espèce apparaît en Loire-Atlantique dès le 25 février, dans le Finistère le 27, dans le Morbihan le 4 mars et dans les Côtes-d'Armor le 6. Néanmoins, il faut attendre la période, plus classique, de la deuxième quinzaine de mars pour que les effectifs augmentent.

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*.

La dernière est observée le 14 novembre à Goulven (29).

L'espèce a-t-elle hiverné en baie du Mont-Saint-Michel (35) ? 2 sont présentes le 27 décembre et 1 le 27 février.

La première est à Ouessant (29) le 18 février.

HIRONDELLE ROUSSELIN *Hirundo daurica*.

1 à Lampaul/Ouessant (29) les 11 et 13 octobre et 2 vers le sud à Yusin/Ouessant le 12.

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbica*.

La dernière à Ouessant (29) le 30 octobre.

Pour cette espèce également, les retours sont particulièrement hâtifs : 30 le 27 février au Petit-Mars (44), 120+ le 4 mars à Pontchâteau (44), 2 le 10 à Hillion (22), 20 le 11 à Saint-Jean/Lochal-Mendon (56) ...

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardii*.

5 oiseaux passent dans le Finistère à l'automne : 1 le 22 septembre à Ouessant, 1 le 24 à Sein, 1 du 29 septembre au 3 octobre à Ouessant, 1 le 18 octobre à Tronoën/Saint-Jean-Trolimon et 1 le 19 à Ouessant.

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris*.

Le passage est nettement plus réduit que l'an passé, seule une dizaine d'oiseaux est repérée, entre le 17 août et le 30 octobre, sur quatre sites, Ouessant, la baie d'Audierne (29), les dunes d'Erdeven et Falguérec/Séné (56).

Une donnée bien hâtive est obtenue le 12 juillet à Landrellec/Pleumeur-Bodou (22).

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*.

Le passage automnal se déroule du 17 août au 12 octobre à Ouessant (29).

Le premier est de retour le 3 avril à Berrien (29).

Dans le Finistère, deux décomptes non exhaustifs sont effectués au printemps dans les deux grands massifs forestiers centraux : 14 sites de chants sont trouvés en forêt du Cranou et 25 en forêt d'Huelgoat. L'espèce a remarquablement profité des dégagements consécutifs à l'ouragan de 1987.

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*.

A Ouessant (29), le passage automnal se déroule de la dernière semaine de septembre au 20 octobre avec une intensité plus marquée de la fin septembre au 15 octobre.

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*.

Un passage est ressenti à Ouessant (29) entre la mi-septembre et la mi-novembre.

Deux mentions concernent des individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *Anthus petrosus littoralis* : 1 le 21 septembre à Ouessant et 1 le 17 avril à Roscoff (29).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*.

Après une observation très curieuse du 16 août à Hoëdic (56), les oiseaux arrivent de façon groupée dans toute la région : le 10 octobre dans le Finistère, le 12 dans les Côtes-d'Armor, le 23 en Loire-Atlantique. A Ouessant, le petit passage est terminé pour 16 novembre.

30 le 20 novembre à Saint-Suliac (35), 25 le 15 février au Faouët (22) et 22 le 16 mars au Petit-Mars (44).

Les départs semblent également synchrones, les derniers étant notés le 7 mars dans le Finistère, le 23 dans les Côtes-d'Armor, le 24 dans le Morbihan et le 30 en Loire-Atlantique.

BERGERONNETTE PRINTANIERE/FLAVEOLE *Motacilla flava/flavissima*.

Nous retenons ici les données générales sans précision d'espèce (ou de sous-espèce ?).

A Ouessant (29), le passage se déroule entre le 24 août et le 17 octobre avec une affluence entre le 6 et le 23 septembre.

La dernière est à Couéron (44) le 31 octobre.

La première est vue à Hoëdic (56) le 31 mars, mais il faut attendre la deuxième décade d'avril pour que les oiseaux apparaissent un peu partout.

1 mâle hybride *M.f.flava*flavissima* est repéré à Loc'h ar Stang/Tréguennec (29) le 1er mai.

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*.

1 ind. *M. f. thunbergi* le 12 septembre au Croisic (44), 1 mâle présentant les caractéristiques de la sous-espèce *M. f. iberiae* se reproduit avec succès en Brière (44).

BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flavissima*.

Quelques individus sont observés en période de reproduction dans l'aire de la Bergeronnette printanière type *Motacilla flava* à Suscinio/Sarzeau (56) et à Guérande (44).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 14 septembre au 30 octobre.

BERGERONNETTE GRISE TYPE *Motacilla alba alba*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 23 août au 16 novembre à l'automne et du 1er mars au 18 mai au printemps.

M. a. alba est signalée en hiver en Loire-Atlantique.

BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrellii*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 21 septembre au 11 novembre à l'automne et du 4 mars au 20 avril au printemps.

Quelques dortoirs hivernaux ont été recensés : 700+ à Beaulieu/Rennes (35), 700-800 à Guingamp (22), 600 à Morlaix (29).

La dernière mention date du 24 mars en Loire-Atlantique et du 13 avril dans les Côtes-d'Armor.

1 femelle présentant les caractéristiques de cette race est notée le 25 mai à La Turballe (44).

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris*.

1 le 13 novembre à Ouessant (29).

ROUGEGORGE FAMILIER *Erithacus rubecula*.

Le passage automnal débute le 26 août à Ouessant (29) avant de culminer entre les 14 et 25 septembre, maximum le 15 avec des milliers d'individus. Les derniers hivernants quittent l'île le 17 mars.

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*.

Trois données en fin d'été, 1 le 22 août à Laoual/Plogoff (29), 1 les 24 août et 3 septembre à Ouessant (29).

Le premier est de retour le 3 avril à Sainte-Luce-sur-Loire (44).

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica*.

La dernière est à Saint-Nazaire (44) le 21 novembre sur le site d'hivernage découvert il y a deux ans.

La première est de retour à Plouhinec (56) le 17 mars alors qu'un couple est présent dans le marais de Sainte-Anne-sur-Vilaine (35) dès le 20.

Au printemps, l'espèce n'est toujours pas signalée à l'ouest de Pen Mané/Locmiquélic (56).

De nouveaux sites sont colonisés autour de Redon (35) et la population d'Ille-et-Vilaine est estimée à 15-20 couples.

ROBIN A FLANC ROUX *Tarsiger cyanurus*.

1 femelle ou juvénile à Ouessant (29) le 27 octobre. Il s'agit de la première donnée française.

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*.

Deux données font état de la présence d'individus à la fin août en dehors de l'aire d'abondance, à l'Île-Grande/Pleumeur-Bodou (22) et à la pointe du Van/Clédén-Cap-Sizun (29). Il s'agit probablement de nicheurs locaux.

A Ouessant (29), le passage automnal se déroule du 10 octobre au 9 décembre et le passage printanier du 9 mars au 1er mai avant une donnée décalée du 25 mai.

A l'intérieur, on note 3 chanteurs à Rennes (35) le 4 décembre, 1 au Faouët (56) le 14 décembre et 1 à Senven-Léhart (22) le 13 mars.

Des chanteurs sont repérés en période de reproduction à Morlaix (29) le 7 avril et dans la carrière de Kerguillo/Guilers (29) le 18. Dans le premier cas au moins, il s'agit d'un migrateur.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*.

Le passage se déroule entre le 17 août et le 26 octobre à Ouessant (29). Dans le reste de la région, les données s'échelonnent du 18 août au 5 novembre.

Au printemps, les migrateurs sont contactés à partir du 16 avril dans le Morbihan et en Loire-Atlantique, du 17 dans les Côtes-d'Armor et du 19 dans le Finistère.

Deux chanteurs sont contactés et un nid avec 4 œufs est découverts en forêt de Coëtquen (22) alors qu'un chanteur est présent le 21 mai aux Forges/Sainte-Brigitte (56).

TARIER D'EUROPE *Saxicola rubetra*.

2 familles dans le Yeun Ellez (29) le 1er août.

Le passage se déroule du 16 août au 23 octobre avec une affluence du 23 août au 23 septembre à Ouessant (29).

Le premier est noté le 13 avril au Croisic (44).

En 1994, l'espèce se reproduit à Préfaïlles, en dehors de l'aire de nidification connue en Loire-Atlantique.

TARIER PATRE *Saxicola torquata*.

A Ouessant (29), des départs ont lieu en septembre puis un passage est ressenti en octobre avant que de nouveaux départs ne laissent en place que quelques hivernants ; les retours s'effectuent à partir du 2 mars mais principalement lors de la dernière décade de ce mois. Le nombre de couples nicheurs diminue : 32 couples contre 45-46 l'année précédente.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 16 août au 31 octobre ; 6 individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *O.o. leucorrhoa* sont observés entre le 9 septembre et le 14 octobre.

Après une donnée du 19 novembre déjà tardive à Hirel (35), un mâle adulte est découvert à Pénestin (56) le ... 1er janvier.

Les premiers retours sont enregistrés le 3 mars.

Le passage pré-nuptial est noté à Ouessant du 14 mars au 20 mai ; 6 individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *O.o. leucorrhoa* sont observés entre le 29 avril et le 20 mai.

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*.

Le passage automnal est circonscrit entre le 16 septembre et le 30 octobre avec une intensité marquée du 12 au 22, maximum 24 le 15 octobre à Ouessant (29).

Le tout petit passage printanier n'est relevé qu'à Ouessant entre le 19 avril et le 1er mai.

MERLE NOIR *Turdus merula*.

A Ouessant (29), le passage débute le 30 septembre et culmine les 19 et 26 octobre.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*.

A Ouessant (29), un ind. est présent les 30 et 31 août et précède le passage qui se déroule du 8 octobre au 1er décembre avec une intensité plus marquée du 10 au 28 octobre.

Dans les Côtes-d'Armor, les mouvements sont plus tardifs : 500 le 16 novembre à Saint-Quay-Portieux, 700 le 19 à Hillion, 300 le 28 à Plaintel.

L'hivernage a été beaucoup plus marqué cette année dans le Finistère et les Côtes-d'Armor.

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 24 septembre au 17 novembre.

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 6 octobre à la mi-novembre.

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 15 octobre au 11 novembre.

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*.

Quelques oiseaux passent à Ouessant (29) du 23 septembre au 31 octobre.

Le statut de l'espèce à l'intérieur des terres serait à préciser. Dans le quart nord-ouest de la région la Bouscarle est très localisée alors qu'elle est commune en Loire-Atlantique.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*.

Les données sont nettement plus nombreuses cette année.

Nous donnons la liste des localités nouvelles pour la période par rapport à celles des deux années passées : Camaret, Fouesnant, Goulven, Huelgoat, Kerlaz, Morlaix, Plougasnou, Plougoulm, Plounéour-Trez, Pont-l'Abbé, Santec, Saint-Pol-de-Léon (29), Petit-Mars (44), Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Jean-Brévelay, Surzur (56).

1 famille est à la pointe du Van/Cléden-Cap-Sizun (29) le 18 septembre et 2 autres au Moulin Neuf/Plounérin (22) le 22.

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*.

La dernière est à Ouessant (29) le 12 octobre.

La première est au Petit-Mars (44) le 13 avril.

Le passage est sensible de la mi-avril à la mi-mai.

Quelques données sont obtenues sur des sites intéressants : 1 tout au long du printemps à l'étang du Guic/Guerlesquin (29), 1 chanteur le 7 juin au cap Fréhel (22), 2 chanteurs le 25 juin à Trunvel/Tréogat (29). Par ailleurs, l'espèce est contactée en période de reproduction sur trois communes de Loire-Atlantique : La Turballe, Petit-Mars et Préfailles.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE *Locustella luscinioides*.

1 chanteur à Ouessant (29) les 5 et 6 août.

La première est le 23 mars à Trunvel/Tréogat (29).

1 à Pen Mané/Locmiquélic (56) le 15 mai.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*.

83 captures en fin d'été à Trunvel/Tréogat (29) dont 18 le 14 août et 10 le lendemain. Sinon trois observations d'isolés en septembre : le 2 à Ouessant (29), le 7 à Bécherel (35) et le 17 à Loc'h ar Stang/Tréguennec (29).

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus*.

4 818 sont capturés lors du passage post-nuptial à Trunvel/Tréogat (29), chiffre record. A Ouessant (29), le passage se déroule entre le 30 août et le 15 octobre.

Le premier est noté à Trunvel le 22 mars alors qu'un passage est remarqué dans le Finistère entre le 26 avril et le 9 mai.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*.

Deux à l'automne à Ouessant (29), les 30 septembre et 16 octobre.

Au printemps 1994, trois couples se reproduisent sur le polder du Légué/Saint-Brieuc (22) alors qu'un autre est découvert près du canal d'Ille-et-Rance/Saint-Grégoire (35) près de Rennes.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 25 août au 30 octobre.

Les retours s'effectuent à partir du 16 avril.

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus*.

La première est à Saint-Etienne-de-Montluc (44) le 24 avril.

Quelques contacts ont été établis en dehors de l'aire principale de l'estuaire de la Loire (44) : 3 chanteurs le 14 mai à Fresnay-en-Retz (44), 1 chanteur le 16 à Trunvel/Tréogat (29) et 1 chanteur en juin au Chenal Neuf en Brière (44).

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*.

Trois oiseaux passent en fin d'été : 1 le 19 août à Hoëdic (56), 1 du 7 au 14 septembre puis 1 le 23 à Ouessant (29).

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*.

Sur les îles d'Hoëdic (56) et d'Ouessant (29), le passage automnal s'inscrit entre le 2 août et le 11 octobre.

Au printemps, les nouvelles « du front » se limitent à deux informations en provenance de Quimper (29) : 1 chanteur le 23 mai et une famille avec nourrissage à Créac'h Gwen le 13 juillet.

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata*.

A Ouessant (29), un passage est décelé entre le 12 octobre et le 11 novembre.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*.

1 famille le 8 août à l'île Besnard/Saint-Coulomb (35).

1 le 13 octobre à Ouessant (29).

1 chanteur le 9 mai en dehors de l'aire de répartition connue, à Clédén-Cap-Sizun (29).

1 le 12 mai dans la vallée du Gouessant/Morieux (22), 1 chanteur le 21 à Port Logo/Plouha (22), 1 chanteur du 29 mai au 6 juillet au moins à Toul Bili/Trédrez (22) et 1 alarme le 12 juin à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*.

A Ouessant (29) le passage est noté du 19 août au 20 octobre.

La première est de retour à Petit-Mars (44) le 22 avril.

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*.

A Ouessant (29), le passage d'automne se déroule entre le 20 août et le 20 octobre.

La première, tardive, est de retour le 24 avril à Landgazel/Trémaouézan (29).

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 14 septembre au 22 novembre.

L'hivernage est considéré comme supérieur à la normale dans les Côtes-d'Armor et le Finistère.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus*.

1 est capturé à Baden (56) le 2 novembre. Il s'agit de la deuxième donnée morbihannaise.

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*.

L'espèce n'est contactée qu'à Ouessant (29) : 27 individus passent à l'automne entre le 14 septembre et le 2 novembre avec un pic marqué du 8 au 20 octobre ; une donnée exceptionnelle au printemps avec 1 à Arland le 24 mars.

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*.

L'espèce n'est contactée qu'en Loire-Atlantique, dans la forêt du Gâvre : 1 le 4 mai et 2 chanteurs le 9 mai. Il est étonnant de constater qu'il s'agit des premières données pour ce département depuis 1988. *Un petit effort de prospection serait le bienvenu !*

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*.

Le premier est signalé le 24 avril en forêt du Cranou (29).

1 chanteur est repéré le 24 mai à Saint-Brandan (22), apparemment sans suite.

Deux preuves de reproduction dans le Finistère où l'espèce reste très localisée : 1 famille et 1 transport de nourriture le 12 juin à Huelgoat (29).

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*.

Le passage se déroule du 15 septembre au 1er décembre à Ouessant (29).

Des oiseaux présentant les caractéristiques des sous-espèces scandinaves et orientales sont notés du 12 octobre au 17 novembre à Ouessant et les 16 octobre, 11 et 12 novembre à Hoëdic (56).

Le passage de printemps prend place entre le 23 février et le 15 mai à Ouessant.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*.

Le passage s'étend du 20 juillet au 29 octobre à Ouessant (29).

2 oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce *P. t. acredula* sont contactés le 13 octobre à Ouessant.

Le premier est noté à Petit-Mars (44) le 11 mars alors que le passage printanier se déroule du 18 avril au 2 mai sur Ouessant.

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*.

Un petit passage printanier est noté à Ouessant (29) du 2 mars au 20 avril.

1 chanteur le 15 mai à Orvault (44) dans un département où il est toujours considéré comme rare mais peu recherché.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU *Regulus ignicapillus*.

Les premiers sont notés à la descente le 19 septembre.

1 chanteur est contacté le 21 mai aux Forges/Sainte-Brigitte (56) dans le massif forestier de Guerlédan. Il est remarquable que cet oiseau se trouvait dans la même parcelle qu'un chanteur de Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*.

GOBEMOUCHE GRIS *Musicapa striata*.

Le passage se déroule du 18 août au 29 octobre à Ouessant (29).

Au printemps, le premier est à Laz (29) le 9 avril alors que le passage ouessantien dure du 9 au 30 mai.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva*.

6 ou 7 oiseaux passent à Ouessant (29) entre le 12 et le 30 octobre.

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*.

Le passage post-nuptial est ressenti du 11 août au 28 octobre aussi bien sur les îles qu'en Ile-et-Vilaine ou en Loire-Atlantique.

Le passage pré-nuptial est peu marqué, mais les cinq données s'inscrivent entre le 4 avril et le 1er mai.

Une donnée estivale troublante : 1 mâle le 2 juillet à Mauves-sur-Loire (44).

PANURE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*.

Une certaine dispersion est sensible à l'automne : 3 à Trévignon/Trégunc (29) le 21 octobre, 2 à l'île de Sein (29) le 30, 2 à Laoual/Plogoff (29) le 7 novembre. Plus tard, 2 à 3 sont découverts à Ménéham/Kerlouan (29) les 26 décembre et 1er janvier.

Peut-être s'agit-il d'un prélude à de nouvelles installations ? Affaire à suivre ! En tout état de cause, l'espèce n'est pas contactée sur des sites inédits au printemps.

MESANGE NOIRE *Parus ater*.

Bon passage à Ouessant (29) du 10 au 30 octobre avec un maximum du 10 au 15.

Rectificatif : ce commentaire figure dans la synthèse précédente alors qu'elle concerne l'automne 1993. En fait aucun oiseau n'avait été contacté en 1992 sur l'île.

Les mouvements ressentis à Ouessant l'ont été à travers toute la Bretagne, une petite invasion est, en effet, notée dans les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique à partir du 8 octobre. De ce fait, l'hivernage est plus important.

Le dernier hivernant est noté le 27 mars en Loire-Atlantique.

L'espèce semble bien s'être reproduite à Clisson en Loire-Atlantique, où elle reste très localisée.

Un nid est découvert le 19 mai dans la partie basse d'un talus en forêt d'Huelgoat (29).

MESANGE BLEUE *Parus caeruleus*.

2 oiseaux à Ouessant (29) les 15 septembre et 16 février.

TICHODROME ECHELETTE *Tichodroma muraria*.

1 est observé sur les murs du Château des Ducs à Nantes (44) entre le 3 février et le 8 avril.

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*.

L'espèce est uniquement contactée au printemps dans les forêts de Rennes et de Villecartier (35).

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus*.

L'espèce n'est contactée qu'à Ouessant (29) à l'automne : 2 le 11 octobre, 5 le 15, 1 le 16.

L'hivernage est constaté à Trunvel/Tréogat (29) du 5 décembre au 26 mars et semble concerner au moins 3 individus.

1 Vertou (44) le 10 avril.

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*.

Le dernier à Fay-de-Bretagne (44) le 5 septembre.

Le premier est de retour à La Chapelle-des-Marais (44) le 20 avril.

7 individus passent à Ouessant (29) entre le 1er et le 30 mai. C'est à ce moment-là, le 9, qu'un chanteur est contacté à l'étang de Beaulieu/Languédias (22). S'agit-il d'un nicheur local ?

La reproduction n'est notée qu'au Bignon (44).

PIE-GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*.

1 famille le 17 juillet à Blain (44).

1 ind. le 16 août à Hoëdic (56) précède le passage d'au moins 6 individus à Ouessant (29) entre le 30 août et le 17 octobre.

La première est à Frossay (44) le 6 mai alors que 4 migrateurs sont contactés à Hoëdic et Ouessant les 29 et 31 mai.

Au printemps : 3+ couples dans le marais de Dol (35), 2 mâles dans les landes de Coëtquidan (35-56) dont 1 a un comportement de reproducteur.

Un recensement a été mené par la LPO 44 (JOLIVET et VERNEAU, 1995). Cet important et intéressant travail permet de préciser les effectifs et la localisation de l'espèce.

141 stations (59 couples et 82 mâles isolés) sont découvertes lors de cette enquête et se répartissent comme suit :

Secteurs	Nombres de stations
Loire amont	1
Estuaire nord de la Loire	79
Ile de la Maréchale	31
Estuaire sud de la Loire	12
Bocage au nord-est de Nantes	1
Marais de Mazerolles	5
Périphérie de la forêt du Gâvre	3
Périphérie de La Brière	9
Total	141

A partir d'une zone échantillon située dans le nord de l'estuaire de la Loire, C. JOLIVET et A. VERNEAU avancent avec beaucoup de prudence les chiffres de 253 à 576 stations pour ce secteur qui constitue le bastion de l'espèce en Bretagne.

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*.

1 du 8 au 10 novembre au Petit-Mars (44), 1 le 10 janvier en forêt de Paimpont (35), 1 du 11 janvier au 25 février à Frossay (44), 1 le 29 janvier à Botmeur (29), 1 le 10 mars sur un site de la forêt de Paimpont différent du premier.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator*.

1 juvénile les 18 et 19 août à Saint-Nazaire (44), 1 juvénile le 24 septembre à Sein (29), 1 adulte le 1er mai à Trunvel/Tréogat (29).

PIE BAVARDE *Pica pica*.

1 le 24 septembre à l'île de Sein (29).

CRAVE A BEC ROUGE *Pyrhocorax pyrrhocorax*.

2 le 28 novembre au Pérélo/Plœmeur (56), 1 le 28 avril sur Ledenez Balaneg/Archipel de Molène (29).

Les données relatives à la reproduction sont un peu plus complètes cette année : 11 couples à Ouessant (29), 3+ familles au Cap Sizun (29), 6-7 couples à Belle-Ile (56).

Total : 20-21+ couples.

Les plus belles bandes sont de 24 à Ouessant en octobre et mars, 9 à Camaret (29) en mars, 18 à Belle-Ile en juin.

CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*.

Deux oiseaux à Ouessant (29) : 1 le 30 octobre puis 1 du 20 au 27 avril.

La plus grande bande rassemble 500 individus à Saint-Thégonnec (29) le 19 décembre.

CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus*.

Il y a 3 nids dans l'unique colonie costarmoricaine à Kerohou/Maël-Pestivien alors qu'à Heinleix/Saint-Nazaire (44) 500 nids sont dénombrés. *Quel contraste !*

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone corone*.

2 nids sont installés en 1994 dans les falaises d'Ouessant (29).

CORNEILLE MANTELEE *Corvus corone cornix*.

1 à Saint-Domineuc (35) le 25 janvier et 1 dans le fond de la baie de Saint-Brieuc (22) du 20 novembre au 8 mars.

GRAND CORBEAU *Corvus corax*.

11 dans l'est des Monts d'Arrée (29) le 8 août.

11 à 12 couples ont été découverts en 1994 ; la production est de 3,67 jeunes à l'envol par couple sur 6 sites contrôlés.

ETOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris*.

Le passage se déroule entre le 17 octobre et le 17 novembre à Ouessant (29).

ETOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*.

1 adulte à Sauzon/Belle-Ile (56) le 2 septembre.

MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus*.

Quelques indices de passage sont relevés à Ouessant (29) du 24 septembre au 20 octobre.

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*.

1 à Ouessant (29) le 15 octobre.

Deux données costarmoricaines laissent espérer le maintien d'une petite population dans le nord-ouest de ce département : 1 à Pleumeur-Bodou en août et 1 à La Roche-Jagu/Ploézal le 25 octobre.

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs*.

Le passage se déroule du 6 octobre au 1er décembre à Ouessant (29) avec un premier maximum du 13 au 19 octobre puis un second du 25 octobre au 3 novembre. Un afflux se déroule le 15 octobre, journée où des centaines de milliers d'individus passent en rangs serrés à Ouessant alors que 31 500 à 36 000 oiseaux sont dénombrés en 1 h 30 à Goulien (29).

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla*.

Le passage se déroule du 8 octobre au 1er décembre à Ouessant (29) avec un maximum du 15 au 29 octobre.

L'hivernage a été nettement plus important que celui de l'année précédente. A titre d'exemple, alors qu'il n'avait pas été possible d'obtenir un contact l'hiver dernier dans la région morlaisienne (29), trois belles bandes dépassant la centaine d'individus sont localisées avec en particulier 250+ exploitant des faînes à Keranroux/Morlaix le 12 décembre et 200 au Roudour/Guerlesquin le 28 janvier.

Dernier à Hoëdic (56) le 17 avril.

SERIN CINI *Serinus serinus*.

A Ouessant (29), deux passages plus soutenus qu'à l'habitude se déroulent du 10 au 28 octobre et du 25 mars au 14 mai.

VERDIER D'EUROPE *Carduelis chloris*.

A Ouessant (29), le passage automnal prend place entre le 8 octobre et le 3 novembre alors que le premier est de retour le 22 février.

CHARDONNERET ELEGANT *Carduelis carduelis*.

Un passage est sensible à Ouessant (29) les 13 et 15 octobre.

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*.

Le passage se déroule entre le 23 septembre et le 19 novembre avec un maximum du 6 au 30 octobre à Ouessant (29). Un afflux est enregistré le 15 avec des dizaines de milliers d'individus présents.

Les derniers sont au Moulin Neuf/Plounérin (22) le 23 mars.

LINOTTE MELODIEUSE *Carduelis cannabina*.

A Ouessant (29), l'espèce est absente du 29 octobre au 9 mars.

LINOTTE A BEC JAUNE *Carduelis flavirostris*.

4-5 ind. à Ouessant (29) le 7 septembre et 1 en baie du Mont-Saint-Michel (35) le 12 décembre. La première donnée est complètement anachronique, l'espèce apparaissant normalement beaucoup plus tard sur les côtes françaises : à titre d'exemple, la date la plus hâtive en Somme est un ... 16 octobre.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*.

A Ouessant (29), 1 le 15 octobre ; en baie du Mont-Saint-Michel (35) 1 fin novembre.

BEC-CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*.

L'invasion qui s'annonçait à la fin de la période précédente est détectée sur la Bretagne au cours de l'été et de l'automne.

Une premier passage important semble s'effectuer entre le 14 août et le 5 septembre : 25 le 14 août à Plougonver (22) ... 33 le 26 à Goulien (29) ... 30 le 31 à Loguivy-Plougras (22) ... 25 le 5 à Trémeur (22).

Après un creux l'espèce réapparaît en fin septembre, 35 le 21 à Saint-Brandan (22), puis reste d'apparition courante en octobre avant l'arrivée d'une deuxième vague fin-octobre début-novembre : ... 25 le 1er novembre à Rennes (35) ... 40 le 7 à Saint-Hélen (22) ...

Par la suite, les observations vont s'espacer et concerner des groupes moins importants : ... 19 le 20 décembre à Saint-Guyomard (56) ... 12 le 31 à Pommerit-le-Vicomte (22) ... 10 le 13 février à Priziac (56) ...

Deux données sont postérieures à la fin-février et peuvent évoquer une possible reproduction : 1 couple cantonné et 1 mâle en forêt de Rennes le 10 mars, des dizaines dans le bois de Lochrist/Ploërdut (56) le 13 avril.

2 à Goulien le 4 juillet.

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus*.

1 fem./juv. le 27 septembre à Ouessant (29).

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula*.

A Ouessant (29), l'espèce passe du 6 au 29 octobre.

GROSBEC CASSE-NOYAUX *Coccothraustes coccothraustes*.

Un passage automnal est relevé dans la région brestoise (29) et à Ouessant (29) où 9 individus sont contactés du 18 au 27 octobre.

En hiver, l'espèce est observée en Loire-Atlantique, ce qui est normal, et dans la région morlaisienne (29), ce qui est moins banal : le Grosbec est découvert sur 4 sites à Morlaix, Plougouven, Plourin-les-Morlaix et Saint-Martin-des-Champs entre le 10 décembre et le 27 mars dans des parcs où il se nourrit essentiellement des fruits du Charme (*Carpinus betulus*).

En période de reproduction : 1 au bois des Gripots/Saint-Sébastien-sur-Loire (44) le 30 avril, 1 transporte de la nourriture à la Fontaine des Eaux/Dinan (22) le 8 mai et 1 fréquente un parc à Bouaye (44) jusqu'en mai.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*.

Le passage automnal prend une importance assez exceptionnelle cette année, débuté le 14 septembre il va durer jusqu'au 8 novembre et concerner plusieurs centaines d'individus. A Ouessant (29) le pic est atteint à la mi-octobre, 39 le 11, 63 le 12, 75 le 13, 180+ le 15. D'autres sites sont concernés tout le long du littoral, maximum 11 le 13 octobre à Goulien

La conséquence logique de cet afflux est la plus forte présence de l'espèce en hivernage : 1 le 4 décembre à la pointe du Van/Cléden-Cap-Sizun (29), 1 le 11 à la pointe de Tréfeuntec/Plonévez-Porzay (29), 49 le 12 en baie du Mont-Saint-Michel (35-50), 1 le 26 à Ménéham/Kerlouan (29), 1 le 12 janvier à Goulien (29), 1+ le 17 à Kergalan/Plovan (29).

L'oiseau vu le 12 mars à Banneg/Archipel de Molène (29) est sans doute un migrateur.

Il y a encore 35 oiseaux présents à Saint-Méloir-des-Ondes (35) en baie du Mont le 23 mars.

BRUANT DES NEIGES *Plectophenax nivialis*.

Le passage post-nuptial est circonscrit entre le 29 septembre et le 7 novembre et concerne un nombre réduit d'oiseaux, maxima 9 à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22) du 15 au 18 octobre et 5 à l'île Rikard/Carantec (29) le 4 novembre.

Une seule donnée hivernale : 21 en baie du Mont-Saint-Michel (35-50) le 12 décembre.

Au printemps, 1 au Cap Fréhel (22) les 4 et 9 avril.

BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella*.

3 individus passent à Ouessant (29) entre les 19 et 26 octobre.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*.

Toutes les données proviennent de Ouessant (29) : 1 le 14 septembre, 1 le 18, 1 le 23, 1 le 27, 1 mâle le 2 mai.

BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica*.

A Ouessant (29), 1 les 13 et 14 octobre puis 1 autre le 23 octobre.

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 11 octobre au 4 novembre.

BRUANT PROYER *Miliaria calandra*.

A Ouessant (29), 1 ou 2 du 20 au 31 octobre.

Quelques belles bandes sont observées en période inter-nuptiale : 24 le 11 octobre puis 64 le 1er novembre à Beuzec-Cap-Sizun (29), 20 le 5 mars à Lampaul-Ploudalmézeau (29), 50 le 23 à Saint-Méloir-des-Ondes (35).

Deux données intéressantes en période de reproduction : 1 chanteur à Kergroas/Pont-Croix (29) le 9 juillet et 1 à Corn Ar Gazel/Saint-Pabu (29) le 15.

BIBLIOGRAPHIE

BARGAIN, B., FORTIN, M., LE PROVOST, N., BOURDONNAY, D., (1996).-

Note sur la nidification du Guépier d'Europe *Merops apiaster* dans le Pays Bigouden. Ar Vran, 7 : 44-45.

BEUGET, A., CAMBERLEIN, G., LE ROY, R., (1994).-

Sillon de Talbert. Suivi ornithologique 1993. Synthèse des résultats, Le Fou, 33 : 5-9.

CADIOU, B., (1995).-

Observatoire des oiseaux marins nicheurs. CREN-SEPNB. Annales de réserves 1995 : 133-154.

CADIOU, B., (1997).

La reproduction des Goélands en milieu urbain : historique et situation actuelle en France. Alauda, 65 : 209-227.

CAMBERLEIN, G., LE ROY, R., (1994).-

Prospection des landes de Locarn, Saint-Nicodème et Plourac'h. Le Fou, 34 : 10-13.

CAMBERLEIN, G., (1995).-

Visite ornithologique aux landes de la Poterie. Le Fou, 35 : 24.

CHOQUENÉ, G.-L., (1994).-

L'étang de Châtillon-en-Vendelais ; bilan de dix années de suivi. Le Grèbe, 7 : 44-55.

CHOQUENÉ, G.-L., (1996).-

Une nouvelle espèce nicheuse dans le département : la Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*). Le Grèbe, 8 : 8-9.

COMMECY, X., SUEUR, F., (1983).

Avifaune de la baie de Somme et de la plaine maritime picarde. GEPOP : 235 p.

DUBOIS, PH.J. ET LE C.H.N., (1995).-

Les oiseaux rares en France en 1993. Ornithos, 2 : 1-19.

DUBOIS, PH.J. ET LE C.H.N., (1995).-

Les oiseaux rares en France en 1994. Ornithos, 2 : 145-167.

DUBOIS, PH.J. ET LE C.H.N., (1996).-

Les oiseaux rares en France en 1995. Ornithos, 3 : 153-175.

- DUBOIS, PH.J., LE MARÉCHAL P., (1995).-** Justification des nouvelles catégories de la liste des Oiseaux de France (1ère partie : liste officielle). Ornithos, 2 : 82-88.
- DUBOIS, PH.J., ROUGÉ, A., (1993).-** Le coin des branchés. L'oiseau magazine, 33 : 52-53.
- DUBOIS, PH.J., ROUGÉ, A., (1994).-** Le coin des branchés. L'oiseau magazine, 34 : 52-53.
- DUBOIS, PH.J., ROUGÉ, A., (1994).-** Le coin des branchés. L'oiseau magazine, 35 : 56-57.
- DUBOIS, PH.J., ROUGÉ, A., (1994).-** Le coin des branchés. L'oiseau magazine, 36 : 52-53.
- DUBOIS, PH.J., ROUGÉ, A., (1994).-** coin des branchés. L'oiseau magazine, 37 : 64-65.
- FRÉMONT, J.Y., (1995).-** l'Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* : une nouvelle espèce nicheuse pour la France. Ornithos, 2 : 44-45.
- G.O.B. Groupe informel du Finistère nord.** Bulletins.
- G.O.B MORBIHAN, (1993).-** Observations ornithologiques pour la période du 16 mars 1993 au 15 novembre 1993. Ar Vran Morbihan, 7 : 53 p..
- G.O.B MORBIHAN, (1994).-** Observations ornithologiques pour la période du 15 novembre 1993 au 15 mars 1994. Ar Vran Morbihan, 8 : 3-25.
- G.O.L.A., (1992).-** Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIXème siècle à nos jours, 285 p..
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON, (1997).-** Les oiseaux nicheurs de Bretagne, 1980-1985. 292 p.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR, (1994).-** Actualités ornithologiques du 16 juillet 1993 au 15 novembre 1993. Le Fou, 33 : 40-62.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR, (1994).-** Actualités ornithologiques du 16 novembre 1993 au 15 mars 1994. Le Fou, 34 : 30-50.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR, (1995).-** Actualités ornithologiques du 16 mars 1994 au 15 juillet 1994. Le Fou, 35 : 38-57.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE.** Notes d'informations.
- GUERMEUR, Y. (1993).-** Bulletin du Centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 10 : 5-29.
- GUERMEUR, Y. (1994).-** Bulletin du Centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 11 : 1-55.
- GUERMEUR, Y., J.Y. MONNAT, (1980).-** Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne. S.E.P.N.B. - C.O.B., Brest, 240 p.

- HARDY, F., (1995).-** Etude du Râle des genêts (*Crex Crex*) sur la rive nord de l'estuaire de la Loire. *Spatule*, 1 : 15-33.
- JOLIVET, C., (1995).-** Etude du Râle des genêts (*Crex Crex*) en pays d'Ancenis 1994. *Spatule*, 1 : 35-107.
- JOLIVET, C., (1995).** Recensements de quelques limicoles nicheurs du Marais breton en Loire-Atlantique. *Spatule*, 1 : 111-126.
- JOLIVET, C., VERNEAU, A., (1995).-** La Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) en Loire-Atlantique : Enquête départementale 1994. *Spatule*, 1 : 2-14.
- KAYSER, Y., PINEAU, O., HAFNER, H., WALMSLEY, J., 1994.** La nidification de la Grande Aigrette *Egretta alba* en Camargue. *Ornithos*, 1 : 81-82.
- LE MAO, P., (1997).-** La Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*) en Bretagne. Histoire et situation récente. *Ar Vran*, 8 : 55-65.
- LE ROY, R., (1994).-** Bernaches cravant - Saison 93-94. *Le Fou*, 33 : 21.
- LE ROY, R., (1994).-** Oiseaux hivernants au Sillon de Talbert, 19/12/1993. *Le Fou*, 33 : 23.
- LE ROY, R., (1994).-** Sortie à Bréhat le 17/4/94. *Le Fou*, 33 : 28.
- LE ROY, R., PETIT, J., (1994).-** Résultats des dénombrements d'oiseaux d'eau réalisés dans les Côtes-d'Armor à la mi-janvier 1994. *Le Fou*, 34 : 4-9.
- L.P.O. 44, (1995).-** Chronique ornithologique de Loire-Atlantique en 1993. *Spatule*, 1 : 162-200.
- L.P.O. 44, (1996).-** Chronique ornithologique Loire-Atlantique : 1994. *Spatule*, 2 : 17-57.
- MAHÉO, R., (1994).-** Bernache cravant - Stationnements en France - Saison 1993-94. Université de Rennes 1.
- MAHÉO, R., (1994).** Limicoles séjournant en France : janvier 1994. Rapport de convention ; O.N.C.- Université de Rennes 1.
- MAHÉO, R., RIOLS, C. & LE BIRIOE FRANCE, (1995).-** Dénombrements des oies grises et bernaches hivernant en France en janvier 1994. *Ornithos*, 2 : 60-62.
- MAOÛT, J., MAUVIEUX, S., (1994).-** La Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*) : une nouvelle espèce nicheuse pour la Bretagne. *Ar Vran*, 5:46-56.
- MARION, L., (1997).-** Inventaire national des héronnières de France 1994. Muséum National d'Histoire Naturelle, 119 p..
- MARION, L., (1996).-** Le Héron cendré en Loire-Atlantique. *Spatule*, 2 : 13-16.

- MARSOUIN, A., (1994).-
Sternes et grands Cormorans dans l'archipel de Bréhat - Saison 1994. Le Fou, 34 : 15-17.
- MAUVIEUX, S., (1996).-
Espèces accidentelles et rares dans les Côtes-d'Armor, mise à jour n°4. Le Fou, 40 : 7-33.
- MÉROT, J.P., (1995).-
L'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) en forêt du Gâvre. Spatule, 1 : 108-110.
- MONTFORT, D., (1996).-
Guifettes noires briéronnes : effectifs nicheurs, niveaux d'eau et pâturage. Spatule, 2 : 9-12.
- POURREAU, J., (1995).-
Dénombrement des oiseaux des zones humides hivernants en Loire-Atlantique (janvier 1994). Spatule, 1 : 127-161.
- PULCE, P., (1994).-
Sortie Rance du 6/2/94. Le Fou, 33 : 24-26.
- PULCE, P., (1997).-
Espèces occasionnelles complément de la mise à jour n°4. Le Fou, 41 : 4-8.
- RAULT, G., (1995).-
Première mention française du Héron vert *Butorides virescens*. Ornithos, 2 : 90-91.
- REEBER, S., MARION, L. & BORET, P., (1996).-
Premières tentatives de nidification de la Mouette pygmée *Larus minutus* en France. Ornithos, 3 : 41-43.
- ROCAMORA, G., MAILLET, N. ET LE BIRIOE FRANCE, (1995).-
Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France - janvier 1994. Ornithos, 2 : 49-69.
- S.E.P.N.B., (1993).-
Annuaire des réserves 1993. S.E.P.N.B. 128 p.
- S.E.P.N.B., (1994).-
Annuaire des réserves 1994. S.E.P.N.B. 113 p.
- SÉRIOT, J., TROTIGNON, J., ET LES COORDINATEURS ESPÈCE, (1996).-
Oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 1994 et 1995. Ornithos, 3 : 97-117.
- SIORAT, F., (1995).-
Une saison de reproduction sur la réserve naturelle des Sept-Iles : 1994. Le Fou, 35 : 17-18.
- SIORAT, F., BREDIN, D., (1996).-
Evolution des populations d'oiseaux marins nicheurs de l'archipel des Sept-Iles (Côtes-d'Armor, Bretagne). Ornithos, 3 : 49-57.
- YÉSOU, P., (1997).-
Nidification de la Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* en France, 1965-1996. Ornithos, 4 : 54-62.
- YÉSOU, P., NISSER, J., (1994).-
Nouvelles nidifications de la Sterne arctique *Sterna paradisaea* en France. Ornithos, 1 : 82-83.

NOTES INEDITES

B. BARGAIN, D. CARCREFF, A. DESNOS, E. DE KERGARIOU, P. LE MAO, R. MAHÉO, J. MAOÛT, J.Y. PÉRON, P. PULCE, G. RAULT.

Jacques MAOUT
16 rue du Croissant
29 600 Morlaix