

UN HIVERNAGE COMPLET
D'ÉCHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus*
DANS LE MORBIHAN

Par Jacques CORBIERRE et Gwénaél DÉRIAN

0067

INTRODUCTION

Lorsqu'au mois de janvier 1998 nous avons rempli les feuilles de comptages pour le WETLANDS INTERNATIONAL, une rubrique inédite est apparue :

- rade de Lorient, Échasse blanche, 1 individu.

Pour incongru que cela semble, il ne s'agissait ni d'une erreur de transcription ni d'une confusion, pour la première fois nous avons pu observer l'échasse en plein hiver au bord du Blavet.

LES CONNAISSANCES ACQUISES

La région lorientaise a abrité épisodiquement des Échasses blanches en période nuptiale : déjà en 1972 "La présence de 2 échasses le 20 juillet en Petite Mer de Gâvres (56), précédée par l'observation d'1 individu en ce lieu depuis le 13 juillet peut faire penser à une nidification dans un secteur proche". Cependant ni Y. GUERMEUR et J.-Y. MONNAT (1980) ni G. GELINAUD (1997), dans les deux atlas bretons des oiseaux nicheurs, ne donnent l'espèce comme nicheuse sur la ou les carte(s) correspondante(s). Elle est signalée "nicheuse certaine" dans le Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France (1994) : 1 couple produit 2 jeunes à Pen Mané, Locmiquélic en 1989 (G. ERMEL, com. pers.). Puis, pour les années récentes, le fichier morbihannais du Groupe Ornithologique Breton mentionne des couples couveurs à Gâvres et Locmiquélic : 1 à 2 couples à Kersahu / Gâvres en 1996, 3 couveurs au même endroit en 1997, enfin deux couples élèvent chacun avec succès deux jeunes à Pen Mané / Locmiquélic en 1997. Mais jamais encore il n'avait été fait état d'une ou plusieurs Échasses blanches s'attardant après la saison de reproduction : en 1995 le dernier individu est vu le 14 juillet à Kersahu ; en 1996 la dernière observation date du 12 août et concerne un oiseau isolé.

LES FAITS

Pourtant la situation devait évoluer différemment en 1997.

Après que les deux couples aient conduit l'élevage de leurs jeunes, le marais de Pen Mané à Locmiquélic est déserté par les échasses dans les derniers jours de juillet, jeunes et adultes disparaissant ensemble.

Puis, le 22 août, un individu identifié comme juvénile à la teinte brune du manteau se nourrit dans ce qui reste d'eau dans le marais. Mais cette observation, qui pouvait encore passer pour une visite estivale d'un oiseau en migration vers ses quartiers du sud, inaugure une suite ininterrompue d'observations. A partir de cette date en effet, le lieu étant assidûment fréquenté par les ornithologues amateurs de la région lorientaise, chaque semaine l'Échasse blanche est retrouvée et notée à Pen Mané. La reconnaissance visuelle ou des croquis de terrain nous assurent qu'il s'agit bien du même individu de premier hiver dont nous voyons lentement s'estomper le gris de la nuque qui s'étalait sur les côtés du cou. Le dessus plus brun que noir, une marge blanche sur le bord postérieur de l'aile complètent la description.

Ce stationnement dure jusqu'au mois d'avril.

Le 29 mars 1998, l'échasse n'est plus seule, un mâle s'est posé à Pen Mané, pour peu de temps puisque le 4 avril il est parti. Au delà du 7 avril, l'Échasse blanche hivernante devient vagabonde, quitte le marais, revient, elle est reconnue encore le 29 avril avec deux congénères. C'est le dernier contact assuré que nous ayons eu avec cet oiseau.

Les lieux où nous avons donc suivi l'hivernage de l'échasse dérivent d'une ancienne vasière du Blavet maritime fermée en 1976 par une digue et séparée par une digue transversale en deux parties, l'ensemble toujours domaine de l'état.

Côté ouest, un bassin de 11 hectares communique avec la rivière par un clapet anti-retour.

Côté est, un espace de 52 hectares à l'origine, des produits de dragage sablo-vasards et surtout coquilliers en constituent les remblais de base. Restent, maintenant, 45 hectares d'un marais en voie de banalisation, faute d'un clapet qui régule les entrées d'eau.

L'Échasse blanche est la plupart du temps visible dans le marais où elle se nourrit, se blottit dans une levée de terre herbue ou s'aventure entre les phragmites. Elle est peu liée aux autres limicoles qui fréquentent Pen Mané et contrairement à ces Bécasseaux variables, Chevaliers gambettes, Vanneaux huppés, qui suivent l'alternance des marées, elle semble fidèle à l'endroit au cours de la journée.

DISCUSSION

La population nicheuse du littoral atlantique, après les rassemblements distincts des adultes en juillet et des jeunes au début du mois d'août, migre vers le sud-ouest, péninsule ibérique puis Afrique de l'Ouest (DELAPORTE, 1994).

T. DISCA et X. RUFRAY (1995) signalent, mais ceci concerne la population méditerranéenne, des hivernages en effectifs réduits pendant les hivers 1992-93, 1993-94, 1994-95 sur l'étang de l'Or dans l'Hérault.

En Bretagne, des échasses peuvent s'attarder :

- le Croisic (44), le 17/11/1991, 2 individus
- Falguérec / Séné (56), le 04/09/1992, 1 individu
- sillon du Talbert, le 06/09/1992, 1 individu
- Sarzeau (56), entre les 03/09/1993 et 13/09/1993, de 1 à 10 individus, adultes et jeunes
- Le Tour-du-Parc (56), le 14/09/1993, 1 individu
- Sarzeau, le 02/09/1994, 2 individus
- Falguérec / Séné, le 03/10/1995, 2 individus
- Falguérec / Séné, le 02/10/1996, 1 individu

Ces données se rapportent donc aux derniers départs des échasses, il est exceptionnel d'en trouver encore une au mois de novembre.

Nous n'avons pas les moyens d'identifier l'origine de l'oiseau hivernant mais la lacune d'observation entre le départ des familles locales et le début des contacts avec lui nous permet de penser qu'il s'agit d'un jeune qui est arrivé à Pen Mané *après-coup*.

CONCLUSION

Ainsi, à notre connaissance, la présence d'un individu dans la rade de Lorient entre les mois d'août 1997 et avril 1998 constitue le premier cas d'hivernage de l'Échasse blanche dans le Morbihan et, plus largement, sur le littoral français atlantique.

REMERCIEMENTS

La présence de cette Échasse blanche qui a été un sujet d'observation très prisé pendant l'hiver 1997-98 a été établie aussi grâce aux données de : PIERRE CORLOU, GUILLAUME GELINAUD et le groupe des observateurs de LOISIRS COOPÉRATIFS, qu'ils en soient remerciés.

BIBLIOGRAPHIE

- Anonyme (1993) . - Observations ornithologiques pour la période allant du 16 mars au 15 novembre 1993. *Ar Vran Morbihan* 7 : 01-53.
- Anonyme, (1996) . - Observations ornithologiques pour la période du 16 mars au 15 novembre 1995. *Ar Vran Morbihan* 10/11 : 26-54.
- Anonyme, (1996) . - Recensement national des limicoles nicheurs, 1996, contribution morbihannaise du GOB. *Ar Vran Morbihan* 10/11 : 25-28.
- Anonyme, (1997) . - Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 mars au 15 novembre 1996. *Ar Vran Morbihan* 13 : 05-54.
- C.O.B., (1972) . - Actualités ornithologiques du 16 juillet 1972 au 15 novembre 1972. *Ar Vran*, V, fasc.4.
- DELAPORTE, P., DUBOIS, P. J. et ROBREAU, H., (1993) . - La saga des échasses blanches. *L'Oiseau magazine* 31 : 22-27.
- DELAPORTE, P., DUBOIS, P. J., et ROBREAU, H., (1994) . - Échasse blanche *Himantopus himantopus*, in YEATMAN-BERTEHELOT. (D.) & Jarry (G.). *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France, 1985-1989*. S.O.F., Paris : pp.478-481.
- DISCA, T. et RUFRAY, X., (1995) . - Hivernage de l'Échasse blanche *Himantopus himantopus* sur l'étang de l'Or (Hérault). *Alauda* 63 : 333.
- GÉLINAUD, G., (1997) . - Échasse blanche *Himantopus himantopus*, in G.O.B. *Les oiseaux nicheurs de Bretagne, 1980-1985*, : p103.
- GÉLINAUD, G., (1993) . - Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1989 et 15/07/1990. *Ar Vran* 4 : 26-50.
- GUERMEUR, Y. et MONNAT, J.-Y., (1980) . - Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne. S.E.P.N.B - C.O.B., BREST. pp. 130-131.
- MAOUT, J., (1996) . - Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1991 et 15/07/1992 Première partie. *Ar Vran* 7 : 02-43.
- MAOUT, J., (1997) . - Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/7/1992 et 15/07/1993 Première partie. *Ar Vran* 8 : 02-42.

Jacques CORBIÈRE
10 rue Brizeux
F.56100 - LORIENT

Gwénaél DÉRIAN
34 rue docteur Villers
F.56 100 - LORIENT