

**SYNTHESE DES OBSERVATIONS
ORNITHOLOGIQUES BRETONNES
ENTRE LES 16/7/1994 et 15/7/1995.**

Par Patrick LE MAO Jacques MAOUT

0072

Avertissement :

La compilation présentée ci-après, constitue la suite de la synthèse publiée dans le fascicule précédent (Ar Vran Vol. 10 N°1, Juin 1999, P. LE MAO & J. MAOUT. 0069 : 19-66)

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*.

Ce Labbe est observé à dix reprises à Ouessant (29) entre le 21 août et le 4 novembre.

Ailleurs en Bretagne, les observations s'échelonnent du 15 (3 à la pointe de Penvins/Sarzeau –56) au 25 septembre (1-3 toujours à Penvins).

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus*.

L'espèce est observée à vingt-et-une reprises à Ouessant (29) entre le 19 août et le 3 novembre, de façon régulière et sans pic notable.

Ailleurs en Bretagne, les observations s'échelonnent du 3 août au 12 novembre avec un très net pic de passage en septembre : 30 le 15 à la pointe de Penvins/Sarzeau (56) et 50 le 17 dans l'estuaire de la Vilaine (56).

Une rare observation hivernale : 1 le 20 janvier à la pointe du Croisic (44).

LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus*.

1 adulte à l'étang de Trunvel/Tréogat (29) le 23 octobre.

GRAND LABBE *Catharacta skua*.

Le passage d'automne est noté à Ouessant du 22 août au 11 novembre, avec quarante-cinq observations assez régulièrement réparties sur toute la période.

Il y a plusieurs observations hivernales : 2 à Penvins/Sarzeau (56) le 8 décembre, 2 à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22) le 21, 1 à Saint-Samson et 1 à Primel/Plougasnou (29) le 1er janvier, 1 à l'île aux Dames/baie de Morlaix le 8, 1 à Kervoyal/Damgan (56) le 21, 2 à Penvins/Sarzeau (56) le 23, 1 oiseau blessé au Croisic (44) le 6 février, revu à Piriac (44) le 8, 1 à Pern/Ouessant (29) le 20.

1 les 19 et 20 avril à Porz Doun/Ouessant.

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*.

Les premiers oiseaux sont notés à la fin du mois de juillet : 2 le 29 à Plouézec (22) ... Un juvénile est observé le 24 août dans l'intérieur des terres, sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-Erbrée (35).

Quelques sites littoraux sont bien suivis et permettent de suivre l'évolution des effectifs :

- plage du Ri/Kerlaz (29) : 9 le 23 septembre, 31 le 22 octobre, 40 le 22 novembre, 69 le 20, 36 le 2 décembre, 23 (et 58 sur la plage voisine de Trezmalaouen/Kerlaz) le 24, 2 le 2 mars.
- Kéerty/Penmarc'h (29) : 10 le 23 octobre, 28 le 26 décembre, 26 (22 ad.) le 26 janvier, 27 (18 ad.) le 18 février.

Un passage très net est enregistré en Côtes d'Armor en février :

- plage de la Banche/Binic : 2 le 4 décembre, 19 le 17 janvier, 38 le 8 février, 13 le 11 mars, 4 le 29.
- Paimpol : 17 le 19 février, 56 le 9 mars.
- Pléhédel : 27 le 18 février, 88 le 21, 51 le 23, 18 le 14 mars, 9 le 23.

A la même période, le 4 février, un oiseau est observé à l'intérieur des terres, dans les gravières de Bruz (35). Les observations de fin mars et avril ne concernent plus que des oiseaux de 1ère année: 21 le 30 avril à Kervigen/Plomodiern (29)

Nidification et estivage (1995) : sur le lac de Grand-Lieu (44), où l'espèce s'est reproduite en 1994, des individus sont présents tout l'été sans qu'une preuve de reproduction soit obtenue ; dans la colonie de Mouettes rieuses *Larus ridibundus* des marais de Liberge/Donges (44), jusqu'à 4 individus sont présents au printemps et 1 couple parade les 23 et 28 avril, mais la reproduction n'est pas prouvée ; 1 oiseau fréquente une colonie de Mouettes tridactyles *Rissa tridactyla* à Groix (56) les 8 et 28 mai.

Le retour est perceptible dès la fin du mois de juin : 3 le 30 juin et 4 le 6 juillet à Paimpol (22).

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus*.

Le passage d'automne est noté du 10 septembre au 11 novembre, avec un pic de 165 adultes et 23 immatures en 4 heures au Castelli/Piriac (44) le 23 octobre.

L'hivernage est enregistré sur l'ensemble du littoral, mais les effectifs observés restent faibles, sans doute parce que les oiseaux sont surtout présents au large. Notons seulement, après des coups de vent : 30 le 2 décembre à Saint-Malo (35), plusieurs dizaines à Penvins/Sarzeau (56) le 8, 26 à Larmor-Plage (56) le 22 janvier.

Le passage prénuptial est sensible du 19 mars au 8 mai. Notons en particulier : 50 le 1er avril au lac de Grand-Lieu (44) ; 400 le 15 à Bouin (44) ; 40 le 20, 21 le 28 et 25 le 29 à l'étang de Paintourteau/Erbrée (35).

1 oiseau immature attaque un observateur sur l'île aux Dames/baie de Morlaix le 14 mai ; par ailleurs des tentatives de reproduction ont eu lieu en cinq points du lac de Grand-Lieu, dans des colonies de Mouettes rieuses *Larus ridibundus* et de Guifettes moustac *Chlidonias hybridus* (constructions de nids, alarmes, mais pas de ponte ni de poussin observé).

MOUETTE DE SABINE *Larus sabini*.

Comme d'habitude, le passage postnuptial est surtout noté à Ouessant (29) et dans le Mor Braz (56 et 44). A Ouessant, il se déroule du 9 septembre au 5 novembre avec un net pic en octobre (11 des 13 observations). Dans le Mor Braz, les observations s'échelonnent du 6 septembre au 11 novembre avec de forts effectifs notés principalement en septembre : 40 à 50 le 11 au large du Croisic (44), 300 le 15 et plusieurs dizaines le 25 à la pointe de Penvins/Sarzeau (56), 80+ le 17 dans l'estuaire de la Vilaine (56). Notons aussi 1 ind. en baie du Mont-Saint-Michel (35) à la fin octobre.

Une très rare observation hivernale est obtenue : 1 le 30 décembre à la pointe du Croisic après une tempête. Précédemment 1 avait été vue le 16 décembre 1973 à Bourgneuf-en-Retz (44).

Deux observations printanières : 1 dans le raz de Sein (29) le 1er mai, 1 à Porz Doun/Ouessant (29) le 19.

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*.

Quelques décomptes sont effectués sur les dortoirs, il s'agit du seul moyen d'estimer la population hivernale :

- lac de Grand-Lieu (44) : 18 000 à la mi-janvier.
- marais de Mazerolles/Petit-Mars (44) : 9 000 à la mi-janvier.
- étang de Châtillon-en-Vendelais (35) : 27 000 le 23 décembre.
- Rance maritime (35-22) : 15 000 le 11 janvier, 10 000+ le 21 février.

Reproduction (1995) : 39 nids au marais du Codilo/Redon (35), 1 nid à Trunvel/Tréogat (29), 259 oiseaux sont notés en Grande Brière (44) le 1er mai, dont 25 alarment sur le Grand Charreau, 140 nids à Liberge/Donges (44) le 23 avril (après destruction, il n'y a plus que 60 couples le 31 mai), 4 couples à Batz-sur-Mer (44) le 7 mai, 133 nids au lac de Grand-Lieu (44).

Le retour est sensible dès le mois de juin : 50+ juv. à Lespoul/Pont-Croix (29) le 29.

GOELAND RAILLEUR *Larus genei*.

1 les 19 février et 4 mars au Bronzais/Pénestin (56). Cette observation, non communiquée au CHN, mériterait d'être étayée.

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis*.

1 ad. au Bronzais/Pénestin (56) du 26 septembre au 1er octobre au moins, puis du 25 au 26 février ; 1 adulte au port du Légué/Saint-Brieuc (22) du 1er décembre au 15 mars ; 1 adulte à Quélisoye/Larmor-Plage et au Ter/Ploemeur (56) du 4 décembre au 12 mars ; 1 adulte au Parc paysager/Saint-Nazaire (44) du 5 janvier au 18 février ; 1 adulte au Stang Alar/Brest (29) le 4 février, sur un site de stationnement devenu traditionnel ; 1 2ème hiver à Lampaul-Ploudalmézeau (29) le 11 mars.

GOELAND CENDRE *Larus canus*.

Le retour s'effectue dès juillet avec notamment 18 à Berder/Larmor-Baden (56) le 25. Les effectifs rapportés ne dépassent jamais quelques dizaines d'oiseaux.

L'hivernage est diffus sur tout le littoral avec, malgré tout, un maximum notable : 270 en rivière du Vincin/Vannes (56) le 28 janvier.

GOELAND BRUN *Larus fuscus*.

Les nicheurs locaux partent massivement dans la deuxième semaine de septembre. Le passage est réduit en octobre et il y a très peu de données ensuite. Notons seulement : 380 le 4 septembre à Sissable/Guérande (44), 129 le 1er octobre à Pen Ines/rivière d'Etel (56), 278 le 6 à Pen Bron/La Turballe (44).

Les nicheurs regagnent leurs colonies en février, alors que commence le passage des oiseaux nordiques *L. f. intermedius* : 56 le 8 février au Kun/Ouessant (29). Celui-ci dure jusqu'au 7 avril sur l'île d'Ouessant : 80 au Kun le 9 mars et 80 au Korz le 7 avril. En mai, 34 oiseaux dont 18 adultes sont le 8 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (35), mais la race n'est pas signalée.

Nidification urbaine (1995) :

Sites/Communes	Dépt	Nombre de couples
Saint-Malo	35	40-50
Rennes	35	1
Saint-Brieuc	22	1
C.H.M./Roscoff	29	2
Brest	29	40-60
Ville/Douarnenez	29	10 ?
Z.I./Douarnenez	29	13-16
Saint Guénolé/Penmarc'h	29	Non compté
Guilvinec	29	5-10
Léchiagat/Treffiagat	29	?
Lesconil/Plobannalec	29	1+
Loctudy	29	quelques
Lorient	56	=360

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*.

Les décomptes sur les colonies en sites naturels sont très partiels (en nombre de couples) : 800 à l'île des Landes/Cancale, 750 à l'îlot du Grand Chevreuil/Saint-Coulomb (35), 1 520 en baie de Morlaix, 160-180 sur Trévorc'h/Saint-Pabu, 327 à la réserve M.H. Julien/Goulien (29), 430 à la réserve naturelle de Groix, 1 500 à Koh Kastell/Belle-Ile, 150 à Er Lannic et 323 à Hent Tenn dans le golfe du Morbihan, 1 150 à Méaban, 870 dans l'archipel d'Houat (56) ...

En revanche, une estimation plus complète des effectifs reproducteurs en milieu urbain a été effectuée par Bernard Cadiou :

Sites/Communes	Dépt	Nombre de couples
Saint-Malo	35	310-345
Rothéneuf/Saint-Malo	35	4-6
Rennes	35	17
Dinan	22	5
Pléneuf-Val-André	22	20 ?
Saint-Brieuc	22	228
Binic	22	?
Etables-sur-Mer	22	4
Saint-Quay-Portrieux	22	5+
Morlaix	29	1-5
C.H.M./Roscoff	29	73-78
Brest	29	980-990
Ville/Douarnenez	29	300 ?
Z.I./Douarnenez	29	131-134
Quimper	29	1
Saint Guénolé/Penmarc'h	29	30-50 ?
Guilvinec	29	245-290
Léchiagat/Treffiagat	29	5-10
Lesconil/Plobannalec	29	10+
Loctudy	29	50-100 ?
Pont-L'Abbé	29	4-5 ?
Sainte Marine/Combrit	29	?
Concarneau	29	?
Lorient	56	540+
Le Croisic	44	30-80

Ce sont donc entre 21 et 24 villes qui sont maintenant colonisées par 2 500 à 2 700 couples. Les villes de haut d'estuaire sont encore peu occupées (Morlaix, Dinan, Quimper), mais l'espèce est solidement implantée à Rennes, même si les effectifs n'y croissent que lentement.

GOELAND LEUCOPHEE *Larus cachinnans*.

C'est en Loire-Atlantique, et plus particulièrement sur la Loire en amont de Nantes que s'observent les plus gros effectifs. L'arrivée est massive en juillet (dès le 3), les effectifs restent forts en août puis décroissent en septembre et octobre, alors qu'il reste quelques isolés en novembre et décembre. Quelques données sont obtenues en amont de Oudon (44) : 170+ le 18 juillet, 200 le 24, 200 le 20 août, 75 le 25 septembre et 50 le 1er octobre. Seulement 7 oiseaux sont dénombrés dans le département à la mi-janvier.

Ailleurs en Bretagne, l'espèce reste rare ou, en tout cas, peu détectée : 1 au Ri/Kerlaz (29) le 28 septembre, 1 imm. Au Korz/Ouessant (29) le 2 novembre, 1 à Kerdual/La Trinité-sur-Mer (56) le 4 décembre, 1 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (35) le 21 mars.

Reproduction (1995) : 1 couple mixte leucophée x brun *Larus cachinnans* x *Larus fuscus* pond deux œufs à Koh Kastell/Belle-Ile (56) mais ceux-ci n'éclosent pas ; un couple mixte leucophée x argenté *Larus cachinnans* x *Larus argentatus* a deux jeunes à l'île de Groix (56) mais ceux-ci meurent avant l'envol, une ponte de remplacement de 1 œuf n'aboutit pas ; une observation estivale concerne un estivant ou un migrateur précoce : 1 à Pen Mané/Gâvres (56) le 11 juin.

Le retour sur la Loire en amont de Nantes est sensible dès la fin du mois de juin : 36 le 23 juin, 71 le 1er juillet, 78 le 15.

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides*.

1 ind. de 1er hiver à Porz Doun/Ouessant (29) le 27 octobre, 1 ind. 1er hiver à Saint-Guérolé/Penmarc'h (29) du 20 janvier au 10 mars, 1 ind. 1er hiver au Stiff/Ouessant le 21 janvier, 1 ind. subadulte à Saint-Guérolé du 22 février au 9 mars, 1 ind. 1ère année probable à Roscoff (29) le 5 avril.

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*.

L'espèce est observée dans six localités cet hiver :

- port de Douarnenez (29) : 1 immature de 1er hiver les 21 et 22 janvier puis le 5 février.
- Trunvel/Tréogat (29) : 1 ind. 1er hiver du 21 janvier au 12 février, 1 ind. 2ème hiver ou subadulte les 25 et 27 février.
- port de Saint-Guérolé/Penmarc'h (29) : 1 ind. 2ème hiver les 10 janvier et 9 février, 1 ind. 1er hiver les 3 et 4 février.
- port du Guilvinec (29) : 1 ind. 1er hiver le 1er janvier.
- île de Groix (56) : 1 ind. 1er hiver aux Grands Sables les 30 octobre et 30 décembre.
- île d'Hoëdic (56) : 1 ind. im. probable (peut être un Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*) le 31 octobre, 1 ind. immature de 1er hiver le 11 février.

GOELAND MARIN *Larus marinus*.

Les décomptes sur les colonies en milieu naturel sont très partiels. Les effectifs reproducteurs des principales colonies recensées sont (en nombre de couples) : 88 à l'île des Landes/Cancale (35), 111 en baie de Morlaix (29), 68 dans l'archipel d'Houat (56), 19 à la réserve M.H. Julien/Goulien (29), 13 à Méaban (56).

La nidification urbaine n'est réellement prouvée qu'à Douarnenez (29) avec 12-13 couples dont 11 sont cantonnées sur les zones industrielles. Ailleurs elle est soupçonnée, mais non prouvée, à Saint-Malo (35), Guilvinec (29), Légiagat (29) et Lorient (56).

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla*.

A Ouessant (29), un fort passage se déroule fin octobre et début novembre : 594/2h à Kadoran et 200/0h30 à Pern le 30 octobre ; 295/1h45 à Kadoran et 635/2h au Créac'h le 1er novembre.

En hiver, on note des passages soutenus en décembre et en janvier : plusieurs centaines à Penvins/Sarzeau (56) le 8 décembre, plusieurs centaines vers l'ouest à Primel/Plougasnou (29) le 1er janvier, 110/0h10 à Kéerty/Penmarc'h (29) le 22 et une forte arrivée sur le littoral morbihannais le même jour après un fort coup de vent.

Une observation intérieure provient d'Ille-et-Vilaine : 1 dans les gravières de Bruz le 4 février.

Reproduction (1995) :

Sites	Nombres de couples	Production (jeunes/couples)	Tendance
Cap Fréhel (22)	107-109	0,32	?
Sept-Iles (22)	37	?	stabilité
Keller (29)	Non recensé	?	?
Ouessant (29)	59	0	diminution
Roches de Camaret (29)	164-169	0,62-1,16	augmentation
Goulien (29)	730	0,55	diminution
Pointe du Raz (29)	278	1,06	augmentation
Groix (56)	90-91	0,78-0,81	forte augmentation
Belle-Ile (56)	305	0,56-0,75	augmentation
Total	1 775-1 800		

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*.

2 le 22 mai à Saint-Cyr-en-Retz/Bourgneuf-en-Retz (44).

STERNE CASPIENNE *Sterna caspia*.

1 le 24 septembre sur la Loire à Thouaré (44), 1 le 30 avril dans l'estuaire du Frémur/Saint-Briac (35).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*.

A Ouessant (29), le passage postnuptial est surtout noté du 9 août au 24 septembre, et il n'y a que deux données en octobre : 5 le 9 et 1 le 28.

En Loire-Atlantique, 28 données sont obtenues en août (maximum de 100 le 26 à Préfailles), 9 en septembre (maximum de 28 le 4 à La Turballe) et 12 en octobre (maximum de 21 le 23 à Piriac) ; une donnée intérieure est obtenue le 31 octobre : 1 au marais de Petit-Mars.

Ailleurs, le passage est soutenu en août et septembre. On note quelques belles bandes : 100 le 9 août et 500 le 15 septembre à la pointe de Penvins/Sarzeau (56).

Effectifs maxima de janvier 1995 (très incomplets) :

Sites	Dépt	Effectifs
Rance maritime	35	1
Baie de Saint-Brieuc	22	3
Archipel de Bréhat	22	9
Penvénan	22	3
Plestin-les-Grèves	22	3
Baie de Goulven	29	1
Tréompan/Ploudalmézeau	29	1
Baie de Douarnenez	29	18
Penmarc'h	29	13
Guilvinec	29	1
Lesconil/Plobannalec	29	1
Groix	56	2
Roc'h Du/Crac'h	56	1
Golfe du Morbihan	56	1
Penvins/Sarzeau	56	2
Presqu'île guérandaise	44	22
Total		82

Un effort de recensement hivernal de cette espèce s'impose.

Le passage de retour est noté du 22 mars au 24 mai à Ouessant, ce qui correspond bien aux mouvements relevés dans le reste de la Bretagne. Les maxima observés sont faibles : 31 le 1er avril à Larmor-Plage (56).

Reproduction (1995) (en nombre de couples) : 150 à la Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22), 600 en baie de Morlaix (29) et 300-310 à l'île aux Moutons/Fouesnant (29) ; 1 ponte est également trouvée sur un îlot du Golfe du Morbihan et 1 couple s'est peut-être reproduit à Trélévern (22).

1 060 couples se sont donc reproduits cette année en Bretagne, ce qui correspond à une érosion par rapport aux deux dernières années (1 570 en 1993 et 1 160 en 1994). Ils représentent 22 % des couples se reproduisant sur la façade atlantique française et environ 17 % de la population nationale.

STERNE ELEGANTE *Sterna elegans*.

1 adulte, apparié à une Sterne caugek *Sterna sandvicensis*, est observé du 29 juin au 20 juillet sur l'île aux Moutons/Fouesnant (29). Le couple ainsi formé amène 1 jeune à l'envol.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougalli*.

Le passage postnuptial est bien suivi à Larmor-Baden, dans le golfe du Morbihan (56), où les effectifs sont importants : 5 le 25 juillet, 13 le 8 août, 24 (2 juv.) le 13, 33 (1 juv.) le 20, 31 (2 juv.) le 3 septembre, 45 (5 juv.) le 15.

Ailleurs, quelques oiseaux sont contactés dès juillet, 1 le 24 au Légué/Saint-Brieuc (22) et 4 le 30 en baie de Quiberon (56). Les observations sont plus nombreuses en août et au début de septembre à Ouessant (29), La Turballe (44), Saint-Brévin-les-Pins (44), en baie de Morlaix (29) et en baie de Saint-Brieuc. Notons en particulier un groupe de 17 individus le 30 août à Saint-Brévin-les-Pins. La dernière observation concerne un juvénile au Conquet (29) le 1er octobre.

Retour : 1 le 30 avril au Cap Coz/Fouesnant (29).

Reproduction (1995) : 90 à 95 couples en baie de Morlaix. On note également 4 à 7 prospecteurs à l'île de la Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22) et 4 autres à partir du 5 juin à l'île aux Moutons/Fouesnant.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*.

Il y a encore deux pulli à Varades (44) le 24 juillet.

Le passage postnuptial est noté à Ouessant (29) du 9 août au 18 octobre avec un pic dans la première quinzaine de septembre. En Loire-Atlantique, les migrateurs sont notés en août (15 données avec un maximum de 100 oiseaux le 26 à Préfailles) et en septembre (11 données concernant des troupes moins nombreuses, maximum de 60 le 11 à Saint-Nazaire) alors que la dernière observation concerne 1 oiseau le 25 septembre au Croisic.

Ailleurs on note quelques belles troupes en août et septembre : 150 vers l'ouest le 20 août sur la Palud/Goulven (29), 250 le 10 septembre à la pointe de Garo/Saint-Suliac (35), 200 le 15 à la pointe de Penvins/Sarzeau (56).

Une donnée tardive : 2 le 13 novembre à Saint-Quay-Portrieux (22).

Un oiseau très précoce est noté le 12 février à La Turballe (44). Il faut ensuite attendre le 2 avril pour que les premiers migrateurs apparaissent vraiment. Quelques belles troupes sont notées à cette occasion à l'écart des sites de reproduction : 109 le 21 avril au large de Saint-Nazaire (44), 60-70 le 29 à l'étang de Paintourteau/Erbrée (35), 39 le 30 à Kervigen/Plomodiern (29).

Reproduction (1995) :

Sites	Dépt	Nombres de couples
Ile au Moine	35	120
La Colombière	22	80
Archipel de Bréhat	22	73-93
Sillon de Talbert	22	19-20
Trélévern	22	20
Baie de Morlaix	29	120
Ile de Batz	29	6
Etang de Saint-Renan	29	5
Kemenez/A. Molène	29	15-20
Béniguet/A. Molène	29	47-57
Port/Brest	29	77-82
Lespoul/Pont-Croix	29	2
Trunvel	29	2
Ile aux Moutons	29	95-110
Rivière d'Etel	56	113-118
Falguérec/Séné	56	11
Ilôt de Grafol/Séné	56	18
Marais de Mesquer	44	19
Marais de Guérande	44	185
Loire en amont de Nantes	44	30
Grand-Lieu	44	9
Total compté		1 096-1 147
Total estimé		1 300

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisea*.

Le passage postnuptial est noté entre le 21 août, 1 juvénile au Dourduff/Plouézoc'h (29), et le 18 octobre, 1 à l'Ile Grande/Pleumeur-Bodou (22). Il s'agit le plus souvent d'oiseaux isolés, au maximum 3 à Saint-Brévin-Les-Pins (44) les 29 et 30 août. Deux données proviennent de plans d'eau douce : 1 au Drennec/Sizun (29) le 17 septembre et 1 juv. au Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (29) le 18.

Une donnée très tardive : 1 adulte en baie de Morlaix (29) le 4 novembre.

Au printemps les données sont rares : 3 le 27 avril à Montsarrac/Séné (56).

Reproduction (1995) : à Enez Lec/Trévou-Tréguignec (22), 1 adulte alarme dans une colonie de Sternes pierregarin *Sterna hirundo* le 13 juin et 1 couple alarme et attaque l'observateur le 13 juillet.

STERNE BRIDEE ou FULIGINEUSE *Sterna anaethetus/fuscata*.

Pour cette donnée, présentée au CHN, il n'a pas été possible de trancher entre ces deux espèces tropicales : 1 im. (1er hiver probable) à Mindin/Saint-Brévin-les-Pins, dans l'estuaire de la Loire (44), le 20 août.

STERNE NAINNE *Sterna albifrons*.

Le passage postnuptial est noté du 20 juillet, 6 en baie de Goulven (29), au 25 septembre, 3 au centre nautique de Guissény (29). Les effectifs sont faibles : maximum de 30 le 15 septembre à Banastère/Sarzeau (56). Une donnée intérieure : 1 le 7 septembre sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-Erbrée (35).

Le retour prénuptial est très précoce puisqu'un oiseau est noté dès le 9 avril au Sillon du Talbert (22). Il est cependant surtout noté de fin avril à mi-mai : 3 à Paimpol (22) le 25 avril, 3 à Kervigen/Plomodiern (29) le 30, 2 à l'île de Sein (29) le 1er mai.

Reproduction (1 995) (en nombre de couples) : 20 à 25 au Sillon du Talbert (22), 6 à Enez ar C'hristien/archipel de Molène, 2 ou 3 à Kemenez/archipel de Molène, 11 à Béniguet/archipel de Molène (29), 20 couveurs sur la Loire à Varades et Ancenis (44).

Au total 59 à 65 couples de Sternes naines se sont donc reproduits en Bretagne, dont 39 à 45 en zone maritime.

3 estivent en baie d'Audierne (29) du 22 mai au 20 juin au moins.

STERNE INCA *Larosterna inca*

1 adulte à Beg Melen/Groix (56) le 6 août, 1 immature au Croisic (44) le 12, 1 adulte sur le même site le 13, 1 subadulte possible à Saint-Nazaire (44) du 13 au 23 décembre.

Un afflux extraordinaire de données de Sternes incas a touché cette année les littoraux de la Manche orientale et de la côte atlantique, de Groix à Yeu. Il est fortement improbable que ces oiseaux soient d'origine sauvage, d'autant plus que 119 individus en provenance du Pérou ont été importés en Belgique le 20 juin 1994 ...

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*.

Encore 3 le 21 août à Passay/La Chevrolière (44) et 1 le 18 septembre à la pointe de Penvins/Sarzeau (56).

Au printemps, les premières réapparaissent le 1er mai : 18 en Grande Brière (44). D'autres migrateurs sont notés jusqu'en Ille-et-Vilaine : 5 le 4 mai aux gravières de Bruz et 2 le 3 juin à l'étang de Châtillon-en-Vendelais.

Reproduction (1 995) : Brière (44) : 25 couples avec pontes le 12 mai, disparaissent le 21, seul 1 couple se reproduira effectivement sur l'ensemble du marais ; lac de Grand-Lieu (44) : 240-270 couples.

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*.

Le passage automnal commence au début du mois d'août, 1 à l'étang du Beffou/Loguivy-Plougras (22) le 1er, et culmine en septembre avec quelques maxima notables : 31 au pont de Saint-Nazaire (44) le 11, 25 à Sainte-Luce-sur-Loire (44) le 16, 26 à Nérizelec/Plovan (29) le 25. Un dernier oiseau est observé le 23 octobre à Piriac (44).

Une observation hivernale exceptionnelle : 1 à Birhit/Sarzeau (56) le 29 janvier !

Le premier migrateur pré-nuptial est noté le 18 mars, date très précoce, au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44). Les premiers nicheurs sont notés en Brière (44) le 20 avril. On remarque de belles concentrations : 72 sur quatre étangs d'Hédé et Combours (35) le 12 mai, 12 à Trunvel/Tréogat (29) le 22.

Reproduction (1 995) (en nombre de couples) : 186 en Grande Brière (44) et 3-5 au lac de Grand-Lieu (44). Ce sont des effectifs records tant au niveau régional qu'au niveau national où les effectifs dénombrés ont atteint 240 à 251 couples.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*.

1 le 11 septembre à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (35), 1 le 27 sur la plage de Trezmalaouen/Kerlaz (29), 1 le 28 dans le port de Douarnenez (29).

GUILLEMOT DE TROIL *Uria aalge*.

40 oiseaux sont présents dans le Fromveur/Ouessant (29) le 1er novembre.

Dans les falaises du Cap Fréhel (22), 37 oiseaux sont dénombrés le 6 novembre et 250 le 5 février.

Recensement des colonies de reproduction (1 995) :

Sites	Dépt	Nombre de couples	Production (jeune/couple)
Cézembre	35	Non recensé	
Cap Fréhel	22	135-142	49-62 pulli vus
Sept-Iles	22	7	?
Roches de Camaret	29	10	5 pulli vus
Goulien	29	28	0,79-0,82
Total		190	

Les recensements mettent en évidence une nette érosion des effectifs par rapport à 1 994 : -10 couples à Goulien, -8 couples aux Sept-Iles, -2 couples à Camaret. Malgré des actes de prédation de la part de grands Corbeaux *Corvus corax* à Goulien, la production y est bonne grâce aux deuxièmes pontes qui ont été épargnées.

PINGOUIN TORDA *Alca torda*.

En hiver retenons seulement un beau rassemblement de 250 oiseaux au large de Saint-Quay-Portrieux (22) le 2 février.

Reproduction (1 995) :

Sites	Dépt	Nombre de couples
Cézembre	35	Non recensé
Cap Fréhel	22	10
Sept-Iles	22	10
Roches de Camaret	29	0-1
Total		20-21

MERGULE NAIN *Alle alle*.

1 à Bedgel/Hoëdic (56) le 15 septembre, 1 dans les marais de Guérande (44) le 18 décembre, 1 mort sur la côte sauvage de Quiberon (56) en février, 1 trouvé mort à La Turballe (44) le 21 février, 1 mort mazouté à Kerhilio/Erdeven (56) le 26.

MACAREUX MOINE *Fratercula arctica*.

Reproduction (1 995)(en nombre de couples) : 239 aux Sept-Iles (22), 10 environ en baie de Morlaix (29, ≤5 à Keller/Ouessant (29), soit un total de 254 couples en 3 sites seulement.

1 oiseau est observé sur l'eau au Cap Fréhel (22) le 1er juin. Rappelons que la reproduction de l'espèce a été soupçonnée sur ce site dans les années 1970.

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*.

A l'automne, le passage se déroule du 12 septembre au 6 novembre.

Quelques bandes hivernales plus importantes qu'à l'habitude ont été notées en dehors des secteurs d'abondance : 17 le 29 novembre à Corseul (22), 12-13 le 2 décembre à Bruillac/Plounérin (22), 50 le 21 décembre à Namer/Plounérin.

En dehors du Nord Finistère, l'espèce est signalée en période de nidification à Langueux, Plouha, Plounérin, Saint-Brandan (22), Goulien (29), Bazouges-la-Pérouse, Liffré (35), Assérac, Bouguenais, La Baule, Thouaré (44).

En Loire-Atlantique, l'espèce est considérée comme peu commune à l'ouest du département et plus commune à l'est de Nantes.

En Ile-et-Vilaine, le 5 juin, 4 chanteurs ont été dénombrés sur un circuit de 4,250 kilomètres dans la forêt de Villecartier/Bazouges-la-Pérouse.

TOURTERELLE DES BOIS *Streptotelia turtur*.

La dernière est vue le 9 novembre à Erdeven (56).

Les premières sont le 1er avril à Ercé-en-Lamée (35) mais l'essentiel du passage du 27 avril au 23 mai à Ouessant (29) notamment.

PERRUCHE A COLLIER *Psittacula krameri*.

1 le 6 novembre à la tour de Cesson/Saint-Brieuc (22), 2 le 12 février en forêt de Lorge (22).

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*.

Quatre oiseaux notés début septembre précèdent un retardataire qui passe aux Sept-Iles/Perros-Guirec (22) le 29 de ce mois.

Le premier est de retour à Assérac (44) le 19 mars, mais il faut ensuite attendre le 3 avril pour avoir d'autres contacts.

Sur Ouessant (29), le gros du passage s'effectue lors de la première quinzaine de mai.

CHOUETTE EFFRAIE *Tyto alba*.

Deux données insulaires originales ont été obtenues : 1 le 30 septembre à Hoëdic (56) et 1+ en janvier à Ouessant (29).

HARFANG DES NEIGES *Nyctea scandiaca*.

1 mâle stationne sur Ouessant (29) du 1er mai environ jusqu'au 4 juillet.

CHOUETTE CHEVECHE *Athene noctua*.

Nous donnons à la suite la liste des communes où l'espèce a été contactée en dehors de la Loire-Atlantique où une opération d'envergure se poursuit.

- dans les Côtes-d'Armor : Louannec, Pléguien, Pleumeur-Bodou, Trégastel.
- dans le Finistère : Goulien, Plonéour-Lanvern, Plouénan, Plouvorn, Poullan-sur-Mer.
- en Ile-et-Vilaine : Argentré-du-Plessis.
- dans le Morbihan : Baden, Brec'h, Erdeven, Larmor-Plage, Persquen, Ploemel, Ploeren.

4 nichoirs sont occupés au printemps 1995 : 1 à Argentré-du-Plessis et 3 sur l'île Arroux/Saint-Julien-de-Concelles (44).

HIBOU MOYEN-DUC *Asio otus*.

Trois oiseaux sont repérés au passage automnal sur les îles : 1 le 11 octobre à Ouessant (29) et 2 le 20 à Hoëdic (56).

La reproduction est constatée à Batz-sur-Mer et Guérande (44) au printemps 1995.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*.

Le passage se déroule du 26 septembre au 22 novembre.

En hiver : 15 à 17 en dortoir du 18 décembre au 18 janvier à Fresnay-en-Retz (44), 1 le 22 décembre à Falguérec/Séné (56), 1 du 3 au 30 janvier à Groix (56), 1 à la mi-janvier entre Beg Meil et l'Aven (29).

1 les 2 et 3 avril aux Glénan (29), 1 le 9 à Ouessant (29) et 1 le 23 à Erdeven (56).

Reproduction : 2 couples dont 1 avec 2 jeunes le 31 mai à Fresnay-en-Retz, 1 couple avec 3 jeunes le 3 juin dans les marais salants de Guérande (44).

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*.

Encore 1 femelle avec 1 pullus " au nid " à Séverac (44) le 4 septembre.

1 cadavre le 1er octobre sur l'île Bono/Sept-Iles (22).

Le premier contact est obtenu le 2 mai à Erdeven (56).

Les localités occupées sont Locarn, Plélan-le-Petit (22), Argol, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Plougonven, Trégarvan (29), la forêt du Gâvre (44), Baud, Brec'h, Erdeven, Larmor-Plage, Ploemeur, Plouhinec (56).

Deux " nids " sont découverts en juillet sur les flancs du Menez Hom (29), l'un avec 2 pulli le 9, l'autre avec 1 pullus le 15.

MARTINET NOIR *Apus apus*.

5 à 8 couples se reproduisent dans des fissures rocheuses de la pointe du Jas/Fréhel au cours de l'été 1994. Cette découverte est une nouveauté pour la Bretagne.

Un passage net se déroule à la fin de la première décade d'août : nombreux à Trunvel/Tréogat (29) le 9, 300 à Ouessant (29) le 10.

Si l'essentiel des mouvements est terminé pour la fin août, quelques individus sont encore vus jusqu'au 25 septembre.

Un individu extrêmement tardif est contacté le 9 novembre à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22).

Les 2 premiers sont à Vertou (44) le 11 mars, ils précèdent de près de trois semaines leurs suivants. Les contacts sont nombreux lors de la première quinzaine d'avril : l'espèce apparaît en Loire-Atlantique le 1er, dans le Finistère le 11, dans le Morbihan le 14 et dans les Côtes-d'Armor le 15.

Une donnée tout à fait extraordinaire concerne un individu transportant, avec les plus grandes difficultés, une ... souris *Mus musculus*, le 3 juin, devant la cathédrale de Dol-de-Bretagne (35). Le mammifère semblait accroché aux pattes de l'oiseau ! Malheureusement, il n'a pas été possible de connaître la fin de l'histoire.

MARTIN PECHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis*.

Le passage se déroule entre le 27 juillet et le 11 novembre à Ouessant (29).

Quelques rares cas de reproduction sont rapportés : 1 nid le 28 mars à Pont Glaz/Locoal-Mendon (56), 1 nid le 23 avril à l'étang de Bétineuc/Saint-André-des-Eaux (22) et 1 nid le 21 mai à l'étang de Bois Joly/Trémereuc (22).

Quatre preuves de reproduction sont annoncées pour 1995, sans plus de détail, de Loire-Atlantique.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*.

En baie d'Audierne (29), alors que 6 adultes et 12 juvéniles, sont vus près de la colonie de Kerboulén/Plomeur le 28 août, les dernières observations datent du lendemain !

Les retours sont constatés dans le Pays Bigouden (29) le 3 mai avec 14 individus à Poulguen/Penmarc'h, aux abords d'une autre colonie.

La population du Pays Bigouden atteint l'effectif record de 31-41 couples en 1995.

HUPPE FASCIEE *Upupa epops*.

Au cours de l'été, deux couples nicheurs sont trouvés à Kerboulén/Plomeur et à Rozantrémen/Plomeur en baie d'Audierne (29).

Deux contacts sont obtenus après la fin du mois d'août : 1 le 8 septembre à Plœmeur (56) et 1 le 18 à Ouessant (29).

L'espèce réapparaît à Fresnay-en-Retz (44) le 12 mars. Le passage printanier, qui se termine le 6 mai, est, comme à l'habitude, caractérisé par des apparitions de l'espèce en dehors de l'aire de reproduction.

Par la suite, seules trois données sont transmises : 1 le 31 mai à Kerhillio/Erdeven (56), 1 le 7 juin à Sept-Iles/Baden (56) et 1 le 22 juin à Lann Dourel/Plumergat (56), localité intérieure.

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*.

La migration d'automne est très groupée entre le 28 août et le 1er octobre.

Trois individus sont contactés, sans suite, en deux points de la forêt du Gâvre (44) entre le 30 avril et le 8 mai.

1 chanteur le 7 mai à Trébeurden (22), il est revu plus tard dans le même secteur. Cette donnée s'inscrit dans une série de contacts printaniers dans le Trégor.

PIC CENDRE *Picus canus*.

L'espèce est à nouveau contactée à Bel Orient/L'Hermitage-Lorge (22) au cours de l'hiver.

1 individu est vu et entendu en forêt de Juigné (44) au cours du printemps.

1 chanteur aux Maffrais/Liffré (35) le 19 avril et 2 chanteurs en forêt de Villecartier/Bazouges-la-Pérouse (35) le 5 juin.

PIC NOIR *Dryocopus martius*.

L'espèce est contactée en forêt de Fougères/Laignelet, au bois le Beau/Erbrée, en forêt de Rennes/Liffré (35), en forêt de Coëtquen/Saint-Hélen, à Landeboulou/Lanvallay, à Léhon, au bois d'Yvignac, en forêt de Lorge (22), à l'étang du Fourneau/Sainte-Brigitte (56), à Assérac, en forêt du Gâvre, en forêt de Domnaiche, à Erbray, en forêt de Juigné/Juigné-des-Moutiers, à Ligné, en forêt de Vioreau/Joué-sur-Erdre, en forêt d'Ancenis, au Cellier et en forêt de Touffou/Le Bignon (44).

La reproduction est prouvée en forêt de Coëtquen et dans le bois d'Yvignac.

PIC MAR *Dendrocopos medius*.

Un nid, avec des poussins, est découvert à 18 mètres de hauteur dans un hêtre de la forêt de Villecartier/Bazouges-la-Pérouse (35) le 5 juin.

Dans les Côtes-d'Armor, l'espèce est contactée dans les forêts de Coëtquen, de Lorge et de Beffou.

En Loire-Atlantique, 1 seule réponse est obtenue à la repasse lors d'une journée de prospection en forêt de Juigné, faiblement pourvue en parcelles de feuillus âgés il est vrai.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla*.

1 ind. les 1er et 2 octobre à Hoëdic (56).

1 ind. le 8 mai à la Torche/Plomeur (29) et 1 du 29 au 31 à Ouessant (29).

Il n'y a aucune donnée relative à la reproduction.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*.

Un site dans les Côtes-d'Armor : 1 à 2 du 6 janvier au 15 mars sur un parking d'hypermarché aux Villages/Saint-Brieuc (22).

Six sites sont contrôlés dans le Morbihan : 3 le 19 avril à Guidel-Plage/Guidel, aux limites du Finistère ; des chants (?) le 28 avril sur la route de Quéven/Lorient ; présence continue, avec au maximum 3 individus les 12 mars et 11 juin, dans le port de Lorient ; 1 le 30 janvier puis 1 couple le 13 mai à Kerhillio/Erdeven ; 1 couple le 13 mai à Kerouriec/Erdeven.

L'espèce est contactée dans sept communes de Loire-Atlantique : Saint-Nazaire, Trignac, Saint-Viaud, Préfailles, La Plaine-sur-Mer, Couëron et Vertou.

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*.

Le passage automnal, beaucoup moins marqué que le précédent, s'inscrit entre le 10 octobre et le 31 octobre, mais presque toutes les données sont obtenues entre le 26 et le 31.

Il n'y a pratiquement pas de données hivernales, à l'exception d'une à Goulien (29) le 13 décembre.

Dans les Côtes-d'Armor, 1 à 2 couples sont repérés sur la commune de Loguivy-Plougras.

3 dont 1 alarme le 8 juillet à La Garenne/Locmaria-Berrien (29).

Par ailleurs, on peut remarquer que l'espèce est contactée dans deux communes morbihannaises, Plumergat et Plescop, ainsi qu'à l'ouest de la Loire-Atlantique, à Herbignac et Fresnay-en-Retz.

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*.

Le passage automnal est ressenti du 30 septembre au 5 novembre avec un pic bien marqué de 1000+ le 2 novembre à Ouessant (29).

122 "individus nicheurs" sont dénombrés dans la partie du Marais Breton située en Loire-Atlantique en mai et juin.

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*.

Deux données sont obtenues le même jour, le 1er novembre : 1 aux Hôpitaux/Erquy (22) et 1 à Trunvel/Tréogat (29).

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*.

Les dernières quittent la région durant la troisième décennie de septembre à l'exception d'une retardataire le 23 octobre à Ouessant (29).

L'espèce réapparaît au début de mars : 1 le 1er dans les gravières au sud de Rennes (35).

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*.

L'espèce est notée régulièrement jusqu'au 11 novembre.

Par la suite trois contacts sont obtenus en décembre, 1 le 15 à Malville (44), 1 le 20 à Calorguen (22), 2 le 27 Cherrueix (35).

Les premières sont de retour le 10 mars à Grand-Lieu (44).

HIRONDELLE ROUSSELIN *Hirundo daurica*.

1 à Hoëdic (56) le 11 septembre, 1 adulte à Ouessant (29) le 9 octobre et, de nouveau, 1 à Hoëdic le 16.

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbica*.

Les derniers migrants sont notés durant la première quinzaine d'octobre, à l'exception de deux isolés qui passent à Ouessant (29) les 2 et 11 novembre.

Il faut attendre le 21 mars pour revoir l'espèce, toujours à Ouessant.

Deux colonies rupestres sont recensées au Cap Fréhel (22) : il y a 10 nids dans la falaise de la pointe du Jas et 18 dans celles de l'anse des Sévignés.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardii*.

Trente-cinq individus, au minimum, sont observés pendant leur transit en Bretagne en automne : 1 à l'étang du Moulin Neuf/Plounérin (22) le 22 septembre, 13 à Ouessant (29) du 24 septembre au 28 octobre, 21+ en baie d'Audierne (29) du 3 octobre au 20 novembre. Maxima : 3 à Ouessant les 10 et 14 octobre et à Trunvel le 19.

Cet afflux tout à fait inhabituel, qui s'inscrit dans un mouvement bien ressenti en Europe, a permis de contacter l'espèce pour la première fois, pour ce siècle au moins, dans un site intérieur. Mais combien sont passés inaperçus ?

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*.

Le passage d'automne s'inscrit entre le 31 août et le 12 octobre. L'essentiel des observations provient de la baie d'Audierne (29) où une trentaine d'individus est contactée, parfois en groupe comme à Trunvel/Tréogat où 6 sont notés les 27 et 28 septembre.

Ailleurs, 1 le 31 août à Erdeven (56), 1 le 16 septembre à Pen Bron/La Turballe (44), 1 le 22 à l'île de Sein (29), 6 le 6 octobre à Ouessant (29) et 1 le 10 à Trégunc (29).

PIPIT A DOS OLIVE *Anthus hodgsoni*.

1 le 5 novembre à Ouessant (29).

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*.

Le passage automnal se déroule du 13 août au 15 octobre avec un maximum de 20 le 6 septembre à Ouessant (29).

Le premier est de retour le 18 mars à Clisson (44).

Dans le Finistère, des chanteurs sont trouvés en limite de répartition dans le Petit Trégor (Lanmeur et Saint-Jean-du-Doigt), au Tréhou et sur les flancs du Menez Hom (Trégarvan et Dinéault).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*.

L'arrivée des migrateurs d'automne est notée le 22 septembre. Le passage est noté à Ouessant (29) ensuite jusqu'au 28 octobre.

En Loire-Atlantique, l'espèce n'est contactée, au printemps, que sur le littoral sauf le 22 mars à Vertou et le 8 mai dans le marais de Goulaine.

Les deux Atlas, breton et costarmoricain, parus récemment font état d'une stabilité de l'espèce depuis la période 1970-1975. Pour notre part, nous pensons que cela reste à prouver et serions même enclins à penser que le farlouse a décliné. En tout cas, il existe bien des endroits de Basse Bretagne où cet oiseau est introuvable en période de reproduction.

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*.

1 oiseau passe à Trunvel/Tréogat (29) le 6 octobre.

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*.

Il n'y a pas d'indications relatives aux passages.

1 ind. est juché sur la flèche de l'église de Roscoff (29) le 7 janvier !

1 ind., en plumage nuptial, présentant les caractéristiques de la race *A. p. littoralis* est présent le 9 avril à la Ville Ger/Pleudihen-sur-Rance (22).

20 couples sur les îlots de la réserve de la baie de Morlaix (29).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*.

Les arrivées des premiers migrants sont très groupées lors de la deuxième décade d'octobre : 1 le 13 à Thouaré (44) ...

L'espèce est plutôt négligée par les observateurs alors qu'elle peut être localement abondante : 30 le 24 décembre autour du lac du Drennec/Sizun (29), 40-50 le 29 à l'étang de Beffou/Loguivy-Plougras (22), 25 le 30 à l'étang du Moulin Neuf/Plounérin (22), 25 le 28 janvier à Goasmeur/Paimpol (22). L'existence de dortoirs peut expliquer en partie ces concentrations.

Le passage de remontée est sensible en mars avant de s'achever au début d'avril alors que le dernier est encore à Thouaré le 14.

BERGERONNETTE PRINTANIERE/FLAVEOLE *Motacilla flava/flavissima*.

Nous retenons ici les données générales sans précision d'espèce (ou de sous-espèce ?).

A Ouessant (29), le passage se déroule entre le 23 août et le 3 novembre avec un pic entre le 4 et le 23 septembre. Les données recueillies ailleurs s'inscrivent bien dans ce schéma : 40 le 30 août à Trunvel/Tréogat (29), 100 le 20 septembre puis 60 le 22 à La Turballe (44).

La dernière est à Batz-sur-Mer (44) le 18 novembre.

Les retours sont précoces en Loire-Atlantique : 2 isolés le 27 février à Nantes et à Petit-Mars précèdent 1 le 22 mars à Varades et 1 le 26 à Bourgneuf-en-Retz. Le gros de la troupe arrive à partir de la première décade d'avril.

4 couples plus 53 individus sont dénombrés en mai et juin sur la partie ligérienne du Marais Breton (44).

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*.

1 ind. *M. f. thunbergi* le 22 août à Trunvel/Tréogat (29), 1 oiseau présentant les caractéristiques de la sous-espèce *M. f. iberiae* le 20 avril en Brière (44). Toujours en Brière, 1 mâle du même type est découvert le 28 mai au marais du Pin, site où 1 individu identique s'était reproduit avec succès l'année précédente.

Quelques individus de la race type sont contactés dans les Côtes d'Armor aussi à l'ouest que dans le Trégor : 1 le 4 mai à l'Ile Grande/Pleumeur-Bodou et 1 le 7 à l'Ile à Canton/Trébeurden.

BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flavissima*.

1 famille le 23 juillet à Pen ar C'hleuz/Tréflez (29). Dans le Léon, l'espèce est devenue rare.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 9 septembre au 4 novembre avec un maximum du 7 au 20 octobre.

En période de reproduction, l'espèce est contactée à Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson, Corcoué-sur-Logne et La Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique.

BERGERONNETTE GRISE TYPE *Motacilla alba alba*.

A Ouessant (29), le passage d'automne se déroule du 29 août au 2 novembre, avec un maximum du 5 au 23 septembre.

1 se trouve le 4 janvier à Saint-Michel-en-Grève (22), dans l'aire d'hivernage de la sous-espèce *M. a. yarrellii*.

Les premiers retours sont enregistrés le 12 mars au port du Ligué/Saint-Brieuc (22) alors que le passage s'étend du 15 mars au 19 mai à Ouessant.

BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrellii*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 4 octobre au 6 décembre à l'automne et du 23 mars au 24 avril au printemps.

Un gros dortoir hivernal est attribué à cette sous-espèce : 2 200 le 19 décembre à Beaulieu/Rennes (35). Il serait intéressant de vérifier si des individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce type ne fréquentent pas ce rassemblement. Rappelons que les deux sous-espèces hivernent en Loire-Atlantique.

ROUGEGERGE FAMILIER *Erithacus rubecula*.

Le passage automnal débute le 22 août à Ouessant (29) alors que les derniers hivernants quittent l'île le 13 avril.

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*.

Le dernier est le 18 septembre à Ouessant (29).

Le premier est de retour le 8 avril au Carnet/Frossay (44).

1 ind. chanteur le 8 mai à Kerhillio/Erdeven (56).

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica*.

Deux contacts sont obtenus le 22 juillet dans le marais du Quellen/Trébeurden (22), site où un individu avait déjà été observé le 28 juin 1991.

L'espèce disparaît en septembre, dernière le 30 à Trunvel/Tréogat (29).

La première est de retour à Guérande (44) le 7 mars.

6 chanteurs sont dénombrés dans le marais de Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35) en mai.

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*.

A Ouessant (29), le passage automnal se déroule du 7 octobre au 24 novembre avec un maximum du 13 octobre au 11 novembre : 150+ le 2 novembre. Les mouvements, plus accentués que d'habitude, sont bien ressentis ailleurs : 15 à Sein (29) le 5 novembre, 40 à Hoëdic (56) le 12.

Le passage de remontée prend place entre le 21 mars et le 30 avril à Ouessant, avec un maximum marqué en début de période : 22 les 22 et 23 mars. Au même moment, 21 sont au Guilvinec (29) le 23.

5 chanteurs sont dans les falaises du cap Fréhel (22) le 5 mai.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*.

Une nidification est soupçonnée à Paule (22) le 21 août. Malheureusement, l'absence de relation circonstanciée ne permet pas d'en savoir plus, d'autant qu'à Ouessant (29) la migration a débuté dès le 16 août pour s'achever le 2 novembre, maximum 7 le 23 septembre.

Les données printanières sont particulièrement peu nombreuses : 4 le 21 mars à Betton (35), 1 le 5 avril en forêt du Gâvre, 1 couple le 23 à la lande Carragat/Saint-André-des-Eaux (22), 1 le 1er mai à Sein (29) et 1 chanteur le 16 en forêt de Coëtquen (22). Aucune preuve de reproduction n'a été rapportée.

TARIER D'EUROPE *Saxicola rubetra*.

1 famille dans le Yeun Ellez (29) le 19 juillet.

Le passage se déroule du 22 août au 27 octobre avec un pic du 23 au 27 septembre à Ouessant (29). Ce maximum est également bien ressenti en baie d'Audierne (29).

Le dernier est à Clisson (44) le 10 novembre.

1 oiseau est noté en baie du Mont-Saint-Michel (35) le ... 22 décembre, mais ne s'agit-il pas d'une confusion avec un Traquet pâle *Saxicola torquata* ? Des précisions n'auraient pas été superflues.

Le premier est noté le 9 avril à Anetz (44).

En 1995, quatorze sites sont découverts, sans recherche particulière, dans les Monts d'Arrée (29), sur les communes de Botmeur (1), Brasparts (7), Le Cloître-Saint-Thégonnec (5) et Saint-Rivoal (1).

TARIER PATRE *Saxicola torquata*.

1 femelle de 1er hiver présentant les caractères de la sous-espèce orientale *S. t. maura/stejnegeri* à Sein (29) le 27 octobre.

A Ouessant (29), de nombreux départs sont enregistrés au début de novembre alors que les retours sont évidents à partir du 20 mars.

Sur cette île, seuls 22 couples sont repérés en 1995, soit la moitié de l'effectif de 1993.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 11 août au 4 novembre avec une intensité plus marquée du 31 août au 25 octobre. Les données en provenance de ce site et de la baie d'Audierne (29) mettent en évidence un pic entre le 23 et le 25 septembre.

Le dernier migrateur est le 11 novembre à Pornichet (44).

Deux " hivernants " sont découverts à la pointe du Décollé/Saint-Lunaire (35) le 6 décembre et à la Herviais/Langrolay-sur-Rance (22) le 11 janvier, encore que, dans le premier cas, il puisse s'agir d'un migrateur attardé.

Le premier est de retour le 5 mars au cap Fréhel (22).

Le passage prénuptial est noté dans les Côtes-d'Armor du 5 mars au 13 mai, à Ouessant du 14 mars au 1er juin et en Loire-Atlantique du 15 mars au 14 mai.

4 individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *O.o. leucorrhoa* sont observés entre le 9 et le 29 avril au cap Fréhel et en baie d'Audierne.

Si deux ou trois couples sont découverts avec des jeunes sur les crêtes des Monts d'Arrée (29), au Ménez Mikel/Brasparts et à Saint-Cadou/Sizun, aucune reproduction n'a pu être mise en évidence dans les Côtes-d'Armor ou en Loire-Atlantique.

Cette espèce mérite un meilleur suivi au moment de la nidification.

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica*.

1 mâle de la forme stapazin à Ouessant (29) du 28 avril au 1er mai.

MONTICOLE DE ROCHE *Monticola saxatilis*.

1 mâle le 13 octobre aux Sept-Iles/Perros-Guirec (22).

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*.

Le passage automnal se déroule entre le 10 octobre et le 7 novembre avec un maximum lors de la deuxième quinzaine d'octobre : 14 le 17 à Ouessant (29).

Le petit passage printanier se déroule du 9 au 30 avril avec là encore une forte prédominance des données ouessantines.

MERLE NOIR *Turdus merula*.

A Ouessant (29), où le passage n'est décelé qu'à partir du 14 octobre, un très gros passage est observé le 2 novembre : 10 000+ transitent au-dessus de l'île.

GRIVE A GORGE NOIRE OU ROUSSE *Turdus ruficollis*.

Une observation concernant peut être un mâle de 1er hiver de la race *T. r. atrogularis*, à Sein (29) le 22 octobre. Il s'agit de la seconde mention pour la Bretagne.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 8 octobre au 24 novembre avec deux pics : 500 les 2 et 21 novembre.

Les derniers oiseaux sont vus en avril : 30 le 20 à Bulat-Pestivien (22).

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 10 octobre au 11 novembre avec un pic marqué : 500+ le 2 novembre.

Toujours à Ouessant, un mouvement de remontée est ressenti le 22 mars.

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 7 octobre au 24 novembre avec un pic exceptionnel de 100 000 individus le 2 novembre.

Les dernières sont à Anetz (44) le 2 avril.

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 8 octobre au 11 novembre.

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*.

Trois oiseaux passent à Ouessant (29) entre le 14 octobre et 4 novembre.

22 chanteurs sont dénombrés sur 2 kilomètres à Petit-Mars (44) le 11 décembre.

1 chanteur de passage est présent au Moulin Neuf/Plounérin (22) le 10 mars.

Une donnée très intérieure est obtenue à Saint-Connan (22) le 3 juillet.

Contrairement à ce que nous affirmions lors de la synthèse précédente, la Bouscarle ne serait pas commune partout en Loire-Atlantique, le nord de département étant moins densément peuplé. Mais peut-être s'agit-il, au moins partiellement, d'une conséquence de la répartition des observateurs dans ce département.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*.

Addendum à la synthèse précédente : au printemps 1994, des chanteurs sont notés au Tour-du-Parc (56) et surtout à Plouray (56), site très intérieur, le 28 mai.

Des familles très tardives sont découvertes fin septembre et même le 19 octobre à l'étang du Moulin Neuf/Plounérin (22).

L'expansion de l'espèce est tout à fait spectaculaire et de nombreuses nouvelles localités viennent s'ajouter à celles publiées depuis quatre ans :

Cherrueix (35), Plougrescant (22), Crozon, Landunvez, Primelin, Saint-Pabu (29), Langonnet, Saint-Armel (56), Donges, Frossay, La Chapelle-Heulin, Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-Eaux, Saint-Lumine-de-Coutais ainsi que le Marais Breton (44).

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*.

La dernière est à Ouessant (29) le 14 octobre.

La première est Cléden-Cap-Sizun (29) le 8 avril.

11 chanteurs le 23 avril dans le marais de Lillemer (35).

Quelques données sont obtenues sur des sites intéressants après le début-mai : 1 chanteur le 9 mai à la pointe de Dinan/Crozon (29) ; 1 chanteur le 28 en forêt du Cranou (29) ; 1 le 25 juin au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44), site où aucun contact n'avait pas été obtenu depuis 1986 ; 1 chanteur le 1er juillet à Kerlaz/Tréguennec (29) ; 1 chanteur le 6 en forêt de Beffou/Loguivy-Plougras (22).

Au cours du printemps 1995, 24 localités de chants sont découvertes, sans recherches particulières, dans les Monts d'Arrée.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE *Locustella luscinioides*.

La dernière est à Frossay (44) le 30 août.

La première est à Loc'h ar Stang/Tréguennec (29) le 1er avril.

L'espèce est contactée sur les sites suivants au cours du printemps : marais de Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35), baie d'Audierne (29), Pen Mané/Locmiquélic (56), Brière, Donges-est, Grand Pineau/Saint-Etienne-de-Montluc, Le Carnet/Frossay, Port-Saint-Père, étang de Clégreuc/Vay, marais de Goulaine, Port-la-Roche/Bourgneuf-en-Retz (44).

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*.

Seulement 42 captures, à partir du 25 juillet, à la station de baguage de Trunvel/Tréogat (29).

1 autre capture le 3 septembre au Masserau/Frossay (44).

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus*.

Lors du passage post-nuptial, 4 313 individus sont capturés à Trunvel/Tréogat (29) et 689 au Masserau/Frossay (44). Sur ce dernier site, les observations s'effectuent du 15 août au 17 septembre alors qu'à Ouessant (29), les mouvements se déroulent entre le 16 août et le 3 octobre.

Le premier est noté à Trunvel le 11 mars alors qu'un passage évident est remarqué dans le Finistère et les Côtes-d'Armor entre le 20 avril et le 6 mai.

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola*.

Deux captures de juvéniles ont été réalisées à Trunvel/Tréogat (29) les 23 août et 23 octobre. Il s'agit des deuxièmes et troisièmes mentions bretonnes après la première du 2 juillet 1990, également capturée à Trunvel.

ROUSSEROLLE DES BUISSONS *Acrocephalus dumetorum*.

1 adulte est observé à Sein (29) le 23 octobre. Il s'agit d'une première bretonne et d'une deuxième française.

Ph. Dubois (1995) attire l'attention sur le fait qu'on ne peut exclure que cet oiseau puisse être un hybride Rousserolle des buissons x Rousserolle verderolle *Acrocephalus dumetorum* x *Acrocephalus palustris*.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*.

5 observations sont faites à Ouessant (29) entre le 14 octobre et le 4 novembre.

Au printemps 1995, 1 couple est présent à l'enrochement du Légué/Saint-Brieuc (22) à partir du 29 mai et jusqu'au 21 juin au moins.

10-12 chanteurs sont dénombrés dans le marais de Lillemer (35) les 5 et 6 juin. Il semble bien que cette partie du marais de Dol soit le chaînon manquant entre la population connue depuis une quinzaine d'année à l'est de la baie du Mont-Saint-Michel (50) et l'avant-poste briochin. Le nombre de chanteurs contactés, sans que les recherches soient exhaustives, laisse supposer que l'installation de l'espèce pourrait dater de plusieurs années.

On remarquera enfin qu'autour de Lillemer, la Rousserolle verderolle fréquente exclusivement le marais boisé (plantations, haies ou saules pionniers).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 2 septembre au 5 novembre.

La dernière est à La Turballe (44) le 11 novembre.

Les premières sont de retour le 10 avril en Loire-Atlantique.

Deux données intérieures sont obtenues en Basse-Bretagne, région où l'espèce est presque exclusivement littorale en période de reproduction : 1 chanteur en juin et juillet au Moulin Neuf/Plounérin (22) et 1 chanteur le 3 juillet à l'étang du bourg/Saint-Conan (22).

Une nouvelle localité est découverte dans le Nord-Finistère : 1 chanteur en retrait de la plage de Saint-Jean-du-Doigt le 18 juin.

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus*.

La dernière est au Massereau/Frossay (44) le 30 août.

La première est contactée à Trunvel/Tréogat (29) le 10 avril.

En Loire-Atlantique, en dehors de l'aire principale de l'estuaire de la Loire, l'espèce est notée dans le Marais breton avec 6 couples et 1 isolé en mai et juin et au Chenal Neuf en Brière avec 1 chanteur en juin.

La nouveauté provient de la baie d'Audierne (29) où la turdoïde est contactée tout au long du printemps avec 1 chanteur à Trunvel du 3 mai au 18 juin et 1 chanteur à Kergalan/Plovan le 21 mai.

HYPOLAIS BOTTEE *Hippolais caligata*.

Un ind. est observé les 22 et 23 novembre à Ouessant (29), mais cette donnée n'a pas été homologuée par le C.H.N..

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*.

Cinq oiseaux passent en fin d'été : 2 du 6 au 9 septembre à Ouessant (29), 1 le 11 à Hoëdic (56) et 2 entre le 6 et le 12 octobre de nouveau à Ouessant.

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*.

Le passage automnal s'inscrit entre le 24 août et le 1er octobre, date à laquelle un individu est observé à Hoëdic (56).

La première est de retour le 10 avril au Loroux-Bottreau (44).

Si l'espèce est de nouveau notée à Quimper (29), sur le site de Lanniron cette fois-ci, avec des alarmes le 22 juin, le fait nouveau est la poursuite de la progression de l'espèce dans les Côtes-d'Armor : 3 couples sont découverts en forêt de Beffou/Loguivy-Plougras dans des jeunes plantations envahies de genêts *Sarothamnus scoparius*. Auparavant, la limite occidentale était, depuis 1992, à Coat Liou / Bourbriac

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata*.

En octobre et novembre, l'espèce apparaît sur des sites où elle n'est pas connue comme nicheuse. L'origine de ces oiseaux n'est pas déterminée, mais il est vraisemblable qu'il s'agit essentiellement de dispersions locales. C'est lors de ces mouvements, le 15 octobre, que 10 individus sont observés dans un buisson à l'Ile Grande / Trébeurden (22).

1 chanteur est entendu, sans suite, le 2 mars au Moulin Neuf / Plounérin (22), sur un site d'hivernage.

Au printemps, la pitchou est découverte dans une localité nouvelle de Loire-Atlantique, au Collet / Bourgneuf-en-Retz.

Si on s'en tient aux quelques dénombrements réalisés au printemps, l'espèce semble bien se porter: augmentation à Ouessant (29) avec plus de 20 couples, 50 sites découverts sans recherche dans les Monts d'Arrée (29), 13 sites dans les landes de Locarn (22).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*.

A Ouessant (29), l'espèce passe du 29 septembre au 4 novembre.

1 le 16 octobre au cap de la Chèvre/Crozon (29).

1 le 29 mai à Ouessant, 1 chanteur le 1^{er} juin à la Ville Galopin/Plévenon (22) et 1 chanteur le 6 juin à l'Île Grande/Pleumeur-Bodou (22).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*.

A Ouessant (29) le passage est noté du 9 août au 27 octobre.

Un individu particulièrement tardif est observé le 15 décembre à Saint-Marc/Saint-Nazaire (44).

La première est de retour au Loroux-Bottereau (44) le 10 avril.

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*.

A Ouessant (29), le passage d'automne se déroule entre le 31 août et le 27 octobre.

La première est de retour le 22 avril en Loire-Atlantique.

FAUVETTE A TÊTE NOIRE *Sylvia atricapilla*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 22 septembre au 23 novembre, avec un maximum du 8 au 19 octobre.

POUILLOT VERDATRE *Phylloscopus trochiloides*.

1 les 20 et 21 septembre à Ouessant (29).

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus*.

Trois oiseaux passent à l'automne par Ouessant (29) : 1 le 27 octobre et 2 le 5 novembre.

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*.

Le passage automnal est plus fourni qu'à l'habitude : 51 +/- individus sont dénombrés à Ouessant (29) entre le 3 octobre et le 17 novembre, 1 le 15 octobre à Primel/Plougasnou (29), 1 le 17 à Kerisit Vihan/Goulien (29), 1 le 11 décembre à Pissaison/Hillion (22).

Un individu hiverne dans le vallon du Stang Alar/Brest (29) où il est encore présent le 12 février.

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus*.

Quatre oiseaux passent à l'automne : 1 les 24 octobre, 17 et 23 novembre à Ouessant (29) et 1 le 5 novembre à Sein (29).

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*.

1 le 3 octobre à Ouessant (29).

1 chanteur le 14 avril en forêt du Gâvre et 1 autre le 7 mai en forêt de la Bretesche/Missillac (44).

Ces trois données sont les seules dont nous disposons, et nous sommes dans l'incapacité de savoir si cette espèce est en déclin ou tout simplement négligée. L'observation de Missillac est tout à fait intéressante car elle se situe à la limite de l'aire connue depuis de nombreuses années.

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*.

Au moins quatre individus passent à Ouessant (29) entre le 6 et le 13 septembre.

Le premier est signalé le 13 avril en forêt du Gâvre (44).

L'espèce semble avoir été très peu abondante en 1995, au moins dans le nord-ouest de la région : 1 seul chanteur le 5 juin en forêt du Cranou (29), aucun contact en forêt d'Huelgoat (29) ni sur les quelques sites traditionnels de la région morlaisienne ou encore dans les forêts de Beffou (22) et de Coat an Noz (22) malgré des recherches.

Ailleurs, les données sont également bien rares : deux dans les Côtes-d'Armor, deux dans le Morbihan, trois en Loire-Atlantique et zéro en Ile-et-Vilaine ! Mais nous ne savons pas quel a pu être l'effort de prospection.

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*.

Erratum : les Pouillots véloce de type sibérien *P.c. tristis/fulvescens* annoncés, dans la synthèse précédente, les 16 octobre, 11 et 12 novembre 1993 à Hoëdic (56) ont été observés en 1994.

Le passage se déroule du 29 août au 24 novembre à Ouessant (29) avec un maximum du 7 octobre au 4 novembre.

Quatre pouillots véloce de type sibérien *P.c. tristis/fulvescens* ont été observés à Ouessant entre 28 octobre et le 6 décembre. Sur ce même site, la sous-espèce *P.c. abietinus* est identifiée à douze reprises entre le 16 octobre et le 17 novembre.

2 *P.c. abietinus* sont notés à Sein (29) le 11 novembre.

Le passage de printemps prend place entre le 15 février et le 3 mai à Ouessant.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*.

Le passage s'étend du 8 août au 4 novembre à Ouessant (29).

1 le 11 novembre à Sein (29).

Le premier est noté à l'étang de Beaufort/Plerguer (35) le 22 mars.

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*.

Le passage est noté entre le 6 septembre et le 23 novembre à Ouessant (29).

1 individu émettant un chant mixte (*R. regulus* x *R. ignicapillus*) est découvert le 22 mai dans la vallée du Douron/Plouigneau (29). Rappelons qu'il est important de vérifier l'identité d'un oiseau émettant un chant de Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus* ne paraissant pas absolument pur.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU *Regulus ignicapillus*.

Les premiers sont notés à la descente le 8 septembre, mais le passage n'est observé à Ouessant (29) que du 18 septembre au 6 décembre.

Trois chanteurs sont découverts au printemps : 2 dans la parcelle 29 de la forêt du Cranou/Hanvec (29) et 1 début juin au bois Riou/Trévou-Tréguignec (22).

GOBEMOUCHE GRIS *Musicapa striata*.

Le passage se déroule du 19 août au 11 octobre à Ouessant (29).

Le premier contact n'est obtenu que le 5 mai à Ouessant.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva*.

8 oiseaux sont contactés à Ouessant (29) entre le 5 octobre et le 3 novembre.

GOBEMOUCHE A COLLIER *Ficedula albicollis*.

1 mâle est découvert à La Chapelle-sur-Erdre (44) le 1^{er} mai. Sauf erreur de notre part, il semble bien s'agir de la première donnée bretonne.

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*.

Le passage post-nuptial est noté du 23 juillet au 28 octobre avec un pic bien marqué à Ouessant (29) au début de septembre : 1 000+ le 6, des centaines les 7 et 8.

Il n'y a aucune donnée printanière.

PANURE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*.

Les premiers vol élevés sont notés le 21 septembre à Trunvel/Tréogat (29).

Quelques données automnales sont obtenues sur des sites où l'espèce ne niche pas : à Ouessant (29) jusqu'à 18 individus, dont 7 avaient été bagués au cours de l'été en baie d'Audierne (29), sont contactés entre le 9 octobre et le 5 novembre ; contact auditif le 6 novembre à Laoual/Plogoff (29) ; 1 le 27 novembre et 3-4+ le 17 décembre à Lez ar Mor/Goulven (29).

MESANGE A LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus*.

2 à Ouessant (29) les 22 et 28 septembre puis le 1er novembre.

MESANGE BOREALE *Parus montanus*.

1 ind. dont 1 chanteur le 27 février en forêt de Fougères (35).

Cette donnée est particulièrement intéressante dans la mesure où la forêt de Fougères est relativement proche des sites de reproductions normands et mayennais.

MESANGE NOIRE *Parus ater*.

Quelques mouvements sont décelés à l'automne : 2 ind. passent à Ouessant (29) entre le 18 et le 22 octobre et 1 ind. est à Sein (29) le 5 novembre, mais c'est en Loire-Atlantique qu'une " belle " invasion est notée du 26 octobre au 25 mars. En tout état de cause les effectifs concernés ont été nettement moindres que ceux de l'an passé.

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*.

Une première finistérienne est obtenue à Ouessant (29) où 1 individu séjourne du 28 septembre au 3 octobre.

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus*.

Une arrivée est constatée en octobre : 2 le 13 à Thouaré-sur-Loire (44), 1 le 15 à Sainte-Luce-sur-Loire (44), 1 le 18 puis 3 le 20 à Trunvel/Tréogat (29).

D'autres contacts sont obtenus en novembre : 2 le 6 à Trunvel, 1 le 11 à Hoëdic (56), 1 le 13 à Pradel/Guérande (44), 7 le 17 au Grand Village/Machecoul (44).

Un indice d'hivernage provient du Marais Breton : 1 le 13 janvier à Port-la-Roche/Machecoul.

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*.

Le dernier à Petit-Mars (44) le 7 août.

Le premier, particulièrement hâtif, est de retour à Clisson (44) le 30 mars.

1 chanteur, de passage, est à Saint-Vio/Tréguennec (29) les 20 et 28 mai.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*.

Encore 2 familles le 20 août au Massereau/Frossay (44).

5 individus passent sur les îles d'Hoëdic (56) et d'Ouessant (29) entre le 11 septembre et le 16 octobre.

La première est de retour à Donges (44) le 30 avril.

1 à Ouessant le 23 mai.

En période de reproduction, l'espèce est notée essentiellement en Loire-Atlantique. Deux localités non citées lors de l'enquête de l'année précédente y font l'objet de contacts : Basse-Goulaine et Fresnay-en-Retz.

En Ile-et-Vilaine, le 5 juin, il y a 7 couples dans le marais de Lillemer et 1 autre à Ercé-en-Lamée.

1 couple est découvert le 25 juin dans les Monts d'Arrée (29), près de la roche Saint-Barnabé/Le Cloître-Saint-Thégonnec. Malheureusement, il ne semble pas y avoir eu de recherches ultérieurement.

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*.

1 ind. le 16 octobre au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44), 1 le 20 novembre au lac de Murin/Massérac (44), 1 du 2 au 10 décembre à Kerfontaine/Sérent (56), 1 le 16 en forêt de Rennes (35), 1 le 13 mars au Carnet/Frossay (44).

1 donnée estivale tout à fait inattendue : 1 le 3 juillet à Petit-Mars (44).

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator*.

3 juvéniles entre le 30 août et le 29 septembre à Ouessant (29).

1 à Ouessant le 11 mai.

PIE BAVARDE *Pica pica*.

1 oiseau est présent pendant toute la période sur l'île de Sein (29).

CRAVE A BEC ROUGE *Pyrrhocorax pyrrhocorax*.

1 couple est accompagné de 5 juvéniles le 16 juillet à la pointe de Kastell Meur/Cléden-Cap-Sizun (29).

1 ind. du 31 août au 2 septembre à l'Ile Grande/Pleumeur-Bodou (22) ... 8 le 20 septembre à Lostmarc'h/Crozon (29) ... départs probables fin octobre à Ouessant (29) ... 1 le 25 novembre à Ar Vechen/Plonévez-Porzay (29) ... 12 en deux groupes le 8 juillet sur le littoral de Sauzon (56).

10 couples à Ouessant en 1995.

CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*.

1 à Ouessant (29) le 29 octobre.

2 sont observés dans une cavité d'arbre le 15 février au bois Le Beau/Erbrée (35). Ce type d'habitat ne semble guère utilisé en dehors des parcs léonards (29).

CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus*.

1 le 29 octobre à Ouessant (29).

CORNEILLE MANTELEE *Corvus corone cornix*.

Erratum : l'individu contacté l'an passé dans le fond de la baie de Saint-Brieuc (22) a été observée du 16 février (et non 20 novembre) au 8 mars.

1 individu a été contacté de 1993 à 1995 à Concarneau (29), 1 le 20 novembre dans l'anse d'Yffiniac (22) et 1 du 28 au 30 avril à Ouessant (29).

GRAND CORBEAU *Corvus corax*.

2 isolés sont observés loin des sites de reproduction connus, le 23 août à Châteaugiron (35) et le 2 octobre à la Chapelle-Chaussée (35).

ETOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris*.

Le passage se déroule entre le 2 octobre et le 17 novembre à Ouessant (29).

ETOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*.

Deux immatures ont été contactés à l'automne : 1 du 7 au 9 septembre à Ouessant (29) et 1 du 15 au 20 octobre à Hoëdic (56).

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*.

L'espèce n'est notée qu'en Loire-Atlantique et dans le Morbihan, à Bignan et Naizin.

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs*.

Le passage se déroule du 7 octobre au 17 novembre à Ouessant (29) avec un premier maximum du 14 au 18 octobre puis un second du 27 octobre au 4 novembre. Le pic est enregistré le 28 octobre avec plus de 100 000 individus dans la matinée. Un dernier passage est ressenti les 16 et 17 novembre.

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla*.

Le passage se déroule du 13 octobre au 23 novembre à Ouessant (29) avec deux maxima, du 28 octobre au 4 novembre puis les 16 et 17 novembre.

L'espèce a été peu notée en hiver, notons simplement : 10 le 2 décembre à Corseul (22), 20 le 18 en forêt de Vioreau/Joué-sur-Erdre (44), 1 000 le 14 février à Pleine-Fougères (35), 30 le 10 mars dans le bois d'Yvignac (22) et 40 le 31 au Breil/Petit-Mars (44).

Il n'y a aucun contact après le 31 mars.

SERIN CINI *Serinus serinus*.

A Ouessant (29), 2 ou 3 passent du 2 au 5 novembre alors qu'un autre est noté au printemps, le 21 mars.

VERDIER D'EUROPE *Carduelis chloris*.

A Ouessant (29), le passage automnal se déroule du 6 octobre au 4 novembre alors que le premier est de retour le 4 avril. Sur cette île, les nicheurs s'installent fin avril et début mai.

L'espèce est présente sur Sein (29) ; 7 le 1er octobre et 6 le 1er mai.

CHARDONNERET ELEGANT *Carduelis carduelis*.

L'espèce n'hiverné pas à Ouessant (29) où aucun contact n'est obtenu entre le 23 novembre et le 21 mars.

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*.

Le passage se déroule entre le 22 septembre et le 23 novembre avec un maximum du 28 octobre au 2 novembre à Ouessant (29).

Quelques beaux rassemblements sont notés en hivernage : 220 le 8 janvier à Bétineuc/Saint-André-des-Eaux (22), 500-600 le 11 février à Petit-Mars (44).

Les derniers disparaissent le 21 mars.

LINOTTE MELODIEUSE *Carduelis cannabina*.

A Ouessant (29), l'espèce est absente du 11 novembre au 17 mars.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*.

L'espèce a été moins rare cette année et parfois associée au Tarin des aulnes *Carduelis spinus* : 1 le 1er novembre et 2 le lendemain à Ouessant (29), 1 le 15 décembre au Moulin Neuf/Plounérin (22), 3 le 8 janvier à Bétineuc/Saint-André-des-Eaux (22), 1 le même jour à Petit-Mars (44), 1 le 12 à Bréquigny/Rennes (35), 1 le 12 février à Petit-Mars et 1 le 21 avril en forêt du Gâvre (44).

BEC-CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*.

Après une année d'abondance, les quelques données de la période font pâle figure : 4 le 12 août à Guerlesquin (29) ; 1 les 2, 8 et 22 septembre à Ouessant (29) ; 2 données dans la dernière décade d'octobre dans les Côtes-d'Armor ; 1 le 7 mars à Vertou (44).

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula*.

A Ouessant (29), l'espèce passe du 8 au 31 octobre.

GROSBEC CASSE-NOYAUX *Coccothraustes coccothraustes*.

1 le 10 octobre à Ouessant (29).

L'espèce hiverne du 19 novembre au 5 février à Porz an Trez/Saint-Martin-des-Champs (29), maximum 4-5+ le 11 décembre. Les oiseaux s'y nourrissent essentiellement de fruits de Charme (*Carpinus betulus*).

1 mâle le 2 mars à La Fontaine des eaux/Dinan (22), 1 cadavre le 19 à la cale de Vertou (44) et 1 couple " nicheur probable " le 4 avril en forêt de Coëtquen/Les Champs-Géraux (22).

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*.

Après la très faste année précédente, la dizaine d'observations collectées fait pâle figure.

Le passage automnal est circonscrit entre le 16 septembre et le 17 novembre.

Une seule autre donnée : 4 le 3 février en baie du Mont-Saint-Michel (35).

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*.

Le passage post-nuptial est bref, il se déroule du 21 octobre au 4 novembre.

20 sont à Pen ar C'hleuz/Tréflez (29) le 27 novembre et 2 à la Groue/Saint-Pol-de-Léon (29) du 11 décembre au 8 janvier.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla*.

L'espèce apparaît sur trois îles à l'automne : à Ouessant (29), huit observations sont réalisées entre le 25 septembre et le 4 novembre ; à Sein (29), 1 est présent du 22 au 24 octobre ; à Hoëdic (56), 1 est vu le 12 novembre.

BRUANT AUREOLE *Emberiza aureola*.

1 juvénile est présent à Sein (29) du 24 au 27 octobre. Il s'agit de la quatrième mention française et de la deuxième bretonne.

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 13 octobre au 5 novembre.

BRUANT MELANOCEPHALE *Emberiza melanocephala*.

1 mâle chante à l'étang de Kerloc'h/Crozon (29) le 9 mai.

BRUANT PROYER *Miliaria calandra*.

1 le 24 juillet à Kersiguenou/Crozon (29).

A Ouessant (29), 2 le 27 octobre et 1 le 1er novembre ; à Hoëdic (56), 1 le 13 novembre.

En dehors de la Loire-Atlantique et de la baie d'Audierne, l'espèce est notée en période de reproduction sur les communes de : Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Saint-Pabu, Sein (1 chanteur le 1er mai) (29), Bangor, Groix et Le Palais (56).

4 chanteurs sont découverts dans le Menez Hom (29) entre le 7 et le 9 juillet.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

- ANONYME, 1994 .- Observations de Sternes incas *Larosterna inca* en France. *Ornithos*, 1 : 98.
- ANONYME, 1995 .- Sortie aux étangs de Bosméléac et de Gourveaux. *Le Fou*, 35 : 20-23.
- ANONYME, 1995 .- Sortie Rance du 5/2/95. *Le Fou*, 36 : 41-45.
- ANONYME, 1995 .- Observer les oiseaux en Côtes-d'Armor. *Le Fou*, 36 : 46-47.
- BARGAIN (B.), FORTIN (M.), LE PROVOST (N.) & BOURDONNAY (D.) 1996 .- Note sur la nidification du Guêpier d'Europe *Merops apiaster* dans le Pays Bigouden. *Ar Vran*, 7 : 44-45.
- CADIOU (B.) 1995 .- Observatoire des oiseaux marins nicheurs. CREN-SEPNB. *Annuaire de réserves* 1995 : 131-154.
- CADIOU (B.) 1997 .- La reproduction des Goélands en milieu urbain : historique et situation actuelle en France. *Alauda*, 65 : 209-227.

- CADIOU (B.), ROUAULT (C.), CONSTANTIN (Y.) & DEPAYS (A.) 1996 .-**
Bilan de la saison de reproduction 1995 pour les oiseaux marins du Cap Fréhel.
Le Fou, 38 : 9-12.
- CAMBERLEIN (G.) & LE ROY (R.) 1995 .-**
Recensement ornithologique dans les Anses d'Yffiniac et de Morieux. Octobre 1994 à Septembre 1995. *Le Fou*, 37 : 5-8.
- DECEUNINCK (B.), MAHÉO (R.), MAILLET (N.) & LE BIROE FRANCE, 1996 .-**
Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France - janvier 1995.
Ornithos, 3 : 2-10.
- DUBOIS (PH.-J.) & LE C.H.N. 1995 .-**
Les oiseaux rares en France en 1994. *Ornithos*, 2 : 145-167.
- DUBOIS (PH.-J.), YÉSOU (P.) & LE C.H.N. 1995 .-**
Les Pouillots véloces *Phylloscopus collybita* de type *tristis/fulvescens* en France : statut et critère d'acceptation par le CHN. *Ornithos*, 2 : 170-174.
- DUBOIS (PH.-J.) & LE C.H.N. 1996 .-**
Les oiseaux rares en France en 1995. *Ornithos*, 3 : 153-175.
- DUBOIS (PH.-J.) & LE C.H.N. 1997 .-**
Les oiseaux rares en France en 1996. *Ornithos*, 4 : 141-164.
- DUBOIS (PH.-J.) & ROUGÉ (A.) 1994 .-**
Le coin des branchés. L'oiseau magazine, 37 : 64-65.
- FOUQUET (A.) 1995 .-**
Un goéland à bec cerclé au port du Légué. *Le Fou*, 35 : 13-15.
- DUQUET (M.) 1995 .-**
Des Sternes incas *Larosterna inca* en France en 1994. *Ornithos*, 2 : 184-185.
- GABORY (O.) 1997 .-**
L'Édicnème criard en Maine-et-Loire et Loire-Atlantique : quelques faits marquants. *Spatule*, 5 : 49-54.
- G.O.B. FINISTÈRE, 1994-1995 .-**
Oiseaux du Finistère. Sélection d'observations du 16 juillet 1994 au 15 juillet 1995. : 1-8.
- G.O.B MORBIHAN, 1994 .-**
Observations ornithologiques pour la période du 16 mars 1994 au 15 novembre 1994. *Ar Vran Morbihan*, 9 : 5-48.
- G.O.B MORBIHAN, 1994-1995 .-**
Observations ornithologiques pour la période du 16 novembre 1994 au 15 mars 1995. *Ar Vran Morbihan*, 10-11 : 7-26.
- G.O.B MORBIHAN, 1994-1995 .-**
Observations ornithologiques pour la période du 16 mars 1995 au 15 novembre 1995. *Ar Vran Morbihan*, 10-11 : 27-54.
- G.O.L.A., 1992 .-**
Les Oiseaux de Loire-Atlantique du XIXème siècle à nos jours, 285 p..
- G. O. B., 1997 .-**
Les Oiseaux nicheurs de Bretagne, 1980-1985. Brest, 292 p.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES COTES D'ARMOR, 1995 .-**
Actualités ornithologiques du 16 juillet 1994 au 15 novembre 1994. *Le Fou*, 37: 11-32.

GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR, 1995 .-

Actualités ornithologiques du 16 novembre 1994 au 15 mars 1995. *Le Fou*, 37 : 33-53.

GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR, 1996 .-

Actualités ornithologiques du 16 mars 1995 au 15 juillet 1995. *Le Fou*, 38 : 28-51.

GROUPE ORNITHOLOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE .-

Notes d'informations.

GRUWIER (X.) & BOUSSEDID (N.) 1995 .-

Observation d'un Merle de roche sur la réserve naturelle des 7 Iles. *Le Fou*, 35 : 19.

GUERMEUR (Y.) 1994 .-

Bulletin du Centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 11 : 1-55.

GUERMEUR (Y.) 1995 .-

Bulletin du Centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 10 : 3-28.

GUERMEUR (Y.) & MONNAT (J.-Y.) 1980 .-

Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne. ARPEGE, 240 p.

LE BAIL (J.) 1998 .-

Concentration occasionnelle d'oiseaux d'eau sur les plaines inondables du Val de Loire en amont d'Ancenis lors de la migration pré-nuptiale 1995. *Spatule*, 7 : 51-56.

LE FLEM (K.), LE FLEM (J.), BOUET (P.) & PASCAL (M.) 1995 .-

Observation d'une Glaréole à collier à l'île Grande. *Le Fou*, 35 : 19.

LE MAO (P.) 1997 .-

La Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*) en Bretagne. Histoire et situation récente. *Ar Vran*, 8 : 55-65.

LE ROY (R.) 1995 .-

Bernaches cravant - Saison 94-95. *Le Fou*, 36 : 27.

LE ROY (R.) 1996 .-

Suivi ornithologique de "l'Enrochement du Légué / St-Brieuc" en 1995. *Le Fou*, 39 : 24-28.

LE ROY (R.) & PETIT (J.) 1996 .-

Résultats des dénombrements d'oiseaux d'eau réalisés dans les Côtes-d'Armor en janvier 1995 et janvier 1996. *Le Fou*, 39 : 18-23.

LPO 44, 1996 .-

Chronique ornithologique Loire-Atlantique : 1994. *Spatule*, 2 : 17-57.

LPO 44, 1996 .-

Nidification de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* en France. *Ornithos*, 3 : 21.

LPO 44, 1997 .-

Chronique ornithologique de Loire-Atlantique en 1995. *Spatule*, 3 : 33-72.

MAHÉO (R.) 1995 .-

Bernache cravant - Stationnements en France - Saison 1994-95. Université de Rennes 1.

MAHÉO (R.), 1995 .-

Limicoles séjournant en France : janvier 1995. Rapport de convention ; O.N.C.- Université de Rennes 1.

MARSOUIN (A.) 1995 .-

Sternes et Grands Cormorans dans l'archipel de Bréhat. *Le Fou*, 37 : 9-10.

- MAUVIEUX (S.) 1996 .-** Espèces accidentelles et rares dans les Côtes-d'Armor, mise à jour n°4. *Le Fou*, 40 : p. 7-33.
- MICHEL (H.) 1995 .-** Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 39 : 64-65.
- MICHEL (H.) 1995 .-** Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 40 : 64-65.
- MICHEL (H.) 1995 .-** Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 41 : 62-63.
- MICHEL (H.) & ROUGÉ (A.) 1994 .-** Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 38 : 56-57.
- MONTFORT (D.) 1996 .-** Guifettes noires briéronnes : effectifs nicheurs, niveaux d'eau et pâturage. *Spatule*, 2 : 9-12.
- MONTFORT (D.) 1997 .-** La Guifette noire *Chlidonias niger* : influence de la gestion des niveaux d'eau sur les effectifs nicheurs. Exemple de la Brière. *Spatule*, 5 : 27-39.
- MUSSEAU (R.) 1997 .-** L'Œdicnème criard (*Burhinus oedecnemus*) en Loire-Atlantique. *Spatule*, 3 : 5-18.
- MUSSEAU (R.) 1997 .-** Etude de l'évolution d'une population de Chouette chevêche (*Athene noctua*) dans un contexte de restructuration foncière. *Spatule*, 3 : 29-32.
- POURREAU (J.) 1996 .-** Dénombrement des oiseaux des zones humides hivernants en Loire-Atlantique -janvier 1995- *Spatule*, 2 : 63-93.
- PULCE (P.) 1997 .-** Espèces occasionnelles complément de la mise à jour n°4. *Le Fou*, 41 : 4-8.
- PULCE (P.) 1997 .-** Espèces occasionnelles complément de la mise à jour n°4 (suite). *Le Fou*, 42 : 28-30.
- RABOIN (D.) & BOURLÈS (J.) 1997 .-** Enquête sur la Chouette chevêche (*Athene noctua*) en Loire-Atlantique et bilan pour la période 1992-1996. *Spatule*, 5 : 61-75.
- REEBER (S.), MARION (L.) & BORET (P.) 1996 .-** Premières tentatives de nidification de la Mouette pygmée *Larus minutus* en France. *Ornithos*, 3 : 41-43.
- ROBIC (J.-F.) 1997 .-** Dénombrements des Gravelots à collier interrompu en Morbihan en 1995. *Ar Vran Morbihan*, 12 : 30-31.
- ROUILLER (P.) & POUVREAU (O.) 1997 .-** Notes sur le statut de l'Aigle botté *Hieraetus pennatus* en Vendée. *Spatule* 5, : 39-46.
- S.E.P.N.B., 1994 .-** Annuaire des réserves 1994. S.E.P.N.B. 113 p.
- S.E.P.N.B., 1995 .-** Annuaire des réserves 1995. S.E.P.N.B. 128 p.
- SEPNB, GROUPES DE DOUARNENEZ, QUIMPER, PAYS BIGOUDEN, CONCARNEAU, TRÉGUNC, 1995 .-** Recensements d'oiseaux d'eau à la mi-janvier 1995.

SÉRIOT (J.), TROTIGNON (J.) & LES COORDINATEURS ESPÈCE, 1996 .-

Oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 1994 et 1995. *Ornithos*, 3 : 97-117.

YÉSOU (P.) 1997 .-

Nidification de la Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* en France, 1965-1996. *Ornithos*, 4 : 54-62.

NOTES INEDITES

Y. AUTRET, B. BARGAIN, C. COLIN, A. DESNOS, P. HAMON, E. DE KERGARIOU, P. LEON, P. LE MAO, R. MAHEO, J. MAOUT, J.P. MEURET, J.Y. PERON, P. PULCE, G. RAULT, B. TREBERN.

et les données du BIROE FRANCE.

Patrick LE MAO
2 Clos de la Fontaine
35 800 Saint-Briac

Jacques MAOUT
16 rue du Croissant
29 600 Morlaix