

**OBSERVATION D'UNE FAMILLE
DE
BECS-CROISES DES SAPINS
(*Loxia curvirostra*)**

EN FORET DE LANOUEE (MORBIHAN)

Par Mikael CHAMPION

0079

INTRODUCTION

Le Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*, robuste fringille au bec très particulier est relativement mal connu en Bretagne. Le nombre d'observations pour cette espèce varie énormément selon les années. L'espèce est contactée en de multiples endroits lors des années d'invasions comme l'hiver 1983/1984 par exemple (YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1994) mais en dehors de celles-ci les observations restent sporadiques. Le Bec-croisé des sapins est noté nicheur pour la première fois en Bretagne en 1984, dans le massif de Camors dans le Morbihan alors qu'un couple est observé à Saint-Nicodème dans les Côtes d'Armor le 23 mai de cette même année (ILIOU, 1997). Notons que ces deux observations font suite à une période d'invasion.


L'observation d'une famille de cette espèce au cours du printemps 2000 en forêt de Lanouée est à l'origine de cette note.

LES FAITS

Le 21 mai 2000, après une opération concertée avec plusieurs collègues ornithologues, ayant pour but le recensement des ZNIEFF forestières de Bretagne, organisée par le G.O.B., Jean-Philippe MEURET et moi-même décidons de profiter de notre déplacement en pays morbihannais pour découvrir un secteur que nous n'avons pas l'habitude de prospecter.

Après nous être engagés dans la forêt de Lanouée au lieu-dit « la Mare aux canards », empruntant ainsi le sentier traversant une futaie de Pins sylvestres, des petits cris, faibles et plaintifs, attirent notre attention. Nous nous arrêtons quelques instants et tentons de localiser l'origine de ces cris. Nous levons la tête et à la cime des pins bordant l'allée forestière, nous apercevons tout d'abord deux oiseaux assez ternes, au plumage brun verdâtre, largement striés sur tout le corps, mais que nous n'identifions pas immédiatement. Puis notre attention se porte sur la cime de l'arbre voisin, où vient d'apparaître un autre oiseau. A ce moment, le doute n'est plus possible. A une quinzaine de mètres du sol et juste devant nous, une boule de plumes d'un rouge brique, sur laquelle les ailes noirâtres et la queue courte et bien échancrée se démarquent

nettement, attire notre attention. Le Bec-croisé des sapins mâle nous honore de sa présence et nous offre un spectacle peu habituel. L'individu est bientôt rejoint par la femelle dont le plumage proche de celui des juvéniles se démarque par ses couleurs plus chaudes et son croupion jaunâtre. Les quémantes des deux jeunes reprennent de plus belle et ceux-ci rejoignent les adultes que nous ne quittons pas des yeux. Nous avons la chance d'assister à ce superbe spectacle, rare dans notre région, et d'examiner les oiseaux sous toutes leurs coutures car ceux-ci prennent des positions diverses tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers afin d'extraire les graines des petits cônes des pins. Entre deux séances d'acrobaties et de positions périlleuses nous assistons à des moments plus « attendrissants » en particulier lorsque les jeunes viennent chercher la becquée auprès des adultes qui régurgitent les graines ainsi prélevées. Nous profitons de ce spectacle pendant environ une vingtaine de minutes avant de voir la petite famille s'enfoncer tranquillement dans la forêt passant d'arbre en arbre en exploitant la cime de ces derniers.



DISCUSSION

Il est intéressant de noter l'essence sur laquelle a été observée l'espèce. En effet, en Europe il existe deux populations bien distinctes de Becs-croisés des sapins (YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1994). La première, que l'on trouve dans le nord de l'Europe ainsi que dans les Vosges, le Jura et les Alpes, est liée aux Epicéas. La seconde, que l'on observe dans les Pyrénées, les Cévennes ou en Corse, est inféodée aux Pins (sylvestres, à crochets,...). Les oiseaux de cette seconde population ont pour particularités d'avoir un bec plus fort et d'être géographiquement plus stables que ceux rencontrés en Europe du nord (YEATMAN-BERTHELOT ET JARRY, 1994 ; GÉROUDET, 1998).

Or, rappelons que l'observation réalisée en forêt de Lanouée s'est faite dans une futaie de Pins sylvestres et que le 17 mai 2000 une dizaine d'oiseaux apparemment cantonnés ont été observés, dans cette même forêt, par Patrick HAMON dans une futaie, là aussi, de Pins sylvestres (com. pers.). Ceci nous amène à penser que ces oiseaux auraient peut-être une origine plutôt méridionale.

Alors, s'agit-il d'une petite population liée aux Pins et installée en Bretagne depuis longtemps ? Ou tout simplement un cas de reproduction faisant suite à une invasion passée. Notons tout de même, l'existence du couloir de pinèdes que constituent les Landes, la Vendée et le sud Bretagne le long du littoral atlantique, ce qui pourrait expliquer cette présence d'oiseaux méridionaux. Il faut, malgré tout, rester prudent car ce ne sont que des hypothèses et seule une description plus détaillée de la morphologie du bec aurait peut-être pu confirmer ces dernières. La situation du Bec-croisé des sapins en Bretagne est mal connue et mérite d'être approfondie. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les lacunes sur les connaissances concernant cette espèce, dans notre région. C'est peut-être une espèce qui, effectivement, est peu commune en Bretagne mis à part les années d'invasions et dont la reproduction reste très ponctuelle. D'autre part, la faible pression ornithologique dans l'intérieur des terres est à prendre en compte. En effet, un manque de prospection des forêts, une époque de reproduction peu propice aux prospections forestières et une strate difficile d'accès visuel, contribuent à une mauvaise image de son statut. L'ornithologie bretonne est très orientée vers la bande littorale et délaisse forêts, landes et bocage ce qui rend la prospection beaucoup moins forte en centre Bretagne où se trouve l'essentiel des forêts, habitat exclusif du Bec-croisé des sapins.

Sans l'opération de recensement des ZNIEFF forestières, cette famille, nous renseignant sur un nouveau cas de reproduction de l'espèce en Bretagne serait sans doute passée inaperçue. Une meilleure prospection des milieux forestiers nous permettrait sans doute d'obtenir une meilleure connaissance du statut du Bec-croisé des sapins en Bretagne et éventuellement de ses origines.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tout particulièrement Jacques GAROCHE pour m'avoir encouragé à rédiger cette note ainsi que Jean-Philippe MEURET, Thierry et Marianne QUELENNEC pour les corrections qu'ils ont apportées.

BIBLIOGRAPHIE

- YEATMAN-BERTHELOT (D.) & JARRY (G.) 1994.- Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989
Société Ornithologique de France, Paris. pages 704-705
- GÉROUDET (P.) 1998.- Les Passereaux d'Europe II : De la Bouscarle aux Bruants.
Delachaux & Niestlé S.A., Neuchâtel (Switzerland), 512 p.
- ILIOU (B.) 1997.- Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* in G.O.B. Les oiseaux
nicheurs de Bretagne 1980-1985,

Mikael CHAMPION
1, Allée de l'Isole
29280 PLOUZANE