

OBSERVATION D'UNE GUIFETTE NOIRE
(*Chlidonias niger*)

EN PERIODE HIVERNALE

EN BRETAGNE



Par Bernard ILIOU

0083

L'observation de certaines espèces en Bretagne en dehors des périodes favorables à leur présence, interpelle régulièrement les naturalistes au sujet des connaissances et des *a priori* qu'ils peuvent avoir sur le statut régional des oiseaux.

Ce fut le cas, ce matin du 19 février 1999, lors d'un recensement de l'avifaune hivernante sur l'étang au Duc de Ploermel dans le Morbihan. Parmi les Laridés présents ce jour là, ce trouvait un oiseau à la silhouette et au vol caractéristique évoquant la Guifette noire (*Chlidonias niger*). Cette présence hivernale me laissa quelques instants septique sur la validité de mon observation. En effet, à cette époque de l'année, cette espèce stationne pour l'essentiel de sa population occidentale dans le golfe de Guinée (YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1994). Peu de temps après, l'oiseau vint se poser sur un ponton d'amarrage à une dizaine de mètres de mon poste d'observation et me conforta ainsi sur ma première détermination. Cette Guifette noire adulte, au plumage usé, semblait dans un état d'extrême fatigue. Elle ne resta que quelques minutes et repris, malgré tout, son envol en direction du sud.

Un examen des données recueillies en Bretagne au cours des quatre dernières décennies (C.O.B. & G.O.B.) révèle une seule et unique mention de présence hivernale de cette guifette, avec un individu observé le 29 janvier 1995 au lieu dit Birhit sur la commune de Sarzeau dans le Morbihan (LE MAO & MAOUT, 1999). En Bretagne, la Guifette noire est très localisée durant la période de nidification. La Brière en Loire Atlantique est le principal site français avec une population oscillant entre 30 et 300 couples (110 couples en 1983) selon les années (RECORBET, 1997). Lors des passages migratoires, on peut la rencontrer, évoluant au dessus des marais, des lacs, mais aussi près des rivages maritimes. Le passage postnuptial se déroule de la deuxième décennie du mois d'août à la mi-octobre, avec un point culminant qui se situe fin août début septembre.

Plusieurs données tardives sont relevées dans la littérature bretonne : un individu le 11 novembre 1968 (site non précisé), un à l'étang du Cranic à Brech dans le Morbihan le 17 novembre 1984, un le 18 novembre 1973 à Moustierlin / Fouesnant et un autre dans l'estuaire de la Penzé dans le Finistère.

Au printemps, la migration est à son maximum autour de la mi-avril, cependant des oiseaux sont notés durant le mois de mars pour les plus précoces, (le 9 mars 1975 et le 12 mars 1989) (LE BAIL, 1992).

En France, La présence de la Guifette noire en période hivernale demeure un fait très rare et n'a pas été signalée lors de la dernière enquête nationale 1977-1981 (YEATMAN - BERTHELOT, 1991). Pour la même époque, l'espèce est cependant signalée en Bretagne et plus précisément en grande Brière en Loire Atlantique (C.O.B., 1986) .

S'agit-il d'individus hivernants de manière ponctuelle, d'oiseaux n'ayant pu rejoindre leurs quartiers d'hivernage pour des raisons physiologique, ou de migrateurs précoces annonçant les mouvements prénuptiaux ? Dans l'état actuel de nos connaissances, nous nous en tiendrons à ces hypothèses.

BIBLIOGRAPHIE

BERTHELOT (D.) & TROTIGNON (J.) 1994.-

Guifette noire, *Chlidonias niger* in YEATMAN-BERTHELOT (D.) & JARRY G.). *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989*, S.O.F., Paris : 356-359.

LE BAIL (J.) 1992.-

La Guifette noire (*Chlidonias niger*), in Les oiseaux de Loire Atlantique du 19 siècle à nos jours. Groupe Ornithologique de Loire Atlantique : 171-172.

LE MAO & MAOUT (J.) 1999.-

Synthèse des observations ornithologiques Bretonnes entre les 16/07/1994 et 15/07/1995. *Ar Vran*, 10 (2) : 73-75.

C. O. B., (1986) .-

Atlas de la présence hivernale des oiseaux de Bretagne, *Ar Vran*, Tome XII, Fasc. 3 : 73.

C. O. B., (1968-1990) .-

Actualités ornithologiques et notes d'ornithologie bretonne Publications *Ar Vran* et bulletins de liaison.

G. O. B., (1990-2000) .-

Publications *Ar Vran* et bulletins de liaison.

RECORBET (B.) 1997 .-

Guifette noire (*Chlidonias niger*), in G.O.B. *Les oiseaux nicheurs de Bretagne*, 1980-1985, Brest : 135.

YEATMAN-BERTHELOT (D.) 1991.-

Atlas des oiseaux de France en hiver, Paris, S.O.F., 575 pages.

Bernard ILIOU
La Ville Gleuhiel
56120 – GUEGON