

OBSERVATION D'UN ROBIN A FLANCS ROUX
(*Tarsiger cyanurus*)
en juillet
DANS LE MORBIHAN

Par Yann KERNINON

0087

DATE ET LIEU DE L'OBSERVATION :

Le 25/07/01 - 9h30 - Etang d'Er Varquez/Crucuno – Erdeven 56

DESCRIPTION DE L'OBSERVATION ET DE L'OISEAU

(+ DUREE DES DIFFERENTES PHASES EN SECONDES) :

Installé dans une trouée de la végétation, je « balaye » au télescope la surface de l'étang pour la énième fois. Du coin de l'œil, je remarque les mouvements d'un oiseau se déplaçant à couvert dans un saule situé à 4 ou 5 mètres de mon poste d'observation.

Je lève les yeux : le "jizz" de l'oiseau me fait d'abord penser à un Rouge-gorge familier (*Erithacus rubecula*), mais, et bien que l'oiseau soit à l'ombre, je remarque aussi une zone claire à la gorge (5 sec.). Je m'apprête à lever mes jumelles quand la tête de l'oiseau (à partir de la poitrine) apparaît à découvert dans le feuillage à 3 mètres de moi. Je note aussitôt que le blanc de la gorge est bien marqué, comme une bavette, que l'œil noir est cerclé de très pâle et que le bec est petit et noir (3 sec.).

L'oiseau s'envole ensuite et passe devant moi à 2 ou 3 mètres en parcourant 5 à 6 mètres. La coloration générale apparaît d'un brun sale uni, plus terne qu'un Rouge-gorge, celle du dessous a paru grise... Mais c'est la queue et le croupion qui retiennent le plus mon attention : ils sont d'un **bleu terne**. Le **bleu** des rectrices est apparu plus vif au moment où l'oiseau a freiné brusquement, queue en éventail, pour se poser à nouveau (3 sec.). L'oiseau a recommencé alors sa progression dans la végétation et a disparu rapidement (3 sec.).

J'attendrai ensuite une heure sans voir l'oiseau réapparaître. Sans guide sous la main, je me suis perdu en conjectures sur son identité. Par association d'idées (colorées !), j'ai pensé à une Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*), à un Rouge-queue noir (*Phoenicurus ochruros*), à un Traquet quelconque, un Monticole... et une seule chose m'apparaît certaine : je ne connais pas d'oiseau avec une queue bleue !

Plus tard, en ouvrant le "Guide Ornitho" (MULLARNEY & al., 1999) je « tombe » rapidement sur la femelle du Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus*, mais un regard à sa carte de répartition me fait douter. Je consulte ensuite le "Peterson" (PETERSON & al., 1984), le G.E.O.P.O (BEAMANN & MADGE, 1998) et trouve finalement un dessin de l'oiseau en vol par H. HEINZEL (HEINZEL & al., 1996) dans son guide, qui ressemble beaucoup à ce que j'ai vu sur le terrain. A noter quand même que je n'ai rien remarqué de roux chez « mon » oiseau. J'apprendrai plus tard que l'oiseau a été noté au moins une fois en France à Ouessant le 27/10/1993 (MAOUT, 1998 ; DARMANDIEU & FOURNET, 1998). Malgré la brièveté de l'observation (14 secondes environ, dont 8 où l'oiseau n'est qu'une ombre ou presque !), j'ai néanmoins rédigé une fiche à destination du Comité d'Homologation National (C.H.N.) qui d'ailleurs n'homologuera pas cette observation.

J'ai ensuite cherché à me documenter sur les autres observations éventuelles de l'espèce en France et ailleurs en Europe : 13 apparitions en Grande-Bretagne (surtout en septembre-octobre), 2 aux Pays-Bas, 1 au Danemark, 4 en Norvège, 9 en Suède, 3 en Estonie, 1 en Pologne, 2 en Allemagne, 1 en République tchèque et 3 en Italie... jusqu'en 1995, mais rien pour la France, exceptée la donnée de 1993 sur l'île d'Ouessant, et surtout peu ou pas de détail sur les dates d'apparition de l'espèce. D'où le titre de cette note.

DESCRIPTION RECAPITULATIVE

Taille et allure : très proches de celles du Rouge-gorge familier.

Coloration générale :

- dessus brun sale, plus terne que celui du Rouge-gorge familier.
- dessous plus clair, gris. Haut de la poitrine plus brun.
- la queue et tout le croupion sont de couleur bleue, sans éclat (sauf un court instant de l'observation, mais cela reste moins intense que le bleu de la Gorge bleue à miroir).
- tête brun sale, oeil noir avec cercle oculaire très pâle, bec petit et noir. Bavette blanche bien marquée s'élargissant vers le bas (effet accentué par la coloration brun-gris du haut de la poitrine).

Comportement : l'oiseau était vif, se déplaçant rapidement (à environ 2 mètres de hauteur), changeant souvent de position. A l'envol, il a perdu un peu de hauteur et a parcouru à découvert (côté étang) et en ligne droite environ 5-6 mètres d'un vol légèrement ondulé avant de virer brusquement sur l'aile pour se poser, recommençant aussitôt à progresser dans la végétation.

Voix : rien de remarquable, 1 ou 2 "pit-pit" au début de l'observation.

BIBLIOGRAPHIE

- BEAMANN (M.) & MADGE (S.) 1998.- *Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental*. Nathan. 872 p.
- DARMANDIEU (H.) & FOURNET (T.) 1995.- Première mention française du Robin à flancs roux. *Ornithos* :
- HEINZEL (H.), FITTER (R.) & PARSLow (J.) 1996.- *Oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient*. Delachaux et Niestlé. 384 p.
- MAOUT (J.) 1998.- Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1993 et 15/07/1994. (deuxième partie). *AR VRAN*, 9 (2) : 79-120.
- MULLARNEY (K.), SVENSSON (L.) & ZETTERSTRÖM (D.) 1999.- *Le guide Ornitho*. Delachaux et Niestlé. 401 p.
- PETERSON, (R.T.), MOUNTFORT, (G.), HOLLOM, (P.A.D.) & GÉROUDET, (G.) 1984.- *Guide des oiseaux d'Europe*. 10^{ème} édition. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris.

Yann KERNINON
Bodavel
56 330 - CAMORS

Note de la rédaction :

Le lecteur doit considérer que les propos émis dans la présente note, le sont sous la seule responsabilité de son auteur. Le comité de rédaction de la publication *Ar Vran* ne s'autorise en aucune manière à confirmer ou infirmer les faits relatés et le diagnostic présenté. Cette attitude doit être admise pour toutes les observations d'espèces très rares en Bretagne.