

MOUETTE DE ROSS *Rhodostethia rosea* **DANS LE FINISTERE EN 2007 :** **JAMAIS DEUX SANS TROIS**

Dire que nous avions, en 2007, appelé cette note : "Mouette de Ross : déjà une mais alors deux...", les derniers jours de cette même année, nous ont obligés à réécrire le titre mais aussi la note.

Le début de l'année 2007, a été marqué par l'observation exceptionnelle de deux mouettes de Ross dans le Finistère : . Déjà qu'une observation est chose rare dans notre pays, mais alors deux ! L'inventaire des oiseaux de France (Dubois P.J. et *al.*, 2001) fait mention de deux oiseaux, l'un tué en 1913 à la Faute-sur-Mer (Vendée) et l'autre observé en 1994 à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), depuis l'espèce a été observée deux nouvelles fois au Clipon (Nord) en 2000 et 2004 (Frémont J.Y., Duquet M. & le CHN, 2006). A chaque fois il s'agit d'oiseaux adultes, sauf pour la donnée de 1913 pour laquelle seul le sexe est donné (mâle) mais pas l'âge.

En 2007, le premier oiseau a été trouvé par Aurélien Audevard, le 21 janvier, dans le port de pêche de Douarnenez (finistère). Cet oiseau adulte s'est laissé observé

pendant cinq jours, jusqu'au 25 janvier. Le second oiseau, un premier hiver, a été découvert par Joël Théry-Sanquer le 12 février dans le port de pêche du Conquet (Finistère). Il restera malheureusement très peu de temps avant de repartir au large. Dans les deux cas, l'identification ne laisse aucun doute car des photos ont été prises permettant de confirmer l'identification (cependant les données sont en cours d'homologation par le CHN).

Après ces deux observations, on pensait qu'il se passerait du temps avant une autre venue de l'espèce dans notre pays. Et pourtant moins de 12 mois après, le 27 décembre 2007, un oiseau est découvert, à nouveau dans le port de Douarnenez, par Mikael Champion. Cet oiseau présente un plumage peu commun dans les observations d'Europe occidentale (A. Audevard, *comm. pers.*). Il s'agit d'un plumage de premier hiver en cours d'acquisition. On observe des restes de plumage juvénile (plumes brunâtre sur la calotte, sur la poitrine, sur la nuque, les moyennes couvertures, et sur le manteau).



photo 1 : mouette de Ross adulte (port de Douarnenez, janvier 2007). A. Audevard.



photo 2 : mouette de Ross 1er hiver (port de Douarnenez, janvier 2008). T. Quelennec.

Mise à part le fait qu'il s'agit à chaque fois d'observations hivernales, il ne ressort pas de date d'observation préférentielle pour l'espèce dans notre pays, puisque les sept données ont été recueillies sur cinq mois différents (octobre, décembre, janvier, février et avril).

Cette triple observation est l'occasion de revenir sur cette espèce "mythique" qui fait rêver de nombreux ornithologues, au premier rang desquels les amateurs de laridés, bien évidemment. D'ailleurs les deux oiseaux de Douarnenez, du fait de la longueur de leur stationnement, ont drainé des amateurs de toute la France. A ce propos, le stationnement du dernier oiseau aura été particulièrement long, avec 14 jours de présence (du 27 décembre au 10 janvier), il s'agit du plus long stationnement enregistré dans notre pays.



photo 3 : malgré sa petite taille, la mouette de Ross révèle un caractère béliqueux. En phase d'alimentation, elle attaque presque systématiquement les mouettes rieuses *Larus ridibundus* qui s'approchent d'elle (Douarnenez, janvier 2008). T. Quelennec.

La mouette de Ross est un petit laridé assez proche en morphologie de la mouette pygmée *Larus minutus* mais qui s'en différencie par des ailes plus longues et plus pointues ainsi qu'une queue cunéiforme, plus longue aussi. Son oeil apparaît plus grand et son bec plus court (Malling Olsen K. & Larsson H., 2003). Chez l'adulte, le dessous de l'aile n'est pas noirâtre comme chez la mouette pygmée et les dessins de la face sont différents. Chez le premier hiver la queue présente juste une tâche noire centrale à sa pointe (cependant, sur l'oiseau observé fin décembre 2007, le noir s'étendait sur 8 rectrices), contrairement à la mouette pygmée de même âge qui a une barre terminale ou dans certaines variations de plumage deux tâches noires sur les rectrices externes. En outre, la mouette de Ross de 1er hiver ne présente pas de calotte foncée.

La mouette de Ross est un nicheur des hautes latitudes de l'arctique, dans les marais de la Toundra. Les principales zones de reproductions se rencontrent dans l'est de la Sibérie. Des petites populations (probablement pas permanentes) se trouvent au Groënland et en Amérique du nord, cependant la plus méridionale située à Churchill (Canada) a disparu (P.J. Dubois, *comm. pers.*). Elle hiverne en général dans des zones où la glace est permanente. On l'observe rarement plus au sud, en Europe du nord. Jusqu'en 2000, on comptait 75 données en Grande-Bretagne et 7 en Hollande (Malling Olsen K. & Larsson H., 2003). De ce fait, on peut légitimement se poser la question du pourquoi de ces trois observations la même année. La progression de l'ornithologie et de l'identification, souvent évoquées pour

certaines espèces, ne peut pas expliquer ici les trois observations bretonnes (d'ailleurs les premières pour la région, ce qui est étonnant). En effet, les critères d'identification de cette mouette n'ont pas progressé entre 2007 et les années précédentes. L'hypothèse émise concerne la possibilité d'une plus grande fréquence des tempêtes hivernales dans la zone d'hivernage de la mouette de Ross. Cette hypothèse a aussi été avancée pour expliquer le plus grand nombre d'observations de goélands à ailes blanches (P.J. Dubois, *comm. pers.*). Ce que l'on peut constater, et qui va dans ce sens, c'est que les trois observations finistériennes ont été précédées de fort coups de vent (A. Audevard, *comm. pers.*).

Je remercie tout particulièrement A. Audevard, M. Champion et P.J. Dubois.

Thierry Quelennec
9 rue d'Alsace
29290 SAINT-RENAN

BIBLIOGRAPHIE

Malling Olsen K. & Larson H., 2003. *Gulls of North America, Europe, and Asia*. Princeton University Press, Princeton : 608p.

Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2001. *Inventaire des oiseaux de France*. Nathan, Paris : 397p.