

Ar Vran

Revue d'ornithologie bretonne



Groupe
Ornithologique
Breton

Décembre 2008

Numéro 19-2

Ar Vran

Ar Vran est une publication semestrielle du
Groupe Ornithologique Breton

Groupe Ornithologique Breton
- BP 42 -
56110 GOURIN
www.gob.fr

CONSIGNES AUX AUTEURS

Ar Vran publie des notes, des brèves et des articles originaux concernant l'avifaune sauvage des cinq départements bretons.

Les auteurs transmettront leur article ou note sur support informatique sous forme de fichier *Word*.

L'ensemble des documents (articles, notes, photos, dessins et cartes) sera soumis à un comité de relecture qui se réserve le droit de les accepter ou de les refuser.

Le comité pourra être amené à modifier les documents qui lui sont transmis dans le but de rendre homogène la présentation de la revue.

Dans tous les cas, les auteurs d'articles ou de notes conservent l'entière responsabilité des propos qu'ils ont émis ; leurs noms et adresses figurent en fin de document.

Adresse d'envoi des documents

Thierry Quelennec
9 rue d'Alsace 29290 SAINT-RENAN
croac29@wanadoo.fr

Comité de relecture

Guillaume Gélinaud
Bernard Iliou
Patrick Philippon

Photo de couverture : hybride de héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* et d'aigrette garzette *Egretta garzetta* (Susciniö - Morbihan, Mai 2008). R. Pavec

ISSN 0180-3875

Groupe Ornithologique Breton

Bulletin d'adhésion - abonnement 2009

Bulletin à renvoyer, accompagné du règlement, à :

GOB - BP 42 - 56110 GOURIN

nom :		prénom :	
adresse :			
code postal :		ville :	
pays :		téléphone :	
email :			

formule choisie :

formule	description	tarif normal	tarif réduit	montant
1	ADHESION + Bulletin de liaison papier	15,00	7,50	
2	ADHESION + Bulletin de liaison par email	9,00	4,50	
3	Revue AR VRAN papier (+ ligne 1 ou 2)	17,00	8,50	
4	Revue AR VRAN par email (+ ligne 1 ou 2)	10,00	5,00	
5	Revue AR VRAN 56 papier (+ ligne 1 ou 2)	7,00	3,50	
6	Revue AR VRAN 56 par email (+ ligne 1 ou 2)	4,00	2,00	
7	Revue AR VRAN papier sans adhésion	34,00	17,00	
8	Revue AR VRAN par email sans adhésion	20,00	10,00	
	TOTAL :			

Tarifs réduits : ces tarifs sont réservés aux étudiants, demandeurs d'emploi et personnes bénéficiant du R.M.I.

Je réserve l'usage de mes coordonnées aux membres du conseil d'administration du GOB et aux adhérents chargés de l'envoi des publications.

Date :

Signature :

Ar Vran

VOLUME 19 - 2, Décembre 2008

SOMMAIRE

0124	MAOUT Jacques, BALLOT Jean-Noël, NEDELLEC Sébastien - Synthèse des observations ornithologiques bretonnes du 16/07/2002 au 15/07/2003 (suite et fin)	2 - 47
0125	COZIC Erwan - Bilan 2007 de la nidification du faucon pèlerin <i>Falco peregrinus</i> en Bretagne	48 - 55
0126	PAVEC Raymond, FOSSE Alain - Une drôle d'aigrette dans les marais de Suscinio : observation d'un hybride	56 - 60
- Brèves -		
0127	QUELENNEC Thierry - Tichodrome échelette <i>Tichodroma muraria</i> en Finistère : le retour	
0128	QUELENNEC Thierry - Un martinet noir <i>Apus apus</i> rentre au nid un 22 août	
0129	QUELENNEC Thierry - Harfang des neiges <i>Bubo scandianus</i> : hivernage aux portes de la Bretagne	

Editorial

Fin 2008 est née la nouvelle version d'Ar Vran. En ce début 2009 paraît le second numéro de l'abonnement 2008. Cette année verra donc la parution de trois numéros afin d'atteindre, à nouveau, un rythme de parution normalisé : deux numéros par an.

Le pivot central de ce numéro est la parution de la synthèse ornithologique concernant l'année 2002-2003. Colonne vertébrale de la revue depuis toujours, la synthèse est devenue trop lourde à réaliser, trop contraignante et dévoreuse de temps... N'oublions pas que cette revue est réalisée entièrement par des bénévoles.

Conscient de la nécessité de la conserver, le conseil d'administration du Groupe Ornithologique Breton réfléchit actuellement à sa poursuite sous une forme différente. Par exemple, la récupération des données à partir d'une base de données régionale est une des pistes de réflexion. On vous tiendra informé de l'avancement de ce projet.

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette synthèse depuis des années.

Enfin vous découvrirez l'évolution encourageante du faucon pèlerin dans notre région. Vous verrez également la description d'une découverte peu banale, un hybride probablement jamais décrit en France.

Bonne lecture.

Patrick Philippon
président du GOB

Thierry Quelenec
responsable de la revue

SYNTHESE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES BRETONNES DU 16/07/2002 AU 15/07/2003 (suite et fin)

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*.

2 le 22 août 2002 à l'Île Grande/Pleumeur-Bodou (22), 2 les 25 et 27 août au sémaphore de Brignogan-Plage (29), 3 le 24 octobre et 1 le 25 à Hoëdic (56), 1 le 27 octobre au sémaphore de Brignogan-Plage.

A Ouessant (29), 1 le 1^{er} septembre, puis le passage est noté du 5 octobre au 3 novembre avec un maximum de 8 le 27 octobre.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus*.

L'espèce est régulièrement observée du 5 août au 10 octobre 2002 au sémaphore de Brignogan-Plage (29).

A Ouessant (29), le passage est faible entre le 4 septembre et le 3 novembre.

1 le 30 septembre à Tréhiguier/Pénestin (56), 1 le 21 octobre à Hoëdic (56) et 1 juvénile de forme sombre le 11 novembre au cap Fréhel (22).

Au printemps 2003, 1 de forme pâle le 2 avril à la pointe Er Hourel/Locmariaquer (56).

LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus*.

1 le 7 septembre 2002 à Ouessant (29).

GRAND LABBE *Catharacta skua*.

L'espèce passe régulièrement du 7 août au 1^{er} décembre 2002 au sémaphore de Brignogan-Plage (29) où 8 sont observés le 2 janvier 2003 en 1h 30.

Le passage est observé à Ouessant entre le 27 août et le 4 novembre.

1 du 27 septembre au 10 octobre au lac de Grand-Lieu (44).

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*.

L'espèce est bien présente dans ses lieux classiques de rassemblement postnuptiaux mais est notée maintenant régulièrement un peu partout sur le littoral et en retrait.

Maximum : 850 à 900 oiseaux le 3 décembre 2002 et 519 le 4 à Beauport/Paimpol (22).

Reproduction.

25 couples se reproduisent sur le lac de Grand-Lieu (44).

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus*.

A Ouessant (29), 5 le 11 septembre 2002, l'espèce est ensuite régulière jusqu'au 4 novembre. 48 en 2 h le 10 octobre au sémaphore de Brignogan-Plage (29).

Il faut ensuite attendre la mi-janvier 2003 pour retrouver une série d'observations : 16 le 11 à la pointe de Saint-Cast-le-Guildo (22), 65 le 13 à Ouessant, 15 à la mi-janvier à la pointe de Tréfeuntec/Plonévez-Porzay (29), 140 le 29 à Martin Plage/Plérin (22).

Le mouvement de printemps se dessine en avril : 300 le 10 à Trunvel/Tréogat (29), 2 le 10 et 150 le 15 à Ouessant, 54 le 20 avril à Hoëdic (56).

MOUETTE DE SABINE *Larus sabini*.

6 le 23 août 2002 au large de Piriac-sur-Mer (44).

A Ouessant (29), 1 le 21 septembre et le 5 octobre, 3 le 12 octobre, 1 les 13 et 17, 5 le 22, 2 les 23 et 27 et 1 le 28 octobre.

Une donnée estivale en 2003 : 1 adulte le 30 juin à Trunvel/Tréogat (29).

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan*.

1 oiseau de 2^e hiver le 11 novembre 2002 au cap Fréhel (22).

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*.

A la mi-janvier 2003, 38 523 en Loire-Atlantique et 9 297+ dans le Morbihan ; 2 000 en baie de Goulven (29) le 25 janvier.

Reproduction.

720 couples se reproduisent au lac de Grand-Lieu (44) en 2003.

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis*.

1 le 14 septembre 2002 au Bronzais/Pénestin (56), 1 le 3 octobre à Bourienne/Langueux (22), 1 ind. de 2^e hiver le 15 à l'étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (29), 1 ind. de 1^{er} hiver du 8 novembre au 12 janvier à l'étang de Kerhuon/Le Relecq-Kerhuon (29), 1 le 17 novembre sur le parking du magasin Carrefour/Langueux, 1 adulte du 7 décembre 2002 au 20 février 2003 à Saint-Renan (29), 1 du 9 décembre au 25 février à Saint Anne la Palud/Plonévez-Porzay (29), 1 du 26 décembre au 14 février à l'écluse du Légué/Saint-Brieuc (22), 1 ind. de 1^{er} hiver le 17 janvier et 1 adulte le 7 février au Kernic/Plounévez-Lochrist (29), 1 ind. de 1^{er} hiver le 25 janvier et 1 adulte le 26 janvier à l'étang de Kerhuon, 1 adulte le 21 février à Guissény (29), 1 ind. de 1^{er} hiver du 23 au 25 février à Saint-Lumine-de-Coutais (44), 1 ind. de 1^{er} hiver du 24 février au 1^{er} mars à Douarnenez (29), 1 ind. de 1^{er} été le 10 mars à Nérizelec/Plovan (29) et à Trunvel/Tréogat(29).

GOELAND CENDRE *Larus canus*.

1 330 en Loire-Atlantique lors des comptages de la mi-janvier 2003.

9 le 15 juin à l'Île-Tudy (29).

L'espèce est notée dès juillet en baie de Saint-Brieuc (22).

GOELAND BRUN *Larus fuscus*.

900 le 19 août 2002 à Nérizelec/Plovan (29).

600 le 11 janvier 2003 au lac du Drennec/Sizun (29).

2 446 en Loire-Atlantique lors des comptages de la mi-janvier.

Reproduction :

Nous indiquons les résultats, en nombre de couples, des recensements effectués en 2003 sur quelques colonies :

Colonies	Département	2003
Île des Landes	35	10
Baie de Morlaix	29	100
Île de Trévorc'h	29	103
Cap Sizun	29	94
Pen Men-Beg Melen/Groix	56	15
Koh Kastell/Belle-Île	56	2 534

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*.

19 878 en Loire-Atlantique lors des comptages de la mi-janvier 2003.

Reproduction :

Nous indiquons les résultats, en nombre de couples, des recensements effectués en 2003 sur quelques colonies :

Colonies	Département	2003
Île des Landes	35	250
Baie de Morlaix	29	1 280
Île de Trévorc'h	29	199
Cap Sizun	29	256
Pen Men-Beg Melen/Groix	56	219
Koh Kastell/Belle-Île	56	639

GOELAND LEUCOPHEE *Larus michaellis*.

1 le 11 août 2002 à la Tour des Anglais/Damgan (56) ; 1 les 21 et 30 août puis le 21 septembre à Bourrienne/Langueux (22) ; 1 ind. de 2nd été, bague poussin en Camargue, le 8 septembre et 1 ind. de 1^e été le 29 septembre à Ouessant (29) ; 1 le 15 octobre à Hoëdic (56).

1 le 8 janvier 2003 sur l'étang de Chalonge/Trébédan (22), 13 en Loire-Atlantique lors des comptages de la mi-janvier.

3 le 2 juillet à Landerneau (29).

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides*.

1 ind. de 2^e été le 11 avril 2003 en baie du Kernic/Plounévez-Lochrist (29).

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*.

1 adulte le 2 janvier 2003 à Saint Pierre/Penmarc'h (29), 1 subadulte du 6 février au 16 mars à Ouessant (29), 1 le 7 février à Loc'h ar Stang/Tréogat (29), 1 ind. de 2nd hiver le 2 mars dans le port du Guilvinec (29), 1 ind. de 1^{er} hiver le 13 à Nérizelec/Plovan (29) et 1 adulte du 21 au 27 mars à Port à la Duc/Pléboulle (22).



photo 1 : goéland bourgmestre de 2^{ème} hiver (port de Douarnenez - Finistère, janvier 2008).
T. Quelenec

GOELAND MARIN *Larus marinus*.

Reproduction :

Nous indiquons les résultats, en nombre de couples, des recensements effectués en 2003 sur quelques colonies :

Colonies	Département	Effectifs 2003
Île des Landes	35	100
Baie de Morlaix	29	118
Réserve naturelle d'Iroise	29	129-130
Cap Sizun	29	31
Pen Men-Beg Melen/Groix	56	4
Koh Kastell/Belle-Île	56	4

80 le 9 novembre 2002 en baie de Tresseny/Guissény (29).

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla*.

230 en 3h30 le 27 octobre 2002, 140/1h45 le 1^{er} décembre et 200 en 1h30 le 2 janvier au sémaphore de Brignogan-Plage (29).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002	Taux de succès
Cap Fréhel (22)	62	35	66%
Goulien (29)	282	300	24%
Pointe du Raz (29)	695	638	37%
Groix (56)	22+	23	82%
Belle-Île (56)	100	148	?
Total	1 160	1 144	

Cette espèce connaît en 2003 une légère progression. Des problèmes de prédation par des corvidés ou des laridés persistent.

STERNE CASPIENNE *Sterna caspia*.

1 le 10 septembre 2002 à Cancale (35).

STERNE "A BEC ORANGE" *Sterna bengalensis/elegans*.

1 le 17 août 2002 à Mesquer (44).

STERNE ELEGANTE *Sterna elegans*.

1 jusqu'au 31 juillet 2002 dans la colonie de sternes caugek *Sterna sandvicensis* de l'île aux Dames en baie de Morlaix (29). Cet oiseau avait été bagué en 2001 au banc d'Arguin (33).

1 aux Glénan (île aux Moutons) à Fouesnant (29), à partir de la mi-mai 2003.

STERNE HANSEL *Sterna nilotica*.

1 adulte le 22 août 2002 au lac de Grand-Lieu (44).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*.

Au mois de janvier 2003, les effectifs minimaux se répartissent comme suit :

35	22	29	56	44	Bretagne
?	14+	141+	25	42	222+

On note 227 le 13 mai en baie de Plouharnel (56) et 410 le 3 juillet à Roc'h Morhoc'h/Ploubazlanec (22).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002	Jeunes à l'envol
La Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22)	0	30	0
Trégor-Goëlo (22)	0	1-2	
Île aux Dames/Baie de Morlaix (29)	820	820	700
Archipel de Molène (29)	0	1	0
Île aux Moutons/Fouesnant (29)	933-942	526-560	680-700
TOTAL	1 754-1 763	1 308-1 393	1 381-1 401

L'augmentation des effectifs se poursuit. L'accroissement de la population est de 10,3 % par an depuis 1997.

La production globale, de 0,8 jeune/couple, est bonne et assez proche de la moyenne depuis 1996 (0,68 jeune/couple).

2 sites accueillent 99,9 % de la population.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougalli*.

4 adultes et 3 juvéniles le 15 juillet 2002 à la Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer(22), localité où l'espèce ne s'est pas reproduite en 2002, 2 le 22 à la grève des Courses/Langueux (22), 1 adulte et 1 subadulte le 26 à Iniz er Mour/Sainte-Hélène(56), 13 adultes et 7 juvéniles le 10 août à Pen an Toul/Larmor-Baden (56), 5 adultes et 2 juvéniles le même jour près de l'Île-d'Arz (56), 5 le 27 à l'île Berder/Larmor-Baden, 1 adulte et 1 juvénile le 25 août dans le port de Saint-Quay-Portrieux (22).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002	Jeunes à l'envol
Ile aux Dames/Baie de Morlaix (29)	72-80	70-80	70
TOTAL	72-80	72-83	70

L'île aux Dames accueille la totalité des effectifs de l'espèce en France. Les effectifs sont stables entre 2002 et 2003 mais sur une plus longue période, l'érosion se poursuit. La production est bonne, estimée entre 0,88-0,97 jeune/couple.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*.

840 en juillet 2002 en baie de Saint-Brieuc (22).

Premiers retours : 3 le 30 mars 2003 à la pointe du Jas/Plévenon (22).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Île aux Moines (35)	95	103
La Colombière/St-Jacut-de-la-Mer (22)	5-20	60-70

Île aux Dames/Baie de Morlaix (29)	90	75-80
Région des Abers (29)	17	7-12
Archipel de Molène (29)	114	71-91
Rade de Brest (29)	139-167	87-102
Trunvel/Tréogat (29)	20	26
Île aux Moutons/Fouesnant (29)	121-124	122-129
Rivière d'Etel (56)	180	100
Golfe du Morbihan (56)	109-128	110
Marais salants de Guérande (44)	70	72
Lac de Grand-Lieu (44)	34	-
TOTAL	1 286-1 355	1 146-1 213

Les effectifs sont en légère progression par rapport à 2002. Le taux d'accroissement est de 7,9 % par an depuis 1999 et la population atteint son meilleur niveau depuis les années 60.

Sur l'île de Béniguet (29), les premières pontes s'étalent du 26 mai au 18 juin, alors que des pontes tardives ont encore lieu début juillet.

Seuls 13 % des effectifs français nichent sur des îlots marins.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisea*.

Il n'y a pas de donnée relative à la reproduction. Par ailleurs, l'espèce est peu notée, peut être par manque d'attention, en migration post-nuptiale.

2 oiseaux sont notés les 22 et 24 octobre 2002 à Hoëdic (56).

STERNE DE FORSTER *Sterna forsteri*.

1 du 10 janvier au 11 mars 2003 dans l'estuaire de la Penzé (29) et en baie de Morlaix (29).

STERNE BRIDEE *Sterna anaethetus*.

1 adulte le 4 août 2002 à la Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22).

STERNE NAINE *Sterna albifrons*.

La migration postnuptiale commence début août 2002 : 2 le 11 à la Tour des Anglais/Damgan (56), 2 le 12 à Brignogan-Plage (29), 6 le 13 et 3 le 22 en baie de Goulven (29), 1 le 25 août à la brèche de Trunvel/Tréogat (29), 1 juvénile le 30 septembre en baie de Goulven, 1 juvénile le même jour à Tréhiguier/Pénestin (56).

5 le 15 avril 2003 et 3 le 4 juin à Trunvel/Tréogat, 28 le 5 mai sur l'île de Sein (29), 2 le 17 mai en baie de Goulven, 1 le 8 juin à proximité de la colonie de sternes pierregarin *Sterna hirundo* d'Iniz er Mour/Sainte-Hélène (56), 3 le 8 juin à Roc'h ar Hon/Lézardrieux (22), 28 le 12 juillet au sillon de Talbert/Pleubian (22), 2 le 15 juillet à la Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22).

Les observations estivales sont principalement effectuées à proximité de colonies de sternes d'autres espèces, probablement par attractivité.

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002	Jeunes à l'envol
Sillon de Talbert & Ile d'Ollone (22)	30-36	19-27	0
Béniguet/Archipel de Molène (29)	34-35	7-16	20
Île de Sein (29)	1+	3	0
TOTAL	65-72	29-46	21

Les effectifs augmentent de manière spectaculaire par rapport à l'an passé. La reproduction échoue totalement sur le sillon de Talbert. L'espèce est coutumière de ces fluctuations d'effectifs, mais reste fidèle à ses sites de reproduction.

La production globale est moyenne avec 0,29-0,28 jeune/couple.

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*.

1 oiseau de 1^{er} été le 8 juillet 2002 à l'étang de Saint-Jean/Locoal-Mendon (56).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Lac de Grand-Lieu (44)	601-642	486

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*.

Un petit passage est noté au sémaphore de Brignogan-Plage (29) et à Guissény (29) de fin août à la mi-septembre 2002.

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Lac de Grand-Lieu (44)	128-141	26

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*.

1 juvénile les 30 et 31 août 2002 à Plonéour-Lanvern (29).

Le reste des observations provient du lac de Grand-Lieu (44) : 1 juvénile du 3 au 10 septembre, 2 juvéniles le 6 septembre et 1 adulte le 19 mai 2003.

ALCIDES SP *Uria aalge/Alca torda*.

450 le 3 novembre 2002, 500 en 1h45 le 1^{er} décembre et 350 en 1h30 le 2 janvier au sémaphore de Brignogan-Plage (29).

GUILLEMOT DE TROIL *Uria aalge*.**Reproduction :**

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Cézembre (35)	1-3	<10
Cap Fréhel (22)	227-233	200
Sept-Îles (22)	10	7
Roches de Camaret (29)	5+	+
Goulien (29)	20	22
TOTAL	263-271	250

La colonie du cap Fréhel accueille toujours la majorité des effectifs de la population du golfe normando-breton. Les effectifs bretons augmentent légèrement.

PINGOUIN TORDA *Alca torda*.

A la mi-janvier 2003, 353 en baie de Douarnenez (29) et 303 en rade de Brest (29).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Cézembre (35)	2	2
Cap Fréhel (22)	8+	8-9
Sept-Îles (22)	21	21
TOTAL	31+	31-32

La légère progression des effectifs en 2002 et 2003 pourrait provenir d'apports des populations britanniques qui semblent en augmentation.

MERGULE NAIN *Alle alle*.

1 le 28 octobre 2002 et 1 le 7 novembre à Ouessant (29), 1 le 17 novembre à Quiberon (56), 1 le 26 novembre dans un jardin à Plouaret (22), 1 du 24 au 26 décembre à la grève du Vauglin/Planguenoual (22).

MACAREUX MOINE *Fratercula arctica*.**Reproduction :**

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Sept-Îles (22)	140	181-182
Baie de Morlaix (29)	2-3	3-4
Keller/Ouessant (29)	2-4	5-6
TOTAL	144-147	189-192

La population de l'île Rouzic, dans l'archipel des Sept-Îles (22) poursuit son déclin. Cette diminution est due à une compétition interspécifique avec le Puffin des anglais *Puffinus puffinus* pour les sites de nidification.

L'espèce est notée à 22 reprises à Ouessant (29) lors du passage d'automne : 26 en 12h le 10 septembre 2002, 6 en 3h le 11, 40 en 5h20 le 13, ..., 11 en 5h40 le 1^{er} novembre.

Toujours à Ouessant, 5 sont observés le 30 avril et 1 le 13 mai 2003.

PIGEON BISET *Columba livia*.

R.A.S..

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*.

A la fin de l'été 2002, des indices de nidification probable sont relevés à Bréhat, Plounévez-Moëdec, Trémel (22), Garlan, Plouézoc'h, Plounéour-Ménez et Taulé (29).

On retient notamment 1 juvénile le 27 juillet à Lann Plumelin/Plumelin (56) et 1 individu sortant d'un terrier de lapin le 23 août sur un îlot proche de Béniguet/Bréhat (22).

Un passage faible est noté sur Ouessant (29) du 5 octobre au 10 novembre et à Hoëdic (56) du 13 au 24 octobre.

Peu de groupes hivernaux sont notés : 100 le 28 janvier 2003 à Peumerit (29) et 60 le 25 février à Ploudaniel (29).

En 2003, des indices de reproduction sont obtenus sur les communes suivantes :

Bazouges-la-Pérouze, Fougères, Liffré (35), Calanhel, Plounévez-Moëdec, Trébédan, Trémel (22), Brignogan-Plage, Commana, Goulven, Guissény, Hanvec, La Feuillée, Lampaul-Guimiliau, Le Faou, Morlaix, Pleyber-Christ, Ploudiry, Plouézoc'h, Plougasnou, Plouider, Plounéour-Ménez, Saint-Goazec, Saint-Martin-des-Champs, Scrignac, Sizun, Trémaouézan (29), Baud, Camors, Guilligomarc'h, Hennebont, Inzinzac-Lochrist et Plumelin (56).

PIGEON RAMIER *Columba palumbus*.

Des groupes de quelques dizaines d'individus sont signalés en août et septembre 2002, mais il faut attendre octobre et surtout novembre pour voir défiler des bandes plus importantes dans l'Est de la région : 95 le 29 octobre à Trélivan (22), 640 le 11 novembre à Pacé (35), 250 le 12 à Sérent (56).

En décembre : 800 le 8 à La Bazouge-du-Désert (35), 1000 le 15 à Bazouges sous Hédé/Hédé (35), 400 le 23 à Campénéac (56), 500 à Gueltas (56) et 500 à Locmariaquer (56) le même jour, un dortoir de 2500 le 7 janvier à Languéan (22), 450 le 2 février à Camors (56), 250 le 13 à Trémel (22)...

Au printemps 2003, l'espèce est trouvée nicheuse à Hoëdic (56) et dans l'archipel des Glénan, au Loc'h/Fouesnant (29). 1 juvénile le 4 avril à Brandivy (56).

TOURTERELLE TURQUE *Streptotelia decaocto*.

En septembre et octobre 2002, plusieurs rassemblements sont notés : 43 le 12 septembre à Baud (56), 112 le même jour à Saint-Thuriau (56), 75 le 5 octobre à Lannilis (29), 64 le 15 octobre à Ouessant (29),...

TOURTERELLE DES BOIS *Streptotelia turtur*.

40 le 31 juillet 2002 à Ploeuc-sur-Lié (22), 25 le 24 août à Campénéac (56), 67 le 29 août à Baud (56). Puis 21 données sont recueillies en septembre et 5 en octobre : les dernières sont notées les 12 et 21 et 30 à Ouessant (29).

La première est vue le 10 avril 2003 à Hoëdic (56), ensuite des données sont recueillies le 15 à Iffendic (35), le 16 à Brignogan-Plage (29), le 17 à Saint-Jacut-de-la-Mer (22), le 22 à Vern-sur-Seiche (35).

20 du 16 au 18 mai à Hoëdic (56), 18 le 26 à Tréguennec (29), 6 le 9 juin à l'île de Saint Nicolas aux Glénan/Fouesnant (29), 16 le 13 au Conquet (29).

PERRUCHE A COLLIER *Psittacula krameri*.

1 le 30 août 2002 à Erdeven (56) puis 2 individus, étonnamment synchrones, vus le 28 octobre à Cesson-Sévigné (35) et Brest (29).

COUCOU GEAI *Clamator glandarius*.

1 le 18 avril 2003 à Donges (44).

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*.

1 juvénile est nourri par une Grive musicienne *Turdus philomelos* le 24 juillet 2002 à Sarzeau (56), puis 5 individus sont signalés en août : le 1^e à Tréogat (29), le 6 à Ouessant (29), le 15 à Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35), le 18 à Plouarzel (29) et le 28 à Goulien (29).

1 hâtif le 14 mars 2003 à Grand-Lieu (44). Les premières départementales interviennent le 18 mars à Larmor-Baden (56), le 20 à Moëlan-sur-Mer (29) et le 23 à Plouézec (22).

Une seule forme rousse est signalée, à Lampaul-Ploudalmézeau (29). Le dernier chanteur est entendu le 19 juin.

A Grand-Lieu (44), 56 chanteurs sont dénombrés en 2003 sur 119 points d'écoute (47 points positifs).

CHOUETTE EFFRAIE *Tyto alba*.

Un seul cas de reproduction est signalé à la fin de l'été 2002, à Languidic (56)

14 cadavres sont notés.

En 2003, la nidification est notée au Cloître-Saint-Thégonnec et à Plougonven (29).

CHEVECHE D'ATHENA *Athene noctua*.

Il y a plus d'informations (21 données) de juillet 2002 à janvier 2003 qu'en période de reproduction.

Les localités où l'espèce a été contactée en 2003 sont les suivantes :

- En Ile-et-Vilaine : Piré-sur-Seiche (2 juvéniles)
- Dans les Côtes-d'Armor : Louargat, Pleudihen-sur-Rance et Rospez (1 cadavre...).

- Dans le Finistère : Logonna-Daoulas (chanteur), Plouvorn et Tréguennec (couple). Dans le Haut-Léon, 25 cas de nidification sont enregistrés sur 36 sites occupés.
- Dans le Morbihan : Merlevenez et Nostang.

CHOUETTE HULOTTE *Strix aluco*.

R.A.S..

HIBOU MOYEN-DUC *Asio otus*.

A Ouessant (29), des isolés sont notés du 11 au 31 octobre 2002.

Durant la saison de reproduction 2003, l'espèce est signalée dans les localités suivantes : **Etrelles** (35), **Guipavas**, **Hanvec**, Ouessant, **Plouénan**, **Plounéour-Trez**, **Scaër** (29), Camors, Locoal-Mendon (56) et Guérande (44) (les communes indiquées en gras ont accueilli une reproduction certaine).

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*.

Un afflux de hiboux des marais est constaté en France en 2002-2003 et la région ne fait pas exception.



photo 2 : hibou des marais (Ouessant - Finistère, octobre 2008). T. Quelennec

Les premiers sont vus à Sein (29) à partir du 27 août. Les observations de septembre concernent les Côtes-d'Armor (île Tomé, 2 ou 3 individus) et surtout le Finistère (Sein, baie d'Audierne, Ouessant).

En octobre, l'espèce est vue à l'unité le 4 à la Bosse-de-Bretagne (35), du 18 au 21 à Hoëdic (56). On note un maximum de 4 le 22 à Ouessant où le passage s'interrompt le 28 ; le lendemain, 1 est à Trielen/archipel de Molène (29).

En novembre et décembre, 6 ou 7 individus sont signalés hors Loire-Atlantique.

Un des faits marquants de l'hivernage est la concentration importante de l'espèce en Loire-Atlantique. Le pic est constaté en janvier ou février et atteint 208 individus (soit 32 % de l'effectif national). Les 7 dortoirs repérés se répartissent sur les communes de Belligné, Erbray, Mésanger, Pannecé, Saint-Herblon et Teillé. Ils accueillent de 30 à 65 individus (maximum le 23 février à Mésanger). De tels effectifs n'avaient jamais été atteints en France.

A Saint-Pabu (29), un dortoir est suivi d'octobre à mars et compte de 2 à 5 individus. Le dernier hivernant quitte le secteur dans la deuxième quinzaine d'avril.

Suite à cet afflux record, aucun indice de nidification n'est reporté, le dernier migrateur printanier est vu le 5 mai en baie de Goulven (29).

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*.

En fin d'été, l'espèce est contactée à Plougouven (29), Guillac, Locoal-Mendon et Plouhinec (56). Le dernier est noté le 21 septembre 2002 à Sarzeau (56).

Le premier est signalé le 21 avril 2003 à Pont-Scorff (56).

Les localités occupées en 2003 sont : Baulon, Guipry, Liffré (35), Trébédan (22), Botmeur, Brasparts, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Plougouven, Pont-l'Abbé, Saint-Goazec, Saint-Rivoal, Scaër (29), Baud, Camors et La Vraie-Croix (56).

On note en particulier 4 à 5 chanteurs le 7 mai en forêt de Rennes/Liffré, 7 le 13 juin sur 2 sites à Guipry, 5 à 6 le 15 juin à Saint-Goazec. 4 et 2 couples sont notés respectivement au Cloître-Saint-Thégonnec et à Trébédan. Enfin, 2 œufs sont découverts le 12 juin dans une coupe à Scaër.

MARTINET NOIR *Apus apus*.

L'espèce est régulièrement notée durant le mois d'août 2002 avec par exemple 32 le 4 à l'île Besnard/Saint-Coulomb (35), 15 le 9 à Saint-Renan (29), 43 le 11 à Iffendic (35) et 70 le même jour à Erbrée (35), 18 le 17 à Bréhat (22), 22 le 27 à Séné (56).

En septembre, 5 données sont recueillies avec notamment 2 le 2 à Rennes (35), 1 le 21 à Penmarc'h et 1 le 29 à Batz (29).

Le dernier est vu le 16 octobre à Ouessant (29).

Les 2 premiers martinets sont vus le 10 avril 2003 à Redon (35) et à Trunvel/Tréogat (29). Ensuite, 1 le 13 à Hoëdic (56), 1 le 17 à Pleumeur-Bodou (22). Les premières bandes sont vues le 16 à Rennes, le 17 à Nantes (44), le 18 à Pont-l'Abbé (29), le 23 à Landerneau (29), le 26 à Saint-Brieuc (22)...

L'unique rassemblement printanier signalé concerne 400 individus le 29 avril à l'étang du Curnic/Guissény (29).

MARTINET RAMONEUR *Chaetura pelagica*.

1 individu aurait été vu le 2 octobre 2002 à Ouessant (29). Cette observation constituerait une première française, mais elle n'a pas été soumise au C.H.N..

MARTIN-PECHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis*.

A Ouessant (29), 71 observations sont réalisées du 3 juillet au 5 novembre 2002.

Des familles sont notées au Moulin à Marée/Lancieux (22) le 29 juillet et à l'étang de la forêt/Brandivy (56) le 3 août.

Au printemps 2003, la nidification est notée le 7 mai en forêt du Cranou/Hanvec (29), 1 couple nourrit 3 juvéniles le 31 mai à l'étang Marcel/Lamballe (22).

Par ailleurs, des observations en période de nidification sont faites à Careil/Iffendic (35) et au Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (29).

16 couples sont repérés à Grand-Lieu (44).

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*.

On note en fin d'été 58 le 17 août 2002 puis 21 le 21 à Saint Pierre/Penmarc'h (29), puis 1 du 1^{er} au 6 septembre à Ouessant (29).

Les 9 premiers sont vus le 3 mai 2003 à Saint Vio/Tréguennec (29).

En dehors de la baie d'Audierne, quelques oiseaux sont observés : 1 les 10 et 13 mai à Ouessant, 2 le 16 juin puis 1 le 10 juillet à l'Île Grande/Pleumeur-Bodou (22) et 1 le 7 juillet à Saint-Joachim (44).

Au printemps, 18 à 20 couples sont recensés en baie d'Audierne dont 5 au moins se reproduisent.

HUPPE FASCIEE *Upupa epops*.

17 observations sont faites en fin d'été 2002, 6 en août et 5 en septembre : 1 le 2 septembre sur l'île Tomé/Louannec (22), 1 le 7 à Ercé-en-Lamée (35), 1 le 28 à Sein (29) et 1 les 22 et 30 à Ouessant (29).

La première est vue le 26 février 2003 à Ouessant où l'espèce est contactée 7 fois du 18 au 26 mars. A Hoëdic (56), 5 individus passent entre le 2 mars et le 20 avril. Sur le continent, le dernier migrateur est signalé le 21 avril à Briec-de-l'Odet (29).

Après le 1^{er} mai, la huppe est observée dans les localités suivantes : Argentré-du-Plessis (35), **Ercé-en-Lamée**, Guignen, **Le Sel-de-Bretagne**, **Teillay**, **Tresboeuf** (35), Penmarc'h (29), Camors (56) (en gras les communes où la nidification est certaine).

L'espèce n'est pas trouvée autour de Grand-Lieu.

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*.

Le premier migrateur, précoce, est signalé le 22 juillet 2002 à Banneg/archipel de Molène (29). Il faut attendre le 17 août, avec 1 à Hoëdic (56), pour que les contacts deviennent réguliers. 8 observations sont faites en septembre et 5 en octobre.

Signalons les trois localités intérieures où l'espèce est notée : le 19 août à Pacé, le 24 à Lillion/Rennes (35) et le 1^{er} septembre à Poullaouen (29). Le maximum est de 4 individus à Sein (29) le 28 septembre.

A Trunvel/Tréogat (29), 3 individus sont capturés entre le 1^{er} septembre et le 10 octobre. Les derniers sont à Ouessant (29) les 16 et 18 novembre puis le 19 décembre, date très tardive.

Le printemps 2003 fournit trois observations : 1 le 17 avril à Ouessant, 1 le 21 à Plounéour-Trez (29) et 2 le 11 mai à Sougeal (35).

PIC CENDRE *Picus canus*.

Au printemps 2003, les contacts proviennent des forêts de Villecartier/Bazouges-la-Pérouse, de Fougères et de Rennes/Liffré (35).

PIC VERT *Picus viridis*.

R.A.S..

PIC NOIR *Dryocopus martius*.

L'espèce est bien notée même si elle est, le plus souvent, discrète. Près de la moitié des contacts correspondent à des loges ou à des indices de présence spécifiques à l'espèce. Elle peut être notée dans des parcs urbains comme à Hennebont (56) ou Morlaix (29).

Les données les plus occidentales sont recueillies dans le Pays bigouden (29), avec en particulier 1 à Trunvel/Tréogat les 26 juillet et 22 août 2002, et dans le Léon (29), avec 1 les 31 janvier et 6 février 2003 (avec chant) à Lanildut.

PIC EPEICHE *Dendrocopos major*.

R.A.S..

PIC MAR *Dendrocopos medius*.

Nous donnons à la suite les localités où l'espèce a été contactée : forêt de Fougères, forêt de Villecartier/Bazouges-la-Pérouze, étang de Bazouges sous Hédé/Hédé, forêt de Rennes/Liffré, forêt de Chevré/La Bouëxière & Châteaubourg, forêt de Paimpont (35), Coat Tromarc'h/Trémel, forêt de Coat an Noz/Belle-Isle-en-Terre, forêt de Coat an Hay/Louargat, bois de la Salle/Pléguien, forêt de Loudéac, château de Saint Aubin/Plédéliac, bois du Bosreux/Brusvily (22), forêt du Cranou/Hanvec & le Faou (29), forêt de Lanouée/Les Forges (56).

La donnée concernant 2 individus le 5 septembre 2002 à l'étang de l'Yaigne/ Châteaugiron (35) est étonnante car c'est en agglomération loin de tout espace boisé.

Quelques données chiffrées : Villecartier (présence dans 3 parcelles), forêt de Rennes (présence dans 5 parcelles), Chevré (3 sites), Cranou (3 sites), Lanouée (7 couples).

PIC EPEICHETTE *Dendrocopos minor*.

R.A.S..

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla*.

Plusieurs observations concernant au moins 2 oiseaux sont faites à Ouessant (29) du 14 au 23 octobre 2002.

Au printemps, 2 oiseaux sont repérés à Ouessant le 16 avril puis les 6 et 7 mai 2003.
1 individu est vu à l'Île Grande/Pleumeur-Bodou (22) à une date étonnante : le 3 juillet.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*.

Deux données sont très étonnantes : 2 le 27 septembre 2002 à l'ancienne carrière des mines/Quily (56) et 1 le 1^{er} février 2003 à Saint-Lumine-de-Coutais (44).
Plus classique : 1 le 5 avril aux Landettes/Saint-Nazaire (44).

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*.

Un premier migrateur est signalé le 5 septembre 2002 à Ouessant (29), localité où 5 observations sont réalisées ensuite du 13 au 31 octobre.
Le chant est entendu jusqu'au 28 octobre.
Peu de groupes sont notés en hiver : 16 le 30 décembre à Moréac (56), 15 le 14 janvier 2003 à Locoal-Mendon (56), 10 le 13 février à Locmariaquer (56).

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*.

Le passage s'étale du 10 octobre au 5 novembre à Ouessant (29).
700 à Cancale (35) et 100 à Hoëdic (56) le 20 octobre, 400 à Saint-Caradec (22) le 7 janvier.

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*.

Toutes les observations proviennent du secteur d'Hirel en baie du Mont-Saint-Michel (35). Le premier oiseau hivernant est détecté le 22 octobre 2002. Par la suite, 4 oiseaux sont notés le 24 novembre puis 10 le 30. Enfin, 6 individus sont suivis du 14 janvier au 8 février 2003.

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*.

En fin d'été 2002, les sites de nidification suivants sont contrôlés : 12 cavités le 17 juillet aux grèves d'En Bas/Fréhel (22), 1 nid le 20 à l'Aber Wrac'h/Landéda (29), 2 ou 3 nids le 22 à Damgan (56), 1 ou 2 juvéniles le 28 à Primel/Plougasnou (29), 1 nid le 29 juillet à Gâvres (56), 1 juvénile nourri le 1^{er} août à Bréhat (22) et 1 autre le 16 août à Hoëdic (56). A la sablière de Quillan/Radenac (56), 3 nichées semblent toujours ravitaillées le 7 septembre.

Au même moment, des stationnements de migrants sont notés : 400 le 28 juillet et 8 août à Pen Mané/Locmiquélic (56), 400 le 11 août à Careil/Iffendic (35), 500 le même jour à Paintourteau/Erbrée (35), 1000 le 19 août au Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (29), 150 le 15 septembre au Curnic/Guissény (29), 1 000 environ le 29 septembre à la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (35).

Les premières sont vues le 6 mars 2003 à Trébeurden (22), le 8 à Poulguidou/Plouhinec (29), Pénestin et Locmiquélic (56), le 9 à Chavagne, Hirel et Iffendic (35).

Les maxima sont modestes : 200 le 9 avril au Rocleu/Peumerit-Quintin (22), 250 le 4, 150 le 19 et 250 le 29 avril au Curnic/Guissény (29).

La nidification est notée en 2003 sur les sites suivants :

Saint-Malo-de-Phily (35), Paimpol (22), Guilers, Plouneour-Trez (29), Hoëdic et Sarzeau (56).

12 à 15 couples nicheurs sont dénombrés à Hoëdic.

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*.

Les plus gros rassemblements sont notés en septembre 2002 : environ 3000 le 29 à la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (35).

L'espèce est régulièrement vue en octobre, jusqu'au 23 à Cancale (35), 26 à Hoëdic (56) et 28 à Pleubian (22). En novembre, toutes les observations proviennent du Finistère. Les dernières sont vues le 20 à Ouessant, le 24 à Lampaul-Plouarzel et le 26 à Brignogan-Plage.

L'hiver qui suit est marqué par l'absence de l'espèce.

Les premiers retours sont notés le 4 mars 2003 à Grand-Lieu (44), le 5 à Plonéour-Lanvern (29), le 6 à Pédernec (22), le 15 mars à Iffendic (35),... 200 le 3 avril à Guidel (56), 100 le 9 à Cléden-Cap-Sizun (29).



photo 3 : hirondelle rustique adulte (Saint-Renan - Finistère, avril 2008). T. Quelennec

HIRONDELLE ROUSSELIN *Hirundo daurica*.

2 individus sont vus en avril 2003 en Loire-Atlantique, le 26 aux Moutiers-en-Retz et le 27 à Saint-André-des-Eaux.

HIRONDELLE DE FENÊTRE *Delichon urbica*.

En fin d'été 2002, plusieurs colonies font l'objet de recensement dans les Côtes-d'Armor : 25 nids à Trébry, 11 à Plouézec et 31 à Paimpol.

Les observations sont régulières en septembre et un nourrissage a encore lieu le 28 à Sein (29). Sur le continent, la dernière est vue le 14 octobre à Châtillon-en-Vendelais (35), puis le 19 à Ouessant (29) et le 26 à Hoëdic (56).

Un précurseur est observé à Ouessant le 9 mars 2003, les suivantes sont notés à la Chapelle-Erbrée (35) le 6 avril, à Hillion (22) le 7, à Ancenis (44) le 12, à Pont-l'Abbé (29) le 18 et à Hoëdic (56) le 21.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardii*.

Toutes les observations proviennent d'Ouessant (29) où une quinzaine de données sont recueillies du 9 octobre au 14 novembre 2002, toutes n'ont pas été soumises au C.H.N., et seuls 3 ou 4 individus ont été homologués.

PIPIT DE GODLEWSKI *Anthus godlewskii*.

Un oiseau est observé du 22 au 26 octobre 2002 à Ouessant (29). Il s'agit de la 3^e donnée française et de la 2^e pour la Bretagne.

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*.

4 individus en septembre 2002, le 13 à Ouessant (29), le 18 à Grand-Lieu (44) et les 15 et 29 à Hirel (35) ; 2 en octobre, le 1^{er} à Plomeur (29) et du 12 au 26 à Ouessant (29).

Au printemps, 1 le 3 mai 2003 à Sein (29).

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*.

69 individus sont dénombrés du 15 août au 28 septembre 2002 à Tréogat (29) et 19 observations sont faites du 18 août au 19 octobre à Ouessant (29).

Les premiers sont notés le 19 mars 2003 à Talensac (35), le 31 à Ouessant, le 6 avril à Languidic (56) et le 12 à Plounérin (22). A Hoëdic (56), le dernier migrateur est vu le 18 mai.

6 à 7 chanteurs sont dénombrés le 15 juin sur 1300 mètres à Brandivy (56). En limite de répartition, l'espèce est contactée à Plounérin (22), Hanvec, Lanmeur, Le Faou et Trégarvan (29).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*.

Les premiers migrants sont notés à partir du 11 septembre 2002 au Rheu (35). Les données sont nombreuses en octobre où on note par exemple 160 le 14 à Hoëdic (56).

En période de reproduction, 38 sites sont recensés dans les Monts d'Arrée (29), à Berrien, Botsorhel, Brasparts, La Feuillée, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Plounéour-Ménez et Scrignac. Non loin, à Lohuec (22), 3 sites sont repérés. Sur le littoral, la reproduction est constatée à Plévenon (22), Plouarzel, Goulien (29) et Hoëdic (56).

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*.

1 le 2 octobre 2002 à Ouessant (29) et 1 du 20 au 25 octobre à Hoëdic (56).

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*.

A l'automne 2002, on note quelques rassemblements : 12 le 12 octobre à la pointe des Saisies/Gâvres (56), 12 le 30 à la pointe du Chevret/Saint-Jacut-de-la-Mer (22), 20 le 1^{er} novembre à la pointe de Primel/Plougasnou (29), 20 le 17 à l'île Besnard/Saint-Coulomb (35). 1 individu présentant les caractéristiques de la forme *A. p. littoralis* est identifié le 11 avril à Hoëdic (56).

Au printemps 2003, 1 couple à l'île des Landes/Cancale et 1 au Grand Chevreuil/Saint-Coulomb (35), 13 à 15 couples sur 7 îlots de la baie de Morlaix, 1 famille à Enez Amann ar Rouz/Kerlouan, 1 couple à Trévorc'h/Saint-Pabu, 1 nid au Loc'h/Fouesnant (29), 1 couple à Rohellan/Erdeven et au moins 2 sites de nidification repérés à Hoëdic (56).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*.

Le premier est noté le 27 septembre 2002 à l'île Tomé/Louannec (22), l'espèce est ensuite contactée le 5 octobre à Hirel (35), le 18 à Plonéour-Lanvern (29), le 21 à Hoëdic (56)...

La plupart des observations concernent moins de 10 individus. Peu de groupes importants sont signalés : 17 le 22 octobre au Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, 13 le 1^{er} décembre à Hirel et 14 le 21 décembre à Pacé (35).

Les derniers sont détectés le 14 mars 2003 à Péder nec (22), le 20 à Plounérin (22), le 13 avril à Hoëdic (56) et le 14 mai à Grand-Lieu (44).

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*.

En fin d'été 2002, des juvéniles sont vus à Goulven (29), à Le-Tour-du-Parc, Locmiquélic et Sarzeau (56). A Ouessant (29), le passage est noté du 21 août au 24 octobre.

La première est de retour le 22 mars 2003 à Erdeven (56).

A Hoëdic (56), la migration printanière s'étale du 12 avril au 16 mai 2003 pour la sous espèce type *M. f. flava*, la Flavéole *M. f. flavissima* étant signalée du 10 avril au 18 mai.

BERGERONNETTE PRINTANIERE type *Motacilla flava flava*.

En mai 2003, cette forme est contactée à Locmiquélic (56) et Saint-Joachim (44), ce qui est très loin de la réalité.

BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima*.

Après la mi-mai 2003, cette sous-espèce est signalée à Pleudihen-sur-Rance (22) et Tréguennec (29).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*.

Le passage postnuptial est noté du 12 septembre à début novembre 2002 à Ouessant (29) et du 29 septembre au 25 octobre à Hoëdic (56).

BERGERONNETTE GRISE ssp.. *Motacilla alba* ssp..

Quelques dortoirs hivernaux sont signalés sur la période : 800 le 10 octobre et 900 le 20 novembre à Vannes (56), 350 le 5 novembre 2002 à Dinan (22), 270 le 25 janvier 2003 à Pléneuf-Val-André (22), 1160 le 5 mars à la gare de Brest (29) où 10 *M.a .alba* sont repérées parmi 853 *M.a. yarrellii* le 17 mars.

BERGERONNETTE GRISE type *Motacilla alba alba*.

Le passage à Ouessant (29) se déroule du 26 août au 31 octobre 2002 (pic du 8 au 20 octobre). Cette sous espèce est identifiée à l'unité le 24 novembre à Iffendic (35) et le 11 janvier à Sizun (29).

La remontée est signalée à Ouessant du 5 au 25 mars 2003. Des migrateurs attardés sont vus en juin à Ouessant et Hoëdic (56).

BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrellii*.

Les premières sont notées le 4 septembre 2002 à Ouessant (29), puis le 10 à Guingamp (22), le 28 à Morlaix (29), le 29 à Hoëdic (56), le 9 octobre à Rennes (35)...

Le passage à Ouessant est noté du 6 octobre au 5 novembre.

Les départs ont lieu en mars 2003 : les 10 dernières sont notées le 23 à Guissény (29).

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus*.

Cette espèce est notée exceptionnellement en Bretagne. Quelques oiseaux ont été vus à partir de la fin de l'hiver : 2 (1 femelle et 1 ind. de 1^{er} hiver) le 15 février 2003, puis 1 le 17 à Plérin (22) et 1 femelle adulte est suivie de la fin mars au 12 avril à Saint-Nazaire (44).

TROGLODYTE MIGNON *Troglodytes troglodytes*.

R.A.S..

ACCENTEUR MOUCHET *Prunella modularis*.

R.A.S..

ROUGEGORGE FAMILIER *Erithacus rubecula*.

Un passage concernant des milliers d'individus est observé sur Ouessant (29) les 18, 19 et 26 mars 2003.

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*.

Le premier est noté le 7 avril 2003 sur un site très inhabituel, l'île Penfret aux Glénan/Fouesnant (29).

Deux données intéressantes sont recueillies ensuite fin mai : 1 chanteur le 24 au Mesnil des Aulnays/Plerguer (35) et 1 couple le 25 à Férel (56), non loin de la population ligérienne néanmoins.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica*.

Encore un nourrissage le 27 juillet 2002 à Pen Mané/Locmiquélic (56).

58 individus sont capturés entre le 15 juillet et le 19 octobre à Trunvel/Tréogat (29) ; 1 le 22 septembre à Ouessant (29).

Les 2 premiers individus sont notés le 4 mars 2003 à Kersahu/Gâvres (56).

2 migrateurs sont découverts sur les îles au printemps : 1 les 29 et 30 mars à Ouessant, 1 le 7 avril à Hoëdic (56).

Au printemps 2003, en dehors de la Loire-Atlantique, l'espèce est contactée à Careil/Iffendic, Timouy/Sainte-Anne, Gannedel/La Chapelle-de-Brain, Droulin/Langon (35), Gâvres, Locmiquélic, Rieux et Sarzeau (56).

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*.

1 femelle est observée le 31 juillet 2002 sur l'île de Bréhat (22), localité où l'espèce ne semble pas être connue comme nicheuse.

En octobre, le dernier chant est entendu le 7 à Saint-Brieuc (22).

Le passage se déroule du 5 octobre au 28 novembre à Ouessant (29) et du 12 octobre au 4 novembre à Hoëdic (56), île où la présence d'observateurs a été plus restreinte que les années passées.

Le pic est atteint du 12 au 31 octobre, maximum de 55 le 21 à Ouessant.

Si la majorité des observations hivernales provient de localités littorales, quelques mentions proviennent de sites franchement intérieurs en décembre et janvier tels La Mézière (35), Baud ou Ploërmel (56).

Des hivernants chantent en mars 2003, le 8 à Saint-Pol-de-Léon (29) et le 18 à Plouarzel (29).

Un passage est ressenti à Ouessant du 13 mars au 16 avril, avec un pic de 6 le 15 mars, et à Hoëdic du 16 mars (pic de 25 ce jour-là) au 13 avril.

1 individu apparemment égaré est vu le 9 juin sur l'île de Saint Nicolas aux Glénan/Fouesnant (29).

Les premiers chanteurs sur les sites de reproduction sont notés le 9 mars à Baud et le 14 à Dinan (22).

1 se trouve le 27 mai dans le port de commerce de Brest (29), localité où la reproduction a déjà été prouvée.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*.

Le passage se déroule du 16 août au 26 octobre 2002 à Hoëdic (56) et du 29 août au 19 octobre à Ouessant (29) avec un maximum en septembre. Sur le continent, les mouvements sont perçus du 24 août au 21 octobre.

Le premier est noté le 4 avril 2003 à Ouessant (29), suivi par 2 autres isolés les 10 et 23 avril sur le même site. D'autres migrateurs sont notés jusqu'au 8 mai.

En période de reproduction, plusieurs sites d'Ille-et-Vilaine fournissent des observations :

-la forêt de Villecartier/Bazouges-la-Pérouze,
-la forêt de Fougères,
-la forêt de Rennes,
-le château du Bois Orcan/Noyal-sur-Vilaine,
-la forêt de Paimpont.

Un couple produit des jeunes au printemps 2003 en milieu non forestier sur la commune de Tréméheuc (35).

TARIER DES PRES *Saxicola rubetra*.

A l'automne, le passage est noté du 12 août au 19 novembre 2002 avec un pic très marqué du 3 au 10 septembre : 40 le 3 à Trévan/Peumerit (29), 70 le 4 à Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35), 30 le 5 à Saint-Lumine-de-Coutais (44), 50 le 10 à Hirel (35).

Une donnée très hâtive est recueillie le 9 mars 2003 à Plouhinec (56), mais il est vraisemblable qu'il puisse s'agir d'une confusion avec un Tarier pâtre *Saxicola torquata*. La donnée suivante est également précoce, le 3 avril 2003 sur l'île Tomé (22).

Les derniers migrateurs sont vus le 4 mai à Yffiniac (22).

Dans les Monts d'Arrée (29), 1 chanteur est entendu le 3 mai dans le Yeun Elez et 1 famille est découverte le 6 juillet à Pen ar Pajou/Plounéour-Ménez (29).

Seul 1 couple est trouvé lors du printemps 2003 à Grand-Lieu (44).

TARIER PATRE *Saxicola torquata*.

R.A.S..

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*.

Le passage se déroule du 6 août au 15 novembre 2002 avec une intensité plus marquée entre le 27 août et le 28 septembre ; les maxima atteignent 36 le 27 août, 50 le 15 septembre, 66 le 28 à Sein (29), 30 le 30 août sur la Côte Sauvage de Quiberon (56), 46 le 31 à la Falaise/Erdeven (56).

1 individu attribué à la sous-espèce *O.o. leucorhoa* est présent du 13 au 15 octobre sur Hoëdic (56).

Au printemps, les premiers sont à Guissény (29) et Erdeven (56) le 9 mars 2003.

Le dernier migrateur est noté le 27 mai à la ZIP/Brest (29).

Des individus attribués à la sous-espèce *O.o. leucorhoa* sont détectés les 29 avril et 4 mai.

La nidification est rapportée du Finistère et du Morbihan :

- 10 couples sont recensés dans l'archipel de Molène (29) dont 1 à Banneg, 3 à Balaneg et 6 à Trielen.

- 1 couple et des jeunes en juillet à Saint-Pabu (29).

- 1 couple au Ménez Mikel/Saint-Rivoal (29) dont le mâle chante dès le 27 mars.

- 1 couple sur Sein (29).

- 1 juvénile le 26 juin à la pointe du Raz/Plogoff (29).

- 2 couples dans la presqu'île de Quiberon (56).

1 premier individu en déplacement est présent à Trunvel/Tréogat (29) le 13 juillet 2003.

TRAQUET PIE *Oenanthe pleschanska*.

1 femelle de 1^{ère} année stationne à Ouessant (29) du 14 octobre au 18 novembre 2002.

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica*.

1 individu de la sous-espèce *O.h. melanoleuca* est le 24 octobre 2002 à Hoëdic (56).

GRIVE A JOUES GRISES *Catharus minimus*.

1 juvénile séjourne du 12 au 14 octobre 2002 à Ouessant (29). Il s'agit de la 3^e donnée française et de la 2^e donnée ouessantine.

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*.

Le passage, soutenu, est noté sur les îles du 22 septembre au 29 octobre 2002 avec quelques très belles journées sur Ouessant (29) en octobre : 17 le 11, 23 le 14, 48 le 16, 8 le 19. Le pic est de 5 le 16 octobre sur Hoëdic (56). La première donnée, du 22 septembre, est la seule à provenir du continent : 1 dans la carrière de Quinipily/Baud (56). Il ne fait aucun doute que de nombreux oiseaux passent inaperçus.

La remontée concerne une vingtaine d'individus entre le 26 mars et le 27 avril 2003, maximum 4 le 9 avril à Kerharo/Plomeur (29).

MERLE NOIR *Turdus merula*.

R.A.S.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*.

Une donnée très hâtive concerne 15 individus au lycée du Restmeur/Pabu (22) le 19 septembre 2002. Le passage démarre le 7 octobre à Ouessant (29), il y reste faible jusqu'à sa fin prématurée, le 24 octobre.

Sur le continent, les mouvements ne démarrent vraiment qu'au début novembre, 20 le 1^{er} à Kergall/Languidic (56), des groupes étant ensuite notés régulièrement jusqu'à la mi-mars.

En décembre et janvier, les bandes de plus de 150 individus se comptent sur les doigts d'une main : 165 le 23 décembre 2002 à Gorré Beuzec/Tréguennec (29), 180 le 24 janvier 2003 aux Basses Landes/Sérent (56).

Le dernier groupe important concerne 86 individus le 13 mars à Kerassio/Languidic, alors que les dernières hivernantes quittent Ouessant le 19.

Les dernières départementales sont du 7 avril dans les Côtes-d'Armor, du 9 dans le Finistère et du 11 dans le Morbihan.

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*.

Le passage se déroule du 1^{er} octobre au 5 novembre 2002 à Ouessant (29) avec une arrivée de plusieurs centaines d'individus dans la nuit du 10 au 11 octobre.

Sur Hoëdic (56), plus de 1 000 oiseaux sont présents le 20 octobre.

24 migrateurs sont présents le 10 avril 2003 à Roc'h Hir/Ouessant (29).

Outre les imitations habituelles de Pic noir *Dryocopus martius*, on peut remarquer celles, plus confidentielles, du Pic mar *Dendrocopos medius*, les 15 et 23 mars à Coat Tromarc'h/Trémel (22) et le 30 mars en forêt de Coat an Noz/Belle-Isle-en-Terre (22).



photo 4 : grive musicienne (Plouarzel - Finistère, janvier 2009). T. Quelennec

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*.

21 sont notées très hâtivement le 5 septembre 2002 à Boutdeville/Langueux (22).

Sinon, le passage se déroule du 1^{er} octobre au 28 novembre à Ouessant (29).

Le maximum du passage est détecté vers la mi-octobre : le 16, des centaines à Sein (29) et des milliers à Ouessant ; le 20, 1 000+ à Hoëdic (56).

Sur le continent, les mouvements sont sensibles jusqu'à la fin novembre.

En décembre et janvier, le maximum est de 500 à 600 le 18 décembre à Tourous/Saint-Renan (29).

La remontée semble débuter peu après la mi-février 2003 et s'achève le 10 avril à Hoëdic ; on note 300 en 30 minutes le 26 mars à Campénéac (56).

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 6 au 25 octobre 2002 ; à Hoëdic (56), quelques individus sont détectés entre le 14 octobre et le 4 novembre.

38 sont vues en vol le 8 novembre entre Mauron et Concoret (56).

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*.

A Trunvel/Tréogat (29), où 206 captures sont opérées, le schéma est le même que les années précédentes : les oiseaux nichant sur le bassin versant arrivent en nombre dans la roselière vers le 10 septembre 2002.

3 individus isolés sont notés à Ouessant (29) entre le 3 septembre et le 11 octobre.

1 migrateur est entendu à l'étang du Moulin Neuf/Plounérin (22) du 25 au 30 octobre.

Les mentions intérieures sont peu nombreuses dans l'Ouest, mais quelques localités s'ajoutent à celle citées l'an passé et qui sont de nouveau occupées pour l'essentiel : Kergogan/Ploudalmézeau (29), Kergollaire/Languidic (56) et l'étang de la Forêt/Brandivy (56).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*.

A Ouessant (29), 2 individus sont détectés en juillet 2002 avant que quelques individus (4 ou 5 ?) ne passent entre le 23 septembre et le 16 octobre.

1 famille est découverte le 12 octobre à l'étang de Careil/Iffendic (35).

Quelques localités non signalées jusqu'à présent, mais pas forcément nouvelles, viennent s'ajouter à celles publiées depuis 1991 : Bréhat (22), Daoulas, Guilers, Hôpital-Camfrout, Kernouës, Plouyé, Saint-Yvi (29), Saint-Gilles (35), Saint-Joachim (44), Brandivy, Damgan, Lanester, Le Hézo, Saint-Armel (56). L'espèce est également contactée dans le camp de Coëtquidan/Campénéac et Guer (56).

La tendance est toujours nettement à la hausse.

Les premiers chanteurs sont notés le 23 février 2003 à Kersahu/Gâvres (56).

1 le 16 mai à Ouessant (29), site où l'espèce réapparaît ensuite le 8 juillet. A Hoëdic (56), le Cisticole paraît présent tout au long de la période.

LOCUSTELLE DE PALLAS *Locustella certhiola*.

1 juvénile stationne sur Hoëdic (56) du 19 au 21 octobre 2002, c'est la 4^e mention française.

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*.

La dernière mention sur un site de reproduction date du 28 juillet 2002 dans les Monts d'Arrée (29).

1 le 17 août à Trunvel/Tréogat (29) et 1 le 8 septembre à Hoëdic (56). A Ouessant (29), le passage se déroule du 29 août au 4 octobre.

La première est le 30 mars 2003 en forêt du Gâvre (44).

Le passage est noté en avril et jusqu'au 6 mai. Après le 15 mai, la Locustelle tachetée est contactée dans le marais de Dol, en forêt de Chevré/Acigné (35), à Mellionnec, à Kerlavezan/Lohuec (22), dans les Monts d'Arrée, à Lanveur/Plounéour-Trez, au Navan/Landunvez, à Kastel Ruphel/Saint-Goazec et à Loc'h ar Stang/Tréguennec (29).

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE *Locustella luscinioides*.

Le dernier chanteur est entendu le 3 août 2002 en baie d'Audierne (29).

140 captures sont réalisées à Trunvel/Tréogat (29), la dernière en date du 27 septembre.

Les retours sont notés le 31 mars 2003 à Grand-Lieu (44) et le 5 avril en baie d'Audierne (29). L'espèce est contactée sur les sites suivants au cours du printemps : le marais de Gannedel (35), la baie d'Audierne (29), Pen Mané/Locmiquélic, Kervran/Plouhinec, la Falaise et Kéravéon/Erdeven, le Cranic et la basse vallée du Loc'h/Brec'h (56), le marais Audubon et le lac de Grand-Lieu (44).

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*.

198 captures (109 l'an passé), sont opérées dans les deux grands camps de baguage de l'automne 2002, 146 au Massereau/Frossay (44) et 42 à Trunvel/Tréogat (29), du 4 août au 28 septembre sur ce dernier site. A Trunvel, la médiane est atteinte le 23 août. On peut noter qu'un individu bagué le 13 août à Trunvel est repris 10 jours plus tard au Massereau.

Sur d'autres sites, on note : 1 le 4 août à Guérande (44), 4 capturés le 3 septembre à Pen Mané/Locmiquélic (56), 1 les 15 et 16 septembre à Hirel (35).

Le dernier est observé le 1^{er} octobre au Massereau.

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus*.

Les opérations de baguage donnent les résultats suivants : 3 275 captures (+53% par rapport à l'année précédente) en baie d'Audierne (29) jusqu'au 16 octobre 2002. A Trunvel/Tréogat (29), le pic de passage est constaté vers la mi-août.

Le passage se déroule de fin juillet au 24 octobre à Ouessant (29), 1 le 8 octobre à Trielen/archipel de Molène (29)

Les premiers sont de retour en mars 2003, le 4 à Kersahu/Gâvres (56) et le 14 en baie d'Audierne. Le dernier migrateur certain chante le 17 mai à Hoëdic (56), mais l'individu contacté le 20 mai au Paluden/Minihy-Tréguier doit en être un autre.

En 2003, il y a 10+ couples reproducteurs à Ouessant (29).

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola*.

1 ind. de 1^{er} automne est vu le 30 octobre 2002 sur Ouessant (29).

ROUSSEROLLE DES BUISSONS *Acrocephalus dumetorum*.

1 oiseau de 1^{er} automne est vu à les 29 et 30 octobre 2002 sur Ouessant (29). Il s'agit de la 7^{ème} mention pour la France.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*.

2 contacts auraient été obtenus le 17 juillet 2002 sur la côte léonarde (29) : 1 au Vougot/Guissény et 1 alarmant à Prat Lédan/Plouguerneau. Faute de précision, le conditionnel s'impose.

2 ou 3 individus sont identifiés à Ouessant (29) à l'automne : 1 le 16 octobre et 1 ou 2 entre le 30 octobre et le 4 novembre. A Hoëdic (56), 1 individu stationne du 21 au 26 octobre.

1 le 1^{er} mai 2003 à Ouessant.

3 chanteurs sont notés entre le 22 mai et le 9 juin à Chantoiseau/Saint-Hélen (22) ; les premières sont contactées le 24 mai dans le marais de Dol (35).

1 chanteur est noté à Radenog/Brignogan-Plage (29) le 1^{er} juin.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*.

1939 individus sont capturés en baie d'Audierne (29) de juillet à fin septembre 2002. Sur ce site, où le dernier poussin, à peine volant, est noté le 4 septembre, 1 individu, bagué le 12 août à Donges (44) est pris le 25 août.

A Ouessant (29), où 29 oiseaux sont capturés au Niou du 20 au 22 août, le passage se termine le 5 novembre. A Hoëdic (56) et à Grand-Lieu (44), les dernières sont vues le 26 octobre.

La première, très hâtive, est de retour le 19 mars 2003 à Sarzeau (56), mais les suivantes arrivent de façon groupée le 8 avril puis à partir du 14.

Sur Sein (29), 1 individu est dans une haie le 3 mai.

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus*.

Il n'y a aucune mention, ce qui ne veut pas dire que cette espèce était absente !

HYPOLAIS BOTTEE *Hippolais caligata*.

2 individus passent sur les îles à l'automne : 1 le 22 octobre 2002 à Hoëdic (56) et 1 le 7 novembre à Ouessant (29).

Il s'agit des 6^e et 7^e données françaises et des 4^e et 5^e données bretonnes de cette espèce.

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*.

1 jeune est le 17 août 2002 à Léhan/Tréffiagat (29), il s'agit peut-être d'un oiseau local en fin de séjour ; 6 individus passent à Ouessant (29) entre le 18 août et le 19 octobre ; 1 le 19 septembre à l'étang du Relecq-Kerhuon (29) ; dernière le 22 octobre à Hoëdic (56).

La première est de retour le 15 avril 2003 à l'étang de Careil/Iffendic (35).

En limite de répartition, l'espèce est contactée en 2003 à Combrit (29).

1 chanteur le 14 juillet à Ouessant.

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata*.

Le 19 octobre 2002, l'espèce est notée sur deux sites atypiques : une friche dépourvue d'ajoncs en bordure orientale de l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande (35) et la pointe du Cosmeur/Carantec (29), où elle n'est pas connue pour se reproduire. Il s'agit peut-être d'indices de passage ou de dispersion.

L'espèce est notée en Loire-Atlantique le 7 mars 2003 près de la plage de l'Etang/Pornic.

Le 27 mai, 1 sur le polder de la ZIP/Brest (29).

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantilans*.

1 femelle les 23 et 24 avril 2003 à Ouessant (29).

FAUVETTE ORPHEE *Sylvia hortensis*.

1 mâle chanteur le 25 juin 2003 à Ouessant (29).

FAUVETTE EPERVIERE *Sylvia nisoria*.

3 individus de 1^{er} automne sont identifiés à Ouessant (29) : 1 du 14 au 23 octobre 2002, 1 du 18 au 22 octobre, 1 les 12 et 14 novembre.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*.

5 individus passent à Ouessant (29) entre le 9 septembre et le 2 octobre 2002 ; 2 stationnent du 14 au 17 octobre à Sein (29).

Au début mai 2003, on note : 1 chanteur le 6 à Toull Bili/Trédrez-Locquémeau (22) et 1 couple le 9 sur Bréhat (22).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*.

Le passage se déroule du 14 août au 25 octobre 2002 à Ouessant (29), on note également la dernière le 24 octobre à Hoëdic (56).

La première est de retour le 29 mars 2003 à Tresboeuf (35).

Les autres premières départementales interviennent le 30 dans le Morbihan, le 13 avril dans le Finistère et le 17 dans les Côtes-d'Armor.

On note 15 individus le 19 avril sur Hoëdic et 25+ le 27 à Careil/Iffendic (35).

L'espèce arrive le 14 avril à Ouessant où 1 seul couple s'installe.

L'espèce semble moins abondante au printemps 2003 qu'en 2002 selon les données transmises.

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*.

Le passage s'achève le 18 octobre 2002 à Hoëdic (56) et le 20 sur l'île d'Ouessant (29).

La première est notée à Saint-Just (35) le 10 avril.

Parmi les autres premières départementales, on relève celle du 14 avril 2003 dans le Finistère et du 15 dans le Morbihan.

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*.

Sur les îles d'Ouessant (29) et d'Hoëdic (56) le passage s'arrête fin octobre début novembre 2002 ; l'individu contacté le 16 novembre sur Ouessant pourrait être une future hivernante.

20 le 16 mars 2003 à Hoëdic alors que la première migratrice est notée le 18 à Ouessant.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus*.

3 individus en octobre 2002 pour 3 îles : 1 le 18 à Sein (29), 1 le 19 à Hoëdic (56) et 1 les 29 et 30 à Ouessant (29).

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*.

23 individus passent à Ouessant (29) entre le 3 septembre et le 16 novembre 2002 avec un creux du 28 septembre au 8 octobre et un maximum de 9 le 16 octobre ; 1 le 19 septembre à Hillion (22) ; 1 le 3 octobre à Groix (56) ; 1 le 18 octobre à Sein (29) ; 1 trouvé mort le 19 novembre au centre-ville de Ploemeur (56).

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*.

Aucune donnée pour la période.

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*.

2 ou 3 individus séjournent à Ouessant (29) entre le 7 et le 21 octobre 2002.

Le premier est observé en forêt du Cranou (29) le 22 avril 2003.

L'espèce est contactée au printemps 2003 sur les sites suivants : bois de Gâtines, étang du Boulet, forêt de Saint-Aubin-du-Cormier, forêt de Rennes, forêt de Chevré, forêt du Pertre, forêt de Paimpont (35), forêt de Loudéac (22), bois du Relecq, forêt du Cranou, forêt de Coatloc'h (29). Aucune donnée pour le Morbihan et la Loire-Atlantique.

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*.

Des pouillots de Sibérie *P.c. tristis/fulvescens* sont capturés à Montoir-de-Bretagne (44) : 2 le 18 décembre 2002 et 3 le 15 janvier 2003. A Ouessant (29), des contacts concernent cette sous-espèce entre le 14 octobre et le 12 novembre.

4 pouillots véloces « de type sibérien » présentant donc des caractéristiques intermédiaires entre le pouillot de Sibérie et le pouillot vélocé nordique sont observés entre le 24 octobre et le 28 décembre à Ouessant ; 2 sont capturés le 18 décembre à Montoir-de-Bretagne.

Quelques pouillots véloces nordiques *P.c. abietinus* sont mentionnés entre le 19 octobre et le 4 novembre à Ouessant.

A Ouessant, le passage printanier est maximal entre le 18 et le 26 mars.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*.

Le passage démarre le 20 juillet 2002 à Iffendic (35) et se termine le 19 octobre à Ouessant (29) où un(des) attardé(s) est(sont) ensuite vu(s) les 16 novembre et... 27 décembre ! Les mouvements culminent de la mi-août à la mi-septembre.

Le premier est noté le 12 mars 2003 à Lann Bourgeol/Inguiniel (56), puis l'espèce est noté le 25 en Ille-et-Vilaine, le 27 dans le Finistère, le 29 en Loire-Atlantique et le 30 mars dans les Côtes-d'Armor.

Les derniers migrants sont détectés le 18 mai. Après cette date l'espèce n'est plus contactée qu'en forêt de Chevré/Acigné (35), dans le secteur du Trégor intérieur sur les communes de Belle-Isle-en-Terre, Plounérin et Plounevez-Moëdec (22), dans les Monts d'Arrée (29), à Boiséon/Lanmeur (29) et en forêt du Cranou (29).

Un chanteur au chant mixte fitis/vélocé *P. trochilus***P. collybita* est entendu en forêt du Cranou du 3 au 26 mai.

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*.

15 familles sont détectées entre la fin juillet et le 25 août 2002, l'espèce se reproduisant tardivement.

A Ouessant (29), le passage est noté du 3 septembre jusqu'à la 1^e semaine de novembre. Sur Hoëdic (56), le passage est maximal les 20 et 22 octobre avec 15 individus.

La 1^e famille est découverte le 19 juin 2003 à Trélivan (22).



photo 5 : roitelet huppé mâle en parade (Ouessant - Finistère, octobre 2008). T. Quelennec

ROITELET TRIPLE-BANDEAU *Regulus ignicapillus*.

Le passage démarre le 1^{er} septembre 2002 pour s'achever début novembre sur Ouessant (29). Sur cette île comme sur Hoëdic (56), le pic est atteint en octobre.

Les premiers chants sont entendus le 26 février 2003 à Sougéal (35).

14 localités donnent lieu à des contacts en période de reproduction (après le 30 avril) : la forêt de Villecartier/Bazouges-la Pérouse, la forêt de Fougères, la forêt de Chevré/La Bouëxière (35), la forêt de Loudéac, le manoir et la forêt de Beffou/Loguivy-Plougras, Coat Tromarc'h/Trémel (22), Kerfaven/Ploudiry, le bourg de Daoulas, la forêt du Cranou/Hanvec, Kernec'h/Combrit, Rosulien/Plomelin, Penvelet/Plomelin et Stang Jet/Saint-Yvi (29). Dans le Morbihan, 4 communes fournissent des données printanières sans précision et il n'est pas possible de les considérer à coup sûr comme relatives à des reproducteurs : Brandérion, Inguiniel, Larmor-Baden et Locoal-Mendon.

GOBEMOUCHE GRIS *Musicapa striata*.

Le passage se déroule du 19 août au 4 novembre 2002 à Ouessant (29) avec un maximum lors des deux premières décades de septembre. A Hoëdic (56), les données s'étalent du 16 août au 29 septembre. A Sein (29), le dernier contact est obtenu le 28 septembre.

Les retours sont particulièrement hâtifs : le 3 avril 2003 en forêt de Loudéac (22) et le 5 à Grand-Lieu (44). Les autres premières départementales sont obtenues le 30 avril en Ille-et-Vilaine, le 1^{er} mai dans le Finistère, le 16 mai dans le Morbihan.

Sur les îles, le passage cesse le 17 mai.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva*.

5 individus semblent être passés par Ouessant (29) entre le 15 septembre et le 29 octobre 2002 contre 20 l'an passé.

Sur Sein (29), 2 individus sont notés le 28 septembre, 1 présente les caractéristiques du Gobemouche de la Taïga *F. p. albicilla*, 1 autre est découvert le 11 octobre.

Sur le continent, 1 adulte se trouve les 28 et 29 octobre à Pen Mané/Locmiquélic (56).

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*.

Le passage se déroule du 2 août au 29 octobre 2002. Le pic de passage se déroule du 15 août au 15 septembre, maximum 7 le 17 août à Hoëdic (56).

Au printemps, 4 isolés passent à Ouessant (29) entre le 8 et le 16 avril 2003 ; 3 passent à Hoëdic entre le 13 et le 24 avril.

1 mâle chante le 2 juin en forêt du Cranou/Hanvec (29) ; 2 le 7 juin à Belz (56).

PANURE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*.

377 captures (dont 282 juvéniles) sont effectuées à la station de baguage de Trunvel/Tréogat (29) entre juillet et octobre 2002.

La reproduction est prouvée à l'étang du Curnic/Guissény (29) avec 1 famille les 18 et 19 août 2003.

En été, l'espèce est observée à Kerloc'h/Camaret-sur-Mer & Crozon, en baie d'Audierne (29), à Pen Mané/Locmiquélic (56) (reproduction prouvée) et à Landrezac/Sarzeau (56).

En automne et en hiver, l'espèce est contactée en dehors de son aire de répartition à Ouessant (29) entre le 19 octobre et le 1^{er} novembre et à Lez ar Mor/Goulven (29) entre le 31 octobre et le 25 janvier.

La Panure est présente au printemps en baie d'Audierne, à Pen Mané/Locmiquélic et à Pradel/Guérande (44).

MESANGE A LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus*.

Le plus grand regroupement compte 45 individus le 25 novembre 2002 dans le marais de Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35). Les bandes de plus de 20 individus sont observées entre le 8 septembre et le 11 février.

A Ouessant (29), 2 couples se reproduisent au printemps 2003 pour la 2^e année consécutive.

MESANGE NONNETTE *Parus palustris*.

Les données sont assez nombreuses pour cette espèce peu commune qu'il convient de noter systématiquement afin d'en suivre l'évolution. Les données intérieures dominent largement.

MESANGE HUPPEE *Parus cristatus*.

Cette espèce à la distribution nordique pourrait faire l'objet d'une plus grande attention. Dans l'état actuel des choses, il est difficile d'en dire quoi que ce soit, tant elle est peu notée.

MESANGE NOIRE *Parus ater*.

Une seule donnée concerne un individu en dehors des secteurs de nidification : 1 le 6 décembre 2002 à Rennes (35).

L'espèce est présente sur des sites de reproduction dans les localités suivantes : forêt de Paimpont (35), forêt de Loudéac, forêt de Duault/Saint-Servais, forêt de Coat an Noz/Belle-Isle-en-Terre, forêt de Beffou/Loguivy-Plougras (22), forêt de Fréau/Poullaouen, forêt d'Huelgoat, Monts d'Arrée, forêt de Landévennec (29), forêt de Camors et forêt de Floranges/Camors (56). La reproduction est prouvée en forêt de Beffou/Loguivy-Plougras et au Roc'h Cléguer/Brasparts, dans les Monts d'Arrée.

MESANGE BLEUE *Parus caeruleus*.

L'espèce est observée à Hoëdic (56) les 13 et 16 octobre et à 4 reprises à Sein (29) entre le 29 septembre 2002 et le 3 mai 2003.

MESANGE CHARBONNIERE *Parus major*.

Deux indices de passage sont recueillis sur les îles en octobre 2002 : 1 le 21 à Hoëdic (56) et 2 arrivent de la mer le 23 à Kadoran/Ouessant (29).

SITTELLE TORCHEPOT *Sitta europea*.

Des loges de Pic noir *Dryocopus martius* ont été maçonnées à Beauport/Paimpol (22) et à Coat Tromarc'h/Trémel (22) au printemps 2003.

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*.

3 massifs d'Ille-et-Vilaine fournissent des mentions : la forêt de Rennes (avec notamment 4 chanteurs le 15 mars 2003 et 3 le 22), la forêt de Paimpont (1 chanteur le 15 mars) et la forêt de Villecartier/Bazouge-la-Pérouse (1 chanteur le 30 mars).

Le milieu où le chanteur a été repéré en forêt de Paimpont diffère du taillis sous futaie de hêtre et de chêne utilisé exclusivement par l'espèce en Ille-et-Vilaine jusqu'à présent : il s'agit plutôt d'un boisement mixte de feuillus et de résineux moins nombreux. Une confirmation s'impose.

1 individu aurait été contacté, sans plus de précision, le 1^{er} mai au château de Gilles de Bretagne/Saint-Cast-le-Guildo (22). Information publiée avec toutes les réserves qui s'imposent.

GRIMPEREAU DES JARDINS *Certhia brachydactyla*.

R.A.S..

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus*.

6 le 14 octobre 2002 à Trunvel/Tréogat (29), 1 les 23 et 26 à Hoëdic (56) et 1 le 4 novembre à Pen Mané/Locmiquélic (56).

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*.

1 famille est observée le 25 juillet 2002 au Tronchet (35).

Il n'y a aucune mention après le 28 juillet en dehors de celle, particulièrement tardive, concernant 1 jeune ou une femelle le 12 octobre à Kerglonou/Plouarzel (29).

Le premier est de retour le 23 avril 2003 à Hoëdic (56). Sur cette île, le passage a lieu jusqu'au 18 mai alors que sur Molène (29) et Sein (29) il se déroule entre le 28 avril et le 7 mai.

En période de reproduction, le loriot n'est noté qu'en Ile-et-Vilaine et Loire-Atlantique en dehors de l'individu vu au Légué/Saint-Brieuc (22) les 24 et 27 juin.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*.

Dernière observation sur site de reproduction le 24 juillet 2002 dans le marais de Dol (35).

Le passage est circonscrit entre le 25 août et le 12 octobre, mais presque toutes les observations sont réalisées en septembre.

La première est notée le 9 mai à Ercé-en-Lamée (35).

4 couples sont dénombrés au printemps 2003 dans le marais de Dol (35) et 15 dans les marais de Vilaine (35-44-56). En Ile-et-Vilaine, l'espèce est présente au printemps sur d'autres communes : Saint-Thurial (1 couple), La Bosse-de-Bretagne (1 couple), Guipry (1 couple), La Dominelais (2 couples), Grand-Fougeray (2 couples).

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator*.

Apparemment, une année blanche pour cette espèce, fait rare.

GEAI DES CHENES *Garrulus glandarius*.

4 le 16 novembre 2002 sur Ouessant (29), donnée rarissime.

1 imite le Pic mar *Dendrocopos medius* (22) le 6 avril 2003 en forêt du Cranou (29).

PIE BAVARDE *Pica pica*.

Un dortoir regroupe 130 individus le 29 décembre 2002 à Careil/Iffendic (35).

CRAVE A BEC ROUGE *Pyrrhonorax pyrrhonorax*.

En période de reproduction les effectifs maximaux notés sont :

19 en automne dans le secteur du Cap Sizun (29), 11 les 19 et 20 septembre ainsi que le 23 février à Locmaria-Plouzané (29), 27 le 12 octobre à Ouessant (29), 14 le 4 mai à la pointe de Pen Hir/Camaret-sur-Mer (29) et 12 le 11 juillet à Illien/Ploumoguier (29).

Quelques recensements très incomplets ont été réalisés au printemps 2003 :

Sites	Dépt	Nombre de couples
Ouessant	29	13
Léon	29	1+
Presqu'île de Crozon	29	1+
Cap Sizun	29	4+
Belle-Île	56	?
Total		19+

Une seule donnée en dehors des sites de reproduction : 4 le 29 septembre 2002 au-dessus de la pointe de la Garchine/Porspoder (29).

CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*.

Le rassemblement le plus important regroupe 700+ individus le 8 novembre 2002 à Tourois/Saint-Renan (29).

L'espèce est contactée au printemps 2003 sur un certain nombre de cartes 10 km * 10 km restées vierges lors de l'enquête nicheurs 1980-1985 et de son complément pour les Côtes-d'Armor qui s'est achevé en 1989. On peut noter, sans être exhaustifs et en complément des informations publiées depuis l'année 2000 : Forêt du Cranou (G08), Saint-Rivoal (G09), Duault (G14), Pont-de-Buis-les-Quimerch (H08), Pleyben (H09), Châtillon-en-Vendelais (H30), Thorigné-sur-Vilaine (I27), Forêt de Branguily (J18), Mauron (J22), Comper (J23), Scaër (K11), Bubry (K15), Campénéac (K22), Baud (L16), Lizio (L20), Ploërmel (L21), Trédion (M20), Etel (O15), Auray (O17), Sarzeau (P18) et Montoir-de-Bretagne (R23).

Il s'agit ici du nom et du numéro des cartes concernées.

L'amélioration constatée ne tient pas uniquement à un intérêt plus soutenu, une tendance à la hausse est perceptible.

CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus*.

1 le 28 février 2003 à Ouessant (29).

Les recensements menés en Ile-et-Vilaine au printemps 2003 ne sont pas exhaustifs. 156-160 nids sont dénombrés sur 5 colonies réparties sur 2 communes : Cesson-Sévigné et Pacé.

Dans les Côtes-d'Armor, 30 couples nichent au lycée agricole de Pommerit-Jaudy. Dans l'Est du département, 8 individus sont vus le 30 avril à Trémeur, d'où viennent-ils ?

Dans le Finistère, quelques colonies sont localisées à Bourg-Blanc, Kernouës, Lannilis, Lanrivoaré, Plomeur, Ploudaniel et Saint-Pol-de-Léon pour un minimum de 114 nids.

Dans le Morbihan, 2 sont le 5 avril à Ménéantoux/Bubry et 20 le 7 juin à Kerouriec/Erdeven.

En Loire-Atlantique, une seule mention concerne 50-75 nids le 9 mars dans une peupleraie de l'île Coton/Ancenis.

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone*.

245 en dortoir le 27 décembre 2002 à Luitré (35).
1 couple se reproduit sur Balaneg/Molène (29) en 2003.

GRAND CORBEAU *Corvus corax*.

Quelques données intéressantes sont recueillies avant la saison de reproduction ou à son début : 1 le 14 août 2002 à Trunvel/Tréogat (29), 1 parade le 16 août au-dessus de la forêt du Cranou (29), 2 à 5 du 14 au 20 octobre à Hoëdic (56), 2 le 22 décembre à Cudel/Spézet (29), 2 le 11 janvier 2003 au lac du Drennec/Sizun (29), 2 en parade le 24 février au Cragou/Le Cloître-Saint-Thégonnec (29), 2 paradent le 10 mars au Roc'h Trévèzel/Plounéour-Ménez (29), 1 le 11 à Meslan (56), 1 le 28 mars au Relecq/Plounéour-Ménez.

1 oiseau fréquente la pointe de Tréfeuntec/Plonévez-Porzay (29) entre le 24 janvier et le 4 avril.
32 couples se cantonnent en 2003, 29 construisent un nid (28 l'an passé), la tendance à la reprise se confirme.

ETOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris*.

Le dortoir des Monts d'Arrée (29) abrite plusieurs centaines de milliers d'individus au cours de l'hiver 2002-2003. Celui de Vannes (56) culmine à 9 200 individus le 22 février 2003.
Les migrateurs arrivent à la mi-octobre et il n'est plus noté de grandes bandes après le 10 mars.

ETOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*.

6 individus sont contactés dont 5 en été et à l'automne 2002 puis 1 au printemps 2003 :

- 1 adulte du 29 juillet au 1^{er} septembre à Molène et à Ouessant (29),
- 1 juvénile du 10 au 13 septembre à Sein (29),
- 1 juvénile du 28 au 30 septembre à Hoëdic (56),
- 1 juvénile le 6 octobre à Ouessant (29),
- 1 juvénile le 15 octobre à Trunvel/Tréogat (29),
- 1 adulte du 10 au 12 juin à Molène (29).

MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus*.

R.A.S..

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*.

En 2002, l'espèce est notée dans les communes d'Erbrée, Laignelet, Pacé et Vitré (35) et en 2003 dans celles de Châtillon-en-Vendelais, Etrelles, Irodouër, Vendel (35) et Lanouée (56).
Sur ce dernier site, des nourrissages ont lieu le 5 juin.

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs*.

Des bandes de plusieurs milliers d'oiseaux sont notées du 19 octobre au 11 novembre 2002.

Le maximum est de 18000 individus le 29 octobre à Hoëdic (56).

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla*.

Le passage se déroule du 25 septembre au 5 novembre 2002 à Ouessant (29).

L'hivernage est peu marqué avec des maxima assez modestes : 30 les 6 et 9 décembre en forêt de Coëtquen (22) et 50+ le 5 février en forêt de Coat an Noz (22).

Le dernier est signalé le 5 avril 2003 à Saint-Nazaire (44).

SERIN CINI *Serinus serinus*.

Le petit passage (10 observations) se déroule du 14 au 28 octobre 2002 à Ouessant (29).

La plus grosse bande concentre 40 individus le 12 janvier à Plouër-sur-Rance (22).

Au printemps 2003, en Basse-Bretagne intérieure, seules les communes de Guingamp, Plounévez-Moëdec (22), Pleyber-Christ (29) et Landévant (56) fournissent des mentions, et encore à Plounévez-Moëdec le chanteur du 26 juin n'est-il que de passage.

VERDIER D'EUROPE *Carduelis chloris*.

Une bande de 650 est notée le 8 décembre 2002 en forêt de Fougères (35).

CHARDONNERET ELEGANT *Carduelis carduelis*.

La plus grosse bande réunit 120 individus le 15 janvier 2003 à Paimpol (22).



photo 6 : chardonneret élégant (centre Finistère, juin 2008). T. Quelennec

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*.

A Ouessant (29), le passage est maximal durant les deux dernières décades d'octobre et début novembre 2002 : on note en particulier 10 000+ le 14 octobre. Passé la mi-novembre, les effectifs diminuent progressivement même si 100 sont encore notés le 15 décembre près du canal de l'Ille à Saint-Grégoire (35).

En hiver, aucun groupe n'atteint la cinquantaine d'individus, le maximum étant de 44 les 28 décembre et 8 janvier à Trélivan (22).

Les derniers groupes sont notés début mars 2003, le dernier étant signalé le 29 mars à la station d'épuration de Meslan (56).

LINOTTE MELODIEUSE *Carduelis cannabina*.

A Ouessant (29), l'espèce est absente du 21 octobre 2002 au 20 février 2003. Sur l'île plus de 1 000 individus sont dénombrés au Kun le 7 septembre.

L'espèce est abondante sur Hoëdic (56) fin mars et début avril alors que des installations sont notées les 6 et 7 avril dans le Sud-Finistère.

Le passage se poursuit jusqu'à la fin avril avec notamment 250 le 10 à Penfret aux Glénan/Fouesnant (29) et 150 le 11 à Hoëdic.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*.

A Ouessant (29), 10 observations sont faites entre le 25 septembre et le 29 octobre 2002 avec une intensité plus marquée lors de la deuxième quinzaine d'octobre.

1 femelle de la sous-espèce *C. f. cabaret* le 16 octobre à Sein (29), 1 le 26 aux Forges (56), 1 le 12 novembre au Rheu (35), 1 *C. f. flammea* le 9 mai 2003 à Sein.

BEC-CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*.

L'invasion qui a débuté à la fin de la période précédente se poursuit tout au long de l'année avec des effectifs assez importants. Tous les mois sont concernés sauf juin.

A Ouessant (29), 18 observations sont collectées entre le 2 septembre et le 28 octobre 2002 avec un maximum remarquable de 120-130 le 14 octobre.

Les dernières grandes bandes sont observées en décembre et les derniers migrateurs probables sont notés en mars 2003 jusqu'au 23 peut-être.

A partir du début avril et jusqu'en juillet, l'espèce est observée sur plusieurs sites et la reproduction est certaine : des chants sont entendus en mars dans les forêts de Chevré et de Fougères (35) et des jeunes observés le 4 mai en forêt de Paimpont (35).

On peut retenir la liste des sites occupés au printemps 2003 après le 1^{er} avril : bois de Chinsève, forêt de Rennes, forêt de Saint-Aubin-du-Cormier, forêt de Chevré, forêt de Paimpont (35), forêt de Lorge (22), Penlan/Plourin-les-Morlaix (29), forêt de Camors, la Lande du Temple/La Vraie-Croix (56).

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus*.

1 mâle gris chante le 29 mai 2003 à Sein (29) quasiment 1 an après le passage d'un autre individu sur l'île. Il s'agit de la 3^e donnée printanière pour la Bretagne.

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula*.

R.A.S..

GROSBEC CASSE-NOYAUX *Coccothraustes coccothraustes*.

L'individu contacté le 12 août 2002 à Vern-sur-Seiche (35) est un nicheur local à n'en pas douter.

1 passe le 20 octobre à Hoëdic (56).

En automne et en hiver, jusqu'au 31 mars, le Grosbec est observé dans les communes d'Acigné, La Bouëxière, Liffré, Piré-sur-Seiche (35), Belle-Isle-en-Terre (22), Trébabu (29), Campénéac (56) ainsi qu'en forêt de Fougères (35), mais les effectifs sont très faibles.

Au printemps 2003, les seules données proviennent de la forêt du Cranou/Hanvec (29), site inédit, et de la forêt de Chevré/Acigné. Aucune preuve formelle de reproduction n'est cependant rapportée.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 10 septembre au 5 novembre 2002 avec un pic bien marqué du 11 au 31 octobre : 23 les 16 et 20.

Sur le littoral léonard (29), l'espèce apparaît également en septembre : 1 du 14 au 16 au Curnic/Guissény, 3 du 21 au 23 puis 1 le 28 au Kernic/Plounévez-Lochrist. On note aussi 1 le 22 septembre à la pointe de Dinan/Crozon (29) et 1 le 28 à Trunvel/Tréogat (29).

En octobre, les observations se partagent quasi-exclusivement entre Ouessant et Hoëdic (56) où 1 individu est observé du 14 au 25. On note toutefois 1 du 30 octobre au 3 novembre à Kerpallud/Paimpol (22).

A partir du 28 novembre, l'espèce est contactée sur deux sites d'hivernage déjà fréquentés l'an passé : maximum de 10+ le 8 février dans la réserve de chasse/Hirel (35) et 3 le 19 décembre à Planguenoual (22).

1 le 14 mars 2003 à Ouessant.

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*.

Le passage se déroule du 7 au 29 octobre 2002 à Ouessant (29), mais 6 individus sont découverts dès le 22 septembre au Kernic/Plounévez-Lochrist (29), ils y sont encore présents le 19 novembre.



photo 7 : bruant des neiges (Ouessant - Finistère, octobre 2008). T. Quelennec

Sur les autres sites, les mouvements démarrent à partir du 28 octobre : le 28, 1 au Curnic/Guissény (29) ; le 1^{er} novembre, 1 à Hoëdic (56) ; le 17 novembre, 1 à l'île Besnard/Saint-Coulomb (35).

Après le 17 novembre 2002 et jusqu'au 15 février 2003, les données concernant des oiseaux sur les sites d'hivernage, on note les maxima : 4 à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22), 1 à la Groue/Saint-Pol-de-Léon, 1 au Kernic, 1 à la pointe de Combrit (29). L'ensemble est bien maigrelet. Le dernier est vu le 12 avril au cap Fréhel (22).

BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella*.

1 individu est de passage le 28 août 2002 à Ouessant (29).

BRUANT ZIZI *Emberiza cirlus*.

4 individus sont découverts le 30 décembre 2002 à Hoëdic (56), île où l'espèce ne niche pas. 1 seul chanteur est entendu sur 119 points d'écoute autour de Grand-Lieu (44) au printemps 2003.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*.

1 le 3 septembre à Locmiquélic (56), 1 les 6 et 7 à Ouessant (29), 1 le 11 septembre 2002 à la Capitaine au lac de Grand-Lieu (44), 1 le 16 octobre à Ouessant.
1 le 1^{er} avril 2003 à Ouessant, 1 les 23 et 26 avril à Hoëdic (56).

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla*.

1 juvénile est capturé le 2 octobre 2002 à Trunvel/Tréogat (29).
1 le 8 mars 2003 à Kerminihy/Erdeven (56) et 1 le 23 avril à Hoëdic (56).

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus*.

383 dont 232 juvéniles sont capturés à Trunvel/Tréogat (29) en fin d'été et à l'automne 2002.
Le passage est noté à Ouessant (29) entre le 1^{er} octobre et le 18 novembre avec un pic du 11 au 31 octobre. A Hoëdic (56), les mouvements sont circonscrits entre le 13 octobre et le 1^{er} novembre.
Les mentions de dortoirs les plus importantes concernent 100 individus le 19 janvier 2003 à Pacé (35) et le 23 février au marais du Launay/Trévou-Tréguignec (22).
A Hoëdic, on note 1 le 17 mars, 22 et 23 avril.
Les observations relatives aux nicheurs concernent majoritairement les Monts d'Arrée et leurs confins (22-29).

BRUANT MELANOCEPHALE *Emberiza melanocephala*.

1 mâle immature est observé sur Sein (29) les 26 et 27 mai 2003.

BRUANT PROYER *Miliaria calandra*.

A l'automne 2002, on peut noter 1 le 25 septembre à la pointe de Tal a Grip/Plomodiern (29).
Dans le fond de la baie de Douarnenez (29), des individus sont ensuite notés en automne et en hiver : le 8 décembre à Goulit ar Guer/Plomodiern, le 8 février (15 individus) à Tréguer Vihan/Plonévez-Porzay (29) ; 1 chanteur le 23 mars à Kervijen/Plomodiern.
La première donnée obtenue hors sites de reproduction concerne 1 oiseau le 26 octobre à Hoëdic (56), puis 1 le 28 à Ouessant (29). 18 le 5 novembre à Bourienne/Langueux (22), site où 8 sont notés le 16 décembre. Non loin de là, 30 sont présents le 21 décembre à Planguenoual (22).
L'espèce est également notée en hiver sur des sites de reproductions classiques : la baie du Mont-Saint-Michel (35), le littoral léonard (29) et la baie d'Audierne (29).
En mars 2003, 1 le 16 à Loc'h Coziou/Trégunc (29) et 1 chante le 23 à Kerfany/Moëlan-sur-Mer (29). Ce secteur du Sud-Finistère est peu suivi.
En période de reproduction, le proyer est contacté sur les secteurs suivants :
-le littoral léonard (29) sur les communes de Guissény, Kerlouan, Lampaul-Plouarzel, Plougoulm (nouveau, reproduction réussie sur un secteur abandonné depuis longtemps), Plounévez-Lochrist (nouveau) et Saint-Pabu.
-le fond de la baie de Douarnenez (29) sur la commune de Plomodiern.
-la baie d'Audierne (29).
-le littoral du Sud-Est du Finistère sur la commune de Moëlan-sur-Mer.
-la vallée de la Loire (44) sur la commune de Saint-Etienne-de-Montluc.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

Bargain B., 2004. *Rapport de la station de baguage de la baie d'Audierne*. Rapport de contrat Morgane. Bretagne Vivante/DIREN Bretagne/Conseil Général du Finistère : 46p.

Bargain B. & Henry J., 2003. *Rapport de la station de baguage de la baie d'Audierne pour l'année 2002*. Bretagne Vivante/DIREN/Conseil Général du Finistère : 52p.

Berthelot P., 2002. Note sur un Tadorne de Belon morbihannais en baie de Paimpol. *Le Fou*, 58 : 6

Berthelot P., 2003. La Mouette mélanocéphale de 1984 à 2002 dans les Côtes-d'Armor. *Le Fou*, 61 : 3-8

Berthelot P., 2004. Mise à jour des espèces occasionnelles ou rares dans les Côtes-d'Armor. *Le Fou*, 62 : 7-17

Blanchard J.L., 2004. Le Choucas des bois. *Ar Vran Morbihan*, 26 : 54-55

Bretagne Vivante-SEPNB, 2002. *Annuaire des réserves 2002*. Bretagne Vivante-SEPNB : 282p.

Bretagne Vivante-SEPNB, 2002 & 2003. Bulletins de liaison. *Le Grèbion*, 5 à 11

Bretagne Vivante-SEPNB, 2003. *Annuaire des réserves 2003*. Bretagne Vivante-SEPNB : 276p.

Brié J.Y. & Dugué H., 2007. La Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) en Loire-Atlantique. *Chronique naturaliste du GNLA*. Année 2006 : 58-60

Cadiou B. (coord.), 2004. Oiseaux marins nicheurs de Bretagne, 2001-2003. *Annuaire des réserves 2003*. Bretagne Vivante-SEPNB : 235-250

Cadiou B., 2005. Cap Fréhel 2002-2004 Bilan de trois saisons de reproduction. *Le Fou*, 67 : 14-23

Cadiou B., 2006. Implantation et nidification au sol du Héron cendré *Ardea cinerea* dans l'archipel de Molène. *Ornithos*, 13-4 : 268-270

Caillat M., Dugué H., Leray G., Gentric A., Pourreau J., Julliard R. & Yésou P., 2005. Résultats de dix années de baguage de fauvettes paludicoles *Acrocephalus* sp. dans l'estuaire de la Loire. *Alauda*, 73-4 : 375-388

Clech D., Cozic E., Floté D., Grémillet X. & Le Roc'h P., 2004. Les Cahiers de la surveillance. Bilan 2003. *L'oiseau magazine. Rapaces de France*, 6 : 20 p.

Conservatoire du Littoral., 2003. Tentative d'éradication du Surmulot sur l'île Tomé. *Le Fou*, 59 : 9-11

Cozic E., 2004. Nidification du Faucon pèlerin en Bretagne. Bilan 2003. *Le Fou*, 63 : 15-19

Deceuninck B., Dronneau C., Kerautret L., Mahéo R. & Maillet N., 2004. Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France - janvier 2003. Wetlands International et la LPO : 39p.

Derian G. (coord.), 2003. Recensement morbihannais des grands cormorans *Phalacrocorax carbo*, hiver 2002-2003. *Ar Vran Morbihan*, 25 : 49-52

Derian G. (coord.), 2003. Un recensement diurne le long du Blavet, grands cormorans *Phalacrocorax carbo* en hiver. *Ar Vran Morbihan*, 25 : 53-54

Derian G., 2005. Suivi d'un groupe colonial de goélands argentés (*Larus argentatus*) sur les criées de Lorient (1^o partie). *Ar Vran Morbihan*, 28 : 46-50

Derian G., 2005. Suivi d'un groupe colonial de goélands argentés (*Larus argentatus*) sur les criées de Lorient (2^o partie). *Ar Vran Morbihan*, 29 : 57-61

Derian G., 2006. grands cormorans (*Phalacrocorax carbo*) dans la rade de Lorient : présence pluriannuelle et occupation de l'espace. *Ar Vran*, 17-1 : 3-19

Dubois P.J., Le Maréchal P., Oliosio G. & Yésou P., 2000. Inventaire des Oiseaux de France. Nathan, Paris : 397p.

Eybert M.C., Bonnet P., Geslin T. & Hédin J., 2005. La reproduction de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* en Brière (Loire-Atlantique, France). *Alauda*, 73-1 : 53-58

Feuvrier B., Michelat D. & Vaslin M., 2005. Afflux record de Hiboux des marais *Asio flammeus* en France au cours de l'hiver 2002-2003. *Ornithos*, 12-5 : 261-268

Février Y., 2003. Statut nicheur d'une espèce patrimoniale majeure de l'estuaire de la Rance : Le Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*. *Le Fou*, 60 : 5-23

Frémont J.Y. & le C.H.N., 2004. Les oiseaux rares en France en 2002. *Ornithos*, 11-2 : 49-85

Frémont J.Y. & le C.H.N., 2005. Les oiseaux rares en France en 2003. *Ornithos*, 12-1 : 2-45

Frémont J.Y. & le C.H.N., 2006. Les oiseaux rares en France en 2004. *Ornithos*, 13-2 : 73-113

Garoche J. & Jamet M., 2003. *Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4-Année 2003*. Rapport GOB : 38p.

GNGL, 2004. Gros plan sur la... Grande Aigrette (*Egretta alba*). *Bulletin du GNGL*, 1 : non paginé

GNGL, 2004. Répartition et effectifs des grands échassiers nicheurs. *Bulletin du GNGL*, 3 : non paginé

GNGL, 2004. Gros plan sur le... Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*). *Bulletin du GNGL*, 4 : non paginé

GNGL, 2005. Gros plan sur la... Sarcelle d'été (*Anas querquedula*). *Bulletin du GNGL*, 8 : non paginé

GOB, 2002 à 2003. *Bulletins de liaison* n°40 à 46

GOB, 1997. *Les oiseaux nicheurs de Bretagne*. Brest : 290p.

GOB Morbihan, 2003. Observations ornithologiques pour la période du 16 mars 2002 au 15 novembre 2002. *Ar Vran Morbihan*, 25 : 4-48

GOB Morbihan, 2004. Observations ornithologiques pour la période du 16 novembre 2002 au 15 mars 2003. *Ar Vran Morbihan*, 26 : 4-39

GOB Morbihan, 2004. Observations ornithologiques pour la période du 16 mars 2003 au 15 novembre 2003. *Ar Vran Morbihan*, 27 : 4-54

GEOCA, 2002 & 2003. *La Plume du Fou*, notes d'informations n°30 à 34

GEOCA, 2003. Actualités ornithologiques du 16 juillet 2002 au 15 novembre 2002. *Le Fou*, 60 : 32-60

GEOCA, 2003. Actualités ornithologiques du 16 novembre 2002 au 15 mars 2003. *Le Fou*, 61 : 47-70

GEOCA, 2004. Actualités ornithologiques du 16 mars 2003 au 15 juillet 2003. *Le Fou*, 62 : 18-54

GEOCA, 2004. Dénombrement des limicoles hivernants – janvier 2003. *Le Fou*, 62 : 45

Guermeur Y., à paraître. Données pour 2002. *Bulletin du Centre ornithologique de l'île d'Ouessant*

Guermeur Y., 2003. *Rapport ornithologique 2003 (condensé)*. Centre d'Etude du Milieu d'Ouessant/Réserve de la Mer d'Iroise : 17p.

Guermeur Y. & Monnat J.Y. , 1980. *Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne*. ARPEGE, Clermont-Ferrand : 240p.

Helsens B., 2007. Suivi de l'avifaune sur un secteur péri-urbain : le bois de Champagne à Pacé (35). *Le Grèbe*, 14 : 11-17

Henry J., Ladan L., Le Pelleter J.P. & Trébern B., 2003. Recensement d'oiseaux d'eau. Mi-janvier 2003 : 2p.

Jamet M., 2004. Tentative de nidification du Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) en milieu anthropique. *Ar Vran*, 15-1 : 3-5

Kerninon Y., 2004. Observation d'un Bruant nain *Emberiza pusilla* à Erdeven le 8 mars 2003. *Ar Vran Morbihan*, 26 : 50-51

Legrand R.P., 2002. Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 69 : 72-73

Legrand R.P., 2003. Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 70 : 72-73

Legrand R.P., 2003. Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 71 : 70-72

Legrand R.P., 2003. Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 72 : 80-81

Legrand R.P., 2003. Le coin des branchés. *L'oiseau magazine*, 73 : 70-71

Le Caro F., 2002. Nidification tardive de Tadornes de Belon dans l'enrochement du Légué/Saint-Brieuc. *Le Fou*, 58 : 5

Le Névé A., Kaiser Y. & Iliou B., 2004. *Synthèse ornithologique hoëdicaise annuelle du 16 juillet 2002 au 15 juillet 2003* : 37p.

Le Névé A. *et al.*, 2004. *Sternes de Bretagne. Observatoire 2003*. Contrat Nature « oiseaux marins » 2003-2006. Bretagne Vivante/Conseil Régional de Bretagne/Conseil Général des Côtes-d'Armor/Conseil Général du Finistère : 69p.

Le Névé A., 2005. La conservation des sternes en Bretagne : 50 ans d'histoire. *Alauda*, 73-4 : 389-402

Le Provost M., 2002. Note sur l'observation d'un Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) à l'étang de l'Ecoublière/Trébédan. *Le Fou*, 58 : 3-4

Le Provost M., 2005. Les étangs de Trébédan (F23). *Le Fou*, 66 : 8-15

Le Roy R., 2002. Notes d'ornithologie en Côtes-d'Armor. *Le Fou*, 58 : 15-19

Lesaffre G., 2003. Note sur l'hivernage du Râle d'eau *Rallus aquaticus* à Trédarzec, Côtes-d'Armor. *Le Fou*, 60 : 3-4

LPO Morbihan/Centre UFCS Vendée, 2003. Un circaète victime de la tourmente. *L'Oiseau magazine - Rapaces de France*, 5 : 5

Mahéo R., 2003. *Avocette Recurvirostra avosetta hivernant en France - Saison 2002/2003*. Université de Rennes 1.

Mahéo R., 2003. *Bernache cravant Branta bernicla hivernant en France - Saison 2002/2003*. Wetlands International. Station biologique de Bailleron.

Mahéo R., 2003. *Limicoles séjournant en France (littoral) : janvier 2003*. Wetlands international-ONCFS-Observatoire Départemental de l'Environnement du Morbihan.-Station Biologique de Bailleron : 45p.

Maoût J., 2004. Statut actuel du Grand Corbeau *Corvus corax* dans les Côtes-d'Armor. *Le Fou*, 62 : 3-6

Marion L. (coord.), 2005. *Recensement national des grands cormorans hivernant en France durant l'hiver 2004-2005*. Laboratoire d'Evolution des Systèmes Naturels et Modifiées, Muséum National d'Histoire Naturelle & Université de Rennes 1 : 33p.

Palpant M., 2003. Note sur un Pouillot à grands sourcils, trouvé mort dans un jardin. *Ar Vran Morbihan*, 24 : 58

Pourreau J., 2004. Dénombrement des oiseaux des zones humides hivernant en Loire-Atlantique -janvier 2001-. *Spatule*, 11 : 5-28

Quélenec T., 2004. Statut du Grand Corbeau dans l'ouest de la France : Bretagne et Normandie. *Ornithos*, 11-1 : 14-23

Recorbet B. (coord.), 1992. *Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIXe siècle à nos jours*. Groupe Ornithologique de Loire-Atlantique, Nantes : 285 p.

Reeber S., 2004. Recensement des grèbes, canards et foulques nicheurs. *Bulletin du GNGL*, 4 : 6-8

Reeber S., 2004. Recensement des grèbes, canards et foulques nicheurs. *Bulletin du GNGL*, 5 : 5-9

Reeber S., 2005. Nidification du Combattant varié *Philomachus pugnax* au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique). *Ornithos*, 12-6 : 328-334

Reeber S., 2006. *Les oiseaux du Lac de Grand-Lieu*. Société Nationale de Protection de la Nature/Réserve de Naturelle du Lac de Grand-Lieu. 203p.

Reeber S., 2007. Enquête nationale sur les espèces allochtones : résultats pour la Loire-Atlantique. *Chronique naturaliste du GNLA*, année 2006 : 54-57

Reeber S. & Latraube F., 2007. Synthèse des recensements d'oiseaux d'eau hivernants en Loire-Atlantique. *Chronique naturaliste du GNLA*, année 2006 : 16-34

Riegel J. & les coordinateurs-espèce, 2006. Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2003 et 2004. *Ornithos*, 13-4 : 209-237

Triplet P., Le Dréan-Quénec'hdu S. & Mahéo R., 2006. Le Bécasseau variable *Calidris alpina* hivernant en France : évolution des effectifs et modalités d'occupation de l'espace. *Alauda*, 74-3 : 311-322

Verneau A. & le Comité d'Homologation, 2007. Les oiseaux rares en Loire-Atlantique : observations de 2001 à 2005. *Chronique naturaliste du GNLA*. Année 2006 : 38-48

Wetlands International & LPO, 2004. Comptages des oiseaux d'eau, janvier 2003, résultats pour le Morbihan. *Ar Vran Morbihan*, 26 : 56-57

Yésou P., 2005. L'ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* dans l'ouest de la France : historique et statut actuel. *Ornithos*, 12-2 : 81-83

Yésou P., Bernard P., Marquis J. & Nisser J., 2005. Biologie de la reproduction de la Sterne pierregarin *Sterna hirundo* sur l'île de Béniguet, Finistère. *Alauda*, 73-2 : 107-118

Zucca M. & le C.M.R., 2005. Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 2^e rapport du CMR (janvier 2001-décembre 2002). *Ornithos*, 12-5 : 233-260

Zucca M. & le C.M.R., 2007. Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 3^e rapport du CMR (janvier 2003-décembre 2004). *Ornithos*, 14-1 : 3-33

Jacques Maout
16 rue du Croissant
29600 MORLAIX

Jean-Noël Ballot
11 rue de Prat Podic
29200 BREST

Sébastien Nédellec
Kerdilez
29500 ERGUE-GABERIC

BILAN 2007 DE LA NIDIFICATION DU FAUCON PELERIN *Falco peregrinus* EN BRETAGNE

Ce bilan est le résultat de la coopération entre de nombreux observateurs, associations et organismes. Cette synthèse des données fournies par les différents participants a, logiquement, respecté une démarche donnant priorité à la protection (par exemple, il n'est pas question de prendre le moindre risque afin de compter les œufs à l'aire ou pour tenter d'obtenir précisément la chronologie de la reproduction...).

Comme lors des précédents bilans, les cantonnements constatés durant une

période comprise entre les mois d'août et de mars inclus ne sont pas signalés, sauf si des comportements liés à la reproduction sont relevés. En effet, ces stationnements concernent bien souvent des migrants, parfois observés en couples.

En 2007, il est probable que la totalité des couples cantonnés en saison de reproduction a été recensée et que le nombre de jeunes à l'envol a pu être établi avec une bonne précision.



photo 1 : faucon pèlerin juvénile (Côtes-d'Armor, juin 2006). F. Jallu

EFFECTIF ET REPARTITION

Morbihan

Belle-Ile : 0 couple, aucun individu cantonné.

Aucun contact n'a été obtenu en période de reproduction malgré des prospections régulières sur les secteurs favorables.

Lorient : 0 couple, au moins 1 individu cantonné.

Comme à Brest, le secteur du port de commerce, avec ses hauts silos et ses pigeons domestiques, a fini par retenir au moins un individu durant toute la période de nidification.

Finistère

Cap Sizun : 1 couple, 3 jeunes à l'envol.

Peu de changements sur le secteur : l'emplacement de l'aire ne varie que d'une trentaine de mètres par rapport à l'année précédente et la productivité reste bonne avec 3 jeunes envolés entre les 14 et 21 juin...

Presqu'île de Crozon : 5 couples, 10 jeunes à l'envol (5 pontes).

Le nombre de jeunes à l'envol est moins élevé qu'à l'accoutumée mais on note peu de changements par ailleurs : les cinq territoires habituels sont à nouveau occupés et quatre couples mènent des jeunes à l'envol.

Le site le moins productif connaît un nouvel échec : la ponte est déposée sur une petite falaise très proche du sentier côtier (d'où l'on distingue le couveur à l'oeil nu) et la nichée disparaît rapidement sans que les raisons de cet échec soient connues (même si sa situation, exposée au dérangement, pouvait faire craindre un tel résultat).

Les dates d'envol s'établissent autour du 1er juin (3 jeunes), autour du 11

juin (4 jeunes), vers le 28 juin (1 jeune) et autour du 29 juin (au moins 2 jeunes).

Brest : 0 couple.

Un couple est présent en début d'année, des parades aériennes sont même observées fin février au dessus du pont de Recouvrance, mais ces observations s'avèrent sans suite et les contacts deviennent irréguliers à partir de la mi-mars.




photo 2 : pose d'un nichoir sur le pont de Recouvrance (Brest - Finistère, janvier 2007). Y. Capitaine



photo 3 : quelques mois plus tard... en attendant un « meilleur » usage (Brest - Finistère, janvier 2008). Y. Capitaine

Ile d'Ouessant : 0 couple, 1 individu cantonné.

Une femelle immature, absente en début de saison de nidification stationne ensuite à partir de la mi-juin jusqu'à la mi-août.

Finistère intérieur : 0 couple.

Un stationnement tardif est constaté dans une carrière en activité avec un couple cantonné début avril (une visite

le 23 avril montre que le site est rapidement déserté).

Côtes-d'Armor

Ile Tomé : 1 couple, au moins 2 jeunes à l'envol.

L'aire est située sur le piton « historique », au même emplacement qu'en 1952. Les 29 et 30 mai les 2 jeunes sont prêts à l'envol.

Sept-Iles : 1 couple, aucun jeune à l'envol.

Pendant toute la période de reproduction 1 couple est présent sur l'archipel. On ignore s'il y a eu une tentative de nidification sur l'Ile Rouzic, mais des comportements troublants y sont notés : à 3 reprises dans la première semaine de juin la femelle se pose sur un même replat herbeux (d'où on ne peut la distinguer) mais qui ne ressemble pas à un reposoir classique car à l'évidence la végétation lui masque la vue. En outre, le 4 juin, alors qu'elle rejoint cette corniche en vol direct, elle aperçoit l'embarcation de la station ornithologique et modifie sa trajectoire pour venir se percher à 50 m, l'observant ensuite 2 minutes avant de regagner ce replat... Quoiqu'il en soit aucun jeune n'est observé par la suite alors que les visites sont régulières et que l'emplacement est systématiquement contrôlé (Deniau, *comm.pers.*).

Côte de Goëlo : 2 couples, au moins 5 jeunes à l'envol.

Pour la première fois, deux reproductions sont relevées sur ce secteur. Si un des territoires est suivi de longue date et connaît sa 8^{ème} nidification consécutive, l'autre nidification a lieu sur une falaise modeste, jamais inspectée jusqu'alors (son contrôle n'est guère possible que depuis la mer). Ce site fait manifestement parti du même territoire

qu'une autre falaise située à 1 km et qui a déjà retenu un couple en 2000 et 2006. Si la reproduction semble exclue ces deux années là en raison du cantonnement très tardif du couple sur l'autre falaise, il paraît tout à fait possible qu'une ou plusieurs nidifications se soient déjà produites sur ce « nouvel » emplacement, inconnu jusqu'alors.

Sur le site « historique », l'aire habituelle est réutilisée et permet l'envol de 3 jeunes aux alentours du 8 juin. Sur le « nouveau » site, 2 jeunes semblent prêts à l'envol le 2 juin .

Fréhel : 1 couple, aucun jeune à l'envol (1 ponte).

Le site se distingue une nouvelle fois par l'échec du couple nicheur . Un suivi très précis en début de saison (sans la moindre perturbation de l'observateur évidemment...) a permis de prouver qu'une ponte a bien été déposée et de situer assez précisément le début d'incubation vers le 4 avril. Par la suite, le couple couve « normalement », mais au moins jusqu'au 12 juin, ce qui indique que les oeufs étaient infertiles ou que les embryons sont morts.

La répétition des échecs et la productivité particulièrement faible de ce site est troublante (seulement 6 jeunes envolés depuis la première reproduction en 2001 et une seule nichée menée à l'envol ces quatre dernières années...).

Les centres UFCS à l'oeuvre

Le 18 mai 2005, la femelle qui nichait probablement sur l'île Tomé, est recueillie sur l'estran, en raison d'un plumage souillé par de la graisse animale. Elle est relâchée, le 22 août 2007, à l'île Grande/Pleumeur-Bodou. Elle avait apparemment recouvré l'ensemble de ses facultés de vol et de prédation (grâce notamment à une « rééducation » par un fauconnier spécialisé) après avoir transité par trois centres de soins UFCS (LPO Ile Grande, l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes et l'Espace Rambouillet).



photo 4 : 18 mai 2005, premiers soins à l'île Grande. G. Bentz



photo 5 : ... au même endroit le 22 août 2007. G. Bentz

Côtes-d'Armor Intérieur : 0 couple.
Aucune donnée tardive.

Ille-et-Vilaine

Rocher de Cancale : 1 couple, aucun jeune à l'envol.

Pour la première fois la nidification est établie sur ce secteur. En effet, ce site a retenu durant toute la saison de reproduction un couple constitué d'un mâle et d'une femelle adulte, et mi-avril la femelle est notée à 2 ou 3 reprises, couchée, exactement au même endroit sur une corniche. Cependant, une semaine après qu'elle

ait été observée une première fois dans cette posture, l'emplacement paraît abandonné (le replat est impossible à contrôler par le dessus) (Avice, *comm.pers.*). On ne peut donc avoir la certitude qu'une ponte a bien été déposée puisqu'en période de ponte les deux partenaires se couchent assez souvent pour gratter l'aire ou "simuler" une incubation, parfois pendant plusieurs dizaines de minutes (Monneret, *comm.pers.*). Quoiqu'il en soit le couple est suivi et contacté très régulièrement sur le rocher jusqu'à la mi-juillet, ce qui

permet d'exclure toute production de poussins.

Loire-Atlantique

0 couple.

Cette année aucune donnée n'est obtenue en période de nidification, contrairement aux années 2004 et 2005 qui ont fourni des observations remarquables. En effet, un couple était alors présent en début de saison (observations jusqu'au 19 avril 2004, puis l'année suivante jusqu'au 22 avril 2005), cantonné sur l'île de la Capitaine du lac de Grand-Lieu. Le couple fréquentait une aire de Milan noir *Milvus migrans*, avec des comportements répétés de parades

nuptiales aériennes, ainsi que des tentatives d'accouplements sur l'aire (Reeber, 2006) !

Ces données rappellent qu'en Bretagne également la nidification peut se faire loin de toute falaise. A titre de comparaison, dans le sud-ouest de l'Angleterre 7 à 10 sites présentent actuellement une situation comparable, avec des couples nichant exclusivement sur des pylônes (jusqu'à présent aucune nidification arboricole n'y est signalée) (Treleaven & Williams, *comm.pers.*). En France, le phénomène est également nouveau et est de plus en plus noté : dans la moitié nord du pays 5 couples ont été repérés sur de telles structures en 2006 (David, 2007).

tableau : bilan de la saison de reproduction dans les cinq départements bretons

	Morbihan	Finistère	Côtes-d'Armor	Ille-et-Vilaine	Loire-Atlantique	Total
couples	0	6	5	1	0	12
pontes	0	6	4-5 ?	1 ?	0	11-12 ?
jeunes à l'envol	0	13+	7+	0	0	20+

CONCLUSION

2007 confirme la dynamique enregistrée les années précédentes avec une légère progression du nombre de couples cantonnés et nicheurs. On notera toutefois que le nombre de jeunes à l'envol est en

retrait par rapport au record de 2006 (25 jeunes).

Par ailleurs, la marge de progression semble encore assez importante, notamment au niveau géographique. En effet, non seulement certains secteurs de falaises maritimes très favorables restent inoccupés, mais de

plus quelques observations locales ou provenant de régions voisines suggèrent que des milieux qui en sont dépourvus pourraient accueillir de

nouveaux couples d'ici peu (avec des nichées en carrière, en ville ou sur des pylônes).



photo 6 : relâché d'un faucon pèlerin après plus de deux ans de soins (Pleumeur-Bodou - Côtes-d'Armor, août 2007). G. Bentz

BIBLIOGRAPHIE

David F., 2007. Cherchez les pèlerins en plaines. *Les notes du Pèlerin* n°7 & 8 : 7

Reeber S., 2006. Faucon pèlerin in *Les oiseaux du Lac de Grand-Lieu*. SNPN : 96p.

LIENS INTERNET

Pour des informations sur le faucon pèlerin à Brest :

www.rade-de-brest.infini.fr/page_ornitho.htm

le suivi du faucon pèlerin à Nantes :

www.fauconpelerin.canalblog.com/

Le suivi du faucon pèlerin sur Nancy :

<http://p.behr.free.fr/>

Le site du spécialiste René-Jean Monneret :

<http://rjmonneret.free.fr/PelerinRegions/index.htm>

Le site de la LPO consacré au faucon pèlerin :

<http://pelerin.lpo.fr/index.html>

Les notes du pèlerin à télécharger :

<http://www.lpo.fr/rapaces/>

Un site sur recherche et protection du
faucon pèlerin en Europe :

<http://www.falcopegrinus.net/index.php>

REMERCIEMENTS

En premier lieu aux personnes qui
oeuvrent dans les centres UFCS...

merci également aux observateurs qui
me communiquent leurs données,
indispensables pour la rédaction de ce
bilan et pour obtenir ainsi une vision
aussi claire que possible de la
situation de l'espèce dans la région.

Merci enfin aux trois photographes
dont les photos enrichissent nettement
ce bilan.

Liste des observateurs :

Pour le Morbihan : Michel Adde, René
Bozec, Jacques Corbière, Guillaume
Février, Frédéric Le Cornoux, Paul &
Huguette Le Roy, Michel Pajard,
Emilie Renoncet, Catherine Robert,
José Serrano.

Pour le Finistère : Aurélien Audevard,
Alain Boënnec, Didier Cadiou, Yvon
Capitaine, Didier Clec'h, Alain Coq,
Erwan Cozic, Laurent Gager, Xavier

Grémillet, Yvon Guermeur, Michel
Guët, Jean-René Guivarc'h, Yann
Jacob, Philippe Lagadec, Yvon Le
Corre, Pierre Le Floc'h, Daniel Le
Mao, Bertrand Le Poupon, Sébastien
Mauvieux, Jean-Yves Monnat,
Sébastien Nédellec, Marc Pavéc, Eric
Pellé, Thierry et Marianne Quélenec,
François Quénot, Alain Thomas,
Damien Vedrenne.

Pour les Côtes d'Armor : Patrick
Bechet, Patrick Behr, Gilles Bentz,
Patrice Berthelot, Alain Beuget,
Yannick Bourgault, Armel Deniau,
Patrick Hamon, Sophie Houbart,
Fabrice Jallu, Guy Joncour, Françoise
Le Caro, Alain Le Dreff, Renault Leroy,
Jacques Maout, Jacques Petit,
François Siorat.

Pour l'Ille-et-Vilaine : Yohann Avice,
Emmanuel Chabot, Philippe Chapon,
Jean-Luc Chateigner, Filipe Contim,
Gaël Gautier, Lionel Houlier, Patrick
Le Mao, André Mauxion.

Pour la Loire-Atlantique : Jean-Luc
Gasnier avec Danielle, Benoît, Pascal,
Evelyne, Dominique & Martine,
Sébastien Reeber.

Associations et organismes publics:
Bretagne Vivante - SEPNEB, FCBE,
GEOCA, GOB, GO35, LPO-Mission
FIR, LPO 7îles, Mairie de Crozon,
O.N.C.F.S, P.N.R.A, Syndicat des
Caps et UFCS.

Erwan Cozic
24 Rumenguy
29460 LOGONNA-DAOULAS

UNE DRÔLE D'AIGRETTE DANS LES MARAIS DE SUSCINIO : OBSERVATION D'UN HYBRIDE

DEROULEMENT DE L'OBSERVATION (réalisée par Raymond Pavec)

Le 21 mai 2008, par une belle journée ensoleillée, j'observe les avocettes élégantes *Recurvirostra avosetta*, les échasses blanches *Himantopus himantopus*, les tadornes de Belon *Tadorna tadorna* sur l'étang côtier situé à quelques centaines de mètres du château de Suscinio (Sarzeau, Morbihan) tout en surveillant la lisière des roseaux dans l'espoir de voir apparaître la gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*.

Je ne prête pas une particulière attention aux deux aigrettes, approximativement de la même taille, qui se nourrissent dans l'eau peu profonde. C'est un peu par hasard qu'elles se trouvent dans le champ des

jumelles, et j'ai la surprise de constater que si l'une des deux est une aigrette garzette *Egretta garzetta* tout à fait habituelle, la deuxième se distingue par un bec de couleur jaune-orange. Un moment plus tard elles s'envolent, ce qui me permet de constater que les pattes de l'oiseau atypique sont entièrement noires jusqu'au bout des doigts.

L'aigrette garzette disparaît, mais l'autre aigrette se pose un peu plus près de moi et continue tranquillement de se nourrir. Je constate alors qu'elle possède les mêmes plumes ornementales que l'aigrette garzette : quelques fines plumes à la nuque, plumes légères à la poitrine et au bas du dos. L'ensemble du plumage est blanc, avec une nuance jaune pâle à peine perceptible à la poitrine et au bas du dos.



photo 1 : en vol les pattes et les pieds apparaissent entièrement sombres
(Suscino - Morbihan, mai 2008). R. Pavec

IDENTIFICATION

De quelle espèce est cet oiseau ? Je pense à la grande aigrette *Casmerodius alba* (l'autre espèce susceptible d'être observée dans la région), pour l'éliminer aussi vite, la consultation d'un guide me confortant : taille trop petite (voisine de celle de l'aigrette garzette), allure trop trapue, plumes ornementales de la nuque.

Après en avoir discuté avec quelques connaissances, et n'ayant toujours pas de solution à ce problème d'identification, la question est soumise au forum "Identification et Taxonomie" du site internet Ornithomedia.

Plusieurs suggestions sont émises : héron garde-bœufs *bubulcus ibis* ,

hybride héron garde-bœufs x aigrette garzette, aigrette intermédiaire *Egretta intermedia*. Finalement, après discussions, c'est l'hypothèse d'un hybride qui paraît la plus probable. Mais passons donc en revue les espèces qui se rapprochent de l'oiseau observé et susceptibles de pouvoir donner un hybride, et voyons les critères compatibles ou non avec l'oiseau observé.

Aigrette garzette :

- Pour : couleur du plumage, plumes ornementales, couleur des pattes (tibia et tarse).
- Contre : couleur, courbure et longueur du bec, cou plus massif, doigts noirs, teinte jaune pâle de la

poitrine et du bas du dos, nombre et longueur des plumes ornementales de la nuque.

Héron garde-bœufs :

- Pour : silhouette assez massive, tibias courts, pas de différence de couleur entre les doigts et les pattes, couleur du bec, renflement du menton, teinte jaune pâle de la poitrine et du bas du dos.
- Contre : couleur des pattes, longueur du bec, fines plumes ornementales de la nuque.

Aigrette intermédiaire :

- Pour : plumes ornementales de la poitrine et de la queue, couleur des pattes
- Contre : faible taille, silhouette trop massive, plumes ornementales de la nuque, forme et taille du bec, renflement du menton.

On peut aussi envisager certaines aigrettes orientales :

- l'aigrette de Chine *Egretta eulophotes*, qui arbore plusieurs aigrettes, mais a le bec plus long, les pieds jaunes,
- l'aigrette des récifs *Egretta gularis schistacea*, qui a des pattes bicolores, un bec plus long également,
- l'aigrette sacrée *Egretta sacra*, qui a des pattes proportionnellement plus courtes à pieds jaunes ou globalement plus claires, un bec plus long.

On constate donc que l'oiseau observé ne rassemble pas tous les critères

d'identification d'une des espèces citées. En revanche, la plupart de ses caractéristiques se retrouvent de manière complémentaire ou intermédiaire, dans le couple aigrette garzette / héron garde-bœufs : le bec a la couleur de celui du héron garde-bœufs, mais est plus long, ce qui accentue la courbure (alors que l'aigrette garzette a un bec totalement droit, long et totalement noir).

Les plumes ornementales de la nuque, plus ou moins visibles suivant les photos, semblent intermédiaires entre celles de l'aigrette (deux longues plumes) et l'abondante chevelure du héron. L'hypothèse d'un hybride entre ces deux espèces peut être retenue.

PROVENANCE DE L'OISEAU

L'oiseau ne portant pas de bague, on en est réduit aux hypothèses. On pense d'abord à un oiseau échappé de volière, l'hybridation des oiseaux étant assez fréquente en captivité. Le parc animalier de Branféré, en particulier, n'est pas très éloigné de la zone d'observation, mais renseignements pris, l'oiseau n'en proviendrait pas. Les collections privées n'étant pas rares, il pourrait provenir de l'une d'elles.

Si cet oiseau est d'origine naturelle, il ne vient pas nécessairement de très loin, car les colonies de héron garde-bœufs sont maintenant bien fournies en Loire-Atlantique, avec plus de 1600 couples en 2007 (Loïc Marion *in litt.*). En Morbihan l'installation des premiers

couples ne date que de 2004. Il faut dire que les deux espèces sont d'installation récente en Morbihan, quelques années pour le héron et quelques dizaines d'années pour l'aigrette. On est donc dans une phase de démographie dynamique pour ces deux espèces.

On notera que l'oiseau arbore des caractères nuptiaux (base rouge du bec, lores mauves, plumes ornementales) et qu'il est envisageable qu'il niche ou tente de nicher à proximité.

LES CAS D'HYBRIDATION

La littérature fait état d'autres cas d'hybridation de ce type. McCarthy (2006) rapporte l'hybridation du héron garde-bœufs avec trois espèces d'aigrettes :

- l'aigrette bleue *Egretta caerulea* (sauvage, en Californie et Floride) ;
- l'aigrette garzette (captivité) ;
- l'aigrette neigeuse *Egretta thula* (sauvage, Floride).

Tandis que l'aigrette garzette s'est hybridée avec :

- le héron cendré *Ardea cinerea*,
- le héron pie *Ardea picata*,
- le héron garde-bœufs,
- l'aigrette bleue,
- l'aigrette des récifs,
- l'aigrette à face blanche *Egretta novaehollandiae*,
- l'aigrette sacrée,
- l'aigrette neigeuse,

- le bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*.

Ces dernières années, Fernando Arce a étudié un hybride tel que celui que nous avons observé. Il vivait en liberté, mais était né dans un zoo, en Espagne. Il a fini par perdre sa trace. Les photos peuvent être consultées à l'adresse suivante :

<http://i26.tinypic.com/2uq2592.jpg>,
<http://i29.tinypic.com/333920x.jpg>.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier Fernando Arce qui nous a communiqué informations et photos de l'hybride qu'il a étudié, ainsi que Loïc Marion et Yves Kayser pour leur relecture attentive de cette note et pour leurs remarques constructives.

BIBLIOGRAPHIE

McCarthy E. M., 2006. *Handbook of Avian Hybrids of the World*. Oxford University Press, New-York : 583 p.

Archives numériques du forum du site Ornithomedia sur ce sujet :

<http://www.ornithomedia.com/phorum/read.php?2,96924>

REFERENCE UTILE

<http://www.bird-hybrids.com>



*photo 2 : pour comparaison : l'hybride à côté d'une aigrette garzette
(Suscinio - Morbihan, mai 2008). R. Pavec*



*photo 3 : la teinte "jaunâtre" apparaît sous le corps
(Suscinio - Morbihan, mai 2008). R. Pavec*

Raymond Pavec
21, route du port
29170 FOUESNANT

Alain Fossé
44, rue Barra
49100 ANGERS

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* en Finistère : le retour

En Bref...

Cela se déroule comme un feuilleton à épisode. Dans le précédent Ar Vran, on vous relatait la découverte et l'hivernage d'un tichodrome échelette, en Finistère, dans les falaises côtières de Tal-ar-Grip (Plomodiern). Bien évidemment, du fait de la rareté de ce genre d'observation, il semblait impossible ou du moins peu probable qu'une telle observation de cette espèce ne se produise avant des années. La fin de l'automne 2008 est là pour nous contredire puisqu'un oiseau est à nouveau observé le 9 novembre 2008, et fait extraordinaire, au même endroit, sous la même cabane de douanier (J.Y. Péron *comm. pers.*). Il sera revu le 26 et le 30 décembre sur le même secteur (A. Le Névé et S. Mauvieux, *comm.pers.*). Début et fin janvier 2009, il est encore dans les mêmes falaises (J.J. Chever et A. Desnos *comm. pers.*), de même le 7 février (R. Debel, *comm. pers.*). En 2008, il a terminé son hivernage au 15 mars. En 2009, il n'est pas revu début mars.

En probabilité, on peut supposer qu'il s'agit du même tichodrome qu'en 2008, même si l'oiseau avait encore son plumage hivernal en janvier (la gorge n'est pas noire contrairement au ventre) (S. Mauvieux, *comm. pers.*).

Il va de soi qu'une visite de ces mêmes falaises en 2010 permettra de savoir s'il existe une coutume

d'hivernage à la pointe bretonne, au moins pour un individu. Feuilleton à suivre.

T. Quelenec

Un martinet noir *Apus apus* rentre au nid un 22 août

Ce vendredi 22 août 2008, à 21h35, en passant dans la rue Charles de Gaulle, à Saint-Renan (Finistère), nous voyons un martinet noir en vol s'engouffrer sous un toit. Notre surprise est grande car ça fait déjà plusieurs jours que nous n'observons plus de martinet noir sur la commune. Les couples qui nichent sous notre propre toit, à quelques centaines de mètres de cette observation, ont déjà quitté les lieux depuis les premiers jours d'août. On sait qu'il existe toujours des retardataires, et on observe même parfois des oiseaux en migration à Ouessant, mi-octobre ! Mais cette observation concerne un oiseau rentrant au nid. Peut-on considérer qu'il s'agit d'un adulte nicheur rentrant pour nourrir sa progéniture ? Dans ce cas il s'agirait d'une reproduction très tardive. En règle générale l'envol des jeunes a lieu pour la fin juillet (Chantler *et al.*, 2000). Certaines années pluvieuses, on a pu observer des nourrissages dans les

premiers jours d'août. Ce fut notre cas en 2007 où deux couples nourrissaient encore chez nous le 6 août. Mais le 22 août est exceptionnel.

Alors pourrait-il s'agir d'un oiseau qui va tout simplement passer la nuit sous un toit ? Il est connu que les martinets passent la nuit en altitude et non posés sous les toits, cependant des situations extraordinaires existent. Nous avons été témoins, en 2007, sur le pignon est de notre maison, d'un oiseau qui avait passé la nuit accroché au mur, en position verticale. Bernard Cadiou relate aussi l'observation d'un martinet noir en dortoir dans un arbre (Cadiou, 2004), alors pourquoi pas sous un toit ?

T. Quelenec

Cadiou B., 2004. Un martinet noir (*Apus apus*) passe la nuit dans un arbre. *Ar Vran*, 15-2 : 73-74

Chantler P. & Driessens G., 2000. *Swifts a guide to the swifts and treeswifts of the world*. 2nd édition. Pica press, Sussex : 272 p.



photo : martinet noir adulte (Saint-Renan - Finistère, juin 2008). T. Quelennec

**Harfang des neiges *Bubo*
scandianus : hivernage aux portes
de la Bretagne**



photo : harfang des neiges femelle (Guernesey - îles anglo-normandes, février 2009). P. Hillion

A ceux qui diront que ça ne concerne pas la Bretagne, je répondrais qu'on est juste aux portes avec les îles anglo-normandes.

L'hiver 2008-2009 a été marqué par l'arrivée puis l'hivernage, en Europe occidentale, de plusieurs chouettes harfangs. Oiseau impressionnant par la taille et la couleur, il ne laisse pas indifférent : de ce fait, un oiseau est déjà un évènement mais alors au moins sept... Les arrivées ont eu lieu à la toute fin de l'automne 2008 (octobre-novembre) : un oiseau aux îles Scilly (Angleterre), deux oiseaux aux îles anglo-normandes, un en Belgique, un aux Pays-Bas mais aussi en Irlande et en Ecosse.

Les îles anglo-normandes à seulement 65 kilomètres de la Bretagne (distance Bréhat-Guernesey), ont accueilli deux puis trois oiseaux qui continuaient encore leur hivernage en mars (B. Bree, *comm. pers.*).

Lors de l'afflux de l'hiver 2002, on avait évoqué un possible transport d'oiseaux, venant du Québec, par des cargos. Il semblerait que l'afflux de cet hiver soit la conséquence d'une très bonne reproduction de l'espèce dans le grand nord suite à une pullulation de lemmings suivi d'une chute, à l'automne, de la population de ces rongeurs. Le manque de nourriture aurait poussé les oiseaux vers le sud. Les chouettes harfangs sont connues pour être migratrices (en moyenne 1727 km entre quartiers d'été et d'hiver (source Ornithomédia.com) mais certains oiseaux peuvent effectuer de

très longues distances, ce qui semble être le cas cette année.

T. Quelenec

Erratum

Comme vous avez pu le voir dans le précédent numéro, nous avons publié une photo de jeunes chouettes chevêches. Cette publication est le fait de la rédaction et non de l'auteur de la brève, Ronan Debel. Cette photo, qui a quarante ans, est à prendre comme un document historique d'un des pères de l'ornithologie bretonne, Edouard Lebeurier. Bien évidemment, cette publication ne remet pas en cause le principe que s'est fixé la direction du GOB de ne pas publier de photos prises au nid. Cependant comme toute règle a des exceptions, le comité de rédaction ne s'interdit pas, s'il le juge utile et s'il a la garantie que le cliché a été réalisé sans dérangement, de publier exceptionnellement une photo de nid ou au nid.