

UNE DRÔLE D'AIGRETTE DANS LES MARAIS DE SUSCINIO : OBSERVATION D'UN HYBRIDE

DEROULEMENT DE L'OBSERVATION (réalisée par Raymond Pavéc)

Le 21 mai 2008, par une belle journée ensoleillée, j'observe les avocettes élégantes *Recurvirostra avosetta*, les échasses blanches *Himantopus himantopus*, les tadornes de Belon *Tadorna tadorna* sur l'étang côtier situé à quelques centaines de mètres du château de Suscinio (Sarzeau, Morbihan) tout en surveillant la lisière des roseaux dans l'espoir de voir apparaître la gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*.

Je ne prête pas une particulière attention aux deux aigrettes, approximativement de la même taille, qui se nourrissent dans l'eau peu profonde. C'est un peu par hasard qu'elles se trouvent dans le champ des

jumelles, et j'ai la surprise de constater que si l'une des deux est une aigrette garzette *Egretta garzetta* tout à fait habituelle, la deuxième se distingue par un bec de couleur jaune-orange. Un moment plus tard elles s'envolent, ce qui me permet de constater que les pattes de l'oiseau atypique sont entièrement noires jusqu'au bout des doigts.

L'aigrette garzette disparaît, mais l'autre aigrette se pose un peu plus près de moi et continue tranquillement de se nourrir. Je constate alors qu'elle possède les mêmes plumes ornementales que l'aigrette garzette : quelques fines plumes à la nuque, plumes légères à la poitrine et au bas du dos. L'ensemble du plumage est blanc, avec une nuance jaune pâle à peine perceptible à la poitrine et au bas du dos.



photo 1 : en vol les pattes et les pieds apparaissent entièrement sombres
(Suscino - Morbihan, mai 2008). R. Pavec

IDENTIFICATION

De quelle espèce est cet oiseau ? Je pense à la grande aigrette *Casmerodius alba* (l'autre espèce susceptible d'être observée dans la région), pour l'éliminer aussi vite, la consultation d'un guide me confortant : taille trop petite (voisine de celle de l'aigrette garzette), allure trop trapue, plumes ornementales de la nuque.

Après en avoir discuté avec quelques connaissances, et n'ayant toujours pas de solution à ce problème d'identification, la question est soumise au forum "Identification et Taxonomie" du site internet Ornithomedia.

Plusieurs suggestions sont émises : héron garde-bœufs *bubulcus ibis* ,

hybride héron garde-bœufs x aigrette garzette, aigrette intermédiaire *Egretta intermedia*. Finalement, après discussions, c'est l'hypothèse d'un hybride qui paraît la plus probable. Mais passons donc en revue les espèces qui se rapprochent de l'oiseau observé et susceptibles de pouvoir donner un hybride, et voyons les critères compatibles ou non avec l'oiseau observé.

Aigrette garzette :

- Pour : couleur du plumage, plumes ornementales, couleur des pattes (tibia et tarse).
- Contre : couleur, courbure et longueur du bec, cou plus massif, doigts noirs, teinte jaune pâle de la

poitrine et du bas du dos, nombre et longueur des plumes ornementales de la nuque.

Héron garde-bœufs :

- Pour : silhouette assez massive, tibias courts, pas de différence de couleur entre les doigts et les pattes, couleur du bec, renflement du menton, teinte jaune pâle de la poitrine et du bas du dos.

- Contre : couleur des pattes, longueur du bec, fines plumes ornementales de la nuque.

Aigrette intermédiaire :

- Pour : plumes ornementales de la poitrine et de la queue, couleur des pattes

- Contre : faible taille, silhouette trop massive, plumes ornementales de la nuque, forme et taille du bec, renflement du menton.

On peut aussi envisager certaines aigrettes orientales :

- l'aigrette de Chine *Egretta eulophotes*, qui arbore plusieurs aigrettes, mais a le bec plus long, les pieds jaunes,

- l'aigrette des récifs *Egretta gularis schistacea*, qui a des pattes bicolores, un bec plus long également,

- l'aigrette sacrée *Egretta sacra*, qui a des pattes proportionnellement plus courtes à pieds jaunes ou globalement plus claires, un bec plus long.

On constate donc que l'oiseau observé ne rassemble pas tous les critères

d'identification d'une des espèces citées. En revanche, la plupart de ses caractéristiques se retrouvent de manière complémentaire ou intermédiaire, dans le couple aigrette garzette / héron garde-bœufs : le bec a la couleur de celui du héron garde-bœufs, mais est plus long, ce qui accentue la courbure (alors que l'aigrette garzette a un bec totalement droit, long et totalement noir).

Les plumes ornementales de la nuque, plus ou moins visibles suivant les photos, semblent intermédiaires entre celles de l'aigrette (deux longues plumes) et l'abondante chevelure du héron. L'hypothèse d'un hybride entre ces deux espèces peut être retenue.

PROVENANCE DE L'OISEAU

L'oiseau ne portant pas de bague, on en est réduit aux hypothèses. On pense d'abord à un oiseau échappé de volière, l'hybridation des oiseaux étant assez fréquente en captivité. Le parc animalier de Branféré, en particulier, n'est pas très éloigné de la zone d'observation, mais renseignements pris, l'oiseau n'en proviendrait pas. Les collections privées n'étant pas rares, il pourrait provenir de l'une d'elles.

Si cet oiseau est d'origine naturelle, il ne vient pas nécessairement de très loin, car les colonies de héron garde-bœufs sont maintenant bien fournies en Loire-Atlantique, avec plus de 1600 couples en 2007 (Loïc Marion *in litt.*). En Morbihan l'installation des premiers

couples ne date que de 2004. Il faut dire que les deux espèces sont d'installation récente en Morbihan, quelques années pour le héron et quelques dizaines d'années pour l'aigrette. On est donc dans une phase de démographie dynamique pour ces deux espèces.

On notera que l'oiseau arbore des caractères nuptiaux (base rouge du bec, lores mauves, plumes ornementales) et qu'il est envisageable qu'il niche ou tente de nicher à proximité.

LES CAS D'HYBRIDATION

La littérature fait état d'autres cas d'hybridation de ce type. McCarthy (2006) rapporte l'hybridation du héron garde-bœufs avec trois espèces d'aigrettes :

- l'aigrette bleue *Egretta caerulea* (sauvage, en Californie et Floride) ;
- l'aigrette garzette (captivité) ;
- l'aigrette neigeuse *Egretta thula* (sauvage, Floride).

Tandis que l'aigrette garzette s'est hybridée avec :

- le héron cendré *Ardea cinerea*,
- le héron pie *Ardea picata*,
- le héron garde-bœufs,
- l'aigrette bleue,
- l'aigrette des récifs,
- l'aigrette à face blanche *Egretta novaehollandiae*,
- l'aigrette sacrée,
- l'aigrette neigeuse,

- le bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*.

Ces dernières années, Fernando Arce a étudié un hybride tel que celui que nous avons observé. Il vivait en liberté, mais était né dans un zoo, en Espagne. Il a fini par perdre sa trace. Les photos peuvent être consultées à l'adresse suivante :

<http://i26.tinypic.com/2uq2592.jpg>,
<http://i29.tinypic.com/333920x.jpg>.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier Fernando Arce qui nous a communiqué informations et photos de l'hybride qu'il a étudié, ainsi que Loïc Marion et Yves Kayser pour leur relecture attentive de cette note et pour leurs remarques constructives.

BIBLIOGRAPHIE

McCarthy E. M., 2006. *Handbook of Avian Hybrids of the World*. Oxford University Press, New-York : 583 p.

Archives numériques du forum du site Ornithomedia sur ce sujet :

<http://www.ornithomedia.com/phorum/read.php?2,96924>

REFERENCE UTILE

<http://www.bird-hybrids.com>



*photo 2 : pour comparaison : l'hybride à côté d'une aigrette garzette
(Suscinio - Morbihan, mai 2008). R. Pavéc*



*photo 3 : la teinte "jaunâtre" apparaît sous le corps
(Suscinio - Morbihan, mai 2008). R. Pavéc*

Raymond Pavéc
21, route du port
29170 FOUESNANT

Alain Fossé
44, rue Barra
49100 ANGERS