

UN OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus* SUR L'ÎLE D'HOËDIC LE 15 FEVRIER 2009

Arnaud Le Névé

Alors que j'effectue un comptage d'oiseaux d'eau sur l'île de Hoëdic, Morbihan, le dimanche 15 février 2009, un oedicnème criard accompagné de quatre pluviers dorés *Pluvialis apricaria* décolle devant moi dans un secteur de dunes, pour se reposer un peu plus loin. Je ne le dérange pas une seconde fois car cette observation en vol, réalisée dans d'excellentes conditions, me permet même d'écarter toute autre espèce occasionnelle d'oedicnème tel que celui du Sénégal.

Cette observation est la deuxième pour l'île de Hoëdic après celle du 8 mai 2005 (*obs. pers.*), mais elle est surprenante car réalisée au cœur de l'hiver et par des températures tout à fait de saison (0°C enregistré à Vannes et sur l'île le matin même).

La population d'Europe du Nord (Angleterre, Pays-Bas, Allemagne)

hivernent principalement en péninsule Ibérique et en Italie. Un nombre substantiel d'oiseaux est également connu pour migrer en Afrique du Nord, voire en Afrique tropicale de l'ouest jusqu'au Sénégal (Cramp & Simmons, 2001). Les nicheurs français hivernent sans doute en péninsule Ibérique et en Afrique du Nord comme le suggère une reprise en Algérie (Dubois *et al.*, 2008). Mais l'espèce hiverne également en France, dans l'ouest notamment, où le statut de l'espèce a été décrit en 1998 par Gabory avec précision. Il met en évidence depuis l'hiver 1982, une recrudescence des données hivernales (c'est-à-dire du 1^{er} décembre au 15 février) en Anjou, en Loire-Atlantique, dans la Vienne, en Charente et en Charente-Maritime. Les effectifs cités alors concernent généralement 10 à 15 individus dans chacun de ces départements (Maine-et-Loire et Loire-

Atlantique confondus). Gabory rappelle également qu'un groupe d'une vingtaine d'individus fuyant un coup de froid a été observé en Anjou en 1987.

Cependant, les synthèses ornithologiques bretonnes de l'hiver 1995 à l'hiver 2002 publiées dans la revue *Ar Vran* ne font état que d'une seule mention hivernale : un individu capturé le 6 février 1995 à Mesquer, Loire-Atlantique (juste en face de l'île de Hoëdic), lors d'une opération de baguage de bécasse des bois *Scolopax rusticola* (Le Mao & Maout, 1999). Sinon, Edouard Lebeurier a signalé à René Bozec en 1968 qu'il avait capturé un mâle le 10 novembre 1932 à Plougasnou, Finistère (Bozec, *comm. pers.*).

A noter enfin au chapitre des îles de l'Atlantique, deux mentions provenant de Ré : 1 le 13 décembre 2001 et 7 le 8 janvier 2003 (Le Guillou, *comm. pers.*).

Une partie de ces données d'hivernage au moins semble toujours d'actualité puisque le 15 février 2009, 14 oedicnèmes criards étaient observés en

Loire-Atlantique à proximité du Maine-et-Loire (Maillard, *comm. pers.*).

Plus largement en France, il est présent en hiver dans une grande région centre allant de l'Allier, à la Seine-et-Marne, la Loire-Atlantique, la Vienne et la Gironde. Mais la région toulousaine et les Pyrénées-orientales accueillent sans doute les plus importants effectifs nationaux : 150 oiseaux le 31 décembre 2006 à Clairac et 195 le 29 décembre 2007 sur l'aérodrome de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Dubois *et al.*, 2008). Dans le sud-est de la France et contrairement à ce que la littérature affirme parfois, il ne semble pas hiverner. Il n'a jamais été mentionné en Crau entre le 14 décembre et le 12 février, à l'exception d'une fois le 30/12/1988 (Paulus, *comm. pers.*) et Cheylan ne le mentionne plus après le 7 décembre (Cheylan, 1975 ; 1988). En Camargue, 10 individus sont observés le 6 janvier 1999 et 1 le 16 décembre 2004, mais il ne s'agit que de 2 données exceptionnelles situées entre le 15 décembre et le 1^{er} février (Kayser, *comm. pers.*).



photo 1 : oedicnème criard dans les chaumes de maïs (Telgruc - Finistère, avril 2009). Y. Le Corre

Au sujet de la migration prénuptiale, Gabory signale des dates d'arrivée dès le 29 février entre 1990 et 1996 dans le nord-ouest de la France. Dans les Bouches-du-Rhône, les premiers migrateurs sont notés en février sur les plages de Camargue (1 le 19 février 2003, 2 le 22 février 2004, 3 le 16 février 2009) parfois en début de mois (1 le 3 février 2009) et en Crau (1 le 12 février 2001) (Paulus & Kayser, *comm. pers.*). Plus près de nous, l'espèce qui niche dans le Morbihan en nombre très réduit a déjà été mentionnée sur les sites de nidification depuis 1998, dès le 28 février en 1998 (Bozec, *comm. pers.* ; Ballot et al. 2002), le 28 février 2000 (Bozec, *comm. pers.*) et le 25 février en 2001 (Bozec, *comm. pers.* ; Maout et al., 2005). L'observation la plus tardive dans ce secteur est celle de deux individus le 25 octobre 1999.

Enfin, pour terminer ce tour comparatif, signalons que parmi les oedicnèmes anglais, ceux de la réserve de Weeting Heath dans le Norfolk, arrivent généralement entre le 13 et le 27 mars (Ryan, *comm. pers.*).

L'espèce ne semble donc pas hiverner en Bretagne administrative. Poussé par des vents d'est persistants depuis quelques jours, l'individu hoëdicais pourrait donc concerner un hivernant des Pays-de-la-Loire ou de Poitou-Charente se déplaçant en raison des rigoureuses conditions hivernales que nous avons connues en janvier dans l'ouest de la France. Mais la date de l'observation ne permet pas de trancher et il pourrait aussi s'agir d'un migrateur, parmi les plus précoces.



photo 2 : oedicnème criard en milieu méditerranéen (maroc, octobre 2008). A. Deniau

REMERCIEMENTS

Je remercie Alain Fossé pour la transmission de l'article de Gabory, José Serrano et René Bozec pour la transmission des observations les plus hivernales ou automnales en Bretagne, Guillaume Paulus de la Réserve naturelle des coussouls de Crau, Yves Kayser de la Tour du Valat, Florence Le Guillou de la Réserve naturelle de Lilleau des Niges, Willy Maillard pour les données citées dans le texte et Jane Ryan du Norfolk Wildlife Trust pour les informations en provenance de Grande-Bretagne.

BIBLIOGRAPHIE

Ballot J.N., Garoche J., Iliou B., Maout J. & Mauvieux S., 2002. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1997 et 15/07/1998. *Ar Vran*, 13-1 : 4-52

Cheyland G., 1988. Recensements en Crau. *Feuille de liaison du Centre d'Etude sur les Ecosystèmes de Provence*, 26 : 22-23

Cheyland G., 1975. Esquisse écologique d'une zone semi-aride : la Crau (Bouches-du-Rhône). *Alauda*, 43-1 : 23-54

Cramp S. & Simmons K.E.L., 2001. *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa ; Volume III Waders to Gulls*. Oxford University Press, Oxford : 913 p.

Dubois P.J., Le Maréchal P., Olios G. & Yésou P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, Paris : 559 p.

Gabory O., 1998. L'hivernage de l'Oedicnème criard dans le nord-ouest de la France. *Crex*, 3 : 65-72

Le Mao P. & Maout J., 1999. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1994 et 15/07/1995. *Ar Vran*, 10-1 : 19-66

Maout J., Ballot J.N., Barrault F., Cozic E. & Mauvieux S., 2005. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/2000 et 15/07/2001. *Ar Vran*, 16-2 : 40-147

Arnaud Le Névé
5 rue Le Guennec
29200 BREST