

PASSAGE RECORD DE PUFFINS CENDRES *Calonectris diomedea* LE LONG DES CÔTES BRETONNES

Thierry Quelennec

Ce 4 septembre 2008, suite à une séance avortée de baguage le long de l'Aulne maritime (météo pluvieuse), nous décidons, Mikael Champion, Philippe Lagadec, Marianne Quelennec et moi-même, d'aller faire du terrain dans le sud-Finistère. En ce début septembre, plusieurs espèces occasionnelles (phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*, phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*, mouette de Franklin *Larus pipixcan* et étourneau roselin *Sturnus roseus*) se sont données rendez-vous entre Saint-Guérolé et la pointe de Penmarc'h (Finistère sud). A notre arrivée, en début d'après-midi, les phalaropes accaparent notre attention mais déjà nous notons le passage, étonnant par le nombre, de puffins cendrés en haute mer. En fin d'après-midi, après avoir cherché la mouette américaine sans succès, nous décidons

de réaliser un comptage du passage de puffins, car celui-ci continue et nous semble tout à fait exceptionnel. Nous nous installons sous le phare d'Eckmul à Penmarc'h et les chiffres de cette séance de guet-à-la-mer sont impressionnants. En une heure, de 17h 50 à 18h 50, nous comptons :

- 862 puffins cendrés,
- 72 puffins sp.,
- 1 puffin majeur *Puffinus gravis*,
- 152 fous de Bassan *Morus bassanus*,
- 1 fulmar boréal *fulmarus glacialis*,
- 1 labbe parasite *Stercorarius parasiticus*,
- 1 grand labbe *Stercorarius skua*.

Les oiseaux remontent du sud vers le nord. Au même moment, à Ouessant, Jean-Yves Barnagaud en compte 53 (entre 18h10 et 19h10) en vol nord-est (Audevard, *comm. pers.*).



photo 1 & 2 : puffin cendré ssp diomedea (Marseille - Bouches-du-Rhône, juin & juillet 2009). N. Bazin

Le puffin cendré est un procellaridé qui niche en Méditerranée, pour la sous-espèce *diomedea* et en Atlantique, des Açores au Portugal, pour la race *borealis*. En 2006, un cas de nidification (3 couples) plus au nord a été noté près d'Arcachon en Gironde. Étonnement, il s'agissait de la sous-espèce méditerranéenne (Mays *et al.*, 2006).

Après la saison de reproduction, les puffins se dispersent en Atlantique, pour les oiseaux de Méditerranée, où ils se mêlent probablement aux oiseaux de la race *borealis* (mais les sous-espèces ne sont pas distinguables sur le terrain). L'espèce fréquente le golfe de Gascogne de mars à novembre, mais c'est un oiseau qui reste peu fréquent dans les eaux côtières (Guérin, 1999). Cependant, on observe parfois des afflux de puffins cendrés. En 1980, un groupe comprenant entre 6000 et 16000 oiseaux s'étendait de la fosse de Capbreton (Landes) jusqu'au sud du Finistère. Cette année là, on a compté 1270 oiseaux en face de la pointe du Raz et 1500 à Brignogan. Le 29 août 1985, ce sont 1500 oiseaux qui stationnaient en face d'Ouessant (Dubois *et al.*, 2008).

Le mouvement observé ce 4 septembre 2008 pourrait être du même ordre de

grandeur. Il pourrait en effet concerner 4300 puffins, en supposant que le passage s'est déroulé au même rythme pendant 5 heures, temps que nous avons passé sur le site. Mais le passage avait commencé avant notre arrivée sur le site et s'est poursuivi après notre départ (on ne peut savoir sur combien d'heures il s'est déroulé), il pourrait donc s'agir d'un groupe aussi important que celui de 1980, donc un des plus gros pour la Bretagne et même pour la France.

BIBLIOGRAPHIE

Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, Paris : 560p.

Guérin S., 1999. Le Puffin cendré *Calonectris diomedea* dans le nord du Golfe de Gascogne. *Ornithos* 6-3 : 115-118

Mays G., Durand J. M. & Gomez G., 2006. Première nidification du Puffin cendré *Calonectris diomedea* sur la façade atlantique française. *Ornithos* 13-5 : 316-319

Thierry Quelennec
9 rue d'Alsace
29290 SAINT-RENAN