

UN CAS DE REPRODUCTION DU BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* A TREVIGNON, DANS LE FINISTERE EN 2010

Arnaud Le Nevé
Sébastien Nédellec
Ghislain Riou
Nathalie Delliou

Le blongios nain, ce petit héron de roselière aux mœurs discrètes et nocturnes, est considéré comme un nicheur et un migrateur rare en France (Dubois *et al.*, 2008).

L'atlas des oiseaux nicheurs de France (sur la période 1985-1989) montre une aire de répartition principalement continentale et méditerranéenne. Elle s'étend du nord au sud de la France en passant par la région Centre, à l'est jusqu'en Alsace, puis vers le sud les vallées de la Saône et du Rhône, le littoral méditerranéen, et vers l'ouest la vallée de la Garonne jusqu'en Poitou-Charentes. Elle évite ainsi les massifs montagneux et tout le grand ouest de la

Haute-Normandie à la Vendée (Marion, 1995).

La population française n'a cessé de diminuer depuis la première estimation de 2000 couples en 1968. Elle était estimée à 500 – 800 couples en 2006 (Dubois *et al.*, 2008). Malgré cette tendance négative et ses faibles effectifs, l'espèce n'est pas inscrite en 2011 sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés de France métropolitaine, où elle est considérée comme « quasi menacée » (MNHN & UICN, 2011).

En Bretagne, Loire-Atlantique comprise, le blongios nain semble avoir toujours été localisé. Il est peu commun en Loire-

Atlantique au XIX^{ème} siècle et absent de Basse-Bretagne au début du XX^{ème}. Dans les années 1960 sur le lac de Grand-Lieu, les témoignages d'anciens pêcheurs et gardes le signalent commun, les observations étant quotidiennes sur les douves des roselières boisées (Sébastien Reeber, *comm. pers.*). Dans le même temps, des indices sont constatés dans le Morbihan (Lannénec/Lorient et Saint-Gildas-de-Rhuys), ce qui est relevé dans le premier atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Cette présence n'est plus remarquée dans les années 1970 à l'exception du secteur de la baie d'Audierne, Finistère sud, où il est nicheur probable. A cette époque, quatre mailles (de l'atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne) sont occupées de façon certaine en Loire-Atlantique (nord de la Brière, nord du Marais Breton, Grand-Lieu et Nantes), et une en Ile-et-Vilaine (étang de Marillé / La Guerche) (Guermeur & Monnat, 1980).

Entre 1980 et 1985, sur les cinq départements le blongios nain n'est plus reproducteur certain qu'en baie d'Audierne, mais une reproduction probable est constatée sur les étangs de Trévignon. Il ne reste plus qu'une maille probable en Loire-Atlantique dans le nord-est (Clec'h, 1997).

Durant les années 1990, la reproduction certaine du blongios en Bretagne se limite à la baie d'Audierne. Sur ce secteur, plusieurs preuves de reproduction sont relevées en 1994, 1995 et 1998 (Maout, 1998 ; Le Mao &

Maout, 1999 ; Ballot *et al.*, 2002). Elle est probable en 1997 (Bargain, 1997). Après le dernier contact de chanteur en 1999 (Ballot *et al.*, 2003), la baie d'Audierne semble désertée par l'espèce.

Enfin, le troisième inventaire des oiseaux nicheurs de Bretagne conduit de 2004 à 2008 n'est guère plus encourageant car le blongios n'est plus noté comme reproducteur certain. Seule la Loire-Atlantique fournit des indices de reproduction possible à Grand-Lieu, et probable à Goulaine (Marion, à paraître). A Grand-Lieu cependant, la reproduction est notée en 2002 (Ballot *et al.*, 2006, 2007) et pourrait encore être annuelle de nos jours (Sébastien Reeber, *comm. pers.*) mais les observations probantes font défaut.

Dans ce contexte de rareté régionale historique et de déclin national, un couple nicheur produisant au moins un jeune a été observé à Trévignon, commune de Trégunc, Finistère sud, au printemps 2010.

Le mâle est contacté pour la première fois le 11 juin sur le Loc'h Coziou, puis le 22 juin sur le Loc'h Lougar. Le 8 juillet il est observé par deux fois puis revu le 22 juillet au Loc'h Lougar. Au même endroit, un juvénile volant est observé le 26 juillet en bord de roselière. Le mâle et le jeune seront également photographiés, sans dérangement, à l'occasion de ces observations et attestent ainsi de la reproduction de l'espèce sur le site.



photo 1 : blongios nain mâle en vol (Trégunc - Finistère, juillet 2010). G. Riou



photo 2 : jeune blongios nain volant le 26 juillet 2010 (Trégunc - Finistère, juillet 2010). G. Riou

Il s'agit donc de la première reproduction certaine de l'espèce sur le site des étangs de Trévignon, mais il était noté nicheur probable au début des années 1980 (Clec'h *op. cit.*). Il est vrai que le milieu naturel offert par le Loc'h Lougar et l'ensemble des étangs de Trévignon correspond aux préférences écologiques de l'espèce. Le blongios nain apprécie en effet les roselières denses à multiples ouvertures et trouées pour s'alimenter. Il affectionne également les roselières buissonnantes, voire les saulaies envahies de roseaux pour peu que les ouvertures soient suffisantes pour assurer son alimentation. C'est aussi une espèce de héron tolérante à la présence de l'homme qui peut parfois nicher sur de petits plans d'eau à proximité des habitations (Marion *et al.*, 2000).

En 2011, l'espèce n'a pas été revue. La gestion pratiquée dans le cadre du site Natura 2000 pourrait être améliorée en sa faveur et celle de la faune et la flore des roselières en général. Sur le Loc'h Coziou qui est l'étang présentant les

plus vastes massifs de roselières du site, la gestion consiste actuellement à contrôler l'expansion de la roselière sur les rives du Loc'h par une fauche estivale avec exportation, tardive (après la reproduction des oiseaux). Elle pourrait être compatible avec les exigences du blongios en produisant l'année suivante des secteurs de roselières peu denses, de composition floristique hétérogène, débarrassées de leur litière, et des ouvertures propices à l'alimentation. Mais le pâturage ovin pratiqué parallèlement à la fauche, tout au long de l'année, paraît trop intensif et empêche au printemps le développement des ceintures à petits hélrophytes en mélange avec la roselière. Ce pâturage devrait être cantonné aux mois de septembre et octobre, sur les regains de roseaux sur les secteurs fauchés (Le Nevé, 2011).

A l'issue de l'enquête 2004 – 2008 pendant laquelle aucune preuve de nidification certaine n'a été recueillie en Bretagne, il paraissait donc opportun de rapporter ici, ce cas rare de reproduction du blongios nain dans la région.

Conservation et recherche de l'espèce en Bretagne

On attribue le récent déclin du blongios nain en France et en Europe à des difficultés de survie sur sa route migratoire au-dessus du Sahara vers ses quartiers d'hivernage en Afrique de l'est, en raison d'épisodes de sécheresse, plus qu'à une destruction de ses habitats de reproduction (Marion *et al.*, 2000).

En Bretagne, en raison de la quasi-absence historique de sa reproduction, le blongios nain n'a pas été retenu dans la « liste des oiseaux menacés et à surveiller en Bretagne » publiée par Bretagne Vivante (Bargain *et al.*, 2008). De même, dans les travaux en cours menés par les associations naturalistes régionales et l'État pour définir la stratégie de création d'aires protégées (SCAP) en Bretagne, il est proposé que l'espèce soit retirée de la liste des taxons à prendre en compte pour justifier la création de ces aires protégées.

Il n'empêche, dans un contexte de réchauffement climatique et une tendance à la remontée vers le nord des espèces méridionales, une attention particulière pourrait être apportée à la recherche du blongios par les observateurs dans notre région et notamment dans les marais littoraux du Morbihan et du sud Finistère. Le blongios nain est un héron à reproduction tardive et discrète. Il est à rechercher en juillet et août lorsque les adultes nourrissent et que les jeunes émancipés se montrent en lisière de roselière en pleine journée.



photo 3 : jeune blongios nain volant le 26 juillet 2010 (Trégunc - Finistère, juillet 2010). G. Riou

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier Sébastien Reeber pour le complément d'information apporté sur la reproduction du blongios nain au lac de Grand-Lieu.

BIBLIOGRAPHIE

Bargain B., 1997. *Station de baguage de la baie d'Audierne, rapport 1997*. SEPNB. : 30 p.

Ballot J.-N., Garoche J., Iliou B., Maout J. & Mauvieux S., 2002. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1998 et 15/07/1998. *Ar Vran*, 13-1 : 4-52

Ballot J.-N., Barrault F., Cozic E. & Maout J., 2006. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/7/2001 et 15/7/2002. *Ar Vran*, 17-2 : 30-89

Ballot J.-N., Barrault F., Cozic E. & Maout J., 2007. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/2002 et 15/07/2003. *Ar Vran*, 18-2 : 71-125

Bargain B., Cadiou B., Gélinaud G. & Le Nevé A., 2008. Listes des oiseaux menacés et à surveiller en Bretagne. *Penn ar Bed*, 202 : 1-13

Clec'h D., 1997. Blongios nain *Ixobrychus minutus*. In Collectif, 1997. *Les oiseaux nicheurs de Bretagne 1980*

– 1985. Groupe ornithologique Breton : 290 p.

Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé. Paris : 560p.

Groupe Ornithologique Breton. *Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Blongios nain mis à jour le 24 mai 2009* [en ligne]. Disponible sur : < <http://gob.fr/atlas/>>. Consulté le 10 mai 2011.

Guermeur Y. & Monnat J.-Y., 1980. *Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne*. Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne - Ar Vran. Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie : 240 p.

Le Mao P. & Maout J., 1999. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1994 et 15/07/1995. *Ar Vran*, 10-1 : 19-66

Le Nevé A., 2011. *Diagnostic du site des étangs de Trévignon*. Déclinaison régionale 2011 du Plan national d'actions du Phragmite aquatique 2010 – 2014. Bretagne Vivante – SEPNB, Dréal Bretagne. Brest : 30 p.

Maout J., 1998. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1993 et 15/07/1994. *Ar Vran*, 9-1 : 8-60

Marion L., 1995. Blongios nain *Ixobrychus minutus*. In Yeatman-Berthelot D. & Jarry G., 1995. *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985 – 1989*. Société Ornithologique de France : 775 p.

Marion L., Ulenaers P. & Van Vessem J., 2000. *Herons in Europe*. In Kushlan

J.A. & Hafner H., 2000. *Heron conservation*. Station biologique de la Tour du Valat. Academic Press : 480 p.

Marion L., (à paraître). *Le Blongios nain* in *Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne 2004-2008*.

Arnaud Le Nevé
G.O.B.
5 rue Le Guennec
29200 BREST

Sébastien Nédellec
G.O.B.
Kerdilès
29500 ERGUE-GABERIC

Ghislain Riou
G.O.B.
21 Touldous
22340 PLEVIN

Nathalie Delliou
Bretagne Vivante
Maison de la mer
Pouldohan
29910 TREGUNC