

DESCRIPTION DETAILLEE

ESPECE: POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita ssp abietinus*)

LOCALITE: Kerlédan- SAUZON/Belle-Ile-en-Mer (56)

DATE: 31/10/90 (17h35 à 17h45)

OBSERVATEUR: Y.CREAU 9, allée des Erables 76240 BONSECOURS

CONDITIONS DE L'OBSERVATION:

Optique: Jumelles 10X40

Distance de l'observation: 4 à 5 mètres minimum. L'oiseau se laisse approcher très près, sans être apparemment dérangé.

Conditions d'éclairage: assez mauvaises compte-tenu de l'heure.

Milieu: vallon avec quelques arbres.

Connaissance antérieure de l'espèce: de la race type, mais pas des sous-espèces nordiques.

DESCRIPTION:

Taille: A première vue comme P.c.collybita, peu être un peu plus grande, mais sans point de comparaison difficile à juger.

Silhouette: Rondouillard.

Tête et cou: Couronne brun gris, sourcil net bien visible. La partie du sourcil de l'oeil au bec de taille égale à la partie en arrière de l'oeil. Impression d'un sourcil plus marqué, plus net et plus long que les P.c.collybita, observés sur l'île.

Lores sombres.

Gorge pâle, peut-être jaunâtre, mais conditions d'éclairage limite. Parties supérieures: gris-brun.

Barre alaire pâle à l'extrémité des grandes couvertures. Cette barre est fine, mais très visible et se prolonge, sur l'extrémité des grandes couvertures visibles.

Parties inférieures: claires, lavées de jaunâtre.

Pattes: noires.

Comportement: se nourrit à terre, dans les herbes couchées, pendant toute la durée de l'observation.

Cri: »jizz« caractéristique des pouillots.

DISCUSSION:

Après élimination du Pouillot à grands sourcils (sourcil plus net, 2 barres alaires), du Pouillot boréal (sourcil plus long), du Pouillot verdâtre (sourcil plus long, cassé), restent les races nordiques du Pouillot véloce.

Compte-tenu de teintes jaunâtres, P.c.abietinus semble de loin le plus probable.

Bibliographie:

Oiseau magazine, n° 11 et 13.

British Birds (Sept 85), 78-9, p 446-447.

Bird Identification, A.HARRIS, L.TUCKER et K.VINTCOMBE.