



CRITERES D'IDENTIFICATION A DISTANCE DES PLONGEONS (GAVIA STELLATA, ARCTICA, IMMER)

		1 AN CATMARIN +1an , AD.		1 AN ARCTIQUE +1an , AD.		1 AN IMBRIN +1an , AD.	
TAILLE		le plus PETIT		DIFF. de TAILLE peu fiable ,grandes variations individuelles			
APPARENCE GENERALE		CLAIR -	CLAIR +	SOMBRE -	SOMBRE +	SOMBRE -	SOMBRE +
TETE	PORT	TYPIQUE , RELEVE (1)		CULMEN et POINTE SOMBRES		CULMEN et POINTE SOMBRES	
	BEC	gris pâle	SOMBRE (1G)	pâle	gris	pâle	gris
		FIN		apparence + longue		apparence + massive	
	FRONT	sombre	CLAIR	sombre ,fuyant		sombre , abrupt	
	CERCLE ORBITAL	OUI		NON		OUI	
COU	COULEUR	sombre	BLANC	GRIS, +CLAIR que le DOS (5)		NOIR,+SOMBRE que le DOS (7)	
	DESSIN	rectiligne ,FIN		légère pointe grise sous la joue		MARQUE BLANCHE à mi-hauteur du cou (8)	
DOS	COULEUR	MANTEAU + SOMBRE que COUVERTURES ALAIRES(tach.) (1D)	FINEMENT TACHETE discernable à faible dist. seulement (1G)	DESSIN en ECHELLE sur la partie antérieure (2D)	SOMBRE UNIFORME (2G)	DESSIN en ECHELLE sur la partie antérieure (6D)	SOMBRE UNIFORME (6G)
				+ SOMBRE que le CRANE et le COU (5)		- SOMBRE que le CRANE et le COU (7)	
	LIGNE de FLANC	NETTE		NETTE MARQUE BLANCHE sur la partie post. (1)		TACHETEE	



ARCTIQUE

IMBRIN



FIGURES

(1) PL. CATMARIN : 1G +1an, 1D 1an
 (2)(3)(4)(5) PL. ARCTIQUE : 2G +1an, 2D 1an
 (6)(7)(8) PL. IMBRIN : 6G +1an, 6D 1an

(1)(2)(6) WALLACE. Oxford univ. press. Cramp et Simmons (1977)
 (3) FURIC. Inédit
 (4) WALLACE. Brit. Birds (1978)
 (5)(8) MULLARNEY. Brit. Birds (1980)
 (7) BOTTOMLEY et BOTTOMLEY. Brit. Birds (1972)



GOELAND ARGENTE JUVENILE



GOELAND BRUN JUVENILE

DOS

- Du dos au croupion on a un léger dégradé vers le clair sans rupture de ton.

- le dos, fortement taché de sombre contraste avec le croupion blanc qui tranche avec le bout de la queue très noire.

AILES

- couvertures uniformes, claires
- les rémiges primaires intérieures sont plus claires et forment une zone pâle visible de loin - souvent en transparence.

- les couvertures forment deux bandes sombres.
- rémiges et extrémités de l'aile uniformément sombres.

Bec rose à pointe noire.

Bec noir.

Pattes rose-chair.

1^{er} hiver : - semblable au juv. mais la tête et le dessous sont plus clairs, moins uniformes.

1^{er} été : - Tête et dessous souvent blancs.

- En raison de l'usure, les ailes et la queue sont brun-pâle, beaucoup plus que chez le G. brun. Il y a parfois quelques squamule grises.

buse



bondrée

vol ascendant

Buteo



Pernis



vol glissé

