

PREMIERE CONSTATATION DE LA NIDIFICATION DE  
NUMENIUS A. ARQUATA SUR LA COMMUNE DE PLOUGASNOU

(*Alauda*. Tome I, 1929. - p. 292-293)

CORRESPONDANCE,  
NOTES ET FAITS DIVERS

---

**Première capture en Europe et en France de *Locustella fasciolata* (GRAY).**

A la dernière réunion (octobre 1929) du *British Ornithologist Club* j'ai montré un spécimen de *Locustella fasciolata* (GRAY), capturé à l'île d'Ouessant (Finistère) où il s'était heurté à la lentille d'un phare. C'est non seulement une nouvelle addition à l'avifaune française, mais aussi la première capture de cette espèce en Europe.

Les lieux de reproduction de cette Locustelle, se trouvent dans la Sibérie orientale. De là l'Oiseau émigre à travers la Chine et le Japon pour aller hiverner dans les îles Philippines et l'Archipel Malais.

COLLINGWOOD Ingram,

**Première constatation de la nidification de *Numenius a. arquata* (L.), sur la commune de Plougasnou (Finistère).**

Le Courlis cendré niche régulièrement, mais en petit nombre, sur quelques-unes de nos landes marécageuses du centre Finistère. En dehors de cette région, nous n'avions jamais encore enregistré de nidification de l'espèce sur une commune cotière.

Cette année sur la commune de Plougasnou (Finistère) le 13 juin, nous avons capturé dans une lande marécageuse située entre les fermes de Goariva et Pont-Guen, un jeune poussin de Courlis en duvet (bec : 34, tarse : 55). Un autre exemplaire de la même nichée que nous vîmes nous échappa dans les

Ajoncs. Le couple défendait avec acharnement sa progéniture et tournoyait à quelques mètres de nous en poussant des cris discordants.

E. LEBEURIER.

#### La Locustelle tachetée en Seine-et-Oise.

Il semble se confirmer que la Locustelle tachetée *Locustella naevia naevia* (BODDAERT), se répand de plus en plus dans ma région.

Le dimanche 2 juin, étant en excursion oologique dans les anciennes sablières de Ris-Orangis (à quelque 22 km. de Paris) j'eus la chance de découvrir, en bordure d'une luzerne, un nid de cette espèce à peine ébauché. Le 6, le nid, complètement terminé, contenait 2 œufs.

Le dimanche 9 juin, la ponte était de 5 œufs.

Le nid, composé de mousse et garni d'herbes sèches à l'intérieur, était complètement en terre, au pied d'une grosse touffe d'herbes et admirablement caché.

G. COGNEAU.

#### Sur une excursion ornithologique en Espagne.

H. JOUARD a reçu, le 10 juin, de notre abonné le Docteur Hans STADLER de Lohr-am-Main (Bavière) qui avait accompagné en Espagne une délégation de botanistes allemands, une intéressante relation de voyage dont voici des extraits, par ses soins traduits — avec l'autorisation du Dr STADLER — à l'intention des lecteurs d'*Alauda* (1).

«... C'est ainsi que je passai près de quatre semaines en Espagne. Notre voyage comporta des difficultés exceptionnelles et fut des plus fatigants. Notre conducteur pouvait, heureusement, se faire comprendre et, au bout de quelques jours, je parvins moi-même à apprendre le calcul et les mots les plus généralement employés en voyage. Toutefois, sans

1. Le Dr STADLER se propose de publier lui-même un article plus détaillé sur ce sujet, — sans doute dans la revue anglaise « *The Ibis* » où sont parus la plupart des travaux ornithologiques récents sur l'Espagne.