

A PROPOS DE LA HUPPE EN BASSE-BRETAGNE

(RFO. Tome 24, 1954. - p. 283-286)

était intérieurement revêtu d'une bonne épaisseur de racines et contenait trois petits.

J'imagine mal quel concours de circonstances a pu inciter cette Hirondelle à choisir un pareil site et aimerais savoir si de pareils cas ont déjà été notés.

J.-C. VOISIN.

### A propos de la Huppe en Basse-Bretagne

A la suite des notes que nous avons fait paraître ici-même sur la Huppe, nous avons reçu quelques nouvelles observations.

#### I

Le numéro de *L'Oiseau et la R. F. O.* du 4<sup>e</sup> trimestre 1953 me tombe sous les yeux. J'y vois une note de M. G. de KERROS signalant deux captures de Huppées en Finistère, comme s'il s'agissait d'une chose assez rare. Ce n'est pas l'impression que m'ont laissée mes expériences personnelles. Avant la dernière guerre, je passais régulièrement le mois d'août à Trémarec, commune de Landudal, canton de Briec, environ à 15 km N.-O. de Quimper.

Ces séjours ne se passaient habituellement pas sans que j'aie rencontré une ou deux Huppées, et cela sans les rechercher spécialement, mais simplement en me promenant avec mes jumelles dans un rayon maximum de 2 km. Elles étaient toujours dans la même région : des champs assez secs, sur les parties les plus hautes du pays. Sans être abondant, ce n'était certainement pas un oiseau rare.

Cela concorde d'ailleurs avec ce que j'ai pu constater dans d'autres provinces et ce que j'entends dire un peu partout, notamment en Bourbonnais et en Mâconnais. Il en résulte que la Huppe doit être actuellement en voie d'extension en France.

Lieutenant-Colonel EBLÉ.

#### II

On sait que la Huppe, après une éclipse plus ou moins prononcée dans ses régions de nidification du nord de la

France, s'y montre partout de nouveau depuis quelques années.

L'extrême nord-ouest, dont le sud-Finistère marquait sa limite de dispersion comme nicheuse, n'échappe pas à la règle, et si, en 1934, nous écrivions dans « L'Ornithologie de Basse-Bretagne » (1) qu'elle semblait avoir disparu, tout au moins s'être très raréfiée, nous ajoutions cependant que des recherches suivies devaient la faire découvrir en Cornouailles comme nidificatrice régulière sinon abondante.

Depuis lors, les rencontres de l'oiseau se sont trouvées plus nombreuses, et si certaines, se rapportant aux mois d'août et septembre, peuvent représenter des individus jeunes en migration, il n'en reste pas moins que des cas certains de nidifications ont été rapportés ces deux dernières années sans recherches spéciales.

Déjà EBLÉ nous signalait avoir levé une Huppe dans un champ de betteraves, le 20 juillet 1934, à Trémarec en Landudal, et que le propriétaire des lieux, M. de POMPERY, disait entendre le « houp houp » de l'espèce fréquemment chaque printemps et jusqu'à la Saint-Jean (24 juin). Il existait d'ailleurs à Trémarec une Huppe naturalisée, tuée sur la propriété avant 1914 (2).

Le même observateur signale encore une Huppe sur une pelouse de Trémarec le 9 août 1936 (3) et m'écrivait la nouvelle rencontre d'un autre oiseau levé deux fois dans un champ de genêt (Sarothamne), le 12 août 1937.

Dans le canton de Fouesnant, plus au sud, notre ami le Docteur MARSILLE nous signalait en leur temps une série de rencontres :

- 30 juillet 1937 — un sujet en vol au-dessus de Beg-Meil ;
- 8 septembre 1937 — un sujet en vol à Saint-Jean en Clohars-Fouesnant ;
- été 1940 — un sujet à terre à Sainte-Véronique-en-Saint-Evarzec ;
- 11 août 1944 — un sujet en vol entre Beg-Meil et Moustierlin ;
- 25 mars 1948 — un sujet tué sur l'île Saint-Nicolas-des-Glénans ;

(1) LESSURIE et RAPINE, Ornithologie de la Basse-Bretagne. *L'Oiseau et la R.F.O.*, 1934, p. 696.

(2) Cf. Vicomte EBLÉ, Notes d'été en Finistère. *Alauda*, 1935, p. 413.

(3) Du même, *Alauda*, 1937, p. 346.

10 juin 1953 — un sujet posé sur les fils de haute tension à 1 km de Pleuven, en direction de Quimper ;

12 juin 1953 — un sujet volant bas, à 2 km de Fouesnant, sur la route de Keroulac, passe si près de l'auto qu'on peut voir un gros coléoptère dans son bec.

Mais, chose curieuse, en 1954 il ne fit aucune observation de Huppe dans le canton.

En 1953, notre collègue R. D. ETCHÉCOPAN surprenait des Huppes dont le comportement laissait supposer qu'elles étaient nicheuses près de Douélan et près du Pouldu en Clohars-Carnoët (4).

Et G. de KERROS, rappelant la mention, dans l'*Ouest-France* du 27 avril 1951, d'une capture à Ploneour-Lanvern, signalait la présence d'un sujet, dans une garenne en bordure de mer, qu'il put observer le 11 septembre 1953 à Sainte-Marine en Combrit. Oiseau qui devait se trouver là depuis le mois de Juillet (5).

Nous signalerons pour notre part une Huppe vue les 21 et 22 avril 1951 sur le bas-côté du G. C. 46, à hauteur de Milaudren en Primel-Plougasnou et la rencontre d'une autre, le 3 juillet 1954, s'envolant devant notre voiture sur la route entre le village de Trémellour et le port de Belon en Riec (6).

Toutes ces observations laissaient supposer la découverte à brève échéance de faits certains de nidification. La première fut enregistrée le 11 juin 1953 par le Docteur MARSILLE, qui observa un couple nourrissant des jeunes dans un trou à 6 m de hauteur, dans un vieux châtaignier du parc de Creac'h Keat en Pleuven. L'orifice de 6 cm de diamètre de la cavité était orienté au N.-W., le nourrissage se faisant à son orifice. L'escalade de l'arbre permit de voir un jeune déjà grand (les autres invisibles).

L'observation de l'oiseau de Keroulac (à 7 km à vol d'oiseau de Creac'h Keta), portant un insecte au bec, laisse les plus grandes chances à un autre cas de nidification. Celle de

(4) R. D. ETCHÉCOPAN, Réflexions faites en Bretagne au mois d'août 1953. *L'Oiseau et la R.F.O.*, 1953, p. 242.

(5) G. de KERROS, La Huppe en Bretagne. *L'Oiseau et la R.F.O.*, 1953, p. 307.

(6) Signalons que le 8 juillet 1954, nous remarquons une Huppe de naturalisation récente dans une buvette de Beg-ar-Lann en Tréméven. Grande fut notre surprise d'apprendre que le spécimen venait d'Algérie, envoyé par le fils de la maison qui faisait là-bas son service militaire.

l'oiseau isolé du 10 juin est moins certaine, la distance à Creac'h Keta n'étant que de 2 km.

Par contre, le 2 juin 1954, M. STEPHAN DU GUILVINEC découvrait dans un trou de mur, au village de Tronoën en Saint-Jean-Trolimon, un nid contenant six petits. Le fait fut signalé dans *Le Télégramme* du 5 juin où il était donné une description des oiseaux qui ne pouvait laisser de doute sur leur identification.

Nous ajouterons que le 1<sup>er</sup> juillet 1954, terminant une visite aux étangs de Trévignon en Tregunc, nous vîmes s'envoler de la bordure de l'étang de Kerouni une Huppe qui se perdit dans les arbres au-delà du village, mais qui bientôt après revint au même endroit, picora dans la bordure herbée, reprit son essor et recommença le manège à différentes reprises. Elle abéquait une famille, née dans la cavité d'un Orme le long d'un chemin creux. L'endroit était boisé et à la limite immédiate de dunes arides.

Ed. LEBEURIER.

#### Observations de comportement chez des oiseaux

C'est un fait banal et maintes fois signalé que le comportement des représentants d'un groupe animal peut se trouver modifié par l'application, à un certain nombre de sujets du groupe, de stimuli défavorables. Ainsi les Cigognes — *Ciconia ciconia* (L.) — ne s'établissent pour nicher que dans les régions où les hommes respectent leurs nids (BOUET) ; les Castors — *Castor fiber* (L.) —, trop chassés, abandonnent leurs constructions de surface ; les Rats et les Souris domestiques évitent les pièges et les appâts, qui ont causé la mort de quelques-uns des leurs ; le gibier des régions trop souvent prospectées par les chasseurs émigre vers d'autres cantons, etc... On pressent même l'existence de relations entre les caractéristiques de ces stimuli et celle des réactions qu'ils provoquent.

Or, si l'on conçoit aisément que l'animal qui a échappé à un danger en garde le souvenir et celui des circonstances qui l'accompagnaient, on peut se demander par quels mécanismes les autres sujets de la même espèce peuvent être, eux aussi, avertis de ce danger et apprendre à l'éviter.