

AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

Ti ar Vro B.P. 103
29833 CARHAIX cedex



N°18 ANNEE 2000

Sommaire du numéro 18 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 novembre 1998 à 15 mars 1999	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 13
Groupe 3 de l'Huïtrier pie au Tournepierre à collier	page 15
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 19
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 22
Activités du G.O.B. MORBIHAN	page 27
Nidification du Grèbe huppé <i>Podiceps cristatus</i> dans le Morbihan en 1998	page 27
Séjours sur Hoëdic, octobre 1999	page 33

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE : 16 NOVEMBRE 1998 A 15 MARS 1999

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
ARTEL Jean-Pierre, BOZEC René, BAILLEUL Patrick, CARDIN Christian,
CORBIERRE Jacques, CORLOU Pierre, DERIAN Gwénaél, DEROUT Nathalie,
ERMEL Gérard, EVANNO Guillaume, GUILLEMOT Francis, HAMET Loïc, ILIOU
Bernard, LEMONNIER Françoise et Jean-Luc, MOUCHEL Yann, ORDUREAU
Yannick, PHILIPPON Patrick, QUILLERE Alain, SIMON Nathalie, URVOAZ
François... sauf erreur ou omission !

Nous remercions à cette occasion Bretagne Vivante qui nous a transmis des données
d'observateurs de passage dans le Morbihan.

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton
(Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre
au 15 mars.

Les observations sont transmises au coordonnateur morbihannais sur papier ou disquette
informatique en respectant l'ordre suivant :

ESPECE ou code	date	lieu-dit (voir carte I.G.N)	commune	effectif	remarques
48005	04/05/1999	Keriel	162	4	un adulte ravitaille trois jeunes dans une lande

Les listes des codes utilisés pour noter les espèces et répertorier les communes sont
disponibles aux réunions du G.O.B. à Brec'h.

Illustration : couverture Patrick Bailleul.

AR VRAN MORBIHAN N°18

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

Plongeur catmarin *Gavia stellata*

(4 données)

Que se passe-t-il ? Seulement trois données maritimes pour ce plongeur entre les 12/12/1998 et 06/02/1999. Il est vrai qu'un observateur note le 09/01/1999 75 individus à la Roche Sèche / Erdevén !

Plongeur arctique *Gavia arctica*

(8 données)

La rivière d'Etel détient la moitié des données entre le 12/12/1998 et le 28/02/1999.

Plongeur imbrin *Gavia immer*

(10 données)

Entre les 22/11/1998 et le 28/02/1999, les observations sur la côte se concentrent vers la presqu'île de Quiberon (7 données). Il n'est question que d'individus isolés ou de paires.


Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

(56 données)

Les effectifs ont été suivis sur deux sites, tous deux à proximité immédiate d'une rivière maritime. Il s'agit de deux étangs de la ria d'Etel, Saint-Jean et Goh-Lenn ; d'un bassin de décantation de remblayage, Pen-Mané / Locmiquélic au bord du Blavet. De plus, les recensements mensuels dans la rivière d'Etel ont révélé que d'importants effectifs y séjournent de novembre à janvier :

Mois	Novembre	Décembre	Janvier	Février
Effectif	267	181	252	87

Grèbes castagneux dans la rivière d'Etel (Morbihan) ; novembre 1998 - février 1999




Grèbes castagneux sur les étangs de Locoal-Mendon et à Pen-Mané / Locmiquélic (Morbihan) ; hiver 1998-1999

WETLANDS INTERNATIONAL : 587.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(72 données)

Parmi les sites d'hivernage :



Grèbe huppé sur l'étang au Duc / Ploërmel (Morbihan), hiver 1998/1999

Quelques données de l'intérieur : à l'étang de Saint-Adrien / Saint-Barthélémy, un couple parade dès le 17/02/1999 ; sur un autre site de nidification, 4 le 17/12/1998 à Château Trô / Guilliers.

Les concentrations d'importance ne semblent guère recensées alors notons seulement 20 à la pointe de Bégüero /le Tour-du-Parc le 22/11/1998, 27 sur le Blavet à hauteur de Locmiquélic le 05/12, 23 à Quélisoye / Larmor-Plage le 24/12.

WETLANDS INTERNATIONAL : 816 dont 460 dans le Golfe et 100 sur la rivière d'Etel.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

(6 données)

Cet hiver apporte un nombre plutôt faible d'observations, concentrées de surcroît entre fin novembre et fin janvier, le secteur privilégié restant la côte de Quiberon :

- Le 22/11/1998, Portivy / Saint-Pierre-Quiberon, 1 ;
- 12/12, Petit Mont / Sarzeau, 1 ;
- 02/01/1999, pointe du Conguel / Quiberon, 5 ;
- 24/01, Le Conguel, 1 ;
- 28/01, étang de Lannénec / Ploemeur, 1 individu ;
- 31/01, port de Penthievre / Saint-Pierre-Quiberon, 4.

WETLANDS INTERNATIONAL : 14 dont 12 dans le Golfe.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(34 données)

Cette fois encore toutes les observations sont littorales (aucune à Guerlédan ?), dispersées tout au long de la période.

A noter : 97 devant la grande plage de Locmariaquer le 20/12/1998, 28 le 17/01/1999 au Conguel / Quiberon, 50 ici et là dans la rivière d'Etel le 28/02.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 181 dont 990 dans le Golfe, les autres sites sont la rade de Lorient, la rivière d'Etel, la baie de Quiberon et la baie de Vilaine avec quelques dizaines d'individus.

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus* (1 donnée)
Un peu plus et aucun n'était vu ? 1 individu à Kerpape / Ploemeur le 02/12/1998.

Fou de Bassan *Sula bassana* (1 donnée)

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (71 données)
Pour l'hivernage dans le Morbihan, voir le numéro précédent d'Ar Vran Morbihan : 1600 à 1700 individus passent l'hiver entre les côtes et les rivières de notre département.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (3 données)
42 à Roëllan face à Etel le 31/01/1999.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* (1 donnée)
Il s'agit encore d'un oiseau vu à Surzur (voir Ar Vran Morbihan n° 14, 15 et 17). Cet habitué ne semble pas rejoint par d'autres congénères ; ou passeraient-ils inaperçus parmi les aigrettes ?

Aigrette garzette *Egretta garzetta* (27 données)
Trois sources différentes renseignent sur les aigrettes de la rivière d'Etel :

- les opérations concertées du G.O.B. ont compté 94, 116 et 128 aigrettes respectivement en décembre 1998, janvier et février 1999;
- un recensement du 07/02/1999 sur les vases salées entre Gohent / Sainte-Hélène et Nestadio / Plouhinec totalise 140 individus ;
- une semaine plus tard, soit le 14/02, 130 aigrettes sont dénombrées au dortoir de Fandouilec / Plouhinec.

D'autre part : 24 au Duer / Sarzeau le 22/11/1998, 4 au Stum / Saint-Barthélémy ce qui pose encore le problème de dortoirs continentaux, 67 aux salines de Carnac le 17/02 (quel dortoir rejoignent-elles ?), le 10/02 77 aigrettes profitent des basses eaux de Pen-Mané / Locmiquélic pour s'alimenter.

Grande Aigrette *Ardea alba* (1 donnée)
A l'étang de Saint-Jean / Locoal-mendon, le 22/12/1998, 1 individu.

Héron cendré *Ardea cinerea* (28 données)
Au crépuscule du 14/02/1999, 100 hérons survolent Riec'h / Belz ; 87 avaient été comptés lors de l'opération concertée du 10/01/1999.

La colonie de Kerzo / Port-Louis s'active tôt : le 07/02/1999, un couple garnit déjà un nid, 1 à 3 nids sont occupés le 13/02 et peut-être un couveur, 6 nids occupés et 2 couveurs le 28/02, 7 à 10 nids occupés le 13/02 et 2 à 4 couveurs.

Que se passe-t-il exactement autour de l'étang de Pont-Calleck / Kernasclédén ? 43 individus observés le 07/03 ont justifié la recherche d'un dortoir ou d'une colonie.. en vain.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(5 données)

Il faut retenir la mention de **340 individus** au dortoir de Castell / Le Tour-du-Parc le 14/02/1999.

Spatule blanche *Spatula platela*

(7 données)

Ce nombre de données ne reflète pas la présence hivernale de l'espèce en presqu'île de Rhuys et dans le Golfe.

A Pen-Mané/ Locmiquélic, un groupe de six (témoignage) laisse derrière lui un individu adulte bagué visible les 13 et 14/03/1999.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

(16 données)

Des observations de paires ou de petits groupes, retenons 15 le 24/01/1999 au Duer / Sarzeau.

Bernache du Canada *Branta canadensis*

(1 donnée)

3 au Duer / Sarzeau, le 11/03/1999.

Bernache nonnette *Branta leucopsis*

(3 données)

- 4 à Tascon / Saint-Armel, le 05/12/1998 ;
- 1 à Tascon, le 19/12 ;
- 1 dans l'anse de Saint-Colombier / Sarzeau, le 18/02/1999.

Bernache cravant *Branta bernicla*

(70 données)

Outre des effectifs modestes dans le Golfe, cette saison hivernale se caractérise par une faible présence de jeunes dans les bandes, ex : 4,54% de jeunes en novembre dans la Petite Mer de Gâvres.

WETLANDS INTERNATIONAL : 10 216 dont 5 050 dans le Golfe.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(62 données)

Parmi les sites du Golfe, l'anse de Sarzeau accueille un peu plus d'un demi-millier d'individus entre décembre et janvier ; les recherches effectuées dans la rivière d'Étel ont permis d'élever les effectifs à plus de cinq cents en janvier. A la fin de l'hiver, les effectifs sont encore à la moitié des précédents, soit 239 le 05/03/1999 à Bénance / Sarzeau et 276 sur la rivière d'Étel le 21/02.

WETLANDS INTERNATIONAL : 4 739 dont 2 920 dans le Golfe.

Canard siffleur *Anas penelope*

(42 données)

Les principaux sites restent, malgré les aléas des dérangements pour le premier d'entre eux, la baie de Sarzeau et la rivière d'Etel : 1000 le 17/12/1998 dans la baie de Sarzeau, mais les effectifs fondent, il y en a 86 le 10/02/1999. L'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon et les vasières du Gouarde / Nostang continuent de retenir les Siffleurs : 450 à Saint-Jean le jour de l'an, 418 lors de l'opération concertée du 10/01 encore 500 au Gouarde le 07/02.

Dans la rade de Lorient, ils arrivent dès la mi-novembre, leur nombre oscille autour de la cinquantaine, visibles sur la Petite Mer de Gâvres, Quélisoye / Larmor-Plage ou l'étang du Ter / Ploemeur.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1099 dont 830 en rivière d'Etel et 170 pour le Golfe.

Canard chipeau *Anas strepera*

(10 données)

Tout au long de l'hiver :

- étang au Duc de Ploërmel ; 5 le 18/11/1999.
- Est du Golfe et presqu'île de Rhuy ; 3 le 22/11 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc, 4 le 14/02/1999 à Suscinio / Sarzeau, 2 à l'étang de la Brousse / Sarzeau le 03/03.
- Rade de Lorient ; 8 dans la Petite Mer de Gâvres le 2/11, 2 le 23/11 puis 1 le 06/03 sur le Blavet à Sterbouët / Locmiquélic.
- Etang de Lannéc / Ploemeur ; 7 le 25/11 et 1 le 06/03.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*


(33 données)

Mises à part les troupes du Golfe, ces sarcelles se montrent en faibles effectifs à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 52 le 07/12/1999 ; 45 au Grand Loc'h de Guidel le 09/12 ; 51 sur l'étang du Pérello / Ploemeur le 09/12 ; 39 à Lannéc / Ploemeur le 14/02.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1780 dont 1420 dans le Golfe du Morbihan.


Canard colvert *Anas platyrhynchos*

(47 données)



Canard colvert sur l'étang aux Ducs / Ploërmel (Morbihan) : novembre 1998 – février 1999

Note : le recensement du 18/1/98 est incomplet.



Canard colvert sur l'étang du Ter / Ploemeur (Morbihan) : octobre 1998 – février 1999

Note : après le comptage du 18/02, les colverts disparaissent presque entièrement.

Fort-Bloqué / Ploemeur, plus de 240 le 20/02/1999.

Canard pilet *Anas acuta*

(25 données)

Dates	31/01	10/02	05/03
Effectif	142	304	218

Canard pilet, trois comptages dans la baie de Sarzeau (Morbihan) : hiver 1998 -1999

Le Passage / Saint-Armel : 650 Pilets le 21/11/1998 ; plus d'un millier dans la baie de Vilaine, vus de la pointe du Moustoir / Billiers, le 23/01/1999.

WETLANDS INTERNATIONAL : dont 821 dans le Golfe et 650 dans la baie de Vilaine.

Canard souchet *Anas clypeata*

(16 données)


Quelques groupes de Souchets sont visibles tout au long de la période, comme à l'étang au Duc de Ploërmel avec 29 unités le 18/11/1998, un maximum hivernal observé à Saint-Jean / Locoal-Mendon le 07/12 ou à Ludré / Saint-Armel, 105 unités le 14/02/1999 ; il en est encore vu 14 le 14/02 aux Loriots sur la côte ploemeuroise.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

(29 données)

Toujours présente mais en maigres effectifs, l'espèce est contactée à l'étang aux Ducs de Vannes, 165 le 29/11/1998, irrégulièrement à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon (19 seulement le 04/01/1999), un maximum de 9 à Ploërmel le 28/01.

L'hivernage traditionnel de l'étang du Ter / Ploemeur est en retrait par rapport aux deux précédents hivers.



Fuligule milouin sur l'étang du Ter / Ploemeur (Morbihan) : octobre 1998 – mars 1999

WETLANDS INTERNATIONAL : 244 dont 191 dans le Golfe.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

(1 donnée)

Un individu se pose sur le bassin de Pen-Mané / Locmiquélic, entre le 20 et le 22/12/1998.


Fuligule morillon *Aythya fuligula*

(42 données)

Une dizaine d'individus séjournent à Pen-Mané / Locmiquélic dans la dernière décade de décembre.

180 sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 01/01/1999 mais l'espèce n'y est pas régulière.

Les effectifs hivernants de l'étang du Ter / Ploemeur sont modestes.



Fuligule morillon sur l'étang du Ter / Ploemeur (Morbihan) : octobre 1998 - février 1999

WETLANDS INTERNATIONAL : 230 dont 102 dans la rade de Lorient.

Fuligule milouinan *Aythya marila* (15 données)

Les données n'émanent guère que de la baie de Vilaine avec 1 000 le 23/01/1999 et encore plus de 950 le 14/02.

1 à 2 individus musardent dans la région lorientaise, entre le 28/11 et le 23/12/98, changeant fréquemment de site.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1581 dans la baie de Vilaine.

Eider à duvet *Somateria mollissima* (5 données)

De Pénestin à Portivy... mais bien peu d'observations. 29 le 23/01/1999 de la pointe du Bile / Pénestin le 23/01/1998 et 28 au Conguel / Quiberon le 13/03.

WETLANDS INTERNATIONAL : 29 en baie de Vilaine.

Harelde boréale *Clangula hyemalis* (1 donnée)

2 le 30/01/1999 à Damgan.

WETLANDS INTERNATIONAL : 2.

Macreuse noire *Melanitta nigra* (11 données)

De la Vilaine à la Laita et de novembre à mars : plus de deux cents au Fort-Bloqué / Ploemeur le 03/12/1998 ; plus de 450 devant Kerhostin / Saint-Pierre-Quiberon le 17/01/1999, et environ 120 à Keroyal / Daamgan le 06/02/99.

WETLANDS INTERNATIONAL : 489 dont 450 en baie de Quiberon.

Macreuse brune *Melanitta fusca* (1 donnée)

Le 10/01/1999 à Linès / Gâvres, 3.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* (39 données)

Un site, en dehors du Golfe, retient plusieurs dizaines de garrots : la rivière d'Etel.

Dates	15/11	13/12	10/01	21/02	21/03
Effectif	0	8	63	24	1

Garrot à œil d'or dans la rivière d'Etel (Morbihan) ; novembre 1998 - mars 1999

WETLANDS INTERNATIONAL : 770 dont 705 dans le Golfe du Morbihan.

Harle piette *Mergus albellus* (2 données)

1 à l'étang du Ter / Ploemeur, le 24/01/1999, peut-être la même femelle la veille à Riantec.

Harle huppé *Mergus serrator* (43 données)

Tout au long de la période, sur toute la côte : rivière d'Etel, 33 le 10/01/1999, 36 à Pénérif le 27/02.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 729 dont 1 530 dans le Golfe.

AR VRAN MORBIHAN N°18

Groupe n°2 Des rapaces aux rallidés

Choix et rédaction établis par Franz Urvoaz

Milan noir *Milvus migrans*

(2 données)

1 donnée très précoce le 21/02/1999 à l'étang de Saint-Jean / Locoal Mendon.

La seconde donnée date du 06/03/99 au bourg de Plouharnel.

Milan royal *Milvus milvus*

(2 données)

Les 2 observations ont été réalisées le même jour sur la commune de Le Tour du Parc le 22/11/1998 et il est fort probable qu'il s'agisse d'un seul et même individu.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

(17 données)

Aucune observation n'est faite en dehors des zones littorales. A noter 5 juvéniles le 25/12/98 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

(15 données)

Espèce erratique durant la période hivernale. 6 données pour les communes de l'intérieur du département (Sérént , Guégon et Loyat).

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

(2 données)

Les 2 observations sont faites au Grand Loc'h / Guidel fin janvier et fin février. Dans le premier cas, il s'agit d'une femelle ou d'un immature.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

(9 données)

Observations régulières, y compris en ville (Sarzeau et Vannes). A noter que certains individus visitent assidûment les mangeoires disposées pour les mésanges et autres granivores.

Buse variable *Buteo buteo*

(7 données)

Observations peu nombreuses eu égard à une espèce relativement commune.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

(5 données)

Même remarque que pour l'espèce précédente.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

(5 données)

Toutes les observations ont été faites en décembre et janvier, dans des communes littorales à l'exception de celle effectuée sur la commune de Augan le 28/01/1999.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (3 données)
Observations notées au Duer/ Sarzeau en novembre et décembre.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* (1 donnée)

Râle d'eau *Rallus aquaticus* (2 données)
Dans les deux cas les oiseaux sont notés sur l'étang de Lannénec/ Ploemeur.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus* (6 données)
Les regroupements les plus notables sont observés à la Grande mare/ Priziac le 21/11/1998 (6 individus) et à la Saline/ Vannes le 22/11/98 (9 individus).

Foulque macroule *Fulca atra* (54 données)
Rassemblements remarquables:

- Maximum recensé à Quélisoye/ Larmor-Plage : 1 456 individus le 22/11/1998 ; le 22/12/98 au même endroit, 1 365 foulques sont comptabilisées. Par la suite, le nombre d'oiseaux continue à diminuer. Le dernier comptage effectué le 22/02/99 se monte à 382 individus.
- Lors des opérations concertées du G.O.B. sur la rivière d'Etel, 1 394 individus sont notés le 13/12/98, 1475 individus le 10/01/99, et 481 le 21/02/99. L'étang de Saint-Jean / Locoal Mendon accueille environ 1 000 individus le 17/01/99.
- Sur l'étang de Toulvern / Baden, 350 foulques le 29/11/98, 440 le 06/02/99 et encore 250 le 06/03/99.
- L'étang au duc/ Ploërmel atteint son pic le 02/01/99 avec 249 individus sur un étang en crue.

AR VRAN MORBIHAN N°18

Groupe n°3 De l'Huîtrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Guillaume Evanno

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

(26 données)

121 le 04/01/1999 sur l'île des Souris / Port Louis, 132 dans la baie de Pont-Mahé / Pénestin le 23/01/99.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

(9 données)

Comme l'an passé l'échasse blanche a hiverné à Pen Mané / Locmiquélic (AR VRAN 9:2 et AR VRAN MORBIHAN N°17). Un individu est noté à partir du 04/10/98 puis est rejoint par un second le 09/01. Ces 2 adultes seront observés jusqu'au 15/03/1999.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(21 données)

Les plus gros effectifs sont notés en rivière de Pénérf : 650 à Pentès / Surzur le 28/11/1998 puis 893 le 17/01/99. 182 à la pointe du Moustoir / Biliers le 23/01/99. L'avocette est également présente de novembre à décembre en rade de Lorient : maximum de 12 oiseaux au Rohu / Lanester le 05/12/98. Le suivi régulier de la rivière d'Etel (opération concertée G.O.B.) n'a permis de déceler que 3 et 4 individus respectivement en décembre et janvier.

Oedicnème criard *Burhinus oedichenus*

(1 données)

Première donnée le 13/03/1999 d'un individu à Kerminihy / Erdevén.

Grand gravelot *Charadrius hiaticula*

(14 données)

Maximum de 304 oiseaux le 29/11/1998 en Petite Mer de Gâvres. 267 le 13/12/98 en rivière d'Etel (opération concertée G.O.B.).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*


(2 données)

1 sur la plage du Magouëro / Plouhinec le 28/02/1999 et 10 à la pointe du Conguel / Quiberon le 13/03/99.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

(41 données)

On retiendra aussi au moins 600 individus à Boderhaff / Le Tour du Parc le 28/11/1998 et 770 à la Pointe / Guégon le 01/12/98.



Dénombrements des Pluviers dorés au Grand Loc'h / Guidel (Morbihan) ; octobre 1998 - février 1999


Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

(15 données)

Maximum de 924 à Linès / Plouhinec le 26/12/1998. 831 en Petite Mer de Gâvres le 29/11/98 et 518 en rivière d'Etel le 10/01/98 (opération concertée G.O.B.).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

(47 données)



Dénombrements de Vanneaux huppés au Grand Loc'h / Guidel (Morbihan) ; octobre 1998 - février 1999

Sur le littoral, en dehors de Guidel, maxima de 1 200 à Boderhaff / Le Tour du Parc le 05/02/1999, 1030 en Petite Mer de Gâvres le 12/12/98 et 415 en rivière d'Etel le 10/01/99 (opération concertée G.O.B.). A l'intérieur du département : 892 à Bocneuf la Rivière / Lanouée le 02/12/98, 600 à Guernéhué / Biliers le 03/12/98 et 805 au Pas aux Biches / Les Forges le 10/12/98.

Bécasseau maubèche *Calidris*

(4 données)

2 à Banastère / Sarzeau le 22/11/1998, 25 à la pointe du Moustoir / Billiers le 23/01/1999, 216 dont un albinos au Duer / Sarzeau le 25/02/99 et 30 à Pen er Lé / Plouharnel le 13/03/99.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

(7 données)

Les plus grands rassemblements sont observés en presqu'île de Quiberon : 2000 à Penthievre le 01/01/1999, 420 à Portivy le 24/02/99.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(10 données)

L'espèce est notée sur les sites habituels : maxima de 18 à Portivy / Saint Pierre Quiberon le 31/12/1998 et 21 à Kerpape / Ploemeur le 15/02/1999.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(20 données)

Entre 4 000 et 5 000 en Petite Mer de Gâvres le 29/11/1998, 5 133 en rivière d'Etel le 10/01/99 (opération concertée G.O.B.). Autres comptages : le 23/01/99, 1 300 en baie de Pont-Mahé / Pénestin, 1 250 sur la plage du Bronzais / Penestin, 1 100 à la pointe du Moustoir / Billiers et 1 200 dans le port de Billiers ; le 07/02/99, 1 300 entre Berringue et Nestadio / Plouhinec.

Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus*

(4 données)

2 oiseaux à Castel-Pencadénic / Le Tour du Parc le 22/11/1998. Régulier depuis quelques années, l'hivernage d'un individu à la tourbière de Kerfontaine / Sérent est constaté en décembre 98 et janvier 99.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

(12 données)

Peu de données et effectifs faibles : 9 à Pen Mané / Locmiquélic le 11/12/1998, 8 à Banastère / Sarzeau le 23/02/1999.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

(5 donnée)

Toutes les données concernent des individus isolés mais on retiendra celles d'un oiseau au centre ville de Vannes les 07/12/1998 et 08/01/1999.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

(9 données)

En novembre, 114 à Pen en Toul / Larmor baden. En décembre, 270 à Bénance / Sarzeau. Le passage pré-nuptial s'observe à Pen en Toul : 50 le 20/02/1999, et à Boderhaff / Le Tour du Parc : 40 le 21/02/99.

Barge rousse *Limosa lapponica*

(6 données)

248 à Pencadénic / Le Tour du Parc le 14/01/1999, 10 à Pen er Lé / Plouharnel le 13/03/99.

Courlis cendré *Numenius arquata*

(30 données)

304 en rivière d'Étel le 10/01/1999 (opération concertée G.O.B.). Un individu albinos est une nouvelle fois observé en rivière de Pénerf, du 27/11/1998 au 05/02/99.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

(8 données)

Des individus isolés ou par paires sont notés de novembre à janvier dans le Golfe du Morbihan et en rivière de Pénerf. Un oiseau est présent à Pen Mané / Locmiquélic les 23/01/1999 et 10/02/99, 9 à Pen en Toul / Larmor baden le 20/02/99.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

(39 données)

La rivière d'Étel accueille 97 individus le 10/01/1999 (opération concertée G.O.B.). Les autres gros effectifs ont été dénombrés à Pen en Toul / Larmor baden : 74 le 29/11/1998, à Pentès / Surzur : 80 le 07/12/98, à Bénance / Sarzeau : 65 le 04/01/99 et au Bill / Damgan : 77 le 31/01/99.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

(6 données)

8 sont vus les 13/12/1998 et 10/01/1999 en rivière d'Étel (opération concertée G.O.B.). 18 à Pen en Toul / Larmor-Baden le 20/02/99.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

(3 données)

Très peu de données et ne concernant que des oiseaux isolés dans le Golfe du Morbihan et en rivière de Pénerf.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

(10 données)

La majorité des observations proviennent de la rade de Lorient et de la rivière d'Étel (oiseaux isolés le plus souvent).

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres*

(13 données)

Maximum de 250 le 05/12/1998 en Petite Mer de Gâvres. 150 à Penthièvre / Saint Pierre Quiberon le 01/01/1999 et 155 à Portivy / Saint Pierre Quiberon le 24/02/99.

AR VRAN MORBIHAN N°18

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Jean-Luc Lemonnier.

Cette chronique couvrant les observations rassemblées entre le 16/11/1998 et le 15/03/1999 est rédigée sur une base de données extrêmement réduite : seules 104 informations nous sont parvenues pour ce groupe d'espèces contre 299 pour l'hiver précédent (*Ar Vran Morbihan n°16*).

Stercorariidae sp.

(aucune donnée)

Laridae sp.

(3 données)

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

(2 données)

2 adultes et un individu de deuxième hiver le 22/11/1998 à Portivy / Saint-Pierre Quiberon,

1 adulte en plumage nuptial le 11/02/1999 à l'étang de Lannénec / Ploemeur.

Mouette pygmée *Larus minutus*

(1 donnée)

1 le 03/12/1998 à Guernéhué / Billiers.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(28 données)

Parmi ces données éparées, citons trois rassemblements de quelque importance :

- un rassemblement crépusculaire de 2 000 individus le 16/11/1998 à Lomener / Ploemeur,
- 800 minimum s'alimentent le 13/01/1999 sur le golf de Kerham / Ploemeur,
- 1 200 individus (s'agissait-il d'un dortoir ?) le 19/02/1999 à l'étang au Duc / Ploërmel.

Des comptages diurnes effectués sur l'estuaire de la Vilaine (un recensement) et en ria d'Etel (3 recensements) illustrent par la faiblesse relative des effectifs ainsi enregistrés la grande dispersion diurne de cette espèce, notamment vers l'intérieur des terres. Ces flux quotidiens mériteraient une étude spécifique. Voici les chiffres de ces quatre opérations :

- estuaire de la Vilaine (de Billiers à Pénestin) : 210 le 23/01/1999,
- ria d'Etel : 1 017 le 13/12/1998, 1 007 le 10/01/1999 et 671 le 21/02/1999.

Signalons encore un individu achrome (tête, sus-alaires et dos blancs) présent le 06/12/1998 à Portivy / Saint-Pierre Quiberon et « reconnu » le 23/01/1999 en baie de Plouharnel.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

(4 données)

Ces données concernent le même oiseau noté du 06/01 au 19/03/1999 à l'étang du Ter / Ploemeur. Ce site accueille cette espèce pour le sixième hivernage consécutif.

Goéland cendré *Larus canus*

(13 données)

Diverses opérations de comptage en ria d'Etel révèlent de fortes disparités d'effectifs à imputer sans doute partiellement au temps dont ont pu disposer les divers observateurs pour détailler les bandes de laridés :

13/12/1998	6	ensemble de la ria
10/01/1999	1	ensemble de la ria
07/02/1999	74	Plouhinec et Sainte-Hélène seulement
21/02/1999	50	ensemble de la ria

Goéland cendré dans la rivière d'Etel (Morbihan) ; hiver 1998 – 1999

Le 25/12/1998, un vent de sud-ouest semble être la cause d'un important rassemblement de laridés à Quélisoye / Larmor-Plage : parmi les 1 800 laridés alors dénombrés figuraient 14 Goélands cendrés (13 étaient toujours présents le lendemain).

On notera enfin la présence de 41 individus le 28/02/1999 à Tréhervé / Ambon.

Goéland brun *Larus fuscus*

(13 données)

Des comptages concertés ou ponctuels en ria d'Etel confirment le fort attachement de cette espèce à ce site en dehors de la période de reproduction (cf *Ar Vran Morbihan* n°17) :

13/12/1998	190	ensemble de la ria
10/01/1999	233	ensemble de la ria
17/01/1999	100	le Néguan / Locoal-Mendon seulement
21/02/1999	54	ensemble de la ria

Goéland brun dans la rivière d'Etel (Morbihan) ; hiver 1998 – 1999

D'autres sites accueillent des rassemblements d'importance :

- 67 individus le 22/11/1998 à la pointe de Bégüero / Le Tour du Parc (effectif supérieur aux résultats des opérations concertées menées sur ce site l'hiver précédent),
- 160 le 25/12/1998 à Quélisoye / Larmor-Plage à l'occasion de vent de sud-ouest,
- 75 le 19/02/1999 à l'étang au Duc / Ploërmel, seule mention non littorale.

Goéland argenté *Larus argentatus*

(18 données)

Outre le rassemblement de 400 individus dans le port de commerce de Lorient et de 300 à Quélisoye / Larmor-Plage le 25/12/1998 à l'occasion de vent de sud-ouest, on retiendra parmi ces données un comptage diurne effectué le 23/01/1998 sur l'estuaire de la Vilaine (de Billiers à Pénestin) totalisant 2 220 Goélands argentés, chiffre à rapprocher des 210 Mouettes rieuses recensées au cours de ce même comptage.

Goéland marin *Larus marinus*

(3 données)

Mentionnons les 45 individus présents à Quélisoye / Larmor-Plage le 25/12/1998 à l'occasion de vent de sud-ouest

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(14 données)

Au cours de cette période, les observations se répartissent ainsi :

	nombre de données	nombre cumulé d'individus
novembre (16 à 30/11)	2	3
décembre	3	5
janvier	1	9
février	7	75
mars (1 ^{er} à 15/03)	1	7

Présence hivernale 1998- 1999 de la Sterne caugek dans le Morbihan

Guifette noire *Chlidonias nige*

(1 donnée)

Un individu est observé le 19/02/1999 à l'étang au Duc / Ploërmel ; la dernière mention hivernale de cette espèce en Morbihan datait du 29/01/1995 à Noyal (Ar Vran Morbihan n°10/11).

Guillemot de Troil *Uria aalge*

(2 données)

Un total de trois individus échoués dont deux mazoutés, sur le littoral d'Erdeven en janvier et février 1999... Les années se suivront mais ne se ressembleront malheureusement pas !

Mergule nain *Alle alle*

(2 données)

Un individu, le 03/01/1999 à Saint-Pierre Quiberon et un autre le 09/01/99 à l'île Tilic / Quiberon ajoutent aux rares mentions morbihannaises de l'espèce.

AR VRAN MORBIHAN N°18

Groupe n°5 - Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick PHILIPPON

Effraie des clochers *Tyto alba*

(4 données)

2 données concernant des collisions avec des véhicules (Plouhinec et Baud) fin janvier, début février. Notée à Lizio (17/12/1998) et Sarzeau (29/01/1999).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua*

(2 données)

Entendue seulement le 15/03/1999 en deux endroits à Ploemeur: Cruguellic et Kervinio

Chouette hulotte *Strix aluco*

(6 données)

Différents chanteurs pendant la période à Saint-Avé, Ploemeur, Carentoir, Baud

Hibou des marais *Asio flammeus*

(1 donnée)

1 individu vu les 21 et 22/11/1998 autour de la Petite Mer / Gâvres.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(15 données)

La moitié des données provient de la côte, entre le 22 et le 29/11/1998 (Saint Armel, Le Tour du Parc, Sarzeau, Baden, Ploemeur). Hivernage constaté sur les mêmes sites ainsi qu'à l'étang de Saint Jean / Locoal-Mendon.

Pic vert *Picus viridis*

(2 données)

Noté en presqu'île de Rhuys (Sarzeau) et Carentoir.

Pic noir *Dryocopus martius*

(2 données)

2 seules données ! ? Forêt de Lanouée / Les Forges le 29/01/1999 et Lann Blad / Locoal-Mendon le 23/02.

Pic épeiche *Dendrocopos major*

(1 donnée)

Pic mar *Dendrocops medius*

(1 donnée)

2 couples le 01/02/1999 en forêt de Lanouée / Les Forges.

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

(1 donnée)

Cochevis huppé *Galerida cristata* (2 données)

1 individu les 24/12/1998 et 12/02/1999 au port de commerce à Lorient.

Alouette lulu *Lullula arborea* (1 donnée)

1 individu le 31/01/1999 dans le camp de Coëtquidan / Campénéac.

Alouette des champs *Alauda arvensis* (4 données)

385 oiseaux en 4 bandes sur les sites de Loyat, Guilliers et Guégon le 22/11/1998. A la Pointe / Guégon, 250 le 01/12/98 et plus de 300 le 20/12/98 à Kergoledec / Guidel.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (1 donnée)

Première donnée du retour printannier: plus de 12 le 21/03/1999 à l'étang de Lannénec / Ploemeur

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (1 donnée)

Le 11/12/1999 3 individus à Pen Mané / Locmiquélic

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (10 données)

En novembre : 2 le 21/11/1998 à Josselin et 2 le 23/11 à Le Duer / Sarzeau. L'hivernage est noté à Le Duer / Sarzeau avec 1 individu du 24/12/98 au 11/02/99.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (21 données)

Les sites d'hivernage sont fréquentés de jour dès le 19/09/1998 : 14 à Ménimur / Vannes.

	22/10	25/10	27/10	06/11	16/12	15/01	16/02
B. grises	300 - 400	530	590	850	1 150 - 1 300	1 150 - 1 300	0
Dont Yarell	?	62	70	80	120 - 130	120 - 130	0

Présence de bergeronnettes grises au dortoir du Centre de tri postal - hôpital à Vannes (Morbihan) ; hiver 1998-99

Les oiseaux occupent les arbres situés sur et autour du giratoire éclairé Hôpital-Centre de tri. Arbres en feuille jusqu'au début décembre. Oiseaux en perpétuel mouvement, difficiles à compter

A Lorient, un dortoir existe encore le 03/03/1999 avec 200 oiseaux environ, situé à...l'hôpital Bodélio!

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (6 données)

Le passage est noté dans la dernière décade de novembre : 5 le 22/11/1998 à la pointe du Percho / SaintPierre-Quiberon et 1 le même jour, dans des chaumes, à la Ville Jehan / Lanouée.

1 mâle à larges taches alaires est vu à Kerzine / Plouhinec le 30/01/1999.

Tarier pâtre *Saxicola torquata*

(1 donnée)

3 le 30/01/1999 à Saint-Jude / Ploemeur.

Merle noir *Turdus merula*

(2 données)

Grive litorne *Turdus pilaris*

(6 données)

Première donnée le 16/11/1998 en bordure de côte aux Sables Blancs / Plouharnel. L'est du département (Mauron, Saint-Léry, Tréhorenteuc) fournit ensuite des données en nombre: 7 le 24/11, 50 le 1/12, 90 le 17/12. Enfin 80 le 07/03/1999 à Périou / Sérent traduisent la remontée prénuptiale.

Grive musicienne *Turdus philomelos*

(1 donnée)

120 en migration vers le nord-ouest le 04/02/1999 à Mané Kload / Caudan.

Grive mauvis *Turdus iliacus*

(6 données)

Les stationnements apparaissent en ce milieu de novembre: 150 à la Ville Gleuhuel / Guegon le 18/11/1998, 55 le 24/11 dans les pâtures autour du bourg de Saint Malo des Trois Fontaines. En décembre, dans la région de Mauron, Saint-Léry, Tréhorenteuc, 30 à 45 individus sont comptabilisés entre le 1 et le 17/12.

Plus aucune donnée ensuite.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

(2 données)

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

(1 donnée)

1 le 11/03/1999 à Pont Neuf / Le Tour du Parc.

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

(2 données)

1 le 31/01/1999 dans le camp de Coëtquidan / Campénéac et 1 le 31/03 à Cruguellic / Ploemeur.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

(1 donnée)

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

(3 données)

3 données de mars: 1 chanteur le 11/03/1999 au moulin du Stang / Plouay et 2 individus le 15/03 en 2 endroits de Ploemeur (Goh Vilin, Kerbrient).

Roitelet huppé *Regulus regulus*

(2 données)

1 le 23/11/1998 à Rugdual / Quéven et 3 chanteurs le 11/03/1999 au moulin du Stang / Plouay.

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapillus*

(1 donnée)

1 le 11/03/1999 au moulin du Stang / Plouay.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

(3 données)

Pen Mané / Locmiquelic apporte les données de la période: 8 le 28/11/1998, 3 le 05/12/98 (dont une femelle baguée) et 2 le 30/12/98.

Mésange à longue-queue *Aegithalos caudatus*

(2 données)

Elaboration d'un nid le 12/03/1999 au Duer / Sarzeau.

Mésange nonnette *Parus palustris*

(1 donnée)

3 le 11/03/1999 au moulin du Stang / Plouay.

Sittelle torchepot *Sitta europea*

(1 donnée)

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

(2 données)

Noté le 4/12/1998 à Rugdual / Quéven et le 11/03/1999 au moulin du Stang / Plouay.

Geai des chênes *Garrulus glandarius* (1 donnée) , **Pie Bavarde *Pica pica*** (1 donnée).**Choucas des tours *Corvus monedula***

(8 données)

Le 29/11/1998, 22 en vol est-ouest au dessus des marais de Pen en Toul / Larmor Baden. Des groupes pendant toute la période à Sarzeau (5 le 12/01/1999), à Plouay (22 le 13/01), 37 le 24/01 à Ploemeur, 55 le 20/02 dans le château de Suscinio.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

(1 donnée)

3 le 20/11/1998 dans le bourg de Guegon.

Corneille noire *Corvus corone*

(1 donnée)

65 le 26/01/1999 à Périot / Sérent.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

(1 donnée)

Plus de 1 500 le 25/11/1998 au Grand Loc'h à Guidel.

Moineau friquet *Passer montanus*

(3 données)

Lizio et Saint Servant sur Oust sont les 2 sites où la fréquentation est relevée. 6 le 21/12/1998 à La Ville Leho / Saint Servant et 2 dans le bourg de Lizio.

- Fringilles** (1 donnée)
600 en bandes dans le bourg de La Grée Saint- Laurent le 16/12/1998 (Pinson des arbres, du Nord, Chardonnerets, Verdiers).
- Pinson du nord *Fringilla montifringilla*** (2 données)
100 le 16/12/98 dans le bourg de La Grée Saint- Laurent.
1 le 17/01/1999 à la Lande de Prassun / Plumelec.
- Serin cini *Serinus serinus*** (1 donnée)
Premier chanteur le 25/02/1999 à Lomener / Ploemeur.
- Verdier d'Europe *Carduelis chloris*** (1 donnée)
150 le 16/12/1998 dans le bourg de La Grée Saint- Laurent.
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*** (2 données)
350 le 16/12/1998 dans le bourg de La Grée Saint- Laurent.
- Tarin des aulnes *Carduelis spinus*** (2 données)
1 tué par véhicule le 23/02/1999 sur la RN 165 à hauteur d'Elven
7 en vol à la tourbière de Sérent le 16/03/99
- Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*** (1 donnée)
200 à 250 le 18/11/1998 à l'étang au Duc à Ploermel.
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*** (2 données)
Noté à Rugdual / Quéven.
- Grosbec casse-novaux *Coccothraustes coccothraustes*** (1 donnée)
7 le 17/12/1998 dans le bourg de Néant sur Yvel.
- Bruant jaune *Emberiza citrinella*** (3 données)
Hivernage d'une bande de 50 individus au Pont Neuf / Le Tour du Parc.
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*** (1 donnée)
- Bruant proyer *Emberiza calandra*** (1 donnée)
23 posés sur un fil le 09/12/1998 au Grand Loc'h en Guidel.

ACTIVITES DU G.O.B. MORBIHAN


NIDIFICATION DU GREBE HUPPE *Podiceps cristatus* DANS LE MORBIHAN EN 1998

Au printemps 1998 - sur une idée de G. Gélinaud -, les observateurs du G.O.B. sont invités à rechercher les couples de Grèbe huppé nicheurs dans le département du Morbihan.

En effet, la simple comparaison des cartes I & II, correspondant respectivement aux enquêtes menées en 1970-75 (Guermeur & Monnat, 1980) et 1980-85 (G.O.B., 1997) révèle une forte pénétration vers l'ouest de la population nicheuse de Grèbe huppé en une décennie. Qu'en est-il aujourd'hui de cette évolution, presque trente ans après la première installation d'un nid de Grèbe huppé sur l'étang de Noyal (Guermeur & Monnat, 1980) ?


Carte I - Distribution des Grèbes huppés nicheurs, Bretagne, 1970-75 (Guermeur & Monnat, 1980).

○ nidification possible ⊙ nidification probable ● nidification certaine



Carte II - Distribution des Grèbes huppés nicheurs, Bretagne, 1980-85 (G.O.B., 1997)

● nidification possible ○ nidification probable ● nidification certaine



I) Présentation des résultats de l'enquête.

Le cadre protocolaire de cette enquête est resté souple : il est seulement demandé aux observateurs deux passages par site si possible, sans négliger les sites potentiels où aucune reproduction n'a été enregistrée jusqu'alors. Notons que des comportements nuptiaux sont notés sur les plans d'eau morbihannais dès le mois de février et qu'en cas de succès de la reproduction, les jeunes peuvent être visibles sur leur site d'origine jusqu'en octobre (Lemonnier, 1998).


Il convient d'ajouter à ce tableau que des sites (peu nombreux) n'ont pas été visités en 1998, alors que des données de présence de l'espèce y avaient été préalablement mentionnés : mortier de Glénac, étang de Loperhet / Erdeven (un couple en 1993).

De 33 à 35 couples nicheurs de Grèbe huppé sont recensés dans le Morbihan en 1998. Mais force est de constater qu'en l'absence de données chiffrées accompagnant les cartes des deux atlas, il est difficile de quantifier l'évolution en nombre de couples de la population nicheuse morbihannaise. C'est pourquoi il convient de cartographier les informations de l'enquête 1998 sur une trame identique à celle utilisée en 1980-85 (10 km x 10 km, U.T.M.) (Carte III).

Tableau 1 - Sites morbihannais ayant accueilli la reproduction du Grèbe huppé en 1998.

site	commune(s)	effectif nicheur en nombre de couples
étang au Duc	Ploërmel & Taupont	13 - 15
étang de Noyalo	Noyalo & Theix	5
étang de Coët-Rivas	Kervignac	3
étang Saint-Jean	Locoal-Mendon	2
étang de Bel-Air	Priziac	2
étang du Cranic	Brec'h	2
le Stum	Saint-Barthélémy	1
étang des Salles	Sainte-Brigitte & Perret (22)	1
étang de Pont-Calleck	Berné	1
étang de Château-Tro	Guilliers	1
étang du Grand Gournava	Pleucadeuc & Molac	1
étang de Vaulaurent	Saint-Martin s/ Oust	1
étang du Beauché	Carentoir	0
sablières de la Lande	Saint-Marcel	0
étang de Rhodes	Merlevenez	0
	Langonnet	0
étang de Lannénec	Ploemeur	0
Randrécart	Treffléan	0
TOTAL		33 - 35 COUPLES


Carte III - Distribution des Grèbes huppés nicheurs, Morbihan, 1998.



II) Comparaison des distributions établies en 1980-85 et 1998 et hypothèses d'évolution de la population nicheuse.

Afin de mettre en lumière une éventuelle modification de la population nicheuse du Grèbe huppé en Morbihan, les indices de l'enquête de terrain de 1980-85 ont été cumulés aux données obtenues en 1998 sans qu'il soit fait de distinction entre les indices de nidification probable et certaine (Carte IV). On distinguera sur le quadrillage ainsi obtenu trois catégories de cartes : celles où l'espèce a niché lors des deux enquêtes, celles où l'espèce notée entre 1980 et 1985 n'est plus notée en 1998, et les « nouvelles » cartes où le Grèbe huppé apparaît nicheur en 1998 alors qu'il en était absent entre 1980 et 1985.

Carte IV - Distribution des Grèbes huppés nicheurs, Morbihan, 1980-85 et 1998.



Voici par carte quelques détails, dont le succès de reproduction en 1998 (s'il est connu) :

● nicheur en 1980-85 et en 1998 :

- **I16** : en plus de l'étang des Salles / Sainte-Brigitte, une partie du lac de Guerlédan figure sur cette carte ; c'est pourtant le plus petit de ces plans d'eau qui accueille la reproduction du Grèbe huppé, B. Iliou (1999) soulignant qu'à Guerlédan « au regard de la superficie, la présence de cette espèce est insignifiante ».
- **J13** : l'étang à retenir sur cette carte est Bel-Air / Priziac, où deux couples ne produisent aucun jeune en 1998 ; l'étang de Langanet accueille occasionnellement l'espèce en pêche.
- **M15** : Coët-Rivas / Kervignac où, en 1998, trois couples ne produisent aucun jeune.

- **M22** : étang de Vaulaurent / Saint-Martin sur Oust.
- **N16** : deux sites importants sur cette carte : le Cranic / Brec'h sur les rives duquel est pourtant implanté un élevage de visons et l'étang Saint-Jean / Locoal-Mendon.
- **N21** : l'indice de 1998 provient du Grand Gournava / Pleucadeuc ; qu'en est-il de l'étang de Rochefort-en-Terre qui accueillait un couple en 1992 ?
- **O19** : étang de Noyalo ; le 13/09/1998, 15 juvéniles et 16 adultes y sont recensés sans qu'il soit permis d'en déduire l'origine exacte.

⊙ **nicheur en 1980-85, non noté en 1998**

- **M17** : étang de la Forêt / Brandivy.
- **M23** : sans doute le Moulin du Val / Carentoir où deux couples sont également notés nicheurs au printemps 1992.
- **N13** : bien que des individus y compris juvéniles aient été observés sur l'étang de Lannénec / Ploemeur en 1998, il n'y a pas eu alors reproduction sur ce site.
- **N15** : étang de Rhodes / Nostang.
- **N23** : mortier de Glénac, val d'Oust, non prospecté en 1998.
- **P23** : sans doute l'étang du Rocher / Saint-Dolay, non prospecté en 1998.
- **R15** : Belle-Île, non prospectée en 1998, mais Gw. Dérian (1999) rappelle qu'« on ne l'y trouve plus ».

○ **non noté en 1980-85, nicheur en 1998.**

- **J21** : Château-Tro / Guilliers et *a fortiori* l'étang au Duc / Ploërmel (carte K21) ont ceci de surprenant que l'on pouvait y attendre une nidification du Grèbe huppé dès les années 80 de par leur proximité des foyers de Haute-Bretagne.
- **K14** : étang de Pont-Calleck : un couple ne peut mener à bien une ponte de trois oeufs.
- **K21** : étang au Duc / Ploërmel ; le très fort nombre de couples de 1998 est peut-être à mettre en rapport avec des effectifs hivernants exceptionnels dépassant la centaine d'individus en décembre 1997 ; en effet de 1995 à 1997 seuls 5 à 6 couples étaient recensés sur cet étang.
- **L16** : le Stum / Saint-Barthélémy : échec du couple installé.

Nous avons déjà mentionné l'absence de décompte lors des enquêtes précédentes. Cependant nous pouvons constater que sept cartes ayant accueilli la reproduction de l'espèce sur la période 1980-85 n'ont pas fourni d'indice en 1998 dont seulement deux par défaut de prospection ; d'autre part quatre nouvelles cartes compensent en partie ces absences. Dans ces conditions, il semble bien que l'on ne puisse plus parler d'expansion du Grèbe huppé en tant que nicheur dans le Morbihan.

En terme d'effectifs, la population morbihannaise pourrait avoir subi une **légère augmentation depuis vingt ans** comme pourrait l'indiquer la découverte d'une forte population reproductrice sur l'étang au Duc / Ploërmel mais il paraît peu probable que ce foyer se maintienne à ce niveau brutalement atteint. On peut encore illustrer la **précarité de cet effectif morbihannais par les échecs de strictement toutes les reproductions ayant fait l'objet d'un suivi au cours de cette enquête 1998. !**

Coordination : Jean-Luc LEMONNIER.

DERIAN (Gw.) 1999. – Un point sur l'avifaune terrestre des îles bretonnes de Ouessant à Hoëdic entre 1970 et 1999. *Ar Vran*, G.O.B. 10.2

GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON 1997. – Les oiseaux nicheurs de Bretagne 1980 - 1985, Brest, 292 p.

GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON 1990 - 1997. – *Ar Vran Morbihan* n°1 à 17.

GUERMEUR (Y.) & MONNAT (J.-Y) 1980. – Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne. S.E.P.N.B. - C.O.B., Brest, 240 p.

LEMONNIER (F. & J.-L.) 1998. – Chronologie d'une reproduction de Grèbe huppé *Podiceps cristatus* aux étangs de Saint-Adrien / Saint-Barthélémy. *Ar Vran*, G.O.B. 14

ILIOU (B.) 1999. – Contribution à la connaissance de l'avifaune du lac de Guerlédan, synthèse bibliographique des observations réalisées entre 1980 et 1998, G.O.B.

SEJOURS SUR HOËDIC, OCTOBRE 1999

Cet automne à nouveau, Edig a vu débarquer des continentaux équipés de sacs et duvets, casquettes ou bonnets, longue-vues plus ou moins étanches, jumelles et guides de toute sorte. Deux fins de semaine consécutives, les uns ou les autres, nous avons pris le courrier des îles et rejoint le port d'Argol. Cette année, les conditions étaient un peu différentes, dans la mesure où l'hébergement a été possible dans un bâtiment aménagé par une association, l'APASE, ce qui nous a permis de trouver un peu de sec. Et il en était bien besoin, qu'on en juge plutôt...

22 octobre au soir à 24 octobre 1999 : après plusieurs jours de vents d'est qui ont apporté sur la côte des vols de passereaux (pouillots et Bruants des neiges observés sur la presqu'île de Quiberon) les dépressions atlantiques apportent un radoucissement et avec lui du vent et de la pluie. Samedi et dimanche, belles éclaircies et grains se succèdent avec une embellie le 24/10.

La semaine est calme, la traversée se fait sans encombre le 29 octobre mais le temps toujours doux est humide, les averses bouchent la visibilité.

Passereaux : Les passages se sont apparemment déroulés hors de nos séjours, les bandes de pouillots et de fringilles sont réduites. Les Pouillots véloces sont encore assez abondants dans les cyprès du bourg les 23 et 24 octobre, toujours présents ils sont cependant beaucoup moins nombreux la semaine suivante.

Si le 29 au soir de nombreux rougegorges et Rougeques noirs hantent le bourg, le lendemain ils ont presque totalement disparu.

Quelques observations marquantes ont été réalisées : un Torcol fourmillier sur la pointe de Beg Lagad, un Roitelet à triple bandeau dans les jardins et dans la carrière à l'est de l'île. Dans les jardins, minutieusement inspectés, aperçu un court instant en vol entre deux haies puis dans un tamaris, un Gobemouche nain hisse Hoëdic à la hauteur de sa réputation.

On a aussi remarqué quelques Grives mauvis et Tarins des aulnes, comme des annonciateurs des hivernants, mais ils s'en vont...

Guet à la mer : il a été pratiqué à partir des deux ports et des pointes de Beg Lagad et du Vieux Château, sans grand résultat. Quelques fous et Puffins des anglais, un Plongeon imbrin automnal et, quand même, deux espèces d'océanites ; 1 O. tempête et 1 O. culblanc. Deux Grands Labbes traversent l'île le 31/10 quand nous cherchons les hiboux !

10 Océanites sont observés pendant la traversée de retour le 23/10.

Rapaces : outre les sédentaires supposés que sont les Busards des roseaux, Faucons crécerelles et Epervier d'Europe, un Faucon émerillon chasse d'un bout à l'autre de l'île. Un maximum de trois Hiboux des marais est trouvé sur Beg Lagad, tapis dans la lande herbeuse.

Autres espèces : peu de limicoles, si ce n'est une centaine d'Huitriers pies et une Bécasse des bois.

Liste des espèces observées lors des séjours d'octobre 1999 du G.O.B.

plongeon sp	Tournepie à collier	Grive musicienne
Plongeon imbrin	Grand Labbe	Grive mauvis
Puffin des anglais	Mouette rieuse	Bouscarle de Cetti
Océanite tempête	Goéland cendré	Cisticole des joncs
Océanite culblanc	Goéland brun	Fauvette pitchou
Fou de Bassan	Goéland argenté	Fauvette à tête noire
Grand Cormoran	Goéland marin	Pouillot véloce
Cormoran huppé	Mouette tridactyle	Pouillot fitis
Aigrette garzette	Sterne caugek	Roitelet huppé
Héron cendré	Pigeon ramier	Roitelet à triple bandeau
Canard colvert	Hibou des marais	Gobemouche rain
Eider à duvet	Martin-pêcheur d'Europe	Pie bavarde
Harle huppé	Torcol fourmillier	Corneille noire
Busard des roseaux	Alouette des champs	Etourneau sansonnet
Epervier d'Europe	Pipit farlouse	Moineau domestique
Faucon crécerelle	Pipit maritime	Pinson des arbres
Faucon émerillon	Bergeronnette grise	Verdier d'Europe
Râle d'eau	Troglodyte mignon	Chardonneret élégant
Gallinule poule d'eau	Accenteur mouchet	Tarin des aulnes
Huitrier pie	Rougegorge familier	Linotte mélodieuse
Grand Gravelot	Rougequeue noir	
Bécassine des marais	Tarier pâtre	
Bécasse des bois	Traquet moteux	
Courlis cendré	Merle noir	

Participants aux séjours d'octobre 1999 : Jacques Corbière, Erwan Crochet, Xavier Cucherat, Gwénaél Dérian, Nathalie Derout, Guillaume Evanno, Andréa Le Gal, Muriel Palpant, Emmanuel Parmentier, François Urvoaz.

Coordination : Gwénaél DERIAN

