

AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

Ti ar Vro B.P. 103

29833 CARHAIX cedex


Tél. 02 97 73 98 04

29833 CARHAIX

6, Place des Droits de l'Homme - B.P. 103

Centre Iv. de l'Orn.

Groupe Ornithologique Breton



N°19 ANNEE 2000

Sommaire du numéro 19 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période :	
16 mars 1999 à 15 novembre 1999	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 13
Groupe 3 de l'Huîtrier pie au Tournepierre à collier	page 16
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 23
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 28
 Activités du G.O.B. MORBIHAN	 page 40
Comptages des oiseaux d'eau dans la rivière d'Etel,	
hiver 1998-1999	page 40
 Documents	 page 55
Baie de Vilaine Stationnements d'oiseaux d'eau , 1999-2000	
Station biologique de Bailleron	page 55
Baie de Quiberon Stationnements d'oiseaux d'eau, 1999-2000	
Station biologique de Bailleron	page 57

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE : 16 MARS 1999 A 15 NOVEMBRE 1999

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
ARTEL Jean-Pierre, BOZEC René, BAILLEUL Patrick et BAILLEUL Philippe,
BELLANGER Christelle, CORBIERRE Jacques, CORLOU Pierre, DERIAN Gwénaél,
DORVAL Patrick, DULAU Stéphane, ERMEL Gérard, EVANNO Guillaume,
GUERIN Stéphane, GUILLEMOT Francis, HAMET Loïc, ILIOU Bernard, JAMAULT
Roland, JONIN Max, LAMOUR Joël, LEMONNIER Françoise et Jean-Luc, MAHEO
Roger, MAOUT Jacques, MOREL Régis, MOUCHEL Yann, ORDUREAU Yannick,
PALPANT Muriel, PHILIPPON Patrick, SIMON Nathalie, SCHRIKE Etienne,
URVOAZ François... sauf erreur ou omission !

Nous remercions à cette occasion les TOURNEPIERRES de LOISIRS COOPERATIFS
qui nous ont transmis des observations.

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton
(Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre
au 15 mars.

Les observations sont transmises au coordonnateur morbihannais sur papier ou disquette
informatique en respectant l'ordre suivant :

ESPECE ou code	date	lieu-dit (voir carte IGN)	commune	effectif	remarques
48005	04/05/1999	Keriel	162	4	un adulte ravitaille trois jeunes dans une lande

Les listes des codes utilisés pour noter les espèces et répertorier les communes sont
disponibles aux réunions du G.O.B à Brec'h.

Illustration : couverture Patrick Bailleul ; p39. Guy Palpant ; p44 Patrick Bailleul.

AR VRAN MORBIHAN N°19

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

Plongeon indéterminé *Gavia sp.*

(1 donnée)

5 individus passent devant la pointe du Talut / Ploemeur, le 11/11/1999.

Plongeon arctique *Gavia arctica*

(1 donnée)

A Gâvres, le 13/11/1999, un immature.

Plongeon imbrin *Gavia immer*

(6 données)

Au printemps, quelques données signalent 4 individus en plumage nuptial, le 30/04/1999 devant Hoëdic, il y en a encore deux le 30/04, l'un en plumage hivernal, l'autre en plumage nuptial. Le dernier est noté à Kerminihy / Erdeven, le 09/05.

Les arrivées ne sont notées qu'à partir du 01/11, un individu adulte ou de premier hiver à la Tour des Anglais / Damgan, 3 P. imbrins croisent devant Saint-Pierre / Locmariaquer le 04/11.


Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

(64 données)

Nidification :

- étang du Varquez-Crucuno / Erdeven, chants le 03/05/1999
- Kermouzouët / Groix, 1 adulte suivi de deux poussins, le 14/04/99
- Boderhaff / Le Tour-du-Parc, deux couples, le 16/05
- Pen Mané / Locmiquélic, 2 adultes et 1 poussin, le 12/06
- étang de la Lande / Saint-Marcel, 1 adulte et 2 poussins le 27/06
- Kersahu Gâvres, 1 adulte nourrit un poussin, le 27/06.

A Pen Mané, les rassemblements débutent dès la fin du mois de juin.

Grèbe castagneux à Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan) : juin 1999 - novembre 1999

Autres rassemblements postnuptiaux : 51 sur le lagunage de Le Tour-du-Parc, le 20/08/99 ; 104 entre les étangs de Saint-Jean et Goh Lenn / Locoal-Mendon le 21/08. Puis, à l'automne, 90 à 100 sur les salines du Bréno / Carnac.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(56 données)

Nidification :

- étang de Ploërmel, si 29 couples sont comptés le 20/03/1999, il n'y en a plus que 14 à 15 le 08/04/99. La reproduction n'a pas été suivie ensuite. Le 04/08, il y a encore deux jeunes non-volants.
- étang de Coët-Rivas / Kervignac, deux couples parquent le 17/03. Trois nids sont construits le 28/04 qui produiront au moins trois poussins de nichées différentes le 10/06.
- étang de Lannénec / Ploemeur ; pour la première fois depuis l'enquête-atlas 1980-85, la nidification du Grèbe huppé est vérifiée. Après une première construction avortée le 22/04, le couple choisit un site plus retiré, 4 poussins observés dès le 17/06 arriveront à émancipation.
- étang de Pontcalleck / Kernasclédén, un couveur le 22/05, 3 juvéniles le 11/07.
- étang de Rodes / Merlevenez, un couple parade le 28/04, sans suite.
- lac de Bel-Air / Priziac, un couple parade le 24/04, sans nidification constatée.

Il n'y a pas d'indice de reproduction probable ou certaine sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon où l'espèce est pourtant présente : 15 le 18/04.

Les premiers rassemblements : 23 entre les étangs de Saint-Jean et Goh Lenn, le 21/08, 15 devant Sterbouët / Kervignac sur le Blavet le 12/09, 22 à Pentès / Surzur le 07/10.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

(2 données)

Les deux dernières données proviennent de Men Du / La Trinité-sur-Mer, un individu en plumage nuptial incomplet et des Sables Blancs / Plouharnel, un individu, le 20/03/1999.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(19 données)

La dernière mention date du 21/03/1999 à Pencadenic / Le Tour-du-Parc, 7 individus.

L'espèce réapparaît à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon dès le 21/08/99. De petits groupes sont contactés entre septembre et novembre dans la rivière de Pénerf et la rade de Lorient.

Les données concernant les puffins et océanites sont relativement nombreuses, suite à des séances de guet à la mer réalisés pendant l'été à Ploemeur.

Puffin indéterminé *Puffinus sp.*

(6 données)

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*

(6 données)

Toutes viennent de Belle-Île.

Puffin cendré *Calonectris diomedea*

(2 données)

A raser la pointe du Talut / Ploemeur, deux individus passent le 24/09/1999.

Un individu à la pointe de Penvins / Sarzeau, le 22/05.

Puffin fuligineux *Puffinus griseus*

(6 données)

Le passage estival est observé durant deux mois :

Date	03/08	04/08	07/08	11/08	28/08	16/10
Effectif observé	3	3	1	1	1	1

Puffin fuligineux à la pointe du Talut / Ploemeur (Morbihan) ; été 1999

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus*

(9 données)

Au printemps, les observations proviennent du Mor-Braz : 1 entre Quiberon et Hoëdic le 11/04/1999, 2 à Hoëdic le 12/04/99 et le 25/04.

En été, il est observé des Puffins des Anglais à la pointe du Talut / Ploemeur à partir du 03/08 jusqu'au 11/11, avec un maximum de 3 les 03/08 et 08/08.

Puffin des Baléares / Yelkouan *Puffinus yelkouan*

(9 données)

Un individu devant Kerillio / Erdeven le 03/06/1999 constitue la première donnée, isolée, de l'année. Puis, à la pointe du Talut / Ploemeur, ces puffins passent entre le 28/07/99 et le 16/10, isolément ou par deux à trois. Cependant, deux groupes plus importants sont notés les 03 et 04/09 avec respectivement 7 et 24 individus.

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus*

(4 données)

Plus d'une vingtaine entre Quiberon et Belle-Île le 25/09/1999 et plus de quinze le 04/10/99 à la pointe du Talut / Ploemeur.

Fou de Bassan *Sula bassana*

(20 données)

De mi-juillet à la fin du mois d'août, des groupes d'importances diverses pêchent entre Ploemeur et Groix, ainsi : 70 le 28/07/1999, 150 à 200 le 07/08/99, 74 le 28/08.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

(52 données)

S'il est présent sur l'îlot de Roëllan, il n'y niche pas.

Le premier groupe de l'été dans la rivière d'Etel est vu le 28/06/1999, 8 individus. Sur cette rivière, le reposoir diurne de l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon accueille un minimum de 120 individus le 09/08/99.

Quelques dortoirs sont suivis :

- à la sortie de la rivière d'Etel, rejoignant Roëllan : 110 le 25/10, 264 le 31/10, 230 le 15/11.
- Total de la rade de Lorient : 15 le 05/09, 214 le 01/10, 383 le 08/11.
- Saint-Goustan : 18 le 24/09, 32 le 08/10, 25 le 11/10.
- Le Stum / Saint-Barthélémy : 16 le 05/11.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*
Niche à Roëllan.

(7 données)

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

(12 données)

L'observation printanière à l'étang de Kerzine / Plouhinec d'un individu le 20/03/1999 est le seul indice en période de reproduction. Deux individus séjournent entre les étangs du Loc'h / Guidel et de Lannénec / Ploemeur, à partir du 12/09 jusqu'à la fin de la période.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*

(1 donnée)

Les 12 et 14/04/1999 un individu sur Hoëdic.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

(67 données)

Nidification :

- 7 nids à Kerzo / Port-Louis. Déjà le 28/03/1999 un adulte construit une aire mais il faut attendre le 16/05 pour observer des couveuses.
- Riec'h / Belz ; nicheuse, sans indication d'effectif.

Rassemblements : plus de 120 à Pen Mané en période de basses eaux le 05/09 ; 32 au Gohent / Sainte-Hélène le 30/04/99 ; 30 à Locoal-Mendon le 29/10 sur les herbus et vases salées.

Recensements hivernaux aux dortoirs :

- 161 dans la rade de Lorient le 30/09.
- 75 sur Fandouillec / Plouhinec le 04/10.
- 51 sur l'île Cuhan / Saint-Philibert le 03/10.
- 120 dans l'anse du P^le 10/10.
- 162 à Pencadenic / Le Tour-du-Parc le 07/11.

Grande Aigrette *Egretta alba*

(1 donnée)

2 à Banastère / Le Tour-du-Parc le 07/11/1999.

Héron cendré *Ardea cinerea*

(38 données)

Nidification :

- 21 nids à Kerzo / Port-Louis, le premier jeune observé le 24/03/1999.
- Nicheur sur Riec'h / Belz.

Rassemblements : 20 le 27/03 et 23 le 23/07 à l'étang de Pontcaleck, la preuve d'une reproduction locale est toujours à apporter ; 60 à Kerboulico / Le Tour-du-Parc le 18/07 et 35 le 05/09 à Pen Mané / Locmiquélic.

Héron pourpré *Ardea pupurea*

(8 données)

Ces observations concernent trois individus. Au printemps, un Héron pourpré à Suscinio / Sarzeau le 04/05/1999 ; 1 subadulte observé le 07/05 à Keravéon / Erdeven est vraisemblablement le même que celui du 08/05 au Vasquez-Crucuno / Erdeven.

Un juvénile se déplace entre le Petit Loc'h / Guidel et Beg Nevez / Guidel entre les 31/08 et 20/09.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

(2 données)

A Le Plessis Jane / Mohon le 24/04/1999 et 3 individus volent haut au dessus du Grand Loc'h / Guidel le 29/04.

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*

(1 donnée)

Parmi des Ibis sacrés, un Ibis falcinelle pâure à Pénerf / le Tour-du-Parc le 14/09/1999.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(10 données)

Isolément ou en groupe, de la presqu'île de Rhuys à la rade de Lorient. 125 le 08/11/1999 au dortoir de Pencadenic / Le Tour-du-Parc.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

(21 données)

En dehors du Golfe et de la presqu'île de Rhuys :

- Petit Loc'h / Guidel, 1 le 08/06/1999 et une juvénile du 13 au 16/09.
- Rade de Lorient ; un maximum de 3 à Pen Mané / Locmiquélic le 21/03 ; une immature séjourne autour de la Petite Mer de Gâvres à partir du 29/10, au delà de la fin de la période.
- Etang au Duc / Ploënnel, 1 le 05/08.
- Kerdual / la Trinité-sur-Mer, 4 le 17/10, 1 le 17/11.
- Baie de Plouharnel, 2 immatures le 11/10.
- Brénigui / Locmariaquer, 3 le 25/10.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

(19 données)

Nidification : un couveur sur l'étang de Pontcalleck / Kernascléden le 24/04/1999, un couple produit quatre poussins à Pen / Mané / Locmiquélic, vus à partir du 27/06. A Suscinio / Sarzeau, un couple et 6 juvéniles le 25/05.

22 individus le 31/10 au Duer / Sarzeau et 11 le même jour à Boderhaff / Le Tour-du-Parc.

Bernache du Canada *Branta canadensis*

(4 données)

Quelques individus sont vus dans le bassin oriental du Golfe : 1 à Pencadenic / le Tour-du-Parc le 25/03/1999, une paire au Duer / Sarzeau les 28/03 et 01/04 puis 1 à l'île Tascon / Saint-Armel 1 individu parmi les Cravants le 29/10.

Bernache cravant *Branta bernicla*

(23 données)

La présence printanière est faible. Les premières arrivées sont signalées à Saint-Sterlin / Kervignac le 11/09/1999, 7 adultes, à Port-Groix / Surzur le 07/10, 3 individus ; une

seule est aperçue au guet à la mer à la pointe du Talut / Ploemeur le 16/10. Puis il y en a 220 à 230 dans la baie de Plouharnel le 17/10, 3000 à 4000 à l'île Tascon / Saint-Armel le 29/10, dans la "Petite Mer de Gâvres 488 le 28/10 et 2085 le 14/11.

Dans les bandes automnales, la proportion de jeunes est plus forte que l'an passé : 28,3% dans la rade de Lorient le 07/11/1999.

Tadorne indéterminé *Tadorna sp.*

(1 donnée)

Peut-être un hybride Tadorne de Belon x Casarca le 07/11/1999 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(95 données)

Les bandes hivernales se dispersent : 42 sur le Croyal / Locoal-Mendon le 18/04/1999, 49 à Pen Mané / Locmiquélic le 21/03/99, 50 dans l'anse de Plouharnel le 20/03, à Pont-Neuf / Le Tour-du-Parc 82 et 82 également le même jour à Pont-Caden / Sarzeau, encore 150 au Moustoir / Arradon le 05/04.

Parmi les sites de reproduction :

- Kersahu / Gâvres, six familles élèvent leurs jeunes, à partir du 16/05.
- Pen Mané / Locmiquélic, au moins quatre familles à partir du 10/06.
- 4 familles sur la côte nord d'Hoëdic, le 12/06/1999.
- Le Rohu / Lanester, une femelle et 7 poussins de quelques jours le 20/06.
- Le 23/07, encore 3 poussins d'une dizaine de jours à Saint-Sterlin / Kervignac.

Après la saison de reproduction : 80 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc le 27/10.

Canard siffleur *Anas penelope*

(10 données)

Derniers à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, le 10/05/1999, 10 individus.

A la pointe du Talut / Ploemeur, les premiers siffleurs passent le 22/08/99, moins d'une dizaine. Ils sont 62 dans la Petite Mer de Gâvres le 17/10 ; 180 sur l'étang de Saint-Jean plus 60 au Gouarde / Nostang le 15/11.

Canard siffleur *Anas strepera*

(11 données)

Les données sont exclusivement printanières et proviennent :

- De l'est du Golfe et de la presqu'île de Rhuys entre les 20/03/1999 et 28/04, maximum de 6 (deux couples et deux mâles).
- Kersahu / Gâvres, un mâle les 20/03, 24/04 et 29/05.
- Hoëdic, un couple sur l'étang le 29/04.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(10 données)

Quelques individus s'attardent jusqu'à la fin d'avril puis les arrivées débutent, timidement, début septembre. Le 17/10/1999, elles ne sont que 74 à la pointe des Emigrés / Vannes.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

(47 données)

Nombreuses sites de reproduction entre le 13/04 à Hoëdic et le 19/06/1999.

Il y en a 100 à 120 à Kersahu / Gâvres le 24/07 mais seulement 3 le lendemain, plus six formes de chasse sur l'étier ! 135 au Grand Loc'h / Guidel le 20/09.

Canard pilet *Anas acuta*

(3 données)

Pas de données entre le 11/06/1999 et le 07/10.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

(8 données)

Les premières sont signalées à pont Caden / Sarzeau le 21/03/1999, 5 au Grand Loc'h / Guidel le 30/04.

Canard souchet *Anas clypeata*

(11 données)

Aucune donnée entre le 17/04/1999 et le 19/07/1999, 9 jeunes volants à Boderhaff / Le Tour-du-Parc.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

(14 données)

A l'étang du Ter / Ploemeur, le dernier est noté le 16/03/1999, les premiers retours prennent place au 11/10/99, deux mâles. Sur l'étang des Ducs de Vannes, ils sont 63 le 30/10 et 263 le 14/11.

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

(13 données)

4 femelles, sur l'étang du Ter / Ploemeur, le 26/03/1999, sont les dernières à partir. 4 femelles amorcent les retours sur cet étang le 15/10. Sur l'étang des Ducs / Vannes, il y en a deux le 08/11.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

(5 données)

- Au printemps : Un couple devant la plage d'Hoëdic, le 01/05/1999.
- 15 devant la plage de Locmariaquer le 06/05.
- 1 à Bédume / Ambon, le 24/05.
- 11 à Treutan / Damgan, le 15/08.

Puis un individu à la pointe du Talut / Ploemeur, le 11/11.

Harelde boréale *Clangula hyemalis*

(1 donnée)

Une femelle fait une halte à l'étang de Lannénec / Ploemeur, le 14/10/1999.

Macreuse noire *Melanitta nigra*

(7 données)

Cinq de ces observations proviennent de la pointe du Talut / Ploemeur entre les 28/08/1999 et 11/11, de un à treize individus. Devant le Loc'h / Guidel, 3 le 14/11 et à la pointe des Poulains de Belle-Île, 3 le 14/10.

Macreuse brune *Melanita fusca*

(1 donnée)

6 le 11/11/1999 à la Barre d'Etel.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

(3 données)

11 le 06/03/1999 à l'étang de Toulven / Baden et 3 le 13/11.

Harle huppé *Mergus serrator*

Encore un mâle le 11/04/1999 au Rohu / Lanester puis un à la pointe du Talut / Ploemeur le 01/11/99. Les huit premiers à l'étang de Toulvern / Baden datent du 13/11 et à Kerihuelo / Landaul 3 femelles remontent la rivière le 15/11.

AR VRAN MORBIHAN N° 19

GROUPE N°2 Des rapaces aux rallidés.

Choix et rédaction établis par Franz Urvoaz.

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

(10 données)

Première observation le 16/04/1999 à Kermenguer / Kervignac.

La dernière concerne 2 individus le 31/09 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon.

Milan noir *Milvus migrans*

(31 données)

Dès le 25/03/1999 un couple parade au Cranic / Landaul.

9 individus survolent ensemble le bourg d'Etel le 02/05.

La dernière donnée provient de l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 04/08.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

(47 données)

Les indices les plus intéressants concernant la reproduction proviennent des communes d'Hoëdic, Locoal-Mendon, Erdeven et Ambon.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

(13 données)

La seule nidification certaine est observée à Merlevenez.

Busard cendré *Circus pygargus*

(3 données)

Communes concernées: Erdeven, Landaul, Sérent.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

(5 données)

Les observations proviennent des communes de Landaul (2), Les Forges (1) et Ploemeur (1), Sérent (1).

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

(21 données)

Noté nicheur certain sur les communes d'Erdeven, de Locoal Mendon, de Plouhinec et de Kervignac.

Buse variable *Buteo buteo*

(18 données)

A niché sur les communes de Merlevenez, Belz, Saint-Tugdual et Locoal-Mendon.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

(18 données)

Toutes les données sauf une (le 10/05/1999 à Bisconte/ Plouhinec) concernent la migration de retour.

La grande majorité des observations se fait courant septembre : entre Laïta et Blavet, sur

la rivière d'Etel et en presqu'île de Rhuys.

La dernière a lieu le 15/11 à l'étang de Lannénec / Ploemeur.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

(24 données)

Les indices de nidification les plus probants proviennent des communes suivantes : Baud , Hoëdic, Le Tour-du-Parc , Landaul , Erdeven , Damgan , Belz et Saint-Pierre-Quiberon.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

(4 données)

Communes concernées: Erdeven , Gâvres , Quiberon , Sarzeau. Les oiseaux sont notés en septembre et en octobre.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

(25 données)

Les indices de reproduction les plus intéressants font référence à des parades sur les communes de Landaul et d'Erdeven.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(5 données)

3 observations sur les 5 ont été effectuées au Duer/ Sarzeau, une autre peut s'y rapporter avec un oiseau à Penvins / Sarzeau et l'observation la plus précoce est du 23/10/1999 au Fort-Bloqué / Ploemeur.

Perdrix rouge *Alectoris rufa* (1 donnée); **Perdrix grise *Perdix perdix*** (1 donnée);

Caille des blés *Coturnix coturnix*

(1 donnée)

Le 26/06/1999 à l'étang de la Lande / Saint-Marcel un individu chante.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

(6 données)

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(7 données)

4 juvéniles observés le 04/ 07/1999 sur la commune d'Ambon.

Râle des genêts *Crex crex*

(1 donnée)

Observation effectuée à Kergall / Surzur le 26/09/1999.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

(19 données)

Le plus gros rassemblement se monte à 11 individus sur le lagunage d'Auray le 27/10.

Foulque macroule *Fulica atra*

(72 données)

Maxima enregistrés : 452 le 24/07/1999 à Kersahu/ Gâvres, 2300 le 12/09 sur l'étang de Saint-Jean / Locoal Mendon, 575 le 12/09 sur le lagunage d'Ambon, 1101 le 07/11 à Quélisoye / Larmor Plage, 568 le 13/11 sur l'étang de Toulvern / Baden, 570 le 15/11 sur l'étang de Goh Lenn / Locoal Mendon.

Grue cendrée *Grus grus*

(1 donnée)

2 individus sont aperçus le 12/11/1999 sur la rivière de Pénerf/ Ambon.

AR VRAN MORBIHAN N°19

Groupe n°3 De l'Huîtrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

(29 données)

Six à huit couples occupent la côte nord de l'île d'Hoëdic.

L'espèce est repérée pendant tout l'été dans la rade de Lorient, entre vingt et trente individus, avant les retours qui s'amorecent à la mi-août : 55 le 15/08/1999 descendant le Blavet. Il y en a déjà 100 à Rédion / Damgan, dans la rivière de Pénerf, le 18/08/99.

Les concentrations à l'automne : 81 sur les Saisies / Larmor-Plage le 07/10, plus de 100 à la pointe du Conguel / Quiberon le 09/10, 120 à la Tour des Anglais / Damgan et 80 à Bétahon Ambon, soit deux centaines dans la rivière de Pénerf le 01/11.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

(120 données)

Reproduction :

Boderhaff / Le Tour-du-Parc	4 à 5 couples dont trois obtiennent des jeunes.
Kerboulico / Le Tour-du-Parc	6 couples, 19 à 21 jeunes.
Kerpenhir / Locmariaquer	4 couveuses.
Kersahu / Gâvres	12 couveuses, aucune éclosion ; une famille composée de deux adultes et deux jeunes volants y séjourne entre fin juillet et fin août.
Marais de Bétahon / Ambon	2 couples, 3 jeunes.
Marais de Tréhervy / Ambon	4 couples.
Pen Mané / Locmiquélic	2 nids occupés, échecs.
Pencadénic / Le Tour-du-Parc	3 couples avec jeunes.
Pont-Caden / Le Tour-du-Parc	3 couples.
Suscinio / Sarzeau	11 couples, 13 jeunes.

Soit environ 51 couples, hors réserves Bretagne Vivante.

La reproduction a atteint des valeurs élevées cette saison à Suscinio (3-4 couples en 1998) tandis que l'expansion vers l'ouest du Morbihan est menacée par le manque de gestion des niveaux d'eau sur les sites de Pen Mané et Kersahu.

Deux hivernantes à Pen Mané avaient présentes jusqu'au 28/03/1999. La première échasse est signalée à Suscinio le 25/03/99, 6 au Grand Loc'h / Guidel le 27/04.

La dernière quitte Kersahu après le 22/08, exception faite d'une future hivernante qui s'attarde déjà à Pen Mané à partir du 22/08.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(27 données)

Reproduction :

Boderhaff / le Tour-du-Parc	3 couples produisent respectivement 2 jeunes, 1-2 jeunes et 2 poussins.
Kerboulico / Le Tour-du-Parc	19 couples nicheurs ; 20 jeunes non-volants et 7 volants au 08/06/1999.
Pont Neuf / Le Tour-du-Parc	4 à 6 couples.
Pencadénic	3 couples.

Pont Caden / Le Tour-du-Parc 2 couples.
 Soit environ, 31 à 33 couples, non compris ceux des réserves Bretagne Vivante.
 250 le 05/04/1999 au Moustoir / Arzal.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

(12 données)

Dans les dunes d'Erdeven, un à deux couples nichent. Le maximum observé est 7 le 30/08/1999, ce qui pourrait correspondre à deux couples accompagné de deux et un jeunes. La dernière observation date du 25/10.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

Un couple produit deux jeunes au Rohu / Lanester. Dans les marais de Tréhervé / Ambon, à l'étang de la Lande / Saint-Marcel, un couple en période de reproduction n'apporte pas d'autre indice plus probant quant à la nidification.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

(28 données)

Encore 60 à Bétahon / Ambon le 16/05/1999 puis les arrivées estivales sont sensibles à partir du début d'août avec plusieurs centaines déjà dans la Petite Mer de Gâvres le 19/08/99, 140 le 11/10 à la pointe du Conguel / Quiberon, 350 à la Tour des Anglais / Damgan le 01/11, le 14/11/ à Kerminihy / Erdeven un adulte bagué en Pologne et âgée de teize ans.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

(37 données)

Reproduction :

Kerminihy / Erdeven	1 à 2 couples, au moins deux poussins.
Ban-Gâvres / Gâvres	2 nids, échecs.
Moténo / Plouhinec	3 couples
Le Magouër / Plouhinec	7 couples, échecs.
Bout-du-Hâvre / Plouhinec	1 couple
Pointe du Percho / Saint-Pierre-Quiberon	2 couples.
Beg en Aod / Saint-Pierre-Quiberon	1 couple
Landrézac / Sarzeau	1 couple.

Soit sur le littoral, 18 couples repérés sans recherche exhaustive. On notera cependant l'absence de Gravelot à collier interrompu sur la flèche de Gâvres et la mention à nouveau faite de couples sur la presqu'île de Quiberon.

Port-Morvil / Groix	1 couple.
Grands Sables / Groix	2 couples, 2 poussins.
Hoëdic	2 couples, au moins 2 poussins.

Pluvier guignard *Charadrius morinellus*

(1 donnée)

Deux paires de Pluvier guignard le 09/09/1999 à Kerminihy / Erdeven.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

(11 données)

Aucune donnée avant le 12/06/1999, un individu à Hoëdic puis le 10/07/99 à la pointe

des Chats / Groix, 1 à Kersahu / Gâvres le 28/07 en plumage d'été. Il y a à nouveau une lacune de données jusqu'au 07/10 avec les arrivées d'hivernants : 35 au Grand Loc'h / Guidel le 09/10 puis 210 le 24/10 ; à Saint-Malo des Trois Fontaines, 47 le 21/10 et à Kermorduel / Saint Barthélémy, 126 le 11/11.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

(13 données)

Aucune concentration notée au printemps. Les arrivées se déroulent au cours du mois d'août : 64 à Linès / Gâvres le 22/08/1999.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (65 données)

Reproduction :

Bout du Hâvres / Plouhinec	4 couples, 2 poussins.
Kervran / Plouhinec	8 couples.
Kerzine / Plouhinec	7 couples.
Kerboullico / Le Tour-du-Parc	1 couple parade ?
Kenninihy / Erdeven	3 à 4 couples.
Kersahu / Gâvres	1 à 2 couples, 1 jeune.
Moténo / Plouhinec	2 couples.
Suscinio / Sarzeau	1 à 2 couples, 3 jeunes.
Trély / Surzur	?
Grand Loc'h / Guidel	1 à 2 couples, échecs.

A noter les forts effectifs nicheurs des étangs de Kervran – Kerzine. Même si la reproduction n'a pas été suivie, l'observation ultérieure de poussins et de jeunes établie la réussite.

Au Grand Loc'h / Guidel, les rassemblements débutent en août : 30 le 18/08/1999, 220 le 09/10. 113 à Kermorduel / Saint-Barthélémy le 11/11, 150 au Pont-Lorois / Plouhinec le 07/11.

Bécasseau maubêche *Calidris canutus*

(6 données)

Au printemps, l'espèce passe inaperçue, ou peu s'en faut : le 29/04/1999 à Beglan / Sarzeau, 1 individu ; le 01/05/99 à Pen Mané / Locmiquélic ; le 16/05, marais de Bétahon / Ambon, 7. Mais la remarque vaut aussi pour le passage postnuptial : le 22/08 à Linès / Gâvres, 8 individus et le 02/09 à Port Croix, 9.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

(9 données)

Au printemps : le Conguel / Quiberon, 46 le 18/03/1999 ; les Saisies / Larmor-Plage, 87 le 30/03 ; Hoëdic, 30 le 29/04.

Dans la Petite Meer de Gâvres, on en trouve dès le 19/08, quelques dizaines sur les vasières. A l'automne, les reposoirs classiques se garnissent : 180 le 03/10 au Percho / Saint-Pierre-Quiberon, 200 le 11/10 au Conguel.

Bécasseau minute *Calidris minuta*

(7 données)

Curieusement, les observations de Bécasseau minute n'émanent que de la rade de Lorient. Les sept premiers, juvéniles, passent à Pen Mané / Locmiquélic entre les 28 et

30/07/1999. Un mois plus tard, 5 à Kervran / Plouhinec, 5 individus le 28/08 se rattachent à un passage plus marqué avec 4 à Pen Mané le 29/08, 2 à Kersahu / Gâvres le 05/09 et les derniers à Pen Mané, 1 les 5 puis 26/09.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

(14 données)

Au printemps : 1 individu à Berringue / Plouhinec le 30/04/1999 et 2 le 16/05 à Bétahon / Ambon.

Les arrivées estivales débutent avec un individu en plumage nuptial complet à Pen Mané le 29/07 puis s'échelonnent à Suscinio / Sarzeau (2 le 04/08), Pen Mané (16 le 28/08), salines de Carnac (8 le 05/09), Kersahu / Gâvres (1 le 29/08) pour finir sur des maxima de 14 les 11-12/09 et 17 le 26/09 à Pen Mané.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(7 données)

Les données printanières intéressent les hivernants de la presqu'île de Quiberon : encore 5 à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon le 06/04/1999 et 15 à Beg en Aod Saint-Pierre-Quiberon le 02/05. A noter en plus une donnée insulaire, avec 24 B. violets au vieux port d'Hoëdic le 28/04.

Les premiers sont comptés à Ploemeur en novembre : le 08/11, 1 à Kerpape et 5 à la pointe du Talud le 11/11.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(37 données)

Les passages printaniers sont encore marqués au mois de mai : 516 à Kersahu / Gâvres le 01/05/1999, 216 le même jour à Pen Mané / Locmiquélic, encore 200 à 300 le 16/05 au marais de Bétahon. Les retours sont ressentis dès mi-juillet : 50 le 17/07 à Pen Mané, plusieurs centaines dans la Petite Mer de Gâvres le 19/08.

Combattant varié *Philomachus pugnax*

(20 données)

Il s'agit surtout d'observations printanières. A partir du 20/03/1999, 7 individus à Kersahu / Gâvres. Sur ce même site, c'est une bande 30 à 40 qui est visible entre les 10 et 18/04/99. Il y en a 16 à Pencadenic / Le Tour-du-Parc le 15/04 et 28 le 22/04, 16 au Grand Loc'h de Guidel le même jour. Quelques individus sont notés ici et là de fin juin à début août.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

(20 données)

16 à Pen Mané / Locmiquélic le 17/03/1999, « nombreuses » au Grand Loc'h / Guidel le 02/04. Il n'y a pas de données du 28/04 au 26/07.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

(1 donnée)

Le 10/04/1999 au Bois Trochu / Le Palais.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

(19 données)

Visible à partir du 04/04/1999 : 1 à Kerpenhir / Locmariaquer et 90 le 29/04 à la barre

d'Étel.. Pendant l'été, les données sont rares : 52 le 24/06 au Duer / Sarzeau, 10 à Pen Mané / Locmiquélic le 05/07, le 19/08 à Kersahu / Gâvres, 2 et pour finir le 26/09 1 à Pen-Mané.

Barge rousse *Limosa laponica*

(19 données)

Elle est notée à partir du 29/04/1999, 34 au dessus du Grand Loc'h / Guidel. Le pic prénuptial est marqué au début de mai : 68 le 29/04 à Beglan / Sarzeau, 80 au vieux port d'Hoëdic le 30/04, 256 sur la flèche de Gâvres le 01/05 et 62 le même jour au Conguel / Quiberon, 104 au Duer / Sarzeau le 03/05. Puis une lacune dure du 16/05 au 27/07. Les passages postnuptiaux : 48 le 05/09 à Linès / Gâvres, 17 au Bronzais/ Pénestin le 26/09, 52 à Pen Mané / Locmiquélic le 26/09, 11 à Pénerf / Damgan le même jour, 17 à la pointe du Percho / Saint-Pierre-Quiberon le 03/10 et enfin le 11/10 50 individus à Pen er Lé / Plouhinec.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

(34 données)

Pendant les passages printaniers, les maximaux sont observés dans la région baie de Plouharnel-rivière d'Étel : 6 premiers à Ihuezic / Locoal-Mendon le 23/03/1999, 26 dans la baie le 25/04, 38 au Gohent / Sainte-Hélène, 21 à Berringue / Plouhinec et 8 à la pointe de la Vieille-Chapelle / Sainte-Hélène soit 61 sur ces vases salées de la rivière d'Étel. Le 01/05, 56 à Kervern / Locmiquélic, 32 sur les vases salées de Sainte-Hélène-Plouhinec le 03/05. Entre le 16/05 et le 15/07, les données manquent. La reprise est notée à Pénerf / Damgan avec 5 individus. Le pic de passage se situe fin-juillet : 70 à Larmor / Damgan le 23/07, 45 à Kersahu / Gâvres le 25/07 et 42 à Larmor le 27/07. Les effectifs et les observations déclinent en août : 10 à Larmor le 15/08. Le dernier est observé au Fort-Bloqué / Ploemeur le 14/11.

Courlis cendré *Numenius arquata*

(31 données)

Peu de données printanières : 18 le 17/04/1999 au marais de Bétahon / Ambon. Aucune observation notée entre le 03/05/99 et le 07/07, date d'un premier passage de 52 individus dans la Petite Mer de Gâvres. Les effectifs augmentent à partir d'août : 104 à Larmor / Damgan le 15/08 et 120 le 18/08, 109 dans la Petite Mer le 19/08, 72 à Ihuelic / Locoal-Mendon le 23/08 et 150 à Larmor le 19/09, 100 à Port-Groix / Surzur le 07/10, 80 du Gouarde / Nostang jusqu' Logodenn sur la rivière d'Étel le 07/11. A noter qu'un individu blanc a été retrouvé cette année encore dans la rivière de Pénerf.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

(9 données)

Les données proviennent surtout de l'ouest du Morbihan mais que l'on ne s'y trompe pas, les observations du Golfe manquent : 1 le 28/04/1999 à Pont-Caden / Sarzeau et 1 à Pencadenic / Le Tour-du-Parc, 2 à Pen Mané / Locmiquélic le 01/05 et 3 le 05/07, 1 à Kervran / Plouhinec le 28/08, 1 à 3 à Pen Mané entre les 12 et 26/09.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

(66 données)

Reproduction :

Suscinio / Sarzeau

1 couple parade.

Tréhervé / Ambon 1 couple.
 Pencadenic / Le Tour-du-Parc 1 couple.
 Kerboulico / Le Tour-du-Parc 2 couples nicheurs.
 Dunes de Kerinihiy / Erdeven 1 couple, poussins.
 Marais de Bétahon / Ambon 1 couple, 2 jeunes.
 Boderhaff / Le Tour-du-Parc 1 à 2 couples.
 Kersahu / Gâvres 2 couples.
 Les rassemblements estivaux commencent dès la fin du mois de juin : le Duer / Sarzeau 102 sur la réserve et 82 sur la vasière le 24/06.

- Rivière de Pénerf

Date	Lieu-dit	Effectif
26/06/99	marais de Bétahon	108
04/07/99	Pencadenic	2
10/07/99	Penerf	30
13/07/99	Penerf	50
22/07/99	Penerf	70
23/07/99	Penerf	170
27/07/99	Penerf	130
02/08/99	Penerf	50
15/08/99	Larmor	150

- rade de Lorient :

Date	Lieu-dit	Effectif
27/06/99	Pen Mané	24
05/07/99	Pen Mané	55
23/07/99	Saint-Sterlin	95
25/07/99	Pen Mané	106
08/08/99	Quélisoye	47
24/09/99	Pen Mané	138
26/09/99	Pen Mané	137

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (44 données)

Le passage printanier est peu marqué, noté seulement entre le 29/04/1999 et le 03/05 avec un maximum de 18 à Kerhervy / Lanester le 30/04 et 9 le 03/05 entre Berringue / Plouhinec et Gohent / Sainte-Hélène. Puis, jusqu'au 09/07, aucune donnée. En été, l'espèce est suivie dans la rade de Lorient : les maxima interviennent en septembre avec 11 individus le 03/09 à Pen Mané / Locmiquélic et 14 le 26/09, 18 individus à Kersahu / Gâvres le 05/09 et 25 le 11/09. En octobre les effectifs décroissent, 10 dans la Petite Mer de Gâvres le 29/10, 8 à Kerhervy le 10/11.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (31 données)

Des oiseaux isolés sont notés au printemps entre le 28/03/1999 et le 26/06/99, le maximum est de 5 individus à Pencadenic / Le Tourdu-Parc le 15/04 et à l'étang de la Lande / Saint-Marcel le 26/06.

Le passage postnuptial débute à la fin de juillet : maximum de 12 le 29/08 au Plec / Locoal-Mendon et de 13 à Kersahu / Gâvres le 05/09. Il n'y a plus de données après le 16/10.

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

(5 données)

- 06/08/1999 ; le Duer / Sarzeau, 2 individus.
- 28/08 ; Kersahu / Gâvres, 2.
- 01/09 ; étang au Duc / Ploërmel, 1.
- 05/09 ; Kersahu / Gâvres, 2.
- 19/09 ; Kersahu / Gâvres, 1.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

(53 données)

Il n'y a pas de données entre le 23/05/1999 et 30/06/99. Les effectifs augmentent à partir de fin juillet : 26 à Bédune / Ambon le 26/07. Il faut noter l'observation d'un groupe de 60 individus sur Gravigne / Plouhinec le 14/08.

Tournepierre à collier *Arenaria interpres*

(51 données)

Les dernières concentrations sur les Saisies / Larmor-Plage comptent 53 individus le 30/03/1999, 57 le 08/05/1999.

Phalarope indéterminé *Phalaropus sp.*

(1 donnée)

3 individus aperçus entre la pointe du Talut / Ploemeur et Groix n'ont pu être identifiés.

Phalarope à bec large *Phalaropus tricolor*

(2 données)

- 26/09/1999, Kersahu / Gâvres, 3 individus de premier hiver suivent les tempêtes.
- 02/10, Boderhaff / Le Tour-du-Parc, 1 juvénile.

AR VRAN MORBIHAN N°19

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Jean-Luc Lemonnier.

Stercorariidae sp.

(2 données)

- Deux labbes, sans précision d'espèce, sont vus depuis la pointe du Talud / Ploemeur en une demi-heure de guet (8h00 à 8h30) le 21/07/1999.
- Le 15/08/1999, ce sont encore deux labbes indéterminés qui sont vus depuis Kervoyal / Damgan.

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus

(3 données)

Il s'agit à chaque fois d'un oiseau isolé :

- le 21 et le 24/09/1999 à la pointe du Talud / Ploemeur,
- le 24/09/1999 à Banastère / Le Tour du Parc.

Cette deuxième décade de septembre reste l'une des plus favorables pour l'observation de cette espèce sur nos côtes. Il est également remarquable que ces quelques séances de guet à la mer n'aient révélé aucun passage de Labbe parasite, espèce habituellement relevée beaucoup plus souvent et en bien plus grand nombre dans les chroniques morbihannaises relatives au passage d'été / automne.

Labbe parasite Stercorarius parasiticus

(1 donnée)

2 individus de forme sombre à Penvins / Sarzeau le 22/09/1999.

Grand Labbe Catharacta skua

(3 données)

- 1 le 24/10/1999 à Damgan,
- 2 le 31/10/1999 à l'île d'Hoëdic.
- 3 le 22/09 à Penvins / Sarzeau.

Laridae sp.

(4 données)

Au port de commerce de Lorient, un couple hybride Goéland brun x G. argenté produit 3 jeunes volants ce printemps 1999.

Les autres données concernent des rassemblements importants plurispécifiques :

- le 31/07/1999, un comptage entre les pointes de l'Istrec et de Rosmarian en rivière d'Etel totalise 12000 laridés,
- le 22/08/1999, à Linès en petite mer de Gâvres, 2600 laridés dont une majorité de Mouettes rieuses sont rassemblés.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus

(20 données)

Toujours plus ! Le dynamisme des diverses populations de cette espèce à travers l'Europe se traduit ici par une augmentation significative du nombre d'observations.

A vrai dire, il ne semble pas exister de site privilégié pour rencontrer cette espèce sur la côte morbihannaise comme ce peut être le cas ailleurs en Bretagne. Certes, les guetteurs à la mer sont les mieux placés pour détecter les mouvements (9 oiseaux en 4 guets entre le 17 et le 22/07/1999 à la pointe du Talud / Ploemeur) mais les Mouettes mélanocéphales se rencontrent en bien d'autres milieux :

- 3 adultes dans le port de commerce de Lorient le 01/07/1999,
- 4 adultes le 28/07/1999 à Kersahu / petite mer de Gâvres,
- 1 adulte le 27/08/1999 sur une digue de la station de lagunage d'Auray : cet oiseau porteur d'une bague colorée avec code avait été bagué en mai 97 dans les Flandres belges, puis contrôlé à Malaga (Espagne) en avril 98, au marais d'Olonne (Vendée) en mai 98 et nichait à Donges (Loire Atlantique) au printemps 99.

Notons encore que ces données concernent surtout des oiseaux adultes, observés après la saison de nidification.

Mouette pygmée *Larus minutus*

(6 données)

Ces six données ne concernent que des oiseaux immatures :

- 2 le 29/08 et 2 (les mêmes ?) le 05/09/1999 à Kersahu / Gâvres,
- 1 le 14/09 à Penvins / Sarzeau
- 1 le 26/09 à Pen Mané / Locmiquélic,
- 1 le 25/10 à la pointe de Kerpenhir / Locmariaquer.

Mouette de Sabine *Larus sabini*

(19 données)

Une succession de très fortes perturbations ayant balayé l'océan Atlantique fin septembre a permis l'observation rapprochée de nombreuses Mouettes de Sabine jeunes et adultes en de nombreux points de la côte. Pour exemple : un adulte est posé sur le parking des Sables blancs / Plouharnel le 03/10/1999. Les données s'échelonnent du 22/09 au 03/10/1999. Les effectifs enregistrés ne sont toutefois pas exceptionnels, le maximum étant atteint à Penvins / Sarzeau, le 22/09, avec 31 individus dont la moitié d'adultes. Citons encore Banastère / Le Tour du Parc le 29/09 avec 12 individus et 8 oiseaux le 24/09 à la pointe du Talud / Ploemeur

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(21 données)

Le premier jeune oiseau de la saison est vu au Rohu / Lanester le 20/06/1999. Puis progressivement la proportion de juvéniles augmente au sein des groupes recensés. En différents points de la rade de Lorient ou de la ria d'Etel, un observateur relève le 27/06/1999 des proportions de juvéniles allant de 0,3% à 5,6% dans des groupes à l'effectif compris entre 65 et 329 individus. Le 07/07, ce type de comptage fournit 2,63% et 20,4% pour des effectifs respectivement de N = 190 et N = 49. Enfin le 31/07, 52,4% de jeunes pour 804 oiseaux en ria d'Etel.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

(2 données)

Ces données concernent le même oiseau noté du 06/01 au 19/03/1999 à l'étang du Ter / Ploemeur. Ce site accueille cette espèce pour le sixième hivernage consécutif.

Goéland cendré *Larus canus*

(10 données)

Le 27/07/1999, 35 oiseaux sont à Larmor / Damgan. Le lendemain, 12 sont dénombrés à Kersahu / Gâvres où sont encore présents 5 individus un mois plus tard. C'est à Pentès / Le Tour du Parc qu'est enregistré l'effectif le plus important de la période : 50 le 12/09/1999. Toutes les autres données concernent de 1 à 3 oiseaux.

Goéland brun *Larus fuscus*

(13 données)

La reproduction n'a été suivie qu'en rade de Lorient : sur les hangars des zones portuaires ; notons également la présence d'un couple avec deux poussins sur un bateau du port militaire le 02/07/1999.

Des rassemblements ont été remarqués tant en période prénuptiale que postnuptiale :

- 26 le 20/03/1999 à l'étang au Duc / Ploënnel,
- 86 le 27/04/1999 à l'étang de Pontcalleck / Berné,
- ou sur la côte : 282 dont des adultes de la forme scandinave au Fort-Bloqué / Ploemeur le 01/04/1999.
- 84 au lagunage d'Auray le 27/08/1999.

Goéland argenté *Larus argentatus*

(18 données)

Le suivi de 33 couples nicheurs dans les ports de Lorient fournit le chiffre de 1,12 jeunes volants / couple ; les premiers poussins ayant été découverts le 16/05/1999.

A Hoëdic, 40 couples environ se reproduisent sur le Grand Mulon et de 16 à 20 couples sur l'îlot de la pointe du Vieux Château (ces deux îlots n'accueillent aucun Goélands bruns ou marins nicheurs).

Dès le 27/06/1999, des juvéniles circulent à la pointe du Talud / Ploemeur. A Port-Louis, un minimum de 6 couples avec jeunes fréquentent encore l'Île des Souris le 01/07/1999.

Goéland leucophée *Larus cachinnans*

(3 données)

Toujours très peu de données pour cette espèce ayant depuis longtemps quitté ses cantons méditerranéens mais n'ayant de toute évidence encore investi nos côtes que très sporadiquement et en très faible nombre. Deux individus apparaissent dans un rassemblement de plusieurs centaines de laridés au lagunage d'Auray le 27/08/1999. Sur ce même site, un individu est encore présente le 13/10 puis le 27/10.

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*

(1 donnée)

Parmi les G argentés, un individu fréquente la côte nord de Groix le 18/10/1999.

Goéland marin *Larus marinus*

(10 données)

Deux couples sont vus sur Roëllan / Erdeven le 31/05/1999 et encore deux couples avec jeunes le 01/07/1999 sur l'Île des Souris / Port-Louis.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

(3 données)

Deux observations au large de Groix les 10 et 13/07/1999 ne concernent qu'un seul

individu à chaque fois. De manière étonnante, les forts coups de vent de fin septembre ne permettent qu'une seule observation de 3 individus à la pointe du Talud / Ploemeur le 24/09/1999. Les Mouettes de Sabine auraient-elles volé la vedette aux moins rares tridactyles ?

Sterne caspienne *Sterna caspia*

(1 donnée)

Jamais cette espèce imposante n'avait pris place dans nos chroniques ornithologiques morbihannaises ! Il nous aura fallu attendre ces deux oiseaux observés le 22/08/1999 à Pen er Pont / Locoal - Mendon durant 35 minutes.

Sterne royale *Sterna maxima*

(1 donnée)

Et le festival se poursuit une semaine plus tard. Cette fois, ce 29/08/1999, il fallait se trouver à la pointe du Talud / Ploemeur pour le passage de deux Sternes royales. Il semble que cette espèce n'ait pas été observée en Bretagne durant la dernière décennie. Lire l'observation circonstanciée et son commentaire dans le n° 1, Vol. 11 d'Ar Vran (Gw. Dérian in G.O.B., 2000).

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(36 données)

Des rassemblements de plusieurs dizaines d'individus sont enregistrés ici et là sur toute la durée de la période. Les groupes comptant des jeunes de l'année sont notés à partir du 21/07/1999 (93 oiseaux à Damgan). Le regroupement le plus important totalisant 370 individus dont 130 juvéniles est constaté quelques jours plus tard, le 24/07/1999 à Bétahon / Ambon, toujours à proximité de la baie de Vilaine.

Sterne de Dougall *Sterna dougallii*

(2 données)

- 4 à l'île Berder / Larmor-Baden le 25/09/1999, site « classique ».
- 1 le 26/09/1999 à Pen Mané / Locmiquélic.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

(39 données)

Après une première donnée printanière particulièrement tardive (le 25/04/1999 à Saint-Pierre Quiberon), les indications sur la reproduction de cette espèce sont cette année 1999 très fragmentaires. Les seules mentions chiffrées nous étant parvenues concernent deux couples à Suscinio / Sarzeau le 11/06 et un couple avec 3 jeunes le 13/08 au port de Sauzon / Belle-Île.

La dernière donnée de la saison provient de Pen Mané / Locmiquélic où environ 40 oiseaux sont présents le 26/09/1999.

En bref : de nombreuses données pour de maigres informations !

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

(3 données)

Pen Mané / Locmiquélic accueille 4 oiseaux le 04/09/1999 puis 2 le 26/09. C'est en eau douce que l'on trouve la dernière donnée : 3 le 27/09/1999 à l'étang de Coët-Rivas / Kervignac.

Sterne naine *Sterna albifrons*

(3 données)

Trois données, toutes printanières :

- 2 le 01/04/1999 au Fort-Bloqué / Ploemeur,
- 30 le 02/05/1999 à Suscinio / Sarzeau,
- 15 le 17/05/1999 à Bétahon / Ambon.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus*

(7 données)

Que se passe-t-il donc ? Les 18 numéros précédents de notre revue totalisaient 7 données pour cette espèce et voilà 7 nouvelles mentions morbihannaises en huit mois !

In extenso :

- 1 pêche au Grand Loc'h / Guidel le 09/05/1999,
- 1 à Pen Mané / Locmiquélic le 25/07/1999,
- 1 à la pointe du Talud / Ploemeur le 27/08/1999,
- 10 à l'étang au Duc de Ploërmel le 21/09,
- 8 à Noyalo le 22/09,
- 2 adultes le 21/09/1999 puis 1 le 24/09 à l'étang de Lannéac / Ploemeur,
- 1 adulte à Pen Mané / Locmiquélic le 26/09/1999.

Guifette noire *Chlidonias niger*

(17 données)

Au printemps 1999: 6 données, à chaque fois un individu isolé, sur divers étangs littoraux. Le mouvement postnuptial est détecté dès le 27/07/1999 avec 1 oiseau à Treutan / Damgan. Des données de 1 à 4 juvéniles principalement à Pen Mané / Locmiquélic émaillent le reste de la période jusqu'au 16/10/1999.

Guillemot de Troïl *Uria aalge*

(4 données)

Données concentrées entre le 26/04 et le 06/05/1999 : 3 données en provenance d'Hoëdic avec 1 à 3 individus et une donnée de deux oiseaux à Locmariaquer.

Pingouin torda *Alca torda*

(6 données)

Deux données printanières : 3 à Hoëdic le 12/04/1999, et 1 au Plec / Plouhinec le 23/05/1999.

Les informations de la fin d'été et de l'automne proviennent toutes de la pointe du Talud / Ploemeur et mentionnent un ou deux individus à chaque fois.

Macareux moine *Fratercula arctica*

(1 donnée)

3 sont observés depuis la pointe de Penvins / Sarzeau le 24/10/1999.

AR VRAN MORBIHAN N°19

Groupe n°5 - Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick PHILIPPON

Pigeon colombin *Columba oenas*

(4 données)

2 couples cantonnés, chanteurs (nicheurs selon le propriétaire) à Le Grego / Surzur les 02 et 24/05/1999. Il s'agit d'un nouveau site. Un chanteur près d'une loge de Pic Noir le 24/05 à la Guyondaie / Caro, 5 le 27/6 dans les carrières de Quinipily / Baud.

Pigeon ramier *columba palumbus*

(2 données)

30 le 27/04/1999 dans le bois de l'île d'Hoëdic

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

(3 données)

Plus de 60 le 20/09/1999 à Le Grand Loch / Guidel

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

(17 données)

Le premier chanteur signalé l'est le 21/04/1999 en forêt de Lanouée. Passage migratoire de 25 le 01/05/99 sur l'île d'Hoëdic et nombreux chanteurs entendus ce même jour à Ambon, Damgan, Ploërmel, Vannes. Dernière observation notée le 29/09/99 à Kergal / Surzur.

Coucou gris *cuculus canorus*

(13 données)

Premiers chants le 25/03/1999 à Beger Lan / Merlevenez et Cranic / Landaul et le 26/03 à la tourbière de Sérent. Le 04/04/99 à Ambon, Lizio. Noté en mai et juin sur l'ensemble du département. Pas de données en juin ni juillet.

Effraie des clochers *Tyto alba*

(10 données)

Un couple couve dans un grenier le 12/04/1999 à Kerprovost / Etel. 25% des données concernent des heurts avec véhicules (voie rapide, départementales) sur toute la période. Repérée à Moréac, Lizio, Plumergat, Ploëren, Sarzeau...

Chevêche d'Athéna *Athena noctua*

(2 donnée)

3 jeunes à l'envol à Saint - Fiacre / Plouhinec.

Chouette hulotte *Strix aluco*

(5 données)

deux données de chocs avec véhicule. De plus elle est notée à Moréac (reproductrice), Lorient, Sarzeau, Saint Servant, Vannes.

Hibou moyen-duc *Asio otus*

(6 données)

A Govet / Damgan, un couple effectue 2 nichées : 4 jeunes volants le 25/05/1999, disparaissant le 13/06 puis 3 jeunes en duvet sur le même site le 20/07, disparaissant le 15/08. Un couple avec deux jeunes dans les dunes de Plouharnel le 27/06/99. L'espèce se reproduit aussi à Moréac : appels de deux jeunes le 19/06.

Hibou des marais *Asio flammeus*

(3 données)

une seule donnée pour les dunes de Plouharnel: 1 individu le 23/04/1999.

Passage automnal à Hoëdic: 3 le 24/10 et 1 le 31/10/99 à Beg Lagad.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

(10 données)

Le 30/04/1999, tous les sites connus autour de Vannes sont occupés. Entendu en mai (20/05 à Clos Calvet et Kerhabonnet / Riantec) et à Saint Servant sur Oust le 31/05 (La Ville Leho et la Touche Piro).

Dernière donnée : le 09/07 à Sainte Julitte / Ambon. (nouveau site).

Martinet noir *Apus apus*

(23 données)

Les premières observations proviennent, le 17/04/1999, de l'étier de Kerboulico / Le Tour du Parc (en 1998, les premiers étaient vus le 16/04 au même endroit). Arrivée sur tout le département à compter du 24/04/99 (Erdeven, Gâvres, Lorient, Ploërmel, Vannes...)

Le 01/08/99, les dernières rondes sont vues à Vannes et le 03/08 à Lorient (époque « normale » de départ)

8 données, allant de 1 à 10 individus entre le 4 et le 22/08 en bordure de côte (Guidel, Locol Mendon, Ploemeur, Saint Pierre Quiberon).

Dernier individu le 22/09 à Antourneau / Le Palais.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(36 données)

Les données pour la période de mars à juillet concernent un oiseau à chaque fois : Coët Rivas / Kervignac le 17/03/1999, écluse du château de Josselin le 30/04, Saint-Marcel le 26/06, forêt de Lanvaux le 27/06...

86% des données portent sur la période d'erratisme et de migration : à la Pointe du Talud / Ploemeur, un « bird watching » les 7 et 28/08/99 donne 1 et 2 individus.

8 données de septembre (1 à 3 oiseaux à Guidel, Le Palais, Locmiquélic, Locol Mendon, Surzur).

10 observations toujours d'un individu en octobre à Ambon, Auray, Crac'h, Le Tour du Parc. et 6 individus en novembre : 1 oiseau à chaque donnée à Riantec, Saint Congard, Saint Tugdual.

Huppe fasciée *Upupa epops*

(9 données)

Première arrivée le 31/03/1999 au bourg de Guilliers (en 1997, la plus précoce avait été vue le 18/03/97 à la pointe Saint-Marc (Belle-Ile).

3 données d'avril (Hoëdic, Languidic, Saint Jean Brévelay) puis 4 données de juin (Pen

en Toul /Lannor Baden et Pointe du Bile / Séné le 16/06, 1 individu à chaque fois ; Saint Abraham : 1 individu le 01/06 au-dessus de la RN 166; 2 le 01/06 au Pouldu / Saint Jean Brévelay).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

(2 données)

2 données de septembre 1999 : 1 à Kersahu / Gâvres le 11 et 1 le 17 dans un jardin de Lorient (Eau courante).

Pic vert *Picus viridis*

(4 données)

Pic noir *Dryocopus martius*

(15 données)

Les sites « classiques » sont occupés (forêts de Lanouée, de Quénécan, Pont Callek) pendant toute la période sans observation de jeunes comme en 1997. A noter à la Guyondaie / Caro, le 24/05/1999 un écureuil s'introduisant dans une loge fraîchement creusée (nouveau site d'observation ?). Données à Notre Dame de Burgo / Grandchamp le 22/04, le Val Joint / Lizio 0(4/04/99), Coët Hanter Her/ Landaul le 12/06 ; 2 individus le 15/08 à la tourbière d Kerfontaine / Sérent.

En automne, l'erratisme est noté à Sept-îles / Baden le 13/11/99

Pic épeiche *Dendrocopos major*

(5 données)

Au moins un couple nourrit à Sarzeau (centre et Duer); noté nicheur à Landaul le 27/04/1999.

Pic mar *Dendrocopos medius*

(1 donnée)

2 chanteurs en forêt de Pontcallek / Berné le 05/04/1999.

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

(8 données)

Noté régulièrement sur la commune de Sarzeau (Duer et Saint Colombier) de juillet à septembre. Nicheur au bois du Ter / Ploemur (3juvéniles près d'une loge le 31/05/1999. Présent toute l'année à Vannes.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(8 données)

Le suivi au port de commerce à Lorient, d'où proviennent 7 données sur 8 permet de voir régulièrement 2 individus puis un jeune volant le 18/06/1999. Un autre est vu à l'école de Kerfichant le 13/11, l'espèce était antérieurement connue dans ce quartier de Lorient..

Alouette lulu *Lullula arborea*

(9 données)

Les chanteurs sont entendus pendant toute la période à Ambon, Arzal, Languidic, Monteneuf (site mégalithique), Plumergat, Surzur et Theix. Entendue dans les coupes

en forêt de Lanouée lors de l'expérience du décompte ZNIEFF.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

(4 données)

Notée à Hoëdic fin avril, en mai à Kerminihy / Erdeven, le Lenn / Damgan.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

(20 données)

Les 10 premières sont à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 21/03/1999 puis sur les étangs de Cranic / Landaul le 25/03/99 et de Bel air / Priziac le 27/03. Plusieurs centaines le 17/04 au Grand Loch / Guidel. Différentes colonies sont repérées de mai à juillet : 20 cavités au Magouero / Plouhinec le 06/05 ; 2 cavités au Magouer / Plouhinec le 15/05; 10 à 15 cavités occupées dans la carrière de Quinipily / Baud le 27/06; 120 - 130 cavités à Loge Coucou / Lanvéneën le 22/05 (nouvelle colonie) ; 22 trous en 2 endroits de la Pointe du Talud / Ploemeur le 27/06.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

(28 données)

Les deux premières à Pont Neuf / Le Tour du Parc le 17/03/1999: un jour plus tôt qu'en 1998 !

Deux paliers migratoires se dessinent : d'abord observée à l'unité sur l'ensemble du département pendant la seconde quinzaine de mars puis en groupes de plusieurs dizaines jusqu'au 8/04 où 100 individus sont au Lac au Duc / Ploërmel .

Une nichée de trois jeunes ne prend l'envol que vers les 10-15 septembre à Kergorec / Moréac.

En août, le "bird watching" permet de noter l'erratisme et / ou les premiers migrateurs : le 21/08/99, 30 individus en 6 groupes passent à la Pointe du Talud / Ploemeur en 2 heures.

Sept données concernent 1 à 4 individus entre le 09 et le 25/10, date de la dernière observation à la Lande de Glemarrec / Naizin.

Hirondelle rousseline *Hirundo daurica*

(1 donnée)

1 individu le 28/04/1999 au dessus du marais d'Hoëdic. C'est cette île qui concentre les données morbihannaises de cette espèce.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

(10 données)

Aucune n'est notée en mars, contrairement à 1998 (21/03/98), absence d'observateurs ou arrivée tardive ?

30 individus le 27/04/1999 à Vannes constitue donc la première donnée alors qu'un couple construit le 28/04 à Malestroit et que les premières vues au port de Lorient le seront le 14/05 puis notées nicheuses le 30/05 à la base des sous-marins.

Dernière le 22/09 à l'étang du Pérello / Ploemeur.

Pipit de Richard *Anthus richardi* (2 données)

1 le 26/04/1999 à la pointe du Vieux château / Hoëdic et autre le 11/11/99 à la Petite Mer à Riantec. Ces deux observations documentées s'insèrent dans les dates de passage de l'espèce sur le littoral atlantique.

Pipit des arbres *Anthus trivialis* (16 données)

Aucune donnée du début avril. A compter de la fin du mois, l'espèce est notée sur Hoëdic : 4 chanteurs le 26/04/1999 (plages de l'Est) puis le 29/04/99 où 5 chanteurs sont contactés en 3 points différents de l'île. Noté en mai (6 données) à Berné, Kernascleden, Saint Tugdual, Surzur.

Pipit farlouse *Anthus pratensis* (6 données)

Transport de nourriture remarqué fin avril (25/04-01/05/1999) à Hoëdic et en juin (27/06) à la Pointe du Talud / Ploemeur (9 individus différents).
Seule donnée concernant la migration ; 20 le 1/10 au Conguel / Quiberon.

Pipit maritime *Anthus petrosus* (9 données)

Nourrissages à Port Melitte / Groix, Pénerf / Damgan, Fort Bloqué / Ploemeur en juin et juillet.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (1 donnée)

Le 7/11/1999 1 individu à Kersahu / Gâvres.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (20 données)

2 le 2/04/1999 à la Pointe du Vieux Château / Hoëdic.
Les nicheurs sont repérés en mai et juin à Kersahu / Gâvres (15 couples) ; Boderhaff / Le Tour du Parc ; Kerminihy et Poulbé / Erdevén ; Bétahon, Tréhervé, Trély / Ambon.
En septembre, 2 sites permettent de noter des individus en migration : 15 à Trégat / Theix et 6 à l'étang de Kervran / Plouhinec le 11/09/99.

Bergeronnette printanière flavéole *Motacilla flavissima* (1 donnée)

1 à l'étang de Kervran / Plouhinec le 28/08/1999.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (14 données)

Lizio, Josselin, Malestroit, la vallée de l'Oust fournissent les données d'avril à juillet. A noter un couple à Le Floch / forêt de Lanvaux le 27/06/1999.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (5 données)

Un couple le 16/05/1999 à Boderhaff / Le Tour du Parc.
Le dortoir de Vannes est fréquenté par 750 à 800 individus les 09/10 et 15/11/99.

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla yarrellii* (3 données)
Vue en octobre et novembre 1999 (Auray et Plumergat).

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (3 données) ; **Accenteur mouchet**
Prunella modularis (1 donnée) ; **Rougegorge familier** *Erithacus rubecula* (2 données).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (26 données)
Un chanteur le 28/03/1999 à Kersahu / Gâvres traduisant la remontée printannière. Un mâle au Duer / Sarzeau le 01/04; 1 à Tréhervé / Ambon le 04/04/99.
6 nicheurs en mai à Kersahu / Gâvres.
Sur Ambon, un nouveau site est trouvé (Toul Canard le 30/05/99) ; des chanteurs sont contactés sur des sites favorables (Pont Caden / Surzur ; Trély / Ambon le 30/05/99).
Dernière observation le 05/11/1999 à la Pointe de Gâvres.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (7 données)
Premiers chants le 18/03/1999 à Sarzeau et à Lizio le 30/03.
Un nourrissage à Etel le 25/05. Groix, Sainte Anne d'Auray, Vannes fournissent des données.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (1 donnée)
Une femelle le 01/05/1999 à Hoëdic.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (5 données)
Deux données printannières : 1 à Hoëdic le 28/04/1999 et 1 sur un fil le 05/05 à Lann Payo / Plouay. Migration d'automne avec 3 individus le 11/09/99 à l'étang de Lannéc / Ploemeur puis 1 le 17/10/99 en baie de Plouharnel.

Tarier pâtre *Saxicola torquata* (13 données)
Cantoné dès fin mars, l'espèce est notée en couple sur tout le département.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (34 données)
Le passage pré-nuptial (40% des données) se déroule du 21/03 au 03/06/1999, observé sur l'ensemble du littoral morbihannais. Dix individus au fort d'Hoëdic le 27/04, alors qu'un couple construit.
A la Pointe du Talud / Ploemeur, au moins deux pontes produisent des jeunes.
Les huit individus sur trois km de dunes à Gâvres le 19/08 traduisent-ils un regroupement avant le départ ou des individus déjà en erratisme ? A l'Apothicaire / Sauzon, 10 sont sur les pelouses le 28/08.
Dernier individu le 31/10 à Pénerf/Damgan.

Merle à plastron *Turdus torquatus*

(1 donnée)

1 le 30/04/1999 dans les ajoncs autour du fort d'Hoëdic. Le site est classique (voir collection Ar Vran) mais les données ne nous parvenaient plus depuis quelques années.

Merle noir *Turdus merula*

(2 données)

Grive litorne *Turdus pilaris*

(6 données)

Passage pré-nuptial remarqué à la Ville Gleuhiel / Guegon entre le 19/03 et le 26/03/99 (80 le 21/3). Pendant la migration d'automne : le 12/11/99, 21 à Trévéré / Lizio puis plus de 150 le 15/11 sur la commune de Ruffiac (plusieurs sites).

Grive musicienne *Turdus philomelos*

(2 données)

Grive mauvis *Turdus iliacus*

(10 données)

L'écoute nocturne sur différents points de la ville de Vannes débutée le 10/10/1999 ne se révèle positive qu'à partir du 14, avec un passage intense, estimé à 3 Mauvis pour 1 Musicienne les 17 et 18/10/99. Les vols nocturnes reprennent du 7/11 au 14/11/99 (Vannes, Locoal-Mendon).

Grive draine *Turdus viscivorus*

(2 données)

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

(15 données)

Les chants se font plus nombreux à compter du 20/03/99 à Sarzeau, Le Tour du Parc.

Cisticole des joncs *Cisticola jundicis*

(17 données)

Chanteur le 20/03/1999 à Suscinio / Sarzeau, l'espèce est représentée dans tous les marais par plusieurs individus : 3-4 à Tréhervé, Billion / Ambon, 3 à Sainte-Barbe / Plouharnel, 2 à Kerminihy / Erdeven.

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

(3 données)

Deux sites pour le printemps : le Duer / Sarzeau le 01/04/1999 et Kersahu / Gâvres le 05/04 avec respectivement 1 et 2 individus.

Un chanteur le 03/07/99 à l'étang de Saint- Jean / Locoal Mendon.

Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides*

(2 données)

Un chanteur le 10/04/1999 à Kersahu / Gâvres et 1 le 22/04 au Grand Loch / Guidel.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

(11 données)

Les premiers chanteurs sont entendus à Kersahu / Gâvres le 05/04/1999 ; le 17/04 plus de 16 sont recensés partiellement sur le site, traduisant un passage certain.

Noté comme chanteur d'avril à juin à Hoëdic (27/04) ; Pen Mané / Locmiquélic (30/05 et 03/06) ; Grand / Loch / Guidel ; Toul Canard et Trehervé / Ambon.
Nourrissage de jeunes le 20/07/99 à l'étang de Lannénec / Ploemeur.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* (8 données)

Première date : le 20/03/1999 à Susicinio / Sarzeau.

Les arrivées semblent se situer vers le 18/04 (1 le 18/04 à Kersahu / Gâvres). En mai les oiseaux sont installés (6 le 30/05 à Pen Mané / Locmiquélic) et un couple construit le 24/05 à l'étang de Lannénec / Ploemeur .

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* (6 données)

A partir du 06/05/1999 au Coin / Theix, 1 individu, toutes les données sont de mai : Ambon (Toul Canard et Trély), Kernascleden, Ploemeur.

Fauvette pitchou *Sylvia undata* (11 données)

Une donnée de nourrissage le 30/03/1999 à la Rodière / Locoal Mendon. 2 jeunes « supposés » le 14/05 au Grand Phare à Groix. Familles, nourrissage observés de mai à juin à Saint Tugdual, Bieuzy les Eaux, Landaul.

4 en 3 sites le 10/10/99 à Kersahu / Gâvres.

Fauvette grisette *Sylvia communis* (11 données)

1 le 04/04/1999 à Tréhervé / Ambon. «Très commune » le 25/04 à Hoëdic. Notée de mai à juillet dans le département avec un nourrissage le 22/07/99 à l'étang de Lannénec / Ploemeur et un juvénile le 17/07 à la Pointe des Chats / Groix.

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (3 données)

1 chanteur le 24/04/1999 à la tourbière de Saint-Guen / Saint Tugdual.

2 chanteurs à le Grégo / Surzur le 02/05 et 1 donnée le 10/07 à la Pointe des Chats / Groix

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (12 données)

1 mâle le 15/03/1999 dans un jardin de Vannes, le couple est vu une semaine plus tard.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (2 données)

1 chanteur le 04/05/1999 aux étangs du Val Joint / Lizio et 2 chanteurs le 29/05 en forêt de Lanouée.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (5 données)

Données éparpillées sur la période. A noter des chants courts le 10 et 19/09/1999 à Laimer / Plumergat et un chant complet le 01/10 aux étangs de Le Sturm / Saint Barthélémy.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

(12 données)

2 chanteurs le 19/03/1999 en forêt de Pontcallek / Berné.

Le passage se déroule d'avril (8 données dont 3 chanteurs le 24/04 à la tourbière de Saint-Guen / Saint Tugdual) à mai (10 chanteurs le 22/05/99 à la tourbière de Saint-Guen / Saint Tugdual) et sur les sites suivants : Ambon, Guillac, Hoëdic, Plumeliau, Saint-Barthélémy.

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapillus*

(3 données)

Nidification prouvée dans un jardin du centre de Sarzeau le 15/05/1999 : nourrissage de jeunes.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

(4 données)

L'espèce niche à Moréac : un jeune juste volant le 04/08/1999 à Kergorec. Les autres données concernant la migration : 1 le 05/09/1999 à Pénerf / Damgan ; plus de 15 le 20/09 dans les carrières de Saint-Marcel et 1 dans les dunes de Fort Bloqué /Ploemeur le 07/10.

Gobemouche nain *Ficedula parva*

(1 donnée)

1 le 30/10/99 dans les jardins d'Hoëdic.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

(6 données)

1 donnée de printemps avec 1 individu le 30/04/1999 dans le bois d'Hoëdic.

La migration est observée en août et septembre : 5 le 22/08/99 dans le vallon de Ster Ouen / Sauzon, 2 à 3 individus par observation pendant le mois de septembre à Pénerf / Damgan, Kervran / Plouhinec et Saint-Marcel.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

(2 données)

Un seul site renseigné : Pen Mané / Locmiquélic avec 4 jeunes le 28/07/1999 et 15 individus le 04/10/99.

Mésange à longue-queue *Aegithalos caudatus*

(2 données)

1 couple et 3 jeunes volants à Trély / Ambon le 30/05/1999.

Mésange nonnette *Parus palustris*

(1 donnée)

Mésange huppée *Parus cristatus*

(1 donnée)

Transport de matériaux le 24/04/1999 en forêt de Pontcallek.

Mésange noire *Parus ater*

(2 données)

Deux à Saint-Bily / Trédion le 06/06/1999.

Mésange bleue *Parus caeruleus* (1 donnée), Mésange charbonnière *Parus major* (1 donnée)

Sittelle torchepot *Sitta europea* (4 données)
Un nourrissage le 27/04/1999 à Mané er Velin / Landaul et le 01/05 à Guillac (vallée d'Oust)

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (3 données)
Le 27/04/1999, nourrissage en forêt de Pontcallek et un couple nourrit trois jeunes volants le 14/05 au Plessis Josso / Theix.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (1 donnée)
Un immature le 12/09/1999 aux lagunes de Bonnervo / Theix.

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* (1 donnée)
Une du 26/04/1999 au 30/04/99 à Hoëdic.

Geai des chênes *Garrulus glandarius* (1 donnée), Pie bavarde *Pica pica* (1 donnée)

Crave à bec rouge *Pyrrhonorax pyrrhonorax* (2 données)
Deux données de Belle-Ile : 4 le 08/08/1999 aux Poulains / Sauzon, 9 le 23/09 à Antès / Sauzon.

Choucas des tours *Corvus monedula* (7 données)
Locmaria / Melrand, un couple couve le 28/03/1999.
5 données à partir de septembre à Loyat, Malestroït, Melrand, Missiriac, Sauzon concernant plus de 10 individus sur chaque site.

Corbeau freux *Corvus frugilegus* (1 donnée)
48 dont 18 adultes nourrissant les jeunes dans les dunes à Erdeven le 21/06/1999.

Corneille noire *Corvus corone* (3 données)

Grand Corbeau *Corvus corax* (6 données)
Observations de juillet à septembre 1999 sur les îles (Groix et Belle-Ile). Un guet à la mer (17, 21/07/99 et 28/08) démontre un passage entre Groix et le continent (1 à 4 individus).

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (4 données)

Moineau domestique *Passer domesticus*

(2 données)

Moineau friquet *Passer montanus*

(6 données)

Le site de nidification du bourg de Lizio a été suivi pendant la nidification (mai à août) : 2 oisillons nourris le 23/06/1999 ; mort d'un des 2 poussins le 04/08/99 lors d'une pluie d'orage : seconde couvée ?

A Kergorec / Moréac, 5 sites sont occupés en 1999, dans des cavités de murs et des trous de pommiers. Au moins cinq nichées se sont envolées.

12 dans une bande de fringilles le 12/11/99 à Saint-Congard.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

(3 données)

Une bande de 150 le 12/11/1999 à Saint-Congard.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

(1 donnée)

1 le 16/11/99 à Trehorenteuc.

Serin cini *Serinus serinus*

(4 données)

Nicheur à Damgan, Vannes, Ploërmel, chanteur en différents endroits de Groix.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (2 données) ; Chardonneret *Carduelis carduelis* (3 données)**Tarin des aulnes *Carduelis spinus***

(1 donnée)

20 le 24/10/1999 à la Pointe de Penvins / Sarzeau.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

(10 données)

Groupes de 10-20 à 70 observés de mai (70 le 06/05/1999 à Moténo / Plouhinec) à juillet.

Regroupement de plus de 250 oiseaux au Grand Loch / Guidel le 18/09/99.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*

(1 donnée)

15 le 21/05/99 dans les landes de Le Cours.

Bouvreuil pivoine *Pyrhula pyrrhula*

(8 données)

Nidification constatée à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 09/06/1999. Noté à Groix, Locmariaquer, Quéven.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*

(11 données)

Cet automne fut riche en observations du 26/09/1999 au 11/11/99; phénomène peu fréquent en Bretagne Sud. Larmor-Plage, Ploemeur, Plouharnel, Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon sont les sites où l'espèce est notée à l'unité (1 femelle le 26/09/99 à la pointe du Conguel lors d'un guet à la mer) ou par 2 (4 données), sauf 10 individus le 10/10/99 9 le 17/10 puis 2 le 31/10 à la Pointe de Conguel /Quiberon.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

(5 données)

Noté comme chanteur de mars à juillet sur Bieuzy les Eaux, Merlevenez, Saint Tugdual, Sarzeau.

Bruant zizi *Emberiza cirlus*

(3 données)

Landaul, Merlevenez, Quiberon sont les endroits où il est noté

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

(10 données)

Le passage n'est pas noté cette année.

60% des observations (de 1 à 4 individus) sont observés en mai et juin (Ambon, Locmiquélic, Plouhinec, Saint-Marcel, Saint Tugdual, Sarzeau)

Un individu nourrit à la tourbière de Saint Guen / Saint Barthélémy.

Bruant proyer *Emberiza calandra*

(1 donnée)

Un le 28/04/1999 au Vieux port à Hoëdic.



ACTIVITES DU G.O.B. MORBIHAN

COMPTAGES DES OISEAUX D'EAU DANS LA RIVIERE D'ÉTEL, HIVER 1998-1999

LA SITUATION


La rivière d'Étel (*carte 1*) entaille, à partir de la mer, un granite à deux micas suivant une direction approximativement SSO / NNE puis elle s'élargit, se divise en traversant le complexe métamorphique sud-armoricain et abandonne des îlots de tailles diverses, découpe plusieurs presqu'îles qui délimitent autant de chenaux dans sa partie moyenne. Plus haut, deux branches divergentes s'éteignent au fond de vallées étroites, parfois barrées par d'anciens moulins et qui ne s'élèvent guère au dessus du niveau de la mer (cote .4 à Nostang).

Ainsi la rivière d'Étel présente-t-elle l'image d'une ria fermée sur son débouché maritime, de larges vasières découvertes par la marée, des goulets parcourus de forts courants et des rives généralement à pente douce occupées par des cultures et des prairies mais aussi des landes et des pinèdes ; par rapport à d'autres rivières proches (Lorient, Laïta) elle se caractérise par une influence presque exclusivement marine, les affluents d'eau douce sont en effet de volume très limité.

Tous les comptages ont été effectués le matin, environ de 9h00 à 12h00, sauf en novembre où quelques observateurs ont prolongé la prospection. Dans ces conditions, l'heure et la hauteur des marées ressenties dans la rivière étaient variables. Dans le but d'assurer une couverture la plus complète possible de la rivière dans le moindre temps, elle a été découpée en cinq zones : c'est un découpage pratique, il s'agit d'abord d'éviter que des parties de la rivière soient négligées ou que des oiseaux soient comptés plusieurs fois. Chaque groupe d'observateurs consignait le point d'observation, l'heure, les effectifs constatés. Ensuite, mais cela n'a été nécessaire que pour un faible nombre de cas, nous avons procédé à des ajustements tenant compte de doubles comptages évidents ou de déplacements d'oiseaux.

Suivant un calendrier établi nous avons dû composer avec les conditions de temps mais seule la sortie de décembre a été sérieusement gênée par la météo du jour.

Le goulet à la barre d'Étel mesure environ 250 m de large, la marée remonte la ria mais y est ralentie, suffisamment pour qu'un retard soit remarqué d'aval en amont (*Tableau 1*).



Mais ces horaires ne doivent pas faire illusion : les heures comme les hauteurs sont fortement influencés par les phénomènes extérieurs et peuvent déconter l'observateur.

Date	météo	Basse mer à Saint-Guillaume, coefficient	Basse mer à Etel	visibilité
15/11/1998	ciel bleu, 5°C	10h00 59	08h43	bonne
13/12/1998	brouillard	08h15 43	07h05	mauvaise
10/01/1999	ciel dégagé, 4°C	06h19 45	04h59	bonne
21/02/1999	nuages, 10°C	03h55 88	02h23	moyenne
21/03/1999	nuages et vent, 10°C	15h20 104	14h10	moyenne

Tableau 1 : conditions d'observations lors des comptages nov. 1998-mars 1999

LES RESULTATS

Plongeon arctique *Gavia arctica*

La présence de plongeurs dans une rivière maritime n'est pas faite pour surprendre mais ici elle reste modeste. Conformément aux observations littorales hors du site privilégié de la baie de Quiberon, ce sont des isolés qui sont contactés dans la rivière d'Etel, à Saint-Cado et aussi haut qu'Ihuézic.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Plongeon arctique	0	1	2	0	0

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

Deux, trois, cinq... dix Grèbes castagneux plongent sous les poches des ostréicultures et pêchent dans les chenaux mais ce sont les deux étangs de Saint-Jean et Goh Lenn qui rassemblent l'essentiel des effectifs au début de la saison. Puis leur part diminue, les Castagneux, par groupes pouvant compter presque une cinquantaine d'individus, se dispersent dans la rivière.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Grèbe castagneux	267	181	252	87	1
part des étangs de Locoal %	73	43,6	329	356	/

Les effectifs reconnus ici dépassent le critère d'importance nationale estimé à 60 individus (Gillier & Mahéo, à paraître ; in Ruffray 1999). En mars, il ne reste que les estivants ou reproducteurs, plus discrets.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Grèbe huppé	43	58	100	45	3

Isolés ou groupés, sur les étangs ou le long de la rivière, les Grèbes huppés arrivés à la fin de l'été semblent vagabonds d'un site à l'autre mais préféreraient les chenaux larges. L'effectif bas de mars suggère que les oiseaux estivants sur Saint-Jean (15 le 18/04/99) ont passé ailleurs leur hiver.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Grèbe esclavon	0	0	0	0	1

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* Ce petit grèbe affirme sa présence depuis quelques années à l'occasion des comptages de janvier : 1 en 90, 2 en 97, 25 en 98. Il faut le chercher dans la partie moyenne de la rivière, particulièrement entre la pointe de la Vieille-Chapelle et Saint-Cado.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Grèbe à cou noir	6	4	15	6	3

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Grand Cormoran	340	165	110	92	48
Dortoirs de nov. à mars	320	86	74	115	42

Les comptages à la sortie de la rivière d'Étel effectués par un autre observateur dans le cadre de l'enquête des dortoirs hivernaux retrouvent le maximum de novembre que nous avons constaté en recensant les Grands Cormorans sur les bancs découverts, les roches de la rivière ou les étangs.

Il n'est pas si fréquent qu'un recensement systématique nous renseigne sur la présence hivernale des hérons sur le littoral morbihannais, l'Aigrette garzette *Egretta garzetta* et le Héron cendré *Ardea cinerea* se rencontrent dans des milieux divers, vasières de la rivière moyenne, herbus et chenaux. Au mois de mars, des nids de Héron cendré sont déjà visibles sur l'île de Riec'h récemment débroussaillée.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Aigrette garzette	76	94	116	128	90
Héron cendré	71	51	87	18	29

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

Sur l'étang de Saint-Jean :

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Cygne tuberculé	0	0	2	1	1

Bernache cravant *Branta bernicla*

La petite population inférieure à 200 oiseaux évolue dans la partie médiane de la rivière, principalement sur les vasières découvertes du triangle Nestadio - Berringue - pointe de la Vieille Chapelle.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Bernache cravant	64	187	138	64	0

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*


Le 13 décembre, les vasières de Berringue concentrent la moitié des tadornes de la rivière dont les effectifs ont considérablement augmenté depuis le comptage de novembre. Cependant, si l'espèce est visible, suivant les heures et les jours, sur l'ensemble des sites visités, herbus et vasières ont sa préférence.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Tadorne de Belon	78	356	537	276	138

Canard siffleur *Anas penelope*

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Canard siffleur	125	438	418	284	0

L'étang de Saint-Jean regroupe l'essentiel des effectifs aux heures de pleine mer ou de chasse, les Siffleurs affluant alors des vasières amont. En février, l'espèce quitte la rivière.



Sarcelle d'hiver *Anas crecca* et Canard colvert *Anas platyrhynchos* C'est surtout sur l'étang de Saint-Jean que sont faites les observations.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Sarcelle d'hiver	3	28	20	11	0
Canard colvert	2	2	30	32	10

Canard souchet *Anas clypeata*, Fuligule morillon *Aythya fuligula*

C'est l'absence de fuligule sur l'étang de Saint-Jean, les jours de nos comptages, qui est remarquable ! Et pourtant... Les Morillons étaient 50 le 25/12/1998 et 113 le 04/01/1999.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Canard souchet	0	5	0	0	0
Fuligule morillon	1	0	0	0	0

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*

Dès la mi-décembre, les premiers individus apparaissent dans les courants de la rivière d'Étel. Le 10 janvier, 29 individus se mêlent aux autres canards présents sur l'étang de Saint-Jean. La presque totalité des hivernants aura disparu lors du comptage du mois de mars.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Garrot à oeil d'or	0	8	63	24	1

Harle huppé *Mergus serrator*

Les oiseaux sont présents dès le mois de décembre : 8 individus peuvent être observés en face de Saint-Cado le 13/12. Les petits groupes se tiennent dans les chenaux sans afficher de préférence pour des sites particuliers. Comme l'espèce précédente, les Harles huppés s'attardent jusqu'en mars.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Harle huppé	0	17	33	23	16

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

Un contact fortuit à l'étang de Rodes n'est évidemment pas représentatif de sa présence réelle ; combien y en a-t-il à Saint-Jean ? à l'embouchure des ruisseaux ?

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Râle d'eau	1	0	0	0	0

Foulque macroule *Fulica atra*

Les effectifs augmentent dès le début de l'été, les étangs de Saint-Jean et Goh Lenn accueillent la quasi-totalité des foulques hivernantes de la rivière. Après deux hivers de plus faible fréquentation, les foulques ont afflué, les maxima de novembre-janvier placent la rivière d'Étel au second rang des sites morbihannais derrière le Golfe.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Foulque macroule	1070	1394	1475	481	102

Huitrier pie *Haematopus haematopus*

A ce jour, cette espèce s'aventure peu au nord du pont Lorois, jusqu'au chenal du Bisconte ; il a été signalé près de l'appontement en face d'Étel. L'évolution de la conchyliculture pourrait le confirmer plus en amont.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Huitrier pie	1	1	2	0	0

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* Les bras de mer entre Nostang et Landévant se révèlent lui être propices.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Avocette élégante	0	3	4	0	0

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* Il accompagne les Bécasseaux variables sur les grandes vasières ; son identification, malaisée par mauvaises conditions climatiques en minimise sans aucun doute le nombre ; surtout en novembre ?

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Grand Gravelot	31	267	93	0	0

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* Acquisition récente de la rivière, l'anse, disons de Nestadio, est l'endroit où il aime se reposer sur les laisses caillouteuses d'anciens parcs ostréicoles ; zones qu'il partage toujours avec le vanneau, de même que le reposoir du Gouarde.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Pluvier doré	16	70	65	0	0

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* Fréquente naturellement les vasières, mais les plus sableuses : facile à dire, pas à juger ! Donc disons plus spécialement au sud de Manéhellec, avec une préférence pour la proximité de la rivière proprement dite au niveau du Bisconte.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Pluvier argenté	59	18	518	0	0

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* A rechercher près des Pluviers dorés, mais en nombre plus important. Des reposoirs d'ampleurs diverses s'installent sur les herbues.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Vanneau huppé	103	70	415	65	0

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Bécasseau sanderling	2	0	0	0	0

Bécasseau variable *Calidris alpina* Sur les vasières de la rivière moyenne, ils vont, ils viennent, ils s'éparpillent en grand nombre en fonction de la marée sans se priver pour autant de mouvements de masse imprévisibles.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Bécasseau variable	3541	816	5133	0	0

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* Deux étangs en bordure de rivière, Saint-Jean et Kercadic se partagent les maigres observations ! C'est vrai que leur discrétion est reconnue. Il y en a sûrement d'autres, beaucoup ? ailleurs ?

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Bécassine des marais	0	2	4	0	0

Barge à queue noire *Limosa limosa* Elles fréquentent le bras de mer de Landévant en amont de la Quenouille de Sainte-Brigitte, de concert avec les Courlis cendrés : un point de convergence tant alimentaire que de reposoir pour des espèces aux habitudes proches. De plus, la zone est aérée avec possibilité de repli aux plus fortes marées au Gouarde ou sur les paluds au nord de Kerihuelo.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Barge à queue noire	10	0	2	0	0

Barge rousse *Limosa lapponica* Il est plus courant de l'observer, mais toujours en petit nombre, sur les vasières de Sainte-Hélène, à la fin de l'été.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Barge rousse	1	3	0	0	0

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Courlis corlieu	0	0	0	0	6

Courlis cendré *Numenius arquata* Il est sur les vasières, à l'est comme à l'ouest ; les regroupements les plus importants sont au nord de la Vieille Chapelle et bien sûr au reposoir du Gouarde ou, question de hauteur de marée, sur les paluds des deux bras de mer, nord de la rivière, au confluent desquels semblent commencer leurs agapes.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Courlis cendré	106	97	304	80	0

Chevalier gambette *Tringa totanus* Quand il est sur les vasières ou les reposoirs, c'est parfait et plutôt vers le nord de la rivière, hormis Saint-Cado, site historique ! Quand il est dans les petits étiers, et ils sont nombreux, comment le voir ou l'apercevoir, s'il ne se manifeste d'aucune façon ? Une petite centaine d'individus jusqu'au mois de janvier semblerait un total plus représentatif. Le niveau de la marée joue un rôle important pour cette espèce.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Chevalier gambette	40	9	97	36	12

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* Souvent entendu, peu vu ! Le brouillard n'excuse pas tout ! Pourtant, au confluent des deux bras de mer "d'en haut", les huit individus en général sont là, sinon ils sont à rechercher sur la vasière de Kercadic, l'étang en arrière de la digue étant parfait pour le repos et la tranquillité. Ils s'aventurent

aussi plus au sud dans l'anse de Nestadio et plus régulièrement dans le chenal de Bisconte.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Chevalier aboyeur	2	8	8	1	8

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* Il est toujours là où on ne l'attend pas, c'est à dire qu'il connaît tous les coins et recoins de cette rivière. Souvent seul, furtif et en tenue de camouflage, au bord de la vase ou des rochers. Ses effectifs pourraient atteindre la douzaine pour la rive.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Chevalier guignette	3	1	0	0	0

Tournepierré à collier *Arenaria interpres* Bien sûr ce n'est pas tout à fait son fief habituel, alors juste une incursion ? Ou bien des pionniers, à l'image de ceux qui auraient la nette tendance à investir la Petite Mer de Gâvres.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Tournepierré à collier	5	0	0	0	0

Goélands et Sternes : les recensements n'ont pas été exhaustifs, mais suffisants pour repérer les concentrations de Mouettes rieuses *Larus ridibundus*, Goéland argenté *Larus argentatus* et Goéland brun *Larus fuscus* qu'attirent les larges vasières découvertes comme celles de l'Istrec ou du Lédec Néguan.

L'étier de Pont Lesdour constitue pour les Mouettes rieuses un reposoir qui peut rassembler plusieurs milliers d'individus aux coefficients moyens. Les Goélands bruns, eux, se rassemblent devant Ihuézic. D'une façon simple, les Bruns se trouvent sur la partie haute de la rivière alors que l'on a plus de chance de compter des Argentés vers l'aval. Ces laridés sont vagabonds, soumis au cycle des marées, ils peuvent se replier sur les champs alentour ou bien sortir de la rivière.


	15/11/1998	13/12/1998	10/01/19	21/02/1999	21/03/1999
Mouette rieuse	4475	1017	1007	671	31
Goéland brun	478	190	233	54	42
Goéland argenté	732	70	223	96	25

Le Goéland marin *Larus marinus* est peu présent mais le Goéland cendré *Larus canus* se trouve tout au long de l'hiver, il a été, lui, systématiquement recherché et compté. Ses sites habituels sont les vases salées de Sainte-Hélène et le chenal de Saint-Jean.

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Goéland cendré	27	6	1	50	8
Goéland marin	0	0	2	0	0

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* Elle pêche dans les chenaux entre Kercadic, Beg er Vil et Saint-Cado, là où frétilent les petits poissons dont elle se nourrit. Moins d'un mètre d'eau suffit largement. Du pont Lorois à la barre, le menu semblerait plus copieux. Quoi de mieux alors qu'une bonne sieste sur les piquets émergents peu au dessus de l'eau à Kercadic ou sur des rochers ?

	15/11/1998	13/12/1998	10/01/1999	21/02/1999	21/03/1999
Neurone caugek	10	3	0	4	8



Goéland cendré sur les vases salées de Sainte-Hélène (Morbihan), hiver 1998-1999

Autres espèces : les Busards des roseaux de l'étang de Saint-Jean étaient au rendez-vous, au maximum de trois, il s'est toujours agi d'individus en plumage féminin ou immature. Autre habitué, le martin-pêcheur, sédentaire à Saint-Jean, il est aussi d'observation aisée sur les rives de Sainte-Hélène. Moins attendue est la présence d'un Faucon émerillon, de novembre à janvier, autour du moulin de Berringue, peut-être y chassait-il les Pipits farlouses sur les herbus ?

Bien sûr, l'ibis *Threskiornis aethiopicus* se devait de figurer dans la liste : 2 en janvier.

DISCUSSION

On le voit à la lecture des résultats ci-dessus, les oiseaux d'eau sont dispersés sur l'ensemble de la rivière médiane et haute, moins présents sur le goulet et la segment aval. C'est qu'ils profitent des nombreux visages de la rivière, d'accès et d'intérêts divers suivant leur nature et la hauteur de la marée : îlots et chenaux, vasières, étangs, herbus et étiers tourbeux accueillent à leur tour les espèces qui y trouvent des aires de gagnage. C'est dire qu'il est délicat, sauf à tenir compte des quelques observations en très petit nombre d'espèces plus franchement maritimes comme les huitriers, Sanderlings et tournepierres, de tracer un profil aval-amont du comportement alimentaire : les oiseaux se déplacent. Par contre, les places de repos sont mieux définies et plus spécifiques : étang de Saint-Jean pour les canards (mis à part les tadornes), herbus entre le Bras du Vieux Moulin et Goah Guillerm pour les limicoles de moyenne et grande taille (Gambette, courlis...), les petits limicoles font halte sur les rochers de Saint-Cado à Saint-Guillaume.

45 espèces ont été recensées entre novembre 1998 et mars 1999, toutes étaient déjà connues dans la rivière d'Étel. Pour les plongeurs et les grèbes, le tadorne, le Héron cendré, le Harle huppé et le Garrot à oeil d'or, la foulque, l'avocette, le Pluvier argenté, le Vanneau huppé, le Bécasseau variable, la bécassine, le Courlis cendré, les Chevaliers gambette et aboyeur les effectifs les plus hauts sont comptés au mois de janvier, c'est à dire à l'époque des recensements annuels WETLANDS INTERNATIONAL. L'Aigrette garzette, le Canard siffleur, la Sarcelle d'hiver, le Pluvier doré peuvent se rattacher à ce schéma. Quant au Grand Gravelot, la différence entre le comptage pourtant difficile de décembre et le résultat inférieur obtenu dans de bonnes conditions de visibilité en janvier rappelle les liens qui existent entre la rivière d'Étel et les sites proches de la rade de Lorient ; un jour ici, ils pouvaient être ailleurs au moment du comptage, ceci est valable pour d'autres limicoles (voir plus bas).

La présence de la Bernache cravant centrée sur décembre-janvier rejoint celle qui est constatée pour les hivernants de la baie de Quiberon et de la rade de Lorient.

Par contre, la présence du Grand Cormoran est nettement antérieure, les effectifs les plus forts ont été trouvés au mois de novembre tant sur le chemin du dortoir qu'en comptage diurne. Au mois de janvier la rivière d'Étel n'est qu'un site secondaire pour cette espèce dans le Morbihan (recensement hivernal des Grands Cormorans, voir AR VRAN MORBIHAN N°17).

Il a déjà été dit que les laridés n'ont pas été intégralement comptés, cependant la visite des sites principaux permet d'avancer que c'est à la fin de l'automne qu'ils sont les plus nombreux, la rivière reste cependant un site d'hivernage notable pour le G. brun.

Comparativement aux années antérieures (comptages WETLANDS et données personnelles), on remarque des effectifs étoffés de Tadorne de Belon, de Foulque macroule, de Courlis cendré, l'affirmation du Grèbe à cou noir, du Harle huppé, du Garrot à oeil d'or et du Pluvier doré, une évaluation supérieure du Chevalier gambette, de plus la Barge à queue noire l'avocette se montrent timidement. Manquent à l'appel les Fuligules milouin et morillon et quelques Barges rousses parfois relevées.

La rivière d'Étel est loin d'être un système clos, indépendant des sites fonctionnels voisins. Peut-être à cause d'une disproportion entre les aires de gagnages et la surface des reposoirs disponibles de nombreux limicoles quittent la ria à la pleine mer et filent vers l'ouest. Des observateurs placés à Linès / Gâvres, c'est à dire au bord de la Petite Mer entendent alors le vol de groupes de dizaines et centaines de petits limicoles qui ont suivi la dune et se posent sur la vasière encore découverte : les Bécasseaux variables en constituent l'essentiel mais s'y mêlent des Grands Gravelots et des Pluviers argentés, des Bécasseaux sanderlings qui peuvent venir de la plage du Magouero / Plouhinec, les vanneaux accompagnent le mouvement, plus quelques barges

et Gambettes. Au retour, les ételois quittent les gâvrais et stationnent sur les rochers de Saint-Cado à Saint-Guillaume, prêts à prendre leur essor et se disperser à mesure que les bancs et les vasières de l'amont sont libérés par le reflux. Le décalage des marées entre la Petite Mer et la rivière d'Étel entre elles et par rapport à la mer complique les déplacements de ces oiseaux, il y a des jours où la ria ne se vide pas ! Cet aspect primordial a depuis bien longtemps été assimilé par les oiseaux qui profitent ainsi des possibilités de gagnage qui leur sont offertes.

Autre espèce dépendante des marées, la Bernache cravant n'est pas fidèle à la rivière, elle s'en éloigne facilement, il est vrai que les bandes visibles ici ne représentent qu'une faible fraction des effectifs de Plouharnel ou Gâvres.

Le Grand Cormoran suit un autre rythme : le dortoir hivernal est situé sur l'îlot extérieur de la rivière de Roëllan alors qu'en période estivale un dortoir existe à l'étang de Saint-Jean, qui regroupe une quarantaine d'individus. Quand les Grands Cormorans rejoignent Roëllan, isolés ou par petits groupes, ils peuvent être comptés de la Roche Sèche / Erdeven ou du Bout du Hâvre dans les deux heures qui précèdent le coucher du soleil.

Les comptages réalisés cet hiver ont mobilisé de novembre à mars de cinq à une douzaine de personnes, effort qui a sans doute amené un état satisfaisant de la présence sur la rivière d'Étel mais qu'il n'est pas envisageable de reconduire. Il est alors souhaitable de suivre un protocole plus léger, facilement reconductible, apte à rendre rapidement une image de l'avifaune résidente à un moment donné. Il faut dans cette idée tenir compte des habitudes des oiseaux :

→ les petits limicoles seront attendus aux reposoirs passagers de Saint-Cado et Plouhinec, avant leur dispersion au début de marée descendante ;

→ les courlis et autres limicoles repérables par leur taille supérieure pourront être comptés sur les vasières ou, plus concentrés, les reposoirs amont (le Gouarde, le Gouhel) ; les plongeurs, grèbes, cormorans, hérons et autres canards, foulques, goélands, mouettes et sternes seront notés sur leurs sites privilégiés (carte 2).

Ainsi, deux équipes simultanément, voire une personne sur deux demi-journées parcoureront la rivière d'Étel ; pas plus qu'un autre ce protocole n'est sans faille, combien de guignettes nous échapperont ? du moins il aura l'avantage de se prêter à des comparaisons interannuelles, à moins qu'il ne prenne aux oiseaux la fantaisie de changer leurs façons...

CONCLUSION

Nous avons suivi l'évolution des effectifs d'oiseaux hivernants dans la rivière d'Étel à travers cinq comptages mensuels, 45 espèces ont été recensées.

Les espèces suivantes atteignent le critère d'importance nationale (GILLIER, MAHEO, GABILLARD, 2000) :

- * le Grèbe castagneux, 252 individus en janvier 1999 ;
- * le Tadome de Belon, 537 individus en janvier ;
- * le Canard siffleur, 418 en janvier (critère France 1% 420 individus) ;
- * la Foulque macroule, 1 475 en janvier ;
- * le Courlis cendré, 304 en janvier ;
- * les comparaisons manquent avec d'autres sites pour le Goéland brun dont les effectifs automnaux puis hivernants semblent relativement élevés.


L'évolution future de plusieurs espèces mérite d'être suivie : il s'agit du Grèbe à cou noir, du Garrot à oeil d'or et du Harle huppé (pour lequel la rivière avait atteint le seuil d'importance nationale en janvier 1998) dont les effectifs, encore modestes, tendent à s'affirmer depuis quelques années voire de l'Huitrier pie et du Tournepierrre à collier qui s'ouvriraient de nouvelles places sur la rivière...

La présente synthèse a été réalisée grâce aux observations de Pierre Corlou, Jacques Corbière, Robert Hegen, Patrick Bailleul, Laurent Teignier, Philippe Le Strat, Nathalie Derout, Franz Urvoaz, Loïc Hamet, Gwénaél Dérian, Yannick Ordureau, Alain Quilleré, Emmanuel Plantier, Benoit X., YX, les observateurs de LOISIRS COOPERATIFS particulièrement attentifs au Goéland cendré ; René Bozec et Guillaume Gélinaud ont apporté leur connaissance de la rivière d'Étel.

Coordination : Patrick BAILLEUL, Jacques CORBIÈRE et Gwénaél DÉRIAN

BIBLIOGRAPHIE :

- DEUCENINCK (B.) et *al* 1996-1998.- Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant à la mi-janvier 1996 - 1997 - 1998. Wetlands International / LPO / O.N.C.
- GILLIER (J-M.), MAHEO (R.), GABILLARD (F.) 2000.- Les comptages d'oiseaux d'eau hivernant en France. Alauda 68 : 45-54.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON.- AR VRAN MORBIHAN n° 9 à 17.
- MAHEO (R.) 1996-1998.- Limicoles séjournant en France. Janvier 1996 - 1997 - 1998. Rapport B.I.R.O.E. / O.N.C. / Université Rennes I.
- RUFRAY (X.) 1999.- Statut des grèbes hivernants en France période 1993-1997. Ornithos 6-1 : 32-39.



Rivière d'Étel Hiver 1998/99	Total corrigé du 15/11/1998	Total corrigé du 13/12/1998	Total corrigé du 10/01/1999	Total corrigé du 21/02/1999	Total corrigé du 21/03/1999
Plongeon arctique	0	1	2	0	0
Grèbe castagneux	267	181	252	87	1
Grèbe huppé	43	58	100	45	3
Grèbe esclavon	0	0	0	0	1
Grèbe à cou noir	6	4	15	6	3
Grand Cormoran	340	165	110	92	48
Aigrette garzette	76	94	116	128	90
Héron cendré	71	51	87	18	29
Cygne tuberculé	0	0	2	1	1
Bernache cravant	64	187	138	64	0
Tadorne de Belon	78	356	537	276	138
Canard siffleur	125	438	418	284	0
Sarcelle d'hiver	3	28	20	11	0
Canard colvert	2	2	30	32	10
Canard souchet	0	5	0	0	0
Fuligule morillon	1	0	0	0	0
Carrot à oeil d'or	0	8	63	24	1
Harle huppé	0	17	33	23	16
Anatidés	273	1041	1241	715	166
Râle d'eau	1	0	0	0	0
Foulque macroule	1070	1394	1475	481	102
Huitrier pie	1	1	2	0	0
Avocette élégante	0	3	4	0	0
Grand Gravelot	31	267	93	0	0
Pluvier doré	16	70	65	0	0
Pluvier argenté	59	18	518	0	0
Vanneau huppé	103	70	415	65	0
Bécasseau sanderling	2	0	0	0	0
Bécasseau variable	3541	816	5133	0	0
Bécassine des marais	0	2	4	0	0
Barge à queue noire	10	0	2	0	0
Barge rousse	1	3	0	0	0
Courlis corlieu	0	0	0	0	6
Courlis cendré	106	97	304	80	0
Chevalier gambette	40	9	97	36	12
Chevalier aboyeur	2	8	8	1	8
Chevalier guignette	3	1	0	0	0
Tournepierre à collier	5	0	0	0	0
Limicoles	3920	1365	6645	182	26
Total (hors laridés...)	6067	4354	10043	1754	469
Monette rieuse	4475	1017	1007	671	31
Goéland cendré	27	6	1	50	8
Goéland brun	478	190	233	54	42
Goéland argenté	732	70	223	96	25
Goéland marin	0	0	2	0	0
Sterne caugek	10	3	0	4	8
Sterne pierregarin	0	0	0	0	0
Total espèces	11789	5640	11509	2629	583

Tableau 2 : Résultats des comptages des oiseaux d'eau dans la rivière d'Étel (Morbihan), hiver 1998-99

Documents

Baie de Vilaine (Morbihan)

Stationnements d'oiseaux d'eau en milieu maritime (dénombrements mensuels)

Saison 1999-2000

coordination : Roger Mahéo, Université de Rennes I station biologique de Bailleron,
56860 Séné

	10/99	11/99	12/99	01/00	02/00	03/00
Plongeon catmarin		1				
Plongeon arctique				3		
Plongeon imbrin				2		
Plongeon sp.		2		1		2
Grèbe huppé	98	1286	15+	220	34	132
Grèbe esclavon			1	7		14
Grèbe à cou noir	1	21	12+	45	21	16
Grèbe castagneux	9	16	15	12	17	1
Aigrette garzette	n.c.	107	69	58	48	108
Spatule blanche		4	9			
Cygne tuberculé			2			
Bernache cravant	121	1386	1440	1018	1213	1340
Bernache nonnette		1				
Tadome de Belon	121	955	537	870	617	538
Canard colvert	549	538	637	272	73	78
Sarcelle d'hiver	2	14	58	65	87	6
Canard chipeau						4
Canard siffleur	18	107	56	3	30	
Canard pilet	26	360	446	453	443	129
Canard souchet		18	48	140	34	
Fuligule milouinan		903	1100	805	860	620
Fuligule milouin		10	2			
Fuligule morillon		41	57	15	20	
Eider à duvet	2	22	60	21	35	10
Macreuse noire	166	1105	290	733	225	168
Macreuse brune				6	10	
Garrot à œil d'or						1
Harle huppé		5	21+	158	52	83
Foulque macroule	1	125	11	29	16	16
Huitrier pie	955	803	1053	964	742	448
Pluvier argenté	40	73	33	62	43	88
Grand Gravelot	1453	813	963	496	651	419
Tournepierre	147	271	279	329	384	174
Courlis cendré	390	326	336	317	286	147
Barge à queue noire	7					
Barge rousse	32	8	7	25	10	
Chevalier gambette	208	151	133	174	159	42
Chevalier aboyeur	3	1		1	2	1

	10/99	11/99	12/99	01/00	02/00	03/00
Chevalier culblanc	1	1	1			
Chevalier guignette	4	5	1	1	6	1
Combattant varié					64	
Bécasseau maubêche	2	138	86	120	102	181
Bécasseau variable	1632	6242	6970	6060	8070	6440
Bécasseau minute	4					
Bécasseau sanderling	6	1		22		
Avocette élégante	126	960	982	1204	1317	340
Vanneau huppé	129	630	575	2022	803	23
Pluvier doré	5	9		214	323	
Mouette pygmée					3	

Baie de Quiberon (Morbihan)

Stationnements d'oiseaux d'eau en milieu maritime (dénombrements mensuels)

Saison 1999-2000

coordination : Roger Mahéo, Université de Rennes I station biologique de Bailleron,
56860 Séné

	10/99	11/99	12/99	01/00	02/00	03/00
Plongeon catmarin		1				1
Plongeon arctique				43		1
Plongeon imbrin				13		1
Plongeon sp.						
Grèbe huppé	20	9	22	131	n.c.	28
Grèbe jougris				3		
Grèbe esclavon		4		25	n.c.	4
Grèbe à cou noir	50	22	34	224	n.c.	156
Grèbe castagneux	124	162	99	23	n.c.	14
Aigrette garzette	n.c.	99	56	73	19+	77
Spatule blanche			2		10	
Cygne tuberculé				1		
Bernache cravant	300	2102	1710	904	1142	1908
Tadome de Belon		89	132	326	262	203
Canard colvert	44	25		111	24	2
Canard siffleur		7				
Eider à duvet				7	1	
Macreuse noire				36		
Garrot à œil d'or				1		
Harle huppé	3	56	24+	253	n.c.	131
Foulque macroule	100+	130	92	94	80	45
Huitrier pie	810	675	538	947	790	480
Pluvier argenté	55	170	238	187	180	160
Grand Gravelot	760	346	570	732	230+	386
Gravelot à col. Int.	10	3	5	5		
Tournepipier	380	281	177	352	160+	209
Courlis cendré	84	111	82	72	62	53
Barge à queue noire						1
Barge rousse	22	52	37	62	31	22
Chevalier gambette	96	68	44	78	57	54
Chevalier aboyeur	9					
Chevalier culblanc					1	
Chevalier guignette	2	1	2	1	1	
Bécasseau maubêche		64	4	100	83	98
Bécasseau variable	810	2980	2820	2851	2550	1380
Bécasseau sanderling	677	510	860	820	523	910
Bécasseau violet				2		2
Vanneau huppé	76	89	120	170	48	0
Pluvier doré	7	41	64			

