

AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

Ti ar Vro B.P. 103
29833 CARHAIX cedex



N°20 ANNEE 2001

Sommaire du numéro 20 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 novembre 1999 à 15 mars 2000	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 15
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 21
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 24
Notes de terrain	
Mystérieux oedicnème	page 29

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE : 16 NOVEMBRE 1999 A 15 MARS 2000

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
ARTEL Jean-Pierre (mairie de Sarzeau), BOZEC René, BAILLEUL Patrick,
CORBIERRE Jacques, CORLOU Pierre, DERIAN Gwenael, ERMEL Gérard,
EVANNO Guillaume, GUERIN Stéphane, GUILLEMOT Francis, HAMET Loïc,
ILIOU Bernard, LAMOUR Joël, LEMONNIER Françoise et Jean-Luc, MAHEO Roger,
MOUCHEL Yann, ORDUREAU Yannick, PHILIPPON Patrick, SIMON Nathalie,
TEIGNER Laurent, URVOAZ François... sauf erreur ou omission !

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton (Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre au 15 mars.

Les observations sont transmises au coordonnateur morbihannais sur papier ou disquette informatique en respectant l'ordre suivant :

ESPECE ou code	date	lieu-dit (voir carte I.G.N)	commune	effectif	remarques
48005	04/05/1999	Keriel	162	4	un adulte ravitaille trois jeunes dans une lande

Les listes des codes utilisés pour noter les espèces et répertorier les communes sont disponibles aux réunions du G.O.B à Brec'h.

Illustrations : couverture Patrick Bailleul ; p10 Tadornes devant l'île de Niheu, Patrick Bailleul ;
photographie p 29, R. Bozec.

AR VRAN MORBIHAN N°20

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

D'une manière générale, peu d'observations de plongeurs en mer ont été rapportées cet hiver. Les observateurs étaient retenus sur d'autres terrains... où ils ont pu détailler de trop près ces plongeurs mazoutés.

Plongeur indéterminé *Gavia sp.* (9 données)

Il s'agit pour une part d'oiseaux vus en guet à la mer au mois de janvier sur la côte ploemeuroise et sur la rivière d'Etel jusqu'à la fin de la période.

Plongeur catmarin *Gavia stellata* (7 données)

- 1 au Petit Mont / Arzon, le 07/11/1999.
- pointe du Talut / Ploemeur en guet à la mer entre le 31/12/1999 et le 13/01/2000, 1, 3 et 1 individus.
- 1 sur le Blavet maritime à Lorient entre les 17 et 24/01. L'oiseau porte des taches d'hydrocarbures sur le haut de la poitrine.

Plongeur arctique *Gavia arctica* (8 données)

La baie de Quiberon et ses entours restent le secteur privilégié pour l'observation de l'espèce, ainsi 43 individus sont contactés à la mi-janvier dans le secteur Téviec-Portivy. C'est là l'unique mention d'une concentration puisque les autres données concernent des oiseaux isolés : 1 juvénile à Banastère le 18/11/1999, 1 au Conguel / Quiberon le 26/12, 1 à Saint-Guillaume / Plouhinec le 29/12 (il est taché de mazout sur la poitrine), maximum de 4 le 04/12 et 3 le 04/03/2000 en guet à la mer devant la pointe du Talut à Ploemeur, 1 les 02/01 et 23/01 à Porh Guerh / Gâvres.

WETLANDS INTERNATIONAL : 52 dont 43 dans la baie de Quiberon.

Plongeur imbrin *Gavia immer* (4 données)

Les rares observations ont été réalisées au début de l'hiver seulement :

- pointe Saint-Pierre / Locmariaquer, 20 le 17/11/1999.
- pointe du Conguel / Quiberon, 1 le 18/11.
- Portivy / Saint-Pierre-Quiberon, 1 le 19/12.


L'espèce n'est pourtant pas absente de nos côtes ensuite puisqu'elle est détectée lors des comptages de mi-janvier.

WETLANDS INTERNATIONAL : 18 dont 13 dans la baie de Quiberon.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (41 données)

La présence n'a pas été cet hiver suivie sur la rivière d'Etel, on peut toutefois noter une

assez faible présence sur les étangs de Saint-Jean et Goh-Lenn / Locoal-Mendon : 5 et 20 le 19/12/1999 et 18 le 22/01/2000. Les Grèbes castagneux se dispersent sur la rivière, entre les différents bras et anses. Cette remarque est valable pour la rade de Lorient où la concentration initiale de Pen Mané ne dure qu'une partie de l'hiver.



Grèbe castagneux à Pen Mané / Locmiquélic ; hiver 1999-2000

WETLANDS INTERNATIONAL : 436 dont 115 dans la rade de Lorient, 135 dans la rivière d'Etel, 133 dans le Golfe du Morbihan.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(33 données)

Quelques concentrations : environ 600 individus à la Mine d'Or / Pénestin les 03 et 22/11/1999, 29 à Sterbouët / Locmiquélic le 25/11, 35 le 26/12 au Conguel / Quiberon, dont 3 mazoutés et 20 le même jour à Penthièvre / Saint-Pierre-Quiberon.

L'hivernage sur l'étang au Duc de Ploërmel a rassemblé des effectifs comparables à ceux de l'hiver précédent : 57 le 22/11 et 48 le 03/12.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 176 dont 545 dans le Golfe du Morbihan et 220 dans la baie de Vilaine.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

(2 données)

- Plage de Kerpenhir / Locmariaquer, 1 le 10/12/1999.
- Baie de Penthièvre / Saint-Pierre-Quiberon, 3 le 26/12.

WETLANDS INTERNATIONAL : 62 répartis de la baie de Quiberon à la Vilaine.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(19 données)

300 le 26/12/1999 à Penthièvre / Saint-Pierre-Quiberon. Quelques dizaines hivernent dans la rivière d'Etel, ex : 30 le 13/01/2000.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 865 dont 1 469 dans le Golfe du Morbihan.

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus*

(1 donnée)

1 cadavre propre le 15/12/1999 sur la grande plage de Plouhamel.

Fou de Bassan *Sula bassana*

(5 données)

Devant la pointe du Talut / Ploemeur, l'espèce n'est contactée qu'en petit nombre : 18 le 28/11/1999.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

(39 données)

Localité	Date	Effectif
Rade de Lorient, total des dortoirs	07/11	388
	06/03	200
Etang de la Forêt / Brandivy	23/01	42
Saint-Goustan / Auray	21/02	37
Rivière d'Étel	21/11	53
	05/12	142
	17/01	81
	06/02	57
	05/03	50

Dortoirs de Grands Cormorans dans le Morbihan ; hiver 1999-2000

Le dortoir de Brandivy est une nouveauté par rapport à l'enquête de l'hiver 1998-1999. Son existence rappelle l'intérêt qu'il y aurait à vérifier la présence de dortoirs continentaux passés jusqu'ici inaperçus.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

(5 données)

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

(6 données)

- 1 à 2 individus séjournent entre les étangs de Lannéac / Ploemeur et du Loc'h / Guidel, observés entre les 16/11/1999 et 20/12.
- à Saint-Jean / Locoal-Mendon, 1 individu le 19/12.
- A Fetan Levec / Erdeven, 1 le 20/12.

Héron gardeboeufs *Bubulcus ibis*

(1 donnée)

3 le 04/03/2000 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc, ce qui en fait l'effectif maximum observé dans le département et presque une donnée printanière ! Une nouvelle espèce à suivre ?

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

(49 données)

Localité	Date	Effectif
Rivière d'Étel	21/11	163
Ile Fandouillec	04/12	142
Ile Riec'h		8
Ile Niheu	02/01	155
Ile Fandouillec	27/02	40
Ile Niheu	27/02	83

Rivière d'Etel	05/03	113
----------------	-------	-----

Dortoirs d'Aigrettes garzettes dans la rivière d'Etel (Morbihan) ; hiver 1999-2000

Localité	Date	Effectif
île de Kerner	23/12	58
Kerzo	31/12	20
île de Kerner	01/01	59
île de Kerner	09/01	74
île de Kerner	26/01	74
Kerzo		14
île de Kerner	24/02	94
Kerzo		0

Dortoirs d'Aigrettes garzettes dans la rade de Lorient (Morbihan) ; hiver 1999-2000

Le dortoir de Kerner est pour le moins plurispécifique puisqu'aigrettes, Hérons cendrés, Ibis sacrés et Spatules blanches s'y perchent sur les cyprès.

Une part de ces comptages crépusculaires a été effectuée dans le cadre d'un travail d'une chercheuse du Muséum National d'Histoire Naturelle (C. Voisin) dans lequel nous avons vu l'occasion de parfaire notre connaissance sur les habitudes de l'espèce. Si les comptages dans la rade de Lorient sont assez aisés du fait de la concentration des oiseaux sur un ou deux sites faciles d'accès il en est autrement de la rivière d'Etel où les îlots de la partie médiane sont diversement utilisés suivant des variables malaisées à comprendre : la marée y a sa part sans doute, mais aussi l'avancement dans la saison, le vent, le dérangement, les effectifs présents... l'usage d'un canot a été très utile.

Date	Effectif
02/11	108
04/12	134
15/01	88

*Aigrettes garzettes, comptages diurnes dans la rade de Lorient (Morbihan)
hiver 1999-2000*

Grande Aigrette *Egretta alba*

(2 données)

Un individu le 15/12/1999 au Petit Loc'h / Guidel.

Héron cendré *Ardea cinerea*

(13 données)

De ce petit nombre de données, retenons 14 individus le 28/11/1999 à Melrand.

Sur la héronnière de Kerzo / Port-Louis, des aires sont déjà rénovées le 30/01/2000 et deux couveurs notés le 20/02.

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*

(1 donnée)

Observation exceptionnelle d'un Ibis falcinelle au Duer / Sarzeau le 12/12/1999.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(6 données)

Les effectifs importants restent localisés à l'est du département : 169 sur les marais de Billiers entre les Granges et les Salles le 09/01/2000 ou 148 près du bourg d'Ambon le 13/02.

Un individu passe l'hiver dans la rade de Lorient, premier cas constaté.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

(14 données)

En dehors des hivernantes de la presqu'île de Rhé et du Golfe du Morbihan (WETLANDS INTERNATIONAL : 6) :

- salines de Camac, 8 le 05/03/2000
- un individu passe l'hiver dans la rade de Lorient, premier cas constaté. Une seconde spatule a été contactée durant toute la période mais par intervalles. Il s'agit de deux jeunes individus.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

(2 données)

Oies grises *Anser sp*

(0 donnée)

Bernache cravant *Brenta bernicla*

(44 données)

Effectifs maxima en novembre dans la rade de Lorient, la baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan avec respectivement 2 085, 2 102 et 14 500 individus (WETLANDS INTERNATIONAL).

La part des individus de premier hiver est élevée : 28,8% dans la rade de Lorient le 07/11. La situation dans la rade de Lorient a été marquée par un amaigrissement assez précoce des effectifs et une dispersion de petites bandes de centaines ou dizaines d'individus.

Bernache cravant sous-espèce à ventre pâle *B. b. hrota*

(1 donnée)

Dans la rivière d'Auray, un individu de cette race est observé entre les 17/11/1999 et 05/01/2000.

Bernache du Pacifique *B. b. nigricans*

(1 donnée)

Le Ruault / Sarzeau, un individu le 08/12/1999.

Tadorne sp *Tadorna tadorna* X *Tadorna ferruginea*

(1 donnée)

Le 16/11/1999 à Pénerf / Damgan : peut-être un hybride Tadorne x Casarca. Ce n'est pas la première mention d'un tel animal (voir AR VRAN MORBIHAN 16).


Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(22 données)

Un individu atypique retient l'attention de l'observateur sur le marais de Pomper / Baden : ce tadorne arbore un collier blanc sur son cou noir.

Des parades à Cambon / Ambon le 13/01/2000 et des individus explorant les terriers dans les dunes d'Erdeven le 06/03/2000 ouvrent les comportements reproducteurs.

WETLANDS INTERNATIONAL : 4 612 individus.



Répartition des *Tadornes de Belon* à la mi-janvier 2000 dans le Morbihan (source : *Wetlands International*).

Canard siffleur *Anas penelope*

(27 données)

A signaler : la fréquentation par l'espèce de l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon est assez faible, les Siffleurs sont contactés au Gouarde / Nostang et sur les vasières de Keriguénen / Locoal-Mendon. L'orientation plus marquée de l'étang pour la chasse n'est sans doute pas étrangère à cette situation nouvelle.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 190 dont 815 dans le Golfe du Morbihan et 301 dans la rivière d'Étel.

Canard chipeau *Anas strepera*

(2 données)

Deux observations isolées : 1 le 20/11/1999 dans la Petite Mer de Gâvres et un couple au marais de la Brousse / Sarzeau le 06/03/2000.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(20 données)

Les données sont rares en dehors du Golfe du Morbihan et de Rhuys et manquent pour la première partie de l'hiver. Notons 27 individus sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 19/11/1999. Plusieurs dizaines ont du séjourner à Kerguelen / Larmor-Plage.

En période prénuptiale :

- rivière de Sarzeau, 130 le 16/02/2000, 200 le 19/02, 140 le 14/03.
- rivière de Noyal, 130 le 04/03.


WETLANDS INTERNATIONAL : 1 941 dont 1 840 dans le Golfe du Morbihan.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

(15 données)

416 sur l'étang au Duc de Ploërmel le 2/11/1999.

WETLANDS INTERNATIONAL : 3 831 individus comptés.



*Répartition des Canards colverts à la mi-janvier 2000 dans le Morbihan
(source : Wetlands International).*

Canard pilet *Anas acuta*

(9 données)

Ces données ne proviennent que des rivières de Pénerf et Sarzeau : 100 le 26/02/2000 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc et 100 à la Métairie du Pont / Noyal le 12/03.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 043 dans le Golfe du Morbihan et 453 dans la baie de Vilaine.

Canard souchet *Anas clypeata*


(7 données)

100 le 13/03/2000 à la Métairie du Pont / Noyal.

WETLANDS INTERNATIONAL : 492 dans le Golfe du Morbihan et 140 dans la baie de Vilaine.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

(25 données)



Fuligules milouins sur l'étang des Ducs / Vannes (Morbihan) : novembre 1999 – janvier 2000


Le fait marquant est le retour de forts effectifs sur l'étang aux Ducs de Vannes, l'hivernage est faible sur le Ter / Ploemeur. 40 Milouins le 18/01/2000 sur l'étang de Goh Lenn / Locoal-Mendon.

WETLANDS INTERNATIONAL : 368 dont 281 dans le Golfe du Morbihan.

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

(20 données)

La rade de Lorient, et particulièrement l'étang du Ter / Ploemeur, reste le principal site d'hivernage morbihannais ; les comptages n'ont pu cependant être continus cet hiver.



Fuligules morillons sur l'étang du Ter / Ploemeur (Morbihan) ; décembre 1999 – mars 2000

WETLANDS INTERNATIONAL : 141 dont 80 dans la rade de Lorient.

Fuligule milouinan *Aythya marila* (7 données)
WETLANDS INTERNATIONAL : 805 dans la baie de Vilaine.

Eider à duvet *Somateria mollissima* (5 données)

- Dans l'estuaire de la Laïta / Guidel, 3 individus le 27/11/1999.
- A Portivy / Saint-Pierre-Quiberon, 1 mâle le 19/12.
- A Treutan / Damgan, 10 le 08/01/2000 et 27 le 13/02.

WETLANDS INTERNATIONAL : 34 dont 21 dans la baie de Vilaine.

Harelde boréale *Clangula hyemalis* (4 données)

- 2 à la pointe de Penvins / Sarzeau, le 02/01/2000.
- Un groupe séjourne devant Suscinio / Sarzeau au mois de janvier : 6 le 03/02/2000 dont 5 femelles et 1 mâle, 8 les 16/02 et 21/02 (7 immatures ou femelles, 1 mâle).

Macreuse noire *Melanitta nigra* (8 données)

- le guet à la mer à la pointe du Talut détecte 17 Macreuses noires le 20/11/1999, 1 le 21/11 et 2 le 13/01/2000.
- à Kersahu / Gâvres, une femelle les 01/01 et 20/01, après une tempête.
- 4 individus à la pointe de Kervoyal / Damgan le 13/01 et un cadavre.

WETLANDS INTERNATIONAL : 74 dont 733 dans la baie de Vilaine.

Macreuse brune *Melanitta fusca* (3 données)

- aux Granges / Billiers, 1 le 03/01/2000 dans un pré inondé.
- à Treutan / Damgan, 5 le 08/01 et 3 le 13/02.

WETLANDS INTERNATIONAL : 6 dans la baie de Vilaine.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* (4 données)

- 1 seul dans la Petite Mer de Gâvres le 21/11/1999.
- dans la rivière d'Etel : 9 à la pointe de Listrec / Locoal-Mendon le 22/01 et 9 à Kerihuelo / Landévant le 19/01.
- 1 à Banastère / Le Tour-du-Parc le 12/803.


WETLANDS INTERNATIONAL : 630 dont 613 dans le Golfe du Morbihan.

Harle huppé *Mergus serrator* (14 données)

- dans la rivière d'Etel : 3 à Kerihuelo / Landaul le 15/11/1999 et 13 à Saint-Cado / Belz le 19/12. 5 individus sur la rivière le 19/01/2000, 1 à la pointe du Levein / Belz le 22/01 et 9 à Saint-Guillaume / Plouhinec le 27/02.

Les autres observations concernent des groupes de petite taille proches des concentrations du Golfe (Banastère le Tour-du-Parc, Toulvern / Baden, Penvins / Sarzeau), les séjours ne sont pas constatés sur d'autres sites (rade de Lorient, Locmariaquer).

WETLANDS INTERNATIONAL : 2 173 dont 1 590 dans le Golfe du Morbihan.



*Répartition des Harles huppés à la mi-janvier 2000 dans le Morbihan
(source : Wetlands International).*

AR VRAN MORBIHAN N°20

Groupe n° 2- Des rapaces aux rallidés.

Choix et rédaction établis par Franz URVOAZ.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (21 données)

Communes où sont effectuées des observations : Sauzon/ Belle-Ile, Le Palais/ Belle-Ile, Gâvres, Riantec, Locmiquélic, Locoal Mendon, Ploemeur, Sarzeau, Le Tour Du Parc et Erdeven.

Parades et cantonnements des couples sont notés en février et mars.

Un individu noté le 26/ 02/ 00 à Kervazezen/ Ploemeur : 1 mâle au plumage tricolore typique et présentant des marques jaunâtres sur la tête étendues.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (7 données)

Parmi ces données cinq concernent Belle-Ile et plus particulièrement la commune de Sauzon entre novembre 1999 et février 2000

Les autres données d'hivernage possible proviennent de Languidic et de Saint Abraham.

Autour des palombes *Accipiter gentilis* (1 donnée)

Une femelle est observée le 16/11/1999 sur la commune de Colpo.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* (8 données)

Communes concernées : Sauzon, Locmaria, Brec'h, Kervignac, Riantec, Saint Barthélémy, Sarzeau.

Buse variable *Buteo buteo* (5 données)

Peu de données pour un rapace pourtant facilement observable. Sans doute n'est-il pas noté de façon systématique.

Communes citées :Baud, Muzillac, Hennebont, Sarzeau, Le Tour du Parc.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (3 données)

La remarque concernant la Buse variable est encore plus justifiée pour le faucon crécerelle.

Communes concernées : Bangor / Belle-Ile, Sauzon / Belle-Ile (où 2 couples en parade sont notés les 28/02 et 03/03/2000) et Brec'h.

Faucon émerillon *Falco columbarius* (1 donnée)

Cette unique donnée provient de la plage d'Etel où 1 oiseau chasse le 13/12/1999.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

(1 donnée)

Cette observation est faite le 19/03/2000 à Kerouac'h/ Guidel.

Faucon sacre *Falco cherrug*

(2 données)

Dans les deux cas les données proviennent du Grand Loc'h / Guidel et sont effectuées par le même observateur qui peut à juste titre s'interroger sur l'origine de l'oiseau vu les 11/11/1999 et 15/12/1999.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(2 données)

La première observation est faite au Duer / Sarzeau le 18/11/1999, la deuxième provient de Boderlann / Sauzon sur Belle-Ile où 1 femelle chasse après un groupe de vanneaux le 19/11/1999. Aucune observation donc n'est rapportée au cœur de l'hiver.

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

(3 données)

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(1 donnée)

Deux individus sont entendus simultanément au milieu de la roselière au Champ des Martyrs / Brec'h le 09/02/2000.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus*

(5 données)

Foulque macroule *Fulica atra*

(28 données)

Les maxima sont atteints à:

- Goh Lenn / Locoal Mendon le 15/11/1999 avec 570 individus.
- étang de Saint Jean / Locoal Mendon le 15/11 avec 2200 individus.
- Quélisoye / Larmor Plage le 02/12 avec 1272 individus.
- étang de Toulvern / Baden le 11/12 avec 980 individus.

Groupe n° 3 De l'Huîtrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Yannick Ordureau

Huîtrier pie *Haemotopus ostralegus*

(18 données)

145 sur la plage de Portivy / Saint-Pierre-Quiberon le 18/11/1999, 120 le 08/01/2000 à Bétahon / Ambon et 200 le 08/01 à Penherf / Kervoyal

WETLANDS INTERNATIONAL : 2144 dont 947 en baie de Quiberon et 964 en baie de Vilaine.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

(6 données)

Comme l'an dernier, l'Echasse blanche a hiverné à Pen-Mané / Locmiquélic. Un individu jusqu'au 12/03/2000.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(15 données)

Les plus gros effectifs sont notés en Rivière de Pénerf : 250 le 18/11/1999, 56 le 11/12/99 et aussi à la Métairie du Pont en Noyalo : 253 le 12/03/2000.

L'avocette est également présente en rade de Lorient : 8 individus le 12/12 au Rohu / Lanester, 3 à Saint-Sterlin / Kervignac le 16/12

WETLANDS INTERNATIONAL : 2503 dont 1294 dans le golfe du Morbihan et 1204 en baie de Vilaine.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

(2 données)

Le premier est observé entre le 21/02 et le 28/02/2000 sur les dunes d'Erdeven. Deux individus y sont observés le 12/03.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

(9 données)

Un rassemblement s'environ 100 individus est observé à la tombée de la nuit sur une aire goudronnée du port de commerce de Lorient le 25/12/1999 et le 9/02/2000.

On en note 7 individus, mazoutés, à Bétahon le 8/01/00 et 120 le 13/02 à la Pointe du Conguel / Quiberon.

WETLANDS INTERNATIONAL : 3043, les principaux sites étant la rade de Lorient (704 individus), la baie de Quiberon (732), le golfe (928) et la baie de Vilaine (496).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

(9 données)

D'importantes concentrations à La Pointe en Guégon : 700 le 18/12/1999 et 900 le 21/12/99. Mais aussi 300 le 11/02/2000 en rivière de Sarzeau et 380 au Grand Loch / Guidel le même jour. Le 13/02, 220 individus sont observés à Larmor / Damgan en halte migratoire

WETLANDS INTERNATIONAL : 319, surtout comptés dans la baie de Vilaine pour ce qui concerne le littoral.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

(10 données)

300 à Boderhaff / Le Tour du Parc le 11/02/2000 et 250 le 29/01/00 à Kermorduel
WETLANDS INTERNATIONAL : 3185 dont 1870 dans le golfe et 863 dans la rade de Lorient.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

(39 données)

Sur le littoral : 500 en rivière d'Etel le 20/12/1999 , 530 aux Granges en Billiers le 21/12, mais aussi 312 à Linès / Gâvres le 02/01/2000 ; le 01/02 , on en note 720 en rivière de Sarzeau / Damgan et 663 à Saint- Colombier, 2000 sont comptabilisés au Rustuel / Quéven le 03/02 et entre 800 et 900 à Kerfrézic / Nostang le 04/02, 1 050 au Grand Loc'h / Guidel le 11/02.

A l'intérieur du département : 260 à Tréhorenteuc le 16/11, 1 200 à Saint Abraham le 18/11, 600 à la Pointe / Guégon le 21/12.

WETLANDS INTERNATIONAL : 9483 dont 5530 dans le golfe et 2022 en baie de Vilaine.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

(3 données)

Peu d'observations notées : 2 le 28/11/1999 à Bédume / Damgan , 1 le 23/01/2000 dans le marais de Bétahon .Comme l'an dernier un albinos a été observé à Saint Arnel, le 17/12.
WETLANDS INTERNATIONAL : 420 répartis presque tous entre la baie de Quiberon et la baie de Vilaine.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

(9 données)

Les rassemblements les plus importants sont observés en presqu'île de Quiberon : 230 le 18/11/1999 et 100 le 13/02/2000 à la pointe du Conguel, 85 le 18/11/99 à Portivy /Saint-Pierre-Quiberon.

On en note aussi 124 aux Saisies / Larmor-Plage le 19/01 et 55 à Kerpape / Larmor-Plage le 21/02.

WETLANDS INTERNATIONAL : 996 dont 820 en baie de Quiberon.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

(1 donnée)

Une première mention de passage migrénuptial provient du Pont de Banastère / Le Tour du Parc, 3 individus observés le 12/03/2000

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(21 données)

20 à la Pointe du Talut en Ploemeur le 21/11/1999 , un maximum de 25 à Kerpape le 17/02/2000 , 22 à Beg er Goalenec/ Quiberon , 19 à Beg en Aod / Saint-Pierre-Quiberon le 19/12 et 24 le 13/02. Ces données ont été recueillies dans le cadre de l'enquête Bécasseau violet du G.O.B., à l'occasion notamment de comptages organisés sur la côte sauvage.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(8 données)

Aucun important rassemblement relaté : 200 individus au port de commerce de Lorient le 26/12/1999 , 200 le 8/01/2000 et 240 le 13/02/00 à Pénerf-Kervoyal , 25 à la Pointe du Conguel en Quiberon le 13/02 .

WETLANDS INTERNATIONAL : 44301.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (8 données)

Encore de maigres données et des effectifs assez faibles : 18 à Sterbouët / Locmiquélic le 25/11/1999, 17 le 05/02/2000 à Pen Mané / Locmiquélic, 6 le 20/02 dans le marais de Pomper en Baden et 4 le 12/03 au Bronzais / Pénestin .

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (2 données)

Les données concernent des individus isolés : 1 à Beg er Lann / Ploemeur le 20/11/1999 et 1 à Lan Vraz / Landaul le 8/12/1999 .

Barge à queue noire *Limosa limosa* (2 données)

640 au Duer le 18/11/1999 et 250 à 300 en reposoir sur la vasière du Duer le 09/02/2000.
WETLANDS INTERNATIONAL : 397 dont seulement 2 hors du golfe.

Barge rousse *Limosa lapponica* (4 données)

42 le 18/11/1999 à Plouharnel , 3 le 29/12 dans l'anse de Locmalo / Gâvres , 13 le 2/01/2000 à Kersahu / Gâvres et 4 le 21/02 aux Saisies / Larmor Plage .
WETLANDS INTERNATIONAL : 175 dont 62 en baie de Quiberon et 77 dans le golfe.

Coudis corlieu *Numenius phaeopus* (1 donnée)

Un individu observé sur la vasière de Port Sauzon en Belle-Ile le 15/11/1999.

Courlis cendré *Numenius aquarta* (11 données)

210 le 11/12/1999 à Pénerf, 250 aux Granges / Billiers le 3/01/2000, 91 à Kersahu / Gâvres le 21/02 .Un individu albinos est une nouvelle fois observé à Boderhaff / Le Tour du Parc le 26/02/00
WETLANDS INTERNATIONAL : 929, les principaux sites sont le golfe (344 individus) et la baie de Vilaine (317).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (1 donnée)

70 individus au Duer le 18/11/99
WETLANDS INTERNATIONAL : seulement 64, dans le golfe du Morbihan.

Chevalier gambette *Tringa totanus* (10 données)

La majeure partie des observations est effectuée dans la presqu'île de Sarzeau : 120 à Pénerf le 11/12/1999 , 35 dans la rivière de Sarzeau le 11/02/2000 , 64 à Bénance / Sarzeau le 22/02 et 34 au Pont de Banastère. 50 ont toutefois été observés à Kersahu / Gâvres le 05/02.
WETLANDS INTERNATIONAL : 700.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

(1 donnée)

8 individus observés le 21/11/1999 à Kerhervy / Lanester.
WETLANDS INTERNATIONAL : 31 dont 18 dans le golfe.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

(2 données)

Ces données ne concernent que des individus isolés : 1 le 19/11/1999 dans la rivière d'Auray , et 1 le 12/03/2000 au Pont de Banastère / Le Tour-du-Parc.
WETLANDS INTERNATIONAL : 10, uniquement dans le golfe du Morbihan.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

(8 données)

La majorité des observations émane de Pen Mané où jusqu'à 3 individus ont été observés le 09/08/1999, le 25/11 et le 05/03/2000.
WETLANDS INTERNATIONAL : 15.

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres*

(14 données)

Un maximum de 25 à la pointe du Talut en Ploemeur le 20/11/1999 , 88 le 19/01/2000 et 174 le 21/02 à Kerpape / Ploemeur. 108 sont observés à Quiberon le 13/02 tandis que 90 individus le sont au port de Saint Jacques / Arzon.
WETLANDS INTERNATIONAL : 1173 sur tout le littoral.

AR VRAN MORBIHAN N°20

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Jean-Luc Lemonnier.

Que dire en préambule de cette synthèse relative à l'hiver 1999 / 2000 ? Elle ne reflètera bien sûr que médiocrement la situation de ces espèces qui furent alors touchées de plein fouet par la marée noire de l'Erika surtout entre le 20 décembre et le 20 janvier. On pourra toutefois lire entre les lignes :

- seules 77 données nous sont parvenues pour ce groupe, faible volume illustrant parfaitement que la préoccupation majeure de beaucoup d'ornithologues fut de travailler dans les centres de soins, à Theix ou Lorient, délaissant, on le comprendra, les observations sur le terrain ;
- on notera toutefois la part importante tenue par les alcidés, mentions presque toujours assorties du triste qualificatif : "mazoutés". Il aura fallu les milliers de cadavres englués sur nos plages pour mesurer quelle vie existe chaque hiver au large des côtes de Bretagne sud.

Décembre 1999 restera également dans beaucoup d'esprits pour ces tempêtes hors norme qui ont dévasté l'Europe entre le 25 et le 29. Il sera pour nous impossible de discerner quelle part exacte a tenu ce régime tempétueux dans la mortalité des oiseaux alors échoués sur les côtes atlantiques. Pour une idée plus juste de l'impact de la marée noire, il faut bien sûr se référer aux bilans des centres de soins, dans la mesure où ils existent (?). Ceux de Theix ont été publiés dans le bulletin de liaison du G.O.B. n° 25 avec l'aimable autorisation de Bretagne Vivante – S.E.P.N.B. On y découvre qu'au 20/01/2001, 20500 oiseaux environ avaient transité par les centres de Belle-Ile, Groix, Lorient et Theix. La proportion de 80% de Guillemots de Troil semble actuellement retenue.

Dans ces conditions, les quelques données listées ci-après ne peuvent être qu'un aperçu des événements de cet hiver.

Grand Labbe *Catharacta skua*

(2 données)

L'un est observé à Bétahon / Ambon le 01/01/2000. L'autre est un cadavre "avancé", mazouté, retrouvé sur la plage de Gâvres le 08/01/2000 : ce labbe avait été bagué poussin le 26/06/1991 à Saksun, Stremoy aux îles Féroë (62°15'N – 07°10'W), soit un port de bague de huit ans et demi avec une reprise à 1640 km du lieu de baguage.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

(0 donnée)

Mouette pygmée *Larus minutus*

(4 données)

- 4 à Goërem / Gâvres le 28/12/1999 ;
- 2 en une heure de guet à la mer depuis la pointe du Talut / Ploemeur le 01/01/2000 par faible vent de sud-ouest ;
- Les deux autres données sont recueillies à Boderharff / le Tour du Parc : le 11/02 (1 individu) et le 12/03 (pas d'effectif précisé).

Mouette de Sabine *Larus sabini*

(0 donnée)

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(4 données)

Notons 500 individus au repos sur l'ensemble des prairies inondées aux Salles et aux Granges / Billiers, le 09/01/2000.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

(0 donnée)

Goéland cendré *Larus canus*

(12 données)

In extenso, les données concernant plus de 10 individus :

- 60 le 08/01/2000 sur la Grande Plage de Damgan,
- 12 le 19/01 à Kerpape / Ploemeur,
- 35 le 04/02 en ria d'Etel, précisément à la Vieille Chapelle / Sainte-Hélène,
- 15 environ le 19/02 au Moustoir, toujours en Sainte-Hélène.

Les autres observations sont faites dans des secteurs proches des précédents : Belz, Locoal-Mendon, d'une part et Larmor-Plage d'autre part.

Goéland brun *Larus fuscus*

(5 données)

- 17 le 22/11/1999 au lac au Duc / Ploërmel.
- 14 le 29/11/1999 au lagunage d'Auray.

Goéland argenté *Larus argentatus*

(4 données)

Le 27/12/1999, 7 Goélands argentés observés à Brec'h, à quelque distance des côtes, présentent tous des traces de mazout au ventre et / ou à la poitrine. Et quelle pouvait être la proportion d'oiseaux portant de telles salissures parmi les 900 individus dénombrés le 08/01/2000 sur la Grande Plage de Damgan ?

Goéland leucophée *Larus cachinnans*

(2 données)

- 1 le 29/11/1999 au lagunage d'Auray,
- 1 individu de troisième hiver le 05/03/2000 sur les anciennes salines de Carnac.

(Hors département : 1 le 27/11/1999 dans le port de Saint-Guénolé)

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

(6 données)

Au moins 10 sont vues le 12/12/2000 depuis la Roche Sèche / Erdevén. Puis 3 le 19/12/2000 au Conguel / Quiberon. Les 24 et 25/12/1999, 30 Mouettes tridactyles au moins sont vues sur les côtes de Larmor-Plage et de Ploemeur mais toutes sont mazoutées. Le 01/01/2000, une heure de guet à la mer à la pointe du Talut / Ploemeur fournit un total de 5 individus.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(8 données)

Des guets à la mer depuis la pointe du Talut / Ploemeur révèlent :

le 20/11/1999	2 en 2 heures
le 04/12/1999	1 en 2 heures
le 01/01/2000	1 en 1 heure
le 04/13/2000	1 en 1 heure

Sternes caugeks à la pointe du Talut / Ploemeur, hiver 1999 / 2000

Signalons à Kerpape / Ploemeur une observation de 13 caugeks le 19/01/2000.

Alcidae sp.

(4 données)

Parmi les données ne concernant pas les échouages, on retrouvera dans le tableau ci-dessous le récapitulatif des observations d'alcidés, identifiés ou non, depuis la pointe du Talut / Ploemeur :

date	durée du guet	nb d'alcidés non identifiés	nb de Pingouins tordas	nb de Macareux moines
20/11/1999	2 heures	4	3	
21/11/1999	?	1		
28/11/1999	1 heure	4	6	
09/01/2000	1 heure 30			1
13/01/2000	1 heure 30	6		

Alcidés à la pointe du Talut / Ploemeur, hiver 1999 / 2000

Guillemot de Troil *Uria aalge*

(13 données)

Hors échouages, citons la présence de 4 guillemots le 12/12/1999 à Penthièvre / Saint-Pierre Quiberon. Toutes les données concernant des échouages de guillemots vivants ou morts proviennent très majoritairement de l'ouest de Quiberon. Voici quelques chiffres extraits d'une liste affligeante et pourtant bien incomplète de guillemots mazoutés :

- le 26/12/1999, 10 vivants et 20 cadavres sur la plage de Kerminihy / Erdeven,
- le 28/12/1999, à Gâvres, 36 cadavres et un seul vivant,
- le 08/01/2000, toujours à Gâvres, 63 cadavres mazoutés à divers degrés, sans confusion avec ceux de la précédente ligne !.

Pingouin torda *Alca torda*

(7 données)

1 oiseau vivant le 07/11/1999 à Locmariaquer et 1 également le 18/11/1999 à Quiberon. Rappelons qu'au centre de soins de Theix ont été comptabilisés environ 25 guillemots pour 1 torda. Dans ces conditions, les 9 tordas échoués (dont 7 morts) le 08/01/2000 sur la plage de Gâvres constituent une donnée tristement remarquable.

Macareux moi ne *Fratercula arctica*

(5 données)

Dans les données nous étant parvenues, un total de 5 macareux échoués apparaît entre le 24/12/1999 et le 13/02/2000.

BIBLIOGRAPHIE

Le Mao (P.) & Cadiou (B.) 2000.-

Le guillemot, principale victime. Bretagne Vivante – S.E.P.N.B. Bulletin de liaison, 92 : 37-40.

G.O.B. 2000.-

Noël noir. Bulletin de liaison, 25 : 8 – 13.

AR VRAN MORBIHAN N° 20

Groupe n°5 - Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick PHILIPPON

Pigeon colombin *Columba oenas*

(12 données)

Du 21 novembre au 05 mars, un dortoir est fréquenté sur l'île de Riec'h / Belz : environ 200 individus du 21/11/1999 au 24/01/2000, encore présents le 13/02/00, les effectifs chutent à 4 individus le 05/03/00.

7 oiseaux le 21/11/99 à Fandouillec / Plouhinec, c'est à dire à portée d'ailes du précédent dortoir.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

(0 donnée)

1000 le 27/11/99 à Rosquerno dans le Finistère.

Effraie des clochers *Tyto alba*

(3 données)

Notée à Sauzon, Ploemeur, Plouharnel (choc contre véhicule) pendant la période.

Chevêche d'Athéna *Athena noctua*

(7 données)

A compter du 26/02/2000, les chanteurs sont notés sur deux communes : Guidel (4 sites différents) et Locoal-Mendon (1 site).

Chouette hulotte *Strix aluco*

(3 données)

2 sites sur Guidel et un sur Quéven fournissent des chanteurs les 25/02/2000 et 05/03/2000.

Hibou des marais *Asio flammeus*

(5 données)

L'hivernage est bien établi cette année sur le site de l'île de Kerner / Riantec avec 1 à 2 individus entre le 24/01/1999 et le 24/02/2000.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(17 données)

90% des données concernent l'observation d'1 individu sur 15 sites différents (Saint Goustan / Auray ; le Port et les Salles - les Granges / Billiers ; Pénerf et Kervoyal / Damgan ; Moulin de marée / Le Hézo ; les Saisies / Larmor-Plage ; Pen Mané / Locmiquélic ; étang de St-Jean , de Goh-Lenn, pointe de Listrec / Locoal Mendon ; pointe du Talut, étangs du Ter, de Lannéec en Ploemeur ; Bénance / Sarzeau.

A noter la forte fréquentation du bord de mer à cette période, y compris lors de guet à la mer.

40% des observations ont lieu en janvier.

Pic noir *Dryocopus martius*

(4 données)

L'erratismo d'automne ne semble pas avoir été noté (sauf 1 individu. à Baden le 13/11/1999 voir Ar Vran – Morbihan n° 19) puisque les données datent de février et début mars.

Nouvelles loges le 06/02/2000 au Bois du Ter / Ploemeur ; traces anciennes et récentes à Stang er Brune / Ploemeur le 26/02 ; le 08/03, 1 mâle chante à Kéraveon / Erdeven.

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

(1 donnée)

1 le 29/11/1999 à Brec'h au Champ des Martyrs.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(3 données)

1 à 2 individus présents sur le port de commerce à Lorient en décembre 1999 (14 et 25) et en février (le 09/02/2000)

Alouette lulu *Lullula arborea*

(3 données)

Les 3 données (27, 29/11/1999 et 21/01/2000) proviennent du même site : Laimier / Plumergat.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

(1 donnée)

Une petite bande de 11 individus dans des chaumes à Moréac le 12/12/1999.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

(1 donnée)

Une date précoce : 2 le 29/02/2000 à Le Palais/ Belle-Ile.

Observation à rapprocher de celle effectuée le 13/02/00 où 1 oiseau a été observé une demi-heure le long des falaises de Plouha dans les Côtes d'Armor (BL n°26 page 6)

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

(4 données)

Présence à Auray, Plumergat et Sarzeau de 2 individus par site durant la période

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

(5 données)

Le dortoir de Vannes disparaît à compter du 15/12/1999 alors que 1000 individus étaient encore présents le 05/12/1999. Nouveau dortoir non trouvé.

A Baud, 300 en dortoir ou prédortoir au centre ville le 01/02/2000 et 200-225 au port de commerce de Lorient le 09/02.

Bergeronnette de Yarell *Motacilla yarrellii*

(2 données)

Parade d'un couple le 21/02/2000 à Laimier / Plumergat.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (7 données)
Hivernage noté sur la côte (Belle-Ile, Billiers, Damgan, Gâvres,) mais aussi à l'intérieur des terres : La Grée Saint-Laurent.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (0 donnée)
Passage d'automne non remarqué ?

Tarier pâtre *Saxicola torquata* (1 donnée)

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (3 données)
Première donnée en février (le 26/02/2000) à Belle-Ile concernant la remontée printanière (?). En tout cas, 7 individus à Kersahu / Gâvres le 12/03.

Grive litorne *Turdus pilaris* (8 données)
La migration d'automne semble débuter massivement le 12/11/1999 (21 à Trévéré / Lizio) puis plus de 150 le 15/11 sur la commune de Ruffiac (plusieurs sites). Jusqu'au 21/11, plusieurs groupes (60 à 80 oiseaux) sont vus dans la partie est du département (Lizio, Saint-Marcel).
Une seule donnée pour le mois de janvier (195 le 31/01/2000 à Inzinzac-Lochrist).
La remontée est également peu notée (16 le 12/02 à Kerpunche / Locoal-Mendon).
Dernière notée : 1 à Plescop le 09/03.

Grive mauvis *Turdus iliacus* (3 données)
Passage simultané à celui des Litornes en novembre 1999 : 140 à Lizio le 21/11.
Remontée écoutée le 12/02/2000 à Kerpunche / Locoal-Mendon où, en dix minutes, plus de 20 sont entendues.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (4 données)
Reprise des chants en début février (Brec'h, Gâvres, Guidel, Le Tour du Parc).

Cisticole des joncs *Cisticola jundicis* (4 données)
Une donnée de décembre 1999 : 1 au petit Loch / Guidel le 20.
Les comportements territoriaux sont observés le 14/03/2000 en bordure de côte (Saint Annel, Le Tour du Parc)

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (0 donnée)

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapillus* (1 donnée)
Le 20/01/2000 à la pointe du Bill / Séné.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* (2 données)
2 au moins à Pen Mané / Locmiquelic le 15/01/2000 et 2 le 26/02 au Bronzais / Pénestin.

Mésange à longue-queue *Aegithalos caudatus* (1 donnée) ; **Mésange nonnette *Parus palustris*** (0 donnée) ; **Mésange huppée *Parus cristatus*** (0 donnée) ; **Mésange noire *Parus ater*** (0 donnée).

Sittelle torchepot *Sitta europea* (1 donnée)

Pie bavarde *Pica pica* (2 données)
Du 03/01/2000 au 10/02/2000, 15 à 39 individus en dortoir à la Pointe des Emigrés / Vannes.

Choucas des tours *Corvus monedula* (1 donnée)
45 le 17/11/2000 au centre de Sarzeau.

Corneille noire *Corvus corone* (3 données)
Un regroupement de 92 individus est noté à Locmiquelic le 25/11/1999.

Pinson du nord *Fringilla montifringilla* (2 données)
1 le 16/11/1999 à Tréhorenteuc et 4 le 23/01/2000 à Saint-Jean-Brévelay dans une importante bande de Pinsons des arbres et de Verdiers.

Serin cini *Serinus serinus* (1 donnée) ; **Verdier d'Europe *Carduelis chloris*** (1 donnée).

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* (4 données)
35 le 20/12/1999 à Kerodic / Lorient ; 18 le 15/01/2000 au nouveau port de La Roche-Bernard, enfin 4 à Quéven le 26/02/00.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* (1 donnée)
350 dans un chaume le 5/12/1999 au moulin du Breuil / Remungol

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (2 données)
Un couple à Calzac / Sarzeau le 03/02/2000 et 4 ensemble à Laimier / Plumergat le 12/02.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*

(4 données)

Après un automne riche en observations, la période hivernale est plus discrète : 2 données qui concernent un mâle à chaque fois : 1 le 08/01/00 à la pointe de Penvins / Sarzeau et 1 le 22/01/2000 à Kerroch / Ploemeur.

Enfin, 2 peu farouches le 05/03/2000 sur Sauzon / Belle-Ile.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

(1 donnée)

Plus de vingt dans des chaumes avec des linottes le 05/12/1999 à Remungol (moulin du Breuil).

NOTES DE TERRAIN

MYSTERIEUX OEDICNEME

« Déconcertant comme tous les originaux... »
P Géroutet *in* Limicoles, 1982.

RENE BOZEC

Déconcertant, il l'est, lorsque son comportement est à l'opposé de celui par vous imaginé.

Mystérieux aussi, lorsqu'il est devant vous, immobile des heures durant, et que vous, n'imaginant aucune suite, vous vous demandez ce qui se passe au fond de cet œil jaune et noir, et ce qui va en sortir.

Depuis 1950, j'ai vécu à cause de cet animal, déceptions et exaltations. Voici quelques moments de mon expérience.

C'est entre les mains d'un chasseur, que j'accompagnais, que je vis pour la première fois une « poule des sables », blessée (je frémis en l'écrivant). Je vis cet homme tordre la mandibule inférieure de l'oiseau. « Pour voir si c'est un jeune » me dit-il. L'œil de l'oiseau est encore dans le mien, immensément rond. C'était en 1951, en juillet-août, juste au sud de Loperhet. On chassait alors durant les mois d'avril et mai, migration oblige, et dès le 14 juillet.



Dunes de Kerminihy – Le Bout du Hâvre ; septembre 1999

En 1954, le *Peterson* fit son apparition dans les librairies de Lorient. Le bonheur ! Par lui j'appris que notre poule des sables s'appelait Oedicnème criard. J'appris aussi l'existence et l'adresse du Muséum de Paris. J'écrivis aux savants de cette

maison. Michel-Hervé Julien qui y travaillait mis le grappin sur moi et me convertit en un tour de main à la protection de la nature. C'est dans une lettre du 17 mai 1960 qu'il me somma littéralement de trouver un nid d'oedicnème, afin de mieux assurer la défense de nos dunes en passe d'être transformées en un autre Carnac.

Le 7 juin 1960, quinze jours après la lettre de Julien, je me rends à Sainte-Barbe en Plouharnel. Au milieu de la dune, je remarque deux oedicnèmes. Un troisième s'envole à vingt pas. Je trouve deux poussins, gros à remplir la main. Je les bague et les photographie. Je m'éloigne d'une dizaine de pas. Je reviens pour les voir encore : je n'ai pas réussi à les retrouver... Au loin, quelques ailes déployées, quelques cris !...

En 1961, je trouve deux nids autour de la Roche Sèche. L'un, 19 mai, se trouve entre la côte, à 100 m, et la route à 2 cv (route actuelle) qui relie Kerouriec à la Roche Sèche. L'autre nid, 16 juin, est posé, à 700 m du premier, sur la pente que surplombe un arc de piquets métalliques en T, utilisés alors par les gens du Polygone de Gâvres pour les tirs (près de la guérite blanche d'aujourd'hui).

En 1962, je repère quatre couples dans la dune de Sainte-Barbe et je trouve trois nids ; le premier, 24 mai, à une vingtaine de mètres de la piste en ciment qui actuellement dessert la déchetterie ; le second, 24 mai aussi, non loin du gué qui aide à franchir, près de la côte, le ruisseau de Loperhet ; le troisième, 6 juin, assez près du village de Sainte-Barbe.

En 1967, 27 mai, deux poussins sont trouvés près de Kerouriec.

M.-H. Julien se montra, comme il savait le faire, plus que satisfait. Et c'est dans l'enthousiasme qu'il envisageait la dune comme réserve naturelle. Quant à moi, je cessai d'« ennuyer » l'oedicnème pour m'en aller auprès de mes jeunes collègues, dont J.-P. Annézo et C. Hays, « taquiner » le Busard cendré omniprésent d'Etel à Grand-Champ.

Fin des années soixante, la dune eut à faire face à deux épreuves : la mort de Julien en 1966 et l'extraction organisée du sable dans le secteur de Kerminhy. Dune vidée comme un cadavre ; dune poubelle ouverte à tout le canton ; rodéo des estivants... Un vrai crève-cœur ! Du 3 août 1968 au 1^{er} août 1986, l'oedicnème est absent de mes caméras.¹

Ce premier août 86, grosse surprise dans les dunes de Plouhinec : 18 oedicnèmes s'envolent devant moi. Ce sont de telles bandes que j'observais trente ans plus tôt de l'autre côté de la ria.

En 1995, la retraite venue, je remets régulièrement les pieds dans la dune d'Erdeven. Ce n'est plus la dune d'autrefois qui était d'un seul tenant d'Etel à Kerhilio, c'est un « massif dunaire » cisailé par les routes, écorché par les marais et les parkings. Qu'en est-il de l'oedicnème dans cette ruine ?



La dunedà Erdeven avant les années 70/80 (1 cm vaut environ 400m)

Mon souci était d'abord de me conserver en jambes et de saluer au passage les oedicnèmes de rencontre. En 1997, naquit en fanfare le projet « Grand Site » avec ses singulières promesses de « réhabilitation » de la dune ; je décidai de noter au maximum la présence de l'oedicnème, argument irréfutable pour la protection de la dune, à mon sens. Voici les résultats dans le secteur de dunes compris entre Kerminihy et le ruisseau de l'étang de Keravéon.

- 1995
 - 20 avril : entendu à 23h00.
 - 27 octobre : entendu à 10h00 au passage d'une buse.
- 1996
 - 15 mars : entendu à 21h00.
 - 17 mars ; 2 individus vus.
 - 25 mars : entendu à 21h00 ; un véritable concert près du parking du Bout du Hâvre où jamais je ne l'ai vu.
 - avril, 2 séances d'observation : aucun oiseau.
- 1997
 - février, 1 séance : aucun.
 - mars, 3 séances : entendu à 22h00 le 09 ; 2 individus vus le 10.
 - avril, 1 séance : rien vu ni rien entendu de Plouharnel à Etel, de 14h00 à 16h00 le 17.
 - juin, 2 séances : le 02, rien vu ni entendu sur le trajet Etel – Plouharnel- Etel de 05h00 à 11h00 ; le 12, entendu à 22h00.

- 1998

- février, 2 séances : le 28, un individu vu.
- mai, 1 séance : le 19, entendu à 10h00 après le passage d'une moto sur la dune.



La dune d' Erdevén après les années 70/80 (1 cm vaut environ 400 m)

- juin, 1 séance : le 08, 4 individus : 2 oedicnèmes chassent mollement deux autres ; cris et postures bizarres, 09h30.
 - août, 4 séances : 1 oiseau vu le 09 ; 2 le 23 ; 1 le 28 : quittant la route par une saignée du talus, je tombe sur un oedicnème assis à deux mètres, étonnement réciproque, il fait quelques pas, s'envole un peu, se pose, marche, s'accroupit à 100 mètres et s'éloigne en marchant... ; 1 individu le 31.
 - septembre, 3 séances : 1 oiseau le 22 et le 27 ; entendu le 29 à 10h00.
 - octobre, 6 séances : aucun.
 - novembre, 1 séance : aucun.
 - décembre, 1 séance : aucun.
- 1999
 - janvier, 2 séances : aucun.
 - février, 3 séances : aucun.
 - mars, 2 séances : 1 individu le 13.
 - avril, aucune séance.
 - mai, 7 séances : 2 individus, le 30 à 21h30, ils paraissent agités ; le 31, à 22h00, deux oedicnèmes s'affrontent ou s'amusent avec force déploiements d'ailes.

- juin, 1 séance : nombre de séances bien insuffisant (!) ; un couple de gambettes nicheur est venu me séduire.
 - juillet, 8 séances : le 19, 5 individus, beaucoup d'excitation : jeux d'ailes et cris variés. Leur âge ? 2 individus les 25 et 29 ; 1 le 30 puis le 31.
 - août, 10 séances : 1 individu le 01, 2 le 02, 1 seul le 20, 3 le 29 et 7 oedicnèmes le 30 à 9h30, qui n'ont pas été retrouvés à 21h00 mais 6 le 31 à 10h00.
 - septembre, 8 séances : 6 oedicnèmes les 05 et 06, 1 le 25 et des cris ailleurs.
 - octobre, 8 séances : 5 le 04, à trente pas exactement de la route, assis ou debout. Autos et vélos passent, ils ne bronchent pas. Un *jogger* passe, ils s'allongent et sont alors invisibles au télescope 25x60 à 250 m ; 5 individus le 11 ; 4 le 16, 3 le 17, dresseurs de chiens ; 4 le 23 et 2 le 25
 - novembre, 10 séances : aucun.
 - décembre, 1 séance : aucun.
- 2000
 - janvier, 2 séances : aucun.
 - février, 4 séances : 1 oedicnème vu le 28.
 - mars, 10 séances : 1 individu les 05, 06 et 08 ; le 08, trois épagneuls jaillissent d'une voiture stoppée sur la dune ; 2 individus le 12 ; aucun le 26 à 09h00, mais 2 le 27 à 11h00.
 - avril, 8 séances : il faut arriver au 30 pour entendre un oedicnème, à 09h00.
 - mai, 10 séances : aucun.
 - juin, 13 séances : aucun.
 - juillet, 6 séances : 1 le 23, et un dresseur de chiens ; 3 le 24 à 08h30, des chiens au loin ; retrouvés à 13h30, au même endroit, à 35 pas de la route ; 7 à 10h00 le 30.
 - août, 8 séances : 6 oiseaux le 02, 7 le lendemain à 10h00, le passage d'une pie déclenche une série d'acrobaties spectaculaires ; 2 oedicnèmes à 21h00 le 06 ; à nouveau 6 à 10h00, le 07, chiens dans le lointain ; 3 le 19 et 5 le 21.
 - septembre, 9 séances : 6 individus le 03 ; 6 encore le 04 à 10h00, ils sont dérangés par un *jogger* ; 4, le 10, sont dérangés par des dresseurs de chiens ; 4 individus le 16 à 18h00 ; 3, voire 4, le 17 ; 6 oedicnèmes le 21 à 15h30 ; 7 le 24, un chasseur à proximité ; aucun n'est trouvé le 25 malgré une prospection poussée ; de nouveau 6 le 30.
 - octobre, 8 séances : le 01, 6 individus, un cheveu traverse la dune, tout désarmé, jusqu'à la pointe de la Barre et revient pour disparaître dans le marais..
 - novembre, 3 séances : aucun oedicnème.
 - 2001
 - février, 5 séances : le 4, le 11, le 17, le 24, aucun ; le 25, à 10h00, 1 oedicnème ; le 27, à 14h00, l'oedicnème est toujours là, stoïque sous la neige, et bien vivant...

Quelques remarques :

1. Les nids trouvés au début des années soixante sont posés à proximité de lieux fréquentés. Ces oiseaux que l'on décrits si farouches, les voici nichant presque dans nos jambes et sous nos roues. Aucune place ailleurs ? Mystère...
2. Il y a comme une « inconscience » dans ces groupes postés bien en vue, comme chez cet individu séparé d'une route très fréquentée par un simple talus. Est-ce l'attirance pour les bruits de moteur ? Est-ce une façon d'être loin des promeneurs, plutôt amateurs du centre de la dune ?
3. Les oedicnèmes ont des lieux favoris pour méditer. En fonction de cela, j'ai aménagé des postes d'observation et prévu une batterie de séances régulières, muni d'une Zeiss 10x25, d'une paires de jumelles à zoom sur pied, d'un télescope 25x60. Fatigué de les attendre, j'ai dû souvent longer la dune à leur recherche, à pied, en voiture, jusqu'à Kerouriec. Bilan 2000 : 81 séances, aucun oedicnème en mai et juin. Déconcertant...

Entre 1990 et 1999, 55 données concernant l'Oedicnème criard sur le cordon dunaire qui s'étire de Gâvres à Quiberon ont été extraits du fichier morbihannais du G.O.B.

Trois à cinq couples semblent se reproduire durant la décennie écoulée mais la nidification n'a été établie qu'à cinq reprises sur les dunes d'Erdeven, près de Kerminhy dans les trois cas :

- en 1995, un couple couve à la mi-avril ;
- en 1996, un couveur, fin avril-début mai ;
- en 1997, un couveur en mai.

Lors de l'enquête « Limicoles nicheurs » deux couples étaient localisés autour de Sainte-Barbe / Plouharnel, un couple a été encore contacté en 1997 mais les données manquent depuis lors.

De l'autre côté de la rivière d'Etel, sur la dune de Plouhinec, un à deux couples s'installaient entre Kervran et Motteno. Notés lors de la même enquête, la dernière mention dans ce segment dunes date de mai 1997 (1 individu).

Groupe Ornithologique Breton

4. S'ils ont niché dans le secteur, ils sont forts (...moi je baisse), ils auraient un sens aigu de l'adaptation.
5. S'ils n'y ont pas niché, j'y vois une cause, l'abondance des chiens. Ne faisant que passer dans le secteur je vois souvent trois ou quatre chiens, toujours les mêmes, courir dans tous les sens, provenant de résidences secondaires voisines. J'ai parlé à l'un de ces propriétaires : il m'a répondu m'avoir bien compris, mais qu'il lui fallait faire maigrir ses chiens, trop alourdis par la vie parisienne, en vue de l'ouverture de la chasse. Tout l'été je les ai subis.
6. Y-aurait-il espoir dans le secteur de Keranroué ? Il n'est guère plus tranquille que celui de Keminihy... On ne sait jamais.
7. Il a été question dans notre revue Ar Vran de couples ou de nids repérés dans la dune de Kerminhy. Il serait indispensable de savoir où et quand exactement.

8. Six oedicnèmes ensemble, ne serait-ce pas un couple et ses deux nichées de l'été ? La scène du 8 juin 98 peut faire rêver, comme celle du 31 mai 99. Mystère...

BIBLIOGRAPHIE :

- ANONYME (1997).- Recensement national des limicoles nicheurs, 1996, contribution morbihannaise. Ar Vran Morbihan 12.
- BARGAIN, B., GELINAUD, G., MAOUT, J. (1999).- Les limicoles nicheurs de Bretagne. Bretagne Vivante S.E.P.N.B.
- ERMEL, G. (1997).- ; Essai de synthèse concernant l'Oedicnème criard (*Burhinus oedicephalus*) dans le Morbihan. Ar Vran Morbihan 13.
- GUERMEUR, Y. & MONNAT, J.-Y. (1980).- Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne. S.E.P.N.B. – C.O.B., Brest, 240p.
- LE MAO, P. (1997).- Oedicnème criard *Burhinus oedicephalus* in G.O.B. Les oiseaux nicheurs de Bretagne, 1980-1985, p105.

¹ Guermeur et Monnat (1980) notent : »Nicheur de part et d'autre de la rivière d'Etel sur le vaste cordon dunaire (...) L'effectif de la Bretagne est très voisin de 5 couples. »

Patrick Le Mao (1997) : « La petite population morbihannaise se maintient sur les dunes de Plouhinec (4 couples en 1984), mais l'espèce ne semble pas avoir niché sur les dunes d'Erdeven pendant la durée de l'enquête. »

Groupe Ornithologique Breton
Centre Ty Ar Vro
6, Place des Droits de l'Homme - B.P. 103
29833 CARHAIX
Tél. 02 97 73 98 04