

AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

**Ti ar Vro B.P. 103
29833 CARHAIX cedex**



Groupe Ornithologique Breton
Centre Ty Ar Vro
6, Place des Droits de l'Homme B.P. 103
29833 CARHAIX cedex
Tél. 02 97 73 98 04

N°21 ANNEE 2001



Sommaire du numéro 21 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 mars 2000 à 15 novembre 2000	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 13
Groupe 3 de l'Huïtrier pie au Tournepierre à collier	page 16
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 21
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 39
Notes de terrain	
Destruction d'une colonie d'Hirondelles de rivage	page 40
Nidification du Fuligule milouin en Morbihan, printemps 2001	page 42
Une saison du programme STOC-EPS dans le Morbihan	page 43

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE :

16 MARS 2000 A 15 NOVEMBRE 2000

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
ARTEL Jean-Pierre (Commune de Sarzeau), BOZEC René, BAILLEUL Patrick,
BROUILLARD Yohann, CORBIERRE Jacques, CORLOU Pierre, CHRISTOPHE
Guénolé, CROCHET Erwan, DERIAN Gwénaél, ERMEL Gérard, EVANNO
Guillaume, FOUCAUT Damien, GUERIN Stéphane, GUILLEMOT Francis, HAMET
Loïc, HAMON Philippe, LEMONNIER Françoise et Jean-Luc, MAOUT Jacques,
MOREL Régis, MOUCHEL Yann, ORDUREAU Yannick, PALPANT Muriel,
PHILIPPON Patrick, ROBIC Jean-François, SIMON Nathalie, TEIGNER Laurent,
THIEBAULT Damien, URVOAZ François... sauf erreur ou omission !

Dans les rédactions des actualités ornithologiques ** désigne des résultats du recensement des oiseaux d'eau dans le Golfe du Morbihan effectué le 15/11/00 (Réserve Naturelle de Séné – réserve de Pen-en-Toul / Bretagne Vivante S.E.P.N.B. / réserve du Duer / commune de Sarzeau).

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton (Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre au 15 mars.

Les observations sont transmises au coordonnateur morbihannais sur papier ou disquette informatique en respectant l'ordre suivant :

ESPECE ou code	date	lieu-dit (voir carte IGN)	commune	effectif	remarques
48005	04/05/1999	Keriel	162	4	un adulte ravitaillé trois jeunes dans une lande

Les listes des codes utilisés pour noter les espèces et répertorier les communes sont disponibles aux réunions du G.O.B à Brec'h.

Illustration : couverture et p 3, Patrick Bailleul ; photographies p 42 et p 45, Gw. Derian.
Relecture et correction : Bernard Iliou, Muriel Palpant.

AR VRAN MORBIHAN N°21

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

Plongeur indéterminé *Gavia sp.*

(9 données)

1 individu le 01/10/00 devant la pointe de Kerroch / Ploemeur constitue la première mention automnale, isolée.

Plongeur catmarin *Gavia stellata*

(1 donnée)

Les deux derniers sont vus le 01/05/00 à Kerroch / Ploemeur.

Plongeur arctique *Gavia arctica*

(1 donnée)

Le 01/05/00, devant la pointe de Kerroch / Ploemeur, deux individus ferment la saison.

Plongeur imbrin *Gavia immer*

(4 donnée)

C'est l'espèce qui a été la plus notée au printemps :

- 2 en plumage nuptial le 27/04/00 d'Er Lannic / Saint-Pierre-Quiberon.
- 3 à la pointe ouest d'Houat, le 28/04.
- 1 à Kerroch / Ploemeur le 01/05.
- 4 en plumage nuptial devant la Roche-Sèche / Erdeven, le 01/05.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

(54 données)


Reproduction :

- Crucuno / Erdeven, une parade le 26/03/00.
- Kersahu / Gâvres, un couple nicheur le 03/07.
- étang du Val / Carentoir, 2 adultes et 3 jeunes le 01/07.
- Bétahon / Ambon, un adulte et un poussin le 05/08.
- Bidume / Ambon, plusieurs couples se reproduisent sur le plan d'eau puisque le 28/05 il est possible de compter trois couples accompagnés respectivement de 2, 2 et 1 jeune, un quatrième couple est présent.
- Kerbiguette / la Trinité-Surzur, un couple sur un petit étang le 04/06.
- Pont-Caden / Sarzeau, le 28/05, un chanteur.

Rassemblements :

- sur les lagunes de Bonervo / Theix, il y a 80 Castagneux le 10/09, leur nombre décroît rapidement avec seulement 18 le 24/09.
- 2 données proviennent de l'étang de Saint-Jean, qui illustrent le changement qui se produit sur cette pièce d'eau : 19 le 27/08, 130 le 23/09 (78 sur Saint-Jean, 52 au Goh Lenn), ensuite les quelques individus qui restent ne sont plus comptés.

A Pen Mané / Locmiquélic et Kersahu / Gâvres, les rassemblements de Grèbe castagneux sont suivis :



Grèbe castagneux à Pen Mané / Locmiquélic et Kersahu / Gâvres (Morbihan) :
juillet – novembre 2000

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(40 données)

Reproduction :

- étang de Lannénec / Ploemeur, la parade est observée le 21/04/00, 2 poussins accompagnent 2 adultes le 27/07.
- étang du Val / Carentoir, 2 adultes et 3 jeunes le 23/06.

Ces deux sites sont nouveaux par rapport à l'enquête de 1998, en 1999 déjà le Grèbe huppé avait niché à Lannénec.

- étang de Coët-Rivas / Kervignac, deux couveurs le 07/05.
- étang de Pont-Calleck / Berné, un couple est présent le 04/06, les oeufs sont couvés.

Rassemblements :

- dès juillet, les Grèbes huppés se groupent sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon : 39 le 02/07, 45 le 27/08.
- Pen Lann / Biliers, 85 Grèbes huppés sur la rive nord de l'estuaire de la Vilaine le 05/08.
- dans la rivière de Pénerf : 28 le 24/09 et 12 le 08/10 à Pentès / Surzur
- dans la rade de Lorient, les Grèbes huppés se concentrent sur le Blavet maritime : 23 le 14/09, 30 le 15/10, 19 le 17/10.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

(1 donnée)

6 s'attardent au Pont de Noyal le 05/04/00.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(10 données)

La dispersion s'achève aux derniers jours de mars, par exemple un individu en plumage

nuptial à Gâvres le 25/03. Les premiers estivants sont signalés dans la rade de Lorient le 06/08 avec un seul à Pen Mané /Locmiquélic ; il y en 26 dans la Petite Mer de Gâvres le 15/10.

Puffin indéterminé *Puffinus sp*

(3 données)

Notons que du point de guet à la mer de Kerroch /Ploemeur, quatre espèces de puffins ont été déterminées entre juillet et octobre. Une prochaine note nous donnera davantage de détails sur ces heures d'observation.

Puffin cendré *Calonectris diomedea*

(1 donnée)

2 individus à Kerroch, le 19/08/00.

Puffin fuligineux *Puffinus griseus*

(2 données)

3 le 26/07/00, 2 le 16/08 à Kerroch.

Puffin des anglais *Puffinus puffinus*

(8 données)

Devant la rivière de Pénerf : 5 le 16/08, 1 le 02/09, 1 le 11/10/00.

A Kerroch : 6 le 01/05, 2 le 23/08, 1 le 30/08, 2 le 10/10.

Puffin des Baléares / Yelkouan *Puffinus yelkouan*

(5 données)

Durant l'été, il n'est noté qu'un individu le 01/07/00 à Kerroch, 1 le 12/08 puis le 16/09, de la pointe de Penvins / Sarzeau un groupe de 40 puis une bande de 160 puffins sont observés.

Océanite indéterminé *Hydrobates sp*

(1 donnée)

Un individu entre Hoëdic et Houat le 21/10/00.

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus*

(11 données)

Les données émanent principalement de deux points de la côte, aux deux extrémités du littoral morbihannais :

- entrée de la rivière de Pénerf : 14 le 02/09/00 et 5 le 11/10 à Treutan /Damgan, 8 le 01/11 à la pointe de Penvins / Sarzeau.
- pointe de Kerroch / Ploemeur : 1 dès le 24/06, 1 le 16/08, 19 le 02/09.

Ces petits groupes de quatorze et dix-neuf oiseaux suivent un coup de vent force 5-7 de nord-ouest.

Ajoutons à ces observations de guet à la mer un à la pointe de Gâvres le 24/06 et un à Saint-Cado / Belz le 31/10 après une tempête de secteur sud (un cadavre ancien sera trouvé le 17/01/01 sur la rive opposée...).

Fou de Bassan *Sula bassana*

(24 données)

Les groupes composés d'individus d'âges divers sont déjà contactés le 01/07/00 à

Kerroch avec 250 individus.

105 au moins à Beg er Lan / Quiberon, une centaine à l'entrée de la rivière de Pénérf le 01/09, cette tempête est aussi suivie à Kerroch / Ploemeur de l'observation d'effectifs notables : 150 le 02/09.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

(35 données)

Le Grand Cormoran a niché dans le Morbihan. Sur l'île aux œufs, dans le Golfe du Morbihan, sept nids ont abrité des jeunes d'âges divers. Un cormoran se livre à un simulacre de construction dans un cyprès au bord de l'étang de Saint-Jean en Locoal-Mendon le 24/07. La tentative n'a pas abouti. Cet étang abrite un reposoir diurne estival : 154 le 27/08.

Dortoirs :

- rivière d'Étel : 30 le 02/04/00 et le 30/07 puis 121 le 08/10, 306 le 13/11.
- rade de Lorient :

05/07	port de guerre	58
10/07	port de guerre	63
16/07	port de guerre	87
12/08	port de guerre	98
16/09	port de guerre	123
15/10	port de guerre	142
08/11	port de guerre	98
08/11	île des Souris	147

Dortoirs de Grands Cormorans, rade de Lorient (Morbihan) ; été – automne 2000

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

(5 données)

Comme d'ordinaire ce sont des données anecdotiques littorales, aucune colonie de reproduction n'ayant fait l'objet de visites par des observateurs du Groupe Ornithologique Breton.

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

(1 donnée)

Un butor au Grand Loc'h / Guidel le 17/04/00.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

(1 donnée)

Le 16/03/00, un Garde-bœuf vu au Tour-du-Parc fait écho à l'observation de trois individus le 04/03 à Boderhaff, ce sera la dernière mention.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

(39 données)

En attendant les résultats de l'enquête Hérons nicheurs, les renseignements concernant la reproduction de la Garzette sont incomplets : 11 aires à Kerzo / Port-Louis, nicheuse sur Riec'h / Belz.

Notons des rassemblements de 60 à 80 à Kersahu / Gâvres durant le mois d'août et un recensement exhaustif mené dans la rade de Lorient qui aboutit à 193 individus le 15/10/00.

36 pêchent ensemble au Néguan /Locoal-Mendon le 24/08, 23 dans la rivière de Landévant le 17/09, branchées à marée haute, 62 comptées dans la rivière d'Étel le 22/10, 41 sur la vasière de Saint-Colombier le 07/09, 22 le 05/11 dans l'anse de Plouharnel, à l'intérieur des terres 3 le 11/11 à l'étang de la Forêt /Brandivy.

Grande Aigrette *Egretta alba*

(3 données)

- 1 à Kersahu / Gâvres le 07/05/00, la pigmentation des parties nues signale un adulte en période de reproduction.
- 1 les 02 et 09/09 à Kergenêts / Surzur.

Héron cendré *Ardea cinerea*

(25 données)

Là aussi, les résultats de l'enquête sont à venir.

Nicheur à Riec'h / Belz, Kerzo /Port-Louis (11 aires). Une aire est construite à l'étang du Val / Carentoir, le 30/04/00 elle n'est pas occupée. Aucune aire n'est trouvée à l'étang de Pontcalleck que 16 hérons fréquentent pourtant le 04/06.

Cigogne noire *Ciconia nigra*

(5 données)

Pour la première fois depuis 1996 (une observation en 1999 à Locmiquélic n'a pas été confirmée !) la Cigogne noire fait une halte remarquable dans le Morbihan. Il s'agit cette fois presque d'une invasion... puisque les contacts s'étalent du 16/08 au 02/09/00, de Ploërmel à Le Tour-du-Parc avec un maximum de 5 à Séné :

- 2 à Suscinio / Sarzeau le 16/08.
- 1 à Ploërmel le 18/08.
- 1 à Sérent le 25/08.
- 1 le 02/09, Le Tour-du-Parc.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

(3 données)

- 1 à Lauzach le 28/03/00.
- 3 à Theix le 03/04.
- 1 le 12/05 à Kerpunche/Locoal-Mendon.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(16 données)

Les voilà sur les îles ! Les 23 et 24/04/00 1 Ibis sacré à Belle-Île, la Roche-Percée et Koh-Kastell. Au delà du Golfe : 7 à Kersahu / Gâvres le 29/08, 6 dans l'anse de Plouharnel le 08/10, 7 à Crucuno / Erdeven le 16/10.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

(11 données)

03/04	le Bréno / Carnac	8	anciennes salines
26/04	le Bréno / Carnac	7	dont des individus <u>bagués</u>
29/04	Kersahu / Gâvres	1	immature

07/05	Kersahu	3	
28/05	Pen Mané / Locmiquélic	1	adulte
04/06	Kersahu	1	immature bagué O/O peut-être LV ce qui en ferait l'oiseau hivernant
06/08	Kersahu	1	adulte
13/10	le Conguel / Quiberon	2	en vol sud / nord

Spatule blanche dans le Morbihan (hors Golfe) ; printemps – automne 2000

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

(18 données)

A noter 21 le 22/10 à Pont-Caden / Surzur et 28 au Duer / Sarzeau le même jour, encore 26 le 06/11 sur la vasière de Saint-Colombier / Sarzeau le 08/11 parmi lesquels 1 jeune, 5 jeunes comptés dans la bande de 10 cygnes vus le 06/10 à Suscinio / Sarzeau.

Bernache cravant *Brenta bernicla*

(15 données)

La dernière est encore au Listrec /Locoal-Mendon le 07/05/00 mais les dernières bandes de quelques dizaines d'oiseaux ont disparu dès les derniers jours de mars.

Les retours sont notés simultanément : 22 dans la Petite Mer de Gâvres le 24/09, une belle troupe de 700 bernaches dans le Golfe le 25/09 et 49 au Logo /Pénestin le même jour. Le 04/11, il y a 219 Cravants dans la Petite Mer de Gâvres ; le lendemain, dans l'anse de Plouharnel, aucun jeune de l'année n'est trouvé sur un échantillon de 200, il y a environ 700 bernaches. 8803 le 15/11 dans le Golfe**.

Ouette d'Egypte *Alopochen aegyptiacus*

(1 donnée)

3 à Suscinio/ Sarzeau le 10/11/00.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(53 données)

Parini les nombreuses mentions de nichées : la première à Kervoyal / Damgan le 24/04 avec 15 poussins, la plus tardive à Pen Mané /Locmiquélic avec quatre poussins de quelques jours le 28/07, trois d'entre deux parviennent à s'envoler à la mi-septembre.

Une famille de 7 jeunes est élevée sur la station d'épuration d'Ar Roc'h /Ploemeur, à deux pas de la côte. Aucune donnée de reproduction ne provient de la rivière d'Etel et des environs de Plouharnel – La Trinité sur Mer... 490 le 15/11 dans le Golfe**.

Canard siffleur *Anas penelope*

(7 données)

Aucune donnée entre 18/03/00 et le 10/09, il ne s'agit encore que de quelques unités à la mi-septembre. 1221 le 15/11 dans le Golfe**.

Canard chipeau *Anas strepera*

(1 donnée)

Le 19/03/00, à l'étang de la Brousse, 9 individus.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(18 données)

Encore 70 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc, le 27/03/00. Après la parenthèse estivale, les premières sarcelles arrivent début septembre : 2 le 10/09 à l'étang de Noyal, 3 le même jour sur les lagunages de Surzur, 36 à Pen Mané / Locmiquélic le 14/11.

Les marais de la pointe des Emigrés à Vannes n'accueillent encore que quelques dizaines d'individus : 68 le 06/11, 77 le 13/11, 110 le 26/11. 1205 le 15/11 dans le Golfe**.

Canard colvert *Anas platyrinchos*

(40 données)

Reproduction constatée à Hoëdic, Gâvres, la Trinité-sur-Mer, Guidel, le Tour-du-Parc, Locol-Mendon, Riantec, Sarzeau, la dernière nichée signalée, à Kersahu / Gâvres, compte 9 poussins récents le 25/07.

Rassemblements : 220 le 22/10 dans l'estuaire de la Vilaine, les Granges / Ambon.

2476 le 15/11 dans le Golfe**.

Canard pilet *Anas acuta*

(7 données)

Aucune donnée après le 25/03/00, 160 individus au Duer le 08/11.

518 le 15/11 dans le Golfe**.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

(3 données)

La présence printanière est presque passée inaperçue : 2 mâles à Kersahu / Gâvres le 25/03/00. L'été n'est guère mieux documenté avec 2 individus le 31/07 et 11 le 06/08, là aussi à Kersahu.

Canard souchet *Anas clypeata*

(10 données)

16 sur l'étang de Lannéc / Ploemeur le 07/04/00, 15 le lendemain à Pen Mané / Locmiquélic. Les observations de couples n'ont pas de suite : un le 18/03 à Pen Mané, deux au Château-d'eau / Le Tour-du-Parc le 13/03. Le 22/10, 10 Souchets se mêlent aux Colverts devant les Granges / Ambon.

116 le 15/11 dans le Golfe**.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

(12 données)

La première observation date du 26/08/00 : 3 individus à Kersahu / Gâvres. Ensuite, les premiers s'installent sur l'étang du Ter le 27/09, 4 individus, et 33 le 08/11.

Devant l'entrée de la rivière de Pénerf, il n'y en a aucun le 22/10, 30 le 29/10, 118 mâles le 05/11, 175 le 25/11.

Fuligule morillon *Aythya morillon*

(5 données)

Le premier est contacté le 24/09/00 à Surzur sur les lagunages.

Sur l'étang du Ter : 1 le 29/09 et 14 le 08/11.

Fuligule milouinan *Aythya marila*

(1 donnée)

2 femelles le 19/03/00 sur les marais à Ambon.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

(15 données)

D'après les rares données printanières, il n'est pas possible d'affirmer une reproduction : 1 femelle à Er Lannic / Saint-Pierre-Quiberon, 7 à Méaban comptés lors du recensement des oiseaux marins nicheurs (Bretagne Vivante), 25 devant Plouhinec le 17/05. Ensuite les observations se concentrent devant l'entrée de la rivière de Pénerf où les oiseaux muent :

14/08	48, mues
16/08	48, mues
26/08	48
01/09	48
03/09	48 ou 49
17/09	48
11/10	56 dont 13 mâles
22/10	56 ou 57

Eider à duvet devant la rivière de Pénerf (Morbihan) : août – octobre 2000

Macreuse noire *Melanitta nigra*

(7 données)

Le guet à la mer depuis la pointe de Kerroch / Ploemeur permet de contacter l'espèce :

- 14 le 01/05/00.
- 2 le 29/07.
- 5 le 12/08.
- 13 le 01/10.

Il y en a environ 90 le 01/05 devant Erdeven, 1 dans l'estuaire de la Vilaine à Guernehué / Billiers, 26 en vol entre Houat et Hoëdic le 21/10.

Macreuse brune *Melanitta fusca*

(1 donnée)

1 le 03/09/00 à Kervoyal / Damgan, site régulier pour cette espèce.

Harle huppé *Mergus serrator*

(3 données)

- 1 au Plec / Locoal-Mendon le 25/03/00.
- 1 à Pen Inès / Locoal-Mendon le 09/04.
- 9 à Pénerf / Damgan, le 02/04.

AR VRAN MORBIHAN N° 21

Groupe n° 2- Des rapaces aux rallidés.

Choix et rédaction établis par Franz URVOAZ

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

(14 données)

Cette espèce est notée dans le Morbihan du 30/04/00 au 10/09/00. La majorité des données proviennent des communes suivantes : Surzur, Berné, Languidic, Erdeven.

Pour la période considérée, un couple est noté sur la commune de Languidic les 17/05/00 et 20/05/00. 2 individus sont aperçus sur la commune d' Erdeven le 24/06/00.

Milan noir *Milvus migrans*

(31 données)

Cette espèce est notée 17/03/00 au 05/08/00 et a été observée durant cette période sur 15 communes différentes. Parmi les communes visitées notons : Béganne, Nivillac, Saint Dolay, Thehillac, Rieux, Penestin, Grandchamp, Sarzeau, Le Hézo et dans l'ouest du département Guidel, Ploemeur et Erdeven. Un couple a produit un jeune à l'envol sur la commune de Sarzeau. C'est une espèce à suivre.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

(2 données)

2 observations sont faites à un jour d'intervalle sur la commune de Damgan les 05 et 06/06/00.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

(39 données)

Les données proviennent de 15 communes différentes.

Données les plus intéressantes :

- un couple constitué début mai sur la commune d' Erdeven.
- 1 individu en plumage atypique (phase blanche) est observé sur l'étier d'Ambon fin mai 2000.
- 2 adultes et 2 immatures sont notés simultanément sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 08/10/00.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

(15 données)

Il est noté sur 9 communes réparties tant à l'intérieur des terres que sur le littoral : Merlevenez, Ploemel, Locoal-Mendon, Landaul, Brandivy, Sarzeau, Surzur, Campénéac et Carentoir. L'espèce niche près de la rivière d'Etel.

1 individu en phase mélanique est observé en vol sur la commune de Campénéac.

Busard cendré *Circus pygargus*

(3 données)

Un couple a niché sur la commune de Campénéac. Un individu est vu sur le terrain militaire de Beignon, le 04/06/.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

(2 données)

Le 21/05/00 dans le cadre de l'opération concertée sur l'avifaune forestière, un mâle et une femelle sont contactés en forêt de Lanouée.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

(17 données)

Cette espèce est notée dans 11 communes différentes.

Elle est notée nicheuse sur les communes de Languidic et de Lanester où 1 femelle et 2 jeunes sont aperçus sur le bord de l'aire le 05/07/00.

Buse variable *Buteo buteo*

(14 données)

1 seule mention est faite d'un individu en phase de reproduction (couve), sur la commune de Ploemeur.

1 individu est découvert mort en décomposition à l'étang du Val / Carentoir. La cause de la mort n'est pas identifiée.

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*

(29 données)

2 observations printanières :

- le 03/04/00 sur la commune de Loyat.
- le 19/05/00 au Petit Loch / Guidel.

Les autres observations s'échelonnent du 18/07 (rivière de Landévant) au 14/11 (réserve du Duer / Sarzeau). Les lieux les plus fréquemment visités lors de la migration de retour sont le marais de Pen en Toul / Larmor-Baden, l'étang de Noyalo, la rivière de Landévant, l'étang de Saint Jean/ Locoal-Mendon, la réserve du Duer / Sarzeau où 1 individu muni d'une bague métal est vu à plusieurs reprises.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

(15 données)

Il est noté nicheur sur les communes de Colpo, de Nostang et de Lanester où 2 adultes et 2 jeunes sont repérés dans un vieux nid de corneille le 01/07/00.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

(4 données)

2 observations printanières les 28/04/00 et 01/05/00 sur la commune de Ploemeur.

Les 2 autres observations ont lieu début novembre au Loc'h/ Guidel et à Kerihuer/ Ploemeur.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

(29 données)

La première mention est effectuée le 19/03/00 à Kerouac'h/ Guidel et la dernière le 02/10/00 sur la commune de Malestroit.

14 communes différentes sont répertoriées : Baud, Berné, Campénéac, Carentoir, Erdeven, Gâvres, Guidel, Locoal-Mendon, Malestroit, Plouharnel, Sainte Brigitte, Sarzeau, Silfiac et Surzur.

- un couple avec des jeunes vus le 24/08/00 sur la commune de Silfiac.
- une nidification probable sur la commune de Sarzeau.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(3 données)

- 1 observation sur l'estuaire de la Laïta le 30/03/00. Cet individu restera présent jusqu'au 17/04/00.
- 1 observation le 16/10/00 sur la réserve du Duer / Sarzeau
- 1 observation le 21/10/00 sur l'île Longue / Larmor-Baden.

Perdrix grise *Perdix perdix*

(5 données)

5 individus sont observés ensemble le 17/09/00 à Le Crano / Bieuzy-les-Eaux.

Caille des blés *Coturnix coturnix*

(1 donnée)

1 individu à Kerminihy / Erdevén le 25/09/00.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

(1 donnée)

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(3 données)

Communes concernées : La Trinité-sur-Mer, Gâvres et Séné où 1 adulte accompagné de 2 poussins sont notés sur la réserve de Falguérec.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

(8 données)

Communes concernées : La Trinité-sur-Mer, Ploemel et Bangor et Sauzon sur Belle-Ile. A chaque fois des jeunes sont observés, à partir du 23/04/00.

Foulque macroule *Fulica atra*

(53 données)

Elle s'est reproduite à La Cour / Sarzeau, à l'étang de la Brousse / Sarzeau, à Pont-Caden / Sarzeau, à Beg-Lann / Sarzeau à La Bidume / Ambon, sur le marais de Bétahon / Ambon, à Kersahu / Gâvres et sur les étangs de la Lande / Saint-Marcel.

Rassemblements post-nuptiaux :

- | | |
|--|-------------------|
| • étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon : | 1200 le 27/08/00. |
| • lagunes de Bonnervo / Theix | 430 le 08/10/00. |
| • rivière du Ter, étangs et Quélisoye / Larmor-Plage | 1342 le 08/11 |
| • recensement dans le Golfe du Morbihan** | 3668 le 15/11. |
| • étang de Malvern | 600 le 17/11. |

AR VRAN MORBIHAN N° 21

Groupe n° 3 De l'Huîtrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Yannick Ordureau

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

(30 données)

Le 01/05/00, 250 individus à l'Île de Méaban / Locmariaquer, 260 à Treutan / Damgan le 17/09, 85 à Téric sur l'îlot Guernic le 01/09 et 105 au Conguel / Quiberon le 13/10.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

(74 données)

La première est vue à Sarzeau le 17/03/00. A Susicinio : 8 le 25/03, 22 le 15/05 dont 4 couples qui couvent, alors que le 28/05 ils sont 7 couples nicheurs puis 8 (7 couvent, l'autre a un jeune) le 02/06. Le 16/06, présence de 5 familles (3 de 2 jeunes et 2 de 3 jeunes). Le 04/08, observation de 49 adultes et jeunes en vol.

A Kersahu / Gâvres, le 29/04 présence de 12 individus et observation d'un accouplement ; le 14/06 une couveuse et le 26/08 deux jeunes.

Au Duer / Sarzeau, observation de 10 couples nicheurs le 24/06 puis de 9 familles composés de 2/1/3/4/4/3/2/2/3 jeunes soit un total de 24 jeunes.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(15 données)

Présence de deux couples avec trois jeunes à l'étier d'Ambon le 28/05/00, de 5 couples nicheurs dans le bassin du marais de Susicinio / Sarzeau le 28/05 et de 3 couples nicheurs avec un jeune à Bétahon / Ambon le 04/06.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

(26 données)

Toutes les observations ont été faites à Kerminihy / Erdeven : la première le 28/02/00 avec la présence d'un individu, puis 2 individus le 12/03, puis aucun contact en avril, mai et juin. Observation de 3 individus le 24/07 puis de 7 le 30/07 et le 24/09. Le 01/10 6 individus y sont encore observés.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

(5 données)

Aux étangs de la Lande / Saint-Marcel, 6 individus sont observés le 23/06/00 dans l'étang sud, parmi eux un couve. Le 11/07, observation d'un adulte et d'un juvénile sur la grève de l'estuaire de la Vilaine au Moustoir / Muzillac.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

(30 données)

Le 19/03/00 encore 50 individus à la Grée / Penvins. Le 07/05 présence d'un individu désailé (plomb de chasse selon le centre de soins). Peu de données en juin et juillet.

D'importants rassemblements à Linès / Gâvres : 150 le 25/07 en reposoir de pleine mer, plus de 200 le 26/08 (et une soixantaine dans la baie de Locmalo / Gâvres) et plusieurs centaines (≈ 500) le 27/08. A Redion / Damgan : 120 le 26/08. Dernière donnée le 12/11 de 137 individus au port de commerce de Lorient.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (9 données)

Présence de 4 individus qui couvent le 27/03/00 à Boderhaff / Le Tour du Parc.
Observation de 2 poussins sur la dune pierreuse le 22/05 à Kerninihy .Un couple nicheur (3 œufs) à Suscinio / Sarzeau le 28/05. Une seule donnée durant juillet et août : 50 le 27/08 à Roche Sèche / Erdeven

Pluvier guignard *Charadrius* (1 donnée)

Un seul observé à Kerninihy / Erdeven le 19/09/00.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (6 données)

Présence de 5 individus dans la dune à Kerninihy / Erdeven le 10/04/00 et le 17/04 ; deux en plumage nuptial le 28/04 à Roz / Theix et 18 le 11/10 au Grand Loc'h / Guidel.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (9 données)

5 individus le 19/03/00 au pont de Banastère / Le Tour du Parc ; 70 à Pénerf le 02/04 et 6 paradant le 29/04 à Kersahu dont 3 encore en plumage d'hiver .

Seulement 4 données du 01/05 au 26/08.

Présence de 32 individus le 27/08 à Linès / Gâvres.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (44 données)

Observation de 5 couples sur les dunes de Kerninihy / Erdeven dès le 21/03/00 avec alarmes le 26/03; 5 nids sont occupés le 15/05.

Dans la sablière de Kérourie / Erdeven observation d'un couple dont le comportement indique la présence de poussins le 12/06.

En juillet très peu de données : le 11/07 à Coëturo / Muzillac ;, une centaine dans les prés humides vers la côte et 82 en reposoir de pleine mer à Linès / Gâvres.

A Pen-Mané / Locmiquélic présence de 21 jeunes et adultes le 17/06, 96 le 01/08, une vingtaine le 29/08 et 60 le 11/11.

Au Grand Loc'h / Guidel, 32 individus observés le 20/09.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* (7 données)

Premières observations fin août : 50 individus à Pentès / Surzur le 24/09 et d'un juvénile à Locmaria / Larmor Plage le 2/11.

Bécasseau sanderling *Calidris alba* (14 données)

Deux données au printemps : 2 le 08/04/00 dans la Petite Mer de Gâvres puis 24 le 09/05 à Suscinio / Sarzeau.

Retour des observations fin août : une dizaine d'individus à Locmalo / Gâvres entre le 24/08 et le 28/08, Présence importante courant octobre : 150 au Conguel / Quiberon le 13/10, 350 à Larmor-Plage le 09/11, et 180 à Penthievre le 11/11 .

Bécasseau minute *Calidris minuta* (3 données)

Très peu d'observations : 2 le 31/07 à Kersahu / Gâvres, 3 à Pen-Mané / Locmiquélic le

29/08 et 2 au Pô / Carnac le 17/09

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

(9 données)

Le 25/07/00 observation de 2 individus encore en plumage nuptial à Kersahu / Gâvres puis de 3 juvéniles à Pen Mané le 27/08 et d'un autre jeune à Kersahu le 02/09 et le 16/09.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(4 données)

Ces données suivent celles concernant les hivernants : 13 individus le 22/03/00 au Stôle / Ploemeur, 18 à l'Ile de Méaban le 01/05 et 19 à Houat le 01/05.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(22 données)

Peu de données pour le passage printanier : 100 le 19/03/00 à La Grée de Penvins / Sarzeau, 26 le 1^{er} avril à Pen-Mané / Locmiquélic. Il faut attendre le 25/07 pour avoir un imposant rassemblement de 310 individus à Linès / Gâvres, puis un d'environ 200 le 09/08 en rivière d'Etel . Présence d'une trentaine d'individus dans la baie de Locmalo / Gâvres du 24/08 au 28/08 avec une pointe de 50 le 27/08.

Combattant varié *Philomachus pugnax*

(12 données)

Trois données printanières dont trois mâles colorés le 08/05/00 à Kersahu et 4 individus à Pen-Mané / Locmiquélic le 28/03 . Observation d'une jeune femelle le 29/08 à Kersahu .

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus*

(1 donnée)

Un individu est observé le 24/09 à Kersahu / Gâvres.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

(13 données)

Peu d'observations au début du printemps et de maigres effectifs : 7 le 27/03/00 à Ty Rhu / Locoal Mendon, 5 le 31/03 à Moteno / Plouhinec et 12 le 80/10 dans les lagunes de Bonnervo / Theix.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

(16 données)

Elle est encore observée après la mi-mars : le 18/03/00 3 à Kersahu /Gâvres et 355 au pont de Noyalo le 05/04. De nombreuses observations en août : 76 le 05/08 à Falguérec / Séné, plus de 100 au Duer / Sarzeau le 24/08.

Barge rousse *Limosa lapponica*

(15 données)

6 individus le 02/04/00 à Penerf puis 66 le 05/04 à Noyalo, 40 à la pointe de l'Helguen / Pénestin le 25/09 et 25 à Bénance / Sarzeau le 10/11.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

(19 données)

Les passages printaniers sont peu notés : première observation d'un individu le 19/04/00 à Kersahu/ Gâvres puis de 11 le 22/04 et de 90 le 29/04, en vol vers la mer .

Le 08/05 présence de 12 dans la lande à Kergal / Theix. A partir de cette date les données manquent jusqu'au 02/07 : observation de 21 individus au Croyal / Locoal Mendon.

Peu d'observations au retour : 15 du 16/08 au 25/08 à Sail / Damgan .

Courlis cendré *Numenius aquata*

(28 données)

Peu de données printanières : 5 individus le 02/04/00 à Port Groix / Surzur, 140 dans un champ le 28/04 à Roz / Theix, 3 à Kersahu / Gâvres le 29/04 et le 08/05.

Aucune observation jusqu'au 11/07 : 10 individus sur la grève d'une vasière de l'estuaire de la Vilaine au Moustoir / Muzillac .

Les effectifs augmentent à partir de fin juillet : 112 le 25/07 au reposoir de pleine mer de Linès / Gâvres, puis 154 le 01/08 sur la Petite Mer de Gâvres. Le 05/08 115 individus remontent l'estuaire à Pen Lann / Billiers. ; le 10/09, 230 à Port Groix / Surzur. Le 17/09, 70 à 80 traversent la rivière à Kerihuello / Locoal Mendon à l'approche d'un chasseur .

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

(2 données)

Les observations manquent puisque les seules données émanent de Kersahu / Gâvres : 1 juvénile le 06/08/00 et 4 le 24/09 .

Chevalier gambette *Tringa totanus*

(34 données)

Reproduction :

- Kersahu / Gâvres un couple nicheur probable.
- étier d'Ambon 2 couples nicheurs.
- Bétahon/ Ambon 1 couple avec jeune.

Les rassemblements commencent à partir du 18/07/00 : 70 à Truscat / Sarzeau, 15 à Linès le 25/07.

Date	Effectif
01/08	96
12/08	17
27/08	30
29/08	38

Date	Effectif
11/08	30
16/08	108
26/08	250

Chevaliers gambettes à Pen-Mané / Locmiquélic et à Redon / Damgan ; été 2000

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

(38 données)

Le passage printanier ne livre que 3 données, d'un individu à chaque fois :

- le 07/05/00 au Listrec / Locoal-Mendon.
- le 08/05 à Kerboulico / Le Tour-du-Parc.
- le 09/05 à Beg Lann / Sarzeau.

Jusqu'au 3/07, il n'y a aucune donnée. En été, le suivi de l'espèce est effectué en rade de Lorient ; les maxima interviennent le 29/08 à Pen Mané avec 5 individus, le 10/09 à Kersahu avec 18 individus. 9 individus sont observés à Kercadic / Sainte Hélène le 29/10.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

(25 données)

Quelques individus isolés sont observés au printemps du 19/03/00 au 8/05

Le passage postnuptial débute le 20/07 avec un maximum de 12 le 08/10 dans les lagunes de Surzur .

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

(3 données)

- 1 individu le 05/08/00 à Bétahon / Ambon.
- 1 à Pen-Mané / Locmiquélic le 29/08.
- 2 au Duer / Sarzeau.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

(47 données)

Peu d'observations printanières; aucune donnée entre le 01/05/00 et le 30/06. Les effectifs augmentent à partir de fin juillet. Un suivi est effectué à Kersahu / Gâvres.

25/07	16
31/07	32
6/08	16
12/08	13
26/08	14
29/08	>10
16/09	7

Chevalier guignette à Kersahu / Gâvres
juillet - août 2000

Tourneperrière à collier *Arenaria interpres*

(21 données)

Une concentration de 42 individus est observée le 06/08/00 à l'Ile des Souris / Port-Louis, de plus de 40 à Locmalo / Gâvres le 25/08, de 30 à la pointe de l'Helguen / Pénestin le 25/09.

AR VRAN MORBIHAN N°21

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Jean-Luc Lemonnier.

Pour cette période, nous sont parvenues 165 données relatives à 23 espèces de ce groupe.

Stercorariidae sp.

(3 données)

Ces données concernent un total de quatre oiseaux observés au large de Damgan ou de Ploemeur entre le 16/08/00 et le 01/09/00.

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*

(aucune donnée)

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*

(2 données)

- 5 le 25/09/00 à la pointe de l'Helguen / Pénestin,
- 1 en 1 heure 30 de guet à la mer depuis la pointe de Kerroch / Ploemeur le 10/10.

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*

(1 donnée)

Espèce toujours aussi rare et / ou aussi difficile à détecter sur nos côtes ; cette observation concerne pourtant deux individus vus à Treutan / Damgan le 02/09.

Grand Labbe *Catharacta skua*

(2 données)

Cette période encore, il faut attendre le milieu de l'automne pour que soit repérée cette espèce :

- 1 durant une tempête le 10/10/00 au Talut / Ploemeur,
- 3 vus depuis la pointe de Penvins / Sarzeau le 11/11.

Laridae sp.

(1 donnée)

Il s'agit d'un rassemblement de 610 grisards le 28/07/00 à Quélisoye / Larmor – Plage.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

(7 données)

Une seule donnée printanière (1 oiseau de 2^e été le 07/05/00 en ria d'Etel) et il faut ensuite attendre le 29/07 pour contacter à nouveau l'espèce (1 à la pointe de Kerroch / Ploemeur). En fin d'été, on retiendra un effectif record d'environ 40 individus enregistré les 27/08 et 17/09 à la Roche sèche / Erdeven ; s'agissait-il de reposoir ou d'oiseaux passant en mer, l'observateur ne le précise pas.

Mouette pygmée *Larus minutus*

(4 données)

En tout début de période, un beau groupe de 20 individus au Tour du Parc le 19/03/00.
Les deux autres données, automnales et rapprochées, concernent :

- 2 jeunes oiseaux à la pointe de l'Helguen / Pénestin le 25/09,
- 3 présentes à l'étang du Ter / Ploemeur du 27 au 30/09.

Mouette de Sabine *Larus sabini*

(1 donnée)

Le 10/10/00, une séance d'une heure et demie de guet à la mer à la pointe de Kerroch / Ploemeur permet l'observation de ce seul individu.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(8 données)

Nombreux furent les observateurs à guetter le retour des premières rieuses sur nos côtes après la reproduction, la donnée la plus précoce est du 17/06/00 où des jeunes de l'année accompagnent des adultes encore porteurs de capuchon à Pen Mané / Locmiquélic.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

(1 donnée)

1 le 25/09/00 au Logo / Pénestin.

Si le site de Pénestin est classique pour l'espèce, l'époque l'est un peu moins, il faut remonter à 1995 pour que le Goéland à bec cerclé apparaisse en septembre dans nos chroniques.

Goéland cendré *Larus canus*

(8 données)

De très faibles effectifs pour cette période. Le maximum de 15 individus est atteint deux fois le 14/08/00 et 01/09 sur la commune de Damgan, lieu de contact habituel pour cette espèce. Les autres données ne mentionnent que de 1 à 6 individus.

Goéland brun *Larus fuscus*

(8 données)

Malheureusement, seul un observateur a communiqué une donnée concernant la nidification de cette espèce dans notre département : il s'agit d'un couple mixte G. brun x G. argenté couvant au port de commerce de Lorient et ayant échoué.

Un seul rassemblement notable : 194 au Néguan / Locoal-Mendon sur la ria d'Etel le 08/10/00.

Goéland argenté *Larus argentatus*

(6 données)

Un échantillon de 33 couples installés sur un bâtiment de la criée de Lorient a produit le remarquable chiffre de 43 jeunes à l'envol entre le 01/07 et le 15/08/00. Ce goéland se reproduit également loin des ports de cette même ville, sans que nous soit parvenue l'estimation de l'effectif nicheur. Concernant les rassemblements post-nuptiaux, les chiffres les plus imposants proviennent de Treulan / Damgan avec un minimum de 500 le 16/08 puis de 2000 le 01/09/00.

Goéland leucophée *Larus cachinnans*

(2 données)

- 2 le 18/03/00 à Pen Mané / Locmiquélic,
- le 06/11/00 au pont de Kerino / Vannes.

Goéland marin *Larus marinus*

(8 données)

Aucune donnée de reproduction communiquée. De 5 à 20 individus fréquentent les alentours de Gâvres en août 2000.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

(3 données)

En juillet et août 2000, de nombreuses et régulières séances de guet à la mer à la pointe de Kerroch / Ploemeur n'ont permis de contacter qu'une seule Mouette tridactyle le 26/07. Il faut attendre le mois de novembre pour deux autres observations d'oiseaux isolés au large de Sarzeau et de Saint-Pierre Quiberon.

Sterne caspienne *Sterna caspia*

(1 donnée)

Il avait fallu attendre dix années de chroniques morbihannaises pour voir apparaître cette espèce, en 1999. Et la voici de retour dès l'année suivante! 1 le 14/09/00 en rivière d'Auray.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(35 données)

Rappelons que l'espèce est contactée sur nos côtes tout l'hiver. Le début du passage prénuptial est ainsi difficile à détecter mais les observations semblent vraiment régulières à compter de la dernière décade de mars. Si l'espèce est très régulièrement observée lors des guets à la mer depuis la pointe de Kerroch / Ploemeur tout l'été, les passages concernent au plus quelques dizaines d'oiseaux (maximum 52 le 08/07/00). C'est à l'est, en baie de Vilaine, qu'il faut comme tous les ans chercher les rassemblements de jeunes et d'adultes : plusieurs centaines dès le 05/08, encore 200 à Treutan / Damgan le 26/08/00. Plus avant dans l'automne, sont notés ici et là quelques individus (3 le 06/11/00 au pont de Kerino / Vannes).

Sterne de Dougall *Sterna dougallii*

(4 données)

L'espèce, sans précision d'effectif, est notée le 25/09/00 à Berder / Larmor-Baden sur son site de prédilection. Mais la Sterne de Dougall est notée cette période sur trois sites inhabituels :

- 1 double la pointe de Kerroch / Ploemeur le 16/07, date particulièrement précoce,
- 1 adulte le 25/09 à la Roche Sèche / Erdeven,
- 1 le 25/09 à la pointe de l'Helguen / Pénestin.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

(34 données)

Le premier couveur est découvert très tôt, le 27/03/2000 à Boderharff / le Tour du Parc, site qui accueille 10 couples le 15/05. Toujours en presqu'île de Rhuys, la reproduction est prouvée à :

- Suscinio / Sarzeau avec 5 couples, 2 nids finissent noyés mais les trois autres familles comptent 1, 2 et 2 juvéniles dont 1 au moins s'envole le 30/06,
- au Duer / Sarzeau où le 24/06 trois familles comptent 1, 2 et 2 juvéniles.

A Locmariaquer, une barge d'ostréiculteur accueille 6 à 7 nids occupés le 19/06, une deuxième barge à proximité abrite peut-être d'autres nids.

Enfin, la dernière preuve de reproduction provient de l'importante colonie d'Iniz er Mor / rivière d'Etel où des nourrissages sont encore observés le 30/07 (l'effectif reproducteur sur cet îlot ne nous est pas connu, rappelons que tout débarquement y est prohibé et qu'un seul recensement annuel y est conduit par Bretagne Vivante).

Durant l'été, l'espèce est régulièrement observée depuis la pointe de Kerroch / Ploemeur mais en effectif beaucoup plus restreint que pour la Sterne caugek : moins d'une dizaine par séance en règle générale. Enfin, peu d'information quant au passage automnal, aucune donnée postérieure au 29/08 ne nous étant parvenue.

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

(4 données)

Comme en 1999, pas de données printanières. Pour la migration post-nuptiale, *in extenso* :

- 3 à Pen Mané / Locmiquélic le 01/08/00,
- 2 adultes à Kersahu/ Gâvres le 20/08,
- 1 juvénile à Treutau/ Damgan le 01/09
- 1 juvénile au moins à Penvins / Sarzeau le 16/09.

Sterne naine *Sterna albifrons*

(6 données)

Au printemps, seuls trois oiseaux sont vus au port de pêche de Lorient le 03/05/00. Les autres données, évoquant 1 ou 2 oiseaux, s'inscrivent entre le 06/08 et le 01/09 et proviennent essentiellement de la rade de Lorient.

Guifette noire *Chlidonias niger*

(7 données)

Peu de données pour les migrations de l'année 2000 et peu d'oiseaux au total. Au printemps, on compte trois mentions entre le 30/04 et le 28/05 dont un groupe de 9 oiseaux descendant la rivière d'Etel le 07/05. Les quatre données post-nuptiales couvrent toute la côte morbihannaise entre les 10/08 et 25/09 et ne concernent que 1 ou 2 oiseaux à chaque fois.

Alcidæ sp.

(4 données)

Avril et mai restent les mois favorables pour observer les alcidés mais les chiffres de cette année 2000 sont particulièrement élevés.

En revanche, aucune séance estivale de guet à la mer depuis la pointe de Kerroch / Ploemeur n'a permis de détecter d'alcidé.

Guillemot de Troïl *Uria aalge*

(13 données)

Il faut retenir le chiffre de 250 à 300 guillemots repérés le 23/04/00 lors d'une traversée de Quiberon vers Groix. Précision importante, aucun oiseau mazouté n'était à déplorer. La donnée est certes exceptionnelle mais pas inattendue : il y a tout lieu de croire que

seule la méthode de dénombrement — suivi d'une ligne parallèle à la côte, sensiblement sur l'isobathe 30 m — ait permis d'observer tant d'oiseaux. Une semaine plus tard, la traversée de Quiberon vers Houat, en eau moins profonde, ne fournissait que 9 guillemots.

Pingouin torda *Alca torda*

(7 données)

Ce même 23/04/00, à un mille de Houat cette fois, 19 Pingouins tordas dont un mazouté sont notés. Toujours à Houat, 2 sont vus le 30/04. Le lendemain, 01/05, 8 sont identifiés depuis la pointe de Kerroc'h / Ploemeur s'ajoutant à 23 autres alcidés d'espèce indéterminée.

Deux individus seulement sont notés en fin d'été et automne.

AR VRAN MORBIHAN N° 21

Groupe n°5 - Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick PHILIPPON

Pigeon colombin *Columba oenas*

(3 données)

Les chanteurs entendus en mai 2000 peuvent être considérés comme nicheurs probables d'après les observateurs : 1 couple à Coet Candec / Colpo dans un château en ruines ; 1 chanteur au château de Trédion. Il s'agit de 2 anciens sites ...qui n'étaient plus visités. Pas de données pour les sites de Grégo / Surzur , de Ploeren, de La Guyondaie / Caro et de Quinipily / Baud.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

(7 données)

Les données proviennent du recensement avifaune forestière (forêt de Lanouée et Pont Callek). La reproduction se poursuit en septembre avec 2 jeunes à l'envol le 02/09/00 au bourg de Carentoir et une ponte (coquille d'œuf au pied d'un chêne) le 19/09 à Ty Rhu / Locoal Mendon

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

(5 données)

Présente en forêt de Lanouée et de Pont Callek le 21/05/00

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

(25 données)

Premier chanteur le 19/04/00 au Sullio / St Jean Brévelay.

A partir du 08/05, les observations concernent plusieurs individus entendus ensemble (Erdeven, La Trinité sur mer, Surzur). Le recensement du 21/05 en forêt de Lanouée et de Pont Callek et les observations du 26/05 et 16/06 sur ces mêmes lieux permettent de dénombrer plus de 20 chanteurs en 15 lieux différents. Présente aussi au Moteno / Plouhinec, Calatrène / Bangor.

Dernière observation le 02/09 à Pénerf / Damgan.

Perruche à collier *Psittacula krameri*

(1 donnée)

1 à 2 individus le 25/09/00 sur l'île de Berder / Larmor Baden.

Coucou gris *Cuculus canorus*

(17 données)

Premier chant le 23/03/00 à Sarzeau. Du 03 au 06/04 divers chanteurs sont entendus à l'unité à Vannes, Ploemeur, Merlevenez. A compter du 17/04 les données s'accumulent. Bien présent en forêt de Lanouée le 21/05.

Enfin la dernière observation concerne une femelle en phase rousse le 17/06 à Kersahu / Gâvres.

Effraie des clochers *Tyto alba*

(13 données)

Notée à Belz, Le Tour du Parc, Locoal Mendon, Sarzeau, Sauzon, Séné, Ploemeur (2 jeunes dans un chêne creux le 20/06/00), Plouhinec.

5 données concernent des chocs contre véhicule pendant la période.

Chevêche d'Athéna *Athena noctua*

(7 données)

A compter du 26/02/00, les chanteurs sont notés sur 2 communes : Guidel (4 sites différents) et Locoal-Mendon (1 site). A Ty-Rhu / Locoal Medon, les cris d'1 femelle suivis d'appels d'un mâle le 17/03, 1 en vol le 08/09 au même endroit. Considérée comme nicheuse à Larédo / Guidel ; 1 le 19/05 à Kerfontaine / Guidel. 1 le 25/08 à l'étang de Poulbé / Erdeven. Celle retrouvée sur le bord de la RN 165 à Vannes le 10/10 (aucun site connu à proximité) peut illustrer l'erratisme de l'espèce.

Chouette hulotte *Strix aluco*

(9 données)

La reproduction est notée en mai : 1 jeune volant le 07/05/00 à Sullio / Saint-Jean Brevelay et 2 jeunes à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon

Présente lors du recensement avifaune forestière (forêt de Lanouée) le 21/05 ainsi qu'à Sarzeau et Plouhinec.

Hibou des marais *Asio flammeus*

(4 données)

Passage automnal à Hoëdic les 20/10/00 (2 individus), 21 et 22/10 avec 1 oiseau à chaque fois. 1 individu le 04/11 à Kersahu / Gâvres.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

(8 données)

Les sites connus autour de Vannes n'ont pas été visités pendant la période.

En mai des chanteurs sont notés à Ty Rhu / Locoal Mendon (05/05/00) à Lanvel / Brandivy (16/05/), pendant le recensement avifaune forestière (forêt de Lanouée le 21/05/00), à Niheu / Locoal Mendon. 1 individu chasse les hannetons « de la Saint Jean » à Kerminihy / Erdeven le 12/07.

Dernière donnée: en août 2000 à Ster Voën / Sauzon, contacté à la repasse

Martinet noir *Apus apus*

(21 données)

Comme l'année précédente, les premières observations datent du 17/04/00... au dessus de l'étang du Varquez / Erdeven.

Du 17 au 23/04 chacun observe les premiers arrivés, par groupes et en faible nombre (<20) sur Vannes, Ploermel, Locmiquélic'. Suit une semaine (du 22 au 29) sans observation. Plus de 100 sont notés le 29/04 à Kersahu / Gâvres, seule observation de concentration.

Pas de données de nidification pendant la période (sauf à Brandérion le 07/05/00) !

Compte tenu des récentes observations de nidification dans les falaises, les arbres en Anjou (voir le Crex n°6 2001 cf BL 33 page 11), il serait intéressant de s'intéresser à cette espèce, qui voit d'année en année ses possibilités de nidification diminuer liées principalement aux réhabilitations des immeubles dans les centres villes

Fidèle à ses dates de départ, les dernières rondes sont vues les premiers jours d'août à Lorient et Vannes. S'ensuit une série d'observations d'individus (maximum 3 ensemble) entre le 06/08 et le 09/09/00 à Lorient, dernière date connue.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* (42 données)

Prouver la nidification de l'espèce dans le Morbihan est délicate puisque seulement 3 données concernant 1 voire 2 individus sont disponibles entre mai et juillet 2000 . (étang du Fourneau / Sainte Brigitte, étang de Pont Callek : Kernascleden, étang du Val / Carentoir) A noter cependant 1 adulte et un jeune le 14/08/00 à Crucuno / Erdeven. Notons encore Le Dreff / Riantec avec 2 individus et 1 oiseau le 14/08 à Pénerf / Damgan.

Les données augmentent à compter du 23/08 (11 données) sur différents sites (Locmalo / Gâvres, étang de la Forêt / Brandivy, rivière de Landévant) toujours avec 1 individu à chaque observation.

En septembre et octobre (23 données) les milieux favorables (étangs, bords de côtes), où l'espèce n'est pas notée pendant la période de nidification, fournissent des données à l'unité, voire 2 individus (Ambon, Erdeven, Guidel, Muzillac, Noyal, Larmor-Baden, Larmor-Plage, Le Tour-du-Parc, Locoal-Mendon, Ploemeur, Plouhinec, Sarzeau...).

A noter 2 chocs par véhicule les 03/09 à l'étang de Saint Jean / Locoal Mendon et 23/09 à Colpo au niveau du bourg sur la départementale.

Guépier d'Europe *Merops apiaster* (1 donnée)

5 à Crac'h le 25/08/00. Le petit groupe n'a fait que survoler l'observateur.

Huppe fasciée *Upupa epops* (8 données)

Premier chant le 23/03/00 à Suscinio / Sarzeau. Trois données d'avril d'un individu à chaque fois : le 07/04 à Guoven / Languidic, le 08/04/00 à le Gaillec / Ploemeur et le 30/04 à Muzillac.

Trois données de mai concernent peut-être le même couple toujours vu le long de la RN 165 dans le secteur de Bohal, Sérent, Caro dont deux observations d'un individu avec des insectes dans le bec le 04/05.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* (1 donnée)

Seule observation : 1 individu le 24/09/00 à Hoëdic

Pic cendré *Picus canu* (2 données)

Les deux données concernent une observation dans le massif de Lanouée lors du recensement de l'avifaune forestière le 21/05/00 : 1 individu.

C'est une redécouverte : le Cendré a été contacté en 96 et 97 sur le littoral mais c'est la première fois depuis l'atlas des oiseaux nicheurs 1980-1985 qu'on le signale dans des sites convenant à sa reproduction.

Pic vert *Picus viridis*

(8 données)

Contacté sur toute la période sur l'ensemble du département.

Pic noir *Dryocopus martius*

(16 données)

1 individu le 29/04/00 à Kergo / Kervignac. Il trahit sa présence par l'écorçage de la base des troncs dans le bois de Treulan / Colpo (01/05), est vu en forêt de Floranges / Camors (04/05), à Ty Lann / Caudan (02/05), à Mane er Velin / Landaul (15/05), à la Forêt / Locoal Mendon (11/05), bien sûr en forêt de Lanouée (21/05).

En juin quatre données le signalent en forêt de Pont Callek (16/06), sur la Laïta / Guidel (07/06) et à Beg er Lann / Merlevenez... sans confirmation réelle de nidification.

L'erratisme d'automne est perceptible sur Muzillac (le 25/09) et la presqu'île de Rhuy où il est de plus en plus noté : 1 le 01/10 à Kergall / Surzur et 1 le 26/10 au Duer / Sarzeau (même individu ?).

Pic épeiche *Dendrocopos major*

(16 données)

Comme pour un bon nombre des espèces de ce groupe, les recensements en forêt ont augmenté le nombre de données (Lanouée, Pont-Callek). Il est noté nicheur à Tréhelo / Caudan (le 08/06/00), à Cotroal / Guidel (le 19/05) et vu pendant toute la saison à Carentoir.

Pic mar *Dendrocopos medius*

(2 donnée)

Plusieurs contacts en forêt de Lanouée le 21/05/00. 1 individu le 09/06/00 sur la Laïta

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

(4 données)

Noté nicheur le 09/06/00 sur la Laïta / Guidel, cette espèce est présente pendant toute la période à Carentoir, Guidel, Locoal Mendon...

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(3 données)

Qui est le plus fidèle au port de commerce de Lorient ? L'oiseau ou l'observateur ? Les deux puisque cette année leur rencontre a eu lieu 3 fois : les 01/05, le 02/07 et 04/10/00.

Alouette lulu *Lullula arborea*

(11 données)

L'espèce semble présente toute l'année. Les données se concentrent sur les communes de Brandivy, Les Forges, Gâvres, Guidel, Locoal Mendon, Ploemeur, Saint Dolay, Saint Marcel.

Les données recueillies ne permettent pas de prouver quelque mouvement migratoire.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

(2 données)

Une petite bande de 10 individus à Le Ruaud / Béganne le 03/06/00.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

(23 données)

Une arrivée massive caractérise cette saison : les 200 premières sont vues le 17/03/00 à Suscinio / Sarzeau au dessus d'un marais. Deux jours plus tard: 50 à l'étang de Bédune / Ambon et 100 au château d'eau de Le Tour -du-Parc.

Ces arrivées se poursuivent ensuite : 200 le 27/03 à l'étang du Pont Caden / Le Tour du Parc; 230 le 02/04 à l'étang de Noyalo et 350 le 09/04 à l'étang du Pont Caden / Le Tour du Parc. Pas de données jusqu'à fin avril.

A partir du 01/05, les oiseaux s'installent, creusant des cavités : le 01/05 au Vieux port / Hoëdic, le 08/05 au marais de Kervillen / La Trinité sur mer.

En juin, des présomptions de nidification existent : 80 trous occupés le 04/06/00, 30 à 50 couples présents le 08/06/00 sur la colonie de Meslan (D 769) : il s'agit d'une falaise créée suite aux travaux routiers. 80 couples à Saint Gildas de Rhys le 17/06/00

Notons la colonie rue de la Motte à Pontivy : environ 15 couples ont trouvé refuge à 4 mètres de hauteur dans un mur en terre et pierres (observations du 09/06). Bien que peu fréquent ce type de milieu a longtemps été exploité à Theix où 3 murs à des endroits différents (et des hauteurs différentes) du centre bourg ont abrité jusqu'à 35 couples. Dernière date de nidification connue sur ce site : 1992.

Le départ des colonies semble s'opérer en août : abandon constaté du site de Meslan le 14/08. La migration est bien marquée le 04/09 à la Pointe du Talud / Ploemeur lors d'un guet à la mer.

Dernière observation le 21/10/00 dans le bourg d'Hoëdic

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

(29 données)

Du 17 au 25/03, 7 données d'un individu à Ambon, Baden, Locoal-Mendon, Sarzeau, Surzur (3 observations différentes). La première décade d'avril voit les premiers groupes arriver : 8 le 02/04 à Pénerf / Damgan et 50 le même jour à Noyalo, puis sur tout le département avec plus de 10 individus par site (Vannes, Malestroit, Ploermel...)

Sa nidification est repérée sur plusieurs sites de mai à août . Les déplacements post-nuptiaux commencent fin août et sont particulièrement visibles en septembre : passage important le 04/09 à la pointe du Talud / Ploemeur, au centre ville de Malestroit le 22/09 où plus de 400 individus survolent la ville vers le sud-ouest tout en se nourrissant. En octobre, des groupes moins nombreux (de 1 à 25 individus) convergent vers le sud est. Dernière donnée : 1 à Locmaria / Larmor Plage les 15 et 17/11/00.

Hirondelle à front blanc *Hirundo pyrrhonota*

(1 donnée)

Première mention française et bretonne à Hoëdic avec 1 individu les 30/09 et 01/10/00.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

(4 données)

Les 4 premières sont observées le 21/04/00 à Ploermel. Nicheuse le 07/05 dans le bourg de La,dévant. Nourrit encore le 09/08 à Bubry. Pas de données sur la migration ni de dernière observation.

A quand un recensement de la nidification de cette espèce ?

Pipit rousseline *Anthus campestris*

(2 données)

2 données d'observateurs différents à la même période : 1 le 25/08/00 à Arzon (lieu non précisé) et 1 le 27/08 à la Roche sèche / Erdeven. L'espèce n'avait été précédemment identifiée qu'en 1994 et 1996.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

(8 données)

Le premier chanteur est entendu le 04/04/00 sur la commune d'Augan. Noté quotidiennement en avril à Ty Rhu et Kervihen / Locoal Mendon. Le 08/05, 3 chanteurs sur le même site de Kergall / Surzur traduit un regroupement de migrants (non nicheur sur ce site). Il est présent lors du recensement en forêt de Lanouée le 21/05.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

(3 données)

1 à Beg Lann / Sarzeau le 19/03/00. Malheureusement non dénombré le 16/05 à Kerminihy / Erdeven. Plusieurs dizaines le 01/10 au Magouëro / Plouhinec : seule donnée du passage d'automne.

Pipit maritime *Anthus petrosus*

(4 données)

Nicheur comme chaque année à Pénerf et Kervoyal / Damgan.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

(1 donnée)

Le 19/03/00 1 individu à Beg Lann / Sarzeau.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

(21 données)

Les premières sont vues le 08/04/00 à Kersahu / Gâvres. Notée dans les lieux favorables pendant la période comme nicheur à Kersahu, dans les marais de Susicinio / Sarzeau, Bétahon, Trély, Tréhervé / Ambon ; la Crolaye / Rieux ; Crucuno et Fetan Levec / Erdeven.

L'erratisme post nuptial est repéré à la Roche Sèche / Erdeven le 27/08 avec 30 individus. La migration est peu notée, (3 données seulement dont 2 en septembre : 4 le 24/09 à Kergénès / Surzur)

Bergeronnette flavéole *Motacilla flavissima*

(2 données)

1 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 06/04/00 et 1 le 14/05 à Kersahu / Gâvres.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

(9 données)

Le recensement forestier la localise le 21/05/00 en forêt de Pontcallek alors que 6 couples sont présents le 07/04/00 à la laiterie Lorco / Pont Scorff.

Présent durant toute la période à Vannes sur la Marle.

Passage migratoire sensible dès le 17/09 avec 1 individu au Port de Pénerf / Damgan. 1 individu au Duer / Sarzeau le 13/11/00.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

(6 données)

Le rassemblement en dortoir à Vannes compte déjà 120 individus le 14/10/00 pour atteindre 1000 à 1200 individus le 25/11/00..

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (9 données); **Accenteur mouchet *Prunella modularis*** (5 données); **Rougegorge familier *Erithacus rubecula*** (10 données). Présents en forêt lors des recensements.

Rossignol philomène *Luscinia megarhynchos*

(3 données)

1 le 28/04/00 à Kerguer / Lanester. 2 chanteurs à Séné le 25/05/00 dont 1 sur l'îlot de Mancel.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

(7 données)

Les 3 premiers chanteurs sont à Susicinio / Sarzeau le 23/03/00. Les données portent sur des mâles chanteurs en mai et juin à Kerminihy et Fetan Levec / Erdeven, au Moteno / Plouhinec, Kersahu / Gâvres.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

(9 données)

Noté principalement dans les centres villes et les bourgs : Baud, Carentoir, Colpo, Muzillac, Ploermel, Sarzeau...

La migration est notée sur Hoëdic le 21/10/00.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

(3 données)

Migration de printemps : 1 mâle le 28/04/00 à Hoëdic

Migration post nuptiale : 1 femelle le 24/09 dans les marais de Kergenêts / Surzur en compagnie de Tarier des prés et 2 le 01/10 à Pen Mané / Locmiquelic.

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

(8 données)

Le passage d'automne est bien remarqué cette année. Les données se concentrent sur un mois (24/08 - 24/09/00) et plus particulièrement sur 2 sites : la rivière de Pénerf (Damgan, Surzur) et Gâvres. Deux pics se dessinent :

- le 26/08/00 avec 8 individus en 2 endroits à Le Lenn, Gueneguelo / Damgan
- le 24/09/00 avec 12 oiseaux dans les marais de Kergenêts / Surzur et 3 à Pentès / Surzur.

Tarier pâtre *Saxicola torquata*

(12 données)

L'espèce semble bien répartie sur l'ensemble du département en nombre plus ou moins important suivant les sites. Présent et nicheur aussi bien en forêt (Lanouée et Pontcallek) que sur le littoral ((Surzur, Damgan, Sarzeau, Gâvres)

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (23 données)

La remontée de printemps est peu notée, seulement trois citations : le 31/03/00, 2 individus sont observés à Moténo / Plouhinec puis 1 donnée en avril (1 femelle le 21/04 à La Crolaye / Rieux) et 1 en mai (1le 01/05 à la pointe de Kerroch / Ploemeur).

2 données en juin (pointe du Conguel et le Moténo / Plouhinec) sans preuve de nidification.

La migration post-nuptiale est nette avec 16 données : 8 observations en août, 5 en septembre et 3 en octobre. Dès le 12/08, 1 femelle ou immature est vue à Kersahu / Gâvres. Le 20 /08 les traquets arrivent : 8 individus de grande taille arrivent sur une pâture au Lenn / Damgan (ils y resteront jusqu'au 17/09/00) et 3 autres au Treutan / Damgan. Le 25/08, 4 à Locmalo / Gâvres et 21 le 26/08/00 sur le secteur de Pénerf / Damgan.

En septembre, les chiffres concernent l'observation d'1 individu à chaque fois (sauf 3 le 24/09/00 dans les marais de Kergenêts / Surzur). Sept sont présents le 01/10/00 aux pylônes de Plouhinec et le dernier est vu le 22/10/00 au port de Gâvres.

Merle noir *Turdus merula* (7 données)**Grive litorne *Turdus pilaris*** (3 données)

Migration pré nuptiale : 17 le 10/04/00 à Le Gaillec / Ploemeur

Migration post-nuptiale : 3 le 01/11 à Kerpenrhu / Camors et 35 en vol le 10/11 à Monterblanc.

Grive musicienne *Turdus philomelos* (8 données)

Le décompte avifaune forestière permet de la noter dans tous les massifs.

Grive mauvis *Turdus iliacus* (2 données)

Passage détecté dès le 04/11/00 le soir à Ménimur / Vannes. Puis du 7 au 17/11 les passages nocturnes s'amplifient, en particulier les 15, 16 et 17/11/00.

Grive draine *Turdus viscivorus* (13 données)

Le décompte avifaune forestière permet de la noter dans tous les massifs (Lanouée, Pontcallek). Des « regroupements » sont notés sur les dunes de Kerminihy / Erdeven en avril et juin (6 individus et plus).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (12 données)

Espèce entendue toute l'année dans les milieux favorables (Ambon, Erdeven, Gâvres, Le Tour-du-Parc, Sarzeau, La Trinité-sur-Mer, Surzur).

Cisticole des joncs *Cisticola jundicis* (4 données)

Pas de données en mars. La première notée est celle s'égosillant le 09/04/00 au dessus

des marais de Pont Caden / Surzur ! 1 à 2 chanteurs sont entendus lors de sorties à Saint-Cado / Belz, Pen er Pont / Locoal-Mendon, Pen Mané / Locmiquélic,

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

(4 données)

Premier chant le 28/03/00 à Baden puis le 06/04/00 à l'étang de Lannénec / Ploemeur. Autre observation en avril : 2 le 19/04/00 à Lann-Kergreiz / Lanester. 1 chant lors du recensement forestier en forêt de Lanouée le 21/05.

Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides*

(1 donnée)

1 chanteur le 17/06/00 à Pen Mané / Locmiquélic.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

(7 données)

Les premiers chanteurs sont entendus à Kersahu / Gâvres le 08/04/00 et le 09/04. Trois données de mai sur 2 sites (Kerminihy et la Roche Sèche / Erdeven). Dernière observation le 29/08 à Kersahu / Gâvres.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

(4 données)

Notée pendant la période à Kersahu / Gâvres, étang du Loch / Guidel, marais de Kerduel / La Trinité sur mer, Tréhervé / Ambon, étang de Caden / Surzur.

Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta*

(8 données)

Toutes les données sont de mai : à Lanvel / Brech, le Rohello / Béganne, forêt de Lanouée, Kerfléau / Caudan.

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

(7 données)

Notée à Pen-Mur / Muzillac le 30/04/00 (ZNIEFF 56), lors des recensements forestiers (Lanouée). Preuve de nidification à Kersahu / Gâvres le 04/06. Notée le 25/09 à la pointe de l'Helguen / Penestin.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

(1 donnée)

1 le 22/10/00 à Kerminihy / Erdeven. Après une mention en octobre 1996 sur Houat, c'est la seconde fois que cette fauvette est notée.

Fauvette grisette *Sylvia communis*

(9 données)

1 le 17/04/00 à Beg Lann / Sarzeau, date tardive par rapport à 1999 (04/04/99). La première entendue à Kersahu / Gâvres l'est le 29/04. Y aurait-il eu une arrivée tardive ? Entendue pendant les recensements forestiers en mai (Lanouée). Nicheur à Kerbiguette / La Trinité Surzur. Dernière observation d'un mâle le 28/08/00 à Locmalo / Gâvres.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

(6 données)

Première donnée au bois de Treulan / Colpo le 01/05/00. Entendue à Pontcallek et Lanouée.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

(11 données)

Présente dans beaucoup de sites (forêts, jardins, ZNIEFF 56...)

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

(3 données)

3 données d'Hoëdic du 21/10/00 au 25/10 concernant à 1 à 2 individus dans le bourg.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

(8 données)

Premier chanteur le 17/04/00 dans de hauts sapins au bord du Scorff à Lanester. Toutes les autres données sont de mai et concernent les recensements forestiers de Lanouée et Pontcallek (21/05/00).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

(6 données)

Les recensements ZNIEFF 56 et forestiers fournissent l'ensemble des données.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

(10 données)

La migration est notée dès le 31/03/00 à Lanester avec 15 individus. Puis 1 individu est vu à Pénerf / Damgan le 01/04 dans un jardin. Quatre données de mai : en forêt de Lanouée (recensement du 21/05), aux Landes Rennaises / Guer le 01/05 et à Croix / Campénéac le 08/05/00. 1 individu au bord de la Laïta / Guidel le 07/07. Migration post-nuptiale fin août début septembre : 1 le 30/08 à Malestroît dans un jardin et 1 le 01/09 à Kerhostin / Saint-Pierre Quiberon.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

(7 données)

Présent lors de la sortie en forêt de Lanouée et Pontcallek (21/05/00) et dans le marais de Kervillen / La Trinité sur mer (ZNIEFF 56 le 08/05).

Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus*

(12 données)

Les recensements ZNIEFF 56 et forestiers de mai (21/05) permettent, comme pour l'espèce précédente, d'obtenir des données sur les secteurs enquêtés (Lanouée, Pontcallek, La Trinité sur Mer). Nicheur à Vannes (nourrissage de 3 juvéniles volants le 28/05/00), à la Laïta / Guidel (une famille de 8 à l'envol le 07/07). En octobre, il en est noté « des dizaines » à Hoëdic le 21/10.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

(16 données)

Les données débutent avec les recensements de l'avifaune forestière (Lanouée et Pontcallek le 20 et 21/05/00). Il est noté nicheur nourrissant à Ploermel le 30/06 au

centre ville et à Vannes le 21/07 dans le parc de Ménimur où 4 jeunes quémangent de la nourriture. L'erratisme post-nuptial est noté dès le 20/08 (à Ménimur / Vannes 3 adultes) et au Duer / Sarzeau avec 1 individu le 24/08. 1 oiseau est présent à Ty Rhu / Locoal Mendon le 03/09, disparaît le lendemain et 1 individu stationne les 11 et 12/09 à Ménimur / Vannes.

Gobemouche nain *Ficedula parva*

(2 données)

2 individus ont séjourné sur Hoëdic du 24/10/00 au 26/10 : 1 en plumage de premier hiver et 1 adulte.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

(16 données)

Migration prénuptiale : 1 mâle adulte le 28/04/00 à Hoëdic.

Migration post nuptiale : elle prend son ampleur à partir du 20/08 : trois données sur les sites de Vannes (2 individus à la Chambre d'Agriculture et à Ménimur), 1 individu à Magorlec / Sauzon puis dans la période du 24 au 28/08 entre 5 et 8 individus sur chaque site mentionnés ci-dessus. Septembre regroupe près de 50% des données de la période. On note un stationnement de plus d'une semaine des oiseaux : à Hoëdic (de 2 à 4 individus du 24/09 au 01/10), à Ty Rhu / Locoal Mendon (2 du 03 au 12/09), à Ménimur / Vannes (8 du 28/08 au 11/09). A partir du 12/09/00, l'espèce semble disparaître sur les sites fréquentés.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

(1 donnée)

1 seule donnée: entendue, le 09/11/00 à l'étang de Lannenec / Ploemeur.

Il est temps de rechercher cette espèce dont les effectifs semblent en diminution sur les sites connus (Erdeven, Sarzeau).

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (7 données) ; Mésange nonnette *Parus palustris* (4 données) ; Mésange huppée *Parus cristatus* (7 données).

Mésange noire *Parus ater*

(5 données).

Notée nicheuse à Coët Candec / Colpo le 10/06/00.

Mésange bleue *Parus caeruleus* (5 données) ; Mésange charbonnière *Parus major* (8 données) ; Sittelle torchepot *Sitta europea* (7 données). Toutes ces espèces ont été observées lors des recensements en forêt ou sur les ZNIEFF 56.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

(8 données)

Noté pendant les recensements forestiers (21/05/00), à Coët Candec / Colpo (2 le 01/05), lors des recensements ZNIEFF (Le Roho / Saint Dolay ; Pen-Mur / Muzillac).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* (1 donnée)

1 le 28/04/00 à Guidel-Plages /Guidel. Etonnante donnée printanière !

Geai des chênes *Garrulus glandarius* (8 données)**Pie bavarde *Pica pica*** (5 données)

1 individu le 20/03/00 au centre ville de Vannes avec dos, scapulaires et tête en partie blanc gris.

Choucas des tours *Corvus monedula* (6 données)

Des regroupements sont notés en mars:

- 60 le 26/03/00 autour de l'église de Redon,
- 20 le 29/03 dans le bourg de Plouay. Il y est nicheur le 20/06.

D'autres sites comme Malestroit, Vannes, Missiriac, Sérent et bien d'autres ... abritent des colonies qu'il serait nécessaire de dénombrer. Enfin 62 le 01/11 au centre de Ploemeur.

Corbeau freux *Corvus frugilegus* (2 données)

Nicheur à Sarzeau. 1 en vol le 17/09/00 au dessus du port de Pénerf / Damgan venant de Sarzeau et allant vers l'estuaire de la Vilaine, tout en criant.

Corneille noire *Corvus corone* (9 données)

Notée dans tous les sites d'observations. 2 concentrations :

- 50 le 24/09 à la Lande du Matz / Sarzeau
- 80 le 02/11 à Pen Mané / Locmiquelic, descendant le Blavet.

Grand Corbeau *Corvus corax* (3 données)

1 individu traverse entre Groix et Kerroch / Ploemeur le 01/05/00 à la Pointe du Talud / Ploemeur le 29/10/00.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (2 données); Moineau domestique *Passer domesticus* (2 données)**Moineau friquet *Passer montanus*** (1 donnée)

1 mâle à Kerdéhel / Baud le 23/05/00. Aucune donnée de nidification au bourg de Lizio ; celui-ci n'étant plus suivi.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

(6 données)

Serin cini *Serinus serinus*

(3 données)

Présent lors des recensements ZNIEFF 56 (marais de Kerdual et Kervillen / La Trinité sur Mer)

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (4 données) ; Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (2 données)
Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

(1 donnée)

Notée en forêt lors du recensement de l'avifaune forestière et de l'opération ZNIEFF 56.

Sizerin flammé *Carduelis flammea*

(1 donnée)

8 le 11/11/00 à l'étang de la forêt /Brandivy.

A rapprocher de la seule observation précédente dans nos archives : en février 1997 dans la forêt de Floranges !

Bec croisé des sapins *Loxia curvirostra*

(4 données)

Nidification en forêt de Lanouée (1 couple nourrit le 21/05/00) et 10 individus vus ensemble au Gué aux biches / Les Forges le 17/05/00.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

(6 données)

Un couple à Le Magouer / Plouhinec le 22/04/00, chanteur dans le marais de Kerdual / La Trinité sur Mer. Nidification prouvée à Beg er Lann / Ploemeur (1 mâle alimente la femelle le 15/05/00). Noté en forêt de Lanouée et Pontcallek. et lors du recensement ZNIEFF 56.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*

(1 donnée)

1 le 12/11/00 à Larmor Plage.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

(4 données)

Chanteur en forêt de Lanouée et Pontcallek, à Coët Candec / Colpo et à Saint Thomin / Nostang.

Bruant zizi *Emberiza cirlus*

(4 données)

Le recensement avifaune forestière (Lanouée, Pontcallek) le détecte. Vu aussi à Guer en octobre.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

(6 données)

L'espèce est observée dans ses milieux favorables pendant toute la période (marais de Béganne, de Suscinio, Erdeven, Surzur, étangs de Saint Marcel...).

Bruant proyer *Miliaria calandra*

(3 données)

1 le 15/07/00 à Petit Anvorte / Sauzon (nicheur ?). 1 le 26/08/00 à Tissac / Ambon, probablement erratique ou migrateur et 1 au Grand Loch / Guidel le 01/10/00.

NOTES DE TERRAIN

DESTRUCTION D'UNE COLONIE D'HIRONDELLES DE RIVAGE

Yann KERNINON

Une triste histoire.

Carrière de Quinipily / Baud 56.

Tout avait pourtant bien commencé.


1^{er} avril : une poignée d'Hirondelles de rivage inspecte le site.

16 avril : au moins 80 hirondelles présentes. Le creusement des nids débute. Les oiseaux ont jeté leur dévolu sur un tas récent de granulats dont la hauteur des parois disponibles varie entre trois et huit mètres.

21 avril : 116 nids.

29 avril : 189 nids.

06 mai : 217 nids.



Colonie d'Hirondelles de rivage, carrière de Quinipily / Baud en 1997

13 mai : 290 nids. Quelques fissures balafrent les parois.

27 mai : 334 nids.

04 juin : 249 nids. Deux petits éboulements se sont produits (garnitures de nids présentes dans les décombres).

10 juin : 0 nid ! Le tas de granulats est réduit à deux petits monticules.

Sur ce site, l'an passé, une colonie (plus de soixante nids) occupait un tas de granulats autrement plus conséquent. Tout s'était déroulé sans problème.

Aujourd'hui, la carrière semble être en fin de vie. Le front de taille est abandonné depuis quelques mois et un énorme tas de matériaux délaissé depuis des années est à présent exploité.

L'exploitant de la carrière n'a pas accordé de sursis aux squatteuses et c'est bien regrettable.

NIDIFICATION DU FULIGULE MILOUIN EN MORBIHAN, PRINTEMPS 2001

François URVOAZ

Dans l'ouvrage sur les Oiseaux Nicheurs de Bretagne, publié par le G.O.B. et couvrant la période 1980-1985, le Fuligule milouin (*Aythya ferina*), est noté comme nicheur certain sur la carte de Penerf et comme nicheur possible sur celle de Sarzeau ainsi que sur l'étang du Cranic / Brec'h.

Dans le Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France, couvrant la période 1985-1989, cette espèce n'est pas notée en tant que nicheuse dans le Morbihan et par ailleurs elle semble touchée par une régression des effectifs nicheurs dans l'ensemble de la France pour des raisons mal déterminées.

Le 8 mai 2001, à Suscinio, en compagnie de Loïc Hamet, nous repérons sur le marais situé près du château, le manège de deux mâles Milouins qui, à l'évidence, semblent quelque peu excités. Pendant cette observation, notre attention est attirée par une femelle très discrète, se faufilant entre les touffes de verdure. Elle se montre très peu et ne vient jamais sur l'eau libre.

Ce marais a conservé un aspect particulièrement sauvage, il est peu profond et parsemé d'îlots. Sur son pourtour, des arbres morts, certains abattus, une végétation dense de saules, lui donnent un caractère naturel et peu accessible.

Lors de la réunion bimensuelle du G.O.B. Morbihan à Brec'h le 15/06/01, j'apprends que des jeunes ont effectivement été aperçus et, le 25/06/01, me rendant sur les lieux avec Y. Ordureau, nous pouvons observer longuement la femelle surveillant 4 jeunes qui ne cessent d'effectuer des plonges pour se nourrir et déjà suffisamment grands pour que le passage d'un Busard des roseaux mâle ne les effarouche guère.

Finalement, le 31/08/01, veille de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau, un individu se nourrit seul sur le plan d'eau.

UNE SAISON DU PROGRAMME STOC – EPS DANS LE MORBIHAN

Gwenael DERIAN

Qu'est-ce que le STOC-EPS ?

Le programme Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple est un des outils utilisés pour suivre l'évolution des oiseaux dans leurs habitats (voir encadrés).

Son protocole est simple : il s'agit de noter, à partir de dix points d'écoute, les espèces d'oiseaux vues et entendues. Deux sorties sont nécessaires, séparées de quatre à cinq semaines, de chaque côté de la date – charnière, pour notre région, du 8 mai.

Les objectifs : faire renaître un réseau national pérennisé, autour d'un protocole consensuel optimisé

Aujourd'hui, il s'agit de recréer un réseau national de Suivi Temporel des Oiseaux Communs par la méthode des points d'écoute (Echantillonnage Ponctuel Simple) et à long terme, avec une coordination nationale. Certaines régions (Auvergne, Normandie, Nord-Pas-de-Calais) ont fait vivre des réseaux régionaux depuis le début des années 90. Au sein du réseau national, le programme serait mis en place dans des régions où il n'est pas présent actuellement. Chaque année, sur des sites précis et prédéfinis, répartis selon les grandes types d'habitat, l'observateur dénombre les oiseaux reproducteurs par la méthode des points d'écoute. Ainsi, année après année, on peut évaluer les tendances d'évolution des effectifs reproducteurs des espèces communes. Le protocole scientifique de récolte des données est encore à l'étude, le principe de base étant une entière compatibilité avec le protocole mis en place en 1989 afin que les personnes qui l'utilisent puissent continuer avec la même méthodologie (des lots de 10 points d'écoute réalisés avant et après le 8 mai). Un échantillonnage aléatoire des nouveaux sites qui seront prospectés semble indispensable pour assurer la récolte de données non biaisées et pouvoir ainsi effectuer des extrapolations au niveau départemental ou régional pour tous les ensembles d'un même type d'habitat.

(site Internet du CRBPO – 2001)

Encadré 1

Chaque année, le même parcours est répété, à des dates autant que possible similaires, sur une durée que l'on souhaite... longue.

L'observateur décrit chaque année l'habitat autour de chacun des dix points.

Le jour de l'écoute, il consigne les espèces contactées et les effectifs reconnus. Il peut aussi, c'est une option, préciser les distances des individus par rapport à lui.

Le STOC – EPS dans le Morbihan

Cette campagne STOC –EPS dans le Morbihan est parti d'initiative personnelle de membres du Groupe Ornithologique Breton. Après avoir contacté le coordinateur national au CRBPO, Frédéric Jiguet, nous avons constitué une équipe réduite.

Pour que le réseau soit viable, il faudrait que chaque département centralise ses données, et qu'il y ait si possible un coordinateur régional qui centralise les données des départements et les envoie au coordinateur national. Les régions ou les départements possèdent ainsi leurs bases de données,

Pour que le réseau soit viable, il faudrait que chaque département centralise ses données, et qu'il y ait si possible un coordinateur régional qui centralise les données des départements et les envoie au coordinateur national. Les régions ou les départements possèdent ainsi leurs bases de données, et peuvent les valoriser localement s'ils le souhaitent. C'est cette structuration locale qui a manqué au réseau initié en 1989 et qui en assurera désormais la pérennité. On souhaiterait qu'une dizaine de lots de points d'écoute (5 minutes par point) soit réalisée dans chaque département, tout en sachant qu'un effort plus faible est toujours beaucoup mieux que rien du tout. Le démarrage du programme a lieu dès le printemps 2001 sur le terrain. Les personnes le souhaitant pourront bien évidemment rallier le réseau ultérieurement, et pourquoi pas dès 2002 !

Ce sont 35 départements dans lesquels de nouveaux sites seront prospectés avec la méthodologie STOC EPS, avec des coordinations locales. L'intérêt d'une coordination locale est notamment qu'il existe une base de données régionale, que les observateurs locaux peuvent valoriser s'ils le souhaitent (avec notre aide si besoin). Cela pérennise aussi le réseau, tout en facilitant la gestion nationale d'un grand nombre de points d'écoute. A la date du 11 avril 2001, ce sont près de 1900 nouveaux points d'écoute qui seront normalement réalisés dès le printemps 2001 à travers la France !

(site Internet du CRBP – 2001)

Encadré 2

Six carrés nous ont été proposés, finalement cinq ont été effectués. Les commentaires suivants ne peuvent pas en conséquence s'appuyer sur une masse de données qui autorise une analyse des résultats, ils ont simplement pour but de présenter ce qui a été réalisé ce printemps 2001.

- La localisation des carrés EPS : cinq sont situés en arrière de la côte ouest du Morbihan, entre Locoal-Mendon et Pont-Scorff, un dernier est isolé dans la région de Josselin.

La détermination des carrés à échantillonner est aléatoire et opérée par mes soins. Chaque observateur souhaitant participer donne à son coordinateur local le nom d'une commune autour de laquelle il aimerait prospecter (domicile, site de prédilection pour l'ornithologie...). Le tirage au sort du carré est effectué dans un cercle de rayon 10 kilomètres autour de ce point. Ainsi, l'observateur a l'assurance de ne pas devoir aller trop loin de ses sites habituels, et le processus de tirage aléatoire est conservé. Des modulations sont effectuées pour les sites montagnards, afin d'éviter qu'un habitant d'une vallée ne se voit tirer au sort un carré dans une autre vallée. Le coordinateur national fournit ensuite au coordinateur local des fiches visualisant la localisation du carré à échantillonner, avec un numéro national pour chaque carré. Deux carrés sont en fait tirés au sort : le premier est celui qui est à faire, le second est un carré de remplacement éventuel, ou cas où le premier serait inaccessible : terrain privé sans accès autorisé, surface en eau trop importante. Toutefois, le principe reste que ce ne doivent pas être des raisons liées aux préférences de l'observateur qui font préférer le carré de remplacement au carré prioritaire, mais seulement des raisons d'accessibilité.

Le tirage aléatoire est une contrainte, mais elle est indispensable pour obtenir des données non biaisées vis à vis de l'habitat, si l'on veut pouvoir faire des extrapolations aux carrés non échantillonnés, et si l'on veut étudier les effets de la modification de l'habitat sur l'évolution des effectifs de l'avifaune.

(site Internet du CRBPO – 2001)

Encadré 3

- Les habitats : les milieux agricoles prédominent. Les carrés sont situés à la

périphérie d'agglomérations de quelque importance (Pont-Scorff, Hennebont) ou en campagne. De toute façon ce sont des milieux façonnés par l'homme où les enclaves sauvages sont restreintes (voir tableau 1).

Habitats	% des points d'écoute
Forêts (arbre > 5 m)	14
Buissons (ou jeune forêt < 5 m)	12
Pelouses, marais et landes	8
Milieux agricoles	54
Milieux bâtis ou urbanisés	12

Tableau 1



Un point d'écoute EPS à Kervignac

- Les espèces : 1114 contacts ont été établis avec 70 espèces.

La moyenne de contacts par carrés EPS est de 222,8 pour deux passages avec 113,4 contacts au premier passage (dates entre le 18 et le 29 avril), 109,4 contacts au second passage (entre le 23 mai et le 02 juin).

Le tableau 2 présente les dix espèces les plus souvent vues ou entendues.

espèce	Contacts avec l'espèce
Troglodyte mignon	92
Merle noir	82
Pinson des arbres	81
Pouillot véloce	80
Pigeon ramier	68
Rougegorge familier	66
Corneille noire	62
Grive musicienne	56
Fauvette à tête noire	48
Mésange charbonnière	28

Tableau 2

- Les remarques : pendant ces séances d'écoute et au cours des rencontres qui ont suivi, nous avons échangé nos impressions et défini quelques points :
 - le protocole est accessible, y compris à des oreilles qui ne sont pas expertes en chants divers d'oiseaux ; le fait que le même observateur couvre année après année le même carré pallie à ce biais inévitable de la différence de compétence entre les participants.
 - l'option « distance » est plus difficile à suivre, pourtant 3 des 5 participants l'ont remplie cette année ; ce ne sera sans doute pas vrai dans l'avenir ;
 - le dénombrement des chanteurs d'une même espèce est parfois difficile, notamment pour des espèces mobiles à faible distance de l'observateur (Pouillot véloce...) ;
 - il a pu être observé une interaction entre l'observateur et les oiseaux chanteurs : dans les premières minutes d'écoute, le désert semble s'être installé autour de l'intrus dans le rayon de 25 m qui constitue la première limite de l'option « distance » ;
 - la description des habitats : il n'est pas toujours évident de noter un élément secondaire ou un autre quand plusieurs semblent *a priori* remarquables, une part d'arbitraire se glisse donc dans la décision prise.
 - quel retour est envisagé vers les participants ? Même si nous trouvons un intérêt local à ce type d'activité, nous n'oublions pas le contexte plus étendu du programme et nous sommes intéressés par les résultats et les enseignements qui en découleront au niveau national ¹.

• Les perspectives : cinq carrés EPS constituent sans doute des pièces utiles dans la mosaïque qui couvre le territoire métropolitain et participeront à l'analyse nationale des habitats et des populations d'oiseaux à l'échelle nationale, puisque tel est le but du programme, mais à l'échelon départemental, voire breton, c'est peu.

Ce protocole est aisé à suivre et riche d'enseignement à partir du moment où il atteint une certaine ampleur. Un réseau informel l'a pris en charge dans le Morbihan, quelques personnes ont fait de même dans des départements voisins (Finistère, Ile-et-Vilaine...), nous espérons qu'il s'agit là du début d'un programme plus développé, que d'autres ornithologues du G.O.B. nous rejoindront pour atteindre à une coordination plus structurée. Malgré son qualificatif de Ponctuel ; le programme EPS présente d'abord l'avantage de nous placer dans la durée.

Les participants morbihannais au STOC – EPS en 2001 : Patrick Bailleul, Gaëtan Cornec, Gwenael Derian, Francis Guillemot, Bernard Iliou, Jean-Luc Lemonnier.

¹ Le bilan de ce genre de programme peut prendre la forme d'une circulaire confidentielle à l'adresse des participants ou d'une note dans une publication scientifique. Nous avons appris depuis que les résultats annuels du programme STOC-EPS paraîtront dans un numéro de la revue *Ornithos* de la LPO. Cette association n'étant ni l'instigatrice ni la coordinatrice du programme relayé par des ornithologues d'origines diverses sur le territoire national, cette voie de communication m'étonne. (Gw. Derian)

