

AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

Ti ar Vro B.P. 103
29833 CARHAIX cedex



N°22 ANNEE 2002

Sommaire du numéro 22 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 novembre 2000 à 15 mars 2001	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 15
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 20
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 24
 Activités du G.O.B. Morbihan	
L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du Morbihan, nouveau protocole	page 30
 Notes de terrain	
Aigrettes garzettes hivernant dans deux rivières maritimes du Morbihan	page 34
Recensement de la population de Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti</i> sur l'île d'Hoedic en 2001	page 42
 Documents	
Recensements Wetlands dans le Morbihan, Résultats de janvier 2001	page 44

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE :

16 NOVEMBRE 2000 A 15 MARS 2001

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
ARTEL Jean-Pierre, BAILLEUL Patrick, BLANCHART Jean-Luc, BOURGEAULT Armelle, BOUSSION Dominique (CSP), BOZEC René, CORBIERRE Jacques, CORLOU Pierre, COTY P, CROCHET Erwan, DERIAN Gwénaél, GAUTIER Sébastien, GELINAUD Guillaume, GUILLEMOT Francis, HAMET Loïc, HAMON Patrick, ILIOU Bernard, ISAAC Bertrand, KERNINON Yann, KERZHERO Valérie, LAMOUR Joël, LEMONNIER Françoise et Jean-Luc, LE MOUEL Arno, MAHEO Roger, MAOUT Jacques, MOUCHEL Yann, ORAIN Catherine, ORDUREAU Yannick, PALPANT Muriel, PHILIPPON Patrick, SIMON Nathalie, URVOAZ François... sauf erreur ou omission !

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton (Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre au 15 mars.

Les observations sont transmises au coordonnateur morbihannais sur papier ou disquette informatique en respectant l'ordre suivant :

ESPECE ou code	date	lieu-dit (voir carte I.G.N)	commune	effectif	remarques
48005	04/05/1999	Keriel	162	4	un adulte ravitaile trois jeunes dans une lande

Les listes des codes utilisés pour noter les espèces et répertorier les communes sont disponibles aux réunions du G.O.B à Brec'h.

Illustration : couverture Patrick Bailleul.

AR VRAN MORBIHAN N°22

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

Plongeon indéterminé *Gavia sp.*

(2 données)

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

(5 données)

L'espèce n'a été notée qu'en décembre ! 12 individus le 25/02/2001 à la Roche Sèche / Erdeven.

Plongeon arctique *Gavia arctica*

(4 données)

Il est noté entre le 24/12/2000 et le 07/03/01, d'Hoëdic à Belle-Île et autour de Gâvres, 1 à 2 individus à la fois.

Wetlands International : 16 individus dont 11 dans le Golfe du Morbihan.

Plongeon imbrin *Gavia immer*

(6 données)

5 observations proviennent du littoral entre Quiberon et Houat, entre le 20/12/2000 et le 06/03/2001.

Un individu est vu le 28/12 sur le lac de Guerlédan.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

(22 données)

L'espèce est très présente sur la rivière d'Etel, les groupes de quelques dizaines d'individus s'échelonnent d'amont en aval de la ria avec, le 17/01/01, un effectif total de 254 individus sans que l'étang de Saint-Jean accueille des groupes importants pendant l'hiver.

A Pen Mané / Locmiquélic, l'espèce a son maximum au début de décembre : 75 le 03/12/2000 puis 41 le 21/01, 36 le 24/02. Une à deux dizaines séjournent sur le récent étang du bourg de Riantec (20 le 03/12).

Wetlands International : 48% des individus comptés le sont dans la rivière d'Etel.


Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(43 données)

Les bandes hivernales ne sont pas toujours notées : 43 sur le Blavet devant Pen Mané / Locmiquélic le 20/11/2000, 35 à Bénance / Sarzeau le 11/02/01.

L'hivernage est suivi à l'étang au Duc (voir graphique)

Parades : 2 couples à Coët-Rivas / Kervignac le 11/02/2001, 3 couples le 04/03/01 au même étang et un couple à l'étang de la Forêt / Brandivy.



Grèbe huppé sur l'étang au Duc / Ploërmel (Morbihan) ; hiver 2000-2001

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

(2 données)

6 devant la pointe du Conguel / Quiberon le 01/01/2001.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(13 données)

Seulement treize données ? En dehors du Golfe du Morbihan, l'espèce a été contactée dans la rivière d'Etel (74 le 04/03/2001) et la Petite Mer de Gâvres (64 le 07/01).

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*

(2 données)

2 cadavres échoués les 06 et 07/02/2001 sur les plages de Plouharnel et Saint-Pierre-Quiberon.

Océanite indéterminé *Hydrobates sp*

(1 donnée)

« Un océanite sp. poussé par un très fort vent d'ouest traverse la route de Quiberon à reculons ! » le 04/01/2001.

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus*

(3 données)

Il y a ces deux O.tempêtes vus à Penvins / Sarzeau le 01/01/01 et ces deux autres entre Quiberon et Belle-Ile le 04/01 par mer très agitée et il y a ce cadavre du 12/01 à Saint-Jean-Brevelay que l'on peut attribuer à la même tempête hivernale.

Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa*

(1 donnée)

A Questembert, un cadavre d'adulte est retrouvé le 14/01/01.

Fou de Bassan *Sula bassana*

(10 données)

Il s'agit pour l'essentiel (7 données sur 10) de cadavres repérés lors de collectes systématiques sur le littoral.

Quelques oiseaux en vol sont observés dans la même zone : le groupe le plus nombreux est de 12 individus observés le 21/12/2000 en baie de Quiberon.

date	Lieu-dit	commune	Effectif	remarque
09/12/00	Penthièvre	SAINT-PIERRE-QUIBERON	1	cadavre échoué collecté le 16/12/2000, adulte ; 1,1 km de côte parcourue de part et d'autre du fort
05/01/01	plage de Sainte-Barbe	PLOUHARNEL	4	adultes échoués : 1 vivant mazouté capturé + 3 cadavres collectés ; 2 km de côte parcourue
10/01/01	plage de Sainte-Barbe	PLOUHARNEL	2	adultes, cadavres échoués mazoutés collectés ; 3 km de côte parcourue
14/01/01	plage de Kerhillio	ERDEVEN	1	adulte, cadavre échoué mazouté collecté ; 0,5 km de côte parcourue
21/01/01	plage de Sainte-Barbe	PLOUHARNEL	1	cadavre échoué mazouté collecté ; 3,4 km de côte parcourue de Kerhillio à Ty Hoche
06/02/01	Penthièvre	SAINT-PIERRE-QUIBERON	1	adulte, cadavre échoué mazouté, 3,1 km de côte parcourue.
07/02/01	grande plage de Plouharnel (Ty Hoche)	PLOUHARNEL	1	adulte, cadavre échoué mazouté, 3 km de côte parcourue


Fous de Bassan échoués, Plouharnel ; décembre 2000 – février 2001

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

(35 données)

Dates	Lieu-dit	Commune	Effectif	remarque
01/03/01	île aux Souris	PORT-LOUIS	138	au dortoir ; total rade de Lorient 253
01/03/01	port militaire	LORIENT	98	au dortoir ; total rade de Lorient 253
04/03/01	étang de la Forêt	BRANDIVY	23	au dortoir à l'aube ; 11 s'envolent vers le nord
20/01/01	le Parco	HENNEBONT	75	comptage au dortoir
13/02/01		PLOERMEL	112	dortoir
29/01/01	Saint-Goustan	AURAY	41	dortoir, 18:40

Dortoirs de Grand Cormoran (Morbihan) ; janvier mars 2001



Comptage des Grands Cormorans dans la rivière d'Étel (Morbihan) ; hiver 2000 - 2001

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

(7 données)

Cadavres échoués sur les plages de Plouharnel à Penthièvre.

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

(3 données)

Un individu au Grand Loc'h / Guidel entre les 17/01 et 15/02/2001.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

(1 donnée)

Trois observations se rapportent à la fin de l'hiver, de façon qui empêche d'affirmer qu'il y a eu un hivernage dans le Morbihan :

- Les 13 et 15/01/2001 un individu repéré à la Noée / Ploërmel dans le dortoir de cormorans.
- Le 25/02/01, un gardeboeufs arpente le bord des salines du Bréno / Carnac.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

(18 données)

Parmi ces données partielles de la présence de l'aigrette dans le département, retenons :

- 94 et 90 les 10/01 et 25/02/2001 au dortoir de Kerner / Riantec.
- 187 au dortoir de Fandouillec sur la rivière d'Etel le 25/02.

Grande Aigrette *Egretta alba*

(2 données)

1 individu le 16/02/2001 ne fait que passer au Grand Loc'h / Guidel.

Une Grande Aigrette a séjourné entre novembre 2000 et février 2001 sur les étangs de Branquilly / Gueltas.

Héron cendré *Ardea cinerea*

(14 données)

Retenons quelques données en dehors du littoral :

- Plus de 19 sur l'étang de Tronchâteau / Cléguer le 08/01/2001 et 25 le 12/02.
- 4 sur l'étang au Duc de Ploërmel le 02/03.
- 8 à Branquilly / Gueltas. Le 15/03.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(10 données)

Toujours bien présente dans l'est du Morbihan, cette espèce échappée fait voir des effectifs plus modestes dans la partie occidentale : 71 à Pen Cadenic / Le Tour-du-Parc le 13/01/2001 et 250 à Pénerf / Damgan le 15/02, 5 au dortoir d'aigrettes de Kerner le 10/01, retrouvés jusqu'au mois de mars.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

(5 données)

Notée dans le Golfe et la rivière de Pénerf (10 le 13/01/2001 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc), et dans la rade de Lorient où hivernent 1 à 2 individus.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

(5 données)

Cygne noir *Cygnus atratus*

(2 données)

Oie cendrée *Anser anser*

(2 données)


3 individus les 17 et 18/02/2001 à Banastère / Sarzeau.

Bernache cravant *Brenta bernicla*

(36 données)

Les bandes automnales de Bernaches cravants ne présentent qu'un faible taux de jeunes : 1 seul pour 626 individus le 19/11/00 dans la Petite Mer de Gâvres.


Quelques comptages : 1640 le 16/12/2000 dans la Petite Mer de Gâvres, 1262 le 14/01/01 dans la baie de Sarzeau, encore 213 le 10/03 au même endroit.



Bernache cravant dans la rade de Lorient (Morbihan) ; hiver 2000-2001

Quelques individus de la forme *B. b. hrota* ont été observés : d'abord 6 le 16/11/00 dans la baie de Plouharnel puis 6 dans la Petite Mer de Gâvres le 18/02/01.

Wetlands International : 8846 dont 5750 dans le Golfe du Morbihan.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* (42 données)

Tadorne de Belon dans la rade de Lorient (Morbihan) ; hiver 2000-2001

Quelques comptages : 199 le 15/12/2000 à Surzur, 1 188 en baie de Sarzeau le 14/01/01, 220 le 14/01/01 dans la rivière d'Etel.

Wetlands International : 4478 dont 3076 dans le Golfe du Morbihan.

Canard siffleur *Anas penelope*

(7 données)

Le Siffleur n'est pourtant pas absent des baies et rivières morbihannaises ? Les effectifs rapportés sont modestes :

- 300 le 24/12/2000 dans la rivière d'Etel.
- 143 (!) le 14/01/01 en baie de Sarzeau.
- 200 le 14/01/01 dans la rivière d'Etel.

Wetlands International : 840.

Canard chipeau *Anas strepera*

(5 données)

Les données sont concentrées entre le 24/12/2000 et le 14/01/01 :

- 1 aux Lorient / Ploemeur le 24/12.
- 2 et 15 le 14/01 à Lomener / Ploemeur et le Loc'h / Guidel.
- Une paire à Tréhuignier / Pénestin le 07/01.

Plus tard, courant février, cinq paires sont visibles sur la rivière du Vincin à Vannes.

Wetlands International : 35.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(11 données)

- Pointe des Emigrés à Vannes, environ 140 individus les 26 et 27/11/2000.
- Le Duer / Sarzeau, 350 le 13/01/01.

Wetlands International : 2376 dont 1960 dans le Golfe.

Canard colvert *Anas platyrinchos*

(31 données)

- 1283 dans la baie de Sarzeau le 14/01/2000.
- Sur l'étang au Duc de Ploërmel, 143 individus le 30/12/00 et 172 le 30/01/01.
- 830 à Bailleron / Saint-Armel le 16/11/2000.
- 227 aux Lorient / Ploemeur, rochers proches de la côte, le 24/12.
- 445 au Grand Loc'h / Guidel le 29/11.
- Sur le lac de Guerlédan, 252 Colverts sont comptés le 28/12.

Wetlands International : 3548 individus.

Canard pilet *Anas acuta*

(8 données)

294 individus le 14/11/2000 en baie de Sarzeau. Aucune donnée n'est étrangère à la partie orientale du Golfe !

Wetlands International : 1526 entre le Golfe et la baie de Vilaine.

Canard souchet *Anas clypeata*

(6 données)


- 102 en baie de Sarzeau le 14/11/2000.
- 45 au Grand Loc'h / Guidel le 25/01/01.

Wetlands International : 417 individus.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

(19 données)

L'hivernage est suivi sur l'étang aux Ducs de Vannes, avec un maximum de 175 fin novembre, soit des effectifs inférieurs à ceux de l'hiver passé.



Fuligule milouin, étang aux Ducs / Vannes (Morbihan) ; hiver 2000 - 2001

Dates	Effectifs
29/11/00	82
01/12/00	73
12/12/00	123
15/12/00	78
26/12/00	33

*Fuligule milouin, étang du Ter / Ploemeur (Morbihan)
Novembre - décembre 2000*

Wetlands International : 162 dont 119 dans le Golfe du Morbihan.

Fuligule morillon *Aythya morillon*

(17 données)

Sur les étangs du Ter / Ploemeur aux Ducs / Vannes, les effectifs recensés en novembre et décembre sont modestes : un maximum de 36 le 26/12/2000 pour le premier et de 16 le 25/12 pour le second.

Les individus du Ter peuvent sans doute être assimilés avec les 36 de Pen Mané / Locmiquélic le 24/12.

Les troupes les plus fournies, mais si peu ! sont comptées sur la rivière d'Etel : 56 le 17/01, 19 le 31/01 et 27 le 18/02 sur l'étang de Goh Lenn / Locoal-Mendon.

Wetlands International : 161 individus entre rade de Lorient, Etel, Golfe et Vilaine.

Fuligule milouinan *Aythya marila*

(3 données)

- 320 à la Mine d'Or/ Pénestin, le 27/12/2000.
- 2 à l'étang aux Ducs de Vannes le 03/01.
- Le 07/01, 100 individus à Tréhiguer / Pénestin.

Wetlands International : 322 en baie de Vilaine.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

(0 donnée)

Wetlands International : 6 en baie de Quiberon.

Macreuse noire *Melanita nigra*

(1 donnée)

1 individu le 25/12/2000 à la Barre d'Etel.

Macreuse brune *Melanita fusca*

(1 donnée)

12 à la Barre d'Etel le 19/11/2000.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

(5 données)

En rivière d'Etel : 3 observations de 1 à 4 individus en janvier.

Wetlands International : 390 individus dont 387 dans le Golfe.

Harle huppé *Mergus serrator*

(18 données)

Quelques individus présents dans la rivière d'Etel (max : 7 le 14/01/20001) et la côte de Ploemeur – Larmor-Plage(max : 2).

Wetlands International : 1797 dont 1580 dans le Golfe.

AR VRAN MORBIHAN N° 22

Groupe n° 2- Des rapaces aux rallidés.

Choix et rédaction établis par Franz URVOAZ

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (17 données)

Cette espèce est notée sur les communes suivantes : Gâvres, Erdeven, Baden, Locmiquélic, Plouhinec, Le Tour du Parc, Kervignac, Sarzeau et Ploemeur.

A noter parmi ces données, le mâle remarquable par son plumage gris observé le 20/11/00 à Pen Mané/ Locmiquélic.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (7 données)

Les oiseaux sont notés sur les communes suivantes : Cruguel, Baud, Pluvigner, Languidic, Sarzeau, Guégon et Belle-Ile.

Autour des palombes *Accipiter gentilis* (1 donnée)

Lors de l'opération avifaune forestière menée par le G.O.B., un autour est aperçu en forêt de Lanouée le 10/12/2000.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* (10 données)

Communes concernées par ces observations : Saint-Armel, Saint-Pierre-Quiberon, Port-Louis, Sarzeau, Plouhinec et Languidic.

Buse variable *Buteo buteo* (10 données)

Les observations ont lieu dans les communes suivantes : Merlevenez, Kerfourn, Lanouée, Pont-Scorff, Cléguer, Sarzeau, Berné et Loyat.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* (2 données)

Il s'agit de 2 observations tardives faites les 16/11 et 20/11/2000 sur la réserve du Duer à Sarzeau.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (6 données)

Communes concernées par ces observations : Guégon, Le Faouët, Sérent, Berné et Lanouée.

Faucon émerillon *Falco columbarius* (4 données)

2 données concernent un individu en décembre : Quiberon et Belle-Ile ; 2 données en février à Ploemeur : un immature ou une femelle.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(5 données)

Communes concernées : Guidel, Saint Armel et Sarzeau, à chaque fois un individu, entre le 27/11/2000 et le 14/02/2001.

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

(1 donnée)

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(2 données)

Noté au marais de Kervillen / La Trinité sur Mer et à Pen Mané / Locmiquélic.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

(2 données)

7 individus à la Pointe des Immigrés / Vannes le 04/12/2000 et 15 individus sur l'étang de la CAM à Vannes le 03/01/2001.

Foulque macroule *Fulica atra*

(33 données)

Les maxima sont en retrait par rapport aux années précédentes. Sans doute est-ce dû à un intérêt moindre de la part des observateurs et également à l'absence de données concernant l'étang de Saint-Jean/ Locoal-Mendon pour les mois de novembre et décembre.

- vasière de Tascon / Saint-Armel : 670 le 16/11/2000.
- lagunes de Bonnavo / Theix : 300 le 26/11.
- Quélisoye / Larmor Plage : 976 le 20/12.
- étang de Goh Lenn / Locoal-Mendon : 540 le 17/01/01.
- l'espèce s'installe sur le bassin de Pen Mané / Locmiquélic : 197 le 03/12/00.

Grue cendrée *Grus grus*

(1 donnée)

Une observation le 16/11/2000 à la Pointe de Bilhervé sur l'île d'Arz dans le Golfe du Morbihan, 1 individu.

AR VRAN MORBIHAN N° 21

Groupe n° 3 De l'Huîtrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Yannick Ordureau

Huîtrier pie *Haemotopus ostralegus*

(13 données)

310 en reposoir sur l'île Tillic / Saint Pierre de Quiberon le 10/12/2000 ; 10 le 04/01/01 sur ce même îlot ; 58 le 01/01 à Bénance / Sarzeau ; 47 le 01/01 sur la vasière de Saint Colombier / Sarzeau le 11/02 et 110 en reposoir à Madavoar / Hoédic le 07/03.

En parcourant 6,3 km de côte de Kerhilio à Penthievre, le 24/01/01, un cadavre échoué mazouté est collecté.

Wetlands International : 1958 dont 917 en baie de Quiberon.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

(1 donnée)

Une femelle en halte migratoire vue le 23/03/2001 à Damgan .

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(11 données)

Les plus forts effectifs sont toujours notés en rivière de Pénerf : 480 à Pentès le 21/01/2001, 250 à Pénerf le 29/01, 480 à Le Lic le 25/02 et aussi à la Métairie du pont à Noyal où 261 individus sont dénombrés .Elle est aussi présente au Moustoir / Arzal : 318 le 27/12/2000.

Wetlands International : 2482 entre Golfe du Morbihan et Baie de Vilaine.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

(1 donnée)

La première observation de l'année est réalisée à Kerminihy / Erdeven le 25/02/2001 .

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

(8 données)

Des rassemblements réguliers et importants sont observés au crépuscule sur le terre-plain du terminal roulier du port de commerce de Lorient : 110 le 28/11/2000, 160 le 14/12 et 149 le 29/12. Au pont de Banaster (côté mer) / Sarzeau 200 individus sont observés le 13/01/2001 .

Wetlands International : 3696 individus.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

(20 données)

Comme les années précédentes d'importantes concentrations à la Pointe en Guégon : 900 le 18/12/2000 et 750 le 26/02/2001 , mais aussi 2500 recensés sur la D764 Pontivy-Josselin à Noyal-Pontivy le 22/12/00 ainsi que 300 à Pleugriffet ce même jour .

Sur la côte des rassemblements sont notés à Linès / Gâvres : 151 le 31/12 et 370 le 07/01/01 et à Kersahu / Gâvres avec 57 le 18/02.

Le site du Loc'h / Guidel n'a pu cet hiver être assidûment suivi mais 285 individus y sont comptés le 20/02.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

(7 données)

Fortes concentrations à Linès / Gâvres : 600 le 27/12/2000 et 770 le 07/01/2001

Wetlands International : 2960 individus.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

(43 données)

Sur le littoral :

- Boderhaff / Le Tour du Parc : 300 le 13/2001.
- le Duer / Sarzeau : 1006 sur la vasière le 14/01.
- le Grand Loc'h / Guidel : plus de 1300 le 04/02.
- Penhoët / Merlevenez : 1422 le 07/02/2001, 928 le 11/02/01 sur la vasière.
- Linès / Gâvres : 205 le 18/02.

Présence régulière à la Pointe des Emigrés / Vannes : 43 le 20/11/00 et le 27/11, 35 le 04/12 et 70 le 17/12.

A l'intérieur du département :

- Noyal-Pontivy : 1200 le 22/12/00.
- La Pointe / Guégon : 950 le 18/12/, 380 le 26/02/01.
- Pleugriffet : 700 le 22/12.
- Penhoët / Locqueltas : 347 le 17/02/01.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

(1 donnée)

Un seul individu recensé le 24/12/2000 sur la plage de Fort-Bloqué / Ploemeur.

Wetlands International : 552 individus.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

(2 données)

10 individus observés le 24/01/2001 à Pen er Lé / Plouharnel.

52 sont observés à La Roche Sèche / Erdeven et la quasi totalité présente des traces de mazout au ventre voire au flanc.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(5 données)

24 le 20/12/2000 à Kerpape / Ploemeur , 28 le 26/12/00 à Beg er Goalenec / Quiberon , et 9 à la Roche Sèche / Erdeven le 09/02.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(13 données)

Environ 600 à Conleau / Vannes le 24/11/2000, 1500 le 13/01/2001 au pont de Banaster (côté mer) et 500 à La Grée / Penvins, 3000 le 14/01 en rivière d'Etel.

Wetlands International : 37076 individus.

Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus*

(1 donnée)

Une observation d'un individu le 14/12/2000 à Kerfontaine / Sérent.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

(15 données)

Une augmentation sensible des effectifs : 36 le 24/12/2000 à Pen Mané / Locmiquélic, 25 le 31/12 à Surzur, 30 à l'étang du Pérello / Ploemeur le 14/01/01, 56 le 19/02/01 au moulin de Pomper / Baden, 30 le 07/02/01 à l'étang de Lannénec / Ploemeur et 12 le 07/03/01 à Paluden / Hoëdic.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

(1 donnée)

Un individu observé en vol le 21/12/2000 dans le bourg de Guilliers .

Barge à queue noire *Limosa limosa*

(16 données)

Un seul individu observé le 13/01/2001 au Pont de Banaster / Sarzeau.

Cette seule donnée ne reflète certainement pas les présences réelles de cette espèce durant cette période .

Wetlands International : 428 Barges à queue noire dans le Golfe.

Barge rousse *Limosa lapponica*

(9 données)

70 individus observés à Bénance / Sarzeau le 28/01/2001.

Date	Nombre
03/12/00	39
24/12/00	24
27/12/00	51
07/01/01	18
21/01/01	23
11/02/01	27
18/02/01	2

Barge rousse dans la Petite Mer de Gâvres (Morbihan) :
Hiver 2000 - 2001

Wetlands International : 167 Barges rousses.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

(1 donnée)

Un individu observé le 07/03/2001 à la Pointe du Petit Mulon / Hoëdic.

Courlis cendré *Numenius aquata*

(13 données)

80 le 14/01/2001 en rivière d'Etel, à Kersahu / Gâvres environ 70 le 24/12/00 et 46 le 18/02/01. Au Tour du Parc le 13/01/01 : 5 à Berguero, 21 à Pen Cadénic, 12 à Boderhaff et 1 à Banaster.

Wetlands International : 1068 individus.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

(11 données)

135 le 31/12/2000 à Pentès / Surzur , le 13/01/2001 11 à Boderhaff et 20 au Duer / Sarzeau, 65 le 17/02/01 à Bénance / Sarzeau.

Wetlands International : 511 individus.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

(4 données)

Un individu le 13/01/01 à Boderhaff / Sarzeau, 1 le 14/01 en rivière d'Etel, 8 le 19/02 et 5 le 25/02 au Moulin de Pomper / Baden.

Wetlands International : 22 individus.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

(4 données)

1 le 21/12/2000 dans les lagunes de Surzur, 5 le 31/12 au ruisseau de l'Epinay / Surzur, 1 à Boderhaff / Sarzeau le 13/01/01 et 2 au Moulin de Pomper / Baden le 25/02.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

(4 données)

A Pen Mané / Locmiquélic un individu le 20/11/2000, 1 le 30/12 et 1 le 02/02; 1 le 11/02 à Saint Ernan / Nostang.

Tournepierre à collier *Arenaria interpres*

(21 données)

170 le 10/12/2000 à la Tour des Anglais / Damgan, 5 le 24/12 à Fort Bloqué / Ploemeur et 90 le 24/01/01 à Pen er Lé / Plouharnel.

Wetlands International : 1153 individus dont 438 en baie de Quiberon.

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*

(7 données)

Le 17/11/2000 un premier individu est observé à Locqueltas / Larmor Plage puis un adulte y est vu le 2/01/01. Le 11/12, un individu est vu à la pointe des Emigrés de Vannes. Un Phalarope à bec large le 14/12 vers Ty Hoche / Plouharnel puis le 20/12 un individu est observé à Penthièvre / Saint-Pierre-Quiberon et un à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon un quart d'heure plus tard.

AR VRAN MORBIHAN N°22

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Jean-Luc Lemonnier.

Il est classique d'évoquer en tête de cette synthèse les régimes de tempête qui repoussent sur nos côtes les oiseaux pélagiques. Pour cette saison hivernale 2000 – 2001, pas d'ouragan, pas de pétrolier brisé, mais une routine de coups de vent entre fin octobre et début février et des reliquats de pollution, ayant provoqué des échouages importants sur les côtes bretonnes. A tel point, qu'en décembre, Bretagne vivante prenait contact avec la DIREN d'une part et les observateurs, dont ceux du G.O.B. d'autre part pour coordonner les ramassages d'oiseaux sur les côtes. Certaines des données ainsi amassées nous sont parvenues et concernent une majorité d'alcidés, au premier chef desquels le Guillemot de Troïl. On pourra toujours avancer que la recherche systématique d'oiseaux morts ou épuisés introduit un biais dans l'estimation de l'importance des échouages mais cet hiver-ci fut encore meurtrier ; il n'est que de parcourir les litanies ci-dessous pour s'en convaincre.

Grand Labbe *Catharacta skua*

(4 données)

La baie de Quiberon et ses abords proches sont seuls concernés par cette espèce et sur un intervalle restreint (31/12/00 à 22/01/01). Il s'agit à chaque fois d'individus isolés. Sur la Grande Plage de Plouharnel, le 10/01/01, quelques promeneurs chanceux purent approcher à moins de 2 mètres un Grand Labbe posé, visiblement fatigué, légèrement blessé au pied mais valide.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

(5 données)

Deux groupes importants :

- 9 en baie de Quiberon le 16/12/00,
- 19 dont 5 en plumage nuptial le 25/02/01 sur les salines du Bréno / Carnac, site décidément intéressant.

Un adulte isolé est observé à Conleau / Vannes les 24/11 et 11/12/00.

Mouette pygmée *Larus minutus*

(9 données)

La majorité des données est concentrée sur décembre et janvier ; les plus forts effectifs étant relevés dans les abords de la baie de Vilaine :

- 60 le 10/12/00 à la tour des Anglais / Damgan,
- 12 le 11/02/01 à l'étang du pont de Caden / Surzur.

La très violente tempête des premiers jours de janvier 2001 a permis également quelques observations en rade de Lorient et baie de Quiberon (maximum de 9 individus).

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(5 données)

On retiendra deux données concernant l'étang au Duc de Ploërmel :

- 8000 le 30/12/00 !!

- 550 dont la moitié en plumage nuptial le 02/03/01.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

(aucune donnée)

Goéland cendré *Larus canus*

(9 données)

Noté en bien des points du littoral mais en groupe toujours restreint, puisque les maxima sont :

- 28 le 24/11/00 à Conleau / Vannes,
- 35 le 10/12/00 à la tour des Anglais / Damgan.

Les autres données concernent de 1 à 10 individus. On remarquera l'absence dans les observations recueillies de bandes importantes tant à Penvins / Sarzeau qu'en rive d'Étel.

Goéland brun *Larus fuscus*

(5 données)

On retiendra trois comptages concernant l'étang au Duc de Ploërmel :

- 201 le 30/12/00 !
- 70 (*ssp intermedius*) le 24/01/01,
- 33 le 02/03/01.

Goéland argenté *Larus argentatus*

(10 données)

Les rassemblements sont seulement notés sur le littoral est, où on pourra retenir :

- 4500 le 10/12/00 à la tour des Anglais / Damgan.

Sur l'étang au Duc de Ploërmel, ce n'est pas le laridé le mieux représenté avec seulement 10 individus le 30/12/00 (*cf.* G. brun et M. rieuse).

Entre le 05/01 et le 06/02/01, un observateur a recueilli 5 cadavres de Goéland argenté sur les plages de Saint-Pierre Quiberon et Plouharnel : 1 de 1^{er} hiver, 1 de 3^{ème} hiver et 3 adultes.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

(4 données)

Le 04/01/01 par très fort vent d'ouest, 5 dont au moins deux juvéniles sont vues en baie de Quiberon ; un adulte de ce groupe est mazouté au bas-ventre.

L'échouage n'est détecté que les 6 et 7/02/01 avec un adulte à Saint-Pierre Quiberon et un immature mazouté à Plouharnel

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(14 données)

Toujours beaucoup de données hivernales. Mais aucune observation de plus de trois individus ensemble. Les données tendent à se raréfier à l'approche du printemps, ce qui est tout de même un comble !

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

(2 données)

Hoëdic abrite les oiseaux les plus précoces : 6 le 07, puis 4 le 08/03/01.

Alcidae sp.

(1 donnée)

Guillemot de Troil *Uria aalge*

(21 données)

20 guillemots sont observés en baie de Quiberon le 30/12/00. Les autres observations d'oiseaux vivants et valides sont réduites à :

- 1 dans le port de commerce de Lorient le 03/01/01,
- 2 sur le trajet de Belle-Ile à Quiberon le lendemain.

Voici, résumées dans ce tableau, les données relatives aux échouages de cette espèce sur le littoral de Plouhinec à Saint-Pierre Quiberon.

	vivants mazoutés	morts mazoutés	morts propres	total
décembre 2000	1	10	2	13
janvier 2001	9	29	35	73
février 2001	3	24	10	37
TOTAL	13	63	47	123

Nombre de Guillemots de Troil découverts échoués sur le littoral Plouhinec – Saint-Pierre Quiberon entre décembre 2000 et février 2001.

Rappelons que ces données ne peuvent être exhaustives. A titre d'exemples, voici le détail de quelques journées de collecte (durant lesquelles de nombreuses autres espèces ont bien sûr été découvertes) :

- le 21/01/01, plage de Sainte-Barbe / Plouharnel, 13 guillemots échoués, 69 % étaient mazoutés,
- 3 jours plus, le 24, dans le prolongement sud de ce secteur : 16 guillemots échoués, 15 % étaient mazoutés,
- la densité la plus impressionnante de la saison : 28 oiseaux de cette seule espèce collectés sur 3,1 km de côte en Saint-Pierre Quiberon le 06/02/01, soit une triste moyenne d'un guillemot tous les 110 mètres !

Pingouin torda *Alca torda*

(11 données)

Malgré la présence de cette espèce autour de la presqu'île de Quiberon sur toute la période (4 données d'oiseaux vivants dont 15 en baie de Quiberon le 31/12/00), les échouages sont heureusement beaucoup moins importants que pour l'espèce précédente. Les chiffres n'en sont pour autant pas moins alarmants, encore qu'il soit difficile d'apprécier si ces deux espèces d'alcidés subissent un même taux de mortalité sur nos côtes.

	vivants mazoutés	morts mazoutés	morts propres	total
décembre 2000	0	1	0	1
janvier 2001	0	3	4	7
février 2001	0	0	1	1
TOTAL	0	4	5	9

Nombre de Pingouins torda découverts échoués sur le littoral Plouhinec – Saint-Pierre Quiberon entre décembre 2000 et février 2001.

La seule collecte ayant permis la découverte de plus d'un Pingouin torda est celle du 24/01/01 sur le Grande Plage de Plouharnel avec 3 adultes et 1 immature découverts sur un parcours de 6,3 km.

Mergule nain *Alle alle*

(1 donnée)

Un cadavre échoué au pied du fort de Penthièvre / Saint-Pierre Quiberon le 09/12/00.

Macareux moine *Fratercula arctica*

(3 données)

Trois cadavres échoués sur Plouharnel et Saint-Pierre Quiberon : 1 dans une gangue de mazout le 05/01/01, 1 le 24/01/01 et 1 le 06/02/01.

AR VRAN MORBIHAN N° 21

Groupe n°5 - Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick PHILIPPON

196 données nous sont parvenues dans ce groupe pour l'hiver 2000 -2001, soit une augmentation de 31% par rapport à l'année précédente (1999) et une diminution de 17% en comparaison de 1998.

En nombre d'espèces, autant ont été notées en 1999 qu'en 2001 (62 espèces) pour 38 en 2000.

La diversité de celles-ci est toutefois mieux marquée en 1999 qu'en 2001 alors que l'on aurait pu s'attendre en 2000 et 2001 à une augmentation liée aux recensements forestiers !

Il est à noter que certaines espèces sont moins observées cette année (Pigeon colombin, martin pêcheur, Pic noir, alouettes, Pinson du Nord, bruants) et en moins de sites.

Pour certaines espèces, comme les alouettes, il serait intéressant de s'y attarder compte tenu de leur raréfaction liée, entre autres, à la disparition des milieux favorables et à l'emploi des produits phyto-sanitaires pour les animaux.

Enfin pour être complet sur cette simple analyse, les données météo ne sont pas prises en compte.

Continuez à noter ces passereaux qui font le charme de nos jardins en hiver.....

Pigeon colombin *Columba oenas*

(0 donnée)

Aucune donnée pour l'espèce. Rappelons qu'un dortoir sur l'île de Riec'h / Belz avait été fréquenté du 21/11/99 au 05/03/00 avec 200 individus en janvier.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

(3 données)

Un regroupement de 250 le 31/12/2000 au Ruisseau de l'Epinay / Surzur. Présent lors des recensements avifaune forestière du 10/12 (Pontcallec et Lanouée).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

(1 donnée)

Notée lors du recensement « avifaune forestière » en forêt de Pontcallec / Berné.

Effraie des clochers *Tyto alba*

(8 données)

Le Hézo, Nostang, Noyalo, Ploeren, Ploemeur, Plougoumelen, Pluvigner, Theix permettent de l'observer. A noter que la RN 165 à hauteur de Ploeren, Plougoumelen est particulièrement dangereuse pour elle : 3 tuées entre le 15/12/00 et le 31/01/01.

Chevêche d'Athéna *Athena noctua*

(3 données)

1 chant spontané le 27/01/2001 à Saint Thomin / Nostang et 1 individu, probablement en migration, à la Ville Gleuhiel / Guégon le 01/03/2001.

Chouette hulotte *Strix aluco*

(2 données)

2 observations d'individus...morts : 1 par un véhicule sur la RN 165 à hauteur de Brec'h le 15/12/2000 et 1 ...échoué le 13/01/2001 à Kerhostin / Saint-Pierre-Quiberon.

Hibou des marais *Asio flammeus*

(0 donnée)

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(6 données)

Noté du 24/12/2000 au 04/03/2001 principalement en milieu côtier autour de la rivière d'Etel à raison d'1 individu par donnée : Locoal-Mendon, Locmiquélic, Riantec.

A noter : 1 individu à l'étang de la forêt / Brandivy le 04/03/01.

Huppe fasciée *Upupa epops*

(2 données)

2 données d' un seul individu en mars à Pleucadeuc : 1 le 07 et 1 le 16/032001 à La Grée des moulins.

Pic cendré *Picus canus*

(1 donnée)

1 individu entendu le 10/12/2000 en forêt de Lanouée (recensement avifaune forestière).

Pic vert *Picus viridis*

(2 données)

Forêt de Lanouée (10/12/2000) et 1 à Keruisseau / Pont-Scorff le 19/02/01.

Pic noir *Dryocopus martius*

(9 données)

Le bois du Ter en Ploemeur est particulièrement suivi cette année : 66% des données ! entre le 20/12/2000 et le 22/02/01 pour 1 individu à chaque donnée.

Autres sites : Kerhenry et forêt de Pontcallek / Berné ; le Gleut / Bubry.

Pic épeiche *Dendrocopos major*

(2 données)

Contacté lors des recensements forestiers du 10/12/2000 (Lanouée et Pontcallek)

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(5 données)

1 individu du 16/11/2000 au 04/03/2001 au port de commerce de Lorient.

Alouette lulu *Lullula arborea*

(2 données)

2 chanteurs le 06/01/2000 à Ty Rhu / Locoal Mendon.

Les 5 oiseaux du marais Le Dreff / Riantec observés le 13/02/01 correspondent peut-être à l'amorce de la remontée prénuptiale ?

Alouette des champs *Alauda arvensis*

(3 données)

Notée en forêt de Lanouée lors du recensement forestier (10/12/2000), dans les dunes Mat Fenoux / Plouhinec le 15/02/01 et 1 chanteur le 07/02/01 à Saint Thomin / Nostang.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

(4 données)

Les 3 premières sont à Lorient le 03/03/2001.

Le 10/03/00 voit apparaître le premier groupe de migrateurs avec 10 individus à l'étang de Coët Rivas / Kervignac ; seuls 2 individus seront contactés au même endroit 4 jours plus tard.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

(2 données)

La période est marquée par la présence de cette espèce en automne et hiver en Bretagne, souvent en nombre : 25 en forêt de Villecartier / Bazouges la Pérouse (35).

Pour le Morbihan : une seule donnée concerne 1 individu vu le 17/11/2000 au Vieux Port / Larmor-Plage.

Le retour des migrateurs est noté le 20/03/01 à la Pointe / Guégon : 2 individus volent vers le Nord.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

(7 données)

Les recensements dans les forêts de Lanouée et de Pontcallek (10/12/2000) et des ZNIEFF mobihannaises permettent de le contacter (marais de Kervillen / La Trinité sur mer.

Plusieurs dizaines vagabondent le 15/02/01 dans les dunes Mat Fenoux / Plouhinec.

Noté dans l'intérieur du département à Ploermel et Berné notamment.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

(2 données)

1 à Kersahu / Gâvres et 1 à Pen Mané / Locmiquélic le 03/12/2000.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

(1 donnée)

Notée le 10/12/2000 en forêt de Pontcallek. Présente à Vannes pendant la période le long des rivières au centre ville.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

(8 données)

Les dortoirs et pré-dortoirs sont remarquables, sans avoir de suivi dans le temps. Ainsi, le dortoir de Vannes, présent en novembre (1000-1200 individus) disparaît le 30/12/2000.

Il s'éclate en différents sites probablement, sans que ceux-ci soient répertoriés.

A Lorient, un pré-dortoir d'au moins 300 individus le 09/12/2000, à Josselin le pré-dortoir est de 30 individus au lycée Ampère.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (2 données) ; **Accenteur mouchet *Prunella modularis*** (2 données) ; **Rougegorge familier *Erithacus rubecula*** (5 données).

Ces espèces sont notées lors des recensements des ZNIEFF 56 et de l'avifaune forestière.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

(8 données)

L'espèce est notée hivernante en décembre et janvier sur le littoral (Etel, Hoëdic, Ploemeur, Saint-Pierre-Quiberon) et en centre ville (Auray, Ploermel, Vannes).

Merle noir *Turdus merula*

(4 données)

Grive litorne *Turdus pilaris*.

(6 données)

La première donnée est liée à l'écoute d'individus en forêt de Pontcallek / Berné le 10/12/2000.

Les regroupements les plus importants sont notés en janvier, pendant et après le coup de froid du 16-18/01/2001 dans le nord-est du département : Billio (26 le 17/01), Lanouée 120 le 22/01 à Blaveos, La barre (250 oiseaux) et Launay Gland (130 individus) sur la commune de La Trinité-Porhoët, soit près de 400 grives le 23/01.

12 le 02/03/01 à l'étang au duc à Ploermel.

Grive musicienne *Turdus philomelos*

(6 données)

Notée lors des recensements forestiers. Des chanteurs sont signalés les 05 et 11/12/2000 à Guégon (la Ville Gleuhiel).

Grive mauvis *Turdus iliacus*

(11 données)

Passage détecté dès le 04/11/2000 le soir à Ménimur / Vannes. Puis du 7 au 17/11 les passages nocturnes s'amplifient, en particulier les 15, 16 et 17/11/00.

Des concentrations sont notées en janvier : 26 le 17/01/01 à Kerpunche / Billio, 70 à Launay Gland / La Trinité-Porhoët le 23/01/01, 150 à l'étang au duc / Ploërmel le 30/01. 60 le 12/03 à Molac et passage nocturne le 14/03 au dessus de Vannes.

Grive draine *Turdus viscivorus*

(3 données)

Notée lors des recensements forestiers. Il serait intéressant de noter plus régulièrement cette espèce.

Cisticole des joncs *Cisticola jundicis*

(1 donnée)

1 chanteur le 11/02/2001 dans les marais de Pont Caden / Surzur.

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

(2 données)

Quelques individus hivernants sont notés : le 10/12/2000 en forêt de Lanouée . 2 individus sont vus à la Villeneuve / Locoal-Mendon.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

(2 données)

1 mâle le 24/01/2001 à Rugdual / Queven.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

(1 donnée)

1 le 22/11/2000 au centre ville de Lorient.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

(1 donnée)

1 chanteur le 15/02/2001 dans les dunes Mat Fenoux.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

(2 données)

Noté lors des recensements forestiers : Lanouée et Pontcallek.

Roitelet à triple-bandeau *Regulus ignicapillus*

(5 données)

3 sites : forêts de Lanouée et Pontcallek (10/12/2000) ; la Ville Gleuhuel / Guegon (10 et 13/02/01). 1 chanteur le 10/03 en forêt de Floranges / Pluvigner.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

(0 donnée)

Pas de donnée cette année.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (2 données) ; **Mésange nonnette *Parus palustris*** (2 données) ; **Mésange huppée *Parus cristatus*** (3 données).
Mésange noire *Parus ater* (4 données) ; **Mésange bleue *Parus caeruleus*** (2 données) ; **Mésange charbonnière *Parus major*** (6 données) ; **Sittelle torchepot *Sitta europea*** (4 données)..

Ces espèces sont notées lors des recensements des ZNIEFF 56 et de l'avifaune forestière.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

(4 données)

Toutes les données proviennent des forêts de Lanouée et Pontcallek en décembre 2000.

Geai des chênes *Garrulus glandarius*(2 données) ; **Pie bavarde *Pica pica*** (1 donnée)**Choucas des tours *Corvus monedula***

(2 données)

Noté autour du 16/12/2000 dans le bourg de Plouay (14 individus) et à Lorient.

Il serait intéressant de noter systématiquement dans les bourgs cette espèce, en fait relativement discrète pour avoir au moins sur le département un aperçu de sa présence.

Corneille noire *Corvus corone*

(3 données)

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

(3 données)

2 observations intéressantes : un dortoir d'environ 3 500 individus dans une roselière au bas du bourg d'Ambon le 10/12/00 et un nourrissage le 09/03/01 au Ter en Ploemeur dans une cavité d'habitation.

Moineau domestique *Passer domesticus*

(1 donnée)

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

(3 données)

Noté lors des recensements forestiers du 10/12/2000.
Premier chant le 11/02/01 à Etel.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

(2 données)

Noté *uniquement* lors des recensements forestiers du 10/12/00.

Serin cini *Serinus serinus*

(1 donnée)

6 au bourg de Nostang le 17/02/2001.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (2 données) ; Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (2 données) ; Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* (1 donnée)

Entendus dans les forêts de Lanouée et Pontcallek.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

(3 données)

Vu et entendu dans les forêts de Lanouée et Pontcallek (10/12/2000).
Plus de 10 se nourrissent à Kergollaire / Languidic jusqu'en mars 2001.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

(3 données)

En forêt de Lanouée le 10/12/2000.

25 passent en vol au dessus de la ville de Ploërmel le 19/01/00 tandis qu'un individu est encore observé le 12/03/01 en forêt de Floranges en compagnie de Pinsons des arbres.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

(2 données)

1 en forêt de Lanouée le 23/11/2000 et 1 à Pen Mané / Locmiquélic le 30/12.

ACTIVITES DU G.O.B. MORBIHAN

L'INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) DU MORBIHAN, NOUVEAU PROTOCOLE

L'inventaire ornithologique des ZNIEFF du Morbihan est engagé depuis maintenant trois années. Une livraison en a déjà été faite à la DIREN Bretagne.

Un nouveau document est disponible qui devrait orienter nos recherches sur le terrain et dans la bibliographie, il s'agit de la liste des espèces déterminantes (Bargain B., Cadiou B., Gélinaud G., Maout J. (2001).- Avifaune de Bretagne Liste des espèces déterminantes pour la réalisation des fiches ZNIEFF – Bretagne Vivante S.E.P.N.B.). La réunion du groupe morbihannais en janvier 2002 a permis de présenter ce nouveau protocole et de distribuer une partie des ZNIEFF qui restent à étudier.

On rappelle que cet inventaire vise deux objectifs prioritaires qui sont l'inventaire de l'avifaune des ZNIEFF désignées et, sous cette nouvelle mouture, celui des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF existantes ; il peut aussi permettre de proposer de nouvelles ZNIEFF à intérêt avifaunistique ou, du moins, rassembler une documentation pertinente.

L'inventaire d'une zone Znieff peut dorénavant se faire en deux temps :

- première année, recherche préliminaire : inventorier les espèces présentes.
- si la zone accueille des espèces déterminantes, l'inventaire peut s'étaler sur plusieurs années : il faut alors rassembler les indices de reproduction et les effectifs concernés, s'assurer des effectifs hivernants et migrateurs. Pour ces deux catégories, le seuil numérique *Déterminant ZNIEFF* s'accompagne d'un critère de régularité de trois années sur cinq.

Un même observateur (ou groupe d'observateurs) peut prendre en charge plusieurs zones, traitées différemment et sur un nombre variable d'années, il est donc nécessaire de dresser un bilan de l'enquête : une *Feuille annuelle de suivi* sera présentée à la réunion de novembre à Brec'h puis utilisée par les coordinateurs pour tenir le compte des zones en cours d'inventaire.

Les documents nécessaires à l'inventaire des zones (liste des espèces déterminantes, feuilles *Description des zones*, *Prospection préliminaire*, *Recherche des espèces déterminantes*) sont disponibles aux réunions de Brec'h ou par l'intermédiaire de la messagerie du G.O.B.

Le calendrier des inventaires prévus s'établit donc comme suit :

- Janvier 2002

Choix dans la liste d'environ 40 ZNIEFF, auxquelles s'ajoutent des ZNIEFF déjà attribuées mais pas encore traitées à cette date, elles seront décrites suivant le nouveau protocole. Les observateurs recevront la documentation concernant les zones choisies : carte, description et inventaire antérieurs.

- Hiver à automne 2002, prospections préliminaires :

⇒ zones présentant d'autres intérêts que l'avifaune.

⇒ par zones, élection des possibles espèces déterminantes.

Bilan à Brec'h, novembre 2002

- Janvier 2003

Remise des dossiers achevés en 2002.

Choix de nouvelles zones.

Collecte de renseignements sur les espèces déterminantes des zones à suivre

Bilan à Brec'h, novembre 2003

Et ainsi de suite...

Il est bien entendu important que les membres du Groupe Ornithologique Breton soient tenus au courant de l'avancement du programme et en voient les résultats. En plus des bilans annuels et des informations que seront échangées à Brec'h, lors des réunions bimensuelles, la publication dans la revue *Ar Vran Morbihan* des résultats synthétiques permettra à chacun d'avoir une vue générale de l'enquête. On commencera par les zones déjà inventoriées depuis 1999, présentées à travers le nouveau crible des espèces déterminantes.

Les documents suivants indiquent la liste des ZNIEFF morbihannaises présentées en janvier 2002 à Brec'h et le nom des observateurs qui les ont pris en charge. N'hésitez pas à leur transmettre des renseignements sur ces zones ou à vous signaler pour assurer l'inventaire de ces ZNIEFF.

Communes	dénomination	Traitées pour le GOB par (2002)
AMBON DAMGAN	dunes de Kervoyal	Patrick Philippon
AMBON DAMGAN LE TOUR-DU-PARC SARZEAU SURZUR	étier de Pénerf	Patrick Philippon
AURAY	Champ des Martyrs	Jean-Luc Lemonnier
BADEN	baie de Kerdréan	Loïc Hamet
BELZ	lande tourbeuse de Kerorel à l'est de Belz	Jean-Luc Lemonnier
BERNE	bassin versant de l'Ellé	Erwan Crochet
BIEUY-LES EAUX	landes du Crano	Jean-Luc Lemonnier
BRECH	étang du Cranic	Yann Kerninon
BUBRY	Stang er Brugueu	Patrick Bailleul
BUBRY	tourbière de la lande de Bubry	Patrick Bailleul
BUBRY	tourbière de la lande de Saint-Yves	Patrick Bailleul
BUBRY	tourbière de Manéantoux	Patrick Bailleul
CAMPENEAC	l'Aff	Bernard Iliou
CLEGUER	étang de Tavardy	Erwan Crochet
CONCORET	étang de Comper	Patrick Philippon
DAMGAN	étang du Loc'h Damgan	Patrick Philippon
FEREL	pointe de l'Isle	Denis Fatin
GAVRES PLOUHINEC PORT-LOUIS	dunes et anse de Gâvres	Gwenaél Derian
GUIDEL	étang du Loc'h Guidel	Laurent Teigner
GUISCRIF	turbière de Boudoubanal	Marc Jamet
KERVIGNAC NOSTANG	moulin de Saint-Gorges et étang de Coët-Rivas	Jean-Luc Blanchart
LANDEVANT	tourbière de Kergurune entre Brandérion et Landévant	Jean-Luc Blanchart
LANGOELAN	Scorff amont	Erwan Crochet
LANGONNET	lande tourbeuse de le Faud	Pierre Corlou
LANGONNET	tourbière de Ker Sainte-Anne	Pierre Corlou
LANGONNET	tourbière des bois de Kerjean	Pierre Corlou
LANGONNET	tourbière nord du Minez Du	Pierre Corlou
LANGONNET	tourbière sud du Minez Du	Pierre Corlou
LANGUIDIC	bois du Pont-Neuf et de Quélennec	Jean-Luc Blanchart
LOCMARIA-GRAND-CHAMP	camp de Meucon	Patrick Philippon
LOCMIQUELIC	anse de Pen Mané	Jacques Corbière
MALANSAC ROCHEFORT-EN-TERRE PLUHERLIN	côteaux de Rochefort en Terre	Bernard Iliou
MARZAN PEAULE	zone de Marzan	Denis Fatin
MAURON	tourbière du Plessis bord du Doueff	Bernard Iliou
MESLAN	rochers du Diable	Gaëtan Cornec
NOYAL-PONTIVY	lande tourbeuse de la Grenouillère en Kerfourn	Yann Kerninon
PENESTIN	anse de Pénestin	Denis Fatin
PLOEMEL	er Varquez - Saint-Laurent	Jean-Luc Lemonnier
PLOUAY	tourbière de Cosclunff - Saint Branda	Patrick Bailleul
PLOUHINEC	étangs de Kervran et Kerzine	Gwenaél Derian
PLOURAY	lande tourbeuse de Kerroc'h	Yann Kerninon

PONTIVY SAINT-THURIAL	lande tourbeuse de la Houssaye	Yann Kerninon
PRIZIAC	étang de Priziac (du Bel-Air)	Marc Jamet
QUIBERON	marais de Quiberon - Rohu	Gwenael Derian
QUIBERON SAINT-PIERRE-QUIBERON	la côte sauvage de la presqu'île de Quiberon	Gwenael Derian
RIANTEC	la Croizetière	Gwenael Derian
RIEUX	marais de Rieux	Denis Fatin
SAINT-GILDAS-DE-RHUYS	le Grand Mont	Loïc Hamet
SILFIAC	tourbière de Silfiac	Bernard Iliou
VANNES	étang du Duc	Patrick Philippon

Tableau 1 : ZNIEFF attribuées en janvier 2002

ARZON	Le Petit Mont
ARZON	pointe de la chapelle du Petit Mont
ARZON SAINT-GILDAS-DE-RHUYS	marais dunaire entre Kervert t Turniac
BUBRY INGUINIEL LANVAUDAN QUISTINIC	vallée du Sébrevet
CAMPENEAC	butte de Dot et de Precesson
CAMPENEAC	ruisseau de Saint-Jean
CARENTOIR LA GACILLY	tourbière et lande tourbeuse de Couesme
CLEGUEREC	tourbière de Boduc
GLENAC SAINT-VINCENT-SUR-OUST CURNON	confluence Oust - Aff
GOURIN	tourbière de Guerveur
GOURIN	tourbière de Kerrouec
GOURIN	tourbière de Saint-Hervé en Gourin
KERGRIST	tourbière de Kérandy
LANVENEGEN	Naïc
LANVENEGEN LE FAOUE	Inam
LE BONO	rade de Kerdréan
LE BONO PLOUGOUMELLEN PLUMERGAT	vases du Bono
LE FAOUE PRIZIAC	l'Ellé entre Barrecan et Sainte-Barbe
LOCMALO SEGLIEN	la Sarre
PEILLAC	Arz
PLOERDUT	étang du Moulin de Kerduel
PLOERDUT	lande de Goarem Lan Vraz
ROUDOUALLEC LANGONNET	Menez Du - Castel Ruphel
SAINT-AIGNAN	Blavet aval de Guerlédan
SAINT-DOLAY	étang du Roho - landes du Roho
SAINTE-BRIGITTE	étang des Forges des Salles
SAINTE-BRIGITTE	étang du fourneau
SAINTE-BRIGITTE	tourbière de Guernauter
SARZEAU	anse de Bénance - Ruaud
THEIX	Anse de Lirey
THEIX	étang du Plessis

Tableau 2 : ZNIEFF morbihannaises à attribuer pour l'inventaire

NOTES DE TERRAIN

AIGRETTES GARZETTES HIVERNANT DANS DEUX RIVIERES MARITIMES DU MORBIHAN

Gwenael DERIAN

Durant l'automne et l'hiver 1999-2000, nous avons trouvé opportun de répondre à un appel à collaboration lancé par Claire Voisin du M.N.H.N.. Cl. Voisin voulait alors connaître l'état des populations et le comportement des Aigrettes garzettes hivernantes sur les côtes de l'ouest de la France.

La présente note expose les résultats de nos dénombrements crépusculaires des dortoirs sur la rivière d'Etel et la rade de Lorient, ainsi que les recensements diurnes dans la rade de Lorient. Les comportements des oiseaux n'ont été que peu observés.

Localisation des dortoirs

La rivière d'Etel abrite des ardéidés nicheurs dans sa partie médiane : îlots de Belz. L'Aigrette garzette y est connue comme hivernante. Les dortoirs étaient déjà repérés quand nous avons entrepris ces comptages : Riec'h et des îlots proches des colonies, Fandouillec et Niheu.

La situation est un peu différente en ce qui concerne la rade de Lorient puisqu'aucune mention n'est faite dans les publications du Groupe Ornithologique Breton de dortoirs. Une étape de repérage a donc été nécessaire. Sur la foi d'observations antérieures (J. Corbière ; l'auteur), l'île de Kerner en Riantec et la pointe de Kerzo sur la commune de Port-Louis ont été retenues. Nous n'avons pas trouvé d'autres sites de rassemblements nocturnes.

Ces deux dortoirs sont distants l'un de l'autre de 3 km, les îlots de Belz sont à environ 10 km de Kerner et à 12-13 km de Kerzo.

Description

Le tableau résume les caractéristiques des dortoirs étudiés. Entre autres nous remarquons que ces rassemblements d'aigrettes se font dans des lieux fréquentés par les humains jusqu'au crépuscule : les promeneurs passent à Kerner et à Kerzo, des canots ou des barges naviguent encore sur la rivière d'Etel entre Saint-Cado et Saint-Guillaume. Cependant, ce ne sont que des activités de passage.

Dortoirs Description	Kerzo /Port-Louis	Kerner / Riantec	Fandouillec /Plouhinec ; Niheu et Riec'h / Belz
Emplacement	Bois de pins sur une pointe ; anse vaseuse au nord, anse plus profonde et port de plaisance au sud ; proximité d'une station d'épuration des eaux et de lotissements	Court alignement d'arbres sur une île plate du schorre recouverte d'une pelouse et d'herbus. Une ferme ostréicole et un centre d'animation touristique, une aire de stationnement entretiennent un passage humain.	Îlots boisés à quelques dizaines de mètres de la rive
Essences servant de support	Pins maritimes, 15-20 m	Cyprés sp. 10-20 m	Pins maritimes sur Fandouillec, 15-20 m ; Cyprés sp. sur Niheu, 15-20 m ; chênes et aubépines sur Riec'h, 0-5 m ; rochers sur les petits îlots. Même sur les îlots boisés, les aigrettes préfèrent souvent se poser sur les rochers découverts.
Sous-bois	Ronces et ajoncs	Non	Faible sur Fandouillec et Niheu.
Eau sous les dortoirs	Non ; à quelques mètres du talus de l'île.	Non	Oui.
Accès	Aisé par terre	Aisé par terre	Par mer ou par une chaussée à Fandouillec qui est, comme Riec'h, habitée à la belle saison.
Colonie de reproduction	Oui	Non	Oui (Riec'h)

Description des dortoirs d'Aigrettes garzettes de la rivière d'Etel et de la rade de Lorient (Morbihan) ; hiver 1999-2000

Méthode

- rivière d'Étel :

La configuration des îlots dans la rivière d'Étel nous a amenés à tenter des comptages à partir de points de vue sur les rives opposées. Un observateur à Saint-Guillaume, l'autre à la pointe du Perche ou à la Forêt font le compte des aigrettes qui descendent la rivière.

Du fait des arrivées tardives nous avons pu privilégier le compte à partir uniquement de la rive ouest, les silhouettes blanches des aigrettes se découpent longtemps dans la première nuit.

Pour compléter ces comptages immobiles, nous avons profité des passages réalisés par R. Bozec à proximité des îlots en canot.

- rade de Lorient :

Le suivi des dortoirs dans la rade de Lorient est relativement aisé. L'observateur arrive à Kerner une heure environ avant le coucher du soleil. Il compte les aigrettes qui se nourrissent ou se reposent entre les herbues et les vasières puis les nouvelles arrivantes qui s'égrennent quand approche le crépuscule. Il obtient ainsi une première estimation. Un second résultat est obtenu au moment de l'envol crépusculaire, quand les oiseaux, ici et là rassemblés en groupes d'importances variables rejoignent le cyprés qui sert de dortoir.

Après quelques hésitations sur la conduite à suivre à Kerzo, nous avons opté pour un comptage au pied du dortoir.

Les deux dortoirs peuvent être recensés le même soir. Après l'arrivée des aigrettes à Kerner, quelques minutes suffisent pour rejoindre Kerzo et compter les oiseaux sous une faible lumière.

Une fois pourtant, le 26 janvier 2000, le recensement a pu se faire simultanément par deux observateurs.

- gagnages :

La méthode pour recenser les Aigrettes garzettes au gagnage dans la rade de Lorient est des plus aisées et des plus simples à reproduire : de la pointe de Gâvres à la vasière de Quélisoye, en journée et à marée basse, l'observateur compte les aigrettes à partir d'une série de points de vue. Au mois de janvier 2000, les équipes du G.O.B. occupées aux recensements Wetlands International ont été attentives aux aigrettes et les ont systématiquement notées. Cette méthode est difficilement applicable en rivière d'Étel où les abords sont beaucoup moins urbanisés, ce qui facilite une très large dispersion des aigrettes sur les pâtures ou les marais.

Résultats

- rivière d'Étel :


Les comptages présentés sur le tableau situent entre 140 et 160 le nombre d'aigrettes aux dortoirs de la rivière d'Étel au cours l'hiver 1999-2000. La différence remarquable entre deux dates proches comme les 04 et 05/12/99 illustre un point du comportement des aigrettes : elles rejoignent tardivement les dortoirs et ne font pas toutes halte sur des reposoirs crépusculaires.

Le résultat du 27/10 peut ainsi s'expliquer par le départ hâtif de l'observateur avant le coucher du soleil, et l'arrivée ce soir-là groupée des aigrettes qui lui auront ainsi échappées.

Certains de ces pré-dortoirs sont placés assez loin en amont : 25 le 5 mars au Plec à 19h00

Dortoirs occupés / recensés	date	Effectif	Type de comptage
Fandouillec	4/10/99	75	terrestre
îlots rivière moyenne	27/10/99	11	terrestre
Fandouillec et alentours	7/11/99	53	canot
Fandouillec et alentours	21/11/99	163	canot
Fandouillec	4/12/99	142	terrestre
rivière moyenne	5/12/99	112	canot
Niheu / Riec'h	2/1/00	155	terrestre
rivière	19/1/00	103	canot
Niheu / Riec'h	28/1/00	66	terrestre
rivière moyenne	27/2/00	123	terrestre
rivière	05/03/00	113	canot

Aigrettes garzettes sur les dortoirs de la rivière d'Etel (Morbihan) ; hiver 1999-2000



Aigrettes garzettes sur les dortoirs de la rivière d'Etel (Morbihan) ; hiver 1999-2000

Il n'y a pas eu de recherche des aigrettes sur les lieux de gagnage, cependant, lors des comptages de janvier 2000 pour Wetlands International, nous avons trouvé le 22/01/2000, 77 aigrettes sur la rivière d'Etel.

- rade de Lorient :

L'effectif de fin septembre est très proche de ce qui est observé avant la mise en place de l'enquête :

- Pen Mané / Locmiquélic rassemble presque toutes les aigrettes de la rade sur ses basses eaux avec 120 individus le 05/09 ;
- 140 individus comptés sur le seul dortoir de Kerner le 14/09.

La chute des effectifs au milieu de l'automne peut être attribuée à un départ migratoire partiel ou à un simple transfert vers des sites proches mais nous n'avons aucun autre indice pour appuyer ces idées, surtout en l'absence d'un comptage fiable en rivière d'Etel fin octobre.

Ensuite, les résultats sur les dortoirs indiqueraient une stabilité de l'effectif hivernant autour de 100 individus, n'était le nombre de 134 aigrettes obtenu au recensement diurne du 04/12.

On notera que l'effectif de fin d'hiver est très supérieur aux effectifs nicheurs de Kerzo : 11 nids en juin 2000 (environ 7 nids en mai 1999).

Date	Effectif total recensé	Kerzo	Kerner
30/09/00	161	69	92
28/10/00	76	50	26
24/11/00	15	0	15
31/12-01/01	79	20	59
26/01/00	88	14	74
24-25/02	94	0	94


Aigrettes garzettes sur les dortoirs de la rade de Lorient (Morbihan) : septembre 1999 - février 2000

Les gagnages fréquentés par les aigrettes dans la rade de Lorient pendant l'hiver 1999 - 2000 sont essentiellement des vasières et des marais salés. Les herbues et le littoral rocheux sont utilisés comme reposoirs diurnes.

17/10/99	161
02/11/99	108
04/12/99	134
15/01/00	88

Comptages diurnes d'Aigrettes garzettes dans la rade de Lorient (Morbihan) : octobre 1999-janvier 2000

Quelques prospections autour de la rade de Lorient ont permis de trouver des Aigrettes garzettes en faible nombre sur des prairies pâturées mais ceci à faible distance de l'eau.



Comparaison des recensements diurnes et crépusculaires d'Aigrettes garzettes dans la rade de Lorient (Morbihan) ; hiver 1999-2000

Hérons et alliés

Les hérons cendrés hivernent dans la rade en nombre réduit. Apparemment une partie seulement de ces quelques dizaines d'individus rejoint Kerner ou Kerzo. Dès le mois de février, les reproducteurs investissent la colonie de Kerzo. Dans la rivière d'Étel, les hérons doivent utiliser divers dortoirs dispersés.

Cet hiver a aussi permis d'attester l'hivernage de la Spatule blanche (au moins 2 individus) et de l'Ibis sacré dans la rade de Lorient (au moins 1 individu).

Autres dortoirs

Au début des recherches de dortoirs, deux autres sites ont été repérés : 120 aigrettes le 10/10/99 dans l'anse du Pô / Carnac et dans la rivière de Crac'h, l'île Cuhan accueillait 41 puis 51 aigrettes les 08/10 et 09/10. Ces dortoirs ne semblent pas avoir été utilisés plus avant dans la saison.

Conclusion

Durant l'automne et l'hiver 1999-2000, deux types de comptages concernant l'Aigrette garzette ont été menés.

Dans la rade de Lorient et la rivière d'Étel, le suivi des dortoirs aura permis d'essayer la méthode de comptage et d'avancer une valeur des effectifs hivernants.

- Dans la rivière d'Étel, les îlots de la partie moyenne, entre Plouhinec et Belz, supportent des dortoirs rassemblant environ 140 à 160 individus.

La rivière d'Étel a pu faire partie des premiers sites morbihannais utilisés par l'Aigrette garzette en hiver puisque la carte AURAY de l'atlas de la présence hivernale (1986) cumule 15 à 19 points, ce qui situe un hivernage antérieurement à 1986.

Le tableau suivant présente les données antérieures à 1997 de la Centrale Ornithologique Bretonne puis du G.O.B.

Ar Vran XII-2	55	11/01/85
Ar Vran XII-2	30	03/03/85
Ar Vran XIII-3	22	22/12/85
Ar Vran Morbihan	34	10/01/92

Présence hivernale de l'Aigrette garzette dans la rivière d'Étel (Morbihan) ; 1985-1992

Pendant l'hiver 1998-1999, des opérations concertées du G.O.B. avaient recensé les oiseaux d'eau, dont les Aigrettes garzettes, sur quatre matinées de novembre à mars ; les nombres obtenus sont du même ordre que les résultats de la présente étude.

15/11/98	76
13/12/98	94
10/01/99	116
14/02/99 aux dortoirs	130
21/02/99	128
21/03/99	90

Aigrettes garzettes dans la rivière d'Étel.

opérations concertées du G.O.B. ; hiver 1998-1999

Pour pouvoir faire l'objet de comparaisons internannuelles, les comptages devront se dérouler à marée haute de préférence, ceci pour chasser les Garzettes des reposoirs à l'amont, jusqu'à la tombée de la nuit, à la limite de la visibilité, à partir de points où le versant sud-ouest de Fandouillec et les pointes de Riec'h et Niheu sont visibles. La cale de Saint-Guillaume voire la pointe du Perche satisfont à cet impératif.

Plusieurs recensements crépusculaires pourraient être nécessaires pour écarter des résultats tronqués par une arrivée particulièrement tardive des aigrettes.

D'autre part, les comptages réalisés à partir d'un canot, s'ils vérifient l'existence de reposoirs, n'assurent pas d'un comptage plus complet.

- Un dortoir principal, sur l'île de Kerner, regroupe la plupart des aigrettes dans la rade de Lorient pendant l'hiver. Le dortoir de Kerzo ne fonctionne pas jusqu'au bout de l'hiver. Le total des aigrettes hivernantes de la rade de Lorient se situe autour de la centaine d'individus.

L'Aigrette garzette a commencé à passer l'hiver dans la rade de Lorient à la fin des années quatre-vingts : 20 le 07/12/1988 à Kervern / Locmiquélic. Depuis, les données se concentrent sur la rive est, à l'image de ce qui est constaté au cours des comptages diurnes qui retrouvent, au mois de décembre 1999 près, les effectifs recensés sur les dortoirs. Les vasières et leurs chenaux, le schorre et les marais salés endigués sont les remises habituellement fréquentées.

Les recensements en vue de comparaison pourront se faire à partir de l'île de Kerner, particulièrement à la base de la chaussée submersible, ou de la cale des Salles,

là aussi tardivement et à marée haute, en comptant les arrivées puis l'envol final.

Le dortoir de Kerzo ne nécessite pas d'être visité le même soir.

L'anomalie du 12 décembre (134 aigrettes en comptages diurnes contre 79 au dortoir les 31/12 – 01/01) trouverait une explication dans la mise en évidence de passages et d'échanges entre la rivière d'Etel et la Petite Mer de Gâvres. Ce qui pourrait éclairer du même coup l'existence d'effectifs élevés à la fin de l'été.

Sur la rivière d'Etel ni dans la rade de Lorient nous ne connaissons de menaces sur les dortoirs d'aigrettes. A moyen terme, toutefois, l'abattage des cypres sur Niheu et Riec'h obligerait à un redéploiement des aigrettes vers d'autres reposoirs.

A l'avenir, nous n'avons pas envisagé de suivi systématique des dortoirs mais un comptage au coeur de l'hiver est possible (voir annexe 1).

Remerciements : ils s'adressent à René Bozec qui nous a confié le fruit de ses recherches personnelles, à Patrick Bailleul, Erwan Crochet, Jean-Luc Lemonnier, Muriel Palpant pour avoir contribué aux comptages dans l'ambiance parfois inconfortable des soirs d'hiver.

Bibliographie :

Centrale Ornithologique Bretonne ; Ar Vran, Tome XII, fasc.3, oct. 83.– Atlas de la présence hivernale des oiseaux de Bretagne 1987 – 1981.


Boret P., Mahéo R. 1983.- Ecosystème de la rade de Lorient. DDE Morbihan - CREBS – Rennes I.

Groupe Ornithologique Breton (1990 – 2000).- collection Ar Vran Morbihan.

Annexe 1 :

Les comptages ont été continué durant les hivers suivants le présent travail :

- 94 aigrettes au dortoir de Kerner le 10/01/01 et 90 le 25/02/01 à Kerner.
- comptages mensuels débutés dès l'été 2001 permettent de découvrir un dortoir estival sur l'île Saint-Léon / Riantec (graphique).



Dortoirs d'Aigrette garzette, rade de Lorient (Morbihan) ; été - hiver 2001 - 2002

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti SUR L'ÎLE D'HOEDIC EN 2001

Bernard ILIOU et Gwenael DERIAN

Seul un chant bref et éclatant permet la plupart du temps à l'observateur de localiser la Bouscarle de Cetti. Cette difficulté est peut être un des paramètres qui explique le peu d'informations existant sur la dynamique et la biologie des populations présentes dans notre région. La démarche initiée sur l'île d'Hoedic contribuera sur le long terme à apporter quelques éléments de compréhension sur cette espèce.

Méthodologie

Ce travail consiste dans un premier temps, à compter et localiser sur un parcours qui sera identique tous les ans, tous les chanteurs de Bouscarle de Cetti.

Résultats

Ce premier recensement a été réalisé le 11 avril 2001, le matin de 8 h00 à 11h30, l'ensemble des milieux a été pris en compte, la superficie prospectée est de 200 ha. Les résultats obtenus nous donnent un total de 65 chanteurs.

Localisation	Paluden	Lande de Caspéraquiz	Jardins	Landes du Fort Champ du Menhir	Total
Nombre de Chanteurs	35	6	4	20	65
Pourcentage	53,85	9,23	6,15	30,77	100

Chanteurs de Bouscarle de Cetti, Hoëdic, avril 2001


La densité présente sur le site recensé est de un chanteur pour 3,08 hectares soit 0,325 chanteur par hectare.



Approche par secteur

- Le Paluden présente une superficie de 17 hectares de marais. 35 chanteurs ont été localisés, soit un chanteur pour 0,5 hectare ou 1,94 chanteur par hectare. Sur la rive sud du marais, d'une longueur de 600 m on atteint une densité linéaire d'un chanteur

pour 28-29 mètres . Sur la rive nord, d'une longueur de 500 mètres, on obtient un chanteur pour 50 mètres.

- La zone dénommée Landes du Fort, Champ du Menhir, constitue un ensemble de 73 hectares. 20 chanteurs ont été comptabilisés. Cela représente un chanteur pour 3,65 hectares soit 0,27 chanteur par hectare.



	rochers		routes et chemins
	sable		sentiers
	broussailles et landes		

Prospection sur Hoëdic, Bouscarle de Cetti en 2001

Nous remercions Anne-Marie Barbaza, Erwan Crochet qui ont profité de leur séjour sur Hoëdic pour participer à ce recensement des bouscarles.

Documents

	étang au duc	Golfe du Morbihan	Baie de Vilaine	Baie de Quiberon	rade de Lorient	rivière d'Etel	presqu'île de Rhuys	autres sites	Total
Plongeon catmarin								1	1
Plongeon arctique		11			2		1	2	16
Plongeon imbrin		4					2		6
Grèbe castagneux		129	11	16	88	254	11	17	526
Grèbe huppé	52	439	83	17	89	54	59	19	812
Grèbe jougris							1		1
Grèbe esclavon		10			3		1		14
Grèbe à cou noir		1060	10	61	100	48	36	1	1316
Fou de Bassan								1	1
Grand Cormoran	12				214	52		21	299
Cormoran huppé					2			3	5
Butor étoilé								2	2
Aigrette garzette		210	75	78	94	55	11	13	536
Grande Aigrette								1	1
Héron cendré	7				14	11		13	45
Spatule blanche		17	1		1				19
Cygne tuberculé				3	4			5	12
Bernache cravant		5750	862	1090	897	162	84	1	8846
Tadorne de Belon		3073	685	275	221	220		4	4478
Canard siffleur		384	233		23	200			840
Canard chipeau		18						17	35
Sarcelle d'hiver		1960	243	15			1	157	2376
Canard colvert	393	1995	381	66	300	34	38	341	3548
Canard pilet		862	664						1526
Canard souchet		270	90			18		39	417
Fuligule milouin		119	1		17	25			162
Fuligule morillon		27	32		44	56		2	161
Fuligule milouinan			322						322
Eider à duvet				6					6
Garrot à œil d'or		387			1	2			390
Harle huppé		1590	36	52	8	22	88	1	1797
Busard des roseaux								2	2
Râle d'eau								1	1
Poule d'eau					9				9

	étang au duc	Golfe du Morbihan	Baie de Vilaine	Baie de Quiberon	rade de Lorient	rivière d'Étel	presqu'île de Rhuys	autres sites	Total
Foulque macroule	136	4067	43	90	1060	722	150	276	6544
Huitrier pie		84	743	917	162	7	29	16	1958
Avocette élégante		1034	1438	3	7				2482
Grand Gravelot		1258	884	911	360		179	101	3693
Gravelot à col. Int.				2					2
Pluvier doré		3	120	103	370			615	1211
Pluvier argenté		1747	54	318	782	34	23	2	2960
Vanneau huppé		3885	1061	460	545	264	60	1130	7405
Bécasseau maubèche		286	208	58					552
Bécasseau sanderling			15	1023	235		8	187	1468
Bécasseau violet								21	21
Bécasseau variable		22375	5523	3040	3010	2500	398	230	37076
Bécassine des marais								70	70
Barge à queue noire		428							428
Barge rousse		72	23	41	30	1			167
Courlis cendré		392	478	86	10	80		22	1068
Chevalier arlequin		17							17
Chevalier gambette		132	110	55	128	44	39	3	511
Chevalier aboyeur		7	3		8		4		22
Chevalier culblanc		4	4				2		10
Chevalier guignette		7	2	1	1				11
Tournepierre		33	279	438	101		217	85	1153
Grand Labbe						1			1
Mouette pygmée			3						3
Mouette rieuse	8000							22	8022
Goéland cendré					18	27		15	60
Goéland brun	56							18	74
Goéland argenté								90	90
Goéland marin								7	7
Mouette tridactyle					1				1
Sterne caugek								2	2
Guillemot de Troil						1		1	2
Pingouin torda								26	26

Comptages des oiseaux d'eau, janvier 2001, résultats pour le Morbihan

Source : Wetlands International

Participants : Artel Jean-Pierre (commune de Sarzeau), Bailleul Patrick & Paule, Bozec René, Corlou Pierre, Crochet Erwan, Darracq Gilles, Derian Gwenael, Douru Jean-Luc, Guillemot Francis, Gomes Régis, Iliou Bernard, Mahéo Roger, Montfort Didier, ONCFS Morbihan, Palpant Muriel, Teigner Laurent (Communauté Pays Lorient).

