

AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

Ti ar Vro B.P. 103
29833 CARHAIX



N°23 ANNEE 2002

Sommaire du numéro 23 d'AR VRAN MORBIHAN



Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 mars 2001 à 15 novembre 2001	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 14
Groupe 3 de l'huitrier pie au Tournepiere à collier	page 19
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 25
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 30
Activités du G.O.B. Morbihan	
Inventaire ornithologique des ZNIEFF morbihannaises (I)	page 47
Notes de terrain	
Echouages à Pénestin	page 64

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE :

16 MARS 2001 A 15 NOVEMBRE 2001

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :,
BOZEC René, BLANCHART Jean-Luc, CORBIERRE Jacques, CORLOU Pierre,
CROCHET Erwan, DERIAN Eric, DERIAN Gwenael, ERMEL Gérard, FATIN Denis,
GAUTIER Sébastien, GUILLEMOT Francis, HAMET Loïc, ILIOU Bernard,
KERNINON Yann, LAMOUR Joël, LEMONNIER Françoise et Jean-Luc, MAOUT
Jacques, MOUCHEL Yann, ORDUREAU Yannick, PALPANT Muriel, PHILIPPON
Patrick, SIMON Nathalie, URVOAZ François... sauf erreur ou omission !

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton
(Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre
au 15 mars.

Les observations sont transmises au coordonnateur morbihannais sur papier ou disquette
informatique en respectant l'ordre suivant :

ESPECE ou code	date	lieu-dit (voir carte IGN)	commune	effectif	remarques
48005	04/05/1999	Keriel	162	4	un adulte ravitaille trois jeunes dans une lande

Les listes des codes utilisés pour noter les espèces sont disponibles aux réunions du
G.O.B à Brec'h.

Illustration : couverture Patrick Bailleul ; photographie p50 Gw.Derian.

AR VRAN MORBIHAN N°23

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwenael Derian

Plongeur catmarin *Gavia stellata*

(0 donnée)

Aucune observation pendant la période.

Plongeur arctique *Gavia arctica*

(1 donnée)

1 individu encore en plumage d'hiver, devant la plage de Gâvres, le 24/03/2001 clôt la saison hivernale.

Plongeur imbrin *Gavia immer*

(2 données)

Un individu devant la plage de Tal er Han / Hoëdic, le 09/04/2001.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

(165 données)


Il y a pléthore de données sur cette espèce, en période de reproduction autant que pendant la fin de l'été.

Reproduction :

- 3 couples, le 11/04/2001 au Moténo / Plouhinec, 2 chanteurs à l'étang de la Forêt de Brandivy le 27/06, une parade et 5 individus sur l'étang er Varquez / Erdeven le 15/04.
- la reproduction est ensuite confirmée au Varquez avec 7 poussins le 16/06, 2 le 29/07 et encore 1 le 21/08. 2 adultes sont accompagnés de deux jeunes sur l'étang du Moulin Neuf / Larmor-Plage le 11/07. 1 poussin et 4 juvéniles sont présents dans le rassemblement qui s'est déjà constitué sur les bassins de Bonervo / Theix le 29/07.
- le 09/07, un juvénile sur l'étang de Saint-Jean en Locoal-Mendon et un autre au Cranic / Landaul. 1 juvénile aussi à Pont-Chaland / Muzillac le 05/08 et plusieurs dans un groupe de dix Castagneux à Bavalan / Ambon le 11/08.

Rassemblements :

- ils s'amorcent à la mi-juillet avec 14 individus à la station d'épuration de Varquez Rongal / Plouharnel le 08/07 mais les effectifs restent modestes au cœur de l'été, à l'exception de l'étang de Saint-Jean : 24 individus le 31/07 sur les bassins d'épuration de Kergourio en Crédin et 28 le 04/09, 26 sur ceux de Kersahu / Gâvres le 26/08. Il y en a 35-38 à Banastère / Le Tour-du-Parc le 09/09, 26 le 24/10 et 23 les 31/10 et 07/11 à Pen en Toul / Larmor-Baden. Le bassin de Pen Mané / Locmiquélic accueille comme d'habitude des effectifs remarquables et les étangs de Locoal les retrouvent.



Grèbe castagneux à Pen Mané / Locmiquéléc et l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon (Morbihan) : juin – novembre 2001

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(125 données)

Reproduction :

- 4 couples sont cantonnés sur l'étang de Coët Rivas à Kervignac, le premier nid est visible le 31/03, le second le 01/04. Deux couples couvent et conduisent chacun un jeune à l'envol. 1 couple et un jeune le 21/05/2001 à Château-Trô / Guilliers. Un couple échoue sur l'étang du Ter, couveur le 19/06. A Saint-Barthélémy, sur les anciennes gravières du Stum, un couple élève 3 jeunes, visibles le 20/7. La nidification a lieu cette année encore sur l'étang de Lannénec / Ploemeur, deux jeunes sont élevés, il en reste un le 30/07.
- les jeunes visibles à Saint-Jean / Locoal-Mendon (1-3 le 24/06), à Pen Mané / Locmiquéléc (1 le 19/07) et au Cranic / Landaul (1 le 09/08) ne suffisent pas à certifier une reproduction sur ces sites.
- l'étang au Duc / Ploërmel n'a pas été suivi, les trois jeunes vus le 28/07 peuvent être nés là.

Les rassemblements débutent au mois de juillet mais ne dépassent pas quelques dizaines d'individus avant la fin de la période.

- sur les estuaires et rivières maritimes : 15 au barrage d'Arzal le 20/09, 42 au Moustoir / Muzillac le 28/10. Dès le 31/08, 10 sur l'étang de Saint-Jean, le maximum s'élève à 28 grèbes le 31/08. Sur le Blavet, 6 à partir du 23/07 à Pen Mané et entre 36 et 45 individus dans l'anse de Sterbouët / Locmiquéléc dans la troisième décade d'octobre.
- l'étang du Cranic héberge jusqu'à 13 individus le 31/08, celui de Ploërmel en compte 38 les 02 et 27/08.

Un dernier passage avait été noté au printemps, avec 18 Grèbes huppés devant Gâvres le 24/03.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(25 données)

Au printemps, la dernière observation provient de l'île aux Œufs / Sarzeau avec un

individu en plumage nuptial le 30/04/2001. Une paire s'était brièvement établi au Moténo / Plouhinec, 11/04.

Premiers retours : 1 le 27/07 à Pen Mané / Locmiquélic. En juillet et août, des isolés sont visibles au Cranic / Landaul, la baie de Kerdréan / La Trinité-sur-Mer, Pen Mané, Goh Len / Locoal-Mendon.

13 à Kerfaut / Riantec le 19/10, 10 à Kerouarc'h / Locmariaquer augurent des sites d'hivernage.

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* (1 donnée)

Sur la plage du Magouëro / Plouhinec, un cadavre propre le 19/05/2001.

Puffin des Baléares / Yelkouan *Puffinus yelkouan* (1 donnée)

37 individus passent devant Penvins / Sarzeau, le 09/09/2001.

Fou de Bassan *Sula bassana* (6 données)

Quelques groupes notés depuis la côte ou en mer à partir d'août.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (77 données)

La reproduction du Grand Cormoran se confirme dans le Golfe du Morbihan : 12-13 nids occupés le 03/04/2001 sur les cyprès de l'île aux Œufs. Le nombre de couples installés approche quarante cette saison.

Dortoirs intérieurs : celui de l'étang de la Forêt / Brandivy n'est guère occupé pendant l'été, avec entre 0 et 3 individus comptés entre les 16/08 et 10/11. A Quinipily / Baud, un petit dortoir au bord de l'Evel reçoit 4 individus entre les 12 et 24/08. Le dortoir estival de l'étang de Saint-Jean fonctionne : 103 individus le 17/07, 193 le 31/08 puis seulement 4 le 12/09.

Dortoirs maritimes : tableau.

A noter, un effectif, quoiqu'incomplet, de 186 individus le 25/10 à Arzal.

Port militaire de Lorient		Sortie de la rivière d'Étel	
		17/04/01	30
22/07/01	87	15/10/01	30
20/10/01	113	28/10/01	84
01/11/01	123	04/11/01	68
03/11/01	121	18/11/01	56
05/11/01	92	19/11/01	128

Dortoirs de Grand Cormoran (Morbihan) : été 2001

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (1 donnée)

Butor étoilé *Botaurus stellaris* (2 données)

Deux individus à l'étang du Cranic / Landaul le 31/10/2001 et sur un site plus exigu, le ruisseau de Lézévy / Nostang, un individu le 04/11.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

(3 données)

Les trois données semblent liées :

- aux Prières / Billiers, 1 le 28/05/2001 et 4 le 10/06.
- à Kerzehec / Surzur, le 25/11, 5 individus.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

(148 données)

Reproduction : les données, très incomplètes, ne mentionnent que les individus nicheurs à Beg er Lann / Sarzeau et 6 aires occupées le 16/04/2001 à Kerzo / Port-Louis.

Pendant l'été, l'espèce est contactée à l'intérieur aussi loin que Crédin, Remungol, Ploërmel ou Sérent, de un à cinq oiseaux.

L'étang du Roc'h Du / Crac'h est fréquenté de l'été à la fin de la période :

Date	Effectif
11/08	44
25/08	29
30/10	24
14/11	12

*Aigrette garzette au Roc'h Du / Crac'h (Morbihan) ;
août - octobre 2001*

A Pen Mané / Locmiquélic, le maximum est relevé le 12/10, le marais étant à sec, avec 68 individus. Un comptage exhaustif trouve 164 Garzettes le 02/09 dans la rade de Lorient. Le second recensement s'élève à 161 le 07/10 parmi lesquelles 123 se protègent du vent à l'abri de l'île Saint-Léon / Riantec.

Autres données : 56 le 27/08 et 144 dans la rivière d'Etel le 28/10 ; 73 à l'abri d'un vent de nord dans l'anse du Pô le 15/11.

Dortoirs :

Date	Dortoir	Commune	Effectif	remarque
13/08	île Saint-Léon	RIANTEC	63	dortoir crépusculaire, total Petite Mer = 140
13/08	île Kerner		77	dortoir crépusculaire, total Petite Mer = 140
24/08	Kerzo	PORT-LOUIS	28	au dortoir
30/08	île Kerner	RIANTEC	75	total dortoirs Petite Mer = 163
30/08	île Saint-Léon		88	total dortoirs Petite Mer = 163
16/10	île Saint-Léon		0	pas de dortoir, les aigrettes et les ibis vont vers Kerner
19/10	île Kerner		142	comptage crépusculaire au dortoir
03/11	Kerzo	PORT-LOUIS	71	comptage crépusculaire au dortoir

Dortoirs d'Aigrettes garzettes dans la rade de Lorient (Morbihan) ; août – novembre 2001

Le dortoir du Castell / Le Tour-du-Parc, recensé incomplètement le 08/09, donne un résultat qui dépasse 250 individus.

Les rassemblements ne sont notés qu'à partir de la seconde décade d'août, c'est à dire qu'il y en a qui ont échappé à la vigilance des observateurs.

Grande Aigrette *Egretta alba*

(24 données)

Cela ressemble à une explosion du nombre de données ! Et même si elle ne concerne qu'un nombre limité de sites, cette série sort de l'ordinaire par le nombre d'individus notés et la longueur des séjours. Les contrôles d'oiseaux bagués nous apprennent qu'il s'agit d'oiseaux nés sur les colonies de Loire-Atlantique.

- étang au Duc de Ploërmel, 1 individu le 02/08/2001, sans suite.
- étang du Varquez / Crac'h, 1 individu le 26/08.
- étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon : à partir du 16/08, 1 à 3 oiseaux sont régulièrement observés.
- étang du Cranic / Landaul, 2 individus les 24 et 27/10.

[Ces deux sites hébergeront des Grandes Aigrettes pendant l'automne 2001]


- étang de Lezay / Saint-Dolay, 1 individu le 05/10.

Héron cendré *Ardea cinerea*

(139 données)

Une curiosité : malgré le nombre de données transmises, très peu concernent des rassemblements. Sont-ils si localisés ? les dortoirs seraient inconnus ?

Reproduction : 14 aires occupées le 06/05/2001 à Kerzo / Port-Louis.



Effectifs de Héron cendré observés (Morbihan) ; mars – novembre 2001

Héron pourpré *Ardea pupurea*

(7 données)

- 1 le 29/07/2001 au Varquez / Erdeven, suivi d'une autre observation le 01/09.
- 1 individu à l'étang du Roze / Neuillac les 11 et 14/09.
- 1 à Kersahu / Gâvres, le 14/08.
- 1 au marais d'Ambon le 18/08.

Toutes ces observations mentionnent des juvéniles.

- enfin, à Hoëdic, un individu d'âge non précisé le 20/10.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(48 données)

L'Ibis sacré est présent sur tout le littoral, la dispersion est ressentie à partir de juillet et concerne des oiseaux nés à Grand-Lieu (Loire-Atlantique). Ainsi de quatre oiseaux dans

une bande de 21 au Varquez / Erdeven, le 26/08/2001.

Plus de 550 individus rejoignent le dortoir du Castell / Le Tour-du-Parc le 08/09.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

(15 données)

Données très partielles. Les lectures de bagues nous apprennent l'origine néerlandaise de ces oiseaux.

12 en vol à Hoëdic le 21/10/2001.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

(41 données)

Reproduction : un nid à Banastère le 30/04/2001 ; un couple et trois poussins d'une semaine au Grand Loc'h / Guidel le 07/05 ; 1 couveur à Kerboulico / Sarzeau le 08/05 .

Un couple avec possible reproduction sur les étangs de Saint-Jean / Locoal-Mendon, le Ter / Ploemeur, la Brousse / Sarzeau et Suscinio / Sarzeau.

Cygne noir *Cygnus ater*

(10 données)

La concordance des observations avec la fin de saison reproductive (à l'exception de deux individus au Grand Loc'h / Guidel le 8/03/2001) plaide en faveur d'une origine captive de ces petits groupes ou oiseaux isolés : sur les lagunages de Damgan, on compte jusqu'à huit cygnes entre le 22/07 et le 11/11 ; sur diverses localités de Sarzeau (Suscinio, vasières) et près de là à Pont-Caden / Le Tour-du-Parc deux individus en octobre.

Bernache cravant *Brenta bernicla*

(39 données)

Dans la rivière d'Etel et la rade de Lorient, les départs sont achevés dès la première décade d'avril : 4 en rivière de Landévant le 01/04/2001, 5 à Kersahu / Gâvres le 08/04.

Estivage : 1 à Saint-Colombier / Sarzeau et Treutan / Damgan, les 15/06 et 17/08.

8 Cravants à ventre pâle, le 18/03, faisaient le lien avec les observations de l'hiver dans la Petite Mer de Gâvres.

Retours :

- la première rejoint la rade de Lorient le 07/10, elles sont 996 le 14/11 dont 2,27% de jeunes.
- dans la rivière d'Etel, 2 le 28/10, 36 le 01/11.
- 12 à Kerouarc'h / Locmariaquer le 30/10 et 73 dans la baie de Plouharnel le même jour, 440 dans la baie le lendemain.
- Golfe du Morbihan : 33 à Séné le 10/10, 2400 à Lasné / Saint-Armel le 01/11 et plus de 3000 au Passage / Saint-Armel.
- baie de Vilaine : le 28/10 251 à Tréhuiguier / Pénestin, 395 au Bronzais / Pénestin le 30/10.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(99 données)

Reproduction :

- Kersahu / Gâvres : premières nichées à la mi-juin, au moins 5 familles le 16/06/2001 rassemblent 61 poussins. Sur ce site, on totalise 119 poussins.

- Pen Mané / Locmiquélic, 16 canetons le 22/06. 45 poussins seront élevés sur le bassin.
- rivière d'Etel : si plusieurs couples sont repérés de l'aval vers le haut de la rivière, les seules données de familles proviennent du lagunage de Sainte-Hélène (6 jeunes d'environ 6 semaines avec deux adultes le 30/06/2001) et de l'étang de Saint-Jean (un couple et 2 poussins le 24/06). Aucune conclusion n'est possible pour la partie aval mais il est certain que les couples du Goah Guillermin / Nostang et de la rivière de Landévant n'ont pas conduit de nichées.
- autres sites : étang de Pomper / Baden, 7 poussins le 04/08 ; bassins de décantation de Baden, 3 poussins le 04/08 ; étang de Kéravéon / Erdeven, 1 poussin le 01/07 ; Varquez-Rongal / Plouharnel, 3 poussins à partir du 08/07.

Rassemblements : Vilaine : 50-80 au Moustoir / Muzillac le 05/08, 111 le 27/10 ; plus de 200 à Tréhuiguier / Pénestin le 28/10. En baie de Sarzeau : on en dénombre 427 le 01/11. Dans la Petite Mer de Gâvres, 30 le 29/09 et 63 le 04/11.

Canard siffleur *Anas penelope*

(13 données)

1 femelle le 27/04/2001 au Moténo / Plouharnel puis c'est le vide jusqu'aux retours de septembre : 2 mâles et 1 femelle à Pen Mané / Locmiquélic le 28/09. 300 à Kerbodec / Sarzeau le 01/11, seulement 17 et 40 sur l'autre site d'hivernage de Saint-Jean / Locoal-Mendon les 17/10 et 02/11. 14 individus se posent sur l'étang du Ter / Ploemeur le 15/11.

Canard chipeau *Anas strepera*

(3 données)

- 1 puis 2 individus dans la Vilaine à Pénestin, les 28/10 et 30/10/2001.
- 2 individus sur l'étang au Duc / Ploërmel, le 20/11.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(17 données)

Quelques retours sont perçus en août : 2 femelles ou jeunes à Pen Mané / Locmiquélic, le 03/08/2001 ; 11 puis 41 à Kersahu / Gâvres, les 26 et 30/08.

Les données automnales ne sont pas significatives des arrivées. 31 sarcelles à Toulvern / Baden le 07/11.

Canard colvert *Anas platyrinchos*

(130 données)

Reproduction : familles à l'étang de Kéravéon / Erdeven, Pen Mané / Locmiquélic, le Moténo / Plouhinec, et Varquez / Erdeven, Varquez Rongal / Plouharnel, étang du Cranic / Landaul, étang de Coët-Rivas / Kervignac, étang de la Forêt / Brandivy, étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, le Stum / Saint-Barthélémy...

Parmi les places de mue : 91 individus sur l'étang de Pont-Caden / Surzur le 25/08/2001, 140 au moins à Bavalan / Ambon le 11/08, 148 au Moulin de Pomper / Baden le 04/08, sur l'étang de Roc'h Du en Crac'h 137 colverts le 11/08 et 77 le 25/08, 91 sur le Varquez Rongal / Plouharnel le 26/08, à Pen Mané / Locmiquélic, l'effectif passe de 50 le 22/06 à 131 le 03/08.

Rassemblements : 200 Colverts à Pen Mané le 30/08, 138 au Cranic le 31/08, 80 au

Roc'h Du le 31/08, 115 au Varquez Rongal le 01/09, 425 sur l'étang du Ter / Ploemeur le 14/10, l'étang au Duc / Ploërmel en accueille 250 le 22/10 et 391 le 20/11, 200 à 300 devant le Moustoir / Muzillac le 27/10, la baie de Sarzeau le 01/11 en totalise 1650, 159 sur les bassins de décantation de Baden le 31/10 et 130 sur les lagunages de Theix à Bonnervo le 11/11.

Canard pilet *Anas acuta*

(5 données)

Quelques données isolées :

- 11/08/2001, Bavalan / Ambon, 4 mâles.
- 29/08, Bétahon / Ambonn, 1 femelle.
- 17/10, étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 2 femelles ou jeunes et 1 mâle.
- 01/11, 650 Pilets dans la baie de Sarzeau.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

(7 données)

Toujours pas d'indice probant de reproduction !

- 02/05/2001, 2 individus au Grand Loc'h / Guidel.
- 16/04, une paire à Lannénec / Ploemeur.
- 29/07, 1 à Surzur sur les lagunages asséchés.
- 25/08, 5 individus à l'étang de Pont-Caden / Surzur.
- 29/08, 8 à Bétahon / Ambon.
- 01/09, 1 femelle ou juvénile au Varquez / Erdeven et 2 sur la station d'épuration du Varquez Rongal / Plouharnel..

Canard souchet *Anas clypeata*

(13 données)

Un seul site au printemps : Pen Mané / Locmiquélic, 2 mâles les 25 et 28/03/2001, 2 femelles et 1 mâle le 27/04.

Les retours sont visibles à la fin d'août, isolés ou par petits groupes, les Souchets passent au Cranic/ Landaul (10 le 27/08), Pen Mané, Bétahon (7 le 29/08).

70 à Kerbodec / Sarzeau le 01/11.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

(23 données)

Le Fuligule milouin s'est reproduit à Suscinio / Sarzeau (voir Ar VRAN MORBIHAN 22). Les trois premiers Milouins sont de retour à Saint-Jean / Locoal-Mendon le 21/08/2001 ; 14 sur l'étang du Ter / Ploemeur le 14/10 ; 22 au Cranic / Landaul le 17/10 ; 14 sur l'étang des Ducs à Vannes le 20/10 et 16 à Bonnervo / Theix. Sur l'étang des Ducs, il y a le 11/11 198 mâles pour 26 femelles et à Bonnervo 39 femelles parmi 70 individus.

Fuligule morillon *Aythya morillon*

(8 données)

1 dès le 15/07/2001 au Varquez Rongal / Plouharnel reste bien isolé puisque les retours sur l'étang du Ter à Ploemeur ne sont notés qu'au 14/10 avec 4 individus.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

(6 données)

La zone de mue repérée devant Damgan n'offre cet été 2001 que de faibles effectifs puisque seulement 6 à 9 individus sont contactés entre le 13/08 et le 09/09.

Macreuse sp *Melanita* sp

(2 données)

1 macreuse non déterminée dans la rivière d'Etel devant la Forêt/ Locoal-Mendon, les 10 et 28/10/2001.

Macreuse noire *Melanita nigra*

(2 données)

- 8 à Kervoyal / Damgan le 29/08/2001.
- 52 devant la Roche Sèche / Erdeven le 04/11.

Harle huppé *Mergus serrator*

(4 données)

Au printemps : 3 femelles et 1 mâle dans la rivière d'Etel à Kercadic / Sainte-Hélène le 18/03/2001 et 1 femelle à Pénerf / Damgan le 13/05.

Les retours : 1 femelle à Bénance / Sarzeau le 01/11 et un couple à Kerouarc'h / Locmariaquer le 14/1 ne sont que des mentions isolées.

AR VRAN MORBIHAN N° 23

Groupe n° 2 Des rapaces aux rallidés.

Choix et rédaction établis par Franz Urvoaz.

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

(13 données)

Première observation : 14/04/2001 à Crucuno / Erdeven.

Dernières observations : 07/08 en vol au-dessus du centre de Vannes, 18/08 à l'étang de Saint Jean / Locoal-Mendon.

Aucun indice certain de nidification n'est noté même si des couples sont observés paradant à Poncalleck / Berné, Lizourden / Sainte-Hélène et Crucuno / Erdeven.

Milan noir *Mibvus migrans*

(37 données)

Premières observations : 24/03/2001 sur la commune de Plougoumelen, 25/03, 2 individus sont aperçus au Bas du Bourg / Muzillac.

Dernières observations : 22/10, 1 individu en vol NE-SO à Kergolaire / Languidic, 25/10 1 individu à Quinsignac / Rieux.

Les oiseaux sont notés dans 18 communes différentes : Sarzeau, Grand-Champ, Landaul, Hoëdic, Guidel, Locoal-Mendon, Erdeven, Beignon, Auray, Arzal, Rieux, Plougoumelen, Theix, Surzur, Plunéret, Languidic, Plouharnel et Muzillac.

Des couples reproducteurs sont localisés sur les communes de Sarzeau, Arzal, Muzillac et Guidel.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

(81 données)

Pendant la période considérée, des busards des roseaux ont été notés dans les communes suivantes : Locmiquélic, Erdeven, Plouhinec, Locoal-Mendon, Gâvres, Hoëdic, Larmor – Baden, Plouhinec, Le Tour du Parc, Saint-Armel, Sarzeau, La Trinité sur Mer, Nostang, Muzillac, Séné, Damgan, Brec'h, Baden et Ambon.

A titre d'anecdote, un mâle est aperçu avec un merle mâle dans les serres au marais de Suscinio / Sarzeau le 27/05/2001.

Des couples nicheurs sont notés à Ambon, Locoal-Mendon et Hoëdic.

Des juvéniles seuls ou en compagnie d'adultes sont observés sur les communes de Brec'h, Muzillac, Erdeven, Larmor-Baden, Plouhinec, Locoal-Mendon, Locmiquélic et Gâvres.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

(34 données)

Observations faites sur les communes suivantes : Gâvres, Néant sur Yvel, Camors, Languidic, Locoal-Mendon, Nostang, Plouhinec, Quily, Sainte Hélène, Sérent, Surzur, Merlevénez, Ambon, Arzal, Erdeven, Guégon, Landaul et Landévant.

Des indices de nidification possible ou probable sont répertoriés sur les communes de Gâvres, Nostang, Plouhinec, Sainte-Hélène, Languidic et Camors.

A noter, un dortoir de 4 individus à Sérent, le 17/10/2001.

Busard cendré *Circus pygargus*

(2 données)

Les deux observations sont faites le même jour sur la commune de Campénéac. Il s'agit de deux mâles distincts dont l'un transporte une proie.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

(6 données)

Communes concernées : Guidel, Plouharnel, Plouay, Berné et Camors.

Deux observations remarquables : 2 juvéniles en compagnie de 2 adultes sur la commune de Plouay le 30/06/2001, 2 adultes et un jeune encore sur l'aire à Berné le 13/06.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

(38 données)

Au total, 24 communes distinctes sont concernées par les observations : Erdeven, Arzal (1 femelle semble défendre son aire contre 1 milan noir) Languidic (présence d'un nicheur certain et d'un nicheur probable), Hoëdic, Guéhenno, Grand-Champ (une aire occupée), Gourin, Erdeven (1 femelle sur son aire), Béganne (2 jeunes volants le 28/07/2001), Caudan, Camors, Caden, Brandivy, Brandérion (nicheur certain), Belz, Etel, Vannes, La Trinité sur Mer, Theix, Taupont, Plouhinec, Moréac (1 jeune au bord de l'aire), Locmiquélic et Landaul (2 jeunes aperçus).

Buse variable *Buteo buteo*

(121 données)

Les communes où l'oiseau est noté comme nicheur possible, probable ou certain :

Camors, Erdeven, Grand-Champ, Caden, Béganne, Brandérion, Brandivy, Brec'h, Languidic, Nostang, Plouharnel, Muzillac, Moréac, Saint Gorgon, Landaul, Ambon, Locoal-Mendon.

Quelques anecdotes :

- 6 individus en vol circulaire à Er Varquez / Erdeven le 01/09/2001.
- 1 parade collective comprenant 5 individus le 23/05 en forêt de Floranges / Camors.
- 1 individu transportant un serpent vivant dans le bec le 05/05 à Locoal-Mendon.

Mis à part les harcèlements par les corneilles qui sont très fréquents, on note aussi un harcèlement par un *corbeau* au Pont du Chaland / Muzillac le 13/10, par un Busard Saint-Martin à Camors (forêt de Floranges) le 27/06.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

(17 données)

Observations effectuées sur neuf communes différentes : Brec'h, Damgan, Guidel, Locoal-Mendon, Landaul, Nostang, Noyal, Sarzeau, Theix.

Deux observations printanières : un individu le 16/04/2001 Kerlapinette / Landaul et 1 à Broral / Theix le 15/06.

Les contacts estivaux, rapportés au passage postnuptial, commencent à partir du 31/07 : 1 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon) et prennent fin le 30/10 au Duer / Sarzeau.

A deux reprises, deux individus sont notés simultanément au Cranic / Brec'h.

Les données viennent de trois endroits :

- est du Golfe du Morbihan, entre le 09/09 et le 30/10
- rivière d'Etel, du 31/07 au 19/09

- Loc'h / Guidel, 1 le 07/09.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

(83 données)

41 communes sont répertoriées. A treize reprises, des aires avec juvéniles, des nicheurs probables ou encore des juvéniles volants accompagnés d'adultes sont observés : Ambon, Baud, Brandérion, Nostang, Moréac, Tréhorenteuc, Languidic, Muzillac, Une aire détruite, les plumes des jeunes retrouvées à terre le 01/07/01 à Moréac.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

(9 données)

Les observations débutent dès le 10/08/2001, 1 individu à Gâvres.

6 communes sont concernées par des observations : Erdeven, Gâvres, Guidel, Hoëdic, Ploëren, Rieux.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

(37 données)

Vingt et une communes sont répertoriées : Baud, Camors, La Chapelle Neuve, Campénéac, Brec'h, Damgan, Hoëdic, Berné, Merlevenez, Theix, Sainte-Hélène, Sainte-Brigitte, Plumelec, Nostang, Erdeven, Moréac, Locoal Mendon, Landaul, Ambon, Colpo et Les Forges.

Des indices de reproduction certains ou probables apparaissent à six reprises : Camors, Baud, Nostang, Erdeven, Colpo et Berné où la reproduction échoue.

Lors des chasses, les Hirondelles rustiques ou de rivage et les Martinets noirs sont en général poursuivis. A noter également la capture de gros insectes (hannetons et libellules).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(1 donnée)

Cette observation est faite au Duer / Sarzeau le 26/10/2001.

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

(1 donnée)

4 individus à Kervolanec/ Camors le 21/03/2001.

Perdrix grise *Perdix perdix*

(1 donnée)

2 individus à Nahellec / Berné le 14/05/2001.

Caille des blés *Coturnix coturnix*

(5 données)

C'est presque une avalanche de données, comparées à la rareté de cette espèce dans nos rubriques !

La caille est notée à la Ville Gleuhel / Guégon le 19/05/2001, 1 individu, puis 1 le 03/07 à Branquiliy / Gueltas.

La donnée la plus remarquable concerne une nichée de 8 à 10 jeunes sur la commune de Remungol durant l'été ; un chanteur noté dès le 14/07 à Kerogard, la nichée est vue les 06 et 12/08.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

(2 données)

Communes concernées : Languidic et Houat.

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(37 données)

Des regroupements de plusieurs individus sont notés à plusieurs reprises à Tréhervé / Ambon, Pen-Mané / Locmiquélic, étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon et Er Varquez / Erdeven. La reproduction est attestée dans ces deux derniers lieux.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus*

(64 données)

Quelques regroupements :

Er Varquez / Erdeven, 16 individus le 13/06/2001 ; étang du Crannic/ Brec'h, 11 individus le 09/07 ; Poulben / Auray, 11 individus le 11/08 ; étang de la Forêt / Brandivy, 10 individus le 26/09 ; étangs de Roze/ Neuillac, 33 individus le 14/09.

La reproduction est notée pour les communes suivantes : Brandivy, Erdeven, Brec'h, Baud, Baden, Auray, Plouharnel, Ploemeur, Neuillac, Hoëdic, Locoal-Mendon et Muzillac.





Foulque macroule *Fulica atra*

(189 données)

Cette espèce est notée sur trente-trois communes. Les regroupements sont constatés à partir de la mi-juillet, ils ont été suivis sur plusieurs sites d'inégales importances (graphiques).

Étang de Toulvern / Baden, 289 le 04/08/01, 373 le 24/10/01, 503 le 31/10/01, 772 le 07/11/01. La vasière de Quélisoye à Larmor-Plage n'a pas, cette saison, été particulièrement suivie, suffisamment pour vérifier que la fréquentation est toujours élevée : 760 le 17/09 puis 1237 le 26/10. Sur la façade orientale du Golfe, quelques comptages : 1000 à Bénance, 930 à Kerbordec / Sarzeau et 1020 au Passage / Saint-Armel, le 01/11. Plus loin, à Theix, il y en avait 1040 sur les lagunes de Bonnavo le 29/07, l'effectif automnal se situe vers deux cents individus.

On peut noter la troupe de 40 foulques sur le Paluden à Hoëdic.



Foulques macroules sur trois étangs (A = Roch Du, B = Cranic, D = Saint-Jean) et un bassin (C = Pen-Mané) du Mornihan ; été-automne 2001

AR VRAN MORBIHAN N° 23

Groupe n° 3 De l'Huîtrier pie au Tournepierrière à collier

Choix et rédaction établis par Yannick Ordureau

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

(32 données)

Le 10/04/2001, 71 individus sont signalés sur la côte sud de Hoëdic

Le 06/10, 86 individus sont présents à Bétahon / Ambon et un rassemblement de 251 individus est observé sur les rochers à la Pointe du Bil en Damgan.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

(44 données)

La première est signalée le 23/03/2001 dans les lagunes de Damgan puis le 14/04 à Kersahu / Gâvres dont une couveuse.

Reproduction :

- Tréhervé / Ambon, 5 à 7 couples.
- Kersahu / Gâvres, deux couples couvent, deux jeunes à l'envol.
- Dunes domaniales de Plouharnel, deux couples, trois jeunes.
- Suscinio / Sarzeau, 8 couples nichent.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(20 données)

Au printemps, 2 individus sont observés à Bétahon / Ambon, et 3 couples nicheurs dans les marais de Suscinio / Sarzeau.

Aucune observation de juvénile n'a été effectuée.

A l'automne, les plus importantes observations ont été faites au Moustoir / Muzillac, 300 individus le 28/10/2001 et dans l'anse du Bronzais / Penestin, 107 le 30/10.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

(13 données)

A partir de la première observation du 25/02/01 (Ar Vran Morbihan 22) un seul individu est contacté et il faut attendre le mois de juillet pour en voir 3 puis 4 en août. La dernière observation date du 08/10. Ceci ne concerne que la dune du Cosquer et Kerminihy à Erdeven.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

(2 données)

Un individu le 15/04/2001 dans les carrières de kaolin à Ploemeur, un couple le 13/05 à Kerhervé / Ambon.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

(38 données)

Le 01/05/2001, 125 individus sont signalés à la Pointe de Penvins / Sarzeau

Reposoirs estivaux : 142 le 10/08/01 à Kerner / Riantec, 200 à Redion-Larmor / Damgan le 20/08, 500 sur le reposoir de Lenn / Damgan le 05/09 puis 550 à Linès / Gâvres le 08/10.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (28 données)

Le 09/04/2001, observation de 15 individus dans les dunes à Houat.

A Roche Sèche / Erdeven, le 34 le 01/08 puis 52 le 12/08 !

Au niveau de la reproduction, trois couples dont deux nids avec éclosion à Kerminihy / Erdeven (28 et 31/05), deux autres à Suscinio / Sarzeau (01/05) et un poussin à Maguéro / Plouhinec (30/05), un couple alarme au Moténo / Plouhinec le même jour.

Sur Hoëdic, un couple sur la côte sud, le 10/04.

Pluvier guignard *Charadrius morinellus* (3 données)

Un individu est observé en plumage nuptial le 07/05/2001 à Kerminihy / Erdeven.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (15 données)

Le 28/03/2001, 3 individus en plumage nuptial incomplet sont signalés à Kerminihy / Erdeven.

- 190 au Grand Loc'h de Guidel le 02/11.
- 150 au Cosquer / Colpo le 09/11.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (17 données)

Le 01/05/2001, 12 individus à Hoëdic ; le 08/05, 33 en majorité en plumage nuptial à l'île de Kerner / Riantec.

Le retour de quelques dizaines d'individus est noté le 14/07 en Petite Mer de Gâvres, il y sera compté 47 le 16/08 puis 57 le 17/10.

25 le 01/11 à Kerbodec / Sarzeau.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (109 données)

De très nombreuses observations, plusieurs couples nicheurs mais peu de présence de jeunes :

- date non-précisée, le bourg d'Ambon, un couple nicheur probable.
- 23/03, la Montag^{re} du Salut / Caudan : 4 vanneaux paradent, une corneille les houspille ; le 31/05 ils sont 4 à 5 dont un probable couveur.
- 11/04, Moténo / Plouhinec, 2 pontes puis 18/05, 1 ponte.
- 01/05, Kergavat / Erdeven, 2 couples dans les champs.
- 05/05, dunes domaniales de Plouharnel, 1 couveur ; un couple parade.
- 07/05, Kerminihy – Le Cosquer / Erdeven, 5 couples cantonnés autour des flaques.
- 12/05 sur les dunes de Kervran Kerzine / Plouhinec, une recherche systématique permet de repérer environ 25 couples mais aucune nidification certaine.
- 12/05, Kersahu / Gâvres, 2 alarment.
- 19/05, une couveuse Magouéro / Plouhinec, 2 alarment.
- 27/05, marais de Suscinio / Sarzeau, 1 couple nicheur probable.
- 20/06, le Gouarde / Nostang, 9 au moins, 5 jeunes, 3 adultes dans maïs de 30 cm ; vraisemblablement deux couples se sont reproduits sur ces semis.

- 01/07, Kerouriec (sablère) / Erdeven, 1 adulte qui alarme, 1 juvéniles et 2 poussins puis le 15/07 1 adulte et 1 poussin.

Quelques rassemblements d'automne :

- 31/10/01, marais de Pen en Toul / Larmor-Baden, 170.
- 02/11/01, Grand Loc'h / Guidel, 420.
- 07/11/01, marais de Pen en Toul / Larmor-Baden, 271.
- 24/11/01, route de Saint-Allouestre / Guégon, 218.
- 05/12/01, champ de Bignan / Saint-Jean-Brévelay, 210.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

(5 données)

Une observation d'un individu en plumage nuptial, le 10/04/2001 à Hoëdic, puis 8 le 15/06 à Penvins / Sarzeau et 4 le 09/09.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

(18 données)

Le 10/04/2001, 90 individus sont signalés à Hoëdic puis 35 le 01/05 ; le 07/05 observation de 32 individus à Roche Sèche / Erdeven.

En octobre 80 le 14/10 à Linès / Gâvres, 70 le 15/10 à Ty Hoche / Plouharnel .

Bécasseau minute *Calidris minuta*

(3 données)

Le 15/06/2001, 1 à Penvins / Sarzeau, 2 adultes le 14/08 à Kerfaute / Plouhinec et 1 jeune à Pen Mané / Locmiquélic le 17/10.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

(6 données)

Principales observations à Gâvres : 1 le 08/07/2001 et le 30/08 à Kersahu et 6 le 19/07 à Linès .

Le 18/08, 4 individus sont signalés à Lenn / Damgan.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(7 données)

Très peu d'observations : 14 à Le Stôle / Ploemeur le 19/03/2001 et 3 à Hoëdic le 01/05.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(40 données)

Des données partielles, on retiendra :

- 10/04/2001, Beg er Faut / Hoëdic, 120.
- 01/05, Penvins / Sarzeau, 200.
- 19/07, Linès / Gâvres, 500, premiers retours d'importance.
- 20/08, Redion-Larmor / Damgan, 200.
- 30/08, Linès / Gâvres, 500.

Combattant varié *Philomachus pugnax*

(3 données)

Trois données en fin d'été : 27/08/2001, Lac au Duc / Ploërmel, 1 ; 29/08, Bétahon / Ambon, 6 ; 02/09, Foisigo / Damgan, 15.

Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus* (1 donnée)

Un individu observé dans la tourbière de Kerfontaine / Sérent, le 30/10/2001.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (31 données)

Une nette augmentation des observations ; au printemps 10 le 22/03/2001 à Listoir / Landévant, 4 à Hoëdic le 11/04 et 2 le 27/04 à Moténo / Plouhinec.

Barge à queue noire *Limosa limosa* (17 données)

Espèce encore présente début mai : 3 à Kervihan / Locoal Mendon le 03/05/2001 et 1 le 08/05 à Kerboulico / Le Tour du Parc.

De nombreuses observations à l'automne ; en particulier : 28/10, Tréhiguier / Pénestin, 32 ; 28/10, Moustoir / Muzillac, 69 ; 11/11, Kerbodec / Sarzeau, 220.

Barge rousse *Limosa lapponica* (34 données)

Encore présente en mai : 69 le 7/05/2001 à la Roche Sèche / Erdeven dont de nombreuses en plumage nuptial, 71 le 08/05 à Gohent / Sainte-Hélène, 66 le 12/05 sur la plage à Plouhinec.

A l'automne plusieurs observations de quelques solitaires sauf le 30/10 où 37 sont observées dans la baie de Plouharnel.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (64 données)

De nombreuses observations en avril et mai dont :

- 26/04/2001, Kergollaire / Languidic, 23.
- 28/04, Kersahu / Gâvres, 17.
- 28/04, Kervihan / Locoal Mendon, 39.
- 6/05, Kerassio / Languidic, 43.
- 8/05, Gohent Ste Hélène, 26.
- 8/05, Penhoët / Merlevenez, 55.
- 13/05, Ambon, 28.

Au retour, quelques unités observées et aussi une concentration de 50 individus le 14/08 à Kerfaute / Plouhinec, 25 le 20/08 à Redion Larmor / Damgan.

Courlis cendré *Numenius arquata* (49 données)

Sept données printanières dont 16 individus à Linès / Gâvres le 30/06/2001 sur la vasière découverte.

Les effectifs augmentent à partir de début août :

- 05/08, Moustoir / Muzillac, 50.
- 14/08, Lizaloué / Nostang, 60.
- 14/08, Linès / Gâvres, 80.
- 9/09, Larmor / Damgan, 80.
- 29/09, Ile St Léon / Riantec, 70.
- 27/10, Moustoir / Muzillac, 150.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

(7 données)

Une donnée printanière le 16/06/2001 à Kersahu / Gâvres .

A l'automne une concentration de 57 individus est signalée à Pen en Toul / Larmor Baden, le 31/10.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

(42 données)

Une reproduction difficile à caractériser, ainsi une seule donnée indique la présence de jeunes : 3 le 22/06/2001 à Moténo / Plouhinec. D'autre part : 2 couples au marais du bourg d'Ambon le 30/04, 2 alarment le 30/05 à Kerzine / Plouhinec et Tréhervé / Ambon le 03/06.

Aucune observation n'indique des couples nicheurs.

Les rassemblements commencent à la mi-août : 15/08, Redion Larmor / Damgan, 67 ; 01/09, Pénerf / Damgan, 183 ; 01/11, Bénance / Sarzeau, 92.


Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

(35 données)

Une seule mention du passage printanier avec deux individus le 07/05/2001 au pont de Kergonan / Plumelec .

Jusqu'au 19/07, il n'y a aucune donnée .

Bon suivi durant l'été à l'étang du Roc'h Du / Crac'h jusqu'à 75 individus sont observés le 25/08.



Chevalier aboyeur sur l'étang du Roc'h Du / Crac'h (Mornihan) ; été 2001

Le 24/10, observation de 31 individus au moulin de Pomper / Baden .

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

(59 données)

Seulement six données printanières du 23/03/2001 au 30/05. Le passage postnuptial est ressenti à partir du le 16/07 . Le maximum observé est de 10 individus le 29/08 à Bétahon / Ambon.

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

(4 données)

Une observation printanière le 16/04/2001 à Suscinio / Sarzeau.

Le 06/10, observation de 4 individus dont 2 jeunes dans le bourg d'Ambon ; le 19/08, sur les lagunes de Damgan, 1 et aussi le 21/10 sur les nouveaux lagunages à Hoëdic .

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

(73 données)

Seulement deux observations durant le printemps : le 25/03/2001 à Le Sac'h / Etel et le 15/06 à Penvins / Sarzeau.

Du 13/08 au 21/08 25 individus sont présents à Pénerf / Damgan puis 10 le 05/09.

Un suivi régulier à l'étang du Cranic / Brec'h de juillet à septembre en dénombre de 1 à 6 (31/08).

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres*

(3 données)

Une importante concentration de 200 individus le 01/05/2001 et de 150 le 05/05 à Hoëdic, et aussi de 187 à Penvins / Sarzeau le 01/05.

Le 28/10, 64 individus à la Roche Sèche / Erdeven, 60 le 14/11 à la Pointe de Kervoyal / Damgan et 120 le 14/11 à l'Ile aux Souris / Port-Louis.

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*

(3 données)

Les 3 observations ont été effectuées début octobre :

- un adulte et un juvénile le 07/10/2001 à Kerminihy / Erdeven.
- 3 individus sur l'étang entre Bétahon et Cromenac'h / Ambon, le 08/10.
- 1 le 10/10 au gué de Bouëd / Séné après de forts vents de sud.

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Yann Kerninon

Pour cette période, nous sont parvenues 318 données et sont traitées 22 espèces.

Sercorariidae sp.

(1 donnée)

Il s'agit d'un groupe mixte de 15 Labbes pomarins et parasites devant Kervoyal / Damgan le 29/08/2001.

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus

(2 données)

1 individu à Kervoyal / Damgan le 18/08/2001 et 4 (2 adultes de forme claire) en vol vers l'ouest devant la plage de Gâvres le 08/09.

Labbe parasite Stercorarius parasiticus

(2 données)

Le 18/08/2001, 2 oiseaux passent à Kervoyal / Damgan, et 1 est vu au large de Hoëdic le 21/10.

Grand Labbe Catharacta skua

(4 données)

Une donnée printanière : 1 individu observé à Houat le 09/04/2001.

Le 23/07, en amont de la ria d'Etel, 1 adulte est trouvé dans un reposoir de Goélants bruns à Kerihuelo / Landaul. En mer : 1 oiseau est vu au large de Hoëdic le 21/10.

Laridae sp.

(6 données)

Les dix cadavres (juvéniles et immatures) trouvés échoués en été et à l'automne concernent le littoral de Saint-Pierre-Quiberon à Etel.

Un grisard ambitieux pourchasse un Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* au Pont de Kerino / Vannes le 06/11/2001 !

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus

(8 données)

Une seule donnée printanière pour 1 seul adulte vu sur une pâture à Légevin / Nostang le 02/04/2001.

Au retour, 3 adultes et 1 juvénile se reposent à La Roche Sèche/Erdeven le 01/08. De faibles effectifs ensuite avec 1 à 2 individus par site pour les côtes d'Erdeven, Etel et Sarzeau entre le 09/09 et le 01/10. Dernière donnée pour Hoëdic avec 1 oiseau le 21/10.

Mouette pygmée Larus minutus

(14 données)

Quelques effectifs intéressants sont relevés au cours de cette période.

Le passage prénuptial est noté du 18/03/2001 (60 individus à Kersahu / Gâvres) au 06/05 (4 à Pen Mané / Locmiquélic).

Entre temps, 95 aux lagunes de Damgan le 23/03 après une tempête (encore 30 le 01/04), 26 au Grand Loc'h/Guidel le 25/03, 34 le 11/04 et 11 à Pen Mané / Locmiquélic le 27/04.

3 données post-nuptiales : 1 mouette à La Roche Sèche / Erdeven le 01/08, 50 à Kervoyal / Damgan le 18/08 et 3 à l'étang du Ter / Ploemeur le 04/11.

Mouette de Sabine *Larus sabini*

(1 donnée)

Une seule mention pour cette espèce pélagique : 1 juvénile est observé en pleine tempête à Quiberon le 07/10/2001.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(38 données)

Aucune donnée du 16/03 au 15/06/2001, le passage est régulier ensuite.

La proportion de jeunes est suivie, ainsi : 2 juvéniles parmi 89 individus le 16/06 à Pen Mané / Locmiquélic, 4 juvéniles pour 88 adultes le 24/06 à Pont er Mor / Nostang et une « très faible proportion de jeunes » parmi 1700 oiseaux le 11/07 dans l'anse de l'Istrec / Locoal-Mendon.

Quelques chiffres d'août à septembre : 113 à La Roche Sèche / Erdeven le 01/08, 116 à l'Île de Kerner / Riantec le 10/08, 126 au lagunage d'Auray, 141 au Moulin de Coët Courzo / Locmariaquer, 243 à La Roche Sèche / Erdeven le 12/08, 130 le 20/08 et 500 le 05/09 à Lenn / Damgan.

Remarquons pour la fin de la période, le chiffre conséquent estimé de 10 000 individus le 28/10 sur la Vilaine à hauteur de Muzillac et le dortoir de 7000 mouettes sur le Lac au Duc / Ploermel le 20/11.

Goéland cendré *Larus canus*

(16 données)

Au passage prénuptial, un dernier individu est contacté à Listrec / Locoal-Mendon le 16/03/2001.

Au retour, le premier individu est repéré le 10/08 sur l'île de Kerner / Riantec.

Surtout contactée en différents points du littoral est, l'espèce fournit toujours de faibles effectifs (de 1 à 4 oiseaux), sinon :

- 12 à Berder / Larmor-Baden le 30/08.
- à Sarzeau, 13 à Bénance et 13 à Kerbodec le 01/11.
- 15 à Lann er Groëz / Riantec le 14/11.

Goéland brun *Larus fuscus*

(31 données)

Le 21/04/2001, 35 individus sur un champ labouré à Penhoët / Grand-Champ.

Aucune donnée pour la reproduction dans notre département. Cependant, la dispersion juvénile est constatée à partir du 23/07 dans un groupe de 128 individus à Kerihuelo / Landaul. Notons aussi 1 juvénile quémendant après un adulte le 04/08 dans la Baie de Kerdréan / Baden et 3 autres juvéniles quémendant aussi après 4 adultes au lagunage d'Auray le 11/08.

Divers rassemblements en ria d'Etel : 109 en dortoir le 16 / 08 en rivière de Landévant, 400 en dortoir le 09/09 à Lannéguy / Saint-Hélène, 75 le 05/09 à Listrec / Locoal-Mendon et 86 le 02/11 en reposoir dans l'anse de l'Istrec / Locoal-Mendon. Pour l'intérieur, 46 individus au Lac au Duc / Ploermel le 20/11.

Comportement : 1 oiseau isolé ramasse en vol une anguille morte flottant sur le Blavet à Baud le 05/07.

[printemps 2001, 230 à 260 couples nicheurs dans la ville de Lorient¹]

Goéland argenté *Larus argentatus*

(25 données)

Dans les terres, un rassemblement de 100 individus noté à Penhoët / Grand-Champ le 21/04/2001.

Une unique donnée de nidification et en milieu urbain : un nid avec poussin(s) découvert le 06/06/2001 sur le toit du Lycée Colbert à Lorient.

Les rassemblements post-nuptiaux les plus importants sont trouvés sur la commune de Dangan :

- à Lenn uniquement, 2500 le 17/08, 2620 le lendemain,
- à Lenn et à La Tour des Anglais, 5000 le 20/08 et 6000 le 05/09.

[printemps 2001, 1960 à 2280 couples nicheurs dans la ville de Lorient¹]

Goéland leucophée *Larus cachinnans*

(3 données)

Les rassemblements estivaux sur la Loire en amont de Nantes (*Ar Vran* 12 – volume 2) pourraient faire espérer une fréquentation plus régulière de notre littoral, il n'en est rien :

- 1 nicheur (3 œufs) à la base des sous-marins de Lorient le 31/05/2001 (recensement Bretagne Vivante - SEPNEB).
- 1 individu suspecté (à moins d'un hybride G. argenté x G. brun) au Listrec / Locoal-Mendon le 05/09.
- 1 à Cantizac / Séné le 26/09.

[printemps 2001, un couple Leucophée x Argenté à Groix, 3 poussins ; Lorient, un couple Leucophée x Argenté, deux poussins élevés, un couple Leucophée x ?, 3 œufs ; Belle-Ile, un couple Leucophée x Brun¹]

Goéland marin *Larus marinus*

(14 données)

Deux données intéressent des juvéniles : 3 avec 12 adultes sur la plage de Kerminihy / Erdeven le 05/08/2001, un jour de mauvais temps, et 1 cadavre le 13/08 à Penhièvre / Saint-Pierre-Quiberon.

Les autres données concernent de 1 à 5 oiseaux observés sur le littoral, rarement plus à l'intérieur : 2 au lagunage d'Auray le 19/08.

[printemps 2001, 35 couples nicheurs dans la ville de Lorient¹]

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

(1 donnée)

Pas de date, ni d'effectif pour cette donnée concernant la Pointe de Penvins/Sarzeau ?

Sternidae sp.

(1 donnée)

Il s'agit de 200 sternes (naines, pierregarins et caugeks... mais dans quelle proportion ?) observées en vol et en reposoir à la pointe de Penvins / Sarzeau le 10/10/2001.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(49 données)

Aucune donnée en mars. Seulement 2 données d'avril et en provenance d'Hoëdic : 45 oiseaux à Treac'h Goured le 09/04/2001 et 10 le lendemain à Beg er Faut. Puis 4

données en mai avec un maximum de 13 sternes à Kerminihy / Erdeven le 07/05. Rien pour juin et juillet ?

Août débute avec 7 oiseaux (2 juvéniles) à La Roche Sèche / Erdeven le 01/08. Les observations sont ensuite très régulières au cours de ce mois avec des concentrations notables à Damgan : à Lenn, 230 le 13/08, 206 le 17/08 et 236 le 18/08 (10 % de jeunes à chaque fois), à Treutan, 150 le 25/08. L'ouest du département, avec surtout les sites de Pen Mané / Locmiquélic et La Roche Sèche/Erdeven, fournit des effectifs beaucoup plus faibles mais réguliers (maximum de 26 oiseaux – 10 juvéniles – le 12/08 à La Roche Sèche).

En septembre, c'est le littoral ouest qui récupère les plus gros effectifs avec 60 le 10/09 et 42 le 16/09 à La Roche Sèche / Erdeven.

Le passage diminue ensuite régulièrement pour finir par ne concerner que les hivernants potentiels : 22 en reposoir le 05/11 aux Saisies / Larmor-Plage, 10 sur la plage de L'Espérance et 11 à la pointe du Bil le 14/11 à Damgan, 3 dans l'anse de Plouhamel le 15/11.

Sterne de Dougall *Sterna dougalli*

(5 données)

4 données originales peuvent laisser penser à un bref stationnement post-nuptial d'oiseaux ailleurs que dans le golfe :

- fin juillet, l'espèce est contactée à Pen Mané / Locmiquélic avec 1 individu le 23/07/2001 puis 2 le 27/07.
- en août, la plage de Kérouriec / Erdeven fournit aussi 2 données d'individus allant et venant en pêche avec 2 le 12/08 et 3 (dont 1 juvénile) le 18/08.

Le site de Berder/Larmor-Baden ne fournit qu'une donnée : au moins 11 oiseaux le 30/08.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

(65 données)

En début de période, 1 à Listrec / Locoal-Mendon le 16/03/01, mais les premiers oiseaux étaient apparus début mars à Hoëdic (*Ar Vran Morbihan* n°22). Les arrivées semblent se faire surtout à partir de fin avril : 12 à Treutan / Damgan et 8 à Suscinio / Sarzeau le 30/04.

Maigres données de reproduction : une dizaine de nids occupés le 07/05 à Iniz er Mor / Saint-Hélène (aucun oiseau le 14/04) et 7 couples nicheurs au marais de Suscinio / Sarzeau le 27/05. Pas de pulli mentionnés.

In extenso les effectifs dépassant 20 individus au cours de la période : 25 à Pen Mané / Locmiquélic le 06/05 et 34 le 16/06, 25 à Lenn / Damgan le 18/08 et 36 à Treutan / Damgan le 27/08.

La dispersion juvénile est notée à partir du 23/07 avec 2 jeunes (6 adultes) à Pen Mané / Locmiquélic. Des groupes de juvéniles stationnent au barrage d'Arzal entre le 10/09 et le 23/10 : 18 le 18/09, 20-25 le 20/09, 10-15 les 22 et 23/10...

Le dernier individu (1 juvénile) est vu sur le canal de Nantes à Brest (commune ?) le 24/10.

Comportements : 1 sterne posée sur un appelant en plastique le 24/06 à l'Étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 2 harcèlent un Faucon hobereau *Falco subbuteo* à l'étang de Rhodes / Merlevenez le 02/07 et 1 pourchasse longuement et bruyamment un grisard à Pen Mané / Locmiquélic le 03/08 (kleptoparasitisme ?).

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

(2 données)

Au printemps, 2 Sternes arctiques sont observées à Pen Mané / Locmiquélic le 06/05/2001.

A l'automne, le 07/10, 1 sterne se pose quelques instants sur la plage de Kerminihy / Erdeven au cours d'une tempête.

Sterne naine *Sterna albifrons*

(10 données)

La première décade de mai fournit 3 données avec 1 à 2 oiseaux pour le littoral est (Sarzeau, Le Tour-du-Parc) à partir du 01/05/2001.

Les observations suivantes sont toutes d'août et concernent les communes de Damgan, Erdeven et Locmiquélic avec au minimum 3 individus à chaque fois. Notons les 12 oiseaux en migration à La Roche Sèche / Erdeven le 01/08, les 10 passant devant la plage de Kérouriec / Erdeven le 12/08, les 8 à Lenn / Damgan le 18/08 et les 10 au même endroit 2 jours plus tard. Les 4 dernières sont à Treutan / Damgan le 27/08.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus*

(3 données)

Ces 3 données concernent le passage post-nuptial et 1 seul juvénile à chaque fois : le 30/08/2001 à Kersahu / Gâvres, le 16/09 au Gouarde / Nostang et le 22/09 à l'étang du Cranic / Brec'h.

Guifette noire *Chlidonias niger*

(11 données)

Une seule donnée au passage prénuptial : 2 oiseaux à Pen Mané / Locmiquélic le 06/05/2001.

Le retour est noté du 19/08 (3 à Kervoyal / Damgan) au 24/10 (1 adulte à l'étang du Cranic / Brec'h).

En dehors des 8 oiseaux (6 adultes et 2 juvéniles) présents sur l'étang du Cranic/Brec'h le 31/08, les observations se font essentiellement à l'unité (Damgan, Ambon, Brec'h).

Hors littoral, on peut aussi citer 1 adulte à l'étang du Roc'h Du / Crac'h le 22/09.

Le passage est noté à Hoëdic avec 1 individu le 21/10.

Guillemot de Troïl *Uria aalge*

(4 données)

Au printemps, 3 cadavres propres sur la plage du Magouëro / Plouhinec le 19/05/2001.

En été, le port d'Etel fournit 2 données : 1 oiseau mort bagué British Museum de Londres y est trouvé le 21/07 et le 29/07, 1 guillemot vivant y est observé. 1 cadavre propre à Kervoyal / Damgan le 31/08.

Pingouin torda *Alca torda*

(2 données)

Seulement une donnée printanière avec 1 individu présent dans le port d'Etel le 30/05/2001. Et une seule donnée estivale : 1 adulte pêche devant la plage de Kerouriec / Erdeven le 28/08.

¹ Cadiou B. , Bretagne Vivante –SEPNB (2002). – Les oiseaux marins nicheurs de Bretagne – Région Bretagne

AR VRAN MORBIHAN N° 23

Groupe n°5 - Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick PHILIPPON

Pigeon colombin *Columba oenas*

(7 données)

Trois données de la carrière de Quinipily / Baud en mai et juin 2001, entre 1 et 3 individus. Le site de Coet Candec / Colpo, dans un château en ruines, est occupé cette année (1 individu le 21/04/01).

1 couple présente des comportements nicheurs (transport de brindilles) le 15/08 à Lann Plunelin / Plunelin. Pas de données pour les sites du château de Trédion, de Grégo / Surzur, de Ploeren, de La Guyondaie / Caro.

La migration post-nuptiale est notée le 22/08 à Pen Mané / Locmiquélic avec 5 individus en vol vers le nord, tandis que 1 oiseau est encore présent le 14/10 à Quinipily.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

(16 données)

Oiseau paraissant « de plus en plus abondant » dans le département.

Les observations lors des opérations du recensement Avifaune forestière (forêt de Camors, Pluvigner), apportent leurs lots de données . Migration de printemps avec 50 individus à Hoëdic le 10/04/2001 ?

Les regroupements après reproduction sont remarqués avec 62 individus à l'étang d'Er Varquez / Erdeven le 25/07 et 55 le 29/08 à Le Lannic / Locmiquélic. Simultanément, la reproduction se poursuit en août (1 œuf frais le 27/08 à Leslé / Plunelin) et septembre avec une ponte le 22/09 à La Ville Gleuhiel / Guégon.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

(3 données)

Présente à Houat le 09/04/2001et dans nombre de secteurs du Morbihan !

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

(35 données)

Les deux premiers chanteurs le 26/04/2001 à Kergal-Pasco en Languidic (soit 7 jours plus tard qu'en 2000), date à partir de laquelle l'espèce est notée en petit nombre (1 à 2 chanteurs) surtout sur le secteur littoral (Surzur, Ambon, Damgan) mais aussi dans l'intérieur (Quily) jusqu'au 30/04. A partir du 05/05, les observations concernent plusieurs individus entendus ensemble : 4 à Hoëdic le 05/05 et 6 le 06/05 ; passage au dessus des dunes à Erdeven le 06/05, Le Tour du Parc, Noyalo. En juin et juillet, l'espèce est notée partout (Ambon, Brandivy, Moréac, Remungol...).

La deuxième quinzaine d'août permet de noter des concentrations dès le 12/08 avec 8 individus ensemble à Quinipily / Baud, 13 le 28/08 à l'étang de la Forêt / Brandivy. La dernière est vue le 01/10 à Surzur.

Coucou geai *Clamator glandarius*

(1 donnée)

1 le 20/05/2001 à Questembert, l'espèce fait ainsi son entrée dans nos chroniques départementales.

Coucou gris *Cuculus canorus*

(27 données)

Si les 2 premiers chanteurs sont entendus le 15/03/2001 à Bodavel / Camors et le 19/03/ à Beg er Lann / Merlevenez, 13 données s'étalent sur les vingt premiers jours d'avril sur l'ensemble du département. 2 individus de phase rousse sont notés : 1 le 28/04 à Lann Rohan / Locoal Mendon et 1 femelle poursuivie par 2 mâles le 07/05 à Er Varquez / Erdeven. Enfin les derniers chanteurs sont notés le 13/06 à Fougues / Erdeven et le 17/06 à Kergal Pasco / Languidic.

Effraie des clochers *Tyto alba*

(11 données)

Notée à Languidic, Moréac (nidification, envol début août), Nostang, Remungol (1 nichée avec envol des jeunes début août). Deux données concernent des chocs contre véhicule pendant la période (Pontivy et Pluneret).

Chevêche d'Athéna *Athena noctua*

(7 données)

Les données s'étalent du 1^{er} avril au 4 novembre 2001. L'espèce est repérée au chant : courtes strophes le 01/04 à Saint-Thomin / Nostang, 1 le 30/06 à Le Roze / Queven, 1 le 25/08 à Kermoisan / Sarzeau et à Saint Déron / Ploemeur le 09/09, 1 chanteur au Grand Loc'h / Guidel le 04/11. Considérée comme nicheuse l'été 2000 par un agriculteur à Le Moustoir / Locoal-Mendon, elle est vue le 14/04/01 à cet endroit.

Chouette hulotte *Strix aluco*

(14 données)

Observée en forêt de Floranges / Camors pendant toute la période (recensement Avifaune forestière), chanteuse à Gestel (STOC EPS) le 23/05/2001, à Nostang, Moréac, Sainte-Hélène. La reproduction est confirmée avec des jeunes criant et volant à Kergorec et Kerléno en Moreac en juin et juillet.

Hibou moyen-duc *Asio otus*

(4 données)

Un chanteur en forêt de Floranges / Camors les 11 et 12/05/2001; 2 juvéniles volants le 16/06 à Kergoalan / Brec'h. Enfin 1 individu évite un filet le 21/10 à Hoëdic.

Hibou des marais *Asio flammeus*

(2 données)

Passage automnal noté à Hoëdic le 21/10/2001 (1 individu), même période qu'en 2000 ; 1 oiseau à Kerbresque / Remungol le 04/11 dans une jachère.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

(18 données)

3 individus chantent le 11/05/2001 en forêt de Floranges. Entre le 12 et le 28/05/, 11

données de chanteurs (entre 1 et 6 oiseaux) repérés sur les communes de Brec'h, Landévant, Locoal-Mendon, Merlevenez, Pont-Scorff, Sainte-Hélène, Sérent. Sur les sites autour de Vannes, ils apparaissent le 14/05/01. Les trois derniers chanteurs sont notés le 02/08 à Crucuno / Erdeven.

Martinet noir *Apus apus*

(34 données)

Les 2 plus précoces sont vus dès le 10/04/2001 à Losteno / Merlevenez. La première vague d'arrivée commence avec quelques-uns au dessus du bourg d'Etel les 13 et 14/04/2001. De même le 16/04 à Ambon, Damgan, Sarzeau, Vannes. Encore s'agit-il de petits groupes (1 à 6 voire 10 individus) de passage volant vers le nord ou l'est. Que ce soit à Vannes ou à Etel, l'espèce ne réapparaîtra qu'après le 26/04 ou le 05/05. 14 données entre le 17/04 et le 30/04 pour 12 sites prouvent l'arrivée massive de l'espèce avec 150 individus chassant au dessus de l'étang de Caden / Surzur le 30/04. A partir du 08/05, le martinet est bien présent en nombre sur ses sites de reproduction. Fidèles aux dates de départ, les dernières rondes sont constatées les 01 et 03/08 à Lorient et Vannes. Quelques observations en août : 1 le 11/08 au Pont Chaland / Muzillac ; 1 le 21/08/01 à Damgan ; dernière date connue : 10 le 25/08 à Damgan.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(88 données)

Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov
3	2	14	22	26	13	8

Observations de mai à novembre 2001

Les premières données datent de mai pour 1 individu vu à chaque fois sur les communes de Plumelec et Brandivy. Un deuxième site sur Plumelec est découvert en juin.

La nidification est trouvée à Rion en Languidic le 20/05/2001. Un oiseau transportant un poisson est accueilli bruyamment dans un buisson à l'étang de la Forêt / Brandivy le 26/05 ! En juillet, les étangs de Coët Rivas / Kervignac, du Cranic / Brec'h, de Saint-Jean / Locoal-Mendon, de Lannéac / Ploemeur, de Er Varquez / Erdeven ou le bord des cours d'eau (Leniotenn et Le Temple (sur le Blavet) en Quistinic, le Pont Chaland / Muzillac, les stations d'épuration de Plouharnel et de Crédin, le bassin de Pen Mané / Locmiquélic offrent le spectacle d'un individu. Par contre, à l'étang de la Forêt / Brandivy, le 09/07 et le 26/07, 3 à 5 oiseaux ont une activité intense avec des poursuites bruyantes.

L'erratisme post-nuptial est décelable à la mi-août quand de nouveaux sites accueillent l'espèce : le Gouarde / Nostang (1 le 16/08), Kerfaute / Plouhinec (1 le 14/08), 5 individus sont sur le Blavet à Lochrist le 29/08, île de Berder / Larmor Baden (2 le 30/08).

Les 26 observations de septembre traduisent la présence de 32 oiseaux en migration, répartis aussi bien dans l'intérieur du Morbihan que sur le littoral, tel celui traversant la route départementale Molac-Questembert (à hauteur de Molac) le 04/09 ou celui présent du 20 au 31/09 au barrage d'Arzal. En octobre, le flux migratoire tend à diminuer et les observations sont concentrées sur le littoral. En novembre, 12 oiseaux sont comptabilisés sur 8 sites.

Parmi les anecdotes, retenons le martin poursuivi par un épervier le 29/08/ à Lochrist ou celui pourchassé par un grisard le 06/11 au pont de Kérino / Vannes.

Guépier d'Europe *Merops apiaster*

(1 donnée)

Deux individus dont un avec de la nourriture dans le bec le 05/07/2001 au bourg d'Evriguet.

Huppe fasciée *Upupa epops*

(12 données)

Première observation le 26/03/2001 à Ruffiac puis 2 données d'avril d'un individu à chaque fois : le 01/04 dans les dunes d'Erdeven et le 23/04 à Crano / Languidic. Les 5 oiseaux observés en mai sur 3 sites (Hoëdic, Languidic, Sérent) sont probablement des migrateurs. Des jeunes sont vus au Gouarde / Nostang le 26/06 qui laissent entrevoir une reproduction locale. Dernière observation le 28/08 à Kersahu / Gâvres, un individu.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

(2 données)

Deux observations de la migration post-nuptiale : 1 individu le 10/08/2001 à Saint Déron / Ploemeur et 1 le 21/10 à Hoëdic.

Pic cendré *Picus canu*

(0 donnée)

Pic vert *Picus viridis*

(7 données)

Contacté sur toute la période sur l'ensemble du département (Ambon, Camors, Moréac, Sarzeau) et dans les opérations Avifaune forestière .

Pic noir *Dryocopus martius*

(27 données)

Cinq données en mars : bois départemental de Kéraveon / Erdeven, 3 en forêt de Camors et en forêt de Floranges le 25/03/2001, à Squivit / Brandérion le 28/03.

Quatre données en avril à Languidic (Kergurune et Kergauz), Plumelec, Sainte-Hélène .

Neuf données sur 6 sites (forêt de Floranges / Camors, forêt de Branquily / Gueltas, Mané er Velin / Landaul, la Croix Balais / Sérent, le Gouarde / Nostang, étang de Saint Jean / Locoal Mendon) sur les trois mois de mai à juillet 2001.

A partir d'août et jusqu'en décembre, l'erratisme d'automne est perceptible sur Languidic (le 03/08 à Kerassio et le 18/09 à Kergal-Pasco), à l'étang du Cranic / Brec'h le 22/08, dans le bois de Quinipily / Baud le 24/08, sur le littoral : l'île de Berder / Larmor Baden (le 12/10) et le marais du Duer / Sarzeau (le 26/10).

Pic épeiche *Dendrocopos major*

(17 données)

Il est noté nicheur à Chouan / Grandchamp, au Moulin de la Forêt / Brandivy, en plusieurs endroits des communes de Camors, Merlevenez, Moréac, Nostang, Ploemeur...

Pic mar *Dendrocopos medius*

(2 donnée)

Noté en forêt de Pontcallek / Berné le 02/04/2001, 2 individus, un chant à la Forge-Neuve / Sainte-Brigitte le 18/04.

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

(6 données)

Cinq dormées d'avril : Grand-Champ, Languidic, Locoal Mendon, Moréac (2 sites).
1 le 28/09/2001 au Moustoir / Arradon.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(1 donnée)

1 le 16/03/2001 au port de commerce de Lorient.

Alouette lulu *Lullula arborea*

(12 données)

Les chanteurs d'avril et mai sont principalement rencontrés sur les communes de Camors, Guégon, Locoal-Mendon, Moréac, Plumelec. Notée en octobre à Auray, Baden, Les Forges....

Un mouvement ou un regroupement migratoire est décelé le 11/11/2001 avec 8 individus ensemble dans des chaumes à Stungrenn / Moréac.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

(15 données)

Les chanteurs sont notés à Houat, Camors, Damgan, Gâvres, Moréac, Plumelin, Remungol.

L'hivernage est noté à Moréac, Plumelin et Remungol où plusieurs bandes de 80 à 100 individus sont observées entre le 04 et le 11/11/2001.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

(36 données)

Les toutes premières sont notées le 03/03/2001 à Lorient, soit 14 jours plus tôt qu'en 2000. Pendant la première quinzaine de mars on en note 10 le 10/03 à l'étang de Coët Rivas / Kervignac, 1 à Nostang le 14/03. A compter du 28/03, les arrivées sont plus nettes : 50 le 28/03 à l'étang de Coët Rivas / Kervignac, 45 le même jour à Pen Mané / Locmiquélic et 20 sur le lagunage de Merlevenez. A l'intérieur des terres, c'est à partir du 01/04 que l'espèce est remarquée (Quinipily / Baud). La migration se poursuit en avril (50 le 23/04 à Crucuno / Erdeven, 50 au Pont Caden / Surzur le 30/04) tandis que la colonie de la carrière de Quinipily / Baud s'installe : 80 nids le 16/04, 334 le 27/05 .. Plouhinec rassemble 2 colonies : 1 de 16 nids à Kerzine et 1 de 30 cavités au Magouëro (30/05). 4 à 5 cavités occupées le 18/06 à Le Verdon / Mendon. En juin, des individus cherchent à s'installer (6 couples le 03/06 à Tréhervé / Ambon en falaise de bord de mer) alors que la colonie de Quinipily est détruite par l'exploitant le 10/06 (voir Ar Vran Morbihan n°21). Notons la colonie rue de la Motte à Pontivy comme en 2000 : environ 12 couples y ont trouvé refuge à 4 mètres de hauteur dans un mur en terre et pierre.(observations du 25/05).

La saison se poursuit avec l'observation de 50 nids à Kersahu / Gâvres le 16/06 dans le

soubassement d'un bâtiment démolí (détruits parla suite), 38 nids dans une falaise au Fort Bloqué en Guidel le 30/07, 188 nids dans la berge d'un bassin de décantation de boues à Quillan / Réguiny le 31/07 où 5 nids sont encore ravitaillés le 04/09.

Un passage migratoire est noté après le 20/08 : 10 groupes de 20-40 individus en 1h30 de guet à la mer à Fétan Léreg / Erdeven le 21/08 et plus de 100 le 26/08 à Kersahu / Gâvres. Pas de données en septembre et début octobre.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

(43 données)

Du 22 au 25/03/2001, 9 données concernant l'observation d'un ou deux individus à Ambon, Damgan, Landévant, Languidic, Locoal-Mendon, Lorient, Nostang et Vannes. A noter 10 ensemble autour de l'église de Keryado / Lorient le 23/03. Du 27/03 au 06/04 les premiers groupes de 3-4 individus arrivent et sont notés sur Auray et Camors.

A partir du 10/04 et pendant tout le mois, la migration s'intensifie sur tout le département : 20 le 10/04 à Hoëdic, 10 le 15/04 à Plumelec, plus de 100 le 30/04 à l'étang de Caden / Surzur. Le 27/06, à l'étang de la Forêt / Brandivy, des juvéniles chassent avec des adultes, prouvant la nidification. A Kergorec / Moréac, 4 couples produisent 9 nichées à l'envol, l'un à trois pontes, les autres deux chacun. Les premiers envols ont lieu entre le 04 et le 10/06, les derniers après le 09/09.

Les déplacements migratoires post-nuptiaux commencent dès le 21/08 avec plus de 500 individus comptés en 1h30 à Fétan Léreg / Erdeven tandis que les dernières sont vues à Languidic le 26/09. Le brouillard bloque 450 oiseaux dans un jardin le 21/09 au matin à la Ville Gleuhiel / Guégon; elles partent plein sud dès le soleil revenu. 20 à Saint Gérard le 22/09. 2 données d'octobre concernant 1 individu : Séné le 10/10 et le 06/10 à Guégon dans la vallée du Sedon. Dernière donnée : 2 à Hoëdic le 21/10.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

(25 données)

Les deux premières sont observées le 16/04/2001 à Ambon et Sarzeau. Dès le 27/04, quelques individus isolés sont vus à Pontivy, Locminé puis le 30/04 correspond à une arrivée plus importante puisque 50 sont à l'étang de Pont-Caden / Surzur et 6 dans le bourg d'Ambon. Nicheuse à partir de mai 2001 dans les centres de Kervignac, Languidic, Nostang, Ploemeur, Ploërmel, Plouay, Theix, Vannes... Dernier nourrissage observé le 12/09 à Landévant.

Migration post-nuptiale d'une centaine d'individus le 21/08 à Fétan Léreg / Erdeven et de 70 au moulin de Pomper / Baden le 18/09.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

(9 données)

Une donnée précoce d'un individu au chant incomplet le 28/03/2001 à Ty Rhu / Locoal-Mendon. A compter du 05/04, 1 individu à La Croix Ballais / Sérent, puis en mai l'espèce s'installe sur ses sites (Sérent, Quily, Camors, Campénéac, Theix). Le 01/05, 1 chanteur sur l'île d'Hoëdic traduit la poursuite de la migration.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

(12 données)

Des chanteurs sont repérés en mars et avril : 1 le 18/03/2001 à Kersahu / Gâvres et

plusieurs le 09/04 sur l'île de Houat. Dès le 17/10 un dortoir près de la tourbière de Kerfontaine / Sérent rassemble 250 individus alors que « les premiers grands groupes » sont notés le 21/10 (120 individus) à Boterel en Moréac.

Pipit maritime *Anthus petrosus*

(4 données)

Données de printemps uniquement : un couple niche à Pénerf / Damgan, 1 autre nourrit le 30/04 à Ambon et 1 parade le 18/05 au port de pêche de Lorient.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

(0 donnée)

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

(28 données)

Sa présence (mâles et couples) est notée en avril (8 données) sur les secteurs d'Ambon, Erdeven (Fetan Lereg, Kerminihy), Gâvres (Kersahu) correspondant au passage migratoire. Ces observations se poursuivent en mai et juin sur les mêmes sites. A noter que d'autres sites (les réserves de Séné et Larmor Baden, Damgan et l'ensemble des sites littoraux) ne fournissent pas de données. Les juvéniles sont vus fin juillet-début août à Fétan Lereg / Erdeven.

L'erratisme post-nuptial est repéré à Bétahon / Ambon le 29/08/01 avec 10 individus. La migration est notée ponctuellement, (5 données entre septembre et octobre avec 20 individus dans une pâture à Larmor / Damgan le 09/09 et 3 le 21/10 à Hoëdic).

Bergeronnette flavéole *Motacilla flavissima*

(0 donnée)

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

(45 données)

De nouveaux sites, accueillant l'espèce (en tant que nicheur ou en migration) sont répertoriés : La Chapelle Neuve, Le Faouët, Berné, Pluvigner, Languidic, Campénéac, Plouhinec en avril et mai 2001, s'ajoutant aux autres sites connus comme le centre ville de Vannes sur la Marle. Sa nidification est prouvée dans des sites classiques comme le moulin d'Estaing / Sainte-Anne d'Auray, moulin de Bodery / Languidic, barrage de Boternau / Bubry, barrage de Saint-Adrien / Saint-Barthélémy), dans les stations d'épuration (Varquez Ronval / Plouharnel, Colles / Locmaria-Grandchamp, soupçonné à la station de Bonnervo / Theix, à Kergourio / Crédin et sur le Blavet (Kerfos / Barthélémy, Le Guern / Baud, la Couarde / Bieuzy les Eaux).

La migration s'observe d'août à octobre, à raison d'1 à 3 individus observés par site, principalement sur le littoral (1 le 30/08 au port de Pénerf / Damgan, 3 à Pen Mané / Locmiquélic le 27/10) et les étangs de Baden, Brandivy, Brec'h, Crac'h, Neuillac, Noyal Pontivy, Plouharnel, Saint-Gérard, y compris en novembre. Le 21/10, 1 individu est vu à Hoëdic.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

(31 données)

L'espèce est notée sur l'ensemble du département pendant la période, aussi bien près de l'eau que dans des secteurs plus terrestres. Le dortoir de Vannes (à l'hôpital) compte

déjà plus de 200 individus le 09/10/2001 puis 350 le 13/10 pour disparaître le 21/10. Il est retrouvé en centre ville le 25/10 avec plus de 700 individus pour disparaître à nouveau le 4/11. Regroupement dans la journée d'individus comme à la station d'épuration de Plouharnel (32 le 11/11).

Bergeronnette grise de Yarell *Motacilla alba*

(6 données)

Observée principalement sur la zone littorale, avec un maximum de 35 individus au dortoir de Vannes le 13/10/2001.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

(8 données)

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

(12 données)

Couple nourrissant le 04/04/2001 à Ty Rhu / Locoal-Mendon.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula*

(13 données).

Rossignol philomène *Luscinia megarhynchos*

(1 donnée)

1 à Séné le 28/05/2001 dans l'anse de Mancel (au même endroit le 25/05/00).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

(21 données)

Le premier chanteur est à Kersahu / Gâvres le 18/03/2001 (soit 5 jours plus tôt qu'en 2000), suivi d'un second le 24/03. Les observations du 25/03 à Fetan Léreg / Erdeven et Pen Mané / Locmiquélic confirment les premières arrivées. Ce n'est qu'à partir du 16/04 que les données de plusieurs mâles chanteurs s'accumulent à Fetan Léreg / Erdeven, au Moteno / Plouhinec, à Suscinio / Sarzeau.

La nidification est prouvée le 22/06 à Pen Mané / Locmiquélic avec une femelle donnant la becquée, tandis qu'un juvénile indépendant est observé le 04/08/ à Pont Chaland / Muzillac.

Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus*

(1 donnée)

1 le 25/07/2001 à Er Varquez / Erdeven. (cf s Ar Vran Vol 13 n°1 Juin 2002).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

(16 données)

10 données proviennent principalement de la carrière de Quinipily / Baud où un couple et un mâle célibataire sont présents. Noté surtout dans les centres villes (Josselin, Ploermel, Pontivy, Vannes) et les bourgs Etel, Sarzeau, Sérent, Tréhorenteuc.

La migration est notée sur Hoëdic le 20/10 avec 20 individus ensemble.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (1 donnée)

Migration de printemps: aucune donnée. Migration post nuptiale: 4 le 21/10/2001 à Hoëdic.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (7 données)

Comme chaque année, le passage post-nuptial se fait sentir fin août sur la rivière de Pénerf (Damgan, Ambon), à raison d'1 ou 2 individus ensemble du 23 au 28/08/2001. 4 sont vus le 24/09/01 à Kerpuncé / Locoal-Mendon.. Deux données en octobre : 1 le 17/10 à Pen Mané / Locmiquélic et 2 le 21/10 à Hoëdic.

Tarier pâle *Saxicola torquata* (12 données)

L'espèce semble bien répartie sur l'ensemble du département en nombre plus ou moins important suivant les sites. La reproduction est remarquée à Arzal, Ambon, Erdeven, Landévant, Languidic, Nostang, Sarzeau, Surzur. 1 individu de la forme orientale est vu le 20/10/2001 à Hoëdic.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (43 données)

L'espèce est autant notée lors du passage au printemps (20 données entre les 18/03 et 12/05/2001) qu'à l'automne (23 données).

La remontée de printemps est abondante : 20 données entre le 18/03/2001 – date du premier observé à Kersahu / Gâvres - et le 12/05.

Les premiers arrivent dans la seconde décade de mars avec un individu le 18/03 puis 5 individus le 24/03 à Kersahu / Gâvres et 3 le même jour dans les dunes d'Erdeven.. En avril, les données concernent 1 à 3 individus ensemble sur les secteurs de Damgan, Erdeven, Houat, Pont-Scorff . En mai, le passage est à son maximum pendant la première dizaine du mois : 8 le 01/05 et 14 le 05/05 à Hoëdic ; 14 dans les dunes de Plouharnel le 05/05, un groupe de 37 et un autre de 12 le 07/05 à Kerouriec et Kerminihy / Erdeven et enfin 17 le 12/05 sur 2000 m dans les dunes de Kervran-Kerzine / Plouhinec.

La migration post-nuptiale est abondante, fournissant 14 données sur 12 sites en août, 3 observations en septembre et 6 en octobre. Dès le 10/08 , 8 oiseaux (femelles ou immatures) sont présents à l'île de Kerner / Riantec et 3 à Kergal Pasco / Languidic. Un flux continu s'établit de 1 à 3 oiseaux par observation jusqu'au 25/08 sur les secteurs de Ambon, Damgan, Gâvres. Du 25/08 au 02/09 , plus de 45 oiseaux sont observés : 9 le 25/08 à Treutan / Damgan, 12 à Locmiquélic sur 2 sites (Le Lannic et Pen Mané) ; 10 le 30/08 sur les dunes de Kervran-Kerzine / Plouhinec et 9 le 02/09 à Kerminihy / Erdeven. En septembre, les données proviennent de Ambon et Surzur (1 individu à chaque fois). Du 12 au 24/10, 1 à 2 individus sont notés à Gâvres (1 le 12/10), à Pen Mané / Locmiquélic (2 du 17 au 20/10), à Hoëdic (2 le 21/10), à Kergollaire / Languidic (2 le 23/10). Le dernier est vu le 24/10 au gué de Boéd / Séné.

Merle noir *Turdus merula* (10 données)

Un nid avec œufs le 25/03/2001 à Kermadec / Remungol.

Grive litorne *Turdus pilaris*

(6 données)

Migration pré-nuptiale : 1 le 28/03/2001 à Kerminihy / Erdeven.

Migration post-nuptiale : les premiers groupes sont vus à Languidic (Kergurune et Kergal-Pasco) le 04/11. Notée en petit nombre (1 à 3 individus) entre le 11 et le 15/11 dans l'est du département (Guégon, Campénéac).

Grive musicienne *Turdus philomelos*

(6 données)

Passage nocturne entendu du 07 au 13/10/2001 à Vannes. Plusieurs en vol le 13/10 au dessus de l'île de Berder / Larmor Baden. Les sorties Avifaune forestière permettent de la noter dans tous les massifs.

Grive mauvis *Turdus iliacus*

(7 données)

10 le 19/03/2001 à la Ville Gleuhiel / Guégon et 1 encore présente le 10/04 à Hoëdic. Passage détecté dès le 11/10 le soir à Vannes. Un groupe de 120 se nourrit dans une pâture à Campénéac le 15/11.

Grive draine *Turdus viscivorus*

(9 données)

1 couple nourrit le 27/04/2001 dans le parc de Ménimur à Vannes. De même, un nid avec 3 jeunes est repéré en avril à Saint-Martin sur Oust. A compter du 21/06 (8 ensemble à le Gouarde / Nostang) et pendant toute la période, des regroupements d'oiseaux sont régulièrement vus : 15 le 05/08 à La Faisanderie / Brandérion, 18 le 16/08 à le Gouarde / Nostang, 21 le 02/09 à Kergorec / Moréac.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

(49 données)

Un farouche admirateur de cette fauvette nous fournit, à lui seul, 32 données soit plus de 65% des observations de la période et sur 11 sites. Espèce entendue toute l'année dans les milieux favorables : Ambon, Brandivy (étang de la Forêt en mai, juin, juillet, octobre), Brec'h (étang du Cranic), Erdeven (à Fétan Léreg, er Varquez), Gâvres, Le Cours (sur l'Arz), Le Tour du Parc (étiers et marais), Sarzeau (Suscinio), Surzur (étang du Pont Caden), les 2 mâles chantant au lagunage de Brandérion le 25/04, les 64 chanteurs le 10/04 et 65 le 11/04 sur l'île d'Hoëdic.

A partir d'août et pendant l'automne, l'espèce est entendue sur des sites différents : station de lagunage de Plouharnel, le gué de Bouéd en Séné,...

Cisticole des joncs *Cisticola jundicis*

(50 données)

18 données entre le 18/03 et le 30/06 concernant un ou plusieurs chanteurs entendus à Ambon, Erdeven, Kersahu / Gâvres, Locmiquélic (Pen Mané), Plouharnel (Sainte Barbe et les Quatres Chemins), Hoëdic, Locoal-Mendon, Le Tour du Parc, Sainte Hélène, Sarzeau. Nidification notée dans le marais de Tréhervé avec 2 couples.

15 observations en juillet d'un individu par site à Brec'h (Champ des martyrs), Erdeven (Kerourin, Fétan Léreg, étang de Kéraveon, Fougues), Gâvres (26 individus à Kersahu soit 2,6 chanteurs pour 10 ha), Guidel (étang du Loc'h), Locmiquélic (Pen Mané),

Locoal-Mendon (étang de Saint Jean), Merlevenez (étang de Rodes), Ploemel (Corn er Houët), Ploemeur (étang de Lannéc), Plouharnel (station d'épuration).

En août, les mêmes sites sont occupés auxquels s'ajoutent : 1 chanteur détecté seulement fin juillet à Ty Rhu / Locoal-Mendon, 6 individus (dont 1 transporte de la nourriture) à Listoir / Landévant, 4 à Mané er Hoët / Merlevenez.

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

(4 données)

2 chanteurs le 12/04/2001 à Fougues / Erdeven. Le secteur de Pinieux et de la tourbière de Kerfontaine en Sérent fournissent respectivement 2 écoutes : 1 le 25/05 sur le et 1 le 12/06. Enfin, 1 individu chasse sur le chemin de halage du Blavet à Gueltas / Pluméliau.

Locustelle luscinioides *Locustella luscinioides*

(5 données)

Observations comprises entre le 08 et le 18/04/2001 sur les sites de La Falaise / Erdeven (1 le 08/04/01), Kersahu / Gâvres (3 le 16/04/01), l'étang de Saint Jean / Locoal-Mendon (où plusieurs chanteurs sont contactés entre le 12 et le 18/04/01). 2 chants le 22/06 puis 1 chanteur le 01/07 à Pen Mané / Locmiquelic.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

(23 données)

3 chanteurs sont déjà à Kersahu / Gâvres le 18/03/2001, (pour mémoire en 2000, le 08 et 09/04). A partir du 12/04, les arrivées sont franches : de 2 à 6 oiseaux par site surtout à Erdeven (Kerminihy, Fétan Léreg, Fougues), Sarzeau (Suscini) et Surzur. En mai, juin et juillet, les mêmes sites sont occupés, plus la station d'épuration de Plouharnel. Dernière observation le 21/10 dans le marais nord de l'île d'Hoëdic avec 3 individus.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

(19 données)

Les premiers sont entendus dans la seconde quinzaine d'avril : le 16/04/2001 sur Suscini / Sarzeau et Pont Caden / Surzur et plusieurs le 18/04 à l'étang de Saint Jean / Locoal-Mendon. La Rousserolle est entendue pendant toute la période sur les sites suivants : Tréhervé / Ambon, étang du Cranic / Brec'h, Fétan Léreg / Erdeven, le Petit Loc'h / Guidel, Pen Mané / Locmiquelic (où un nourrissage est observé le 01/07), la station d'épuration de Plouharnel, l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon. Dernière observation le 21/10 dans le marais nord de l'île d'Hoëdic avec 30 individus.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*

(18 données)

2 chanteurs précoces le 10/04/2001 à Hoëdic. Sur le continent, il faut attendre le 12/05 pour entendre le premier individu à Bodavel / Camors. Puis, par petites touches, les hypolaïs arrivent : 1 le 19/05 à Ty Rhu / Locoal-Mendon (site connu en 2000), non entendue les jours suivants ; 1 le 22/05 au lagunage de Brandérion, 1 le 25/05 à Kergal Pasco / Languidic et 2 chanteurs le 27/05 à La Boschinaie / Guer. Toutes les données de juin et juillet proviennent des sites intérieurs : Le Guern / Baud, la déchetterie de Belz, la forêt de Lanouée, une friche à la Villeneuve / Pontivy, enfin les derniers chanteurs sont à Kergorec, Kermen, Kernevenin en Moréac les 14 et 15/07/01.

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

(8 données)

Notée uniquement de mai à août dans les endroits suivants : déchetterie de Belz, Kerpenru et forêt de Floranges en Camors, dans les Landes Rennaises en Campénéac, à l'étang de Kéraveon / Erdeven, à Kermerrien / Guidel et en forêt de Lanouée.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

(1 donnée)

2 le 21/10/2001 dans le marais sud d'Hoëdic.

Fauvette grisette *Sylvia communis*

(16 données)

Une première date d'arrivée le 24/03/2001 à Kersahu / Gâvres. Tout le mois d'avril et début mai (20 chanteurs le 01/05 à Hoëdic), les Grisettes arrivent, trainant en ville (1 mâle le 23/04 au centre ville de Ploërmel) ou s'empresant de construire leur nid (transport de brindilles le 12/04 à Fougues / Erdeven).

La nidification a lieu en mai au Gallion / Plouharnel et l'oiseau est vu à Damgan (13/08/01), Erdeven, Plouhinec.

Dernière observation de 3 individus le 21/10 dans un roncier au nord de l'île d'Hoëdic.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

(10 données)

Arrivées constatées entre le 16/04/2001 (Suscinio / Sarzeau) et le 29/04 (Grand-Champ, Languidic Plumelec, Quily). 5 chanteurs sont contactés le 08/05 sur 250 mètres en forêt de Floranges / Camors. Dernière observation de 8 individus le 21/10 dans le bois d'Hoëdic.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

(13 données)

Bien implantée dans tous les secteurs du département, migration remarquée le 21/10/2001 à Hoëdic avec plusieurs dizaines.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

(1 donnée)

3 le 20/05/2001 à Coët Fournio / Baud.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

(8 données)

Les contacts auditifs s'intensifient à partir du 15/03/2001. A noter 8 chanteurs sur 800 m le 01/07 à Kernevenin / Moréac.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

(6 données)

Peu de données sur la migration de printemps. Le premier contact concerne un chanteur le 06/04/2001 à Kergal Pasco / Languidic. 1 individu est présent à Hoëdic le 10/04. En mai, 2 individus recensés à Locoal-Mendon et Landaoul le 04/05/01.

1 seule donnée pour la migration post nuptiale : 1 le 13/08 au Lenn / Damgan.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

(8 données)

Présent à Camors, Guégon, Hoëdic, Moréac, Plumelin pendant la période. A noter 10 chanteurs sur 1 kilomètre en forêt de Camors le 23/05/2001 et 10 individus sur Hoëdic le 21/10.

Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus*

(3 données)

Plusieurs dizaines le 21/10/2001 à Hoëdic.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

(16 données)

Des couples nourrissant sont observés en juillet et jusqu'au 17/08/2001 à la Faisanderie / Brandérion, Ty Rhu / Locoal-Mendon, Boterel / Moréac, Kerogard / Remungol, dans le parc de Ménimur / Vannes. Cependant, ces observations ne signifient pas obligatoirement une nidification à l'endroit de l'observation. A Kergorec / Moréac, des jeunes au nid le 14/07 seront victimes d'une prédation à l'envol.

L'erratismo post-nuptial est noté dès le 02/08 au Lac au Duc / Ploërmel avec 5 individus sur 5 kilomètres puis la migration s'installe à partir du 23/08 (5 au Guenegelo / Damgan), 4 en deux lieux-dits différents de Damgan le 27/08, se poursuit en septembre (3 le 20/09 à l'étang du Roze / Neuillac) et octobre (1 le 13/10 dans le parc de Ménimur / Vannes).

Gobemouche nain *Ficedula parva*

(1 donnée)

2 individus ont séjourné sur Hoëdic le 19/10/2001.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

(9 données)

Migration postnuptiale : 5 individus (couple et 3 jeunes) du 17 au 23/08/2001 à la Faisanderie / Brandérion. Les observations sont ensuite concentrées sur un mois (du 20/08 au 29/09/01) avec un maximum de 10 individus ensemble le 05/09 à Goeven / Languidic.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

(3 données)

5 les 12 et 18/04/2001 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon. Une donnée concerne 2 adultes le 22/06 à Pen Mané / Locmiquélic.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

(7 données)

Des familles sont vues à Beignon, Guégon, Muzillac. Espèce observée lors du recensement Avifaune forestière.

Mésange nonnette *Parus palustris*

(4 données)

5 ensemble le 25/03/2001 à Locoal-Camors / Camors et 3 le même jour au moulin de Coët Digo / Guégon. Espèce observée lors du recensement avifaune forestière.

Mésange huppée *Parus cristatus*

(6 données)

Niche à Vannes dans le parc de Ménimur le 13/07/2001. Espèce observée lors du recensement Avifaune forestière.

Mésange noire *Parus ater*

(6 données)

A Kervrenn / Plumelin et à Kermadec / Remungol, la petite Noire chante le 25/03/2001; une congénère est entendu le 01/04 à Kermeno / Moréac. En dispersion automnale, 2 individus sont vus dans un jardin vannetais le 01/11.

Mésange bleue *Parus caeruleus* (8 données) ; **Mésange charbonnière *Parus major*** (10 données) ; **Sittelle torchepot *Sitta europea*** (7 données) ; **Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*** (1 donnée.)

Toutes ces espèces ont été observées lors du recensement Avifaune forestière.

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

(13 données)

Espèce observée lors du recensement Avifaune forestière, présente sur tout le département.

Pie bavarde *Pica pica*

(1 donnée)

Choucas des tours *Corvus monedula*

(5 données)

90 au moins le 11/05/2001 dans un labour à Kerlain Bastard / Ploemeur, sur labours avec Rieuses, étourneaux et corneilles ; c'est la quasi-totalité de la population du bourg de Ploemeur qui s'en trouve déserté au même temps. Des déplacements automnaux : 1 le 21/10 au bourg d'Hoëdic, 1 le 21/11 à la Ville Gleuhiel / Guégon.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

(3 données)

Toutes les données concernent l'erratisme post-nuptial : plusieurs le 04/08/2001 à Prière / Beignon (nombre non précisé), 1 le 13/10 au Pont Chaland / Muzillac et 3 au bourg de Guégon le 18/11.

Corneille noire *Corvus corone*

(21 données)

- 26 se rassemblent au crépuscule le 10/04/2001 autour du Vieux Fort à Hoëdic.
- 180 le 21/04 à Penhouet / Grand-Champ.
- le 29/10, 57 à Pen Pradic / La Chapelle Neuve dans un champ de maïs.
- le 31/10 à Sterbouest / Locmiquelic 185 sont sur la vasière du Blavet.
- enfin 285 le 09/12 route de Guipry en baie de Vilaine.
- le suivi d'un regroupement sur un champ de semis de pommes de terre donne les résultats suivants :

28/05	08/06	12/06	21/06	25/06	29/06
33	107	61	29	42	50

Corneille noire, rassemblements à Tremeler / Neuillac (Morbihan) ; printemps 2001

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (8 données)

La reproduction est notée à Kergorec / Moréac : sur 10 nichées, 5 dans des cavités bâtiments, 5 dans des trous d'arbres le 01/05/2001. Les secondes nichées sont observées les 04 et 10/06. Les regroupements commencent fin juillet avec 155 oiseaux à Fetan Léreg / Erdeven le 25/07 et plusieurs milliers le 31/07 en dortoir au Pont Chaland / Muzillac.

Moineau domestique *Passer domesticus* (2 données)

Plus de 100 en dortoir à Kergorec / Moreac le 02/09/2001.

Moineau friquet *Passer montanus* (2 données)

A Kergorec / Moréac, 1 couple élève 2 nichées : une dont les jeunes sont volants le 28/07/2001 et une autre nichée dans la même cavité avec envol le 06/09/01.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* (9 données)

Seul regroupement constaté : 35 le 29/10/2001 dans un champ de maïs à Bodavel / Camors. Espèce observée lors du recensement Avifaune forestière, présente sur tout le département.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* (7 données)

Le premier est vu à Hoëdic le 21/10/2001. L'arrivée des pinsons est bien enregistrée sur les sites de Bodavel et Kerpenru / Camors où dès le 29/10 5 individus sont en compagnie de fringilles dans un champ. Le 03/11, plus de 10 sont sur ces sites. Espèce observée lors du recensement Avifaune forestière.

Serin cini *Serinus serinus* (8 données)

Présent pendant toute la période sur les communes de Ambon, Camors, Erdeven, Houat, Hoëdic, Neuillac, Sarzeau, Vannes.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (6 données)

Les groupes sont observés à partir d'octobre : 250 le 08/10/2001 à la pointe de Penvins / Sarzeau, 50 le 17/10 à Pen Mané / Locmiquelic et 63 le 29/10 à Bodavel / Camors. Espèce observée lors du recensement Avifaune forestière, présente sur tout le département.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

(9 données)

A Bodavel / Camors, 1 couple niche à 1,80 mètre de hauteur dans un *Forsythia* isolé, à 2 mètres de l'entrée d'une maison. Assez indifférent aux va-et-vient. Ponte : 3 oeufs. Eclosion le 28 ou 29/06/2001, envol des 3 jeunes le 10/07.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

(2 données)

Des dizaines en migration à Hoëdic le 21/10/2001 et 10 en vol le 09/11 à Ménimur / Vannes.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

(6 données)

80 le 10/04/2001 dans les landes de Porz Guern à Hoëdic. Notée lors du recensement de l'Avifaune forestière.

Bec croisé des sapins *Loxia curvirostra*

(3 données)

1 en forêt de Floranges / Camors le 20/05/2001 ; 2 le 18/09 à Saint Guyomard à les Bolans-tourbière et 9 individus ensemble le 09/12 en forêt de Floranges / Camors lors de l'opération Avifaune forestière.

Roselin cramois *Carpodacus erythrinus*

(1 donnée)

1 le 21/10/2001 au marais nord d'Hoëdic.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

(20 données)

Individu isolé, en couple ou en famille, le bouvreuil est présent à Baud, Berné, Brandivy, Camors, Erdeven, Kervignac, Larmor Plage, Locoal-Mendon, Moréac.

Gros bec casse noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

(2 données)

1 le 02/04/2001 en forêt de Pontcallek / Berné.

Observé en forêt de Camors le 09/12 lors de l'opération Avifaune forestière.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

(10 données)

Nicheur le 17/05/2001 à Kergollaire / Languidic (nid et coquilles d'œuf). Le suivi d'un secteur, en juin et juillet 2001 à Kermeno / Moréac, apporte 6 chanteurs installés sur le pourtour d'une jachère comprenant 750 m de talus, et 23 chanteurs repérés sur la zone prospectée, alors que sur un autre site de la commune (Kermel), à la même période, 5 chanteurs sont présents dont 4 recensés sur 350 m de chemin. Chanteurs en pourtour de la forêt de Floranges.

Bruant zizi *Emberiza cirrus*

(11 données)

L'espèce est recensée sur les communes de Camors, Erdeven, Landaul, Languidic,

Locmiquélic, Merlevenez, Nostang.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (28 données)

L'espèce est bien observée pendant toute la période sans que nous puissions déceler de passage prénuptial marqué : ainsi 3 mâles sont vus le 08/04/2001 à Fétan Léreg / Erdeven (1 femelle sera vue le 08/06 au même endroit avec les 3 mâles) alors qu'aucun oiseau n'est compté sur Hoëdic le 10/04 et qu'un mâle chanteur est le 25/04 sur le lagunage de Brandérion. Ce bruant est repéré sur le secteur côtier (Ambon, Damgan, Erdeven, Locmiquélic, Merlevenez, Muzillac, Plouhinec, Sarzeau) mais aussi dans l'intérieur (Quistinic avec 2 sites au bord du Blavet, Brec'h, Brandivy à l'étang de la Forêt, Le Cours au bord de l'Arz, Guégon à la base du Rouvray).

La migration post-nuptiale est notée à Hoëdic le 21/10 dans le marais nord de l'île.

Bruant proyer *Miliaria calandra* (2 données)

Aucun le 10/04/2001 à Hoëdic. 1 donnée du 22/06 d'un individu alarmant à Toul Hent / Erdeven.

ACTIVITES DU G.O.B. MORBIHAN

INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE DES ZNIEFF MORBIHANNaises (I)

Habitats côtiers et halophiles (1)

ESTUAIRE DU BLAVET

Description des milieux :

Estuaire soumis aux marées, vasières et schorre réduit (<10%).

Intérêts :

habitats
oiseaux
zone particulière
d'alimentation
géologiques

Activités humaines :

pêche
port
activité militaire

Facteurs influençant l'évolution la zone :

Cueillette et
ramassage

Données recueillies	1996-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	61
Coordinateur	Patrick Bailleul

Espèces nicheuses

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 1.

Tadorne de Belon * (2 co).

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 8.

Oie cendrée (irrégulière, max : 14) ; *Balbusard pêcheur*

(1) ; Foulque macroule (0-1000) ; Huitrier pie (0-50, apparition récente) ; Echasse blanche (27) ; Courlis corlieu (100) ; Courlis cendré (50) ; Sterne pierregarin (50).

Espèces hivernantes

Déterminantes :

2.

Grèbe castagneux (50) ; Foulque macroule (0-1000).

Non déterminantes : 8.

Grèbe huppé (50) ; *Grèbe à cou noir* (5) ; *Bernache cravant* (0-1000) ; *Tadorne de Belon* (100) ; *Huitrier pie* (10-50) ; *Avocette élégante* (27) ; *Vanneau huppé* ; *Courlis cendré* (50).

Commentaire ornithologique : la zone fait partie du fonctionnement global de la rade de Lorient.

La Foulque macroule en 1996 puis la Bernache cravant en 1997/98 ont déserté le site qui est l'objet d'une pêche à pied croissante.

ANSE DE QUELISOYE

Description des milieux :

vasière maritime au confluent de la rivière du Ter et de la rade de Lorient.

Intérêts :

habitats
oiseaux
phanérogames
(zostères)
zone particulière
d'alimentation

Activités humaines :

port

Facteurs influençant l'évolution la zone :

cueillette et ramassage
(pêche à pied)
équipements sportifs et
de loisirs (port de
plaisance)

Données recueillies

1995-1999

Niveau de l'inventaire ornithologique

bon

Nombre d'espèces relevé

51

Coordinateur

Gwenaél Derian

Espèces nicheuses

Déterminantes :

aucune

Non déterminantes : 1

Tadorne de Belon (0-1 couple).

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 29

Grand Cormoran (20-60 en reposoir diurne); Héron cendré (10-50); Ibis sacré; Bernache cravant (diz. à cent.); Canard colvert (100-400 en liaison avec les étangs du Ter); Foulque macroule (700); Bécasseau minute (1); *Bécasseau cocorli* (1); Bécasseau variable (cent.); Combattant varié (1); Barge à queue noire (14); Courlis corlieu (1-5); Courlis cendré (1-10); Chevalier gambette (150); Chevalier aboyeur (1); Chevalier guignette (5); Mouette mélanocéphale (1); Mouette rieuse (cent.); Goéland cendré (1-10); Goéland brun (diz.); Goéland (argenté) (500); Goéland leucophaea (1); Goéland marin; Sterne caugek (15); Sterne pierregarin (50); Martin-pêcheur d'Europe (2); Pie bavarde (10); Corneille noire.

Espèces hivernantes

Déterminantes : 3

Fuligule morillon (0-110, l'anse sert de repli quand les étangs du Ter sont gelés); Foulque macroule (1300); Chevalier gambette (120).

Non déterminantes : 39

Plongeon catmarin (1); *Plongeon arctique* (1); *Grèbe castagneux* (2-20); *Grèbe huppé* (1-20); *Grèbe esclavon* (0-4, exceptionnel); *Grèbe à cou noir* (1-5); Grand Cormoran (20-110 en reposoir diurne); *Aigrette garzette* (10); Héron cendré (1-10); *Oie cendrée* (0-1 exceptionnelle); *Bernache cravant* (300-700); *Tadorne de Belon* (20); *Canard siffleur* (20-150); *Canard chipeau* (0-25, irrégulier); Canard colvert (10-50); *Canard pilet* (10); *Canard souchet* (10); *Fuligule milouin* (0-160; l'anse sert de refuge quand le gel atteint les étangs du Ter); *Fuligule nyroca* (0-1, exceptionnel); *Huitrier pie* (20-40); *Avocette élégante* (10-50); *Pluvier argenté* (10); Vanneau huppé (10); *Bécasseau variable* (200-500); *Barge à queue noire* (1); *Barge rousse* (4); *Courlis cendré* (5-20); *Chevalier guignette* (2); *Tournepie à collier* (10); *Mouette mélanocéphale* (0-3); *Mouette pygmée* (25); *Mouette rieuse* (2000); *Goéland cendré* (2-14); *Goéland brun* (50-160); *Goéland argenté* (2000); *Goéland marin* (5-45); *Sterne caugek* (2); *Martin-pêcheur d'Europe* (1-2); *Corneille noire* (10-20).

Commentaire ornithologique : l'anse de Quélisoye est en liaison d'une part avec le reposoir des Saisies / Larmor-Plages (les limicoles régulent leur présence sur ces sites en fonction des marées), d'autre part avec les étangs du Ter où Colverts et Siffleurs se reposent. C'est aussi un repli pour les fuligules quand ces étangs gèlent. La présence des foulques est marquée depuis l'hiver 96/97, en même temps que cette espèce désertait les vasières du Blavet situées en amont de l'anse. La destruction de l'herbier par des pêcheurs à pieds réduit les capacités d'accueil de la vasière pour les bernaches en transit.

avis du coordinateur de la zone : Znieff à conserver, étendue aux étangs du Ter et à la rive lorientaise.



Vasière à Quélisoye / Larmor-Plage

DUNES D'ERDEVEN

Description des milieux :

dunes avec landes atlantiques, dépressions humides.

Intérêts :
habitats
oiseaux
flore

**Activités
humaines :**
tourisme et loisirs
chasse

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
surfréquentation
fermeture du milieu
sport et loisirs de plein
air

Données recueillies	1996-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	41
Coordinateur	Guillaume Evanno

Espèces nicheuses**Déterminantes :** 11.

Busard des roseaux (2) ; Oedicnème criard (2-6) ; Gravelot à collier interrompu (20-30, reproducteur avec échec par dérangement) ; Vanneau huppé (24-40) ; Huppe fasciée (2) ; Hirondelle de rivage (30) ; Bergeronnette printanière (6-8) ; Gorgebleue à miroir (6-8) ; Traquet motteux ; Phragmite des joncs (4-10) ; Fauvette pitchou.

Non déterminantes : 19.

Tadorne de Belon (6-8) ; Faucon crécerelle (au moins 1 co) ; Râle d'eau (4-6) ; Gallinule poule-d'eau ; Foulque macroule ; *Chevalier gambette* (4) ; Tourterelle des bois ; *Hibou des marais* (nidification possible) ; Alouette des champs ; Pipit maritime ; Tarier pâle ; Bouscarle de Cetti ; Cisticoule des joncs (10) ; *Rousserolle effarvatte* ; Panure à moustaches ; Verdier d'Europe ; Chardonneret élégant ; Linotte mélodieuse ; Bruant des roseaux (10-20).

Espèces de passage**Déterminantes :** aucune.**Non déterminantes :** 3.

Milan noir (1) ; Faucon émerillon (1-2) ; Hibou des marais (1-2).

Espèces hivernantes**Déterminantes :** aucune.**Non déterminantes :** 2.

Aigrette garzette ; *Bécassine des marais* (5-10).

Commentaire ornithologique : les dunes d'Erdeven abritent plusieurs espèces d'oiseaux à forte valeur patrimoniale. Cependant, la plupart d'entre elles sont en diminution du fait de la forte fréquentation du site.

MARAIS DE SUSCINIO

Description des milieux :

Marais saumâtre en arrière du littoral, roselière étendue, jusqu'à la dune (10%) et la plage sableuse (10%).

Intérêts :
oiseaux

Activités humaines :
pêche
chasse

Facteurs influençant l'évolution la zone :
surfréquentation
chasse
érosion

Données recueillies	1996-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	102
Coordinateur	François Urvoaz.

Espèces nicheuses

Déterminantes : 12

Grèbe castagneux (4) ; Busard des roseaux (2) ; Echasse blanche (5-17) ; Gravelot à collier interrompu (6-21) ; Vanneau huppé (1-20, 2 couples en 1997) ; Chevalier gambette (8) ; Bergeronnette printanière (12) ; Gorgebleue à miroir (14) ; Traquet motteux (6) ; Locustelle lusciniôide (2) ; Phragmite des joncs (8) ; Panure à moustaches (2).

Non déterminantes : 30

Tadorne de Belon (1-12, un couple nicheur en 1999) ;

Canard colvert (6-40) ; Faucon crécerelle (2, un couple nicheur en 1998 et 1999) ; Gallinule poule d'eau (8) ; Foulque macroule (20 co) ; *Sterne pierregarin* (22, niche sur îlots de terre et plateforme artificielle) ; Pigeon ramier (220) ; Coucou gris (2) ; Alouette des champs (30) ; Troglodyte mignon (6) ; Accenteur mouchet (10) ; Rougegorge familier (10) ; Tarier pâle (6) ; Merle noir (4-8) ; Grive musicienne (4) ; Bouscarle de Cetti (1-6) ; Cisticole des joncs (4) ; *Rousserolle effarvatte* (8) ; Fauvette à tête noire (6) ; Mésange bleue (10) ; Mésange charbonnière (10) ; Geai des chênes (4) ; Pie bavarde (6) ; Choucas des tours (10-40) ; Corneille noire (5-10) ; Pinson des arbres (10) ; Verdier d'Europe (2) ; Chardonneret élégant (45) ; Linotte mélodieuse (4) ; Bruant des roseaux (6).

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 20.

Spatule blanche (5-7) ; Canard chipeau (4) ; Sarcelle d'été (2) ; Petit Gravelot (2) ; Pluvier argenté (1) ; Bécasseau sanderling (20) ; Combattant varié (2) ; Courlis corlieu (00-3) ; Chevalier aboyeur (3) ; *Chevalier culbanc* (2) ;

Chevalier guignette (2) ; *Mouette pygmée* (5) ; Sterne caugek (3) ; Sterne naine (12) ; Martinet noir (500) ; Hirondelle rustique (500) ; *Tarier des prés* (1) ; Pinson des arbres (30) ; Verdier d'Europe (20) ; Chardonneret élégant (20).

Espèces hivernantes

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 47

Grèbe castagneux (2-5) ; *Grèbe huppé* (10-20) ; *Grèbe à cou noir* (5-7) ; Grand Cormoran (4) ; *Aigrette garzette* (5-20) ; Héron cendré (5-10) ; Ibis sacré (5-10) ; Cygne tuberculé (1-6) ; *Tadorne de Belon* (20) ; *Sarcelle d'hiver* (12) ; Canard colvert (40) ; Harle piette (0-1, exceptionnel) ; *Harle huppé* (2) ; *Busard des roseaux* (2) ; Buse variable (4) ; Faucon crécerelle (2) ; Gallinule poule d'eau (12) ; *Foulque macroule* (30) ; *Avocette élégante* (5) ; *Grand Gravelot* (5-10) ; *Bécasseau*

variable (14) ; *Bécassine des marais* (5) ; *Chevalier gambette* (10) ; *Mouette rieuse* (30) ; Goéland brun (5) ; Goéland argenté (25) ; Pigeon ramier (30) ; Alouette des champs (12) ; Bergeronnette grise (Yarrel) (10) ; Troglodyte mignon ((4) ; Accenteur mouchet (4) ; Rougegorge familier (1-4) ; Tarier pâle (3) ; Grive musicienne (4) ; Bouscarle de Cetti (2) ; Cisticole des joncs (2) ; Mésange bleue (10) ; Mésange charbonnière (10) ; Geai des chênes (6) ; Pie bavarde (12) ; Choucas des tours (10-20) ; Corneille noire (5-20) ; Etourneau sansonnet (50) ; Pinson des arbres (20) ; Chardonneret élégant (10) ; Linotte mélodieuse (2) ; Bruant des roseaux (2).

MARAIS DE PENVINS

Description des milieux :

roselière (70%), dune et plage de sable.

Intérêts :
oiseaux

Activités humaines :
chasse
tourisme et loisirs

Facteurs influençant l'évolution la zone :
surfréquentation
chasse
rejet de polluants

Données recueillies

1999

Niveau de l'inventaire ornithologique

assez bon

Nombre d'espèces relevé

29

Coordinateur

François Urvoaz

Espèces nicheuses

Déterminantes : 3.

Grèbe castagneux (3-9) ; Gravelot à collier interrompu (4-8, 2 couples) ; Phragmite des joncs (5-10).

Non déterminantes : 20.

Aigrette garzette (1-5) ; Canard colvert (20-50) ; Faucon crécerelle (2) ; Gallinule poule d'eau ((2-6) ; Foulque macroule (15-20) ; Pigeon ramier (4-8) ; Coucou gris (2-5) ; Alouette des champs (5-10) ; Rougegorge familier (1-5) ; Tarier pâtre (4-8) ; *Traquet motteux* (2-6 , sans reproduction assurée) ; Bouscarle de Cetti (6-12) ; Cisticole des joncs (4-7) ; *Rousserolle effarvatte* (5-10) ; Pouillot véloce (5-10) ; Pie bavarde (2-6) ; Corneille noire (5-10) ; Pinson des arbres ; Verdier d'Europe ; Linotte mélodieuse.

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 43.

Courlis corlieu (3) ; Sterne pierregarin (3) ; Martinet noir ; Hirondelle rustique.

Espèces hivernantes

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 25.

Grèbe huppé ; *Grèbe à cou noir* (2-3) ; *Aigrette garzette* (2-5) ; Héron cendré (2-5) ; Ibis sacré (7) ; Cygne tuberculé (9) ; *Bernache cravant* (32-51) ; *Tadorne de Belon* (10) ; Canard colvert (2) ; *Harle huppé* (3) ; *Harle bièvre* (1, exceptionnel) ; Bécasseau variable (40-100) ; *Chevalier gambette* (5) ; *Tournepipe* à collier (4-145) ; *Mouette rieuse* (100-670) ; *Goéland cendré* (2) ; *Goéland argenté* (50-100) ; *Goéland marin* (10) ; *Sternne caugek* (1) ; Alouette des champs (10-20) ; Pipit maritime (05-15) ; Bergeronnette grise (5-10) et de Yarrel (5) ; *Traquet du désert* (1 individu, présence exceptionnelle) ; Linotte mélodieuse (20).

POINTE DE KERZO

Description des milieux :

parc urbain, pins et jeunes chênes..

Intérêts :

oiseaux dortoir zone particulière liée à la reproduction

Données recueillies	1997-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	2
Coordinateur	Gwenael Derian

Espèces nicheuses

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 2.

Aigrette garzette (6 co) ; Héron cendré (21 co).

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : aucune.

Espèces hivernantes

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 2.

Aigrette garzette (15-70) ; Héron cendré (0-15).

Commentaire ornithologique : unique héronnière de la rade de Lorient. Sert de dortoir secondaire en hiver pour les aigrettes.

ROCHES DES SAISIES

Description des milieux :
récifs

Intérêts :
oiseaux
étape migratoire,
stationnement

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
non mentionnés

Données recueillies	1996-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	assez bon
Nombre d'espèces relevé	35
Coordinateur	Jacques Corbière

Espèces de passage**Déterminantes :** aucune.**Non déterminantes :** 15.

Grand Cormoran ; Huitrier pie (30) ; Grand Gravelot (80-200) ; Pluvier argenté (40) ; Vanneau huppé (50) ; Bécasseau sanderling (200-300) ; Bécasseau maubèche (200) ; Bécasseau variable ; Barge à queue noire (1) ; Barge rousse (3) ; Courlis cendré ; Chevalier arlequin (1) ; Chevalier guignette (1) ; Tournepieuvre à collier (60) ; Goéland brun (30) ; Goéland marin (5) ; Mouette tridactyle (10) ; Sterne caugek (90) ; Sterne pierregarin (30) ; Pingouin torda (1).

Espèces hivernantes**Déterminantes :** aucune.**Non déterminantes :** 20.

Plongeon catmarin (1) ; *Grèbe à cou noir* (1) ; Grand Cormoran (20) ; *Bernache cravant* (100) ; *Macreuse noire* (4) ; *Harle huppé* (2) ; Huitrier pie (70) ; *Grand Gravelot* (200) ; *Pluvier argenté* (250) ; *Bécasseau maubèche* (200) ; Bécasseau violet (2-40) ; Tournepieuvre à collier (50) ; Goéland cendré (1) ; Goéland brun (40) ; Goéland argenté ; Goéland marin ; Sterne caugek (5-10) ; Martin-pêcheur d'Europe (1).

Commentaire ornithologique : reposoir en liaison avec la rade de Lorient ; en raison de la hauteur de la marée, le reposoir est inutilisable onze jours par mois en moyenne quatre heures.

avis du coordinateur de la zone : tracé à conserver.

VASES SALEES DE LOCOAL MENDON

Description des milieux :

Estuaire soumis à marées avec vasières et prés salés atlantiques.

Intérêts :

habitats
oiseaux
étapes migratoires
zone particulière liée
à la reproduction

Activités humaines :

chasse

Facteurs influençant l'évolution la zone :

non mentionnés

Données recueillies

1994-1999

Niveau de l'inventaire ornithologique

bon

Nombre d'espèces relevé

72

Coordinateur

Gwenael Derian

Espèces nicheuses

Déterminantes : 3.

Milan noir(0-2) ; Hirondelle de rivage (10-50) ; Fauvette pitchou.

Non déterminantes : 8.

Grèbe castagneux ; *Tadorne de Belon* (2-18) ; Faucon crécerelle (1 co) ; Tourterelle des bois ; Pipit farlouse ; Alouette des champs ; Cisticole des joncs ; Bruant jaune.

Espèces de passage

Déterminantes : 1.

Balbusard pêcheur (3).

Non déterminantes : 3.

Mouette rieuse (100-10 000) ; Goéland brun ; Sterne pierregarin (10-50).

Espèces hivernantes

Déterminantes : 1.

Canard siffleur (200-700).

Non déterminantes : 9.

Grèbe castagneux (10) ; *Grèbe huppé* ; *Grèbe à cou noir* (10) ; Grand Cormoran (10-50) ; *Aigrette garzette* (10-20) ; Héron cendré (1-10) ;

Cygne tuberculé (2) ; *Tadorne de Belon* (200) ; *Sarcelle d'hiver* (4) ; Canard colvert (110) ; *Garrot à œil d'or* (25) ; Faucon crécerelle (2) ; *Courlis cendré* (80) ; *Chevalier gambette* (80) ; *Mouette rieuse* (5000) ; Goéland brun (100-400) ; Pipit farlouse.

Commentaire ornithologique : participe au fonctionnement de la rivière d'Étel.

VASES SALEES DE SAINTE-HELENE

Description des milieux :
vasières

Intérêts :
habitats
oiseaux

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
non mentionnés

Données recueillies	1996-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	assez bon
Nombre d'espèces relevé	50
Coordinateur	Jacques Corbière

Espèces nicheuses

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 3.

Tadorne de Belon (12) ; Canard colvert (5) ; *Hirondelle de rivage* (25 ; microfalaise percée de trous antérieurement utilisés).

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 5.

Grand Cormoran (5) ; Courlis corlieu (15-20) ; Goéland brun ; Goéland argenté (10) ; Goéland marin (2).

Espèces hivernantes

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 16.

Grèbe castagneux (5); *Grèbe huppé* (5); Grand Cormoran (10); *Aigrette garzette* (15); Héron cendré (5); *Tadorné de Belon* (10); Canard colvert (5); *Garrot à œil d'or* (1); *Avocette élégante* (0-4); Vanneau huppé (30-400); *Courlis cendré* (10); *Chevalier gambette* (30-40); *Mouette rieuse* (50-300); Goéland brun (10-30); Goéland argenté (10); Goéland marin (2).

Commentaires :

avis du coordinateur de la zone : zone à élargir vers l'est pour intégrer les vasières du Gouarde / Nostang

Eaux non marines (1)

ER VARQUEZ CRUCUNO

Description des milieux :

étang avec roselière, entouré de conifères.

Intérêts :
habitats
flore
oiseaux

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
chasse

Données recueillies	1996-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	assez bon
Nombre d'espèces relevé	44
Coordinateur	Guillaume Evanno

Espèces nicheuses

Déterminantes : 5.

Grèbe castagneux (4); *Busard des roseaux* (2); *Faucon hobereau* (2); *Engoulevent d'Europe* (4); *Fauvette pitchou*.

Non déterminantes : 10.

Héron cendré (2-4); *Canard colvert* (4-8); *Epervier d'Europe* (2); *Buse variable* (1-2); *Râle d'eau* (2-6); *Gallinule poule d'eau* (6-10); *Foulque macroule* (6-14); *Bouscarle de Cetti* (2-4); *Rousserolle effarvate*.

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 4.

Ibis sacré (1-3) ; Sarcelle d'hiver ; Bondrée apivore (1) ;
Martin-pêcheur d'Europe (1-2).

Espèces hivernantes

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : aucune.

Commentaire ornithologique : le faucon hobereau utilise le site comme terrain de chasse en période de reproduction.

ETANG AU DUC

Description des milieux :

étang, saules, roselières réduites.

Intérêts :
habitats
insectes
amphibiens
oiseaux
flore

Activités humaines :
pêche
chasse
navigation

Facteurs influençant l'évolution la zone :
sport et loisir de plein-air
pêche
eutrophisation
atterrissement

Données recueillies	1994-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	125
Coordinateur	Bernard Iliou

Espèces nicheuses

Déterminantes : 2.

Grèbe huppé (20-40, 13 co en 1998) ; Phragmite des joncs.

Non déterminantes : 8.

Grèbe castagneux (10-20) ; *Canard colvert* (20-80) ;
Epervier d'Europe (5) ; *Gallinule poule-d'eau* (10-20) ; *Foulque macroule* (20-60) ;
Bouscarle de Cetti (5-15) ; *Rousserolle effarvate* (5-30) ; *Bruant des roseaux* (5-30).

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 52.

Grèbe castagneux ; Grèbe huppé ; Aigrette garzette (2) ; Héron cendré (20) ; Héron pourpré (2) ; Spatule blanche (10) ; Bernache cravant (5) ; Tadome de Belon (10) ; Canard colvert ; Sarcelle d'été (4) ; Fuligule morillon (20) ; Garrot à oeil d'or (3) ; Harle bièvre (10) ; Erismature rousse (10) ; Bondrée apivore (5) ; Epervier d'Europe (5) ; Buse variable (5) ; Balbuzard pêcheur (2) ; Faucon crécerelle (5) ; Gallinule poule-d'eau (20) ; Foulque macroule ; Huîtrier pie (2) ; Avocette élégante (25) ; Petit Gravelot (2) ; Grand Gravelot (5) ; Vanneau huppé (100) ; Bécasseau minute (1100) ; *Bécasseau cocorli* (10) ; Bécasseau variable (10) ; Combattant varié (5) ; *Bécassine des marais* (50) ; Barge à queue noire (5) ; Barge rousse (5) ; Courlis corlieu (3) ; Courlis cendré (5) ; Chevalier gambette (5) ; Chevalier aboyeur (20) ; Chevalier culblanc (20) ; Chevalier sylvain (3) ; Chevalier guignette (50) ; Mouette rieuse ; Goéland cendré (20) ; Goéland brun (100) ; Goéland argenté (100) ; Goéland marin (50) ; Mouette tridactyle (1) ; Sterne pierregarin (10) ; *Guifette noire* (20) ; Bergeronnette de Yarrell ; *Phragmite des joncs* ; *Rousserolle effarvatte* ; Bruant des roseaux.

Espèces hivernantes

Déterminantes : 1.
Chevalier guignette (10).

Non déterminantes : 22.

Grèbe castagneux ; Grèbe huppé (60-100) ; Grèbe à cou noir (5) ; Grand Cormoran (80-150, dortoir proche) ; Héron cendré (10) ; *Tadome de Belon* ; Canard siffleur (15) ; *Canard chipeau* (10) ; *Sarcelle d'hiver* (20) ; Canard colvert (250-450) ; *Canard pilet* (5) ; *Fuligule milouin* (30) ; *Harle bièvre* (0-10) ; *Harle piette* (0-10, exceptionnel) ; Epervier d'Europe (5) ; Faucon crécerelle (5) ; Gallinule poule-d'eau (20) ; *Foulque macroule* (100-300) ; Vanneau huppé (20-50) ; *Bécassine des marais* (20) ; *Mouette rieuse* (1000-5000) ; Goéland brun (20) ; Goéland argenté (10) ; Pipit spioncelle (0-50) ; Bergeronnette de Yarrell (0-20) ; Bruant des roseaux (10-50).

Commentaire ornithologique : de par sa position centrale en Bretagne, le site est un carrefour pour de nombreuses espèces qui coupent la Bretagne lors de leurs déplacements (stationnement, hivernage, migration).

ETANG DE NOYALO

Description des milieux :

étang de forme allongée, roselières et formations à grandes laîches réduites (20%)

Intérêts :

habitats
oiseaux
dortoir
mammifères
flore

Compléments descriptifs :

Activités
humaines :
pêche

Facteurs influençant
l'évolution la zone :
non mentionnés

Données recueillies	1990 à 1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	32
Coordinateur	François Hémerly

Espèces nicheuses

Déterminantes : aucune

Non déterminantes : 7

Grèbe huppé (0-4, reproduction non avérée) ; Canard colvert (2-10) ; Gallinule poule d'eau (6-12) ; Foulque macroule (4-10) ; Bergeronnette grise (2-10) ; Bouscarle de Cetti (4-10) ; Cisticole des joncs (2-8).

Espèces de passage

Déterminantes : 1
Balbuzard pêcheur (0-3).

Non déterminantes : 24

Grèbe huppé (1-25) ; Grand Cormoran (50-300) ; Héron cendré (1-12) ; Tadornes de Belon (0-10) ; Canard chipeau (0-5) ; Sarcelle d'hiver (0-20) ; Canard colvert ; Sarcelle d'été (0-4) ; Milan noir (0-2) ; Busard des roseaux (0-3) ; Buse variable (0-2) ; Faucon hobereau (0-1) ; Galinule poule d'eau (5-15) ; Foulque macroule (10-40) ; *Chevalier cul blanc* (1-8) ; Chevalier guignette (2-10) ; Mouette rieuse (10-100) ; Goéland brun (0-5) ; Goéland argenté (0-20) ; *Guifette noire* (0-5) ; martin-pêcheur d'Europe (1-3) ; Hirondelle de rivage (0-200) ; Bergeronnette des ruisseaux (1-10) ; Bergeronnette grise (5-20).

Espèces hivernantes

Déterminantes : 1
Chevalier guignette (0-5).

Non déterminantes : 19

Grèbe huppé (5-10) ; Grand Cormoran (20-100) ; Héron cendré (0-8) ; *Tadorné de Belon* (0-10) ; *Canard siffleur* (0-10) ; *Canard chipeau* (0-5) ; *Sarcelle d'hiver* (0-50) ; Canard colvert (5-40) ; *Fuligule milouin* (0-40) ; *Fuligule morillon* (0-15) ; *Busard des roseaux* (0-3) ; Buse variable (0-2) ; Gallinule poule d'eau (5-15) ; Foulque macroule (5-30) ; Mouette rieuse (10-100) ; Goéland brun (0-5) ; Goéland argenté (0-20) ; Bergeronnette grise (5-10) ; Bouscarl e de Cetti (1-5).

Commentaire ornithologique : les arbres surplombant l'étang accueillent un dortoir estival de Grands Cormorans.

* En italiques, figurent les espèces **déterminantes** pour lesquelles les critères d'effectif ou de régularité ne sont pas atteints.

NOTES DE TERRAIN

ECHOUAGES D'OISEAUX A PENESTIN, 2001

Samuel TRIGODET

Pénestin présente un faciès littoral d'environ vingt-cinq kilomètres comprenant une partie proprement maritime et l'estuaire de la Vilaine (voir tableau).

Les résultats présentés ici concernent un ramassage d'oiseaux échoués le long de l'année 2001. La fréquence de passage est généralement hebdomadaire mais peut varier. L'ensemble du littoral est couvert par quatre personnes, chacune sur une portion. Je dois par recoupement déterminer les échouages recensés par mes collègues, c'est pourquoi une marge d'erreur peut se glisser dans ces dénombrements, non tant au niveau du nombre que des espèces (je n'ai pas toujours l'occasion de voir les cadavres).


Généralement, ceux-ci se situent dans la laisse de haute mer. Il semble y avoir une prédation : nombre d'entre-eux sont à moitié dévorés, particulièrement les crânes, ce qui ne rend pas aisée l'identification. Les cadavres sont en général enlevés des plages.

	Dénomination	Description
Partie maritime	Le Palandrin, Keraudré	plages de sable avec petits systèmes dunaires
	Pointe du Bile, Goulumer	falaises argileuses et rochers, entrecoupés de petites criques
	Loscolo, sud	plage de sable au pied de falaise argileuse, système dunaire dégradé
	De la pointe de Loscolo à Maresclé	falaises entrecoupées de petites criques recouvertes presque à chaque marée
	Maresclé à Poudrantaïs	falaise rocheuse puis petite plage
	Poudrantaïs à la Mine d'Or	falaise argileuse
	Mine d'Or au Lomer	plage de sable et galets au pied de la falaise argileuse
	Lomer à Halguen	falaise rocheuse découpée de plages
Estuaire de la Vilaine	Halguen à Camaret	plage de sable puis cordon de galets
	Camaret à Men er Mor	falaise entrecoupée de criques
	Men er Mor au Bronzais	plage de sable, cordon de galets
	Bronzais au Logo	plage de sable
	Pointe du Scal au port de Tréhuiguier	falaise rocheuse

Littoral de Pénestin (Morbihan)

Résultats mensuels, échouages d'oiseaux, 2001

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total par espèces
Plongeon arctique		1											1
Grèbe à cou noir	1												1
Fulmar boréal			1		1								2
Fou de Bassan	4	3	2			2				7	2	1	21
Grand Cormoran							1	2			1		4
Cormoran huppé												1	1
Ibis sacré								1					1
Bernache cravant			1										1
Tadorne de Belon	1										1	1	3
Canard colvert								1					1
Huitrier pie									2				2
Grand Gravelot	1												1
Bécasseau variable												12	12
grisards					1	2	24		5	6	3	4	45
Mouette rieuse	2	2	2	1	2		1		1		4		15
Goéland cendré			1										1
Goéland brun						1							1
Goéland argenté	1	3			1	4	20	16		5	5	1	56
Goéland marin												1	1
Mouette tridactyle	2												2
Sterne pierregarin								1					1
Guillemot de Troil	16	9	2	2		1		1					31
Pingouin torda	1	1	1										3
Mergule nain												1	1
Macareux moine	1												1
Pigeon sp ou ramier				1									1
Perruche sp				1									1
Total annuel	30	19	10	5	5	10	46	22	8	18	16	22	211



Résultats mensuels, échouages d'oiseaux, 2001

