

AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

Ti ar Vro B.P. 103
29833 CARHAIX



N°24 ANNEE 2003

Sommaire du numéro 24 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 novembre 2001 à 15 mars 2002	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 17
Groupe 3 de l'Huitrier pie au Tournepierre à collier	page 20
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 24
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 28
 Activités du G.O.B. Morbihan	
L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du Morbihan (II)	page 36
Saison 2002 du programme national STOC EPS dans le Morbihan	page 53
 Notes de terrain	
Observation d'un dortoir hivernal de Bergeronnettes des ruisseaux <i>Motacilla cinerea</i> dans la vallée du Scorff	page 56
Note sur un Pouillot à grands sourcils, trouvé mort dans un jardin	page 58
 Documents	
Recensements Wetlands dans le Morbihan, Résultats de janvier 2002	page 59

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE :

16 NOVEMBRE 2001 A 15 MARS 2002

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
ANGIN Bruno, BLANCHARD Jean-Luc, BOZEC René, BAILLEUL Patrick,
CORBIERRE Jacques, CORNEC Gaetan, CROCHET Erwan, DERIAN Gwenael,
ERMEL Gérard, FATIN Denis, GUERIN Stéphane, GUILLEMOT Francis, ILIOU
Bernard, KERGOAT Laurent, KERNINON Yann, LAMOUR Joël, LEMONNIER
Françoise et Jean-Luc, MAHEO Roger, MAOUT Jacques, MOUCHEL Yann,
PALPANT Muriel, PHILIPPON Patrick, SIMON Nathalie, ... sauf erreur ou omission !

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton
(Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre
au 15 mars.

Les observations sont transmises au coordonnateur morbihannais sur papier ou disquette
informatique en respectant l'ordre suivant :

Espèce	Effectif	Remarque	Indice de reproduction	date	lieu-dit	commune
Grande Aigrette	102	50% en phase mélanique, baguées	certaine	2/04/2003	le Stum	SAINT- BARTHELEMY

Les listes des codes utilisés pour noter les espèces sont disponibles aux réunions du
G.O.B à Brec'h. Vous pouvez vous procurer un fichier de saisie sur tableur auprès du
G.O.B.

Illustration : couverture Patrick Bailleul ; photographies p43 et p50, Gw. Derian.

AR VRAN MORBIHAN N°24

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwenaél Derian

Plongeur indéterminé *Gavia sp.*

(3 données)

Rares observations cet hiver, seulement entre Gâvres et Erdeven, en février et mars : de un à cinq plongeurs non identifiés, sans doute Arctiques ou Imbrins.

Wetlands International : 3.

Plongeur catmarin *Gavia stellata*

(3 données)

Ce sont trois observations devant Erdeven, avec notamment 11 individus à la Roche Sèche le 06/01/02/2001. Puis 1 les 20/01 et 01/02/02 à Porh Kerhouet.

Wetlands International : 1.

Plongeur arctique *Gavia arctica*

(3 données)

- 30/01/2002, pointe er Hourél / Locmariaquer, 4, en alimentation.
- 21/02, Karreg-er-Hrank/ Plouhinec, 1 adulte.
- 03/03, La Roche Sèche / Erdeven, 1 adulte.

Plongeur imbrin *Gavia immer*

(8 données)

- 16/01/2002 et le 30/01, pointe er Hourél / Locmariaquer, 3 puis, le 15/02, 5 individus s'alimentent.
- 02/01, pointe du Conguel / Quiberon, 1 immature.
- 03/03, La Roche Sèche / Erdeven, 2.
- 21/02, Fontaine Saint-Gildas / Gâvres, 1.
- 30/12, Porh Guerh / Gâvres, 2 adultes et 1 immature puis le 21/02, 1 adulte.

Il est remarquable que toutes ces observations de plongeurs, émanant d'un seul segment de la côte, sont le fait d'un unique observateur.

Wetlands International : 3.

Grèbe indéterminé *Podiceps sp.*

(1 donnée)

Le 20/12/2001 à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon, 7 Grèbes à cou noir ou esclavons.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

(93 données)

La rivière d'Étel affirme son rôle de place d'hivernage importante pour le Morbihan, avec le tiers des données transmises et l'effectif élevé de la mi-janvier (comptages Wetlands).

Sur les étangs de Locoal-Mendon (Saint-Jean et Goh-Lenn) le maximum est de 87 le

17/11/2001 puis le nombre d'hivernants décroît : 58 le 19/12 et moins d'une vingtaine courant janvier 2002.

Corrélativement, des groupes sont observés sur la rivière proprement dite, en Locoal-Mendon : la Forest, 67 le 23/12 ; Listrec, 48 le 19/01/02 ; et à Sainte-Hélène, un maximum de 109 le 10/01 à Beg er Vil.

Autre site habituel, Pen Mané / Locmiquélic est cet hiver peu fréquenté : seulement 12 le 09/01 mais l'espèce est aussi présente sur le Blavet, 28 le 21/11 et encore 12 le 27/01 devant Sterbouët / Locmiquélic.

A signaler : 20 et plus au moulin à marée / Le Hezo le 18/11, 30 Castagneux le 18/12 à Kerdrual / La Trinité-sur-Mer, 35 entre la baie de Locmalo et Kersahu / Gâvres le 05/01.

Plusieurs observations rappellent la présence de l'espèce à l'intérieur du département, de petits plans d'eau artificiels suffisent : 2 à 4 individus hivernent sur l'étang de la Forêt / Brandivy et autant sur l'étang des Basses Landes / Sérent ; le 01/12 sur un bassin d'épuration à Kergourio / Crédin, 15 individus mais seulement deux quand les bassins sont gelés à 80% le 15/12.

Wetlands International : 689 dont 370 pour la rivière d'Etel.


Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(94 données)

Le recensement ne permet pas de donner une idée précise de l'hivernage sur l'étang au Duc de Ploërmel, notons cependant que 66 Grèbes huppés y étaient présents le 20/11/2001.

A Kerzo / Port-Louis, les recensements crépusculaires dénombrent 30 individus le 21/11, 11 le 27/02. 35 individus comptés à Por Gueh / Gâvres le 30/12.

Reproduction : parmi les 33 Grèbes huppés sur l'étang au Duc le 06/03, quatre couples se sont déjà cantonnés. L'étang de Coët-Rivas / Kervignac accueille 8 arrivants le 29/01, le 06/03 deux des six grèbes paraden. A Brandivy, étang de la Forêt, une courte parade occupe les deux oiseaux présents le 09/02.



Grèbe huppé sur le Blavet à Sterbouët / Locmiquélic, (Morbihan) ; hiver 2001-2002

Wetlands International : 741 dont 409 dans le Golfe du Morbihan.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

(10 données)

De la pointe er Hourel / Locmariaquer à Gâvres, en passant par la presqu'île de Quiberon, entre le 24/12/2001 et le 22/02/02, de petits groupes peuvent se mêler aux autres plongeurs marins. Deux groupes plus imposants : 18 et 24 individus, respectivement à

Portivy / Saint-Pierre-Quiberon et er Hourel / Locmariaquer, les 24/01 et 15/02.
Wetlands International : 10.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(34 données)

Les données manquent du Golfe, sinon celles des pointes de Locmariaquer : 55 le 16/01/2002 puis 28 plus 10 individus le 30/01.

Les autres sites régulièrement fréquentés sont

- la rivière d'Etel, principalement dans son cours médian : 25 et 17 le 02/01/2002 à Locoal-Mendon, 45 le 10/01 à Sainte-Hélène mais 75 le 26/12/2001 sur l'ensemble de la rivière.
- la presqu'île de Quiberon : 15 le 24/01 dans la baie de Plouharnel, quelques individus épars sur la côte sauvage.
- la rade de Lorient : 14 dans la baie de Locmalo / Gâvres le 05/01 ; dans l'anse de Kerzo / Port-Louis, les rassemblements crépusculaires s'élèvent à 27 et 39 individus les 21/11 et 27/02.


Wetlands International : 1862 dont 1314 dans le Golfe du Morbihan et 361 en baie de Quiberon.

Puffin indéterminé *Puffinus / Calonectris sp.* (0 donnée) ; **Océanite indéterminé** *Hydrobates sp.* (0 donnée) ; **Fou de Bassan** *Sula bassana*, (1 donnée).

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

(73^d données)

Plusieurs dortoirs ont fait l'objet de suivis routiniers, dont celui de Brandivy, de découverte récente (voir Ar Vran Morbihan 17), dont l'effectif est en hausse. Le 16/01/2002, les 197 individus comptés sur Méaban ne représentent qu'une part du dortoir. Dans la rade de Lorient : 87 le 22/12/2001 au port militaire, 261 le 07/03 sur l'ensemble des dortoirs.



Grand Cormoran sur l'étang de la Forêt / Brandivy (Morbihan) ; hiver 2001-2002

En aval de l'étang au Duc de Ploërmel, 54 individus et 102 au dortoir, les 20/11 et 26/12.
A noter : 80 individus à Arzal, le 03/12, "dans le débit du siphon et sur la drôme" du barrage.

dates	Effectif
19/11	128
25/11	157
20/12	95
26/12	100 environ
30/12	100 environ

Sortie crépusculaire des Grands Cormorans : rivière d'Etel (Morbihan) : novembre – décembre 2001

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

(4 données)

A Porh Kerhouet / Erdeven, deux individus paradent sur l'eau le 30/01/2002. Ce littoral est un reposoir diurne régulier en même temps qu'un lieu de pêche.

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

(2 données)

- 12/01/2002, étang de Coët-Rivas / Kervignac, 1.
- 29/01, étang de Lannéac / Ploemeur, 1.

Wetlands International : 3 sur le littoral Guidel-Ploemeur.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

(6 données)

Le statut de l'espèce n'évolue pas, il n'y a toujours que quelques individus hivernants à l'extrême est du département, sans signe d'expansion : 25/11/2001, Kerzehec / Surzur, 5 ; 09/12, Castell / Tour-du-Parc, 3 ; 13/01, Camoël, 1 ; 09/03, marais de Kergenets / Surzur, 2.

Une exception le 17/01/2002 à Pontivy, en direction de Josselin, 1 individu au repos dans un champ.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*


(82 données)

Dortoirs :


- le Castell / Le Tour-du-Parc, 197 le 09/12/2001.
- les deux dortoirs de la rade de Lorient sont visités : moins de 20 individus à Kerzo / Port-Louis pendant l'hiver, les cyprès de Kerner / Riantec accueillent l'essentiel de l'effectif.
- A l'étang de la Forêt / Brandivy, un dortoir de petite dimension draine des aigrettes qui arrivent du nord-ouest.
- Noter dans la rivière d'Etel, 86 individus le 25/11, 150 le 10/12, 120 le 16/12 et seulement 60 le 26/12.

Quelques données documentent la présence de l'espèce à l'intérieur du département, mais il ne s'agit pour l'heure que d'individus isolés qui, pour une proportion importante des cas, semblent suivre les cours d'eau (Blavet, Oust).

- 1 à l'étang au Duc / Ploërmel, le 24/11/01,
- 2 à l'étang des Basses Landes / Sérent, le 20/01/02.
- 3 à Quinipily / Baud, 03/01.
- 5 à l'étang du Roz à Noyal-Pontivy, 28/01.
- 1 au Couëdic / Saint-Gérard, 29/01.
- 1 au Bas Bodine / Les Forges, 22/01.



Aigrette garzette au dortoir de Brandivy (Morbihan) ; hiver 2001-2002



Aigrette garzette au dortoir de Kerner / Riantec (Morbihan) ; hiver 2001-2002


Grande Aigrette *Egretta alba*

(14 données)

L'hivernage dans la rivière d'Étel est vérifié entre l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, jusque mi-décembre 2001, et le Cranic / Landaul, jusque fin-février. Les individus bagués, contrôlés plusieurs fois, sont originaires de Loire-Atlantique.

Une donnée isolée vient de Suscinio / Sarzeau, un individu le 07/01.

Wetlands International : 1.



Grande Aigrette dans la rivière d'Étel (Morbihan) ; hiver 2001-2002

Héron cendré *Ardea cinerea*

(91 données)

A Kerzo / Port-Louis, 7 aires sont occupées et un oiseau est en position de couveur le 03/02/2002, d'autres couveurs sont vus le 27/02.

A Tronchéteau / Pont-Scorff, 16 individus se nourrissent sur les berges un moment dégagées. 12 au dortoir du Castell / Le Tour-du-Parc, le 09/12/01, 1 à 2 à celui de l'étang de la Forêt en Brandivy pendant l'hiver.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(21 données)

334 individus au dortoir du Castell / Le Tour-du-Parc, le 09/12/2001. L'hivernage se confirme dans la rade de Lorient, avec de bien plus modestes effectifs : 27 individus aux dortoirs les 03-04/01/2002.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

(15 données)

Ces observations renseignent surtout, entre le début de la période et le 19/02/2002, sur la présence d'une adulte qui passe un nouvel hiver dans la rade de Lorient. En fait 2 à 3 individus hivernent là.

Autres données :

- 20/12/2001, anciennes salines du Bréno à Carnac, 1 adulte
- 24/12, anse de Kerdual / la Trinité-sur-mer, 1 adulte.
- 26/12, marais de Pen en Toul / Larmor-Baden, 1 adulte.
- le 31/12, 15 à 20 individus à Falguérec / Séné.
- 08/01/02, moulin de Pomper / Baden, 1.
- 15/02, étang du Roc'h Du / Crac'h ; 1 adulte.

Wetlands International : 9 dont 6 dans le Golfe du Morbihan.


Cygne tuberculé *Cygnus olor*

(13 données)

Bernache cravant *Brenta bernicla*

(39 données)

Golfe du Morbihan, baies de Vilaine et de Plouharnel, rivière d'Étel : voir Wetlands International, Bernache cravant. Le maximum que nous avons noté dans la baie de Plouharnel était de 1579 le 06/01/2002. Dans la rivière d'Étel, maximum de 170 individus le 13/01. En rade de Lorient, un seul contact sur les vasières du Blavet : 70 le 21/11.



Bernache cravant dans la rade de Lorient (Morbihan) ; hiver 2001-2002

Wetlands International : 13044.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(82 données)

Rassemblements : le 26/12/2001 dans l'estuaire de la Vilaine, 313 ; dans l'anse de Baden, le 26/12, 164 et 159 le 15/02 ; 25/02 à la pointe des Sept-Îles / Baden, 86 ; 177 le 22/07 en baie de Plouharnel, l'espèce est suivie à Crac'h et Locmariaquer (tableau) ;

dates	Effectif	12/12	16
12/12	68	24/12	32
24/12	69	31/12	19
31/12	57	09/01	57
09/01	36	30/01	6
15/02	62	15/02	6
étang du Roc'h Du / Crac'h		Kerouarc'h / Locmariaquer	


*Tadorne de Belon (Morbihan) ;
décembre 2001-février 2002*

les vasières de Locoal-Mendon sont régulièrement fréquentées (tableau) ce qui n'exclut pas l'espèce de la rive ouest de l'Intel, le 10/01, 13 à Beg er Vil / Plouhinec, 56 à Beg er Vil en Saint-Hélène et 46 à Pont er Lann / Sainte-Hélène ; les Tadornes de Belon de la

dates	Effectif
17/11	45
08/12	66
19/12	134
01/01	118
13/01	13
06/02	153

*Tadorne de Belon, vasière de
Keriguénen / Locoal-Mendon
(Morbihan), hiver 2001-2002*

rade de Lorient se concentrent dans la Petite Mer et sur les vasières et herbues du Blavet.



Tadorne de Belon dans la Petite Mer de Gâvres (Morbihan) ; décembre 2001 – mars 2002

*Tadorne de Belon, Blavet m. rit me
/ Locmiquélic (Morbihan),
hiver 2001-2002*

dates	Effectif
12/12	66
09/01	16
27/01	56
19/02	34
09/03	76


Dès le mois de février des cantonnements sont amorcés : un couple sur le bassin d'épuration de Locoal-Mendon le 18/02, un couple à l'étang du Cranic le 21/02, un autre à Branguren / Muzillac le 24/02 puis deux le 14/03. Un couple se place dans les dunes de Kerminihy / Erdeven le 08/03. Le rassemblement de 32 tadornes au moulin de Pomper le 13/03 compte surtout des couples.

Wetlands International : 5741 dont 3250 dans le Golfe du Morbihan et 1435 dans la baie de Vilaine..

Canard siffleur *Anas penelope*

(27 données)

La principale nouvelle est la restauration d'effectifs notables sur l'étang de Saint-Jean et la rivière d'Etel après quelques saisons basses. Ces bandes de Siffleurs sont cependant dérangées et des comptages répétés nous montrent des résultats fluctuants (graphique). Ils fréquentent aussi les vasières : 105 au Gohen / Sainte-Hélène, le 29/12.



Canard siffleur à Locoal-Mendon (étangs et rivière d'Etel) (Morbihan) ; hiver 2001-2002

Pas d'hivernage sur l'étang de Ploërmel : 3 le 26/12, 13 et 14 individus les 20/01 et 22/01, 2 le 06/03.

Wetlands International : 2520 dont 2405 dans le Golfe du Morbihan.

Canard chipeau *Anas strepera*

(7 données)

- 20/11/2001 et 26/12, 2 sur l'étang au Duc / Ploërmel.
- 15/12, 1 à Kergourio (bassin d'épuration) / Crédin.
- 2 sur les lagunages de Damgan, le 30/12.
- 24/12, 1 étang du Roc'h Du / Crac'h.
- 06/01, 2 au Varquez Rongal (bassin d'épuration) / Plouharnel.
- 21/12, 5 sur l'étang du Ter / Ploemeur.

Wetlands International : 40 dont 33 dans le Golfe du Morbihan.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(49 données)

A part les concentrations de Vannes et Baden (tableau), ce sont surtout des observations dispersées. Font exception à ce constat les suivis effectués sur des pièces d'eau autour de la rivière de Crac'h : Roc'h Du et Coët-Courzo.

dates	Effectif		dates	Effectif		dates	Effectif	
26/12	104	étang de Toulvern / Baden	12/12	12	étang du Roc'h Du / Crac'h	24/12	27	moulin de Coët-Courzo / Locmariaquer
15/2	21		24/12	54		31/12	10	
25/2	15		31/12	39		9/1	42	
13/1	170	pointe des émigrés / Vannes	9/1	17				
25/2	70		30/1	16				
			15/2	87				

Sarcelle d'hiver (Morbihan) : hiver 2001 - 2002

On a aussi noté l'espèce aux anciennes salines de Carnac, 32 le 20/12/2001 et 30 le 24/12, sur le Cranic / Landaul durant la seconde quinzaine de décembre (max. 39 le 01/01/2002), au Varquez-Rongal / Plouharnel, 12 le 09/12, 42 le 06/01 et 5 le 20/01, le 26/12 sur le marais de Pen en Toul / Larmor-Baden, 24.

Le 09/03, un chanteur attire l'attention de l'observateur dans la queue de l'étang de Pen Mur / Muzillac.


Wetlands International : 3533 dont 2740 dans le Golfe du Morbihan.

Canard colvert *Anas platyrinchos*

(84 données)

10/12	150	Saint-Jean	Cléguerec
20/1	85	Porh Kerhouet	Erdeven
15/2	85	étang du Roc'h Du	Crac'h
2/2	82	étangs de Branguily	Gueltas
16/1	80	pointe er Hourél	Locmariaquer
24/12	61	Kerouarc'h	Locmariaquer
1/12	52	étang / réserve de chasse	Réguiny
20/1	50	lagunes de Bonnervo	Theix
15/2	48	Pont-Claou (bassin de décantation.)	Baden
28/12	48	plage de Kerouriec	Erdeven

Canard colvert (Morbihan) : hiver 2001 - 2002



Canard colvert, étang du Duc / Ploërmel (Morbihan) : novembre 2001 - janvier 2002

Wetlands International : 6462.

Canard pilet *Anas acuta*

(7 données)

En l'absence des données du Golfe, la liste des observations est très réduite : 28/11/2001, Pen Mané / Locmiquelic, 4 femelles ; 26/12, étang de Toulvern / Baden, 15 dont 9 mâles ; 26/12, marais de Pen en Toul / Larmor-Baden, 1 couple ; 31/12, étang du Roc'h Du / Crac'h, 1 femelle ; 6/3, Branguren / Muzillac, 100 dans une prairie partiellement inondée ; 06/03, Prières / Billiers, 36 dont 17 femelles et 19 mâles s'alimentent ; 09/03, Pen Mané / Locmiquelic, 5.

Wetlands International : 1677 exclusivement entre le Golfe du Morbihan, l'302 et la baie de Vilaine, 375.

Canard souchet *Anas clypeata*

(23 données)

Le 30/12/2001, 30 sur les lagunes de Damgan.

L'espèce est présente un mois au Roc'h Du, deux mois à Bonnervo (tableau). Les autres observations sont isolées... pas de nouvelles du Golfe.

24/12	48	étang du Roc'h Du / Crac'h	13/1	12	lagunes de Bonnervo / Theix
31/12	41		20/1	4	
9/1	41		17/2	35	
30/1	45		24/2	12	
			25/2	12	
			3/3	10	

Canard souchet (Morbihan) : hiver 2001 – 2002


Wetlands International : 855 dont 510 dans le Golfe du Morbihan et 296 dans la baie de Vilaine.

Fuligule milouin *Aythya ferina*


(39 données)

L'hivernage est peu suivi sur l'étang du Ter (94 le 31/11/2001 et 64 le 21/12) et reste très faible à l'étang au Duc à Ploërmel (12 le 20/11 et 7 le 26/12, 21 le 10/01). Par contre, l'étang de Cranic / Landaul affiche des effectifs assez élevés au début de janvier : 112 le 01/01 et 102 le 09/01. Noter 96 individus le 31/12 sur les bassins d'épuration de Poulben / Auray.

C'est entre Theix et Vannes que les Milouins hivernants sont le mieux suivis, avec des effectifs élevés et des indications de répartition des sexes (tableau et graphique).



Fuligule milouin, étang du Duc / Vannes (Morbihan) ; hiver 2001 – 2002--A



Fuligule milouin, étang du Duc / Vannes (Morbihan) ; hiver 2001 – 2002 – B

Une donnée décalée de Bonnervo / Theix: 128 le 20/01.

Wetlands International : 492 dont 256 dans le Golfe du Morbihan, 128 dans la rade de Lorient.

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*

(1 donnée)

Un individu de cette espèce exotique est vu sur les bassins de Pénestin, le 06/02/2002 ; à rapprocher d'une observation restée douteuse à Bonnervo / Theix le 17/02.

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

(38 données)

Aucun hivernage important n'est documenté cet hiver, une unique donnée de 84 individus provient de l'étang du Ter à Ploemeur, datée du 30/11/2001. Le 18/11, 28 au Stum, étangs de Saint-Adrien / Saint-Barthélémy ; au barrage d'Arzal, le 16/02/02, 47. Sur les lagunes de Bonnervo / Theix, 3 le 13/01, 18 le 20/01, 17 le 17/02, 21 le 24/02 et le 25/02, 24 le 03/03, 11 le 10/03.

Wetlands International : 235 dont 167 dans la rade de Lorient.

Fuligule milouinan *Aythya marila*

(6 données)

- arrivées à la mi-novembre, 136 puis 780 à la mi-décembre avant 940 dans l'estuaire de Vilaine le 26/12/2001, 120 le 09/03/02.
- 1 à Kersahu / Gâvres, le 05/01.

Wetlands International : 1090 dans la baie de Vilaine.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

(3 données)

- 24/12/2001 et 16/01/02, pointe er Hourél / Locmariaquer, 1 femelle.
- 21/02, Porh Guerh / Gâvres, 1 mâle de premier hiver.

Wetlands International : 1 en baie de Quiberon.

Harelde boréale *Clangula hyemalis*

(5 données)

Les 21 et 24/11/2001 puis les 18/12 et 09/01/2002, enfin le 07/03, l'observation d'une femelle laisse envisager que s'est déroulé un hivernage sur le Blavet maritime.

Wetlands International : 1 en dans la rade de Lorient.

Macreuse indéterminé *Melanita sp*

(1 donnée)

Le 30/12/2001 à Kervoyal / Damgan, 250 individus.

Macreuse noire *Melanita nigra*

(1 donnée)

Le 09/12/2001 devant Linès / Gâvres 13 individus volent vers l'est. Seule observation ?

Macreuse brune *Melanita fusca*

(1 donnée)

Le 23/12/2001, La Forest / Locoal-mendon, 1 mâle et une femelle.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

(9 données)

- 17/11/2001, 6 et 1 le 06/02/02 à la pointe de l'Istrec / Locoal-Mendon.
- Kerouarc'h : Locmariaquer, 2 le 24/12, 5 le 09/01, 10 le 30/01.
- le 30/01, étang du Roc'h Du / Crach, 1 femelle.
- les 24/02, 25/02 et 03/03, un mâle parade devant une femelle de Morillon, Bonnervo / Theix.

Wetlands International : 268 dont 266 dans le Golfe du Morbihan.

Harle huppé *Mergus serrator*

(24 données)

Des sorties devant la pointe d'Er Hourel permettent de belles observations de Harle huppé : 24/12/2001, 16 ; 31/12, 35 ; 09/01/2002, 72 ; 16/01, 154 ; 30/01, 55 ; 15/02, 14.

Les contacts dans la rivière d'Etel sont rares, maximum de 8 le 02/03 et 10 le 11/03.

Wetlands International : 1780 dont 1486 dans le Golfe du Morbihan et 230 en baie de Quiberon.

Harle bièvre *Mergus merganser*

(1 donnée)

Le 19/12/2001, étang du Cranic / Landaul, 1 femelle pêche en compagnie des Grands Cormorans, puis au repos sur la glace. L'étang est au tiers gelé.

Wetlands International : 1 sur le littoral Guidel-Ploemeur.

AR VRAN MORBIHAN N° 24

Groupe n° 2 Des rapaces aux rallidés

Choix et rédaction établis par Franz URVOAZ

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

(32 données)

Cette espèce est observée sur 12 communes :

Locoal-Mendon, Gâvres, Brec'h, Baden, Crac'h, Plouhamel, Billiers, Ambon, Erdeven, Plouhinec, Muzillac et Fégréac.

A l'exception d'un regroupement de 6 individus le 08/12/2001 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon et qui suggère l'existence d'un dortoir, toutes les observations ne concernent qu'un ou deux individus.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

(6 données)

Les oiseaux sont notés sur les communes suivantes : Camors, Guégon, Sérent, Brandivy, Rieux, Sainte Brigitte.

Observation remarquable : 1 dortoir de 5 individus à Sérent le 02/02/2002.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

(2 données)

1 individu est noté en vol direct le 23/12/2001 à l'étang de la forêt à Brandivy, et 1 mâle immature effectuant une tentative vaine de chasse sur une pie le 06/01/02 au Rohu / Quiberon.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

(17 données)

Ce rapace est noté sur 15 communes à savoir : Gâvres, Languidic, Réguiny, Larmor Plage, Brandérion, Camors, Berné, Nostang, Brandivy, Guégon, Landaul, Sainte Hélène, Crédin, Muzillac, Inzinzac-Lochrist.

Peu de détails fournis quant aux observations, exceptée une femelle poursuivant 1 corneille noire le 22/12/2001 à Berné.

Buse variable *Buteo buteo*

(65 données)

Les données parviennent des 43 communes suivantes : La Chapelle Neuve, Plumelin, Merlévéné, Landévant, Baden, Moréac, Guénin, Radenac, Languidic, Locoal-Mendon, Locmariaquer, Brec'h, Locmiquélic, Crédin, Brené, Camors, Plunéret, Priziac, Crac'h, Brandivy, Baud, Grand-Champ, Pluvigner, Erdeven, Noyal-Pontivy, Sérent, Hennebont, Gueltas, Saint-Nolff, Pluméliau, Arzal, Nostang, Camoël, Ambon, Guégon, Rieux, Kervignac, Belz, Muzillac, Inzinzac-Lochrist, Sainte Brigitte, Bignan et Cruguel.

Les premières parades, les vols en feston sont notés dès la fin de janvier début février : une paire cercle au Porzo / Hennebont le 31/01/2002.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

(43 données)

Les observations concernent 26 communes : La Chapelle Neuve, Baud, Camors, Pluvigner, Moréac, Crédin, Radenac, Remungol, Cléguérec, Locoal-Mendon, Locmariaquer, Saint Philibert, Grand-Champ, Gâvres, Locmiquélic, Noyal-Pontivy, Neuillac, Languidic, Pontivy, Guénin, Saint Barthélémy, Gueltas, Brec'h, Inzinzac-Lochrist, Sainte Brigitte et Muzillac.

Même si ces données sont encore très parcellaires, elles fournissent un aperçu plus juste de l'abondance de ce petit rapace que les six données transmises pour la même période l'année dernière (AR VRAN N° 22). Cette remarque vaut également pour l'espèce traitée précédemment : La Buse variable (uniquement dix observations transmises pour AR VRAN N° 22)

Faucon émerillon *Falco columbarius*

(3 données)

Les deux premières données concernent Kerminihy-Le Cosquer / Erdeven les 25/11 et 10/12/2001. Plus tard, on note seulement un individu perché sur un piquet dans les marais du Robeaux à Rieux le 22/02/02.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(5 données)

L'oiseau est noté dans 4 communes : Baud, Bâden (étang de Toulvern), Locmariaquer et Erdeven. A Baud, l'individu hiverne autour de la carrière de Quinipily. A Locmariaquer, le 31/12/2001, un juvénile tente une attaque sur les huîtres pies stationnés sur les Bourésaux. L'observation d'un immature le 10/03 à Kerouriec / Erdeven intéresse probablement un migrateur puisque l'espèce n'avait pas été précédemment détectée.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

(1 donnée)

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(3 données)

Ces observations sont effectuées à l'étang de Pont Caden / Surzur le 18/11/2001 et sur la queue de l'étang de Pen Mur à Muzillac le 09/03/02.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

(24 données)

Observations faites sur 15 communes : Brandivy, Crédin, Plouharnel, Cléguérec, Brec'h, Carnac, Larmor Baden, Saint Gérard, Sainte Brigitte, Neuillac, Noyal-Pontivy, Bignan, Ambon, Lanouée et Muzillac.

Quelques observations intéressantes :

- 15 individus à la station d'épuration de Plouharnel le 09/12/2001.
- 7 individus sur un bief du canal de Nantes à Brest à Saint-Gérard le 07/01/02.
- 8 individus sur les étangs du Roz à Neuillac le 24/01.
- 6 individus à la station de lagunage de Lanouée le 07/03.
- 5 individus à l'étang de la forêt à Brandivy le 02/03.

Foulque macroule *Fulica atra*

(79 données)

Liste des 27 communes d'où proviennent ces données : Locoal-Mendon, Theix, Saint Barthélémy, Ploërmel, Locmiquélic, Brec'h, Baden, Régigny, Crédin, Remungol, Plouharnel, Erdeven, Cléguérec, Crac'h, Brandivy, Locmariaquer, Larmor Baden, Priziac, Damgan, Arzal, Vannes, Neuillac, Gueltas, Billiers, Ambon, Sérent et Camoël.

Observations les plus remarquables :

- étang de Toulvern / Baden : 875 le 26/12/2001 puis encore 650 le 25/02/02.
- lagunage de Bonnervo / Theix : 500 le 24/02.
- Pen Mané/ Locmiquélic : 562 le 21/11.
- étang du Roc'h Du / Crac'h : 429 le 12/12.
- étang de Saint Jean / Locoal-Mendon : 1531 le 13/01.
- étang au Duc / Ploërmel : 182 le 10/01.

Il est à noter que les chiffres pour la vasière de Tascon / Saint Armel ainsi que ceux concernant Quélisoye / Larmor Plage n'ont pas été communiqués.

Wetlands International : 10095.

AR VRAN MORBIHAN N° 24

Groupe n° 3 De l'Huîtrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Yannick Ordureau

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

(4 données)

Très peu de données au regard des années antérieures. Le 13/12/2001, observation de 134 individus sur l'île Tilic à Portivy / Saint-Pierre Quiberon. Le 07/01/02, 93 à Banastère / Le Tour du Parc et 150 le 24/01 à Portivy / Saint-Pierre Quiberon.

Wetlands International : 1904 dont 1002 dans la baie de Vilaine.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(21 données)

De nombreuses données à Camoël : 100 individus le 20/11/2001 dont 3 bagués, 80 le 11/12, 63 le 19/01 et 70 le 16/02.

On note d'importantes concentrations :

- 626 sur la vasière au Moustoir / Arzal le 26/12
- 800 à la Pointe du Moustoir / Muzillac le 19/01
- à Toul Coquenn / Muzillac, 340 le 16/12 et 339 le 9/03

Wetlands International : 2121 dont 1247 dans la baie de Vilaine et 871 dans le golfe du Morbihan.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

(30 données)

Un rassemblement de 150 individus le 20/01/2002 à Linès / Gâvres et 24 individus à la Pointe er Hourel / Locmariaquer le 24/12 et le 09/01. Ces données ne sont aucunement significatives de la présence du Grand Gravelot sur la côte du Morbihan.

Wetlands International : 2806 dont 929 dans le golfe du Morbihan et 720 dans la rade de Lorient.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

(8 données)

Une concentration de 1800 individus est notée le 17/01/2002 le long de l'axe Pontivy-Josselin, 350 le 21/11/01 à la Pointe / Guégon et 60 à Linès / Gâvres le 20/01/02.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

(2 données)

Le 20/01/2002 un regroupement de 650 individus est observé à Linès / Gâvres.

Wetlands International : 3428 dont 2409 dans le golfe du Morbihan et 654 dans la rade de Lorient.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

(33 données)

Sur le littoral :

- 100 le 25/11/2001 à Gravigne / Belz

- 400 le 30/12 à Damgan
- 100 le 13/01/02 à la Pointe des Emigrés / Vannes
- 340 le 23/01 au Moulin de Pomper / Baden
- une alarme avec parade le 11/03 à Ty Rhu / Locoal Mendon ; ce couple se reproduira sur ce site

A l'intérieur du département :

- 100 le 21/11 à la Pointe / Guégon
- 460 le 24/11 à Bocneuf / Lanouée
- 218 le 24/11 à Saint - Allouestre / Guégon
- 2000 le 17/01 à Josselin

Wetlands International : 3428.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

(1 donnée)

123 individus observés le 07/01/2002 à Banastère / Sarzeau.

Wetlands International : 231 dont 173 dans le golfe du Morbihan.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

(14 données)

C'est encore dans la presqu'île de Quiberon que les observations les plus importantes sont signalées : 300 le 13/12/2001 à Portivy / Saint Pierre - Quiberon et plus de 200 le 29/12.

Wetlands International : 1383 dont 753 en baie de Quiberon.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(8 données)

- presqu'île de Quiberon : 10 le 13/12 à Beg er Goalenec / Quiberon.
- le même jour, 55 devant Portivy / Saint-Pierre Quiberon : 44 sur Roh Vidic Braz, 6 sur l'île Tilic et 5 à Beg en Aod.
- 26/12 à la Pointe de Loscolo / Pénestin, 7 et 3 au Maresclé / Pénestin.
- 3 à Porh Kerhouet / Erdeven, le 20/01/02.

Wetlands International : 33.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(21 données)

Quelques rassemblements:

- 250 le 17/11 à Lédec Négua / Locoal Mendon
- 272 le 24/12 à Courzo / Locmariaquer
- 147 le 28/12 en reposoir à la Roche Sèche / Erdeven
- 500 le 09/01 en reposoir à la Pointe Er Hourel / Locmariaquer
- 2800 le 20/01 à Linès / Gâvres

Wetlands International : 36 806.

Combattant varié *Philomachus pugnax*

(1 donnée)

Le 24/02/2002 une observation de 2 individus à Branguren / Muzillac

Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus*

(2 données)

Un individu observé à la Tourbière de Kerfontaine / Sérent le 04/02 et le 07/02/2002.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

(27 données)

De nombreuses observations et des effectifs intéressants :

- 7 le 16/11/2001 à Lann er Groëz / Riantec.
- 12 le 18/11 dans les lagunes de Bonnervo / Theix.
- 42 le 28/11 puis 27 le 26/12 au Moulin de Pomper / Baden.
- 16 le 08/12 à Pen Mané / Locmiquélic.
- 15 le 22/12 à Lann er Groëz / Riantec.
- 10 le 09/03/02 à Branguren / Muzillac.

Wetlands International : 37.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

(7 données)

Les données concernent en majorité des individus isolés :

- deux individus en vol sont observés le 21/11 à Quinipily / Baud.
- le 09/12/2001 dans la forêt de Floranges / Camors, 1.
- le 16/12 à Mané Bos / Lanester, 1 au crépuscule traverse le rond-point routier.
- le 06/01/02 à Bodavel / Camors, 1.
- le 10/03 dans les bois de Trémolin / Inzinzac-Lochrist.
- 1 à Kergorec / Moréac, janvier 2002.
- 1 à Kernevenin / Moréac, février 2002.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

(6 données)

Des données plus importantes que les années précédentes : 32 individus le 26/12/2001 à Pen en Toul / Baden, 25 le 19/01 et 20 le 09/03/02 à la Pointe du Moustoir / Muzillac.

Wetlands International : 782 dont 724 dans le golfe du Morbihan.

Barge rousse *Limosa lapponica*

(1 donnée)

Une cinquantaine, le 09/03/02, à la pointe du Moustoir-Toul Coquenn / Muzillac.

Wetlands International : 95 dont 66 en baie de Quiberon.

Courlis cendré *Numenius arquata*

(24 données)

- 121 le 23/11/2001 dans l'anse du Bronzais / Pénestin
- 19 le 05/01/02 à Kersahu / Gâvres.
- 65 le 10/01 à Beg er Vil / Sainte-Hélène.
- 14 le 19/02 à Sterbouest / Locmiquélic.
- 9 le 06/03 à Branguren / Muzillac.

Wetlands International : 970.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

(2 données)

Un passage de nuit de 8 individus le 07/01/2001 à Suscinio / Sarzeau. Un individu entendu le 10/03 dans le centre ville de Muzillac.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

(20 données)

Aucune observation indiquant de fortes concentrations :

- 44 le 08/12/2001 à er Huënnic / Locoal Mendon.
- 18 le 26/12 à l'étang de Toulvern / Baden.
- 33 le 19/02 à Pen Mané / Locmiquélic.

Wetlands International : 752 dont 260 dans la baie de Vilaine. et 208 dans le golfe du Morbihan.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

(15 données)

Un nombre de données très supérieur à ceux des années précédentes (1 en 2000-2001, 4 en 2001-2002) : l'hivernage est de la sorte établi à l'étang du Roc'h Du, maximum de 21 le 12/12/01 et encore 8 le 15/02/02 ; dans la rivière d'Étel, un séjour en décembre - janvier à er Huënnic / Locoal-Mendon de 2 à 3 individus ; à l'extrémité nord-ouest du Golfe : 14 le 28/11 au Moustoir / Arradon, 4 et 11 les 26/11 puis 23/11 au moulin de Pomper / Baden ; sur la rade de Lorient, 6 individus descendent vers Sterbouët / Locmiquélic le 21/11 et 4 le 12/12.

Wetlands International : 18.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

(17 données)

Tout comme pour le chevalier aboyeur, une nette augmentation du nombre des données (2 en 2000-2001, 4 en 2001-2002) . Les données concernent surtout des individus isolés :

- 01/12, sablière de Quillan / Radenac, 1 sur un ancien bassin de décantation des boues.
- 09/12, Varquez Rongal (bassin d'épuration) / Plouharnel, 2 puis 3 le 06/01.
- 12/12/2001, étang du Roc'h Du, Crac'h, 1.
- 26/12, le moulin de Pomper / Baden, 4.
- 30/01/02, étang du Cranic / Landaul, 1.
- 18/02, er Varquez / Erdeven, 1 et le 09/03, 1.
- 09/03, marais de Kergenêts / Surzur, 2.
- 10/03, lagunes de Bonnervo / Theix, 1.

Un individu est observé du 07/01/2001 au 29/01 à Le Couédic / Saint Gérard. 1 à 2 individus hivernent à Quinipily / Baud, la présence est notée de mi-novembre au 01/04/02. Wetlands International : 2.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

(16 données)

8 individus sont observés le 28/11/2001 au Moustoir / Arradon, 2 le 08/12 à Kériguénen / Locoal - Mendon et 2 le 09/01/2002 à Sterbouët / Locmiquélic. Les autres observations ne concernent que des cas isolés. Wetlands International : 16.

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres*

(7 données)

150 individus observés le 13/12/2001 à Portivy / Saint-Pierre Quiberon, 40 le 13/12 à Beg en Aud / Saint-Pierre Quiberon et 22 le 13/12 à Roh Vidic Braz / Saint-Pierre Quiberon. Wetlands International : 847.

AR VRAN MORBIHAN N°24

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Yann Kerninon

La période en chiffres : 10 observateurs ont transmis un total de 109 données concernant 11 espèces.

Répartition des données pour la période du 16/11/2001 au 15/03/2002

	Nov. (du 16 au 30)	Décembre			Janvier			Février			Mars (du 01 au 15)
		1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	
Nbre de données	17	10	8	15	6	7	15	4	8	6	13
Nbre d'espèces	7	5	6	8	4	4	7	2	5	4	6
Laridés spe	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
M. mélanocéphale	2	-	1	3	-	1	1	-	1	-	1
Mouette pygmée	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Mouette rieuse	2	1	3	-	-	1	2	3	4	2	4
Goéland cendré	2	1	1	1	2	3	1	-	-	-	2
Goéland brun	3	3	-	2	1	2	3	1	1	2	2
Goéland argenté	1	2	-	1	-	-	2	-	1	1	3
Goéland marin	1	-	1	1	-	-	2	-	1	-	1
Mouette tridactyle	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
Sterne caugek	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Alcidés spe	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Guillemot de Troil	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Pingouin torda	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-

Stercorariidae sp.

(0 donnée)

Laridae sp.

(3 données)

Dans l'intérieur du département, le 01/12/2001, 702 grisards dans un groupe de 1 553 goélands en reposoir sur un champ à Talhouët-Lojan / Moréac et 105 sur l'étang de Régigny.

Sur le littoral, le 30/01/02, vaste rassemblement de 17 000 laridés à Kervoyal-Pénerf / Damgan (en majorité des *L. argentatus*).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

(10 données)

9 individus le 27/11/2001 au Moulin de Pomper / Baden et, proche de là, 3 le lendemain sur la vasière du Moustoir / Arradon. Pour le reste de la période, l'espèce a surtout été détectée à l'unité sur trois sites : Portivy / Saint-Pierre-Quiberon, Penvins / Le Tour-du-Parc, Conleau / Vannes et Le Moulin de Pomper / Baden.

Mouette pygmée *Larus minutus*

(3 données)

3 observations de fin décembre seulement : 5 mouettes à Kervoyal / Damgan et 2 à Penvins / Le Tour-du-Parc le 29/12/2001, et 1 sur les lagunes de Damgan le 30/12.

Mouette de Sabine *Larus sabini*

(0 donnée)

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(22 données)

Le plus grand rassemblement rapporté concerne l'étang au Duc / Ploërmel avec 7 000 mouettes le 20/11/2001.

Un seul site est visité assez régulièrement pour évoquer l'évolution des effectifs au cours de la période. Les chiffres de l'étang du Crannic / Brec'h montrent que l'espèce devient plus abondante durant la seconde partie de la période :

19/12/01	30/01/02	06/02/02	21/02/02	09/03/02
25	64	83	96	212

Mouettes rieuses sur l'étang du Crannic / Brec'h (Morbihan) ; hiver 2001-2002

In extenso, les effectifs dépassant la centaine d'individus (notons, là aussi, leur fréquence plus grande en février et mars) :

- 102 le 12/12 sur le réservoir de Tréauray / Brec'h.
- au moins 165 le 03/02 sur les lagunes de Bézit et de Bonnervo / Theix.
- 125 le 15/02 à l'étang du Toulvern / Baden.
- 436 le 15/02 à l'étang du Roc'h Du / Brec'h.
- 350 le 19/02 à l'étang des Basses Landes / Sérent.
- 150 le 24/02 sur les lagunes de Damgan.
- et au moins 450 le 06/03 sur une prairie inondée à Branguren / Muzillac.

Goéland cendré *Larus canus*

(13 données)

L'espèce est présente tout au long de la période (même si février ne fournit aucune donnée) et sa répartition ne témoigne peut-être que de l'habitude de quelques observateurs à visiter leurs sites privilégiés. Retenons :

- 25 le 24/11/2001 à Lann er Groëz / Riantec.
- 33 le 27/11 au Moulin de Pomper / Baden.
- 14 le 04/01/02 entre l'Île Saint-Léon et Lann er Groëz / Riantec.
- 16 le 09/03 à Lann er Groëz / Riantec.
- 35 le 13/03 au Moulin de Pomper / Baden.

Les autres données concernent de 1 à 5 individus et évoquent en plus les sites suivants : Kervourden / La Trinité-sur-Mer, Kerouarc'h et la Pointe er Hourél / Locmariaquer, Lédec Néguan / Locoal-Mendon.

Goéland brun *Larus fuscus*

(20 données)

Les reposoirs et les dortoirs les plus importants restent l'apanage de la ria d'Étel : 57 dans l'anse de l'Istrec / Locoal-Mendon le 17/11/2001. Le dortoir situé dans l'anse du Gohen / Sainte-Hélène a été suivi.

dates	01/12	25/12	31/01	02/02	28/02
effectifs	323	418	312	1063	489

Dortoir de Goéland brun, rivière d'Etel (Morbihan) : hiver 2001-2002

Le suivi des effectifs de l'étang au Duc de Ploërmel donne le tableau suivant :

20/11/01	26/12/01	10/01/02	20/01/02	22/01/02	06/03/02
46	6	10	49	110	25

Goéland brun, étang au Duc / Ploërmel (Morbihan) : hiver 2001-2002

Autre site intérieur apportant une donnée, Talhouët-Lojan / Moréac où 38 Goélants bruns adultes sont comptés dans un rassemblement de plus de 1 500 laridés le 01/12/01.

Goéland argenté *Larus argentatus*

(8 données)

- le 01/12/2001, 832 adultes en reposoir avec d'autres laridés à Talhouët-Lojan / Moréac, auxquels on peut ajouter les 47 individus comptés peu de temps auparavant à l'étang de Réguieny,
- le 25/01/02, 500 en vol à Kergollaire / Languidic, passage pouvant être rapporté aux mouvements pendulaires quotidiens qu'effectue un grand nombre de laridés entre les reposoirs littoraux et les sites intérieurs de gagnage.

Un individu de la race type *L. a. argentatus* (nicheur en Scandinavie et près de la Baltique) est déterminé dans un dortoir à Banastère / Le Tour-du-Parc le 31/12/01.

Goéland leucopée *Larus cachinnans*

(0 donnée)

Goéland marin *Larus marinus*

(7 données)

En s'éloignant du trait de côte, notons : 1 individu le 19/12/2001 à l'étang du Crannic / Brec'h (mange un poisson « on the rock » ; étang au tiers gelé), 2 à 3 individus sur l'étang à marée du Roc'h Du / Crac'h entre le 31/12/01 et le 15/02/02.

Avec d'autres laridés en reposoir, 5 le 31/12/01 dans l'anse de l'Istrec / Locoal-Mendon.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

(3 données)

Deux données de cadavre échoué :

- un juvénile trouvé le 24/01/2002 à Penthievre / Saint-Pierre-Quiberon.
- et un individu découvert le 23/02 entre la pointe du Moustoire et Toul Coquen / Muzillac.

Sinon, un juvénile est observé au Varquez / Erdeven le 28/01, soit à 3,5 kilomètres de la laisse de mer la plus proche.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(10 données)

Que penser de l'absence de donnée entre janvier et mars ?

C'est aux abords du Bronzais / Pénestin et du barrage d'Arzal que les plus gros effectifs sont comptés et comme ils ne concernent que le mois de novembre, il s'agit sans doute là de migrants tardifs : 33 le 22/11/2001 (1 site) et 77 le 23/11 (3 sites).

Les hivernants existent pourtant bien avec 14 sternes le 20/12 à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon et 14 le 23/12 en ria d'Étel à La Forest / Locoal-Mendon.
Les autres données ne concernent, comme souvent, pas plus de 3 individus.

Guillemot de Troïl *Uria aalge*

(2 données)

Deux données en provenance du site de Beg er Goalennec / Quiberon : 1 individu le 20/12/2001 et 1 mazouté le 01/01/2002.

Pingouin torda *Alca torda*

(3 données)

Trois données d'oiseaux vivants et apparemment en bonne santé :

- 6 à 8 individus devant la plage de Kerminihy / Erdeven le 30/12/2001.
- 1 en vol, puis posé, devant Beg en Aud / Saint-Pierre-Quiberon le 02/01/02.
- et 2 près de l'estran rocheux de La Roche Sèche / Erdeven le 06/01.

AR VRAN MORBIHAN N° 24

Groupe n°5 Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick PHILIPPON

Pigeon colombin *Columba oenas*

(1 donnée)

3 individus sur un chaume de maïs le 02 février 2002 à Branguily / Gueltas

Pigeon ramier *Columba palumbus*

(12 données)

Un regroupement de 650 le 12/01/2002 à Lann Pontual / Plumeliau. D'autres groupes sont remarqués à Saint-Gérand (46 le 07/02) et Brandivy (44 en vol le 19/01). Noté également sur le littoral (Billiers, Muzillac). Présent lors des recensements Avifaune Forestière des 09/12/01 et 09/03/02 (Camors, Floranges et Trémelin, forêt de Quénécan).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

(3 données)

Noté lors du recensement Avifaune Forestière en forêts de Camors, Floranges et Trémelin, forêt de Quénécan. Un groupe de 12 est vu le 10/02/2002 sur un fil électrique à Goh Locoal / Camors.

Effraie des clochers *Tyto alba*

(1 donnée)

Chevêche d'Athéna *Athena noctua*

(3 données)

Un recensement probablement partiel sur 3 sites connus sur la commune de Locoal-Mendon (le Minihiy, le Moustoir et Porh-Kerio) donne, après repasse, 1 seul chanteur à Le Moustoir le 02/03/2002.

Chouette hulotte *Strix aluco*

(6 données)

Brandivy, Camors, Locoal-Mendon, Sérent, Vannes abritent des chanteurs particulièrement en février et début mars 2002.

Hibou moyen duc *Asio otus*

(1 donnée)

Un chanteur le 08/03/2002 à Le Branhoc / Locoal-Mendon

Hibou des marais *Asio flammeus*

(8 données)

L'hivernage d'au moins un individu s'est déroulé cette année sur l'île Kerner / Riantec

du 16/11/2001 au 13/03/2002, il y en a 3 le 19/12. 1 individu en vol (proche du pare-brise) le 13/02/02 à La Chatouillette / Guillac.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

(1 donnée)

1 donnée très précoce d'un chanteur en forêt de Branguily / Gueltas le 04/03/02 fera l'objet d'une note circonstanciée.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(24 données)

Hivernage noté sur les sites de Brandivy, Brec'h, Cleguerec, Erdeven, Kervignac, La Trinité-sur-Mer, Larmor-Baden, Locoal-Mendon, Locmariaquer, Neuillac, Noyal-Pontivy, Reguiny, à raison d'1 individu par observation.

Peut-on noter un faible passage à partir de la seconde quinzaine de février avec 2 individus se pourchassant bruyamment sur les étangs de Coëtrivas / Kervignac (19/02/2002) et la Forêt / Brandivy (21/02 et 02/03).

Pic vert *Picus viridis*

(13 données)

Vu, entendu, lors des opérations de recensement en forêt de Camors, Floranges, Quénécan et Trémelin les 09/12/2001 et 09/03/2002.

Pic noir *Dryocopus martius*

(3 données)

Observé (et noté) uniquement en 2 endroits différents de la forêt de Camors pour cette période.

Pic épeiche *Dendrocopos major*

(11 données)

Contacté sur 7 communes en différents lieux (Baden, Brandivy, Camors, Larmor-Baden, Neuillac, Pont-Scorff, Saint-Gérard).

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(1 donnée)

1 individu le 24/12/2001 à la Pointe er Hourel / Locmariaquer. Le site de Lorient serait-il déserté ?

Alouette lulu *Lullula arborea*

(7 données)

Noté sur 5 communes (Berné, Locoal-Mendon, Moréac, Saint-Laurent sur Oust, Sérent). 11 à 13 individus sont présents les 06/01/02 et 12/02 dans le même champ à Kervenennin / Moréac (chaumes nus). 3 chanteurs le 13/02 dans le bourg de Saint-Laurent sur Oust.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

(6 données)

Le site régulier d'hivernage de Stungrenn / Moréac (plateau agricole ouvert) regroupe 60 à 70 individus le 16/12/2001 ; une autre troupe de 20 oiseaux est à Branguily / Gueltas le 02/02/2002 .

Noté dans le bois de Trémelin / Inzinzac-Lochrist lors du recensement forestier (10/03/02).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

(1 donnée)

La seule et unique donnée concerne le premier migrateur de retour d'Afrique ; le 13/03/2002 à l'anse de Mancel / Séné.

Pour mémoire, les 3 premières étaient à Lorient le 03/03/01.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

(5 données)

Les bandes sont vues surtout en janvier : 35 le 20/01/2002 à Porh Kerhouet / Erdeven, 2 groupes de 10 et 12 le 29/01 en deux endroits de Saint-Gérard. 12 le 02/02 au bassin d'épuration de Crédin et enfin plus de 20 le 09/03 à Branguren / Muzillac.

Pipit maritime *Anthus pretosus*

(2 données)

1 bagué le 02/12/2001 à Penvins / Sarzeau et 1 à Portivy / Saint-Pierre Quiberon le 09/12.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

(26 données)

Notée en 16 endroits différents du département aussi bien sur le littoral (Ambon, Auray, Locmiquélic, La Roche-Bernard, Plouharnel) qu'en ville (Ploërmel, Vannes) et dans l'intérieur (Languidic, Baud, Brandivy, Crédin, La Chapelle-Neuve, Neuillac, Noyal-Pontivy, Saint-Gérard, Sainte-Brigitte), le plus souvent par 2 individus.

A noter une bande de 8 le 09/02/002 à l'étang de la Forêt / Brandivy.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

(12 données)

Les rassemblements crépusculaires, dortoirs et pré-dortoirs sont remarqués à Brandivy, Brandérion (Boul-Sapin : 250 le 22/01/2002), Lorient (plusieurs centaines le 25/02), Neuillac, Plouharnel, Pluvigner (82 le 17/11/2001).

Le dortoir de Vannes se forme dès le 13/10/01 (plusieurs centaines). Il éclate en différents sites ensuite.

Bergeronnette grise de Yarell *Motacilla alba*

(18 données)

Hormis le groupe de 35 le 13/10/01 à Vannes, toutes les données concernent 1 ou 2 individus ensemble sur les communes suivantes : Camors, Malgouet, Neuillac, Plouharnel, Pluvigner, Saint-Gérard, Sérent.

Dernière donnée : 1 le 09/03/02 à Branguren / Muzillac.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

(10 données)

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

(7 données)

Premier chant complet le 23/01/2002 à Bodavel / Camors.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (10 données)

Un nid avec couveur le 15/03/2002 à la Rougeraie / Lanouée. Ces espèces sont notées lors des recensements des ZNIEFF morbihannaises et de l'Avifaune Forestière (forêts de Camors, Floranges, Inzinzac-Lochrist, Sainte-Brigitte).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (3 données)

L'espèce est notée hivernante pendant la deuxième quinzaine de décembre à Gâvres, Neullac et Vannes

Tarier pâtre *Saxicola torquata* (6 données)

A raison d'1 ou 2 mâles par observation, l'espèce est hivernante en janvier 2002 à Camors, Locoal-Mendon, Locmariaquer, Plouharnel, Quiberon. Poursuite entre 2 mâles chanteurs pour une femelle le 21/02/02 à Mât Fenoux / Plouhinec

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (1 donnée)

Malgré une recherche attentive sur les dunes de Kerminihy / Erdeven le 08/03/02, aucun migrateur n'est encore arrivé.

Merle noir *Turdus merula* (11 données)

16 ensemble en bande lâche au bord d'un champ le 17/11/2001 à Lann Plumelin / Plumelin.

Grive litorne *Turdus pilaris* (31 données)

La première bande de 50 individus est vue le 01/12/2001 au bassin d'épuration de Crédin. La première vague de migrants arrive autour du 15/12/01 avec plus de 100 grives vues le même jour en 3 endroits différents (Noyal Pontivy, Crédin et Camors). Hormis un groupe de 150 individus le 15/01/02 à Kerassio / Languidic, les 15 données concernant l'hivernage (janvier et février) portent sur de très petits groupes (1 à 12 individus) sur les communes de Brandivy, Camors, Languidic, Saint-Gérard, Saint-Laurent sur Oust (12 le 13/02), Saint-Thuriau.

La migration pré-nuptiale est notée dès le 07/03 à la Ville Gleuhiel / Guégon avec 100 individus, se poursuivant dans la première quinzaine du mois (groupes de 15 à 60) individus dans l'est du département.

A noter un chanteur le 10/03/02 à Fégréac (35)

Grive musicienne *Turdus philomelos* (15 données)

Notée lors des recensements forestiers. Pas de rassemblements avec d'autres turridés. Des chanteurs sont signalés dès le 16/01/2002.

Grive mauvis *Turdus iliacus* (34 données)

Le traditionnel passage de novembre n'est pas noté cette année. L'hivernage est noté

principalement à l'intérieur du département sur 13 communes (Baud, Berné, Brandivy, Camors, Cléguerec, Erdeven, Languidic, Neuillac, Noyal-Pontivy, Saint-Malo des Trois Fontaines, Saint-Tugdual, Saint-Gérard, Sainte-Brigitte) par groupes de 15 à 90 individus. Dès le 12/02/2002 un chanteur est contacté à Kergal / Languidic. Le 02/03, plus de 20 chanteurs sont contactés sur Berné (forêt de Pontcallek) en 4 points différents. Le recensement Avifaune Forestière du 10/03 permet également d'apprécier leur chant. La migration prénuptiale est remarquée à Guer (55 en vol vers le Nord le 07/03 au dessus du centre ville) et à Kergal / Languidic entre le 12 et le 15/03 (troupes différentes chaque jour sur le même site : de 25 à 50 individus)

Grive draine *Turdus viscivorus*

(13 données)

Notée lors des recensements forestiers et sur 6 communes.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

(11 données)

6 données concernent l'hivernage sur au moins 3 communes (Brandivy, Brec'h, Locmiquélic) entre le 17/11/2001 et le 22/02/2002. En mars, les chanteurs sont présents sur Baden, Erdeven et Muzillac.

Cisticole des joncs *Cisticola jundicis*

(3 données)

1 seul chanteur le 17/02/2002 à Kersahu / Gâvres et 2 individus sur 2 sites à Locoal-Mendon le 07/03.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

(12 données)

L'espèce est présente tout l'hiver sur neuf communes (Baden, Camors, Guégon, Nostang, Ploërmel, Quiberon, Sainte-Brigitte, Sérent, Vannes). Il s'agit à 95% de mâles observés. Un fréquente les mangeoires à Camors.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

(12 données)

Hiverné à Billiers, Camors, Guégon, Inzinzac-Lochrist, Muzillac, Penestin, Ploërmel, Saint-Thuriau, Sainte-Brigitte et Vannes. Les premières troupes de migrants apparaissent début mars, le 07/03/2002.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

(1 donnée)

1 le 14/03/2002 à Kergurune / Languidic.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

(7 données)

Noté lors des recensements forestiers : Inzinzac-Lochrist, Camors et Sainte-Brigitte.

Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus*

(6 données)

2 le 03/12/2001 à Kerruisseau / Pont Scorff, 2 le 07/01/2002 à la Ville Gleuhuel /

Guégon, 3 à Kergall / Languidic du 27/01 au 08/02 puis 4 le 28/02.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

(0 donnée)

Pas de donnée pour cet hiver.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

(11 données)

Plusieurs rondes (12 le 23/12/2001 à l'étang de la forêt / Brandivy) et encore 17 le 02/03/2002 au même endroit.

Mésange nonnette *Parus palustris*

(6 données)

Du 22/12/2001 au 19/02/2002, un individu (à chaque observation) fréquente les mangeoires à Camors, Neuillac, Saint-Gérard.

Mésange huppée *Parus cristatus* (3 données). Mésange noire *Parus ater* (3 données)

Mésange bleue *Parus caeruleus*

(10 données)

10 se succèdent le 27/12/2002 à une mangeoire à Bodavel / Camors.

Mésange charbonnière *Parus major* (12 données); Sittelle torchepot *Sitta europea* (3 données).

Ces espèces sont notées lors des recensements des ZNIEFF morbihannaises et de l'enquête Avifaune Forestière (Camors, Floranges, Inzinzac-Lochrist et Sainte Brigitte).

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

(11 données)

Présent de décembre 2001 à février 2002 à Baden (étang de Toulvern), Brandivy (étang de la forêt) et Saint-Gérard (le Couëdic)

Noté lors des recensements Avifaune Forestière de Inzinzac-Lochrist et SainteBrigitte le 10/03/02.

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

(8 données)

Pie bavarde *Pica pica*

(7 données)

11 le 23/12/2001 à Pratel Locoal /Camors et 23 le 09/02/2002 à l'étang de la forêt / Brandivy.

Choucas des tours *Corvus monedula*

(5 données)

33 le 15/12/01 en compagnie de Freux à la Ville Glais / Crédin. 1 individu est constamment avec un couple de pie du 05/03 au 15/03/02 à Kergurune / Languidic.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

(5 données)

Hivernage marqué cette année dans la moitié nord du département, débutant par 3 individus le 18/11/2001 au bourg de Guégon. Puis 27 le 15/12/2001 à la Ville Glais / Crédin (avec des Choucas) et au moins 46 le 02/02 au même endroit. Enfin 28 le 24/01 et 41 le 07/02 sur des chaumes de maïs à Coët Nostra / Saint-Gérard.

Corneille noire *Corvus corone*

(12 données)

Des rassemblements relativement importants sont notés :

- 41 le 17/11/2001 et 95 le 12/12 sur l'estran à Sterboust / Locmiquelic.
- 42 le 01/12 à la sablière de Quillan / Radenac
- 285 le 09/12 route de Guipry en baie de Vilaine

Espèce notée lors des recensements des ZNIEFF morbihannaises et Avifaune Forestière (Camors, Floranges, Inzinzac Lochrist et Sainte-Brigitte).

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

(4 données)

Construction d'un nid le 18/02/2002 à la Ville Gleuhel / Guégon et un transport de nourriture le 10/03 à Locmaria / Nostang.

Moineau domestique *Passer domesticus*

(1 donnée)

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

(11 données)

150 le 17/11/2001 à Lann Plumelin / Plumelin, 100 à 150 le 22/12 à Tromelin / Berné et 80 le 20/01/2002 à l'étang des Basses Landes / Sérent. Présent lors des recensements forestiers.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

(8 données)

Le premier est vu parmi la bande de 150 Pinsons des arbres le 17/11/2001 à Lann Plumelin / Plumelin. 3 le 19/12/01 à Trémeler / Neuillac. 150 le 20/01/2002 à l'étang des Basses Landes / Sérent. Noté en petit nombre (1 à 3) lors des recensements en forêts de Camors en décembre 2001 et de Sainte-Brigitte en mars 2002.

Serin cini *Serinus serinus*

(3 données)

5 dont 1 chanteur très expansif le 08/02/2002 à le Couëdic / Saint-Gérard.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

(6 données)

21 à la pointe du Conguel / Quiberon le 02/01/2002 et une autre bande de 50 le 20/01 à l'étang des Basses Landes / Sérent

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

(6 données)

15 le 20/01/2002 à l'étang des Basses Landes / Sérent. 15 le 24/02 à Branguren /

Muzillac.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

(6 données)

Plusieurs petits groupes observés pendant l'hiver : 8 le 10/12/2001 à Trémeler / Neuillac ; 12 le 13/01/2002 à Ménimur / Vannes ; 8 à Lann Dourel / Plumergat présents de fin janvier au 09/03/02.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

(2 données)

150 le 20/01/2002 à l'étang des Basses Landes / Sérent.

Bec croisé des sapins *Loxia curvirostra*

(3 données)

8 à 10 le 09/12/2001 à Coët Fournu / Baud lors de l'opération Avifaune Forestière, forêt de Camors et au moins 1 en forêt de Floranges à la même date. 16 le 07/03/2002 en forêt de Lanouée.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

(7 données)

2 mâles et 1 femelle en erratisme dans un jardin de Vannes le 20/12/2001 ; vus et entendus dans les forêts de Camors, Floranges, Sainte Brigitte.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

(1 donnée)

1 en forêt de Camors le 09/12/2001.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

(10 données)

1 chanteur le 25/02/2002 à la Croix Balais / Sérent. Noté lors de l'opération Avifaune Forestière du 10/03/02 en forêt de Quénécan / Sainte Brigitte et de Trémelin / Inzinzac Lochrist.

Bruant zizi *Emberiza cirlus*

(5 données)

12 le 02/01/02 à la pointe du Conguel / Quiberon

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

(5 données)

10 en dortoir le 24/01/2002 à la tourbière de Kerfontaine / Sérent. Noté début mars en queue d'étang de Pen Mur et à Branguren / Muzillac.

ACTIVITES DU G.O.B. MORBIHAN

INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE DES ZNIEFF MORBIHANNaises (II)

Habitats côtiers et halophiles (2)

SABLIÈRES DU FORT-BLOQUE

Description des milieux :

dunes, landes sèches, dépressions humides.

Intérêts :

oiseaux
flore
insectes

Activités

humaines :
tourisme et loisirs
chasse

Facteurs influençant l'évolution la zone :

surfréquentation et
piétinement

Données recueillies

1998-1999

Niveau de l'inventaire ornithologique

bon

Nombre d'espèces relevé

47

Coordinateur

Pierre Corlou

Espèces nicheuses

Déterminantes :

2.

Traquet motteux (0-2) ; Fauvette pitchou (0-4).

Non déterminantes : 36

Canard colvert (0-4) ; *Busard des roseaux* (0-3) ; Epervier d'Europe (0-4) ; Buse variable (0-2) ; Faucon crécerelle (0-3) ; Faucon émerillon (1 individu, sans reproduction avérée en 98) ; Petit Gravelot (0-1) ; *L'anneau huppé* (0-2 ; pas de reproduction avérée) ; Pigeon ramier (0-5) ; Tourterelle turque (0-6) ; Tourterelle des bois (0-4) ; Coucou gris (0-3) ; Chevêche d'Athéna (0-2) ; Alouette des champs (0-10) ; *Hirondelle de rivage* (0-20) ; Pipit farlouse (0-12) ; Pipit maritime (0-10) ; Troglodyte mignon (0-6) ; Accenteur mouchet (0-8) ; Rougegorge familier (0-4) ; Tarier

pâtre (0-4) ; Traquet motteux (0-2) ; Merle noir (0-6) ; Grive musicienne (0-4) ; Grive draine (0-2) ; Bouscarle de Cetti (0-4) ; Fauvette grisette (0-4) ; Pie bavarde (0-4) ; Corneille noire (0-4) ; Moineau domestique (0-6) ; Pinson des arbres (0-6) ; Verdier d'Europe (0-6) ; Linotte mélodieuse (0-10) ; Bruant zizi (0-4) ; Bruant des roseaux (0-2).

Espèces de passage

Déterminantes : aucun.

Non déterminantes : 21.

Grand Gravelot (0-60) ; Pluvier doré (0-10) ; Vanneau huppé (0-15) ; Mouette rieuse (0-50) ; Goéland argenté (0-15) ; Pigeon ramier (0-15) ; Tourterelle turque (0-15) ; Alouette des champs (0-30) ; Pipit farlouse (0-35) ; Pipit maritime (0-30) ; Bergeronnettes grise et de Yarrell (5-20) ; Tarier des prés (0-3) ; Traquet motteux (0-6) ; Merle noir (0-8) ; Gobemouche gris (0-1) ; Pinson des arbres (0-50) ; Verdier d'Europe (0-50) ; Linotte mélodieuse (0-60) ; Bruant des neiges (2 le 11/11/1999) ; Bruant des roseaux (passe en automne par petits groupes 1-8).

Espèces hivernantes

Déterminantes : aucun.

Non déterminantes : 25.

Busard des roseaux (0-4) ; Epervier d'Europe (0-4) ; Buse variable (0-2) ; Faucon crécerelle (0-3) ; *Faucon émerillon* (0-2) ; Pluvier doré (0-10) ; Vanneau huppé (0-15) ; *Mouette rieuse* (0-50) ; Goéland argenté (0-15) ; Alouette des champs (0-30) ; Pipit farlouse (0-35) ; Pipit maritime (0-30) ; Bergeronnette grise (0-20) ; Troglodyte mignon (0-6) ; Accenteur mouchet (0-6) ; Tarier pâtre (0-6) ; Bouscarle de Cetti (0-2) ; Fauvette pitchou (0-2) ; Pie bavarde (0-50) ; Choucas des tours (0-10) ; Corneille noire (0-12) ; Moineau domestique (0-15) ; Pinson des arbres (0-50) ; Verdier d'Europe (0-50) ; Linotte mélodieuse (0-60).

Commentaire ornithologique : la dune sert de terrain de chasse à plusieurs rapaces qui nichent alentours. En cas de forte tempête, des oiseaux stationnés sur la plage y trouvent refuge.

avis du coordinateur de la zone : cette zone est soumise à une forte pression humaine surtout des marcheurs accompagnés parfois de chiens qui occasionnent des dérangements en période de nidification. Il faut compter également avec les VTT et les cerf-volistes. S'y ajoute depuis plusieurs années le stationnement des caravanes (plus de 300 caravanes du 27 juin au 04 juillet 1999).

DUNES ET ANSE DE GÂVRES

Description des milieux : vasière nue, herbiers à posidonies, prés salés, dunes et plage.

Intérêts :

écologique, oiseaux, zones de passage, reproduction et d'alimentation.

Compléments descriptifs :

lagune et flèche de sable.

Facteurs influençant l'évolution la zone :
sport et loisirs de plein-air

Activités

humaines :

activité militaire, loisirs, habitat dispersé.

Données recueillies	1999 à 2002
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	130
Coordinateur	Gw. Derian

Espèces nicheuses 48

Déterminantes : 10

Grèbe castagneux, 1 couple ; Busard des roseaux, 1 couple ; Echasse blanche, 4-12 couples ; Gravelot à collier interrompu, 0-3 couples ; Vanneau huppé, 2-3 couples ; Chevalier gambette, 1-2 couples ; Bergeronnette printanière, 15-20 couples ; Gorgebleue à miroir, 6 couples ; Phragmite des joncs, 50-60 individus ; Fauvette pitchou 4-6 couples.

Non déterminantes : 37

Tadorne de Belon, 18 couples, *Hirondelle de rivage*, 50 couples ; *Traquet motteux*, 1 couple ; *Locustelle tachetée*, *Locustelle luscinioides*, *Rousserolle effarvatte*.

Canard colvert, 2-4 couples ; Faucon hobereau, 0-1 ; Râle d'eau, 1-3 couples ; Gallinule poule-d'eau ; Foulque macroule, 1 couple ; Pigeon ramier ; Tourterelle turque ; Tourterelle des bois, Coucou gris, 2-3 ; Martin-pêcheur d'Europe, 1-3 ; Alouette des champs, 50 ; Hirondelle rustique, 1 couple ; Pipit farlouse, 10-50 couples ; Bergeronnette grise, 1 couple au moins ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ; Rougegorge familier ; Tarier pâle, 10-20 couples ; Merle noir ; Grive musicienne ; Bouscarle de Cetti, 20-40 chanteurs ; Cisticole des joncs, 30-50 individus ; Fauvette grisette ; Pie bavarde ; Corneille noire ; Moineau domestique ; Pinson des arbres ; Verdier d'Europe ; Chardonneret élégant, plus de 10 couples ; Bouvreuil pivoine, au moins un couple ; Linotte mélodieuse, dizaines de couples ; Bruant des roseaux, 1-10 couples.

Espèces de passage 99.**Déterminantes :** aucune.**Non déterminantes : 99**

Bécasseau cocorli, 1-6 ; *Bécassine sourde*, 0-1 ; *Bécassine des marais*, 8 ; *Chevalier sylvain*, 0-2 ; *Mouette pygmée*, 0-60 ; *Mouette de Sabine*, 3 ; *Guifette noire*, 2 ; *Chevalier culblanc*, 13 ; *Tarier des prés*, 10 ; *Phragmite des joncs*, .

Grèbe castagneux, 55 ; Grèbe huppé, 18 ; Grèbe à cou noir, 28 ; Océanite tempête ; Océanite culblanc ; Grand Cormoran, 20-60 ; Aigrette garzette, 160 ; Grande Aigrette, 1 ; Héron cendré, 20 ; Héron pourpré, 1 ; Spatule blanche, 4 ; Canard siffleur, 2 ; Canard colvert, 100 ; Canard pilet, 0-1 ; Sarcelle d'été, 1-11 ; Canard souchet, 4 ; Fuligule milouin, 0-5 ; Fuligule morillon, 1 ; Fuligule milouinan, 1 ; Bondrée apivore, 0-1 ; Busard Saint-Martin, 0-2 ; Epervier d'Europe, 1 ; Balbuzard pêcheur, 0-1 ; Gallinule poule-d'eau ; Foulque macroule, 300 ; Huîtrier pie, 40 ; Echasse blanche, 20-40 ; Avocette élégante, 0-7 ; Petit Gravelot, 0-4 ; Grand Gravelot, 500-1000 ; Gravelot à collier interrompu, 0-2 ; Pluvier argenté, 700 ; Bécasseau maubèche, 1-21 ; Bécasseau sanderling, 100 ; Bécasseau minute, 0-2 ; Combattant varié, 1-40 ; Barge à queue noire, 1 ; Barge rousse, 40-260 ; Courlis corlieu, 30-90 ; Courlis cendré, 120-150 ; Chevalier arlequin, 0-6 ; Chevalier gambette, 30 ; Chevalier aboyeur, 25 ; Chevalier guignette, 30 ; Tournepierre à collier, 20-470 ; Phalarope à bec large, 0-3 ; Labbe pomarin, 4 ; Grand Labbe, 2 ; Mouette mélanocéphale, 4 ; Mouette rieuse, 2600 ; Goéland cendré, 20 ; Goéland brun, plus de 100 ; Goéland argenté, centaines ; Goéland marin, dizaines ; Sterne caugek, 50 ; Sterne pierregarin, 50 ; Sterne arctique, 2 ; Sterne naine, 1 ; Guifette moustac, 1-2 ; Guifette noire, 2 ; Pigeon ramier ; Tourterelle turque ; Tourterelle des bois ; Martinet noir, 100-1000 ; Huppe fasciée, 1 ; Torcol fourmilier, 1 ; Alouette des champs, 100-200 ; Hirondelle de rivage, 100-1000 ; Hirondelle rustique, 100-1000 ; Pipit farlouse, 200 ; Pipit spioncelle, 1 ; Bergeronnette printanière, 20 ; Bergeronnette grise, 20 ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ; Rougegorge familier ; Rougequeue noir, 1 ; Traquet motteux, 20 ; Merle noir ; Grive musicienne ; Locustelle tachetée, 2 ; Locustelle luscinioides, 3 ; Phragmite des joncs ; Pie bavarde ; Corneille noire ; Grand Corbeau, 1 (occasionnel) ; Moineau domestique ; Pinson des arbres ; Verdier d'Europe, dizaines ; Chardonneret élégant, 500 ; Linotte mélodieuse, 500.

Espèces hivernantes 71**Déterminantes :** 6

Aigrette garzette, 160 ; Spatule blanche, 2 ; Bernache cravant, 2200 ; Grand Gravelot, 360-500 ; Pluvier argenté, 670-930 ; Chevalier guignette, 5.

Non déterminantes : 65

Plongeon arctique, 2 ; *Plongeon imbrin*, 2 ; *Grèbe castagneux*, 25 ; *Grèbe huppé*, 8 ; *Grèbe à cou noir*, 67 ; *Tadornes de Belon*, 150-210 ; *Canard siffleur*, 20-60 ; *Canard pilet*, 0-4 ; *Macreuse noire*, 1 ; *Garrot à oeil d'or*, 0-2 ; *Harle huppé*, 4-24 ; *Busard des roseaux*, 2 ; *Faucon émerillon*, 0-1 ; *Foulque macroule*, 50-70 ; *Huîtrier pie*, 20 ; *Avocette élégante*, 0-2 ; *Bécasseau maubèche*, 0-2 ; *Bécasseau sanderling*, 20-80 ; *Bécasseau variable*, 3000-8000 ; *Bécassine sourde*, 0-1 ; *Bécassine des marais* ; *Barge à queue noire*, 7 ; *Barge rousse*, 10-50 ; *Courlis cendré*, 50 ; *Chevalier gambette*, 40 ; *Chevalier aboyeur*, 0-3 ; *Tournepierre à collier*, 20-470 ; *Mouette rieuse* ; *Goéland cendré*, 20-40 ; *Sterne caugek*, 10 ; *Pingouin torda*, 0-6 ;

Hibou des marais, 1-3.

Grand Cormoran, 20-60 ; Grande Aigrette, 1 ; Héron cendré, 20 ; Ibis sacré, 26 ; Buse variable, 1 ; Râle d'eau, 4-7 ; Gallinule poule-d'eau ; Pluvier doré, 45-576 ; Vanneau huppé, 200-1000 ; Goéland brun, plus de 100 ; Goéland argenté, centaines ; Goéland marin, dizaines ; Pigeon ramier ; Tourterelle turque ; Martin-pêcheur d'Europe, 3-5 ; Alouette des champs, 10-200 ; Pipit farlouse, 100-200 ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet, Rougegorge familier ; Tarier pâle ; Merle noir ; Grive musicienne ; Bouscarle de Cetti, 10 ; Cisticole des joncs, 10 ; Pie bavarde ; Corneille noire ; Moineau domestique ; Pinson des arbres ; Verdier d'Europe ; Chardonneret élégant, 100-200 ; Linotte mélodieuse, 100-200 ; Bruant des roseaux, dizaines.

Commentaires :

ornithologique : la Petite Mer offre de réelles capacités d'alimentation et de repos aux périodes intempestives aux limicoles et anatidés. Les anciennes salines de Kersahu et les marais proches accueillent limicoles et passereaux nicheurs.

avis du coordinateur de la zone : zone à protéger ! les assecs précoces à Kersahu compromettent les nidifications palustres. Le dérangement par les activités nautiques s'intensifient avec la pratique du Fly Surf sur la ZPS.

Le marais du Dreff, où des travaux de régulation des niveaux ont été récemment effectués, accueillent quelques limicoles aux passages, la reproduction dépendra de la tranquillité qu'ils y trouveront.

L'île de Kerner supporte le principal dortoir d'ardéidés, spatules et ibis de la rade de Lorient.

ANSE DE PEN MANÉ

Description des milieux : anse endiguée du Blavet, un bassin et un marais avec roselière, parties sèches en broussailles.

Intérêts :
écologique
oiseaux
zone de migration

Activités humaines :
loisirs
chasse

Facteurs influençant l'évolution la zone :
atterrissement

Données recueillies	1997-2003
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	127
Coordinateur	Jacques Corbière, G.O.B.

Espèces nicheuses 46

Déterminantes : 8

Grèbe castagneux, 0-1 couple ; Echasse blanche, 0-2 couples ; Vanneau huppé, 0-2 couples ; Gorgebleue à miroir, 3 couples au moins ; Phragmite des joncs, 28 ; Rousserolle effarvatte, 7 au moins ; Fauvette pitchou, 1 couple ; Panure à moustaches, 4 couples au moins.

Non déterminantes : 3+35

Tadorne de Belon, 2-4 couples ; *Busard des roseaux*, 1 couple ; *Locustelle luscinioides*, 3.

Cygne tuberculé, 1 couple ; Canard colvert, 3 couples au moins ; Epervier d'Europe, 1 ; Buse variable, 3 ; Faucon crécerelle, 2 ; Râle d'eau, 3 chanteurs ; Foulque macroule ; Petit Gravelot, 0-1 couple ; Pigeon ramier ; Tourterelle turque ; Tourterelle des bois ; Coucou gris, 1 ; Martin-pêcheur d'Europe, 1 ; Pipit maritime, 1-2 couples ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ; Rougegorge familier ; Tarier pâle, 4 couples ; Merle noir, 12 ; Grive musicienne, 3 ; Bouscarle de Cetti, 20 ; Cisticole des joncs, 15 ; Fauvette grisette, 1 ; Fauvette à tête noire, 5 ; Pouillot véloce, 17 ; Roitelet huppé, 1 ; Mésange bleue, 6 ; Mésange charbonnière, 3 ; Moineau domestique, 30 ; Pinson des arbres, 15 ; Verdier d'Europe, 10 et plus ; Chardonneret élégant, 55 ; Linotte mélodieuse, 40 ; Bruant zizi, 1 couple ; Bruant des roseaux, 17.

Espèces de passage

Déterminantes : aucune

Non déterminantes : 9 + 81

Balbusard pêcheur, 0-1 ; *Bécasseau cocorli*, 10-20 ;

Bécassine des marais, 20-60 ; *Chevalier culblanc*, 1-4 ; *Chevalier sylvain*, 1-4 ; *Mouette pygmée*, 1-34 ; *Guifette noire*, 0-5 ; *Tarier des prés*, 15 ; *Rémiz penduline*, 0-1 (exceptionnelle).

Grèbe castagneux, 40-180, effectifs sur le bassin, maximum en 1999 ; Grèbe huppé, 2-6 ; Grèbe esclavon, 1 (exceptionnel) ; Grèbe à cou noir, 2-3 ; Grand Cormoran, 2-10 ; Aigrette garzette, 20-120, sur le bassin concentrations lors des basses eaux ; Héron cendré, 6-35 ; Ibis sacré, 4 ; Spatule blanche, 1-5 ; Cygne tuberculé, 0-4 ; Tadorne de Belon, 120 ; Canard siffleur, 0-2 ; Sarcelle d'hiver, 20-40 ; Canard chipeau, 0-1 (exceptionnel) ; Canard colvert, 130-220 ; Canard pilet, 0-16 ; Canard souchet, 2-17 ; Fuligule milouin, 0-2 ; Fuligule morillon ; Bondrée apivore 0-1 ; Epervier d'Europe 1 ; Faucon émerillon, 0-1 (exceptionnel) ; Marouette ponctuée, 0-1 (exceptionnelle) ; Foulque macroule, 10-500 en augmentation sur le bassin ; Huîtrier pie, 0-3 ; Faisan de Colchide, 4 ; Echasse blanche, 19 ; Petit Gravelot, 0-4 ; Grand Gravelot, 50 ; Pluvier doré, 1 (exceptionnel) ; Pluvier argenté, 0-4 (occasionnel) ; Bécasseau maubèche, 1-120 (occasionnel) ; Bécasseau sanderling, 2 ; Bécasseau minute, 5-40, annuel sur les bancs découverts ; Bécasseau variable, 120 ; Bécasseau falcinelle, 0-1 (exceptionnel) ; Combattant varié, 1-32 ; Barge à queue noire, 1-14 ; Barge rousse, 7-63 ; Courlis cendré, 1-6 ; Courlis corlieu, 1-8 ; Chevalier arlequin, 2-3 ; Chevalier gambette, 100-170 ; Chevalier aboyeur, 11-27 ; Chevalier guignette, 5-15 ; Phalarope à bec large, 1 (exceptionnel) ; Mouette rieuse, 100-280 ; Goéland leucopnée, 1 ; Goéland brun, 15 ; Goéland argenté, 10-50 ; Goéland marin, 2-25 ; Sterne caugek, 30-54 lors de l'émancipation des jeunes sur les bancs découverts du marais ; Sterne pierregarin, 30-70 lors de l'émancipation des jeunes sur les bancs découverts du marais ; Sterne de Dougall, 0-2 ; Sterne arctique, 0-1 ; Sterne naine, 0-3 ; Guifette moustac, 0-3 ; Pigeon colombin, 0-5 ; Pigeon ramier, 16 ; Tourterelle turque, 14 ; Tourterelle des bois, 5 ; Coucou gris, 5 ; Martinet noir, centaines ; Martin-pêcheur d'Europe, 1-2 ; Pic vert, 1 ; Pic épeiche, 1 ; Alouette des champs, 4 ; Hirondelle de rivage, 500 en dortoir sur les phragmites en été ; Hirondelle rustique, 40 ; Hirondelle de fenêtre, 10-20 ; Pipit spioncelle, 1-10 ; Pipit farlouse, 60 ; Bergeronnette printanière, 4 ; Bergeronnette grise, 23 ; Tarier pâle, 10 ; Traquet motteux, 9 ; Grive musicienne, 5 ; Verdier d'Europe, 250 ; Chardonneret élégant, 110 ; Bruant zizi, 2 ; Serin cini, 7.

Espèces hivernantes

Déterminantes : 1

Grèbe castagneux, 40-170, moindres effectifs depuis 2000.

Non déterminantes : 25 + 38

Aigrette garzette, 20-80 ; *Spatule blanche*, 0-2 ; *Tadorne de Belon*, 10-40 ; *Canard siffleur*, 0-10 ; *Canard chipeau*, 0-1 (exceptionnel) ; *Sarcelle d'hiver*, 0-14 ; *Canard pilet*, 0-5 ; *Canard souchet*, 0-2 ; *Fuligule milouin*, 0-15 ; *Fuligule morillon*, 0-36 ; *Fuligule milouinan*, 0-2 (occasionnel) ; *Harelda boréale*, 0-1 (occasionnelle) ; *Garrot à oeil d'or*, 0-2 ; *Harle piette*, 0-1 (exceptionnel) ; *Busard des roseaux*, 2 ; *Foulque macroule*, 50-630 effectifs en hausse ; *Avocette élégante*, 0-1 ; *Bécasseau variable*, 100 ; *Bécassine des marais*, 5-36 ; *Courlis cendré*, 1-10 ; *Chevalier gambette*, 10-40 ; *Chevalier arlequin*, 0-1 (exceptionnel) ; *Chevalier guignette*, 3 ; *Mouette rieuse* ; *Panure à moustaches*, 10.

Grèbe huppé, 2-6 ; Héron cendré, 5-15 ; Ibis sacré, 4 ; Canard colvert, 50-200 ; Fuligule nyroca, 0-1 ; Faucon crécerelle, 1 ; Buse variable, 2 ; Râle d'eau ; Echasse blanche, 1 ; deux hivernages exceptionnels pour cette région ; Vanneau huppé, 60-240 ; Goéland

argenté ; Goéland brun ; Goéland marin ; Tourterelle turque ; Bergeronnette grise, 2 ; Pipit maritime, 2 ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ; Rougegorge familier ; Tarier pâtre, 10 ; Merle noir ; Grive musicienne ; Bouscarle de Cetti ; Fauvette pitchou, 2 ; Pouillot véloce, 5 ; Mésange bleue ; Mésange charbonnière ; Geai des chênes, 4 ; Pie bavarde, 14 ; Corneille noire, 50 ; Etourneau sansonnet, 150 ; Moineau domestique ; Pinson des arbres, 25 ; Verdier d'Europe, 50 ; Chardonneret élégant, 50 ; Linotte mélodieuse, 40 ; Bruant zizi, 2 ; Bruant des roseaux, 43.

Commentaires :

avis du coordinateur de la zone : sur un tel site la maîtrise du niveau d'eau et sa libre circulation sont primordiales.

Eaux non marines (2)



étang de Rodes / Merlevenez

ETANG DE RODES

Description des milieux :

étang avec formations végétales amphibies et flottantes, bordures avec roselière.

Intérêts :
oiseaux

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
non mentionnés

Données recueillies	1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	assez bon
Nombre d'espèces relevé	15
Coordinateur	Gwenael Derian

Espèces nicheuses**Déterminantes :** aucune.**Non déterminantes :** 15.

Grèbe castagneux (1); *Grèbe huppé* (1-2); Héron cendré; Canard colvert (5-10); Buse variable; Gallinule poule-d'eau; Foulque macroule; Sterne pierregarin; Martinet noir; Hirondelle de rivage; Hirondelle de fenêtre; Bouscarle de Cetti; *Phragmite des joncs*; *Cisticole des joncs*; Bruant des roseaux.

Espèces de passage**Déterminantes :** aucune.**Non déterminantes :** aucune.**Espèces hivernantes****Déterminantes :** aucune.**Non déterminantes :** aucune.

avis du coordinateur de la zone : la zone est en lien avec l'estuaire du ruisseau de Lézévy bordé d'une cariçaie où nichent plusieurs Cisticoles des joncs (3 chanteurs en juillet 2001), lequel pourrait être intégré à la ZNIEFF.

ETANG DE SAINT-JEAN**Description des milieux :**

étang, landes et broussailles, conifères, roselière.

Intérêts :

oiseaux
étape migratoire
zone d'alimentation
zone de reproduction

Activités humaines :

pêche
chasse

Facteurs influençant l'évolution la zone :

non mentionnés

Données recueillies	1995-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	56
Coordinateur	Gérard Ermel

Espèces nicheuses

Déterminantes : 12.

Grèbe castagneux ; Butor étoilé (reproduction possible) ; Bondrée apivore ; Milan noir (nicheur au moins depuis 1998, 1 couple) ; Busard des roseaux (2 couples) ; Faucon hobereau ; Engoulevent d'Europe ; Pic noir (apparition en 1996) ; Gorgebleue à miroir (un chanteur en 2002, nidification possible) ; Phragmite des joncs.

Non déterminantes : 37.

Grèbe huppé (reproduction irrégulière) ; Héron cendré (zone d'alimentation) ; Aigrette garzette ; Canard colvert ; Canard pilet (occasionnel) ; Epervier d'Europe (1 couple) ; Buse variable (1 couple) ; Faucon crécerelle ; Râle d'eau ; Gallinule poule d'eau ; Foulque macroule ; Effraie des clochers ; Martin-pêcheur d'Europe (1 couple) ; Pic épeiche ; Troglodyte mignon ; Tarier pâle ; Bouscarle de Cetti ; Cisticole des joncs ; *Rousserole effarvate* ; Panure à moustaches ; Mésange à longue queue ; Mésange bleue ; Mésange charbonnière ; Verdier d'Europe ; Chardonneret élégant ; Bouvreuil pivoine ; Bruant jaune ; Bruant des roseaux.

Espèces de passage

Déterminantes : 1. Balbuzard pêcheur (3).

Non déterminantes : 8.

Grand Cormoran (dortoir postnuptial ; >100 individus) ; Grande Aigrette ; Chevalier guignette ; Hirondelle de rivage ; Hirondelle rustique ; Hirondelle de fenêtre ; *Phragmite des joncs* ; *Rousserole effarvate*.

Espèces hivernantes

Déterminantes : 1. Canard siffleur (150).

Non déterminantes : 9.

Canard chipeau ; *Sarcelle d'hiver* ; *Canard souchet* ; *Fuligule milouin* ; *Fuligule morillon* ; *Harle huppé* ; *Bécassine sourde* ; *Bécassine des marais* ; *Chevalier guignette*.

Commentaire :

ornithologique : zone d'intérêt promordial tant pour la reproduction que la migration du fait de la tranquillité des lieux et de la superficie. En plus, située juste à côté de la rivière d'Etel.

ETANG DE LANNENEC

Description des milieux :

étang avec végétation vasculaire, landes atlantiques, aubépines et prunelliers, bocage, village.

Intérêts :

oiseaux
poissons
amphibiens
flore
insectes
mammifères
reptiles

Activités humaines :

agriculture
pêche
chasse
tourisme et loisirs

Facteurs influençant l'évolution la zone :

mise en culture
chasse
sport et loisir de plein air
traitement de
fertilisation et pesticides
pêche
incendie

Données recueillies	1995-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	130
Coordinateur	Pierre Corlou

Espèces nicheuses

Déterminantes : 9.

Grèbe castagneux (4) ; Busard des roseaux (1 couple) ; Vanneau huppé (0-2) ; Engoulevent d'Europe (4) ; Traquet motteux (6) ; Locustelle lusciniôide (6) ; Phragmite des joncs (20) ; Rousserolle effarvate (20) ; Fauvette pitchou (8) ; Panure à moustaches (4).

Non déterminantes : 69.

Grèbe huppé (4, 1 couple) ; Aigrette garzette (3) ; Héron cendré (3) ; Cygne tuberculé (1 couple) ; Canard colvert (8) ; Bondrée apivore (1) ; Busard Saint-Martin (1) ; Epervier d'Europe (4) ; Buse variable (4) ; Faucon crécerelle (2) ; Perdrix rouge (8) ; Perdrix grise (2) ; Faisan de Colchide (2) ; Râle d'eau (4) ; Gallinule poule-d'eau (10) ; Foulque macroule (40) ; Petit Gravelot (2) ; Pigeon ramier (28) ; Tourterelle turque (10) ; Tourterelle des bois (8) ; Coucou gris (4) ; Effraie des clochers (4) ; Chevêche d'Athéna (6) ; Chouette hulotte (8) ; Martinet noir (40) ; Martin-pêcheur d'Europe (4) ; Pic vert (10) ; Pic épeiche (6) ; Pic épeichette (4) ; Alouette des champs (30) ; Hirondelle de rivage (30) ; Hirondelle rustique (40) ; Hirondelle de fenêtre (20) ; Pipit farlouse (20) ; Pipit maritime (14) ; Bergeronnette grise (4) ; Troglodyte mignon (6) ; Accenteur mouchet (15) ; Rougegorge familier (15) ; Tarier pâle (8) ; Merle noir (15) ; Grive musicienne (6) ; Grive draine (6) ; Bouscarle de Cetti (12) ; Cisticole des joncs (10) ; Rousserolle effarvate (20) ; Hypolaïs polyglotte (2) ; Fauvette grisette (12) ; Fauvette des jardins (8) ; Fauvette à tête noire (8) ; Pouillot véloce (10) ; Mésange à longue queue (30) ; Mésange bleue (15) ; Mésange

charbonnière (30) ; Grimpereau des jardins (4) ; Geai des chênes (4) ; Pie bavarde (10) ; Corneille noire (6) ; Etourneau sansonnet (20) ; Moineau domestique (50) ; Pinson des arbres (20) ; Serin cini (6) ; Verdier d'Europe (30) ; Chardonneret élégant (10) ; Linotte mélodieuse (20) ; Bouvreuil pivoine (4) ; Bruant jaune (4) ; Bruant zizi (6) ; Bruant des roseaux (10).

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 76.

Grèbe esclavon (2) ; Grèbe à cou noir (2) ; Grand Cormoran (8) ; Butor étoilé (3) ; Aigrette garzette (10) ; ; Héron cendré (6) ; Héron pourpré (1) ; Spatule blanche (1) ; Tadorne de Belon (5) ; Canard siffleur (15) ; Canard chipeau (10) ; Sarcelle d'hiver (17) ; Canard colvert (70) ; Canard pilet (18) ; Sarcelle d'été (4) ; Canard souchet (10) ; Fuligule milouin (13) ; Fuligule morillon (10) ; Fuligule milouinan (3) ; Harelde boréale (1) ; Garrot à oeil d'or (3) ; Bondrée apivore (1) ; Busard des roseaux (3) ; Busard Saint-Martin (1) ; Epervier d'Europe (3) ; Buse variable (4) ; Balbuzard pêcheur (2) ; Faucon émerillon (2) ; Faucon pèlerin (1) ; Petit Gravelot (2) ; Grand Gravelot (40) ; Pluvier argenté (2) ; Bécassine des marais (5) ; Barge rousse (2) ; Chevalier aboyeur (4) ; Chevalier culblanc (1) ; Chevalier guignette (4) ; Mouette pygmée (5) ; Mouette rieuse (700) ; Goéland cendré (45) ; Goéland brun (20) ; Goéland argenté (2000) ; Goéland marin (10) ; Sterne caugek (6) ; Sterne pierregarin (10) ; Guifette moustac (2) ; Guifette noire (7) ; Pigeon ramier (60) ; Tourterelle turque (petite concentration en automne) ; Tourterelle des bois (25) ; Hibou des marais (1) ; Huppe fasciée (1) ; Alouette des champs (80) ; Hirondelle de rivage (800) ; Bergeronnette printanière (2) ; Bergeronnette des ruisseaux (10) ; Tarier des prés (3) ; Tarier pâle (15) ; Grive mauvis (75) ; Locustelle tachetée (4) ; Phragmite des joncs ; Rousserolle effarvatte ; Roitelet huppé (2) ; Roitelet à triple bandeau (1) ; Gobemouche gris (1) ; Panure à moustaches (17) ; Geai des chênes (7) ; Pie bavarde (15) ; Choucas des tours (10) ; Etourneau sansonnet (600) ; Pinson des arbres (100) ; Verdier d'Europe (200) ; Chardonneret élégant (25) ; Tarin des aulnes (10) ; Linotte mélodieuse (250) ; Bruant des roseaux (15).

Espèces hivernantes

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 39.

Plongeon catmarin (2, irrégulier) ; Plongeon arctique (2, irrégulier) ; Grèbe castagneux (6) ; Grand Cormoran (8) ; Butor étoilé (3) ; Aigrette garzette (10) ; Héron cendré (6) ; Cygne tuberculé (2) ; Tadorne de Belon (5) ; Canard siffleur (15) ; Canard chipeau (10) ; Sarcelle d'hiver (17) ; Canard colvert (50) ; Fuligule milouin (13) ; Fuligule morillon (10) ; Harle pie (1, exceptionnel) ; Harle bièvre (1, exceptionnel) ; Busard des roseaux (3) ; Faucon crécerelle (2) ; Faucon émerillon (2) ; Faucon pèlerin (1) ; Perdrix rouge (8) ; Faisan de Colchide (2) ; Râle d'eau (4) ; Gallinule poule-d'eau (4) ; Foulque macroule (2) ; Pluvier argenté (2) ; Barge rousse (2) ; Mouette rieuse (700) ; Goéland cendré (45) ; Goéland brun (30) ; Goéland argenté (1200) ; Goéland marin (4) ; Sterne caugek (6) ; Pigeon ramier (60) ; Tourterelle turque (40) ; Pipit farlouse (50) ; Pipit maritime (50) ; Bergeronnette grise (30).

avis du coordinateur de la zone : en bordure de l'étang, les pâtures naturelles ont été abandonnées au profit des cultures de maïs.
Il y a également une forte pression des pêcheurs, surtout au printemps en période de nidification, qui organisent des week-ends de pêche.

LE STUM

Description des milieux :

gravières en eau, sites industriels abandonnés.

Intérêts :

oiseaux
étapes migratoires,
zones de
stationnement,
dortoirs

Activités

humaines :
pêche

Facteurs influençant l'évolution la zone :

non mentionnés

Données recueillies

1995-2002

Niveau de l'inventaire ornithologique

bon

Nombre d'espèces relevé

49

Coordinateur

Françoise et Jean-Luc Lemonnier

Espèces nicheuses

Déterminantes :

1.
Grèbe castagneux (1-2).

Non déterminantes : 9.

Grèbe huppé (5, un couple); Canard colvert (15-34, reproduction incluse); Gallinule poule d'eau (1-3); Foulque macroule (4, reproduction incluse); Tourterelle des bois (5); Martin-pêcheur d'Europe (3); Bergeronnette des ruisseaux (2); Bergeronnette grise (2); Pouillot fitis (4).

Espèces de passage

Déterminantes :

aucune.

Non déterminantes : 16.

Grèbe castagneux (2); Grand Cormoran (2); Aigrette garzette (1); Héron cendré (14); Canard siffleur (1; occasionnel); Canard colvert (8); Fuligule morillon (28); Garrot à œil d'or (5; occasionnel); Foulque macroule (32); *Chevalier culblanc* (1); *Chevalier guignette* (1); Mouette rieuse (200); Goéland brun

(40) ; Goéland argenté (3) ; *Guifette noire* (1 ; occasionnelle) ; Martin-pêcheur d'Europe (3) ; Hirondelle de rivage (20) ; Bruant des roseaux (1).

Espèces hivernantes

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 6.

Grèbe castagneux (2) ; Grand Cormoran (32) ; *Aigrette garzette* (5) ; *Héron cendré* (1) ; *Foulque macroule* (34) ; Martin-pêcheur d'Europe (3) ; Tarin des aulnes (9).

Commentaires :

ornithologique : un dortoir de Grand Cormoran est utilisé dès la dispersion post-nuptiale.

avis du coordinateur de la zone : un étang principal et trois autres plans d'eau de superficie très modeste. L'ensemble de l'infrastructure d'exploitation de ces gravières est en ruine et envahie d'une végétation arbustive, voire arborée, s'étendant sur tous les espaces n'étant pas en eau.

Zone fréquentée par quelques habitués, pêcheurs, riverains.

OUST AU ROC SAINT-ANDRE

Description des milieux :

Rives boisées (saules) et mince roselière.

Intérêts :

habitats
insectes
poissons
oiseaux
auto-épuration des
eaux
zone particulière de
reproduction

Compléments descriptifs :

lit majeur et
méandre d'une
rivière

Activités humaines :

pêche
chasse

Facteurs influençant l'évolution la zone :

modification des
fonds, des courants
fermeture du milieu
entretien des rivières

Données recueillies	1998-1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	assez bon
Nombre d'espèces relevé	13
Coordinateur	Bernard Iliou

Espèces nicheuses

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 13.

Faucon crécerelle (2) ; Pigeon ramier (6) ; Pic épeiche (2) ; Troglodyte mignon (6) ; Accenteur mouchet (10) ; Rougegorge familier (10) ; Merle noir (6) ; Grive musicienne (2) ; Grive draine (2) ; Mésange bleue (6) ; Mésange charbonnière (4) ; Mésange à longue queue ; Pinson des arbres (10).

Espèces de passage


Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : aucune.

Espèces hivernantes

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : aucune.



Le Scorff à Pont-Calleck

SCORFF MEDIAN

Description des milieux :

Cours de rivière, bocage, sapinières.

Intérêts :

oiseaux
poissons
insectes
flore
mammifères

Compléments

descriptifs :
rivière, méandre,
vallée

Activités

humaines :
agriculture,
pêche
tourisme

Facteurs influençant

l'évolution de la zone :
traitement de fertilisation
et pesticides
désherbage,
suppression des haies et
bosquets
remembrement

Données recueillies

1998-1999

Niveau de l'inventaire ornithologique

assez bon

Nombre d'espèces relevé

47

Coordinateur

Pierre Corlou

Espèces nicheuses

Déterminantes : aucune

Non déterminantes : 44.

Héron cendré (0-2) ; *Canard colvert* (0-6) ; *Epervier d'Europe* (0-2) ; *Buse variable* (0-2) ; *Faucon crécerelle* (0-2) ; *Gallinule poule d'eau* (0-6) ; *Pigeon ramier* (0-20) ; *Tourterelle des bois* (0-8) ; *Coucou gris* (0-1) ; *Chouette hulotte* (0-2) ; *Martin-pêcheur d'Europe* (0-2) ; *Pic vert* (0-3) ; *Pic épeiche* (0-4) ; *Alouette des champs* (0-6) ; *Hirondelle rustique* (0-20) ; *Pipit des arbres* (0-3) ; *Bergeronnette grise* (0-7) ; *Troglodyte mignon* (0-10) ; *Accenteur mouchet* (0-4) ; *Rougegorge familier* (0-12) ; *Merle noir* (0-14) ; *Grive musicienne* (0-6) ; *Grive draine* (0-4) ; *Fauvette des jardins* (0-4) ; *Fauvette à tête noire* (0-8) ; *Pouillot véloce* (0-10) ; *Pouillot fitis* (0-3) ; *Roitelet huppé* (0-15) ; *Mésange à longue queue* (0-20) ; *Mésange nonnette* (0-20) ; *Mésange huppée* (0-15) ; *Mésange bleue* (8) ; *Sittelle torchepot* (12) ; *Grimpereau des jardins* (8) ; *Geai des chênes* (6) ; *Pie bavarde* (8) ; *Corneille noire* (6) ; *Etourneau sansonnet* (6) ; *Pinson des arbres* (20) ; *Verdier d'Europe* (14) ; *Chardonneret élégant* (6) ; *Bouvreuil pivoine* (4) ; *Bruant jaune* (4) ; *Bruant zizi* (5).

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 9.

Bécasse des bois (5) ; Pigeon ramier (60) ; Tourterelle des bois (20) ; Pie bavarde (24) ; Corneille noire (25) ; Etourneau sansonnet (150) ; Pinson des arbres (40) ; Verdier d'Europe (15).

Espèces hivernantes

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : non mentionnées.

avis du coordinateur de la zone : les cultures de maïs s'étendent.


Figurent en italiques les espèces pour lesquelles ne sont pas atteints les critères d'effectif ou de régularité proposés par Bargain et al. (2001) pour la désignation des ZNIEFF en Bretagne.

Saisie et mise en forme des données : Gw. Derian, Muriel Palpant.

SAISON 2002 DU PROGRAMME NATIONAL STOC EPS DANS LE MORBIHAN

GWENAEL DERIAN

La première campagne du programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillon Ponctuel Simple (STOC EPS) a sans doute séduit ses premiers participants puisque tous ont répondu à l'appel une seconde fois. D'autres observateurs du G.O.B. se sont joints à eux ce qui a porté à douze le nombre de carrés à prospecter au printemps 2003. En plus de cette amélioration en quantité, la couverture 2002 est marquée par une plus grande dispersion des carrés puisqu'une proportion importante d'entre eux se situe à l'intérieur du département (carte 1).



Situation des carrés STOC - EPS dans le Morbihan en 2002

Finalement, 9 carrés ont été entièrement effectués : le printemps pluvieux a réduit pour certains observateurs les occasions de sortie.

Nombre de points couverts : 2 passages sur 90 points		
Passages	premier	second
dates	11 avril à 27 avril	18 mai à 02 juin

- les habitats

Par rapport à 2001, on note une moindre représentation des milieux agricoles, au profit des milieux bâtis ou urbanisés et des boisements.

Habitats, %	en 2002	en 2001
Forêts	21	14
Buissons	10	12
Prairies, marais et landes	6	8
Milieux agricoles	47	54
Milieux anthropiques	16	12
Milieux aquatiques	1	0
Rochers terrestres ou côtiers	0	0

- les espèces

Passages	Premier	Second	Total
Nombre d'espèces	59	62	66
Nombre de contacts	894	847	1741

Place	espèce	Fréquence %
1	Pinson des arbres	72,78
2	Troglodyte mignon	69,44
3	Merle noir	66,67
4	Pouillot véloce	63,33
5	Rougegorge familier	63,33
6	Pigeon ramier	61,67
7	Grive musicienne	50,00
8	Corneille noire	48,89
9	Fauvette à tête noire	41,11
10	Mésange bleue	34,44
11	Verdier d'Europe	30,56
12	Mésange charbonnière	28,89
13	Goéland argenté	26,67
14	Etourneau sansonnet	26,67
15	Accenteur mouchet	18,89
16	Pie bavarde	16,11
17	Pic vert	16,11
18	Roitelet huppé	12,78
19	Tourterelle des bois	12,78
20	Hirondelle rustique	20,00

Place	espèce	Abondance %
1	Pinson des arbres	8,82
2	Corneille noire	7,75
3	Pigeon ramier	7,44
4	Merle noir	7,03
5	Troglodyte mignon	6,81
6	Rougegorge familier	5,74
7	Pouillot véloce	5,65
8	Goéland argenté	4,96
9	Grive musicienne	3,73
10	Verdier d'Europe	3,64
11	Etourneau sansonnet	3,42
12	Mésange bleue	3,11
13	Fauvette à tête noire	3,04
14	Mésange charbonnière	2,10
15	Moineau domestique	1,88
16	Pie bavarde	1,69
17	Chardonneret élégant	1,38
18	Hirondelle rustique	1,35
19	Accenteur mouchet	1,35
20	Roitelet huppé	1,16

STOC EPS, Morbihan, printemps 2002

Le second passage, plus riche en espèces, donne moins de contacts que le premier. On peut l'interpréter comme le résultat de la discrétion des nicheurs précoces déjà engagés dans la reproduction... ce qui ne s'était pas vu pourtant l'an dernier.

Il serait bien prématuré, à notre échelle, de tirer déjà des enseignements sur les variations d'effectifs. Tout au plus peut-on retenir le retentissement sur les résultats

par espèces de l'arrivée des nouveaux carrés : ainsi du Roitelet huppé, de quatre contacts en 2001 il passe à vingt-trois en 2002 parmi lesquels quatorze concernent la forêt de Camors et trois les côteaux du Blavet, carrés nouvellement prospectés.

Treize espèces contactées en 2001 ne le sont pas cette année : Grèbe castagneux, Grand Cormoran, Busard des roseaux, Râle d'eau, Gallinule poule d'eau, Foulque macroule, Vanneau huppé, Chouette hulotte, Alouette lulu, Traquet motteux, Panure à moustaches, Locustelle lusciniöide, Phragmite des joncs.

A l'inverse, onze espèces sont contactées en 2002 seulement : Buse variable, Perdrix grise, Courlis cendré, Sterne pierregarin, Pic noir, Hirondelle de rivage, Bergeronnettes grise et des ruisseaux, Pouillots siffleur et fitis, Hypolais polyglotte.

- perspectives

On recrute ! Il y a encore des carrés à pourvoir, des milieux à prospecter et, avec une seule carte à l'est d'une ligne Pontivy – Vannes, le bassin de l'Oust mérite d'être davantage suivi dans le cadre de ce programme.

Les participants au programme dans le Morbihan : Patrick Bailleul, Gaëtan Cornec, Gwenael Derian, Francis Guillemot, Bernard Iliou, Marc Jamet, Yann Keminon, Jean-Luc Lemonnier, Régis Morel, Yannick Ordureau, Jean-François Robic, François Urvoaz.

NOTES DE TERRAIN

OBSERVATION D'UN DORTOIR HIVERNAL DE
BERGERONNETTES DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea* DANS LA
VALLEE DU SCORFF

ERWAN CROCHET

Le mois de décembre est le mois idéal pour observer la reproduction des saumons atlantiques *Salmo salar* sur les frayères. Cette étude sur le terrain est faite de nuit par une équipe de l'I.N.R.A. à laquelle je propose régulièrement mon aide. Le 05 décembre 2002 nous partons pour une nouvelle prospection sur des zones limitrophes aux communes de Plouay et Guilligomarc'h, entre le Morbihan et le Finistère. C'est à 2h du matin que nous avons découvert un groupe de Bergeronnettes des ruisseaux. Depuis plusieurs jours le temps est couvert, légèrement pluvieux ; la température est douce.

Nous sommes sur ce que les pêcheurs nomment un radier. Ce sont des zones à fort courant (>40 cm/s), peu profondes, avec un fond de roche, où les saumons creusent leur frayère. Cela apporte une bonne oxygénation aux œufs. Les bergeronnettes, une trentaine, sont perchées sur un pommier surplombant le radier sur la moitié de la largeur de la rivière (environ 5 mètres à cet endroit). Le pommier a les pied dans l'eau par suite des fortes pluies de la semaine passée. Le courant, en cet endroit, est proche de 1 m/s, voire 1,5 m/s. Toutes les Bergeronnettes des ruisseaux sont installées sur les branches à peu près horizontales à une hauteur variant entre 40 centimètres et 1 mètre au-dessus de l'eau. Le pommier est peu entretenu, les branches utilisées sont de faible diamètre (2 cm) et couvertes de lichen. Les bergeronnettes ne sont pas pelotonnées les unes contre les autres mais séparées les unes des autres. La distance séparant deux individus varie suivant les cas. Nous les avons découvertes en prospectant le radier : l'éclairage puissant de nos lampes n'a provoqué aucune réaction de leur part : ni fuite, ni cri, même à très courte distance.

Je suis retourné voir ce dortoir le 15 et le 21 décembre : il y avait plus d'une vingtaine d'individus présents. L'arbre était déserté la nuit du 07 au 08 février 2003.

J'ai déjà pu observer des Bergeronnettes des ruisseaux la nuit à l'occasion de ces prospections de frayères. A chaque fois nous ne prospectons que les radiers et jamais nous n'allons sur des zones profondes, sans courant où pourraient exister d'autres rassemblements. Nous avons déjà vu des bergeronnettes dormir sur une branche au-dessus de l'eau mais toujours à l'unité, le dortoir décrit ici est donc pour nous une première.

La Bergeronnette des ruisseaux est nicheuse au moins sur la partie basse du Scorff : de Berné à Quéven. Des individus restent sur les zones de reproduction toute l'année, mais une portion de la population disparaît de ces zones entre décembre et février (*obs. pers.*). J'ai pu noter ainsi l'absence de bergeronnettes sur un radier que je prospectais le 21 décembre 2002 alors que j'y ai trouvé 2 individus le 8 février suivant.

J'interprète ce rassemblement comme un dortoir hivernal. Reste à préciser sa période d'occupation. Rien ne me permet de dire si ce sont des bergeronnettes de passages ou sédentaires qui l'occupent.

Remerciements

Je remercie l'équipe INRA / Fédération de pêche du Morbihan qui m'a signalé la présence du dortoir, et particulièrement Nicolas Jeannot, Jean-Yves Moelo, Thomas Dauphin et Jean-Yves Le Foll.

NOTE SUR UN POUILLOT A GRANDS SOURCILS, TROUVE MORT DANS UN JARDIN

MURIEL PALPANT

Le 19 novembre 2002 Gilbert Dérian m'annonce qu'il a trouvé un oiseau mort au fond de son jardin à Ploemeur (Morbihan). L'oiseau était sur la pelouse sans blessure apparente. Le jardin se trouve dans le bourg de Ploemeur, dans un quartier de maisons individuelles. Sa description exclut un roitelet mais oriente plutôt vers un pouillot. L'oiseau en main, je me rends compte qu'il s'agit en effet d'une espèce de petite taille et que nous avons bien à faire à un oiseau de la famille des pouillot. Mais je suis frappée aussitôt par un détail : le pouillot en question possède deux barres alaires sur les couvertures ; de plus, le sourcil est très visible, large et long. Je pense alors, pour l'avoir déjà vu, au Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*.

Les parties supérieures présentent un manteau vert-olive avec de très nettes barres blanches : une sur les grandes couvertures et une autre plus courte sur les moyennes encadrant un rectangle sombre. De larges liserés blancs sur les tertiaires et des pointes blanches sur les primaires et secondaires donnent un aspect d'échelle lorsque les ailes sont repliées.

Le croupion paraît plus jaunâtre et les rectrices usées sont presque noires avec une marge claire.

Les parties inférieures sont blanc-crème.

En ce qui concerne la tête nous remarquons que le front, la calotte et la nuque, vert-olive, sont séparés des parties inférieures par de très longs et très marqués sourcils jaune-paille s'étendant de la base du bec à la nuque en barrant l'œil. Un trait sourcilier sombre se dessine sur les lores et l'arrière de l'œil.

Le bec, quant à lui, possède une mandibule supérieure sombre et une mandibule inférieure claire avec une pointe sombre.

Les pattes sont brunes avec des doigts plus clairs.

L'ensemble de ces caractéristiques confirme ma première appréciation : il s'agit bien d'un Pouillot à grands sourcils.

Cette espèce est observée occasionnellement dans le Morbihan. Dans les archives du Groupe Ornithologique Breton je ne trouve que six mentions sûres de cette espèce entre 1987 et 2000, en octobre ou novembre concernant ce département. Elles viennent toutes du littoral soit sur une île, Hoedic, soit à Lorient ou Baden (capture), avec un seul individu à chaque fois. Notre observation s'inscrit donc dans les dates et lieux déjà rencontrés.

Remerciements à Gilbert Dérian qui nous a signalé sa trouvaille ; à Erwan Crochet pour ses photographies visibles sur le site internet du G.O.B.

Documents

Comptages des oiseaux d'eau, janvier 2002, résultats pour le Morbihan

Source : Wetlands International

	Total	étang au duc	littoral Guidel Ploemeur et Loc'h	Golfe du Morbihan	Baie de Vilaine	Baie de Quiberon	rade de Lorient	rivière d'Elle	presqu'île de Rhé	autres sites
Plongeon indéterminé	3		3							
Plongeon catmarin	1						1			
Plongeon imbrin	3					3				
Grèbe castagneux	689		13	142	24	34	58	370	48	
Grèbe huppé	741	13	16	409	27	84	95	90	6	1
Grèbe esclavon	10			2		7			1	
Grèbe à cou noir	1862		1	1314	63	361	23	87	13	
Grand Cormoran	475	102	20		68		283			2
Butor étoilé	3		3							
Aigrette garzette	353		5	102	25	91	117	2	8	3
Grande Aigrette	1									1
Héron cendré	12		8		3					1
Ibis sacré	21						21			
Spatule blanche	9			6	1		2			
Cygne tuberculé	50			16	11	5	9	9		
Bernache cravant	13044		1	8760	1213	1430	1354	170	116	
Tadornes de Belon	5741			3250	1435	322	250	484		
Canard siffleur	2520	13	9	2405	35	20	38			
Canard chipeau	40	2		33			2			3
Sarcelle d'hiver	3533		257	2740	484	5		45		2
Canard colvert	6462	448	317	4160	759	89	520	8	156	5
Canard pilet	1677			1302	375					
Canard souchet	855	1	26	510	296	2	12	8		
Fuligule milouin	492	21		256			128	87		
Fuligule morillon	235	15		20	33		167			
Fuligule milouinan	1090				1090					
Eider à duvet	1					1				
Harelde boréale	1						1			
Garrot à oeil d'or	268			266				2		
Harle huppé	1780			1486	30	230		17	17	
Harle bièvre	1		1							
Busard des roseaux			3		2		2			
Gallinule poule-d'eau	67		52				15			
Foulque macroule	10095	144	396	5350	151	38	1797	1764	360	95
Huitrier pie	1904		8	31	1002	694	112		57	
Avocette élégante	2121			871	1247		3			

	Total	étang au duc	littoral Guéhel Ploemeur et Loc'h	Golfe du Morbihan	Baie de Vilaine	Baie de Quiberon	rade de Lorient	rivière d'Etel	presqu'île de Rhé	autres sites
Grand Gravelot	2806		87	929	379	437	720		254	
Gravelot à collier i.	6					6				
Pluvier doré	680		410	2	60	148	60			
Pluvier argenté	3428		1	2409	141	189	654		34	
Vanneau huppé	8498		1206	4400	1919	219	423	331		
Bécasseau maubèche	231			173	24	34				
Bécasseau sanderling	1383		233		48	753	285		64	
Bécasseau minute	5			5						
Bécasseau violet	33		33							
Bécasseau variable	36806		128	21640	6258	3450	4810		520	
Bécassine des marais	37		25				12			
Barge à queue noire	782			724	58					
Barge rousse	95			1	18	66	10			
Courlis cendré	970		14	388	289	92	37	150		
Chevalier gambette	752		2	208	260	103	158	19	2	
Chevalier aboyeur	18			10	2		6			
Chevalier culblanc	2			2						
Chevalier guignette	16			10	3	1	2			
Tournepierre à collier	847		142	28	273	229	65		110	
Mouette rieuse	8879	8000			879					
Goéland cendré	36				29		7			
Goéland brun	61	49			12					
Goéland argenté	496				496					
Goéland marin	13				13					
Sterne caugek	17		2				15			

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The public sector has become a major employer in the UK, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.