

AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

Ti ar Vro B.P. 103
29833 CARHAIX



N°25 ANNEE 2003

Sommaire du numéro 25 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 mars à 15 novembre 2002	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 5
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 4
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 14
Groupe 3 de l'Huitrier pie au Tournepierre à collier	page 19
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 25
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 31
 Activités du G.O.B. Morbihan	
Recensement morbihannais des Grands Cormorans <i>Phalacrocorax carbo</i>, hiver 2002-2003	page 49
Un recensement diurne le long du Blavet, Grands Cormorans <i>Phalacrocorax carbo</i> en hiver	page 53
L'inventaire ornithologique des ZNIEFF morbihannaises (III)	page 55
 Notes de terrain	
Sortie nocturne	page 66
 Documents	
Inventaire des ZNIEFF morbihannaises	page 68

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE : 16 MARS A 15 NOVEMBRE 2002

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
ANGIN Bruno, BERNEY Florent, BOZEC René, BLANCHARD Jean-Luc,
CORBIERRE Jacques, CROCHET Erwan, DERIAN Gwenael, DERIAN Yannick,
ERMEL Gérard, FARCY Olivier, GUERIN Stéphane, GUILLEMOT Francis,
HOLDEN Sue et Richard, ILIOU Bernard, JOANNES Gérard, KERNINON Yann,
LAMOUR Joël, LE CORRE Gilles, LE DOZE Anthony, LEMONNIER Françoise et
Jean-Luc, LEPORT Bruno, MAOUT Jacques, ORDUREAU Yannick, PALPANT
Muriel, PHILIPPON Patrick, URVOAZ François, VINOT Alexandre... sauf erreur ou
omission !

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton
(Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre
au 15 mars.

Un fichier de saisie rapide peut être demandé auprès du coordonnateur morbihannais.
Dans le cas d'une transmission sur papier, merci de respecter l'ordre suivant :

abréviation ou nom d'espèce	effectif	remarque	indice de reproduction	date	lieu-dit	commune
ech bla (Echasse blanche)	8	le nid est installé sur un bassin désaffecté	nid occupé	25/05/04	Kerlapous	SILFIAC

Illustration : couverture Patrick Bailleul ; pl 5, Epervier d'Europe, Muriel Palpant.

AR VRAN MORBIHAN N°25

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwenaél Derian

Plongeon imbrin *Gavia immer*

(1 donnée)

En voici un, le 28/10/2002, à la pointe er Hourel / Locmariaquer, qui annonce les observations de l'hiver à venir

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

(149 données)

Reproduction certaine :


- er Varquez / Erdeven, quatre à cinq chanteurs dès la mi-mars et un minimum de quatre couvées !
- Crucuno / Erdeven, un couple et deux jeunes le 30/05/2002.
- sur les bassins d'épuration de Kergourio / Crédin, une famille de quatre poussins le 14/07.
- anciennes carrières de Saint-Marcel, deux couples accompagnés chacun de deux poussins le 30/07.

Reproduction possible à probable :

- un chanteur sur le bassin d'épuration de Meslan le 23/03.
- Hoëdic, un couple avec chanteur le 18/04.
- Saint-Jean / Locoal-Mendon, cris et parade le 19/04.
- sur l'étang des Basses Landes / Sain-Marcel, deux couples le 23/05.
- étang de la Forêt à Brandivy, un couple et un nid vide le 10/07.


Rassemblement :

- à Pen Mané / Locmiquélic, les premiers estivants sont vus le 13/07, 8 individus, puis l'effectif ne s'élèvera guère.



Grèbe castagneux à Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan) : juillet - novembre 2002

- au Cranic / Brec'h, le maximum est noté entre mi-août et mi-septembre, ex : 15 le 26/08.
- 23 le 07/09 et 19/10 sur la station d'épuration de Kergourio / Crédin.
- 16 le 30/08 à Kersahu / Gâvres.
- la fréquentation des étangs de Locoal-Mendon est comparable à celle de l'été précédent.



Grèbe castagneux sur les étangs de Saint-Jean et Goh-Lern / Locoal-Mendon (Morbihan) ; juillet – novembre 2002

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(147 données)

Sur les sites où la reproduction s'annonçait à la fin de l'hiver (Ar Vran Morbihan 24) :

- étang de la Forêt : Brandivy, le couple parade et se maintient jusqu'à juin mais sans reproduction.
- sur l'étang au Duc de Ploërmel, treize à quinze couples sont formés le 08/05/2002 mais les données manquent pour la suite ; deux poussins le 01/07.
- Coët-Rivas / Kervignac, deux couveurs le 05/05.

Autres sites :

- étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, un couple parade le 29/03.
- Pen-Mané / Locmiquélic, un couple parade sur le bassin, fin mars, sans suite.
- Loperhet / Erdeven, le 24/04, un couple et cinq poussins (nouveau site).
- le Cranic / Brec'h, un nid occupé le 25/05, deux jeunes sont produits.
- Crucuno / Erdeven, un couple parade le 29/05.
- deux couples aux étangs de Branguily / Gueltas, produisent trois et deux jeunes (nouveau site).
- étang des Basses Landes / Saint-Marcel, un couple et quatre jeunes le 12/07 (nouveau site) et un couple avec deux poussins le 30/07.
- le Stum / Saint-Adrien, aucun indice de reproduction.

(nouveau site) = site où la reproduction n'a pas été notée lors de la précédente enquête en 1998 (Ar Vran Morbihan 18).

Rassemblements : 37 à l'étang au Duc le 29/03, 22 en reposoir crépusculaire dans l'anse de Kerzo / Port-Louis le 19/03 ; au Cranic, maximum de 17 le 30/07, 16 devant la Tour

des Anglais / Damgan le 11/08, 19 au Gouarde / Nostang le 25/ 09 et 10 dans la rivière de Landévant le 29/09, dans le secteur de Locmariaquer : 10 à Kerouarc'h le 04/09 et 14/10, 12 à la pointe er Hourel le 28/10 ; 30 se rassemblent sur l'étang au Duc le 28/09.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(41 données)

Une paire en plumage nuptial à Pen Mané / Locmiquélic le 05/04/2002 clôt les observations printanière. Les retours sont remarqués à partir de mi-juillet : un individu à Pen Mané / Locmiquélic le 13/07, un à Saint-Marcel le 11/09, huit au Cranic / Brec'h le 11/09, 10 en Petite Mer de Gâvres le 14/10, 11 à Kerouarc'h le 17/10, 27 à er Hourel / Locmariaquer le 28/10.

Puffin indéterminé *Puffinus sp*

(2 données)

Plus d'une centaine devant la Tour des Anglais / Damgan le 10/08/2002 ; quelques uns au large d'Hoëdic le 18/10.

Fulmar glacial *Fulmarus glacialis*

(1 donnée)

Un individu en trois-quarts d'heure de guet à la mer à la Roche-Sèche / Erdeven, le 10/08/2002

Puffin majeur *Puffinus gravis*

(4 données)

Un visiteur exceptionnel dans nos chroniques ! Trois de ces données concernent chacune un cadavre collecté d'Erdeven à Saint-Pierre Quiberon le 25/10 mais une d'elle mentionne un individu vivant, à Kerhilio / Erdeven, le 26/10, par le même observateur.

Puffin fuligineux *Puffinus griseus*

(1 donnée)

Un cadavre à Sainte-Barbe / Erdeven, le 25/10/2002.

Puffin des anglais *Puffinus puffinus*

(1 donnée)

Deux individus à la pointe de Gâvres le 12/08/2002.

Puffin des Baléares / Yelkouan *Puffinus yelkouan*

(1 donnée)

Pendant la même séance de guet à la mer qu'à l'article précédent, deux groupes de Puffins des Baléares / Yelkouan, trois et dix individus.

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus*

(2 données)

Trente à la pointe de Gâves, passant à l'unité ou par deux – trois à la fois, le 30/08/2002. Un mâle (autopsie du cadavre) le 03/11 à Kerhilio / Erdeven.

Fou de Bassan *Sula bassana*

(12 données)

A partir de fin juillet, l'espèce est détectée devant la Tour des Anglais / Damgan et la

pointe de Gâvres, plus de 400 le 10/08/2002 et 840 comptés le lendemain à la Tour des Anglais. A Gâvres, les effectifs relevés sont plus modestes. 39 individus le 10/08 à la Roche Sèche / Erdeven.

Dates	Effectif	Circonstances
29/07	41	En 1h15 de guet (07h30-08h45). pleine mer, vent de nord-ouest, 1-3 Beaufort.
12/08	39	En 1h40 de guet (07h35-09h15). pleine mer, vent de nord-ouest, 3-4 Beaufort.
12/10	108	En 45 min de guet (09h30-10h15). pleine mer, vent de nord-ouest, 3-4 Beaufort.
16/10	6	En 45 min de guet (13h00-13h45). pleine mer, vent de sud-est, 2-3 Beaufort.
31/10	1	En 45 min de guet (11h00-11h45).

Fou de Bassan, guet à la mer à la pointe de Gâvres (Morbihan) ; juillet – octobre 2002

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

(75 données)

Pas de précision sur la reproduction dans le Golfe du Morbihan ; 90 individus sur les cyprès de l'île Gohvihan / Sarzeau le 24/07/2002.

Dortoirs :

- étang de la Forêt / Brandivy, 1 immature le 26/07/2002 et 1 le 09/11.
- étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 1 le 07/08.
- rade de Lorient :

Date	Effectifs	dortoir	Total rade Lorient
01/06	45	port militaire	45
31/07	108	port militaire	108
24/10	77	port militaire	288
24/10	205	île aux Souris	
07/11	105	port militaire	301
07/11	172	île aux Souris	

Grand Cormoran, dortoirs de la rade de Lorient (Morbihan) ; juin – nov. 2002

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

(2 données)

Vingt-six en reposoir sur les Rouzes le 05/10/2002 à la pointe de Porh-Lineneu / Erdeven. 7 le 31/10 à Beg en Aod / Saint-Pierre-Quiberon.

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

(2 données)

Un vu au Varquez / Erdeven le 16/03/2002. D'après un témoin, deux individus aurait hiverné là. Sur un site plus classique, un individu le 15/11 à l'étang de Lannédec / Ploemeur.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*

(2 données)

Un individu dérangé du couvert des saules le long de la voie ferrée, le 31/03/2002 à l'étang du Cranic / Brec'h. Mais ce n'est pas tout... le 01/11/ un individu est aperçu, au

« *repos absolu, perché (et presque dissimulé) dans un arbre accueillant également une dizaine d'aigrettes et 4 ou 5 hérons cendrés, en rive droite du chenal de Saint-Jean [Locoal-Mendon], visible depuis la route de Kerrio* ».

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

(107 données)

Reproduction : à Kerzo / Port-Louis, au moins cinq aires sont occupées, un poussin.

Rassemblements : 35 à la Forêt / Locoal-Mendon, le 09/05, 71 à Pen Mané / Locmiquélic, le 27/07 ; 50 à l'aval de Kerouarc'h / Locmariaquer le 27/08 ; à l'étang du Roc'h Du / Locmariaquer, il y en a une trentaine durant le mois d'août, 36 au Sterbouët / Locmiquélic le 11/09 ; 21 au reposoir à Kerfrezec / Sainte-Hélène, sur des arbres, le 29/09.

Grande Aigrette *Egretta alba*

(23 données)

L'espèce est notée du 07 juillet à la fin de la période.

A part une paire le 25/09/2002 au Cranic / Brec'h les 25 et 28/10/2002, il s'agit toujours d'individus isolés, dont un jeune bagué du printemps à Grand-Lieu : étang de Saint-Jean, étang du Cranic, étangs de Branguily / Gueltas, marais de Séné, Josselin, Petite Mer de Gâvres.

Héron cendré *Ardea cinerea*

(46 données)

Reproduction : au moins 11 aires occupées à Kerzo / Port-Louis le 21/04/2002.

Rassemblement : 20 à Pen Mané / Locmiquélic le 27/07, 15 au Roc'h Du / Locmariaquer le 19/07, 15 au Cranic / Brec'h le 25/09.

Au dortoir de Brandivy, 4 individus rejoignent aigrettes et cormorans le 04/11, premiers de la saison.

Cigogne noire *Ciconia nigra*

(1 donnée)

Un individu sur les marais près de Billion / Ambon, le 24/08/2002.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(51 données)

L'espèce n'est plus notée entre le 01/05/2002 et le 14/07 puis en quelques jours gagne l'ensemble du littoral morbihannais, les oiseaux bagués confirment l'origine à Grand-Lieu. Ils sont déjà dix en Petite Mer de Gâvres le 24/10.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

(13 données)

Dix individus le 20/04/2002 dans les marais de Séné. Dès le 24/10, une hivernante déjà connue gagne la Petite Mer de Gâvres.

Anatidés indéterminés *Anas sp*

(1 donnée)

Dix sarcelles le 19/08/2002 à Kersahu / Gâvres.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

(43 données)

Reproduction à Pen Mané / Locmiquélic, Kervran / Plouhinec, Saint-Jean / Locoal-Mendon...

Cygne noir *Cygnus ater*

(6 données)

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

(1 donnée)

Au Magouëro / Plouhinec, un cadavre avancé le 10/11/2002.

Oie cendrée *Anser anser*

(1 donnée)

Quatre individus à Pen Mané / Locmiquélic le 01/11/2002 s'éloignent après les coups de feu en lisière du marais.

Bernache nonnette *Brenta leucopsis*

(1 donnée)

Six volent le 23/10/2002 à Kerhillio / Erdeven.

Bernache cravant *Brenta bernicla*

(29 données)

Les premières arrivées :

- le 29/09/2002, Petite Mer de Gâvres, 8 individus.
- 199 devant le Bronzais / Pénestin le 30/09.
- 150 survolent Vannes le 10/10.
- 170 en baie de Plouharnel le 12/10.

A Pénestin on trouve 5% de jeunes sur 700 individus le 16/10, en Petite Mer de Gâvres 8% de jeunes sur 1040 le 09/11.

Il y avait un individu *hrota* au Duer / Sarzeau le 01/04.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*

(8 données)

Une femelle séjourne sur l'étang du Cranic / Brec'h entre les 26/08 et 25/09/2002.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(107 données)

Reproduction, bilan très partiel :

- sur les bassins d'épuration d'Auray, un couple et 10 poussins de quelques jours le 17/05/2002, 5, 5 et 4 poussins le 09/06.
- bassins d'épuration de Sainte-Hélène, une famille de 8 poussins est menée jusqu'à l'envol.
- de même pour 10 poussins sur les bassins de la Madeleine / Merlevenez.
- à Pen Mané / Locmiquélic, six nichées sont conduites.
- moulin de Coët-Courzo / Locmariaquer, 4 poussins le 10/07.
- le 17/05, 12 poussins au moulin de Pomper / Baden.
- seulement 44 poussins notés à Kersahu / Gâvres.

D'autres couples à Falguérec / Séné, la rivière du Bono, les dunes de Kerminihy / Erdeven...

Rassemblements : Hoëdic, 58 individus le 17/04/2002 ; Pen Mané / Locmiquélic, 101 adultes le 26/06 ; Petite Mer de Gâvres, 209 le 24/03 et 137 le 06/04.

Canard siffleur *Anas penelope*

(27 données)

Quelques individus sont encore trouvés courant mars puis une lacune s'étend du 29/03 au 04/09/2002 : 41 au Bronzais / Pénestin le 30/09 ; Saint-Jean / Locoal-Mendon, les neuf premiers le 12/10, 80 le lendemain, plus de 100 le 20/10.

Canard chipeau *Anas strepera*

(2 données)

Une femelle le 17/09/2002 aux étangs de Branguily / Gueltas ; un individu le 15/11 à Pen Mané / Locmiquélic.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(23 données)

Deux premières sont signalées le 21/07/2002 à Falguérec / Séné puis il faut patienter jusqu'au 20/08 pour en revoir à Pen Mané / Locmiquélic avec 3 individus puis un groupe de vingt le 12/09 ; 34 à Toulvern / Baden le 18/09.

Canard colvert *Anas platyrinchos*


(150 données)

Nombreux sites de reproduction.


Rassemblements :

Localité	Commune	Effectif	Date
Pen Mané	Locmiquélic	218	01/06
étang du Cranic	Brec'h	309	30/07
étangs de Branguily	Gueltas	168	04/08
étang du Cranic	Brec'h	197	15/08
étang du Roc'h Du	Crac'h	248	27/08
étang de Toulvern	Baden	222	27/08
étangs de Branguily	Gueltas	150	02/09
étang/réserve de chasse	Régigny	230	07/09
Kerouarc'h	Locmariaquer	335	28/10

Canard colvert, rassemblements, juin à octobre 2002 (Morbihan)



Canard colvert à Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan) ; été 2002



Canard colvert à Saint-Jean / Locoal-Mendon (Morbihan) ; été 2002

Canard pilet *Anas acuta*

(16 données)

Retour de quelques isolés à la mi-septembre.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

(3 données)

Durant la seconde décade d'avril, un mâle est vu à Suscinio / Sarzeau, Falguérec / Séné et Kervran / Plouhinec. Voilà pour la Sarcelle d'été !

Canard souchet *Anas clypeata*

(24 données)

Le stationnement est marqué ce printemps à Pen Mané / Locmiquélic : du 23/03 au 02/05/2002, d'abord un groupe qui compte jusqu'à 18 individus fin mars puis l'effectif baisse dès le 01/04 (6 individus), un ou deux couples s'attardent.


Retour : 23/07 à Pont-Caden / le Tour-du-Parc, un individu puis on note une lacune qui amène au 02/09, 2 individus à Branguily / Gueltas, 16 au Roc'h Du / Locmariaquer le 18/09.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

(28 données)

Les Milouins sont partis quand débute la période de cette chronique, un mâle estive à Vannes.

L'étang du Cranic / Brec'h est le cadre d'un séjour estival :



Fuligule milouin, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; été 2002

Les Milouins reviennent dans la seconde quinzaine d'octobre à Vannes : 22 le 26/10 sur l'étang aux Ducs. Les mâles y sont très majoritaires :

- 25 sur 30 le 31/10.
- 23 sur 25 le 02/11.
- 19 sur 22 le 10/11.

L'effectif gonfle avec 129 à Bonnervo / Theix le 10/11.

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* (1 donnée)

Une femelle se pose sur les bassins d'épuration de Meslan le 23/03/2002.

Fuligule morillon *Aythya morillon* (9 données)

La femelle qui est encore à Suscinio le 16/04/2002, le couple à Pen Mané / Locmiquélic le 02/05 et dont la femelle fouille la phragmitaie ne resteront pas là.

Deux individus au Cranic / Brec'h le 18/09 et 37 sur l'étang du Ter / Ploemeur le 12/11.

Eider à duvet *Somateria mollissima* (2 données)

Un mâle en éclipse plonge et mange des crabes, le 26/10/2002 à Kerouriec / Erdeven puis un juvénile le 29/10 à La Roche Sèche / Erdeven.

Macreuse noire *Melanita nigra* (12 données)

Plus d'une centaine devant Penvins / Sarzeau le 12/04/2002 et on les retrouve au passage estival à partir de la Tour des Anglais / Damgan avec 25 et 38 individus les 10 et 11/08, seulement trois devant Gâvres le 12/08 pendant une séance de guet à la mer et 37 qui longent la presqu'île devant Beg er Goalenec / Quiberon le 31/10.

Macreuse brune *Melanita fusca* (2 données)

De retour d'Hoëdic, le 19/10/2002, du bateau, un vol de 12 individus. Un Macreuse brune devant la grande plage à Damgan le 01/11.

Harle huppé *Mergus serrator* (5 données)

Premier retour rapporté : une femelle à Sterbouët / Locmiquélic le 29/10/2002.

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis* (4 données)

Cela concerne un premier groupe de trois femelles et un mâle le 26/08/2002, quatre femelles le 29/08 et une femelle le 13/11. Ces observations ont lieu sur l'étang du Cranic / Brec'h.

AR VRAN MORBIHAN N° 25

Groupe n° 2 Des rapaces aux rallidés.

Choix et rédaction établis par Franz URVOAZ

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

(13 données)

Les observations s'échelonnent du 07/04 au 26/07/2002. Observations effectuées sur les 9 communes suivantes : Sarzeau, Languidic, Ploemel, Landaul, Lanvéneën, Locoal-Mendon, Tréhorenteuc, Colpo et Les Forges. A noter l'attaque d'une Bondrée apivore par un Faucon hobereau mâle défendant son aire le 01/07 à Colpo.

Milan noir *Milvus migrans*

(20 données)

Les données proviennent de 9 communes différentes : Plouharnel, Plescop, Tréhorenteuc, Sarzeau, Brec'h, Landaul, Brandérion, Languidic, Landévant. Les trois premiers individus sont aperçus en vol au-dessus de la RN 165 dès le 24/03. La dernière observation (19/08) concerne 1 couple accompagné de 2 jeunes sur la commune de Landaul.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

(78 données)

Observations faites sur les 16 communes suivantes : Erdeven, Belz, Locmiquélic, Locoal-Mendon, Brec'h, Plouhinec, Crac'h, Séné, Saint-Armel, Surzur, Sarzeau, Gâvres, Damgan, Guidel, Plouharnel et Ploemeur. Sur plusieurs des communes précitées des indices de reproduction soit probable soit certaine sont relevés. A noter 8 individus prenant leur essor ensemble après l'irruption de chasseurs le 20/10/2002 à l'étang de Saint Jean / Locoal-Mendon.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

(29 données)

Les données proviennent de 17 communes à savoir : Mohon, Sérent, Landaul, Hoëdic, Landévant, Croix-Helléan, Ploeren, Meucon, Guégon, Ploemel, Languidic, Tréhorenteuc, Camors, Carentoir, Campénéac, Locoal-Mendon et Locmiquélic. A deux reprises des indices de reproduction sont constatés : à Tréhorenteuc et à Camors. A ce dernier endroit, 3 juvéniles sont contactés le 10/07.

Busard cendré *Circus pygargus*

(3 données)

Seulement 2 communes, Tréhorenteuc et Campénéac, sont répertoriées mais dans les 2 cas avec des indices certains de reproduction. 4 jeunes volants sont même notés sur la commune de Campénéac le 24/07.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

(2 données)

Un mâle immature est observé sur la commune de Berné le 23/03/2002 et une femelle le 06/09 à Pont-Scorff.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

(50 données)

29 communes ont fait l'objet d'au moins une observation : Quéven, Belz, Berné, Languidic, Landaul, Baud, Inzinzac-Lochrist, Sainte-Brigitte, Plouhinec, Brandérion, Locmariaquer, Moréac, Brandivy, Crac'h, Sarzeau, Erdeven, Locoal-Mendon, Brec'h, Nostang, Sainte-Hélène, Kervignac, Camors, Locmiquélic, Neuillac, Gueltas, Gâvres, Hoëdic, Crédin et Theix. Des indices de reproduction sont établis sur 7 des communes précitées. A noter une prédation sur une Sterne pierregarin le 13/08 à Sainte-Hélène et la découverte d'un juvénile agonisant dans un jardin de Neuillac le 12/09.

*Epervier d'Europe, Hoëdic***Buse variable *Buteo buteo***

(143 données)

Pendant la période considérée, cet oiseau est noté sur les 48 communes suivantes : Brec'h, Belz, Berné, Erdeven, Languidic, Pontivy, Les Forges, Bréhan, Caudan, Sérent, Camors, Plumelec, Crédin, Gourin, Muzillac, Baud, Brandivy, Inzinzac-Lochrist, Sainte-Brigitte, Cléguer, Ploeren, Crac'h, Moréac, Colpo, Pleugriffet, Josselin, Pluvigner, Gueltas, Guillac, Locoal-Mendon, Sarzeau, Surzur, Campénéac, Questembert, Limerzel, La Chapelle-Neuve, Radenac, Séné, Meslan, Damgan, Saint-Thuriau, Locmiquélic, Noyal-Pontivy, Landaul, Plumelin, Ploemeur, Plouharnel et Kerfourn. Des indices de reproduction sont établis pour 10 communes : Languidic, Brec'h, Crédin, Locoal-Mendon, Meslan, La Chapelle-Neuve, Radenac, Surzur, Moréac et Berné.

Quelques anecdotes : 6 individus planent en compagnie de faucons crécerelles au Lic / Damgan le 25/08 ou encore à Crédin, un juvénile au plumage déconcertant est noté à savoir : dessus brun, tête un peu plus pâle et dessous blanc, particulièrement la gorge et la poitrine.

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*

(20 données)

Ces données se répartissent sur 7 communes : Locoal-Mendon, Nostang, Landaul, Brec'h, Locmiquélic, Gâvres et Noyal.

Un seul individu est observé lors de la migration de printemps le 22/04/2002 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon. Un individu stationne à l'étang du Cranic / Landaul du 11/08 au 25/09.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

(87 données)

Ces observations concernent 37 communes : Landaul, Belz, Crédin, Erdeven, Baud, Languidic, Riantec, Berné, Muzillac, Camors, Plumelin, Ploemel, Inzinzac-Lochrist, Auray, Le Saint, Cléguer, Plouharnel, Noyal-Pontivy, Plouhinec, Ploërmel, Locmariaquer, Locmiquélic, Séné, Surzur, Saint-Armel, Sarzeau, Muzillac, Brandivy, Damgan, Gâvres, La Chapelle-Neuve, Locoal-Mendon, Neuillac, Radenac, Taupont, Guidel et Ploemeur. Des indices de reproduction sont notés sur les communes suivantes : Crédin, Languidic, Riantec, Baud, Ploemel, Plumelin, Plouhinec et Damgan. Quelques faits anecdotiques : 5 individus en vol en compagnie de 6 Buses variables le 25/08 à Damgan. Un mâle capture un lézard vert (*Lacerta viridis*) puis suite à un dérangement laisse tomber sa proie le 13/07/2002 à Locmiquélic. Un mâle harcèle un Faucon pèlerin le 10/11 à Plumelin.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

(6 données)

Ces observations proviennent de 4 communes : Erdeven, Locmiquélic, Plouhinec et Hoëdic. 1 donnée de printemps le 24/03/2002 à Kerminihy / Erdeven.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

(33 données)

Les données parviennent de 16 communes : Erdeven, Damgan, Brec'h, La Croix-Helléan, Sérent, Camors, Gueltas, Berné, Colpo, Campénéac, Vannes, La Chapelle-Neuve, Locoal-Mendon, Radenac, Noyal et Languidic. La seule mention certaine de reproduction concerne la commune de Colpo.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(7 données)

Les 5 communes d'où nous parviennent des données sont les suivantes : Plouharnel, Pénestin, Plumelin, Erdeven et Guidel. Deux anecdotes méritent une mention : 1 chasse aux petits limicoles le 16/10/2002 à Pénestin et 1 juvénile pourchassé par un Faucon crécerelle mâle le 10/11 à Plumelin

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

(2 données)

Ces deux observations sont faites sur la commune de Languidic.

Perdrix grise *Perdix perdix*

(2 données)

Ces deux observations sont faites sur la commune de Gueltas.

Caille des blés *Coturnix coturnix*

(5 donnée)

Pour la deuxième année consécutive des données intéressantes nous parviennent sur cette espèce. Elles concernent cette fois les communes de Languidic et de Camors. Un mâle chanteur est entendu 3 jours consécutifs à Kergollaire / Languidic. Cependant, contrairement à 2001, aucune mention certaine de reproduction ne nous est parvenue.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

(2 données)

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(10 données)

Des observations sont effectuées dans 11 communes : Locmiquélic, Erdeven, Sarzeau, Brec'h, Crac'h, Locoal-Mendon, Guidel, Gueltas, Hoëdic, Brandivy et Ploemeur. 4 indices de reproduction sont relevés sur les communes de Erdeven, Locmiquélic, Crac'h et Locoal-Mendon.

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

(6 données)

Toutes ces données sont effectuées à Pen Mané / Locmiquélic, la première le 07/03/2002, les 4 suivantes du 07/09 au 13/09 concernent un jeune et la dernière le 02/10.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

(76 données)

La reproduction est avérée à Groix, Hoëdic, Er Varquez / Erdeven, étang de la Forêt / Brandivy, étang du Cranic / Brec'h et aux étangs de Branguily / Gueltas.





Regroupements les plus importants :

- 10 individus le 23/03/2002 à l'étang de la Forêt / Brandivy.
- 10 individus le 17/08 à Er Varquez / Erdeven.
- 12 individus le 07/09 à Crédin sur les bassins d'épuration.
- 10 individus le 11/09 à l'étang du Cranic / Brec'h.
- 10 individus le 17/09 aux étangs de Branguily / Gueltas.-

Foulque macroule *Fulica atra*

(167 données)

Ces données émanent de 25 communes : Erdeven, Gueltas, Locmiquélic, Brec'h, Locoal-Mendon, Crac'h, Ploërmel, Damgan, Theix, Saint-Philibert, Hoëdic, Crédin, Sérent, Saint-Barthélémy, Sarzeau, Saint-Gildas-de-Rhuys, Le Tour du Parc, Ambon, Brandivy, Régigny, Saint-Marcel, Guilliers, Baden, Plouharnel et Meslan. Dès le début Juin des regroupements significatifs peuvent être observés. Ci-dessous l'évolution des effectifs sur les 4 sites également suivis en 2002



Foulques macroules sur trois étangs (A = Roch Du, B = Cranic, D = Saint-Jean) et un bassin (C = Pen-Mané) du Morbihan : été-automne 2002

AR VRAN MORBIHAN N° 25

Groupe n° 3 De l'Huîtrier pie au Tournepierre à collier
Choix et rédaction établis par Yannick Ordureau**Huîtrier pie *Haematopus ostralegus***

(15 données)

Le 12/10/2002 , 89 individus sur la plage des sables blancs / Plouharnel , 65 le 18/10 sur l'îlot sud à Hoëdic et 300 le 19/10 au Conguel / Quiberon

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

(55 données)

La première est signalée le 30/03/2002 dans les lagunes de Damgan.

Reproduction :

- Kersahu / Gâvres ; deux couples, avec accouplement, le 06/04, il y aura au maximum 4 couveuses. Un seul couple conduira trois jeunes à l'envol, seconde quinzaine de juillet.
- Pen Mané / Locmiquélic ; une couveuse s'installe du 29/06 au 06/07 mais échoue.
- L'Isle / Plouhinec ; une alarme le 04/07 laisse un doute sur une nidification.

Des familles sont observées en juillet aux lagunages de Damgan, à Suscinio / Sarzeau.

Les rassemblements sont marqués à Pen Mané, dès le 01/07, jeunes et adultes, se rassemblent ; le maximum atteint 19 le 28/07, il n'y en a plus le 08/08.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(10 données)

4 couveuses dès le 09/05/2002 dans les marais en bas du bourg d'Ambon. Le 30/09 , 300 individus à Tréhiguier / Pénestin.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

(11 données)

Deux individus en vol vers l'ouest à Moténo / Plouhinec le 31/05/2002. A Kerminehy / Erdeven , la première observation a lieu le 22/07, puis on doit attendre le 18/08 pour le voir de nouveau ; 4 individus y sont observés le 23/08 et le 24/09.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

(18 données)

De nombreuses données dont 3 individus le 13/04/2002 à Suscinio / Sarzeau , un nid avec 4 œufs le 15/05 à l'étang des Basses Landes / Sérent. Un couveur le 1/07 à Pen Mané / Locmiquélic échoue à partir du 06/07 mais, un peu plus loin, un couple a sans doute produit les deux jeunes qui rejoignent Pen Mané en juillet..

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

(28 données)

45 individus dans l'anse du Pô / Carnac le 16/04/2002 , 25 le 25/07 à Le Lenn / Damgan puis 35 le 24/08 dont un bagué. Un total de 1008 individus en reposoir à Linès / Gâvres le 30/08.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (18 données)

Reproduction :

- Sarzeau ; au moins un couple à Suscinio le 16/04/2002.
- Erdeven ; 5 couples vers Kerminihy, seconde moitié de mai.
- Plouhinec ; 5 couples sur 2 km de dunes au Moténo, mi-mai.
- Gâvres ; 3 couples se reproduisent sur la plage, juillet.

Des poussins sont vus à Erdeven et Gavres. Ajoutons deux couples à Hoëdic.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (21 données)

Le 23/03/2002 un individu à Kerminihy / Erdeven , 1 le 12/05 , puis 2 le 11/09 à Moténo / Plouhinec. Dès le 17/10 , une forte concentration de 200 individus à Kervihan / Pluméliau , 205 le 31/10 à Linès / Plouhinec , 255 le 03/11 à Gâvres et 309 le 15/11 au Grand Loc'h / Guidel.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (9 données)

Le 30/08/2002 à Linès / Gâvres , observation de 100 individus puis de 66 le 30/08 et de 77 le 31/10.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (99 données)

Reproduction : l'espèce niche en plusieurs points du littoral, le succès de reproduction semble faible.

- er Varquez / Erdeven, un à deux couples.
- Kerminihy / Erdeven, cinq couples.
- Kerouriec / Erdeven, au moins un couple.
- Sainte-Barbe / Erdeven, 3-4 couples entre mars et avril mais le total a pu s'élever à une douzaine de couples ; beaucoup de dérangement.
- sur les dunes de Kervran –Kerzine / Plouhinec, 18 à 20 couples.

On trouve aussi des nicheurs sur des prairies, labours voire terrain-vague :

- Ty Rhu / Locoal-Mendon, un couple nicheur sur une prairie.
- près du bourg de Mendon, une alarme laisse croire à une tentative de reproduction.
- la Montagne du Salut / Caudan, un couple réussit sa couvée entre la voie rapide et une aire goudronnée en voie d'envahissement par les ajoncs.

date	Effectifs	Localité	Commune
04/08	110	Nénez	Pluméliau
17/10	160	Kervihan	
10/09	160	étangs de Branguily	Gueltas
17/10	160	Locqueltas	Cleguerec
29/11	171	Pen Mané	Locmiquelic
07/11	180	bord RN 166	La Chapelle

08/11	180	?	Mauron
28/10	200	?	Moustoir-Ac
17/10	280	?	
05/11	303	Notre Dame de Bon-Secours	Quéven
28/10	176	le Grand Loc'h	Guidel
04/11	540		
26/11	626		
15/11	878		

Vannicau huppé, rassemblements (Morbihan) : été – automne 2002

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

(7 données)

5 adultes dans les marais de Falguérec / Séné le 27/08/2002 ; au Bronzais / Pénestin , 63 individus le 30/09 puis 15 le 21/10.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

(10 données)

Un regroupement de 97 individus le 17/04/2002 au Vieux Port / Hoëdic , 250 le 12/10 dans la baie de Plouharnel, 80 le 19/10 au Conguel / Quiberon.

Bécasseau minute *Calidris minuta*

(12 données)

Dernier au printemps le 01/06/2002 à Pen Mané / Locmiquélic. Le retour y est noté le 03/08, avec 4 individus, piètre maximum de la saison. Le dernier est vu le 02/12 au Cranic / Brec'h. L'espèce est noté également au Loc'h / Guidel et sur l'étang au Duc / Ploërmel.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

(1 donnée)

Une observation de 2 individus le 26/09/2002 à Moténo / Plouhinec

Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis*

(2 données)

Le 10/08/2002 à Falguérec / Séné observation d'un adulte en plumage de transition.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

(12 données)

Deux derniers le 15/05/2002 à Pen Mané / Locmiquélic. On retrouve l'espèce à partir du 14/08 à Falguérec / Séné, avec un maximum de 12 à Pen Mané le 07/09. Le dernier est vu à la Roche-Sèche / Erdeven le 12/10.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(2 données)

A Fort Bloqué / Ploemeur ,10 individus le 19/04/2002 et 1 le 01/10

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(39 données)

132 individus le 16/04/2002 à l'Anse du Pô / Carnac dont un individu leucistique ayant quelques plumes sombres sur le manteau et les scapulaires .

Quelques regroupements importants :

- 764 le 15/05 à Pen Mané / Locmiquélic
- 120 le 10/08 à Falguérec / Séné
- 560 le 28/10 à Kerouarc'h / Locmariaquer
- 1472 le 31/10 à Linès / Plouhinec .

Une observation hors littoral d'un juvénile avec des Bécassines des marais est signalée dans l'étang de Branguily / Gueltas.

Combattant varié *Philomachus pugnax*

(8 données)

Une donnée de 7 individus le 25/03/2002 à Roche Sèche / Erdeven .

Une majorité en fin d'été : 4 le 19/02 à Pen Mané / Locmiquélic ; 1 adulte et 2 juvéniles le 17/09 à l'étang de Branguily / Gueltas

Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus*

(1 donnée)

Un individu observé le 14/11/2002 à Moténo / Plouhinec.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

(46 données)

Observations au printemps puis le reste dès la fin août dont : 16 le 28/09 à l'étang au Duc / Ploërmel ; 25 le 3/10 à l'étang de Branguily / Gueltas ; 35 le 10/11 dans les lagunes de Damgan.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

(23 données)

Une seule observation printanière de 5 individus le 7/03 à Pen Mané / Locmiquélic.

Le 21/07 , un regroupement de 120 individus à Falguérec / Séné , puis 45 le 10/08. Au Bronzais / Pénestin , 100 le 30/09 puis 150 le 21/10.

Barge rousse *Limosa lapponica*

(25 données)

Plusieurs observations en mai dont : 21 le 05/05 à Le Gouarde / Nostang ; 62 le 09/05 à Saint Sterlin / Kervignac. D' autres courant septembre dont : 35 le 11/09 à Pen Mané / Locmiquélic ; 30 le 18/09 à Kerouarc'h / Locmariaquer ; 76 le 21/10 dans la Baie de Plouharnel.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

(38 données)

Quelques observations au printemps : 23 le 01/05/2002 sur la Plage de Plouhinec ; 35 le 12/05 à Berringue / Plouhinec ; 20 le 12/05 à Kerminihy / Erdeven.

Au retour de nombreuses observations dont un regroupement à Le Gouarde / Nostang de 60 le 21/07 et de 57 le 1/08 , et un autre de 133 en reposoir de haute mer le 13/08 à Iniz er Mor / Sainte-Hélène.

Courlis cendré *Numenius aquata*

(20 données)

Deux données printanières : le 16/04/2002 , 2 individus à l'Anse du Pô / Carnac et 10 à Kersahu / Gâvres le 31/05. Augmentation des effectifs dès la fin juillet : à Le Gouarde / Nostang , 42 le 24/07 , 39 le 1/08 , 77 le 17/08 et 53 le 3/11 ; à Linès / Gâvres , 77 le 12/09 ; à Kerfaute / Gâvres , 64 le 17/10.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

(4 données)

Aucune donnée printanière. Un individu en mue le 22/07 au Duer / Sarzeau , 4 à Falguérec / Séné , 2 le 19/08 à Kersahu / Gâvres , 1 le 17/10 à l'Etang du Roc'h Du / Crac'h.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

(48 données)

Aucune observation n'indique la présence de jeunes .Une observation précise une parade le 17/05/2002 à Kersahu / Gâvres , une autre indique la nidification probable d'un couple le 23/06 dans ce même site . Les rassemblements amorcés dès fin juin (33 le 29/06 à Pen Mané / Locmiquélic) sont au maximum en août (141 le 25/07 à Pen Mané, 170 à Larmor-Redion / Damgan les 04 et 25/08, encore 118 à Pen Mané le 07/09).

Chevalier stagnatile *Tringa stagnalis*

(2 données)

Un individu (premier hiver) le 10/08/2002 à Falguérec / Séné.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

(60 données)

Un nombre important de données dont huit printanières. Un suivi intéressant à l'Etang du Roc'h Du / Crac'h est récapitulé dans le tableau suivant.

date	Effectifs
19/07	71
2/08	86
9/08	67
27/08	83
4/09	54
18/09	23
25/09	5
17/10	54
28/10	29

Chevalier aboyeur, étang du Roc'h Du / Locmariaquer (Morbihan) ;
juillet – octobre 2002

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

(56 données)

Seulement 6 données printanières dont une fin d'hivernage à Quinipily / Baud. Le passage post-nuptial est ressenti à partir du 14/07/2002 et connaît un pic en septembre. Le maximum observé est 21 individus à Falguérec / Séné le 10/08.

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

(3 données)

Un à deux individus entre le 30/07/2002 et le 15/09.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (89 données)

Encore 11 à Beg Kerio / Belz le 01/04/2002 et le 21/04 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon. Un retour est sensible dès début juillet. Quelques concentrations : 11 à Kersahu / Gâvres le 20/07 ; 12 le 21/07 au Cosquer / Nostang ; 17 à Pen Mané / Locmiquélic le 24/07 et 13 le 28/07 ; 25 à Pénerf / Damgan entre le 04 et le 25/08 ;

Tournepipier à collier *Arenaria interpres* (21 données)

Au printemps 60 individus sur la plage de Plouhinec le 01/05/2002 et 50 à Le Lenn / Damgan le 25/07. Le 12/10 une concentration de 112 individus dans la Baie de Plouharnel.

AR VRAN MORBIHAN N°25

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Yann Kerninon.

La période en chiffres : 14 observateurs ont transmis 309 données concernant 17 espèces.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*

(1 donnée)

Le 30/09/2002, 1 individu est dans l'estuaire de la Vilaine devant Tréhiguier / Pénestin.

Grand Labbe *Catharacta skua*

(2 données)

En fin d'hiver, 1 cadavre est trouvé le 19/03/2002 à Sainte-Barbe / Plouharnel et à l'automne, le 18/10, 4 individus passent au large de l'île de Hoëdic.

Laridæ sp.

(5 données)

Ces données concernent des groupes de grisards vus sur l'étang au Duc / Ploërmel (74 le 29/03/02) et aux étangs de Branguily / Gueltas (78 le 10/09, 124 le 17/09 et 80 le 24/09). Un cadavre ancien est trouvé sur ce dernier site le 03/10.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

(2 données)

En moyenne, 7,18 données de Mouette mélanocéphale sont transmises depuis le numéro 14 d'Ar Vran 56 (et même 7,6 si on considère uniquement les numéros couvrant la même période). Seul l'hiver 1998-99 avait été aussi « mauvais ».

Un adulte le 21/07/2002 sur la plage de Damgan et 2 adultes le 21/09 sur Nichtarguer à Saint-Cado / Belz.

Mouette pygmée *Larus minutus*

(8 données)

Le printemps débute avec l'observation peu courante dans l'intérieur des terres de 3 mouettes le 29/03/2002 à l'étang au Duc / Ploërmel. Le 30/03, 25 sont présentes sur les lagunes de Damgan. A Pen Mané / Locmiquélic, le passage pré-nuptial est noté ainsi : 1 adulte le 04/04, 1 le 05/04, 2 immatures le 17/04, 1 adulte et 1 immature le 20/04. Deux adultes sont ensuite vus au Gouarde / Nostang le 23/04.

Une seule mention à l'automne avec 9 individus le 10/11 sur les lagunes de Damgan.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(56 données)


Aucune donnée entre le 02/04/2002 et le 15/06.

Les premiers jeunes de l'année sont notés à partir du 26/06. Leur proportion dans différents groupes a été relevée par les observateurs jusqu'à la mi-août et cela fournit le tableau suivant (seuls les groupes de plus de 50 oiseaux ont été pris en compte) :

Lieu-dit	Commune	Date	Effectif total	Nombre de juvéniles	Pourcentage de juvéniles
Pen Mané	Locmiquélic	26/06	280	8	2,85 %
Etang de Rodes	Merlevenez	27/06	60	1	1,66 %
Pen Mané	Locmiquélic		370	10	2,7 %
Pen Mané	Locmiquélic	13/07	100	9	9 %
Etang du Roc'h Du	Crac'h	19/07	81	2	2,46 %
Pen Mané	Locmiquélic	24/07	217	1	0,4 %
		28/07	154	3	1,94 %
		29/07	352	7	1,98 %
Etang du Plessis	Lanester	30/07	205	14	6,82 %
Etang du Roc'h Du	Crac'h	02/08	68	0	0 %
		09/08	52	0	0 %
		18/08	371	0	0 %

Mouettes rieuse, rassemblements et part des individus de premier été (Morbihan) ; été 2002

Pas de rassemblement important relevé cette fois-ci : maximum de 371 à l'étang du Roc'h Du en rivière d'Auray le 18/08. Pour l'intérieur du département, notons 80 mouettes en vol sud à Camors le 14/08, 70 (comptage partiel) à l'étang au Duc / Plœrmel le 28/09 et 236 à l'étang du Cranic / Brec'h le 23/10.



Mouette rieuse, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; mars-novembre 2002

Goéland cendré *Larus canus*

(11 données)

Une seule mention lors du passage printanier : 2 immatures le 01/04/2002 sur les lagunes de Damgan. Il faut attendre le 11/08 pour voir réapparaître l'espèce : 4 à Tour des Anglais / Damgan.

Les groupes les mieux fournis :

- 20 lors d'un guet à la mer le 30/09 au Bronzais / Pénestin.
- 22 le 14/10 à Conleau / Vannes.
- 8 le 17/10 à Linès / Gâvres.
- 10 le 10/11 à l'étang aux Ducs / Vannes.

Les autres données concernent de 1 à 4 individus vus sur les communes de Baden, Belz et Larmor-Baden.

Goéland brun *Larus fuscus*

(47 données)

Reproduction :

- le 15/05/2002, un couple construit un nid sur la digue centrale du lagunage d'Auray, mais ce comportement reste sans suite.
- dans le Golfe, le 24/07, une dizaine de nids sont occupés dans les cyprès de l'Île de la Jument et Hent Tenn / Arzon, de l'Île Govihan / Sarzeau et de l'Île Longue / Larmor-Baden.

Les rassemblements ont été peu suivis cette période-ci : 38 le 16/03 à l'étang du Cranic / Brec'h, 80 en dortoir le 22/03 à Beg er Vil / Sainte-Hélène, noté « très abondant » à Listrec et au Néguan / Locoal-Mendon le 23/09 et le 13/10, 50 en baie de Plouharnel le 12/10.

En dehors de l'étang du Cranic, où elle est absente d'avril à la mi-août, l'espèce a été peu notée dans les terres : 15 le 28/08 à l'étang au Duc / Ploërmel, 9 le 17/09 et 12 le 24/09 aux étangs de Branguily / Gueltas.

Goéland argenté *Larus argentatus*

(19 données)

Reproduction :

- au port de pêche de Lorient, un premier poussin est noté le 15/05/2002. Sur ce site, 41 couples suivis produisent 55 juvéniles.
- au port de commerce de Lorient, un couple mixte *L. argentatus* x *L. fuscus* produit 2 jeunes à l'envol.
- dans le Golfe, le 24/07, plusieurs dizaines de couples sont notés nicheurs sur les cyprès de l'Île de la Jument et Hent Tenn / Arzon et de l'Île Govihan / Sarzeau.

Un unique rassemblement d'importance est rapporté : plus de 4000 individus le 10/08 à Tour des Anglais / Damgan.

L'étang du Cranic / Brec'h est suivi pendant toute la période et l'espèce n'y a pas été notée d'avril à septembre. Les effectifs maximaux y sont de 183 individus le 16/03 et de 123 le 31/03.

Les étangs de Branguily / Gueltas sont visités en septembre et donnent un maximum de 28 oiseaux le 24/09. 107 individus sont rassemblés sur l'étang aux Ducs / Vannes le 10/11.

Goéland leucophée *Larus cachinnans*

(5 données)

4 données proviennent de Ty Douar et Pen Mané / Locmiquélic et ne concernent qu'un individu à chaque fois (le même ?) : le 15/05/02, puis 3-4 jours d'affilée à la fin de ce mois, le 29/06 et enfin le 01/09. Un oiseau est vu le 11/08 à Tour des anglais / Damgan.

Goéland marin *Larus marinus*

(17 données)

64,7 % de ces données concernent l'observation d'un seul individu, 17,6 % de 2-3 et 17,6 % de 7 et plus.

Au cours de la période, de 1 à 3 goélands fréquentent l'étang à marée du Roc'h Du en rivière d'Auray. Deux données intérieures en provenance de l'étang du Cranic / Brec'h avec 1 le 31/03/2002 puis le 15/08.

Reproduction : l'espèce est notée dans le Golfe avec un nid occupé sur un cyprès le 24/07 sur l'Île Longue / Larmor-Baden.

Les « rassemblements » : 7 le 11/08 à Tour des Anglais-Kervoyal / Damgan, 10 en reposoir le 12/10 dans la baie de Plouharnel et 8 le 10/11 à l'étang aux Ducs / Vannes.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(62 données)


L'espèce est bien présente tout au long de la période, mais plus de 74 % des données concernent des groupes de 10 individus ou moins. Les concentrations existent néanmoins et se situent surtout aux pics migratoires pré- et postnuptiaux :

- 93 adultes en plumage nuptial le 03/05/2002 aux Saisies / Larmor-Plage, puis 108 le 18/06,
- 180 le 04/08 à Treutan / Damgan,
- 191 le 11/08 à l'entrée de la rivière de Pénérff / Damgan. Ce même jour, le soir, plus de 400 sternes sont présentes à Tour des Anglais / Damgan,
- plus de 150 (dont 12 baguées) passent en 2 heures devant Tréhiguier / Pénestin le 30/09

La dispersion juvénile est observée à partir du 13/07 à Pen Mané / Locmiquélic (4 adultes et 2 juvéniles). Parmi 12 individus, 1 juvénile y est encore ravitaillé par 1 adulte le 18/09.

L'espèce s'éloigne peu du trait de côte ou alors à la faveur des rias, comme ces 2 sternes vues à Pen Inès / Locoal-Mendon le 29/10.

Notons aussi une faible représentation du Golfe avec seulement 6 données (9,6 %) et un maximum de 3 Caugeks à Kerouarc'h / Locmariaquer le 18/09 et le 17/10.



Sterne caugek, Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan), juin-octobre 2002

Sterne de Dougall *Sterna dougallii*

(3 données)

Le 26/07/2002, 1 adulte et 1 subadulte sur la colonie de Sternes pierregarins d'Iniz er Mor / Sainte-Hélène. Deux données en provenance du Golfe, de Larmor-Baden précisément : 4 le 10/08 sur la réserve naturelle de Pen en Toul et 5 le 27/08 à l'Île Berder (mais une douzaine était présente la veille. *comm. pers.*).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

(48 données)

L'espèce est observée du 20/04/2002 au 21/09.


Reproduction :

- le 01/05, 140 sternes sont autour d'Iniz er Mor / Sainte-Hélène (6 le 20/04) et des comportements reproducteurs sont notés. Les dénombrements à distance (donc partiels) des oiseaux nicheurs donnent 42 couveurs le 04/05 et 64 le 27/05.
- le 21/07, 1 sterne est vue en position de couveur à la réserve de Falguérec / Séné.
- dans les marais de Suscinio / Sarzeau, 2 juvéniles et 1 pullus sont notés parmi 15 individus. Un second poussin est trouvé le lendemain.
- le 27/08, à Kerouarc'h / Locmariaquer en rivièr d'Auray, sur une ancienne barge ostréicole, un juvénile à peine volant est défendu avec vigueur par 2 adultes contre un goéland. Cette même famille est encore présente le 04/09 (un nourrissage).

Fin juin, les Pierregarins commencent à se rassembler à Pen Mané / Locmiquélic où l'élevage des jeunes volants se poursuit. Deux données du 13/07 et de deux observateurs différents illustrent les mouvements de l'espèce sur ce site selon les marées notamment : 33 adultes et 18 juvéniles pour l'un, 7 adultes et 3 juvéniles pour l'autre. Le 17/07, 45 adultes et 21 juvéniles sont présents, auxquels on ajoutera les 30 individus observés en amont à Sterbouest. Cette concentration dure essentiellement jusque fin juillet.

Seulement 18,75 % des données transmises (n9) émanent du Golfe avec un maximum de 6-7 sternes à l'étang du Hézo le 26/07.

Les deux derniers groupes importants rassemblent 54 sternes le 11/08 à Tour des Anglais / Damgan et 25 le 28/08 à Pen Mané. Passé la fin août, les effectifs diminuent rapidement et les 4 dernières sont à Penvins / Sarzeau le 21/09.



Sterne pierregarin, Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan), mai-octobre 2002

Sterne naine *Sterna albifrons*

(3 données)

Peu de données pour peu d'individus. Le 25/05/2002, 1 adulte autour de la colonie de Sternes pierregarins d'Iniz er Mor / Sainte-Hélène. Lors du passage postnuptial : 2 le 11/08 à Tour des anglais / Damgan, puis 1 juvénile en mer devant Tréhiguier / Pénestin le 30/09.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus*

(4 données)

Au passage prénuptial : 1 le 09/04/2002 (présente depuis trois ou quatre jours) à la réserve naturelle des marais de Falguérec / Séné.

Au retour : 1 adulte le 15/08 à l'étang du Cranic / Brec'h, puis 1 juvénile le 27/08, et 1 juvénile le 19/08 à Kersahu / Gâvres.

Guifette noire *Chlidonias niger*

(12 données)

L'espèce n'est pas observée au printemps. Le passage postnuptial se déroule du 17/07/2002 au 18/09.

Les sites les plus fréquentés :

- 5 mentions pour l'étang du Cranic / Brec'h : 1 juvénile le 15/08, 1 juvénile le 26/08, 1 adulte le 29/08, 3 adultes et 2 juvéniles le 11/09, 1 juvénile le 18/09.
- 2 mentions pour l'étang au Duc / Ploërmel : 2 le 28/08, puis 4 le 12/09.
- 2 mentions pour l'étang de Saint-Jean : 4 adultes le 24/08 et 1 adulte le 29/08.
- Autres sites ayant accueilli l'espèce : Iniz er Mor / Saint-Hélène avec 2 juvéniles le 17/07, er Varquez / Erdeven avec 1 juvénile le 10/08 et Kerouarc'h / Locmariaquer avec 1 adulte le 18/08.

Guillemot de Troil *Uria aalge*

(0 donnée)

Pingouin torda *Alca torda*

(4 données)

1 le 24/03/2002 à Pont-Lorois / Plouhinec. 1 en vol vers l'est le 05/10 à la pointe de Porh-Lineneu / Erdeven. 1 le 12/10 dans la baie de Locmalo / Gâvres. 1 cadavre échoué frais et propre le 15/11 sur la plage de Kerhillio / Erdeven.

AR VRAN MORBIHAN N° 25

Groupe n°5 Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick PHILIPPON

Pigeon colombin *Columba oenas*

(8 données)

Comme en 2001, 3 données de la carrière de Quinipily / Baud en avril, mai et juin , entre 1 et 3 individus. Un couple parade le 30/06/2002 à la carrière de Lann Plumelin / Plumelin et 2 couples (dont un chanteur) plus un juvénile sont présents le 27/07 au même endroit. Deux nouveaux sites avec chanteurs : 1 à Lesteno / Merlevenez le 13/07 et 1 le 26/07 au haras d'Hennebont. Pas de données pour les sites du château de Trédion, de Grégo / Surzur, de Ploeren, de la Guyondaie / Caro et de Coët Candec / Colpo. Une donnée de migration post nuptiale : 1 le 04/11 à Pen Mané / Locmiquélic.

Pigeon ramier *Columba palumbus*


(22 données)

Bien présent dans tout le département y compris sur les îles et en forêt (recensement avifaune forestière). Des regroupements la troisième décade d'avril (Kéraveon / Erdeven, Nenez / Pluméliau les 24 et 26/04/2002) concernent-ils un quelconque mouvement migratoire ? Si oui, que dire des 50 individus se nourrissant au sol en forêt de Camors le 05/06 ?

Les regroupements après reproduction débutent avec 50 individus le 04/08 à la sablière de Quillan / Radenac, 65 le 31/08 à l'étang d'Er Varquez / Erdeven, 37 le 10/11 à la carrière de Lann Plumelin / Plumelin et 250 le 26/11 à Sérent en vol vers l'Ouest.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

(12 données)



Tourterelle turque, la Houssaye / Saint-Thurian (Morbihan) ; été 2003

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

(43 données)

Les premiers chanteurs sont à Hoëdic le 18/04/2002 (1 individu) et le 19/04 (3 ind.). Un regroupement de 16 individus le 16/05 au Moténo / Plouhinec traduit bien l'arrivée de cette espèce. Bien présente lors de l'opération avifaune forestière à Trémelin / Inzinzac

Lochrist et Sainte Brigitte le 26/05. En juillet, l'espèce est notée sur l'ensemble du département.

En août et début septembre, des concentrations sont notées : 28 le 04/08 à la sablière de Quillan / Radenac, 25 le 24/08 à Leslan / Campénéac, 67 le 29/08 à Kerhabellec / Baud, 12 le 05/09 à Lann-er-Groëz / Guénin . Si la dernière observation de l'espèce sur son site de nidification est du 08/09 à Languidic, elle est notée à Landévant, Locmiquélic durant le même mois. La dernière est vue le 29/09 à Pénérff / Damgan.

Perruche à collier *Psittacula krameri* (1 donnée)
1 en vol le 30/08/2002 à Kerninihy / Erdeven

Coucou gris *Cuculus canorus* (42 données)
Les premiers chanteurs le 29/03/2002 à la Ville Gleuhuel / Guégon (1), 1 le 30/03 à Lann Dourel / Plumergat et 2 le même jour aux tourbières de Sérent. Ensuite, 17 données s'étalent sur les vingt premiers jours d'avril sur l'ensemble du département , y compris dans les opérations avifaune forestière du 26/05 . Duel de deux chanteurs perchés à moins de 100 mètres l'un de l'autre et dernier chant à 22h42 le 31/05 en forêt de Floranges / Camors. 1 femelle phase rousse le 06/06 au Moteno / Plouhinec et 1 autre « rôdant dans les ajoncs » le 16/06 à l'étang de Kéravéon / Erdeven. Les derniers chanteurs sont notés le 17/06 sur le territoire de la commune de Languidic. Un juvénile quémande auprès d'une grive musicienne le 23/07 à Kerlevenan / Sarzeau.

Effraie des clochers *Tyto alba* (21 données)
Notée à Languidic (jeunes sortis du nid le 30/08/2002), Locoal-Mendon, à Kerivec / Moréac (le 29/06 nidification tous les ans dans un chêne creux depuis au moins 1979), Nostang, Ploemel (2 nidifications : le 16/05 dans la chapelle de Saint Méen à côté d'un Crécernelle et le 05/06 à Quéric la Lande) Plougoumelen, Questembert.
7 données concernant des chocs contre véhicule pendant la période (Auray, Brech, Guénin, Plougoumelen, Pluméliau, Pluvigner, Pontivy).

Chevêche d'Athéna *Athena noctua* (8 données)
L'espèce est repérée au chant : 2 individus le 23/03/2002 sur 2 sites de Nostang : Lestrohan et Saint Ernan . Considérée comme nicheuse le 05/06 à Quéric la Lande / Ploemel. 1 chanteur le 23/10 et 24/10 à Bodavel / Camors. 1 donnée concerne un choc contre véhicule : 1 le 20/09 aux QuatreChemins / Belz.

Chouette hulotte *Strix aluco* (33 données)
Arradon, Baud, Belz, Branderion, Camors (bourg et forêt), Moréac, Nostang, Ploemel, Saint Gravé, Vannes sont les principaux sites où l'espèce est entendue et /ou observée. La reproduction est confirmée (jeunes criant) à Brandérion (le 20/05/2002), Moréac (le 16/06 à Kerivec, Kerlego et Kernevenin). En août et septembre, les chanteurs de Bodavel / Camors s'expriment entre 20 h et 7h

Hibou moyen-duc *Asio otus*

(4 données)

Un chanteur le 21/03/2002 à Ty Rhu / Locoal Mendon, 1 le 18/06 en forêt de Floranges / Camors. 3 jeunes le 29/06 à Keranchel / Plurnelin. 1 choc contre véhicule le 24/04 à Monterlot.

Hibou des marais *Asio flammeus*

(2 données)

Passage automnal noté à Hoëdic les 18 et 19/10/2002 (1 individu pour chaque jour).

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

(27 données)

Premier chanteur le 24/04/2002 à Montgolérien / Meucon, alors que le premier n'est entendu en forêt de Floranges / Camors que le 04/05. En mai, les 7 données concernent 1 à 4 individus vus ensemble sur les communes de Baud, Brandivy, Camors, Meucon, Moréac, Riantec, Sainte Hélène. Nidification constatée avec 2 adultes et 2 juvéniles le 29/06 à la Crozetière / Riantec. Neuf sorties au cours du mois de juin en forêt de Floranges ont permis de déceler au moins 16 chanteurs sur un parcellaire préalablement défini. 4 données de juillet à Brandivy, Guillac, Plouhinec. Les trois derniers chanteurs sont notés le 07/08 à l'étang de Saint Jean / Locoal Mendon.

Martinet noir *Apus apus*

(21 données)

25/03/2002 : les premiers arrivent à Brandérion (en 2001 : 10/04 date la plus précoce).

La première vague d'arrivée commence avec quelques-uns au dessus de l'île d'Hoëdic le 17 et 18/04 puis s'amplifie à partir du 20 : 50 à Pen Mané / Locmiquélic, 12 à Malestroit à 9h15, 0 à 13h15. Les villes sont investies durant cette troisième décade (Lorient, Plouay, Ploermel, Vannes) comme début mai l'ensemble du département ds midi.

3 à 4 couples nichent dans un mur de clôture en pierres et de terre à 4-5 mètres de hauteur rue de la Motte à Pontivy. Première année et première donnée dans le Morbihan pour ce type de milieu (événement non noté en 2000 et 2001)

L'espèce est fidèle à ses dates de départ massives au tout début août, seuls de petits groupes d'individus (1 à 5) sont notés durant ce mois à Damgan, Locmiquélic et à Séné où 22 individus chassent au dessus des marais de Falguerec le 27 août.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(83 données)


83 données du 23/03 au 11/11/2002 réparties sur 32 sites situés aussi bien sur le littoral que sur les étangs et cours d'eaux de l'intérieur. Les données de mars, avril et mai proviennent de Brandivy (étang de la Forêt) et de Saint Barthélemy (le Stum, étangs de St Adrien), pour 1 individu vu à chaque fois.

La nidification est trouvée à :

- Saint Barthélemy (le Stum, étangs de Saint-Adrien), avec 1 jeune non volant et 2 adultes le 03/07.
- à l'étang de la forêt / Brandivy le 03/08 (1 adulte. et 1 jeune).
- à l'étang de Branguily / Gueltas le 04/08 (1 jeune).

En juillet, les étangs de Roch Du / Crac'h, du Cranic / Belz, de Branguily / Gueltas, de Saint Jean / Locoal Mendon, de Er Varquez / Erdeven, et les stations d'épuration de Plouharnel et de Crédin offrent le spectacle d'un individu.

L'erratisme post nuptial semble débuter dès début août à la Grenouillère / Kerfourn (04/08), Rosvelec / Vannes (1 le 10/08), Tallen / Baud (1 le 12/08), s'amplifie en deuxième quinzaine (2 le 20/08 au Vieux Passage / Plouhinec, 4 le 22/08 à l'étang du Château de Trô / Guilliers). En septembre et octobre, de nouveaux sites sont fréquentés (1 à 2 individus pour chaque donnée) : moulin de Coët Courzo / Locmariaquer, étangs du Roz / Noyal Pontivy, étang de Toulvern / Baden, port d'Etel, rivière de Landevant, Pont er Mor / Nostang, île d'Hoëdic, Kerner et port / Gâvres, Mez Kergatouarn / Groix sans que l'on sache, pour certains sites, s'il s'agit d'un défaut de prospection dans les mois antérieurs ou d'oiseaux en migration. Novembre n'apporte pas de nouveaux sites.



Martin-pêcheur d'Europe, nombre d'observation (Morbihan) ; mars-novembre 2002

Huppe fasciée *Upupa epops*

(8 données)

Première observation le 29/03/2002 à Ty Rhu / Locoal Mendon, jamais revue ensuite. Il faut attendre les 25 et 29 /04 pour contacter 2 individus respectivement à Kergurune / Languidic et Kerboulard / Elven. En mai, 2 sites fournissent 2 individus : la Ville Gleuhuel / Guégon et les Landes de Pinieux / Sérent. Dernière observation le 24/08 à Mane Hellec / Sainte Hélène.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

(2 données)

Deux observations de migrateurs : 1 le 28/05/2002 chante à tue-tête à Tréhorenteuc (migration pré nuptiale), et en migration post nuptiale le 30/08 à Kersahu / Gâvres.

Pic vert *Picus viridis*

(68 données)

Contacté, à raison de 1 à 3 individus par observations sur les communes de Arzon, Baud, Berné, Branderion, Brandivy, Camors, Caudan, Crac'h, Crédin, Elven, Erdeven, Gueltas, Hennebont, Ile d'Arz, La Chapelle Neuve, Locmariaquer, Meslan, Plumelin, Ploermel, Radenac, Régigny, Rochefort en Terre, Saint-Armel, Sainte-Brigitte, Saint-Gérand, Séné, Surzur, Vannes, et dans les opérations avifaune forestière.


Pic noir *Dryocopus martius*

(31 données)

Les lieux-dits en forêts de Pontcallek (Berné), de Floranges (Camors) n'ont pas été

étudiés. L'analyse de la situation des lieux-dits par commune où les observations sont réalisées fait apparaître que :

- les secteurs de Quily (Meslan Ouest, Tregugouet, Ville Clement), Guégon (Treganteur), Languidic (Kergal, Kergollaire, Kerhan, Prado), Erdeven (Crucuno et Er Varquez), Baud (Quinipily), Plumelec (Pont de Kergonan, Bois de Donnant), voire Meucon, accueillent la présence d'au moins un oiseau (cantonné ?) toute l'année, exploitant, à priori, un vaste territoire,



2 pics de données (mai et août) correspondent-ils à une période où les oiseaux sont plus visibles ou à une plus grande fréquentation des observateurs ?

Pic noir, nombre de données (Morbihan) : mars-novembre 2002

- les observations sur Hennebont (aux haras le 26/07/02 avec 3 belles loges), Sainte Hélène (le 1/06/02 une femelle alarmant), Le Cours (le 18/07/02 à Beau Soleil), Questembert (le 25/07/02 à Coët Bihan, des traces fraîches) correspondent soit à de nouveaux territoires occupés toute l'année (mais un manque de suivi existe) soit à une dispersion de jeunes.

Pour cette année, il n'est noté nicheur qu'à Camors (Goah Du le 01/05)

Enfin, l'erratisme est noté à Bodavel / Camors le 19/08/02, au bord de la RN 165 sur la commune de Pluneret le 29/08.

Par rapport à 2001, sur la même période, l'absence de données sur Sérent (la Croix Balais) Landaul (Mamé er Velin), Locoal Mendon (étang de Saint Jean), Gueltas (forêt de Branquily), Sarzeau (Duer), Branderion (Squivit) ne signifie pas l'absence de cet oiseau sur ces lieux-dits ou aux alentours.

Pic épeiche *Dendrocopos major*

(35 données)

Les tambourinages sont entendus jusqu'en mai dans les communes de Baud, Brandérion, Berné, Camors, Caudan, Erdeven, Les Forges, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Neuillac, Radenac, Séné. Le 04/05/2002, une femelle transporte de la nourriture à Coët-Fourmo / Baud, 1 couple nourrit le 10/05 à la Faisanderie / Branderion, une loge avec poussins dans une parcelle d'eucalyptus à la Madeleine / Ploemel le 23/05, noté nicheur à Beg er Lan / Merlevenez le 27/05 et 1 adulte nourrit 2 jeunes dans le site de l'estuaire du Scave rive droite / Quéven.

Pic mar *Dendrocopos medius*

(2 données)

Noté en forêt de Pontcallek / Berné le 23/03/2002. La donnée du 25/07 au bourg de Rochefort en Terre est à confirmer.

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

(9 données)

Cinq données de mars et 2 en avril : 1 femelle alarme le 17/03/2002 à Mané er Velin / Landaul ; noté entre le 24 et 26/03 à Branderion, Plumelec et Sérent et en avril à Locoal-Mendon et Quéven. 1 chanteur le 22/07 au Duer / Sarzeau et 1 le 24/08 à Er Varquez / Erdeven.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(2 données)

2 le 27/09/2002 dans les anciennes carrières de Quily et aucun le 31/10 au port de commerce de Lorient.

Alouette lulu *Lullula arborea*

(22 données)

A partir du 04/04/2002, les chanteurs sont principalement rencontrés sur les communes de Branderion, Camors, Guégon, Languidic, Locoal Mendon, Meucon, Quily, Sérent. Noté en octobre à Campénéac, Nostang sans que l'on sache s'il s'agit de locaux ou de migrants.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

(17 données)

Les chanteurs sont notés à Camors, Damgan, Hoëdic, Kerfourn, Plouhinec, Saint Gildas de Rhuys, Sarzeau, parfois en nombre comme ces 24 chanteurs sur 125 hectares le 01/05/02 sur les dunes de Kervran Kerzine / Plouhinec. Les mouvements migratoires semblent se dessiner le 30/09/02 avec 5 individus en pleine mer entre 10h et 12h au Bronzais / Penestin. 10 individus sont présents aux étangs de Branguily / Gueltas les 11 et 19/10

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

(53 données)

Arrivée de 80 individus le 07/03/2002 (première donnée) à Pen Mané / Locmiquélic, site bien suivi pendant la période et fournissant des données importantes, comme le montre le tableau ci-dessous.

07/03	23/03	24/03	01/04	04/04	13/04	01/05	26/06	24/07	28/07	08/08	11/09
80	70	50	500 - 1000	150	180	150	200	200	400	400	1

Hirondelle de rivage, Pen-Mané / Locmiquélic (Morbihan) : mars-septembre 2002

Pendant un mois (du 7 mars au 7 avril 2002), le passage est remarqué sur plusieurs sites :

- er Varquez / Erdeven : 30 le 24/03 et 60 le 01/04/02.
- étang au Duc à Ploermel : 130 le 29/03 et 400 le 01/04.
- étang de Bel Air / Priziac : 150 le 03/04..
- lagunes de Bonnervo / Theix : 50 le 07/04.

A partir de cette date, le flot migratoire s'essouffle (groupes de 30 à 60 par sites) alors que les sites de nidification de l'année précédente (carrières) sont visités.

En mai et juin, le suivi des lieux possibles de nidification : carrières de Kerouriec / Erdeven ; dunes de Kervran Kerzine / Plouhinec ; sablière de Quillian / Radenac ; carrières de Lann Plumelin / Plumelin ; carrière de Quinipily / Baud ; le Magouer /

Plouhinec, montre des excavations nombreuses mais peu sont utilisées. Eboulements naturels, extractions de sable vont ruiner la reproduction.

Notons la colonie rue de la Motte à Pontivy comme en 2000 et 2001. Environ 5 couples (contre 12 en 2001) cohabitent avec des martinets à 4 mètres de hauteur dans un mur en terre et pierres.

Des mouvements sont perceptibles dès le 10/08 avec 150 individus à la réserve de Falguérec / Séné. Toutes disparaissent début septembre. Dernière donnée le 15/09 : 2 à Kerminihy / Erdeven.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

(70 données)

40 le 07/03/02 à Pen Mané / Locmiquélic. Il faut attendre le 23/03/02 pour voir la première à Camors, Languidic, Plouhinec. Une semaine plus tard (le 29/03), elles sont 10 à Languidic et présentes (1 à 5 individus) à Les Forges, Ploermel, Vannes, Belz, Locoal Mendon, Ambon, Theix. A compter du 01/04 des groupes apparaissent : 30 le 01/04 chassent au Lac au Duc / Ploermel, 20 le 10/04 à er Varquez / Erdeven, 20 le 14/04 à l'étang du Cranic / Brec'h, 10 à Hoëdic le 18/04. Au 01/05, 100 sont à Pen Mané / Locmiquélic.

A Moréac, 5 couples produisent 10 nichées à l'envol : 1 à 3 pontes, 3 à 2 pontes, 1 à 1 ponte. Les premiers envols ont lieu début juin, le dernier le 10/9 pour le couple à trois nichées.

A partir du 08/08, les regroupements commencent : 100 à l'étang du Cranic le 08/08 ; 45 le 18/08 à Kergollaire / Languidic, 57 le 29/08 à Penn Ganquis / Camors, 200 le 28/09 à l'étang de la Forêt / Brandivy ; un passage continu, par groupes de 20 à 50 toute la journée du 29/09 à Pénerf / Damgan ; le 01/10 départ de Languidic. Des attardées sont vues : 1 le 08/10 à Les Forges et 1 le 09/10 à Campénéac ou ce groupe de 35 chassant au dessus du Blavet le 11/10 à Saint Adrien / Saint Barthélémy.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

(40 données)

Les 11 premières sont observées le 07/04/2002 à Matz / Sarzeau. Les arrivées s'échelonnent jusqu'au 15/05/02 à Saint Gérard. La recherche exhaustive des nids se réalise de juin à août. Les communes de Brec'h (6nids), Nostang (27), Merlevenez (27), Landévant (14). Des nids sont encore repérés à Ambon (10), Rochefort en Terre (25), Surzur (15), Inzinzac Lochrist (5), Cleguer (18). A noter une colonie de 21 nids dont 18 occupés sur une maison à Le Petit Lambel / Camors. Des nourrissages ont encore lieu à Nostang le 27/08. En septembre et octobre, les derniers individus sont vus : 30 le 28/09 à l'étang de la Forêt / Brandivy, 6 au centre ville d'Auray le 05/10 et 2 à Hoëdic le 20/10.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

(21 données)

Premier individu repéré au chant le 04/04/2002 à Ty Rhu / Locoal Mendon et 2 le 08/04 à Les Belans / Saint Guyomard. A compter du 19/04, les données s'intensifient (Camors, Landévant, Meucon, Plumelec, Sérent), début mai les arrivées sont nombreuses (4 le 09/05 à Meucon). L'espèce est ensuite silencieuse en juin. La migration post nuptiale est notée à Hoëdic avec 2 individus.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

(17 données)

Une seule donnée d'avril : 1 le 27/04/2002 à la tourbière de Silfiac. 4 données de juillet le situent sur les communes de Ambon (1 à Bétahon le 25/07), Le Tour du Parc (7 au Pont Neuf le 23/07/02), Damgan (1 le 25/07 au Lenn), Surzur (1 le 26/07 à Port Groix). A partir de fin septembre, des concentrations significatives traduisent la migration : 20 le 25/09 à Kerassio / Languidic, 50 le 28/09 à Kevern / Guidel, 12 sur un labour le 29/09 à Kerpenru / Camors et 20 le 04/10 à Pen Mané / Locmiquélic. Dans la dernière décade d'octobre les groupes observés dépassent la trentaine d'individus. Un rassemblement de 100 oiseaux à la tourbière de Kerfontaine / Sérent le 04/11.

Pipit maritime *Anthus petrosus*

(12 données)

Premier chant complet entendu le 24/03/2002 à Pénerf / Damgan (le couple habituel qui niche chaque année ?) et 2 ensemble le même jour à Fétan Léreg / Erdeven. 3 données de juillet et août à Ambon, Gâvres et Sarzeau. A partir d'octobre, plusieurs individus sont vus ensemble : 4 le 02/10 à la Pointe des Saisies / Gâvres, 6 le 08/10 au Petit Loch / Guidel, 12 le 12/10 à la Pointe des Saisies / Gâvres.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

(18 données)

La première vue est un individu de la race *iberiae* le 11/04/2002 à Suscinio / Sarzeau. Peu de données concernant son arrivée en avril (3 données à Erdeven et Hoëdic). Plusieurs couples à Kersahu / Gâvres le 04/05/02. Les juvéniles sont vus à partir du 23/07 à Suscinio / Sarzeau et Le Tour du Parc ; le 20/08 à Pen Mané / Locmiquélic. L'erratisme post nuptial n'est pas repéré cette année.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

(57 données)

29 communes sont concernées par au moins une observation.

Baud, Brandivy, Cléguer, Le Cours, Credin, Guégon, Gueltas, Inguiniel, Inzinzac Lochrist, Lizio, Neuillac, Plumelec, Quily, Reguiny, Saint Barthelemy, Saint Gérard, Saint Thuriau, Sérent, Silfiac, Brec'h, Erdeven, Groix, Guidel, Hennebont, Languidic, Locmiquélic, Locoal-Mendon, Plouharnel, Theix, prouvant que l'espèce est bien implantée dans le département, le plus souvent près des ruisseaux (même en forêt), moulins, stations de lagunage. Sa nidification est prouvée le 03/06/2002 à Bizoizon / Guégon dans un site étonnant : un pot de géranium dans un garage à 150 m de l'eau (nid et œufs). Les juvéniles sont vus à partir du 10/07 à l'étang de la Forêt / Brandivy, le 30/07 à Kergollaire / Languidic. Les 3 individus le 31/08 sur la dune sèche de Sainte Barbe / Plouharnel traduisent l'erratisme ou le début de la migration. 9 données en septembre (concernant jusqu'à 6 individus ensemble le 10/09 au moulin de Saint Yves / Cléguer), 12 en octobre et 4 en novembre.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

(33 données)

L'espèce est notée nicheuse sur l'ensemble du département pendant la période, aussi bien sur le littoral (Sarzeau, Locmiquélic..) que dans des cantons de l'intérieur (Gueltas). Quelques regroupements en août (30 le 08/08/2002 à Pen Mané / Locmiquélic) et en septembre (30 le 12/09 à Linès / Gâvres ; 20 le 24/09 à Neuillac).

Les dortoirs :

- celui de Vannes compte plus de 800 individus le 10/10 puis s'éclate en plusieurs dortoirs dès le 12/11.
- 85 au crépuscule à Boul Sapin / Brandérion le 09/11.
- 200 se regroupent sur le port d'Etel le 09/11.

Bergeronnette grise de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* (4 données)

Observée à l'unité entre le 14/10 et le 14/11/2002 sur les communes de Neuillac, Plouharnel, Saint-Thuriau. Pas de données concernant les individus du dortoir de Vannes, celui-ci ayant éclaté en plusieurs sites.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (13 données)

Bien présent sur l'ensemble du département pendant la période (ZNIEFF, opération avifaune, STOC EPS...). Les familles sont bruyantes fin juin et en juillet – août.

Accenteur mouchet *Prunella modularis* (10 données)

Noté sur l'ensemble du département et lors de l'opération avifaune forestière à Inzinzac Lochrist et Sainte Brigitte (26/05/2002). 1 juvénile le 24/07 à Le Lerrio / Ile aux Moines.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (19 données)

Un nid récent dans un nichoir le 26/03/2002 à Bodavel / Camors, non utilisé ultérieurement? Nicheur sur l'ensemble du département. 14 chanteurs le 02/10/02 à Pen Mané / Locmiquelic traduisent un mouvement migratoire

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (20 données)

Le premier chanteur est dans la basse vallée du Loc'h / Brec'h le 21/03/02, suivi de 2 le 23/03/02. A partir du 01/04, les arrivées se succèdent sur les sites de Erdeven, Plouhinec, Locmiquelic et un chanteur est présent à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 24/04. Il est regrettable de ne pas disposer de données concernant la rivière de Pénerf et les secteurs de Muzillac, les marais de Redon. Comme en 2001, la nidification est prouvée (le 04/07) à Pen Mané / Locmiquelic avec un jeune volant mais le site du Le Loch / Locmiquelic avec 2 mâles et 2 jeunes le 19/07/02 marque une nouveauté.. Dernières observations de 2 individus le 11/09 à Le Moteno / Plouhinec et 1 jeune le même jour à Pen Mané / Locmiquelic

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (14 données)

Nicheur à Baud à la carrière de Quinipily, Plumelin (carrière de Lann Plumelin), Vannes, (plusieurs sites), Ploermel, Sérent...

La migration est notée sur Hoëdic avec 6 individus ensemble le 18/10. Migrateurs ou hivernants le 10/11 au Bill / Damgan et le 26/11 au Fort Bloqué / Ploemeur.

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

(24 données)

Presque 4 fois plus de données qu'en 2001 ! Une donnée concerne la migration prénuptiale : 1 femelle le 23/04/2002 à la Crozetière / Riantec. 1 mâle, 1 femelle et 3 jeunes le 12/08 à Goëven / Languidic marquent le début du passage d'automne. Premiers groupes fin août : 20 le 29/08 à Kerassio / Languidic, 10 le 30/08 à Kersahu / Gâvres, puis les données concernent 1 ou 2 individus (2 bagués le 03/09 à Pen Mané) jusqu'en deuxième quinzaine de septembre. A Languidic, 12 le 21/09 à Gonnec et 10 à Goëven le 26/09. Trois données en octobre dont 3 le 17/10 à Pen Mané / Locmiquélic, 1 le 28/10 à la Trinité / Groix. Dernier individu observé : 1 le 04/11 à Pen Mané / Locmiquélic.

Tarier pâtre *Saxicola torquata*

(25 données)

Belz, Camors, Crédin, Erdeven, Gâvres, Guidel, Hoëdic, Languidic, Locmiquélic, Meucon, Plouhinec, Sarzeau, Surzur, Le Tour-du-Parc sont les communes où l'espèce est notée. Le 18/04/2002, un mâle transporte de la nourriture à Beg en Argol / Hoëdic alors que le 03/05 un couple a 2 jeunes au Moteno / Plouhinec. La migration automnale semble débuter en septembre avec les premiers groupes d'oiseaux rencontrés (4 mâles ensemble à Kerpenru / Camors le 21/09), se poursuit en octobre : 5 le 08/10 au Petit Loc'h / Guidel, 10 le 16/10 à Pen Mané / Camors et 10 sur le parking le 29/10 à la Pointe de Porh-Lineneu / Erdeven.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

(42 données)

L'espèce est moins notée au passage de printemps qu'à celui de l'automne (13 et 29 données), malgré une recherche attentive sur les dunes de Kerminihy / Erdeven le 08/03/2002, aucun migrateur n'est encore arrivé (Ar Vran 56 n°24). Des couples ou des mâles se cantonnent sur les dunes de Plouharnel (09/04), Kervran-Kerzine / Plouhinec (01/05), Moteno / Plouhinec (2 couples alarment le 06/06).

Le premier flot de migrants est vu du 12 au 31/08 (10 données) avec le 30/08 30 oiseaux en petits groupes sur la côte sauvage à Saint-Pierre-Quiberon et le 31/08 46 entre la barre d'Etel et Kerouriec / Erdeven. En septembre, un flux moins important (1 à 4 oiseaux par sites) se poursuit, en particulier observé à l'intérieur des terres (à Gonnec / Languidic : 1 le 21/09, 3 le 22/09). En octobre, ce flux est régulier pendant tout le mois (13 données sur 12 sites). Le dernier est vu le 15/11, plage de Kerhillio / Erdeven.

Merle à plastron *Turdus torquatus*

(4 données)

Unedonnée concerne l'intérieur du Morbihan : 1 femelle le 22/09 à la carrière de Quinipily / Baud ; les autres sont vus à Hoëdic, à raison d'un individu par donnée les 18 et 19/10 ; 1 jeune le 28/10 à Groix.

Merle noir *Turdus merula*

(17 données)

Premiers nids avec œufs : le 24/03/2002 à Carmez / Neuillac, le 25/03 au pont de Kergonan / Plumelec.

Grive litorne *Turdus pilaris*

(6 données)

Migration pré nuptiale remarquée fin mars et début avril : 15 le 12/03/2002 à La Ville Olivier / Guégon, encore 1 les 05 et 08/04 à La Ville Gleuhuel / Guégon. 20 le 25/03 au pont de Kergonan / Plumelec, 12 le 29/03 à l'étang au duc / Ploërmel. Migration post nuptiale : les premières sont vues en deux endroits : 1 le 08/11 au bourg de Tréhorenteuc et 20 le même jour à Kergall / Languidic.

Grive musicienne *Turdus philomelos*

(13 données)

14 /04/2002 : 4 jeunes sont volants à l'étang du Cranic / Brec'h. Le décompte avifaune forestière du 26/05 permet de la noter dans tous les massifs (Bois de Tremelin / Inzinzac Lochrist et Sainte Brigitte).

Grive mauvis *Turdus iliacus*

(17 données)

Migration printanière : est bien notée entre le 18/03/2002 et le 29/03 avec des groupes importants (30 à 100 individus par vol) à Elven, Plumelec, Pont Scorff. Des individus sont chanteurs. 3 encore présentes le 03/04 à Le Croisty. Migration automnale : passage détecté dès le 11/10, de jour, à Ploërmel avec 3 individus. Des bandes sont vues à Hoëdic les 18, 19. Les passages nocturnes au dessus de Vannes connaissent deux 2 périodes fortes : du 4 au 8/11, de manière régulière de 20h à 01h puis les 11, 12 et 13/11.

Grive draine *Turdus viscivorus*

(17 données)

Chanteurs pendant la période à Berné, Camors, Colpo, Erdeven, Hennebont, Meucon, Moréac, Nostang, Pont Scorff, Sainte Brigitte. Quelques regroupements en fin d'été comme les 15 ensemble à Kergorec / Moréac le 15/08/2002. Un groupe de 38 en vol le 08/11 à Concoret.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

(80 données)

Les données de mars portent sur un chanteur par site sauf 3 le 23/03/2002 à Pen Mané / Locmiquelic :

- en avril : 2 pics au début du mois (24 le 01/04 puis 12 le 09) et en fin de mois (31 le 20/04) ; mai et juin montrent une certaine stabilité de l'effectif chanteur : 12 le 15/05 et 16 le 13/06 (même observateur).
- en septembre et octobre, 4 chanteurs sont régulièrement contactés.

Les données de la période de nidification sont éparpillées apportant peu de précisions. Des chants imparfaits (de juvénile ?) dès le mois de juillet les 29/07, 08 et 20/08.

11 données en septembre et 11 en octobre sur les sites fréquentés au printemps, mais aussi sur des lieux différents : station de lagunage de Plouharnel, Theix

Cisticole des joncs *Cisticola jundicis*

(68 données)

Plus de 97% des données proviennent des communes côtières. En mars, les premiers chants sont constatés : station de lagunage de Kergourio / Crédin le 23/03/2002 où un individu est présent et ne sera pas revu ensuite ; Pen Mané / Locmiquelic : 1 chanteur le 28/03 , 4 le 01/04, 9 le 09/04, 15 le 20/04 et 14 le 13/06, 12 chanteurs à Kersahu /Gâvres

le 04/05. L'activité estivale est illustrée : 4 dans le camp de Coëtquidan le 24/07 ; le cas de cet oiseau non repéré lors de visites précédentes à l'étang de la Forêt / Brandivy le 27/07, entendu aussi le 30/08 et non revu ensuite ; ou celui présent dans une friche herbacée à ombellifères le 30/07 à Toul Bahado / Lanester. Les cisticoles semblent aphones en début septembre pour se faire à nouveau entendre dans la dernière décade : 10 à Pen Mané / Locmiquélic le 24/09, 4 le 27/09 à Ihuézic / Locoal-Mendon, 1 le 30/09 à la tourbière de Kerfontaine / Sérent (oiseau entendu depuis le 28/06), 4 au Petit Loch / Guidel le 03/10.

Locustelle tachetée *Locustella naevia* (10 données)

Passage de printemps noté cette année avec 6 données en avril : 1 chanteur par sites à Erdeven (Fougueu et Kerouriec) le 15/04/2002, 1 chanteur dans chaque tourbière de Silfiac (Guervezo et bourg) le 27/04. Trois oiseaux le 25/04 à Pen Mané / Locmiquélic. L'étang de Kerzine /Plouhinec, Pen Mané / Locmiquellic, Pinieux / Sérent, fournissent les données de mai respectivement les 01, 15 et 25/05. En juillet, la tourbière de Saint Bily / Trédion et le camp de Coëtquidan / Campénéac accueillent cette espèce les 15 et 25/07.

Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides* (12 donnée)

4 sites regroupent ces 12 données comprises entre le 01/04 et le 29/07/2002. Il s'agit de Er Varquez / Erdeven, Pen Mané / Locmiquélic, étang de Kervran / Plouhinec, étang de Saint-Jean / Locoal Mendon. De 1 à 3 chanteurs par donnée.

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* (1 donnée)

L'opération baguage (Bretagne Vivante) du 03/09/2002 à Pen Mané / Locmiquélic permet d'en capturer 4.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (32 données)

Trois chanteurs sont à Kersahu / Gâvres le 23/03/2002 (*en 2001 le 18/03/01, et pour mémoire en 2000, le 08 et 09/04*) et 8 le 01/04 à Pen Mané / Locmiquélic. Les 17 données d'avril concernent les communes de Brec'h (étang du Cranic), Erdeven (étang de Poulbé, Fétan-Lereg, Fougueu, er Varquez), Locmiquélic (Pen Mané), Locoal-Mendon (étang de Saint-Jean), Plouhinec (Moténo). C'est autour du 20/04 que le maximum d'arrivée est noté à Pen Mané avec 28 chanteurs. Au 13/06, 19 chanteurs sont présents sur ce dernier site et au 04/07, les premiers transports de nourriture ont lieu. La reproduction a également lieu à Le Loch / Locmiquélic (des jeunes le 19/07) et dans les marais de Suscinio / Sarzeau (1 famille le 23/07).

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* (1 données)

Un chanteur le 15/05/2002 à Pen Mané / Locmiquellic, migrateur de printemps.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* (24 données)

Premier chanteur noté le 28/04/2002 à l'étang du Cranic / Brec'h, date relativement tardive (12 jours plus tard qu'en 2001). La première grosse arrivée de migrateurs est à partir du 12/05 (6 à l'étang du Cranic / Brec'h) pour s'amplifier d'un maximum de 12 chanteurs le 15/05 à Pen Mané / Locmiquélic, où seulement 5 individus sont contactés le 16/06. Le 16/06, un transport de nourriture est noté à er Varquez / Erdeven. En juillet, des jeunes sont vus le 04/07 à Pen Mané, une famille le 25/07 à la Grée Penvins / Sarzeau. Août apporte son lot de sites où l'espèce s'est reproduite : Fetan Lereg / Erdeven, étang de Saint Jean / Locoal Mendon.

Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta* (18 données)

Deux chanteurs discrets le 24/04/2002 à l'étang de Loperhet / Erdeven (le 10/04/01 à Hoëdic). Les arrivées s'étalent de début à mi-mai avec 1 le 09/05 aux lagunes de Damgan, 3 sites à Baud et Moréac, Crédin, Lanouée, Locoal-Mendon, Ploëren, Saint-Thuriau, Sérent. Dernière observation le 14/07 à la sablière de Quillan / Moréac, une alarme.

Fauvette pitchou *Sylvia undata* (7 données)

Noté uniquement sur les communes de Camors, Erdeven, Locmariaquer, Plumelin, Saint Guyomard. Nidification réussie à Kerpenru / Camors le 16/06/2002 avec 1 couple et 1 juvénile.

Fauvette grisette *Sylvia communis* (13 données)

5 chanteurs sont entendus le 15/04/2002 à Fougeu / Erdeven. Jusqu'au 03/05, les données concernent de 1 à 5 chanteurs par site prospecté (Branderion, Camors, Erdeven, Hoëdic, Plouhinec, Riantec). Les 4 données de mai concernent 1 individu par poste d'écoute. La nidification a lieu à Le Tour du Parc (1 famille le 23/07).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (25 données)

Premiers chanteurs le 19/04/2002 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon et Kerollaire / Languidic. 5 chanteurs sont contactés entre le 20/04 et le 29/04 sur Branderion, Brec'h, Le Cours, Locoal Mendon, Plumelec, Séné. Il s'agit de la première vague de migrateurs. Du 01 au 25/05, plus de 20 chanteurs sont contactés surtout dans l'intérieur du département. Présente dans les opérations forestières du 26/05.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (40 données)

Bien implantée dans tous les secteurs du département, notée dans 22 communes où sa nidification est prouvée. 3 données d'octobre.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (9 données)

Ces données provenant de 3 sites : forêt de Camors, forêt de Floranges et de Camors, Coët Fournio à Baud. 1 le 24/04/02 en forêt de Camors sur un STOC. 1 à 2 individus par

site jusqu'au 29/05 où, à Coët Foumo, le dernier chanteur est entendu.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (6 données)

Les contacts auditifs s'intensifient à partir du 18/03/2002 à Ploermel, Pont Scorff, Vannes, Saint Thuriau.... Les Pouillots véloce sont bien présents lors des opérations « avifaune forestière » d'Inzinzac et Sainte Brigitte du 26/05. Plusieurs familles sont notées entre le 21 et 25/07 sur le littoral (Arzon, Sarzeau, Surzur).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (12 données)

Premier chanteur le 03/04/2002 à Saint Caradec et 4 (3+1) chanteurs en 2 sites à Trehorenteuc le 05/04, alors qu'aucun ne sera entendu le 28/05. 5 données en mai (Meucon, Sérent, Silfiac, avifaune forestière). 3 données pour la migration post nuptiale : 1 le 04/09 à Kergollaire / Languidic ; 1 le 12/09 à l'Île d'Arz et 1 le 13/09 dans un parc de la ville de Vannes

Roitelet huppé *Regulus regulus* (2 données)

Présent lors du recensement avifaune forestière du 26/05/2002.

Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus* (7 données)

1 donnée de 2 chanteurs le 05/06/2002 en forêt de Camors. Les autres données concernent les mois d'octobre (5 données à Les Forges, Groix, Locmiquélic, Ploermel et novembre (2 données).

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (5 données)

Peu de données en 2002 sur l'espèce (- 50%) tant en nidification qu'en migration. Vu en deux sites de Berné, à Camors, et Saint Guyomard. Migration : 5 le 28/08 au Lac au Duc / Ploermel. En septembre, 2 données : 1 le 05/09 à Neuillac et 1 le 28/09 à Kerpenru / Camors.

Gobemouche nain *Ficedula parva* (2 données)

Probablement le même oiseau a séjourné les 28 et 29/10/2002 à Pen Mané / Locmiquélic.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (6 données)

Migration postnuptiale peu observée: du 10 au 18/08/2002, 1 à 2 individus fréquentent un jardin à Pénerf / Damgan, 1 le 22/08 à l'étang des Basses Landes / Sérent. Hormis 1 individu le 13/09 à la Villeneuve / Locoal Mendon, la migration est surtout notée à Hoëdic avec 5 individus du 18 au 21/10.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* (19 données)

Trois sites principaux visités : Pen Mané / Locmiquélic (16 données), étang de Saint Jean / Locoal Mendon (2 données du 19/04 et du 23/05/2002) et Landrezac / Sarzeau (1 le 25/07). La nidification est certaine à Pen Mané / Locmiquélic: 9 individus le 20/04, 1 transport de nourriture le 01/06, 1 nid le 13/06 et 1 adulte et 4 jeunes volants le 04/07, 1 autre famille le 13/07, Enfin, 14 individus seront vus le 04/10.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (6 données)

Des familles sont vues à Brandivy, Brec'h, Languidic, Locmiquélic, Pont Scorff. Espèce observée lors du recensement avifaune forestière

Mésange nonnette *Parus palustris* (7 données)

Présente le 29/04/2002 à Coët Rivas / Kervignac et à Palivarch / Nostang. En forêt de Quénécan le 25/05 (recensement avifaune forestière), 1 famille le 22/06 en forêt de Pontcallek / Berné.

Mésange huppée *Parus cristatus* (7 données)

Espèce observée lors du recensement avifaune forestière. 1 famille à Camors le 06/07/2002 ; 1 individu le 24/07 à Le Lério / Ile aux Moines.

Mésange noire *Parus ater* (5 données).

2 le 25/03/2002 dans le bois de Kerblaye / Pont Scorff. 1 famille le 18/06 en forêt de Floranges / Camors et une autre le 22/06 en forêt de Pontcallek / Berné. 2 chanteurs le 26/09 en forêt de Camors.

Mésange bleue *Parus caeruleus* (12 données) ; Mésange charbonnière *Parus major* (12 données) ; Sittelle torchepot *Sitta europea* (12 données)

Toutes ces espèces ont été observées lors du recensement avifaune forestière.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (12 données)

Berné (forêt de Pontcallek), Brandivy, Camors, Ile aux Moines, Moréac, Sainte Brigitte (forêt de Quénécan), Saint Thuriau sont les endroits où des familles ont été notées.

Rémiz penduline *Rémiz pendulinus* (1 donnée)

1 le 04/11/2002 à Pen Mané / Locmiquélic, donnée exceptionnelle dans le département.

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* (1 donnée)

Un le 26/05/2002 à Bodiel / Taupont. Il s'agit de la quatrième observation mentionnée dans nos archives : 1 le 26/04/98 à Hoëdic, 1 le 20/05/98 à la réserve de Séné, 1 le 26/05/99 à Kergal / Languidic.

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

(6 données)

Espèce observée lors du recensement avifaune forestière, présente sur tout le département.

Pie bavarde *Pica pica*

(11 données)

Plus de 30 le 03/11/2002 à l'étang au Duc / Vannes à 18h15 : dortoir?

Choucas des tours *Corvus monedula*

(16 données)

Espèce présente dans plusieurs villes et centre bourgs du département.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

(1 donnée)

5 sur un labour le 14/05/2002 à Coët Nostra / Saint Gérard.

Corneille noire *Corvus corone*

(16 données)

Quelques rassemblements : 50 à 70 d'avril à juillet 2002 à Kergollaire / Languidic ; 60 le 25/03 au pont de Kgonan / Plumeloc ; 80 sur un labour le 10/04/02 à Le Gouarde / Nostang ; 70 avec le Choucas et les 2 Pies le 23/04 à Kergauz / Languidic ; 40 sur les dunes à Fétan Lereg / Erdeven le 16/06 ; 50 le 07/09 à la Noë des Blancs / Crédin.

Grand Corbeau *Corvus corax*

(3 données)

2 à 3 individus vus à Hoëdic entre le 18 et le 24/10/02 à Hoëdic.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

(2 données)

La construction d'un nid est notée dès le 20/03/2002 à Bodavel / Camors alors qu'un nourrissage se pratique à Neuillac le 05/04.

Moineau domestique *Passer domesticus*

(2 données)

Moineau friquet *Passer montanus*

(2 données)

A Kergorec / Moréac, 1 couple élève ses jeunes le 12/05/2002 dans une cavité de mur et le 23/06, 1 couple nourrit dans une autre cavité.

Fringilles indéterminés

200 Chardonnerets et Verdiers le 09/11/02 à Pen Mané / Locmiquélic.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

(13 données)

Seul regroupement constaté : 250 le 08/11/2002 dans un labour à Haligan / Concoret.

Espèce observée lors du recensement avifaune forestière, présente sur tout le département

Serin cini *Serinus serinus*

(12 données)

Présent pendant toute la période sur les communes de Camors, Hennebont, Languidic, Ploermel, Sainte Helene, Sarzeau, Sérent, Surzur, Vannes.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

(4 données)

Des groupes sont encore observés (30 le 06/04/2002 à Kergollaire / Languidic) qu'un jeune volant est vu le 22/04 à Ty Rhu / Locoal Mendon. 250 le 04/11 à Pen Mané / Locmiquelic.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

(15 données)

Premiers grands rassemblements : 80 et plus le 17/10/2002 à Bodavel / Camors, 110 le 04/11 à Pen Mané / Locmiquelic.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

(10 données)

2 le 23/03/2002 à Pen Mané / Locmiquelic. Le passage automnal est remarqué à partir du 11/10/02 à Saint Adrien / Saint Barthélémy avec 4 individus. Une première vague arrive: 30 le 14/10/02 à Les Forges, puis une seconde en novembre : 8 en vol le 04/11/02 à Ploermel, 35 le 10/11 à l'étang au Duc à Vannes, 1 couple le 15/11 à Kermoran / Bubry.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

(12 données)

Première bande de 28 le 24/07/2002 à Pen Mané / Locmiquelic. Notée lors du recensement de l'avifaune forestière.

Sizerin flammé *Carduelis flammea*

(1 donnée)

1 le 26/02/2002 en vol au bourg de Les Forges.

Bec croisé des sapins *Loxia curvirostra*

(9 données)

1 en forêt de Pontcallek / Berné le 22/06/2002 concernant peut-être un nicheur ou estivant. En comparaison des données de Vendée (groupes de plus de 40 sur le littoral), le Morbihan, comme la région Bretagne, semble peu touchée par l'invasion de fin août (aucune donnée pour ce mois). Tout au plus, constatons-nous 10 données (contre 3 en 2001) dont 6 en septembre : 5 dans les mélèzes à Saint-Urlo / Languidic le 01/09, des petits groupes en forêt de Camors (15 le 12/09, 34 en 3 groupes le 26/09), 3 à Neuillac en court arrêt le 27/09, 1 le 30/09 à Evriguet. 1 donnée d'octobre (4 le 11/10 aux étangs de Branguily / Gueltas) et 1 le 10/11 à Bodavel / Camors.

Bouvreuil pivoine *Pyrhula pyrrhula*

(18 données)

Individus isolés, en couple ou en famille, le bouvreuil est présent à Baud, Berné, Brandérion, Brandivy, Camors, Colpo, Erdeven, Gueltas, Inzinzac Lochrist, Locoal Mendon, Meucon, Sainte Brigitte, Saint Thuriau

Bruant lapon *Calcarius lapponicus*

(3 données)

1 individu est vu par 3 personnes différentes les 18,19 et 20/10/2002 à Hoëdic.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

(15 données)

Présent durant la période sur les communes de Camors, Colpo, Inzinzac Lochrist, Languidic, Moréac, Sainte-Brigitte, Saint-Thuriau.

Bruant zizi *Emberiza cirrus*

(25 données)

L'espèce est recensée sur les communes de Arzon, Baud, Camors, Damgan, Erdeven, Inzinzac Lochrist, Kervignac, Languidic, Locmiquélic, Plouharnel, Pont Scorff, Radenac, Sainte Brigitte, Surzur

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*


(1 donnée)

Lors d'une opération baguage (Bretagne Vivante), 1 individu est capturé le 03/09/2002 à Pen Mané / Locmiquélic.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

(46 données)

Si l'espèce n'est pas dénombrée (mais présente) sur la Znieff de la basse vallée du Loc'h / Brec'h le 21/03/2002, l'espèce est bien observée pendant toute la période. En mars, à raison de 1 à 4 individus par site (Le Cours, Plouhinec avec 4 au Moténo le 26/03, Plurnelec, Sérent). Avril et mai marquent la reprise des chants : 2 chanteurs le 15/04 et 5 le 24/04 et le 05/05 à Fetan Lereg / Erdeven alors que 9 chanteurs sont contactés le 15/05 à Pen Mané / Locmiquélic. En juin, les nicheurs sont installés mais la recherche de sites de nidification se poursuit telle cette donnée du 24/06 à Ty Rhu / Locoal Mendon « sur une minuscule roselière ». Peu de données en juillet (tourbière de Saint Bily / Trédion le 05/07 et er Varquez le 06/07). La nidification (transport de nourriture le 14/07 aux bassins de lagunage de Kergourio / Crédin), ou ce jeune avec ses parents le 19/07 au Loc'h / Locmiquélic alors qu'adultes et jeunes sont vus le 27/07 à Pen Mané / Locmiquélic.



Bruant des roseaux à Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan) ; octobre-nov. 2003

ACTIVITES DU G.O.B. MORBIHAN

RECENSEMENT MORBIHANNAIS DES GRANDS CORMORANS *Phalacrocorax carbo*, HIVER 2002-2003

Coordination : GWENAEL DERIAN

Comme précédemment, en 1998-1999 puis 2000-2001, le Groupe Ornithologique Breton a coordonné le volet morbihannais du recensement national des Grands Cormorans hivernants l'hiver passé. Les résultats qui suivent intègrent ceux qui nous ont été transmis par les agents du Conseil Supérieur de la Pêche (CSP), de sorte que la couverture du département est satisfaisante.

La procédure est la même que lors des recensements précédents : il s'agit de compter les oiseaux sur les dortoirs, au matin ou au crépuscule à la mi-janvier. Cette partie a été réalisée entre le 12 et le 22 janvier sur le Blavet et jusqu'au Golfe du Morbihan (Guerlédan, le 26) et du 13 au 22 janvier pour l'ensemble Oust-Vilaine (sauf le Boro le 04/02 et vérification le 05/02 à la Butte au Rouge). D'autre part, une fraction des dortoirs a été suivie mensuellement tout au long de l'hiver.

RESULTATS

1) Résultats à la mi-janvier 2003

Secteur	dénomination	effectif mi-janvier 2003	Recensé par
Oust Vilaine	étang de Pen Mur	38	CSP
	Bourgerel	50	GOB
	Vieille-Roche	64	GOB
	la Gionnais	56	CSP
	Boro	84	CSP
	l'étier (Saint-Mathurin)	22	CSP
	la Blangeraye	29	CSP
	Iles aux Pies	37	CSP
	Buttes du Rouge (44)	0	CSP
	Villeneuve	27	ONCFS & GOB
	Régigny	\	
	Roncin	98	GOB
S/Total		505	

Golfe du Morbihan	étang de Noyalo	77	CSP
	Méaban	352	GOB
	Saint-Goustan	43	GOB
S/Total		472	
Rivière d'Etel	étang de Saint-Jean	35	GOB
	Roëllan	187	GOB
S/Total		222	
Blavet	île aux Souris	159	GOB
	port de guerre	112	GOB
	le Parco	125	GOB
	le Stum	0	GOB
	Guerlédan	84	GOB
S/Total		480	
Laïta-Ellé	pont-Saint-maurice	134	GOB
Autres	étang de la Forêt	0	GOB
TOTAL Morbihan janvier 2003		1813	

Remarques :


- le résultat nul de l'étang de la Forêt peut s'expliquer par la fuite des individus effarouchés par les tirs de régulation.
- au Stum / Saint-Adrien, le gel n'est pas responsable de l'absence de cormoran, ce dortoir n'a pas été régulièrement fréquenté.
- l'étang de Réguiny, utilisé en début d'hiver, aurait été désert à cette époque.
- cette année, le dortoir de Méaban, qui concentre les cormorans du Golfe, a été recensé de la côte, au moment de la dispersion matinale.
- à la Butte au Rouge, les tirs de régulation ont favorisé la fuite des oiseaux.
- Vieille-Roche remplace au moins partiellement le dortoir de Bourgerel situé sur un pan effondré de la falaise dans l'estuaire de la Vilaine.
- la population hivernante des îles du Mor Braz n'a pas pu être recensée.

2) Comptages mensuels

Dortoir	X-02	XI-02	XII-02	I-03	II-03	III-03
Saint-Maurice	139	175	174	134		
île aux Souris	205	172	209	159	135	177
port de guerre	77	105	90	112	25	31
Saint-Jean		62	59	35		
la Forêt	0	30	0	16	0	

Les principaux dortoirs de ce tableau n'ont pas fait l'objet de tirs de régulation, leur évolution en est donc indépendante. La baisse brusque des effectifs au port de guerre est inhabituelle.

Répartition des dortoirs de Grands Cormorans (Morbihan) janvier 2003



Carte : JPLB



COMPARAISON

Depuis le précédent recensement, on peut trouver que le nombre total de Grands Cormorans à la mi-janvier sur notre département a peu évolué : de près de 1600 en 1999 puis 1700-1800 en 2001 et maintenant 1800 environ. Mais la répartition des dortoirs a davantage changé depuis le premier recensement.

Les dortoirs se distribuent suivant trois grands ensembles géographiques qui sont : les

axes fluviaux Oust-Vilaine et Blavet et le Golfe du Morbihan ; viennent ensuite la rivière d'Etel et la Laïta. Il est délicat d'affiner des tendances nettes dans les trois premiers cas : légères baisse ou hausse respectivement sur l'Oust-Vilaine et le Blavet aval, baisse plus marquée mais avec des méthodes différentes dans le Golfe. Cependant, l'augmentation d'effectif autour de la rivière d'Etel est plus sûre.

Au sein des ensembles définis plus haut, de nouveaux dortoirs sont apparus qui rassemblent 17% du total recensé en janvier 2003 : Pen Mur, la Villeneuve, Réguiny, Noyalo, Saint-Jean, la Forêt, Saint-Maurice. Certains étaient connues précédemment pour être des reposoirs diurnes et des dortoirs estivaux (Noyalo et Saint-Jean). Le cas le plus remarquable est celui du pont Saint-Maurice sur la Laïta. Le site n'était connu que comme faible reposoir diurne puis le dortoir apparu en 2000 a tout de suite pris du volume sans qu'on constate une perte d'effectifs dans la rade de Lorient proche. Il faut donc que les cormorans qui l'utilisent viennent de plus loin...

Les tirs de régulation ont déstabilisé plusieurs dortoirs (la Grionnais, la Forêt, le Stum ?) mais n'ont pas empêché la hausse des effectifs au Parco.

CONCLUSION

Le recensement des Grands Cormorans hivernants dans le Morbihan continental a été effectué de manière satisfaisante en janvier 2003. Le total dépasse de peu 1800 individus. Une tendance à la multiplication des dortoirs (16 en 1999, 21 à 24 en 2003) se dessine.

Les observateurs du Groupe Ornithologique Breton ont participé à ce recensement : Patrick Bailleul, René Bozec, Erwan Crochet, Gwenael Derian, Denis Fatin, Bernard Iliou, Yann Kerninon, Jean-Luc Lemonnier, Régis Morel.

UN RECENSEMENT DIURNE LE LONG DU BLAVET, GRANDS CORMORANS *Phalacrocorax carbo* EN HIVER

Coordination : GWENAEL DERIAN

Il arrive qu'une idée largement partagée, connue de tous, ne débouche pas, ne se concrétise jamais. C'est ici l'exposé d'une situation inverse, celle d'une proposition lancée et qui a été mise en œuvre sans attendre. Dans l'ambiance du recensement hivernal des Grands Cormorans et des résultats des tirs de régulation déjà effectués sur le Blavet, il nous a paru judicieux de faire le point sur la présence diurne de l'espèce. L'essai a été réalisé dans les derniers jours de l'année 2002

METHODE

A pied ou à vélo, l'important c'est qu'on progresse lentement : l'observateur suit le chemin de halage, repère les cormorans, les compte, les situe sur la carte, note leurs activités et leurs supports. Sur la feuille d'observation, on précise également, les heure et sens de cheminement.

RESULTATS

La totalité du Blavet canalisé, d'Hennebont à Pontivy, a été prospectée, plus la portion qui mène de Pontivy au lac de Guerlédan. Dix observateurs en cinq équipes se sont partagés en autant de segments de longueurs proches (à l'exception du segment aval, plus court). Il n'a pas été possible de synchroniser exactement les opérations qui se sont déroulées du vingt-neuf au trente décembre, entre dix heures et midi dans de bonnes conditions (visibilité, température clémente, pas de vent gênant).

Quatre-vingt trois Grands Cormorans ont été comptés. Le risque de double comptage existe quand des oiseaux qui s'envolent devant l'observateur se reposent devant lui t hors de sa portée. Cependant, la surestimation attachée à ce biais a pu être évitée dans la plupart des cas et ne doit pas excéder quelques unités.

	Individus	distance depuis Hennebont, km
Pont-Neuf - Hennebont	30	12
Saint-Rivalain - Pont-Neuf	35	32
Saint-Rivalain - Pontivy	5	52
Pontivy - lac	13	72

Résultats du recensement diurne, 2002

A la même époque (voir ce numéro), les comptages aux dortoirs du Blavet trouvaient pour le Parco / Hennebont et le lac de Guerlédan, respectivement 125 et 84 individus au crépuscule. De plus on sait (Gw. Derian, *obs. pers*) que la grande majorité des cormorans du Parco arrivent de l'amont. Nous sommes alors conduits à admettre, en comparant les totaux obtenus, que les Grands Cormorans qui se regroupent sur les dortoirs se dispersent au delà du Blavet pour leurs activités diurnes.

Les participants ont aussi noté les activités et, éventuellement, le support utilisé par les cormorans. Quand ils sont au repos, les Grands Cormorans trouvent sur les arbres des berges les perchoirs nécessaires. Ils n'ont que peu recours aux constructions ou aux rives dégagées. Les activités constatées sont le vol (20,5%) et la nage ou la pêche (21,7%) sur la rivière. ces oiseaux posés sur l'eau sont sensibles à l'approche du passant et s'envolent.

Arbres	Rives	Constructions	Eau	En vol
42	5	1	18	17

Support des Grands Cormorans

CONCLUSION

Le recensement diurne des Grands Cormorans sur le Blavet a montré une densité linéaire de 1,15 oiseaux / km. Une part seulement des oiseaux comptés sur les dortoirs fréquentent le Blavet pendant la journée. De cefait, les tirs de régulation effectués sur le Blavet canalisé ne sont pas assurés d'y induire une baisse de la fréquentation de l'espèce.

REMERCIEMENTS : les participants au recensement de décembre 2002, Bailleul Patrick, Cornec Gaétan, Derian Gwenael, Kerninon Yann, Kerzehro Valérie, Le Corre Gilles, Le Corre Michèle, Lemonnier Françoise, Lemonnier Jean-Luc, Morel Régis.

INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE DES ZNIEFF MORBIHANNaises (III)

Habitats côtiers et halophiles (3)

Le Petit Mont

Description des milieux : broussailles et fourrés, landes atlantiques, falaises maritime avec végétation, pins.

Intérêts : oiseaux.

Facteurs influençant l'évolution la zone : surfréquentation.

Données recueillies	2002
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	28
Coordinateur	P. Philippon

Espèces nicheuses

Déterminantes : 1
Fauvette pitchou, 2 à 4 individus.

Non déterminantes : 25

Epervier d'Europe, 1 à 2 ; Faucon crécerelle, 1 à 2 --ces deux espèces chassent sur la lande) ; Pigeon ramier ; Tourterelle turque ; Pipit maritime, 1 à 4 ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ; Rougegorge familier ; Tarier pâle, 2 à 4 ; Merle noir ; Grive musicienne ; Bouscarle de Cetti, 2 à 6 ; Fauvette grisette, 2 à 6 ; Fauvette des jardins, 2 à 4 ; Fauvette à tête noire, 2 à 6 ; Pouillot véloce ; Mésange huppée, 2 à 6 ; Mésange bleue ; Mésange charbonnière ; Mésange à longue-queue ; Corneille noire ; Etourneau sansonnet ; Pinson des arbres ; Verdier d'Europe ; Linotte mélodieuse ; Bouvreuil pivoine, 2 à 8.

Le Grand Mont

Description des milieux : falaises maritimes avec végétation spécifique, broussailles et fourrés, landes atlantiques.

Intérêts :
oiseaux.

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
surfréquentation

Données recueillies	2002
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	24
Coordinateur	L. Hamet

Espèces nicheuses

Déterminantes : 1
Fauvette pitchou, 1 à 4 individus.

Non déterminantes : 23

Faucon crécerelle, 1 à 2 ; Gallinule poule-d'eau, un couple ; Pigeon ramier ; Alouette des champs, 1 à 4 ; Pipit maritime, 1 à 4 ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ; Rougegorge familier ; Tarier pâle, 1 à 4 ; Merle noir ; Grive musicienne ; Fauvette grisette, 1 à 4 ; Fauvette des jardins, 1 à 4 ; Fauvette à tête noire, 1 à 4 ; Pouillot véloce ; Mésange bleue ; Pie bavarde ; Corneille noire ; Moineau domestique ; Pinson des arbres ; Serin cini, 1 à 2 ; Linotte mélodieuse ; Bouvreuil pivoine, 1 à 4.

Eaux non marines (3)

Grand Gournava

Description des milieux : étang, petites roselières des berges, roselières.

Intérêts :
habitats, insectes,
bryophytes.

**Activités
humaines :**
pêche, chasse.

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
évolution écologique.

Données recueillies	1998-1999.
Niveau de l'inventaire ornithologique	assez bon.
Nombre d'espèces relevé	36.
Coordinateur	B. Iliou.

Espèces nicheuses

Déterminantes : 3.

Grèbe huppé, un couple ; Busard Saint-Martin, un couple ; Faucon hobereau, un couple.

Non déterminantes : 33.

Engoulevent d'Europe ; Pic noir ; Fauvette pitchou.

Gallinule poule-d'eau, deux couples, Foulque macroule, deux couples ; Pic épeiche ; Hirondelle rustique ; Pipit des arbres ; Bergeronnette des ruisseaux ; Rougegorge familier ; Tarier pâle ; Merle noir ; Grive musicienne ; Grive draine ; Fauvette des jardins ; Fauvette à tête noire ; Pouillot véloce ; Pouillot fitis ; Roitelet huppé ; Mésange à longue queue ; Mésange nonnette ; Mésange huppée ; Mésange bleue ; Mésange charbonnière ; Sittelle torchepot ; Grimpereau des jardins ; Geai des chênes ; Pie bavarde ; Corneille noire ; Pinson des arbres ; Verdier d'Europe ; Linotte mélodieuse ; Bruant des roseaux, un couple.

Commentaires :

avis du coordinateur de la zone : zone tourbeuse d'intérêt primordial pour les landes de Lanvaux.

Tourbières et marais

Lande tourbeuse de Kerdossan , bois de Saint-Bily

Description des milieux : bois marécageux à aulne, saules et piment royal.

Intérêts :
insectes, oiseaux,
floristique.

**Compléments
descriptifs :**
ruisseau.

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
fermeture du milieu.

Données recueillies	1999
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon
Nombre d'espèces relevé	17
Coordinateur	B. Iliou

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 17

Engoulevent d'Europe.

Buse variable ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ;
Rougegorge familier ; Merle noir ; Grive draine ; Mésange à longue queue ; Mésange
nonnette ; Mésange bleue ; Mésange charbonnière ; Sittelle torchepot ; Grimpereau des
jardins ; Corneille noire ; Pinson des arbres ; Verdier d'Europe ; Bruant jaune.

Commentaires :

avis du coordinateur de la zone : fermeture du milieu au détriment de la
diversité botanique et ornithologique. Disparition progressive des espèces de
milieux tourbeux.

Tourbière de Cosclunff – Saint-Brendan

Description des milieux :

Intérêts :

**Compléments
descriptifs :**

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**

**Activités
humaines :**

Données recueillies	2002
Niveau de l'inventaire ornithologique	prospection préliminaire seulement
Nombre d'espèces relevé	26
Coordinateur	P. Bailleul

Espèces nicheuses

Déterminantes :

1

Locustelle tachetée, 8 chanteurs.

Non déterminantes : 24

Canard colvert ; Pigeon ramier ; Pic vert ; Pic épeiche ;
Alouette des champs ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ; Rougegorge familier ;
Tardif pâle ; Merle noir ; Grive musicienne ; Fauvette grisette ; Fauvette des jardins ;
Fauvette à tête noire ; Pouillot véloce ; Pouillot fitis ; Roitelet huppé ; Mésange bleue ;
Mésange charbonnière ; Geai des chênes, 2 ; Pie bavarde, 4 ; Corneille noire ; Pinson
des arbres ; Bruant jaune.

Tourbière de Manéantoux

Description des milieux :

Intérêts :

**Compléments
descriptifs :**

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**

**Activités
humaines :**

Données recueillies	2002
Niveau de l'inventaire ornithologique	
Nombre d'espèces relevé	23
Coordinateur	P. Bailleul

Espèces nicheuses

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 23

Canard colvert ; Buse variable, un couple ; Gallinule poule-d'eau ; Pigeon ramier ; Pic vert ; Pic épeiche ; Hirondelle rustique ; Bergeronnette des ruisseaux ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ; Rougegorge familier ; Merle noir ; Grive musicienne ; Fauvette à tête noire ; Pouillot véloce ; Roitelet huppé ; Mésange bleue ; Mésange charbonnière ; Geai des chênes ; Pie bavarde ; Corneille noire ; Moineau domestique ; Pinson des arbres.

Commentaires :

ornithologique :

avis du coordinateur de la zone : zone à supprimer

Landes tourbeuses de Landordu

Description des milieux : bétulaie, sapinière, tourbière dégradée à molinie, peupleraie de tremble, lande humide.

Intérêts :
insectes,
mammifères,
floristique.

**Activités
humaines :**
agriculture,
sylviculture.

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
mise en eau, fermeture
du milieu, plantation.

Données recueillies	2000
Niveau de l'inventaire ornithologique	assez bon
Nombre d'espèces relevé	32
Coordinateur	B. Iliou

Espèces nicheuses

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 32

Engoulevent d'Europe ; Pic noir.

Epervier d'Europe ; Buse variable ; Gallinule poule-d'eau ; Coucou gris ; Pic vert ; Pic épeiche ; Hirondelle rustique ; Pipit des arbres ; Bergeronnette des ruisseaux ; Rougegorge familier ; Merle noir ; Grive musicienne ; Grive draine ; Fauvette des jardins ; Fauvette à tête noire ; Pouillot véloce ; Pouillot fitis ; Roitelet huppé ; Mésange nonnette ; Mésange bleue ; Mésange charbonnière ; Sittelle torchepot ; Grimpereau des jardins ; Geai des chênes ; Corneille noire ; Pinson des arbres ; Verdier d'Europe ; Linotte mélodieuse ; Bruant jaune.

Commentaires :

avis du coordinateur de la zone : un étang a été creusé sur la lande tourbeuse. La saulaie s'installe, banalisation de certaines zones tourbeuses.

Tourbière de Plaudren ; bois de Goh Lut

Description des milieux : bois marécageux à aulne, saules et piment royal.

Intérêts :
insectes, oiseaux.

**Compléments
descriptifs :**
ruisseau.

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
fermeture du milieu.

Données recueillies	2001
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon.
Nombre d'espèces relevé	16.
Coordinateur	B. Iliou.

Espèces nicheuses 16.

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 16.

Buse variable ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ; Rougegorge familier ; Merle noir ; Grive musicienne ; Fauvette des jardins ; Fauvette à tête noire ; Pouillot véloce ; Pouillot fitis ; Mésange nonnette ; Mésange bleue ; éponge charbonnière ; Grimpereau des jardins ; Corneille noire ; Pinson des arbres.

Commentaires :

avis du coordinateur de la zone : zone ne présentant plus d'intérêt sur le plan floristique ou ornithologique dans la mesure où le milieu s'est fermé. La tourbière de Plaudren a fait place à une saulaie humide.

Lande tourbeuse de Kerdroguen

Description des milieux : prairies artificielles, bosquets.

Intérêts :
aucun.

**Activités
humaines :**
élevage.

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
jachère, pâturage.

Données recueillies	2000.
Niveau de l'inventaire ornithologique	bon.
Nombre d'espèces relevé	12.
Coordinateur	B. Iliou.

Espèces nicheuses**Déterminantes :** aucune.**Non déterminantes :** 12

Buse variable ; Pipit des arbres ; Troglodyte mignon ; Accenteur mouchet ; Merle noir ; Grive musicienne ; Fauvette à tête noire ; Corneille noire ; Pinson des arbres ; Verdier d'Europe ; Linotte mélodieuse ; Bruant jaune.

Commentaires :

avis du coordinateur de la zone : cette zone n'a plus d'intérêt comme lande tourbeuse ; disparition des espèces caractéristiques, banalisation végétale de cette zone.

Tourbière de Kergurune**Description des milieux :** saulaie.

Données recueillies	1996 à 2002.
Nombre d'espèces relevé	50.
Coordinateur	J.-L. Blanchard.

Espèces nicheuses

Déterminantes : 2
Pic noir, un couple ; Alouette lulu, un couple.

Non déterminantes : 37

Canard colvert, un couple ; Epervier d'Europe ; Buse variable, un couple ; Faucon crécerelle ; Gallinule poule-d'eau, un couple ; Coucou gris ; Effraie des clochers ; Chouette hulotte ; Pic vert, un couple ; Pic épeiche, un couple ; Pic épeichette ; Pipit farlouse ; Troglodyte mignon ; Rougegorge familier ; Tarier pâle ; Merle noir ; Grive musicienne ; Bouscarle de Cetti ; Fauvette des jardins ; Fauvette à tête noire ; Pouillot véloce ; Roitelet huppé ; Mésange à longue queue, un couple ; Mésange huppée, deux couples ; Mésange charbonnière ; Sittelle torchepot ; Grimpereau des jardins ; Geai des chênes ; Pie bavarde, un couple ; Corneille noire, un couple ; Etourneau sansonnet ; Pinson des arbres ; Serin cini ;

Verdier d'Europe ; Linotte mélodieuse ; Bruant jaune ; Bruant zizi.

Espèces de passage

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 9

Aigrette garzette, 1 ; Héron cendré, 2 ; Milan noir, 1 ;
Hirondelle rustique ; Mésange charbonnière ; Mésange bleue ; Mésange nonnette ;
Mésange huppée ; Gobemouche noir, 1.

Espèces hivernantes 5

Déterminantes : aucune.

Non déterminantes : 5

Bécasse des bois ; Bécassine des marais, 6 ; Pipit farlouse, 10 et plus ; Grive litorne, 10 et plus ; Grive mauvis, 10 et plus.

Commentaires :

avis du coordinateur de la zone : la tourbière n'existe plus. La zone humide est envahie par la végétation (saules...). Absence de Drosera et Rhynchospora blanc, sphaignes. Le milieu est colonisé par la dorine à feuilles opposées ; présence de fougères (Athyrium, Dryopteris, scolopendre...)

Forêts

Coët-Ny

Description des milieux : pins Laricio.

Intérêts :
floristique.

**Activités
humaines :**
sylviculture

**Facteurs influençant
l'évolution la zone :**
plantations, fermeture
du milieu.

Données recueillies	2000
Niveau de l'inventaire ornithologique	assez bon.
Nombre d'espèces relevé	18
Coordinateur	B. Iliou.

Espèces nicheuses**Déterminantes :** aucune.**Non déterminantes :** 18.*Fauvette pitchou.*

Epervier d'Europe ; Buse variable, un couple ; Accenteur mouchet ; Rougegorge familier ; Merle noir ; Grive musicienne ; Grive draine ; Fauvette à tête noire ; Pouillot véloce ; Mésange huppée ; Mésange bleue ; Mésange charbonnière ; Geai des chênes ; Corneille noire ; Pinson des arbres ; Verdier d'Europe ; Linotte mélodieuse.

Commentaires :

avis du coordinateur de la zone : site dégradé par la plantation de résineux. Banalisation végétale et fermeture du milieu.

Figurent en italiques les espèces pour lesquelles ne sont pas atteints les critères d'effectif ou de régularité proposés par Bargain et al. (2001) pour la désignation des ZNIEFF en Bretagne.

Saisie et mise en forme des données : Gw. Derian, Muriel Derian.

NOTE DE TERRAIN

SORTIE NOCTURNE

FRANZ URVOAZ

21 heures. L'obscurité a envahi l'hippodrome depuis longtemps déjà mais la chance nous accompagne : les étoiles scintillent dans le ciel après la pluie incessante des jours précédents. Un petit vent frais de Nord-Ouest souffle très modérément et ne parvient pas à transpercer les couches de pulls et de vestes que nous avons enfilées les unes par dessus les autres.

Stéphane balaie la nuit à l'aide d'un puissant phare alimenté par une batterie de moto qu'il porte dans un sac à dos. Sébastien, le garde de l'Office National de la Chasse marche à ses côtés alors que, suivant les conseils à la lettre, nous avançons une dizaine de mètres derrière, chuchotant nos commentaires et évitant les plus grosses flaques et les endroits rendus boueux.

Yannick et Loïc maïmonnent leur mécontentement. Comment se sont-ils débrouillés pour laisser leurs bottes à Vannes ? Quel oiseau de mauvais augure a-t-il pu les persuader que Questembert était à l'abri des intempéries hivernales ?

Tout à coup, dans le faisceau de lumière, les oreilles dressées terminées par les deux tâches noires caractéristiques, un lièvre étonné examine les visiteurs d'un soir avant de s'éloigner nonchalamment. A de nombreuses reprises, Sébastien demandera d'éclairer une tâche suspecte, il provoquera l'envol apeuré d'un pipit farlouse, tirera de sa quiétude un nouveau lièvre solitaire mais, rien à faire, elles ne sont pas au rendez-vous.

Sébastien propose alors de changer d'endroit. On en profite pour passer chez lui et nos deux linottes étourdies se trouvent bien aise de se faire prêter des bottes. Le temps de prendre une boisson et nous voilà repartis dans la campagne.

De tous côtés nous parviennent les hululements plaintifs des chouettes. La traque reprend et soudain, la voilà enfin, prise dans le pinceau de lumière comme un papillon de nuit dans une toile d'araignée. Son œil, tel un tison incandescent brille dans la nuit. Alors que nous nous sommes à présent arrêtés, Stéphane et Sébastien approchent lentement tout en continuant de l'éblouir. Notre volatile semble nerveux. Sa silhouette trapue et son long bec se découpent idéalement sur le pré. Il se tourne nerveusement. Va-t-il nous échapper au dernier moment ? Sébastien abaisse lentement le filet circulaire qu'il tient au bout d'une perche télescopique de plusieurs mètres. Au dernier moment la bécasse tentera un envol vertical mais il est trop tard, elle est prisonnière. Nous nous précipitons pendant que Sébastien la dégage du filet. Yannick en hérite pendant que l'on fouille dans le sac à la recherche de la pince et des bagues. Elle s'appellera désormais GY 38966. Son cœur bat la chamade pendant que nous l'examinons en détail.

« C'est une adulte » nous confie Sébastien en examinant ses rémiges. « Chez une juvénile les plumes auraient un aspect moins net, elles paraîtraient plus usées. Tenez,

voilà les plumes blanches de la queue qui sont si spectaculaires durant la croule. Et voici la plume du peintre. Ces oiseaux se doivent d'avoir un plumage en très bon état. La majorité de celles qui hivernent chez nous viennent de Russie. »

Yannick la pose au sol sur l'herbe mouillée. Aussitôt elle prend son envol et elle s'éloigne d'un vol rectiligne, les ailes battant à la façon d'un papillon trop nerveux.

En cette nuit claire de janvier 2003, nous achèverons nos recherches peu avant minuit après avoir également baptisé GY 38967 et GY 38968. « On trouve presque uniquement des adultes cette année » poursuit notre guide « et elles sont bien plus rares. C'est très mauvais signe pour l'espèce. »

Puissent ces trois spécimens au moins ne pas achever leur course au bout du fusil d'un valeureux nemrod qui, tenant l'oiseau mort à la main, s'extasiera devant la beauté de son plumage.

Lors de la dernière enquête nationale sur les tableaux de chasse, en 98/99, les chasseurs du Morbihan ont déclaré avoir abattu 81300 bécasses ce qui représente 7% du total national.

En 2003, la chasse à la bécasse se prolongera jusqu'au 26 février alors même que certaines fédérations de chasseurs conseillent à leurs adhérents de ne pas exercer une pression trop importante sur l'espèce devenue fragile. On a connu des «gestionnaires» plus avisés !

Documents

L'inventaire ornithologique des ZNIEFF morbihannaises se poursuit, certaines zones n'ont pas été attribuées, d'autres seront redistribuées. Le nouveau protocole doit permettre juger de l'effort à porter sur une zone que découvre l'observateur : simple prospection (certaines tourbières en régression) ou suivi assidu, de façon à établir une connaissance de l'intérêt ornithologique de l'ensemble de ces espaces. Les protocoles, cartes, codes de description et formulaires peuvent être demandés au G.O.B. (Gw. Derian).

COMMUNE	LOCALITE
Arzon Saint-Gildas-De-Rhuys	marais dunaire entre Kervert et Tumiach
Bubry Inguiniel Lanvaudan Quistinic	vallée du Sébrevet
Campeneac	butte de Dot et de Precesson
Campeneac	ruisseau de Saint-Jean
Carentoir La Gacilly	tourbière et lande tourbeuse de Couesme
Cleguerec	tourbière de Boduc
Glenac Saint-Vincent-Sur-Oust Courmon	confluence Oust - Aff
Gourin	tourbière de Gerveur
Gourin	tourbière de Kerrouec
Gourin	tourbière de Saint-Hervé en Gourin
Kergrist	tourbière de Kérandy
Lanvenegen	Naïc
Lanvenegen Le Faouet	Inam
Le Bono	rade de Kerdréan
Le Faouet Priziac	l'Ellé entre Barreacan et Sainte-Barbe
Locmalo Seglien	la Sarre
Peillac	Arz
Ploerdut	étang du Moulin de Kerduel
Ploerdut	lande de Goarem Lan Vraz
Roudouallec Langonnet	Menez Du - Castel Ruphel
Saint-Aignan	Blavet aval de Guerlédan
Saint-Dolay	étang du Roho - landes du Roho
Sainte-Brigitte	étang des Forges des Salles
Sainte-Brigitte	étang du fourneau
Sainte-Brigitte	tourbière de Guernauter
Sarzeau	anse de Bénance - Ruad
Theix	Anse de Lirey
Theix	étang du Plessis

Liste des ZNIEFF du Morbihan qui ne sont pas encore attribuées pour leur inventaire ornithologique

