


AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

**Ti ar Vro B.P. 103
29833 CARHAIX**



Bretagne Vivante
Bibliothèque S.E.P.N.C.



Courriel :
gob@gob.fr

N°26 ANNEE 2004

Sommaire du numéro 26 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 novembre 2002 à 15 mars 2003	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 16
Groupe 3 de l'Huitrier pie au Tournepieuvre à collier	page 19
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 24
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 27
 Activités du G.O.B. Morbihan	
Saison 2003 du programme national STOC EPS dans le Morbihan	page 40
Notes pour le suivi de la migration postnuptiale des passereaux sur la côte morbihannaise : automne 2003	page 42
 Notes de terrain	
Observation d'un bruant nain <i>Emberiza pusilla</i> à Erdeven, le 08 mars 2003	page 50
Observation d'une mouette rieuse <i>Larus ridibundus</i> leucique en rade de lorient	page 52
Le choucas des bois	page 56
 Documents	
Recensements Wetlands dans le Morbihan, Résultats de janvier 2003	page 57

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE :

16 NOVEMBRE 2002 A 15 MARS 2003

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
BLANCHARD Jean-Luc, BOZEC René, CROCHET Erwan, DERIAN Eric, DERIAN Gwenaël, ERMEL Gérard, GUILLEMOT Francis, ILIOU Bernard, KERNINON Yann, LAMOUR Joël, LE DOZE Anthony, LEMONNIER Françoise et Jean-Luc, LE PORT Bruno, LIMANTON Sylvain, MORIN Hervé, PALPANT Muriel, PHILIPPON Patrick, TESNIERE Edouard, URIEN Xavier... sauf erreur ou omission !

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton (Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre au 15 mars.

Un fichier de saisie rapide peut être demandé auprès du coordonnateur morbihannais. Dans le cas d'une transmission sur papier, merci de respecter l'ordre suivant :

abréviation ou nom d'espèce	effectif	remarque	indice de reproduction	date	lieu-dit	commune
ech bla (Echasse blanche)	8	le nid est installé sur un bassin désaffecté	nid occupé	25/05/04	Kerlapous	SILFIAC

Illustration : couverture Patrick Bailleul ; photographies p8, 32, 52 Muriel Derian & Gwenaël Derian ; dessin p35 P. Bailleul.

AR VRAN MORBIHAN N°26

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwenael Derian

Plongeur indéterminé *Gavia sp.*

(7 données)

Quand il y a hésitation, l'identification balance entre P. arctique et P. imbrin.

Plongeur catmarin *Gavia stellata*

(2 données)

Deux adultes et un juvénile le 24/12/2002 à la pointe er Hourél / Locmariaquer puis un adulte le 08/03/2003 à la Roche Sèche / Erdeven.

Plongeur arctique *Gavia arctica*

(3 données)

Un adulte et un juvénile le 24/12/2002 à la Pointe er Hourél / Locmariaquer ; 1 en train de mourir le 20/01/03 à Kerguelen / Larmor-Plage ; 1 le 28/01 au Fort-Bloqué / Ploemeur.

Plongeur imbrin *Gavia immer*

(13 données)

Ces données, entre le 24/12/2002 et le 13 mars suivant, ont été recueillies sur le large segment de côte de la rade de Lorient à l'entrée du Golfe du Morbihan : le maximum est de six individus le 24/12 à la pointe er Hourél / Locmariaquer.


Numéros d'Ar Vran Morbihan	Plongeur catmarin	Plongeur arctique	Plongeur imbrin
24	3	3	8
22	5	4	6
20	7	8	4
18	4	8	10
16	6	7	13
14	9	10	6
moyenne	5,14	6,14	8,57

*Nombre d'observations hivernales des trois espèces de plongeurs ; Morbihan***Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis***

(68 données)

Plusieurs sites ont été suivis au long de l'hiver. Les maxima ont été relevés entre novembre et décembre : 45 le 16/11/2002 sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon ; 11 sur la Basse-Lande / Saint-Marcel le 22/11 ; 30 à Goh Lenn / Locoal-Mendon le 16/11 ; 40 à Pen Mané / Locmiquélic le 20/11.

Les oiseaux résidents se font discrets dès que s'annonce le mois de mars : aucun n'est vu le 03/03 sur les sites de la rivière d'Etel et toujours aucun le 11/03 sur Saint-Jean ; aucun individu à Pen Mané le 04/03 mais au Varquez / Erdeven, le 23/02, des chants parmi cinq



Grèbe castagneux sur les étangs de Locoal-Mendon (Morbihan) ; h ver 2002-2003


individus dont 3 en plumage nuptial ; également, un plumage nuptial au Cranic / Brec'h le 05/03.

Wetlands International : 426 dont 191 dans le Golfe du Morbihan.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(123 données)

Le suivi de l'étang au Duc / Ploërmel permet de constater un effectif hivernant comparable à celui des années récentes, en retrait par rapport aux saisons 1997 à 1999.



Grèbe huppé sur l'étang au Duc / Ploërmel (Morbihan) ; hiver 2002-2003

Les maxima relevés : 48 dans la rivière d'Etel, le 12/01/2003 (précédemment, 27 à Saint-Jean / Locoal-Mendon le 16/11) ; 25 dans l'anse de Kerzo / Port-Louis le 04/12 ; 11 sur l'étang du Duc de Vannes le 19/01 ; 11 le 16/12 à Priziac.

Reproduction :

- sur la rade de Lorient, à Ty Douar / Locmiquélic, un couple composé d'un adulte et d'un immature parade le 13/02.
- 2 couples parquent sur le réservoir du Loc'h à Brec'h, le 27/02.
- parmi 19 individus à Saint-Jean / Locoal-Mendon, un couple parade le 06/03.
- un couple parade sur l'étang de Coët-Rivas / Kervignac le 12/03 ; deux paires sont là depuis au moins le 08/03.
- sur les étangs de Branguily / Gueltas, 3 couples présents le 25/02.

Wetlands International : 741 dont 394 dans le Golfe du Morbihan.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

(1 donnée)

Un individu au Bronzais / Pénestin, le 18/01/2003.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

(8 données)

- 2 le 17/11/2002 au Conguel / Quiberon.
- 2 le 31/12 à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon.
- 3, le 13/01/2003 devant l'île Stuhan / La Trinite-sur-Mer.
- un individu le 16/03 au Lenn / Damgan.
- plusieurs données d'er Hourel / Locmariaquer : 6 le 24/12 ; 2 le 3/02/03 ; 7 le 05/03 ; 8 le 12/03.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(50 données)

Les observations sont exclusivement littorales. Seule s'en détache la présence au Cranic / Brec'h de 1 à 3 individu tout au long de l'hiver.

66 le 12/01/2003 à Iniz er Mor / Sainte-Hélène, 37 à Kerouarc'h / Locmariaquer le 32/12/2002, maximum de 15 à er Hourél / Locmariaquer, le 12/03.

Wetlands International : 17 09 dont 1456 dans le Golfe du Morbihan.

Fou de Bassan *Sula bassana*

(1 donnée)

Un cadavre échoué, non mazouté, le premier janvier 2003 à Kerbillio / Erdeven.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

(77 données)

Le recensement hivernal de l'espèce avait abouti à un effectif de 1813 Grands Cormorans sur les dortoirs du département. La prospection menée à la fin décembre 2002 a situé à une valeur proche de 1 / km la densité linéaire du Grand Cormoran le long du Blavet (ar Vran Morbihan n°25).

Un dortoir s'était constitué sur l'étang de Régigny, avant sa dispersion par tirs ciblés.

Le 18/11/2002 devant Nohic / Belz, 200 individus pêchent en une bande unique.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

(5 données)

Jusqu'à 15 Cormorans huppés sur les reposoirs rocheux de la côte d'Erdeven et autant face à Locmariaquer (25/12/2002, er Hourél).

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

(8 données)

- Saint-Jean / Locoal-Mendon, 1 butor les 5/12/2002, 10/02/03, 20/02 et 3 le 06/03.
- entre l'étang de Lannénec / Ploemeur et le Loc'h / Guidel, un individu est observé du 03/12 au 25/01.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

(48 données)

Dortoirs :

- Castell / Le Tour-du-Parc : 83 le 23/11/2002, 58 le 12/01/03, 120 le 09/02.
- étang de la Forêt / Brandivy, 6 à 10 aigrettes pendant tout l'hiver. A noter, le 14/02, clair de lune, elles ne rejoignent pas le dortoir à la nuit tombée mais « Se réunissent en amont de l'étang sur une zone de vase exondée ».
- étang de Régigny, 2 aigrettes le 05/02. C'est le dortoir, signalé, situé le plus loin à l'intérieur des terres.
- île de Kerner / Riantec : 74 le 04/01 et 61 le 17/01.

A signaler : 75 dans les salines en cours de dégel du Breno / Carnac le 13/01 et 24 le 06/03 dans l'anse de l'Istrec / Locoal-Mendon.

Grande Aigrette *Egretta alba*

(5 données)

A chaque fois, il est contacté un seul individu :

- les 16/11/2002, 23/11 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon et 27/11 sur les vasières de Kercune.
- 19/12, étang du Cranic / Brec'h.
- 23/11 sur les étangs de Branguily / Gueltas.

Héron cendré *Ardea cinerea*

(76 données)

38 données concernant des individus isolés mais il y aussi mention de 15 hérons en vol entrant dans la baie de Locmalo / Gâvres le 04/01/2003 ; 28 hérons, ici et là, autour de Nohic dans la rivière d'Etel le 12/01/2003 ; 10 au repos à l'abri de l'île Saint-Michel dans la rade de Lorient le 24/01 ; 11 à Pen Mané / Locmiquélic le 04/03.

Reproduction : 6 aires occupées à Kerzo / Port-Louis et 3 couveurs le 12/03.



Ibis sacrés à Lann er Groez / Riantec : décembre 2003

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(20 données)

Dortoirs :

- Castell / Le Tour-du-Parc, 139 ibis le 23/11/2002, 131 le 12/01 et 350 le 09/02.

- île Kerner / Riantec, les 04 et 17/01, 26 individus.

Observations diurnes : les bandes sont visibles tout le long du littoral, sur les vasières mais aussi les prairies. 22 à Braden / Crac'h le 19/01, 10 au Guerno / Plouhinec le 22/01, 15 à la pointe d'Arradon le 05/02, 10 à Kerfoucher / Plouhinec le 26/02.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

(14 données)

60 individus rejoignent le dortoir dans les marais de Séné le 22/11/2002. Un adulte bagué passe un nouvel hiver dans la rade de Lorient, rejoint par un congénère en fin de période.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*


(35 données)

Ici et là. Des groupes persistent au long de l'hiver, visibles au Brenno / Carnac (7-9 de janvier à mars), à Saint-Jean / Locoal-Mendon (maximum 10 individus dont 2 jeunes, sur toute la période), au Cranic / Brec'h (4-6 jusque fin décembre, adultes et jeunes)

Bernache cravant *Brenta bernicla*

(52 données)

Golfe du Morbihan, baies de Vilaine et de Quiberon, rivière d'Etel, rade de Lorient : voir Wetlands International. On peut citer, comme fréquentant la baie de Plouharnel, les effectifs suivants : 764 le 17/11/2002, 903 le 14/12, 520 le 11/01/03, 298 le 15/03. Les dérangements par la pratique du Fly-Surf sont constatés dans la baie de Plouharnel comme en Petite Mer de Gâvres. Dans la rade de Lorient, des groupes d'importance (centaines) ont été vus sur les vasières du Blavet, sites abandonnés ces dernières années. A noter : 200 bernaches au Fort-Bloqué / Ploemeur, le 26/11.



Bernache cravant dans la rade de Lorient (Morbihan) ; hiver 2002-2003

Wetlands International : 9969 dont 63 94 dans le Golfe du Morbihan.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(78 données)

Rassemblements : 105 au Fort-Espagnol / Crac'h le 19/01/2003, 126 dans l'estuaire de la Vilaine le 18/01 entre la pointe d'Halguen et le barrage d'Arzal. 3 Tadorne de Belon à l'étang au Duc de Ploërmel le 09/12.

Certains sites sont suivis, comme la baie de Plouharnel avec 33 le 17/1, 105 le 11/01, 130 le 10/02 et 75 le 15/03.


dates	Roc'h Du / Crac'h	dates	Kerouarc'h / Locmariaquer
21/11	68	21/11	5
5/12	71	24/12	72
24/12	79	31/12	21
31/12	44	8/1	96
13/2	9	13/2	65
5/3	10	5/3	95
12/3	45	12/3	10

Tadorne de Belon (Morbihan) ; hiver 2002-2003

dates	Effectif	Lieu-dit
3/1	8	Sterbouest
13/2	50	Pen Mané
14/2	123	
18/2	11	
22/2	13*	Saint-Sterlin
	71*	Pen Mané
	16*	Sterbouest
4/3	105	Pen Mané
7/3	66	
14/3	90	

Tadorne de Belon sur le Blavet maritime (Morbihan) ; janvier – mars 2003

* Total = 100



Tadorne de Belon dans la Petite Mer de Gâvres (Morbihan) ; novembre 2002-février 2003

L'espèce est visible sur toute l'étendue de la rivière d'Etel (20 au Gouarde le 15/02 et 10 à Penhoët / Merlevenez le 27/02). Des concentrations sont notées surtout sur les vases salées de Locoal-Mendon.

dates	Effectif	Lieu-dit
22/12	105	le Négan
27/12	47	anse de l'Istrec
	1	étang de Saint-Jean
15/1	64	Kercune
22/1	2	étang de Saint-Jean
	26	Lédec Négan

15/2	100	étang de Saint-Jean
	80	Kercune
20/2	8	anse de l'Istrec
	107	Lédec Néguan
	139	vasière de Kériguénen
6/3	99	Lédec Néguan
	95	vasière de Kériguénen
14/3	6	étang de Saint-Jean
	55	Lédec Néguan

Tadorne de Belon à Locoal-Mendon (Morbihan) ; décembre 2002-mars 2003

Reproduction : deux couples sur le lagunage de Locoal-Mendon le 14/03, un couple dans le marais de la pointe des Emigrés / Vannes le 13/03

Wetlands International : 5171 dont 3515 dans le Golfe du Morbihan.


Canard siffleur *Anas penelope*

(28 données)

Les données proviennent essentiellement de la rivière d'Etel, impression tronquée de la situation de ce canard dans le Morbihan, corrigée par les résultats des comptages de mi-janvier. Wetlands International : 1698 dont 1211 dans le Golfe du Morbihan.

Entre l'étang de Saint-Jean et les vasières de Locoal-Mendon et Nostang, on note un maximum de 385 Siffleurs observés le 27/12/2002.

D'autre part : 12 à l'étang au Duc / Ploërmel le 12/01, 45 à 60 Siffleurs dans la Petite Mer de Gâvres le 21/12, 24 au Grand Loc'h / Guidel le 21/01.



Canard siffleur dans la rivière d'Etel (Morbihan) ; hiver 2002-2003

Canard chipeau *Anas strepera*

(1 donnée)

Une femelle le 16/01/2003 au Varquez / Erdeven.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(25 données)

Les données qui nous sont parvenues ne sont qu'un lointain écho de la situation de l'espèce dans le Morbihan : ni les gagnages ou remises du Golfe ni les rassemblements marin ne sont documentés.

dates	Effectif
21/11/02	21
05/12/02	30
24/12/02	22
31/12/02	17
08/01/03	14
08/01/03	16


Sarcelle d'hiver, étang du Roc'h Du / Crac'h ;
h ver 2002-2003

44 à l'île Stuhan / La Trinité-sur-Mer le 13/01/2003, 69 à la pointe des Emigrés / Vannes le 13/03.

Wetlands International : 1313 dont 1050 dans le Golfe du Morbihan.

Canard colvert *Anas platyrinchos*

(92 données)



Canard colvert, étang au Duc / Ploërmel (Morbihan) ; h ver 2002-2003

dates	Effectifs	lieu-dit	Commune
02/02/03	60	lagunes de Bonnervo	Theix
23/12/02	66	étangs de Branguily	Gueltas
24/12/02	71	Kerouarc'h	Locmariaquer
21/11/02	80	lagunes de Bonnervo	Theix
03/02/03	85	château villeneuve	Malestroit
22/11/02	90	lagunes de Bonnervo	Theix
23/11/02	90	étangs de Branguily	Gueltas
13/01/03	108	îlot Roellan	Erdeven
13/01/03	121	île Stuhan	La Trinite-Sur-Mer
05/02/03	185	étang de réguinty	Reguinty
21/11/02	205	Kerouarc'h	Locmariaquer
15/01/03	210	étang du Ter	Ploemeur

Canard colvert (Morbihan) ; h ver 2002 – 2003

Wetlands International : 4619 dont 2677 dans le Golfe du Morbihan et 488 dans la baie de Vilaine.

Canard pilet *Anas acuta*

(5 données)

Non significatif !

4 le 08/01/2003 au Breno / Carnac ; 2 paires le 14/12 dans la Petite Mer / Gâvres ; un couple les 22/02 et 04/03 à Pen Mané / Locmiquelic ; 50 le 27/02 au Bronzais/ Pénestin.
Wetlands International : 1937 dont 1105 dans le Golfe du Morbihan et 828 dans la baie de Vilaine.

Canard souchet *Anas clypeata*

(29 données)

Non significatif !

L'espèce passe ou s'attarde à Bonnervo et au Roc'h Du.

dates	Effectif	dates	Effectif
24/12/02	25	21/11/02	5
31/12/02	4	22/11/02	4
13/02/03	7	30/11/02	3
05/03/03	18	06/12/02	35
étang du Roc'h Du / Crac'h lagunage de Bonnervo / Theix		07/12/02	38
		19/01/03	2
		02/02/03	8
		08/03/03	2

Canard souchet (Morbihan) ; hiver 2002 - 2003

A Pen Mané / Locmiquelic, on en compte 8 le 04/03 et 6 le 15/03.


Wetlands International : 929 dont 399 dans le Golfe du Morbihan et 511 dans la baie de Vilaine.

Fuligule milouin *Aythya ferina*


(50 données)

L'hivernage est bien documenté et atteint des effectifs, relativement aux années précédentes, élevés : si les 400 unités comptées au Bronzais / Pénestin peuvent être attribuées aux retours et constituent une donnée isolée, les suivis de Vannes et Theix montrent la variabilité des effectifs et le transfert des oiseaux entre les sites et vers le Golfe. Cet hiver encore les Milouins stationnent sur l'étang du Cranic / Brec'h et sont peu visibles (100 le 22/12/2002) à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon.


Ils ne sont que 2 à 5 durant le mois de décembre sur l'étang au Duc/ Ploërmel et les deux seules données de l'étang du Ter / Ploemeur (37 le 25/11 et 24 le 15/01 plus 35 à Pen Mané / Locmiquelic) reflète (à vue d'œil !) la situation qui a prévalu même si aucun suivi n'a été effectué.



Fuligule milouin, étang au Duc / Vannes et lagunage de Bonnervo / Theix (Morbihan) ; hiver 2002 - 2003



Fuligule milouin, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; h ver 2002 – 2003 - A




Fuligule milouin, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; h ver 2002 – 2003 - B

Fuligule morillon *Aythya morillon*

(55 données)

Les effectifs enregistrés à l'étang au Duc / Vannes et Bonnervo / Theix ne dépassent pas 23 le 02/02/2002. Le niveau est également très faible à Ploërmel : 16 le 12/01. L'hivernage de l'étang du Ter / Ploemeur n'est pas suivi attentivement : 51 le 25/11 et 35 le 15/01 – 54 le 18/01 à Pen Mané / Locmiquélic. Les observations de Saint-Jean / Locoal-Mendon sont sans doute à relier à l'hivernage du Cranic : 56 le 27/12, 45 le 08/01 et 36 le 22/01 à Goh Lenn.

C'est donc sur l'étang du Cranic / Brec'h que l'hivernage a été le mieux suivi et constitue une nouveauté.



Fuligule morillon, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; h ver 2002 – 2003

Fuligule milouinan *Aythya marila* (4 données)

- mâle de premier hiver le 12/12/2002 sur l'étang du Cranic / Brec'h.
- 4 femelles se tiennent à l'écart des autres fuligules le 02/01 au Cranic.
- 307 dans l'estuaire de Vilaine, de la pointe Halguen au barrage d'Arzal le 18/01.
- 107 le 22/01 dans l'estuaire de la Vilaine / Pénestin.

Wetlands International : 967 dans la baie de Vilaine.

Eider à duvet *Somateria mollissima* (5 données)

- 2 le 31/12/2002 à La Roche-Sèche / Erdeven.
- 1 le 13/01/03 près de l'îlot de Roellan / Erdeven.
- deux couples le 01/03 devant Locmariaquer.
- 1 mâle le 24/12/02 de la pointe er Hourél / Locmariaquer puis 2 mâles adultes, 1 mâle de 1er hiver et 1 femelle le 05/03

Macreuse noire *Melanitta nigra* (3 données)

- 25 le 14/03/2003 devant la barre d'Etel / Plouhinec.
- 1 en vol vers l'ouest le 08/03 à La Roche Sèche / Erdeven.
- 10 en mer le 11/01 à Penthievre / Plouharnel.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* (18 données)

Les observations sont rares en dehors du Golfe : entre 2 et 8 individus du Roc'h Du / Crac'h à Kerouarc'h / Locmariaquer, un maximum de 8 dans la rivière d'Etel, au Listrec / Locoal-Mendon le 20/02/2003 et encore moins dans la rade de Lorient : 2 le 14/02, 1 le 04/03. Un garrot s'aventure jusqu'à l'étang au Duc / Ploërmel le 09/12/2002.

Wetlands International : 581 dont 574 dans le Golfe du Morbihan.

Harle huppé *Mergus serrator* (35 données)

Devant Locmariaquer, 20 à 30 individus sont communément observés : 34 le 21/11/2002 à er Hourél et encore 21 le 05/03. Près de là, quelques uns (2-7) se posent au Roc'h Du / Crac'h.

Dans la rivière d'Etel : une dizaine de Harles huppés dans les courants, 11 à la pointe de Rosmarien / Landaul le 18/11, 6 le 14/03 à Pen Inez / Locoal-Mendon ; le 30/11, 6 individus, à l'aube, entrent dans la rivière devant Etel.

Wetlands International : 1498 dont 1753 dans le Golfe du Morbihan.

Harle bièvre *Mergus merganser* (1 donnée)

Un Harle bièvre au Fort-Bloqué / Ploemeur le 28/01/2003.

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis* (1 donnée)

Une femelle le 05/12/2002 sur l'étang du Cranic / Brec'h accompagne les fuligules.

AR VRAN MORBIHAN N° 26

Groupe n° 2 Des rapaces aux rallidés.

Choix et rédaction établis par Franz URVOAZ

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (51 données)

Ces données nous sont parvenues des 13 communes suivantes : Erdeven, Plouhinec, Kervignac, Ploemeur, Locoal-Mendon, Brec'h, Crac'h, Baden, Gâvres, Landaul, Guidel, Damgan et Locmiquélic.

La donnée la plus remarquable fait état d'une parade de 5 oiseaux à savoir 2 femelles, 3 mâles (2 adultes et 1 immature) le 06/03/2003 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon. 2 individus dont 1 mâle à calotte claire et épaules crème se livrent à des parades très démonstratives le 26/01/2003 à Kervran Kerzine / Plouhinec.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (26 données)

16 communes différentes sont notées : Locoal-Mendon, La Croix Helléan, Erdeven, La Chapelle Neuve, Riantec, Plouhinec, Camors, Languidic, Guégon, Lanouée, Nostang, Lizio, Surzur, Saint-Jean Brévelay, Brandérion et Sérent où un dortoir hivernal réunit 5 individus les 05 et 12/12/2003 sur la tourbière de Kerfontaine.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* (30 données)

Les données sont parvenues des 15 communes suivantes : Camors, Plumelec, Le Tour-du-Parc, Locoal-Mendon, La Chapelle-Neuve, Languidic, Brandérion, Guégon, Theix, Saint-Guyomard, Pleugriffet, Locmiquélic, Saint-Malo-les-Trois-Fontaines, Saint-Pierre-Quiberon et Baud.

Une attaque infructueuse sur des bécasseaux variables est notée le 21/11/2002 à l'étang du Roc'h Du / Crac'h. A noter également à trois reprises des mâles poursuivis par des corneilles noires.

Buse variable *Buteo buteo* (79 données)

Des données de 28 communes nous sont parvenues à savoir : Locoal-Mendon, Lanouée, Guénin, Lizio, Guéhenno, Guégon, Erdeven, Belz, Saint-Gonnery, Brandivy, Ploemeur, Sérent, Les Forges, Brec'h, Crac'h, Gueltas, Sainte-Brigitte, Languidic, Camors, Baud, Locmariaquer, Crédin, Ploërmel, Nostang, Saint-Jean-Brévelay, Locmiquélic, Taupont et Cruguel.

Février et Mars fournissent les données les plus remarquables :

- parade collective de 5 individus le 27/02/2003 au réservoir du Loc'h / Brec'h
- parade collective de 4 individus le 04/03 à La Croix Balais / Sérent.
- piqués et festons de la part de 5 individus le 06/03 à Ty Rhu / Locoal-Mendon.
- rassemblement de 5 individus le 10/03 à Kergal/Languidic.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

(64 données)

Les observations sont faites dans 27 communes : Ploërmel, Cruguel, Guéhenno, Guégon, Saint-Gérard, Guillac, Plumelec, Sérent, Lizio, Saint-Gonnery, Brandivy, Ploemeur, Régigny, Brec'h, Camors, Crédin, Lanouée, Plumelin, Les Forges, Guidel, Pleugriffet, Mohon, Plouharnel, Saint-Jean Brévelay, Baud, La Trinité-Porhoët et Josselin.

Deux données méritent une mention particulière :

- le 17/11/2002 à Pen er Lé / Plouharnel, 2 mâles sont aperçus ensemble. L'un d'eux capture un passereau sans doute un tarier pâtre.
- le 12/01/2003, une femelle harcèle un Busard Saint Martin mâle.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

(4 données)

Ces 4 données proviennent de Kerminehy / Erdeven, de Kervran-Kerzine / Plouhinec, de La Ville Mulot / Saint-Malo les Trois Fontaines et de la Petite Mer de Gâvres où un individu capture en vol un Pipit farlouse.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(5 données)

Ces observations sont faites sur les dunes d'Erdeven, à la carrière de Plumelin, au Loc'h de Guidel, entre le 17/11/2002 et le 12/01/03

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

(1 donnée)

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(26 données)

Les observations proviennent de 8 communes : Erdeven, Brandivy, Ploemeur, Brec'h, Locoal-Mendon, Locmiquélic, Locmariaquer et Plouharnel.

Le 07/12/2002, 4 individus différents sont entendus à l'étang de la Forêt / Brandivy ; le 04/03/2003, 3 individus sont entendus à Pen Mané / Locmiquélic et le 08/03, pas moins de 6 individus sont entendus à La Falaise / Erdeven.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

(26 données)

Les données émanent des communes suivantes : Erdeven, Vannes, Theix, Brandivy, Régigny, Cléguer, Brec'h, Gueltas, Locmiquélic, Radenac, Plméliau, Locoal-Mendon et Plouharnel.

Les plus importants rassemblements sont notés dans les lieux suivants : 10 individus le 14/02/2003 à l'étang de la Forêt / Brandivy ; 15 individus le 01/03 à l'étang de Kerlurec / Theix, 13 individus le 23/02 à Er Varquez / Erdeven.

Foulque macroule *Fulica atra*

(112 données)

650 individus le 02/12/2002 à Quélisoye / Larmor Plage ; 185 individus sur les lagunes de Bézit / Theix le 07/12/2002 et 140 individus sur les lagunes de Damgan ; 185 individus le 12/01 au Lac au Duc/Ploërmel ; 530 le 13/01 au Roc'h Du / Séné ; un maximum de 55 individus est atteint le 22/01 à l'étang du Cranic / Brec'h.



(Voir graphiques suivants).

Grue cendrée *Grus grus*

(1 donnée)

Deux individus stationnent sur la Réserve Naturelle de Séné du 07/11/02 au 01/12/02.

Le mâle parade.

*Foulque macroule sur les étangs de Locoal-Mendon (Morbihan) ; hiver 2002-2003**Foulque macroule au Roc'h Du / Crac'h (Morbihan) ; hiver 2002-2003*

AR VRAN MORBIHAN N° 26

Groupe n° 3 De l'Huîtrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Yannick Ordureau

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

(28 données)

Un nombre conséquent de données pour cette période :

- le 20/12/2002 , 138 sur l'île aux Souris / Port-Louis.
- Le 10/02/2003, 123 à Le Conguel / Quiberon.
- Le 22/02, 68 individus sont observés au total sur le Blavet maritime.

A la Pointe er Hourél / Locmariaquer , des données régulières : une centaine d'individus le 24/12, 137 le 13/02, 110 le 05/03 et 95 le 12/03.

Wetlands International : 1953 dont 887 dans la baie de Vilaine et 791 en baie de Quiberon..

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(6 données)

Très peu de données : 93 le 07/12/2002 à marée montante à Le Lic / Ambon et 420 groupées à marée haute à Pentès/ Surzur le 23/11/2002.

Wetlands International : 2566 dont 930 dans le Golfe du Morbihan et 1631 en baie de Vilaine.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

(2 données)

Le 15/03/2003 deux individus sont entendus à Erdeven, l'un à Kerminihy, l'autre à Sainte Barbe.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

(130 données)

- un regroupement de 100 individus en reposoir à marée montante en Baie de Plouharnel le 17/11/2002.
- 200 le 21/11 à Kervoyal-Pénerf/ Damgan.
- 110 en reposoir à marée haute le 01/12 à La Roche Sèche / Erdeven.
- 239 le 23/02/2003 à Linès / Gâvres.
- 150 à marée haute à la Pointe er Hourél / Locmariaquer.

Wetlands International : 2377 dont 878 en baie de Vilaine.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

(1 donnée)

Le 12/03/2003 observation de 6 individus en gagnage à marée haute à la Pointe er Hourél / Locmariaquer

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

(30 données)

L'axe Pontivy-Josselin offre encore une fois un regroupement de 800 individus le

25/11/2002 à la hauteur de Pleugriffet. Le 18/12/2002 un recensement de 455 individus en la Croix-Helléan et le 04/01/2003, 650 à Timadeuc / Rohan.

Sur le littoral : à Linès / Gâvres 376 le 30/11/2002, 399 le 19/01/2003, environ 300 le 23/02.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

(24 données)

Des regroupements conséquents à Gâvres : 738 le 30/11/2002 à Linès ; 720 le 15/02/2003 puis environ 700 le 23/02. A la Pointe er Hourél / Locmariaquer, 200 le 13/02/2003 et 350 le 05/03.

Wetlands International : 3495 dont 2345 dans le Golfe du Morbihan et 677 dans la rade de Lorient.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

(94 données)

Sur le littoral : 351 le 20/02/2003 à Conleau / Vannes : 495 le 30/11/2002 à la Petite Mer de Gâvres ; 540 le 21/01 au Grand Loc'h / Guidel.

A l'intérieur du département : 500 le 22/11 en vol à Talbediny / Guénin ; 3300 le 25/11 aux carrières / Pleugriffet ; 800 le 18/12 à Kernan / La Croix-Helléan ; 650 le 28/12 à Bocnoeuf la Rivière / Lanouée ; 3200 le 22/01 au carrefour Radenac - Pleugriffet ; 1196 le 22/01 sur la vasière de Penhoët / Merlevenez .

Quelques observations de parades : 3 couples le 23/02 à l'étang de Kervran / Plouhinec ; 5 couples installés sur la dune le 24/02 à Kerminihy / Erdeven ; un couple le 08/03 à Ty Rhu / Locoal-Mendon.

Wetlands International : 6214 dont 3035 dans le Golfe du Morbihan et 1128 en baie de Vilaine.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

(2 données)

Ces deux observations ont été faites en Petite Mer de Gâvres : 2 individus le 30/11/2002 et 10 le 15/02/2003.

Wetlands International : 420 dont 255 dans le Golfe du Morbihan.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

(13 données)

Les données proviennent uniquement de la presqu'île de Quiberon : 220 le 17/11/2002 en reposoir à marée montante en Baie de Plouharnel ; 220 le 30/12 en face de l'île Tilic / Saint-Pierre-Quiberon ; 250 le 3/02/03 à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon.

Wetlands International : 1620 dont 1070 en baie de Quiberon.

Bécasseau minute *Calidris minuta*

(1 donnée)

Un individu observé le 12/03/2003 à la Pointe er Hourél / Locmariaquer.

Wetlands International : 4 dans le Golfe du Morbihan.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(2 données)

3 le 01/12/2002 en reposoir à la Roche Sèche / Erdeven et 3 le 10/02/2003 à le Conguel / Quiberon.

Wetlands International : 28 sur la côte de Ploemeur.

Bécasseau variable *Calidris alpina* (23 données)

- 550 en reposoir à marée montante le 17/11/2002 en Baie de Plouharnel.
- 2000 le 30/11 dans la Petite Mer de Gâvres.
- 770 en gagnage le 24/12 à Kerouarc'h / Locmariaquer.
- 2830 en gagnage à marée montante le 20/02/03 dans l'Anse de l'Istrec / Locoal-Mendon.
- 940 en reposoir à marée haute à la Pointe er Hourél / Locmariaquer le 12/03.

Wetlands International : 42 153 dont 21 360 dans le Golfe du Morbihan.

Combattant varié *Philomachus pugnax* (2 données)

Trois femelles et un mâle le 21/01/2003 au Grand Loc'h / Guidel et 3 le 16/03/2003 à Pen Mané / Locmiquélic.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* (3 données)

Observation d'un individu à la Tourbière de Kerfontaine / Serent le 17/01/2003 , le 6/02/2003 et le 10/02/2003.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (31 données)

De nombreuses observations durant cette période : 12 dans les dunes de Plouhinec le 26/11/2002 , 12 le 13/01/2003 dans les anciennes salines de Carnac puis le 27/01 et le 04/03 ; 8 le 09/01 sur le plan d'eau de Riantec.

Le 28/12/2002 , observation de 5 individus levés par une femelle de Busard Saint Martin , à Varquez / Erdeven.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (6 données)

Les données ne concernent que des individus isolés :

- le 09/12/2002, le 22/01 et le 10/02 à Kergal / Languidic.
- le 09/02 à l'étang du Cranic / Brec'h.
- le 16/02 à Laimer / Plumergat.
- le 8/03 à Poignant / Vannes.

Barge à queue noire *Limosa limosa* (1 donnée)

Observation de 9 individus le 30/11/2002 dans la Petite Mer de Gâvres.

Wetlands International : 1135 dans le Golfe du Morbihan.

Barge rousse *Limosa lapponica* (6 données)

35 en reposoir à marée montante le 17/11/2002 dans la Baie de Plouharnel, 25 groupées à marée haute le 21/11 dans le marais du Bill / Damgan.

Wetlands International : 384 dont 170 en baie de Quiberon.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (1 donnée)

Wetlands International : 1 dans la rade de Lorient.

Courlis cendré *Numenius aquaria*

(25 données)

- 67 le 30/11/2002 et 60 le 15/02/2003 dans la Petite Mer de Gâvres.
- 60 le 21/12 au Gouarde / Nostang.
- 25 en reposoir sur le Grand Huernic – Kerouarc'h / Locmariaquer le 31/12.
- 40 le 10/02/2003 à Pen er Lé / Plouharnel.

Wetlands International : 1254 dont 596 en baie de Vilaine.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

(0 donnée)

Wetlands International : 24 dans le Golfe du Morbihan.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

(34 données)

De nombreuses données et quelques bons regroupements :

- 150 groupés à marée haute le 21/11/2002 dans le marais du Bill / Damgan .
- 80 le 23/11 dans le Marais de Castell / Le Tour-du-Parc.
- 37 le 29/11, 29 le 14/02/03 et 36 le 04/03 à Pen Mané / Locmiquélic.

Wetlands International : 649 dont 250 dans le Golfe du Morbihan.

*Chevalier gambette ; Riantec***Chevalier aboyeur *Tringa nebularia***

(11 données)

A l'étang du Roc'h Du / Crac'h, 10 individus le 21/11/2002 et 15 le 12/03/03 ; 5 le 04/01/03 à Listrec / Locoal-Mendon

Wetlands International : 23.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

(8 données)

Les données concernent en majorité des individus isolés sauf 4 le 27/12/2002 à l'étang au Duc / Ploërmel et 2 le 29/01/2003 dans les carrières de Pleugriffet.

Wetlands International : 1.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

(16 données)

Deux individus le 05/12/2002 à l'étang du Roc'h Du / Crac'h ; 4 le 1/01/2003 à Penhoët / Merlevenez et 7 le 13/02 à Lann er Groez / Riantec. Les autres observations ne concernent que des individus isolés.

Tournepipierre à collier *Arenaria interpres*

(16 données)

- 140 en reposoir à marée montante en Baie de Plouharnel le 17/11/2002.
- 230 à Kervoyal-Pénerf / Damgan le 21/11/2002.
- 80 en reposoir à marée haute le 01/02/2003 à la Roche Sèche / Erdeven.
- 428 à l'Île aux Souris / Port-Louis le 02/02/2003.
- 60 le 05/03/2003 à la Pointe er Hourél / Locmariaquer.

Wetlands International : 1056 dont 345 en baie de Vilaine et 360 en baie de Quiberon.

AR VRAN MORBIHAN N°26

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Yann Kerninon.

Stercoraridae sp.

(0 donnée)

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

(4 données)

3 données concernant des adultes vus à l'unité : le 13/12/2002 à la Roche Sèche / Erdeven, le 20/12 à Conleau / Vannes, le 13/02/03 à la pointe er Hourél / Locmariaquer. Le 03/02, 28 individus sont présents à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon, effectif rarement rapporté dans le département.

Mouette pygmée *Larus minutus*

(1 donnée)

L'espèce est passée quasiment inaperçue cette période : seulement 2 mouettes observées au Lenn / Damgan le 21/11/02.


Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(56 données)

Plusieurs rassemblements intéressants :

- 930 le 21/11/2002 à Kervoyal-Pénerf / Damgan.
- 500 le 22/11 aux lagunes de Bonnervo / Theix.
- 8000+ le 26/11 et 9000 en dortoir le 14/02/03 au lac au Duc / Ploërmel.
- 1506 le 19/12 à l'étang du Cranic / Brec'h.
- 1146 le 20/02/03 et 663 le 06/03 autour de la presqu'île du Néguan / Locoal-Mendon.

Des comptages réguliers à l'étang du Cranic se traduisent par le graphique suivant :



Mouette rieuse, étang du Cranic/ Brec'h (Morbihan) : novembre 2002 – mars 2003

Goéland cendré *Larus canus*

(26 données)

Quelques beaux groupes sont notés dans le département :

- 45 le 21/11/2002 à Kervoyal-Pénerf / Damgan.
- 14 le 21/12 à Lann er Groez / Riantec.
- 35 le 24/12 à Kerouarc'h / Locmariaquer.
- 41 le 18/01/03 à Arzal.
- 20 le 05/03 à Kerouarc'h / Locmariaquer.
- 14 le 06/03 autour de la presqu'île du Néguan / Locoal-Mendon.

Mais il faudra surtout retenir les 136 individus observés le 20/12 à Conleau / Vannes, ce qui constitue un effectif peu commun pour le département.

Goéland brun *Larus fuscus*

(33 données)

Inhabituel dans cette chronique, l'absence de reposoir ou de dortoir important recensé en rivière d'Etel, sauf les 300 goélands à Ber er Vil / Plouhinec le 08/12/2003.


Suivi partiel de l'étang au Duc / Ploërmel : plus de 450 le 26/11/02 et 644 le 14/02/03.

Des comptages réguliers à l'étang du Cranic / Brec'h et à l'étang à marée du Roc'h Du / Crac'h n'ont pas permis l'observation de reposoir remarquable : seulement de 1 à 8 individus sur le premier site et de 3 à 10 sur le second.

Goéland argenté *Larus argentatus*

(36 données)

Rassemblements dans l'intérieur des terres : 200 sur un labour le 24/12/2002 à Penvern / Camors, 100 sur un pré le 28/12 au Parc / Pluvigner, 70 le 27/02/2003 sur le réservoir du Loc'h / Brec'h. Aucun comptage supérieur ou équivalent pour les sites littoraux, sauf pour un site en bordure du Golfe : 200 le 12/01 sur les lagunes de Bonnavo / Theix.



Goéland argenté, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; novembre 2002 – mars 2003

Goéland marin *Larus marinus*

(15 données)

Quelques rassemblements attribuables pour partie aux nicheurs locaux :

- 37 (21 adultes et 16 grisards) le 02/02/2003 sur l'Île aux Souris / Port-Louis.
- 6 en reposoir le 07/03 sur la vasière de Sterbouest / Locmiquélic.
- 22 visibles de la côte le 08/03 sur l'Île de Roëlan / Erdeven.
- 10 en reposoir le 15/03 dans la baie de Plouharnel.

Sinon, en s'éloignant de la côte, 2 à 3 individus notés en ria d'Etel entre l'étang de Saint-Jean et l'anse de l'Isirec / Locoal-Mendon du 19/12/02 au 14/03/03.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

(0 donnée)

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(15 données)

Comme pour la même dernière période, on notera l'absence de l'espèce de fin janvier à février et ce n'est pas la première fois que ce déficit de donnée est relevé dans cette rubrique. Nos hivernants quitteraient-ils le département un peu avant le début du passage printanier ?

En novembre, 5 données avec un maximum de 8 sternes le 17/11/2002 en baie de Plouharnel. En décembre, 4 données avec un maximum de 22 entrant au petit matin dans le Golfe le 14/12. En janvier, 2 données avec un maximum de 5 sur une vasière à Beg er Vil / Plouhinec le 06/01/03. En mars, 4 données avec un maximum de 18 en reposoir à Kerouarc'h / Locmariaquer le 12/03.

Alcidae sp.

(1 donnée)

1 cadavre sur la plage de Kerhillio / Erdeven le 16/01/2003.

Guillemot de Troil *Uria aalge*

(7 données)

1 devant la plage de Kerbillio / Erdeven le 13/12/2002, 1 en rivière d'Etel, au Magouër / Plouhinec le 23/12, 2 à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon le 31/12 et 1 au même endroit le 03/02/03.

Echouages : 1 cadavre mazouté le 01/01 et 1 propre le 16/01 sur la plage de Kerbillio, 1 dans le marais de Pentès / Surzur le 12/01.

Pingouin torda *Alca torda*

(1 donnée)

Avec 1 individu le 11/01/03 à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon, l'espèce s'est montrée discrète, mais au moins aura-t-elle évité de trop fréquenter les laisses de mer.

AR VRAN MORBIHAN N° 26

Groupe n°5 Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Yann KERNINON

Pigeon colombin *Columba oenas*

(6 données)

9 sur des chaumes de maïs parmi 400 Ramiers à Crota / Campénéac le 23/12/2002. Les reproducteurs de la carrière de Lann Plumelin / Plumelin réapparaissent le 02/02/03 et 4 individus y sont présents le 09/03. Ce même jour, 1 individu est présent à la carrière de Quinipily / Baud. Sinon 1 à Kerfrézec / Sainte-Hélène le 15/03.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

(19 données)

Quelques rassemblements :

Effectif	Date	Remarque	Lieu-dit	Commune
250	18/12/02	sur chaumes de maïs.	La Ville Gleuhiet	GUEGON
500+	23/12/02	dans un bosquet.	Branguily	GUELTAS
400	23/12/02	sur chaumes de maïs.	Crota	CAMPENEAC
150	12/01/03		La Ville Allain	GUEGON
450+	02/02/03	sur chaumes de maïs.	Kerauffret	CAMORS
110	04/02/03		Kergal	LANGUIDIC
120	13/02/03		Kerassio	LANGUIDIC

Espèce contactée en forêt de Quénécen lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

(3 données)

19 ensemble à Goh Locoal / Camors le 26/12/2002. Un accouplement est observé le 16/02/2003 à Saint-Goustan / Auray.

Effraie des clochers *Tyto alba*

(15 données)

Notée uniquement à l'unité sur 8 communes : Brec'h, Cruguel, Guégon, Guillac, Languidic, Locoal-Mendon (3 sites), Plouay et Pluméliau. Quatre chocs contre des véhicules sont rapportés.

Chevêche d'Athéna *Athena noctua*

(5 données)

Une chevêche à la Ville Gleuhiet / Guégon le 28/11/2002, puis le 30/01/03. 1 individu erratique est présent jusqu'au 29/11 à Bodavel / Camors. 1 contact à Saint-Thomin / Nostang le 29/11.

Chouette hulotte *Strix aluco*

(26 données)

Notée sur 12 communes : Brandérion, Brandivy, Camors, Cruguel, Guégon, Landévant, Merlevenez, Pont-Scorff, Réguiny, Sainte-Brigitte, Sérent et Vannes.

Deux couples sont vus : 1 le 28/01/2003 à Ti Nêhué / Pont-Scorff et 1 le 08/03 à la Villeneuve / Locoal-Mendon.

Anecdote : le 05/01 à Bodavel / Camors, suite à une nuit très froide, une Hulotte est découverte endormie sur l'étagère d'un appentis à 07h30. Elle n'est pas retrouvée à 08h00, mais un chanteur se fait entendre dans les environs.

Espèce contactée en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Hibou moyen-duc *Asio flammeus*

(3 données)

Un individu à la Rougeraie / Lanouée le 15/11/02, et 1 femelle observée les 10 et 14/03/2003 à Ty Rhu / Locoal-Mendon.

Hibou des marais *Asio flammeus*

(2 données)

Un Hibou brachyote est dérangé par des chasseurs à Kermi nihy / Erdevén le 08/12/2002 et 1 chasse au crépuscule sur l'Île Kerner / Riantec le 07/01/2003, soit deux observations sur des sites classiques où un hivernage régulier est connu.

Martinet noir *Apus apus*

(1 donnée)

Le 29/11/02 est trouvé un "cadavre ancien, possiblement mis à jour par des travaux récents dans l'église" du bourg de Mendon / Locoal-Mendon.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(36 données)

L'hivernage est bien noté avec 50 % des données entre le 1^{er} décembre et le 20 février tant sur des sites littoraux bien suivis que sur des sites intérieurs comme l'étang de la Forêt / Brandivy, les étangs de Branguily / Gueltas, le canal de Nantes à Brest / Saint-Gérard et la carrière de Pleugriffet.

Mois	Nov.	Décembre			Janvier			Février			Mars
Décade	Du 16 au 30	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	du 01 au 15
Nombre de données	8	1	3	4	6	0	2	1	1	3	7
Nombre de sites	6	1	3	3	5	-	2	1	1	3	7

Martin-pêcheur d'Europe, présence dans le Morbihan ; hiver 2002-2003

Pic vert *Picus viridis*

(11 données)

Espèce vue et entendue sur 9 communes : Brandivy, Camors, Cléguer, Guégon, le Roc-Saint-André, Sainte-Brigitte, Sainte-Hélène, Sérent et Vannes.

Contacté en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/2002.

Pic noir *Dryocopus martius*

(13 données)

Noté sur 10 communes : Camors, Kervignac, Languidic, Locoal-Mendon, Merlevenez,

Nostang, Ploemeur, Plumergat, Sainte-Brigitte et Sérent.

Retenons : 2 en pèlerinage le 26/01/2003 près de la basilique de Sainte-Anne d'Auray et 2 le 18/02 à la tourbière de Kerfontaine / Sérent. Des chanteurs, un à chaque fois, sont entendus à Beg er Lann / Merlevenez le 10/02, en forêt de Camors le 16/02 et à Brambillec / Kervignac le 06/03.

Espèce contactée en forêt de Quénécán lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Pic épeiche *Dendrocopos major*

(7 données)

Espèce vue et entendue à Camors, Guégon, Languidic et Sainte-Brigitte. 4 sont présents au Pont-Neuf / Languidic le 15/03/03.

Espèce contactée en forêt de Quénécán lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Pic mar *Dendrocopos medius*

(3 données)

Le 15/02/2003, une recherche spécifique en forêt de Lanouée sur la commune des Forges permet de repérer 7 couples cantonnés.

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

(6 données)

Vu à l'unité : 1 femelle le 16/11/2002 à Rugdual / Quéven, 1 le 29/11 à la Croix Balais / Sérent, 1 mâle le 02/12 dans un jardin du centre-ville de Ploermel, 1 le 11/03/2003 aux Cinq Chemins / Les Forges et 1 au Pont de Kerhervy / Saint-Jean-Brévelay.

Espèce contactée en forêt de Quénécán lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(0 donnée)

Alouette lulu *Lullula arborea*

(11 données)

16 alouettes sur des chaumes le 30/12/2002 à Stungrenn / Moréac. Jusqu'à 15 ensemble à Ty Rhu / Locoal-Mendon le 14/01/2003. Sur ce site, les chants reprennent le 07/02 et sur la même commune, 2 autres sites accueillent aussi un chanteur : le 05/03 à Mendon et Kerverhant.

Les 10 individus présents le 13/02 à la Pointe er Hourél / Locmariaquer sont-ils attribuables à la remontée printanière ou relèvent-ils d'un hivernage local ?

Alouette des champs *Alauda arvensis*

(17 données)

Plusieurs bandes hivernantes sont observées :

Effectif	Date	Remarque	Lieu-dit	Commune
60	07/12/02	sur un labour.	Le Lic	DAMGAN
68	18/12/02	sur un labour.	?	TAUPONT
10	23/12/02	sur chaumes de maïs.	Crota	CAMPENEAC
15	02/02/03		Kerauffret	CAMORS
50	22/02/03		Saint-Sterlin	KERVIGNAC
12	04/03/03	dans les dunes.		PLOUHINEC

En février, des chanteurs donnent de la voix à Camors, Erdeven, Locmariaquer, Locmiquélic et Radenac.

Contactée lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

(2 données)

Les 10 premières sont présentes à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 13/03/2003 et le lendemain ce sont 100 à 150 qui y chassent.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

(3 données)

La première est vue le 13/03/2003 à Kerrousseau / Quéven. Puis 1 le 15/03 au Pont-Neuf / Languidic et 1 le 26/03 à Pen er Pont / Locoal-Mendon.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

(26 données)

61,5 % des données (16/26) proviennent de communes littorales. Notons : 35 le 07/12/2002 aux lagunes de Bonnervo / Theix, 18 le 14/01/2003 et 25 le 24/01 dans les dunes de Plouhinec, 10 le 23/02 à la pointe de Porh-Lineneu / Erdeven, 19 le 05/03 à la pointe er Hourél / Locmariaquer et 15+ le 15/03 à Pen er Lé / Plouharnel.

Cependant des observations très intéressantes viennent de sites intérieurs :

- 60 en dortoir le 12/12 à la tourbière de Kerfontaine / Sérent.
- 80 le 01/02 à Kergollaire / Languidic.
- 80 à 100 réunis à 17h45 sur une lande à bruyères le 08/02 à Kerpenru / Camors..
- et 30 le 14/02 à Kerassio / Languidic.

Pipit maritime *Anthus petrosus*

(0 donnée)

Aucune donnée ?!

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

(2 données)

Seulement 2 observations d'un seul individu dans les deux cas : le 23/11/02 aux étangs de Branguily / Gueltas et le 23/02 aux bassins d'épuration de Varquez Rongal / Plouharnel.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

(20 donnée)

Notée sur 16 communes, surtout dans l'intérieur : Brandivy, Brec'h, Crédin, Guégon, Gueltas, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Locmiquélic, Locoal-Mendon, Malesroit, Pleugriffet, Plouharnel, Plumelec, Sainte-Brigitte et Sérent.

Contactée lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Mois	Nov.	Décembre			Janvier			Février			Mars
Décade	du 16 au 30	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	du 01 au 15
Nbre de données	5	3	0	0	2	1	1	1	2	2	4

Bergeronnette des ruisseaux, présence dans le Morbihan : hiver 2002-2003

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

(9 données)

Seulement 2 dortoirs ou pré-dortoirs sont recensés :

- le dortoir du centre-ville de Vannes accueille 900 individus le 20/11/2002, puis il s'éclate en plusieurs dortoirs, toujours en ville, après le 25/11.
- à Boul Sapin / Brandérion, les rassemblements de fin de journée comptent 90 bergeronnettes le 22/10, 120 le 13/01/03 et 150 le 16/01.

Contactée lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla yarrellii*

(7 données)

43 au dortoir parmi les Bergeronnettes grises à Vannes le 20/11/2002. 10 le 23/02/2003 aux bassins d'épuration de Varquez Rongal / Plouharnel.

Les autres données concernent des bergeronnettes vues à l'unité sur les communes de Brandivy, Locmariaquer, Locmiquélic, Saint-Gérard et Sérent.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (1 donnée), **Accenteur mouchet *Prunella modularis***, (4 données), **Rougegorge familier *Erithacus rubecula*** (1 donnée)

Espèces contactées lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

(13 données)

Les 5 individus (1 mâle et 4 femelles/immaturation) présents à Pen er Lé / Plouharnel le 17/11/2002 concernent sans doute le passage postnuptial.

Toutes les autres données correspondent à des oiseaux vus à l'unité sur les communes de Baud, Larmor-Plage, La Trinité-sur-Mer, Nostang, Ploermel, Ploemeur, Plouharnel, Plouhinec et Plumelin.

Les retours sur les sites de reproduction sont notés le 23/02/2003 à la carrière de Quinipily / Baud (1 mâle, puis 1 chanteur le 09/03) et le 09/03 à la carrière de Lann Plumelin / Plumelin (1 femelle).

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

(1 donnée)

Une donnée précoce : 1 femelle accompagne un couple de Tarier pâtre le 09/03/2003 à Magouëro / Plouhinec.

Tarier pâtre *Saxicola torquata*

(14 données)

Noté sur 10 communes : Auray, Damgan, Erdeven, Guégon, Languidic, Locmariaquer, Meucon, Ploemeur, Plouhinec et Surzur. En fin de période, certains regroupements peuvent être attribués pour partie à des migrants prénuptiaux : 7 à Fetan-Léreg et 5 à La Falaise / Erdeven le 08/03/03, 8 sur les dunes de Plouhinec le 14/03.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

(2 données)

Le premier mâle de la saison est à Kerminihy / Erdeven le 09/03/03. Les 3 suivants sont dans les dunes de Plouhinec le 14/03.

Merle noir *Turdus merula*

(5 données)

Anecdotes :

- le 04/01/2003 à Bodavel / Camors, bagarre entre 2 mâles qui se laissent approcher par 3 fois à moins de 3 mètres.
- le 08/03 à Kerhan / Languidic, un individu avec 2 rémiges et 2 caudales blanches.

Grive litorne *Turdus pilaris*

(35 données)

La migration postnuptiale, notée dès le début novembre (cf Ar Vran 56 n°25), semble avoir été assez peu marquée au cours de la deuxième quinzaine de ce mois avec seulement 3 données et de 1 à 15 individus sur des sites intérieurs.

Entre le 1^{er} décembre et le 20 février, l'hivernage est observé sur 11 communes : Bieuzy, Brandivy, Camors, Crac'h, Guégon, Languidic, Pluméliau, Saint-Gérard, Saint-Malo-Les-Trois-Fontaines, Sérent et Theix. Notons : 80 le 05/12/2002 et 40 le 12/12 à la tourbière de Kerfontaine / Sérent, 80 le 18/12 à Penfran / Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, 50+ le 30/12 à Saint-Nicodème / Pluméliau, 180 le 24/01 aux Basses Landes / Sérent, 150 (dont 1 avec la tête blanche) le 03/02 à Kergal / Languidic, 120 le 11/02 à Kergollaire / Languidic.

La remontée printanière est notée à partir du 19/02 : 80 le 11/03 à La Georgelais / Malestroît, 80 le 04/03 et 86 le 13/03 à Kerassio / Languidic

Mois	Nov.	Décembre			Janvier			Février			Mars
Décade	du 16 au 30	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	du 01 au 15
Nbre de données	3	1	4	4	3	3	2	2	4	5	5

Grive litorne, présence dans le Morbihan ; hiver 2002-2003

Grive musicienne *Turdus philomelos*

(6 données)

L'espèce n'a été notée qu'à la faveur de ses chants à partir de décembre. Une Musicienne imite le Pic noir *Dryocopus martius* le 12/02/03 à Kergauz / Languidic.

Grive mauvis *Turdus iliacus*

(21 données)

La migration automnale remarquée dès la seconde décade d'octobre (cf Ar Vran 56 n°25) se poursuit normalement en novembre. A Ty Rhu / Locoal-Mendon, le passage est donné "abondant" dans la soirée du 16/11/2002 (1 cri toutes les 30 à 60 secondes à 22 heures et 2 heures plus tard) et nul le lendemain avec les mêmes conditions météo. 100 le 19/11 à la Ville Gleuhel / Guégon.

Entre le 1^{er} décembre et le 20 février, l'hivernage est observé sur 8 communes : Inzinzac-Lochrist, Languidic, Plumelin, Priziac, Sainte-Anne-d'Auray, Sainte-Brigitte Saint-Malo des Trois Fontaines et Taupont. Notons : 150 le 18/12 à la Ville Gleuhel / Guégon, 45 le 03/02/2003 à Kergal / Languidic, puis plus tard 70 le 04/03 à Kerassio / Languidic.

Contactée en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Dates	31/01/03	07/02/03	11/02/03	24/02/03
Effectifs	50	30	80	70

Grive mauvis, Kergollaire / Languidic (Morbihan) : janvier-février 2003

Mois	Nov.	Décembre			Janvier			Février			Mars
Décade	du 16 au 30	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	du 01 au 15
Nombre de données	6	4	2	1	0	0	1	2	2	1	2

Grive mauvis, présence dans le Morbihan : hiver 2002-2003

Grive draine *Turdus viscivorus*

(6 données)

Premier chant rapporté le 24/12/2002 à Ty Rhu / Locoal-Mendon. 2 le 19/01/2003 à Bodavel / Camors et 4 le 24/01 dans les dunes de Plouhinec (maigre indice de la remontée printanière).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

(25 données)

Repérée durant toute la période, même sur des sites intérieurs (Brandivy, Brec'h, Languidic). L'absence de donnée fin janvier ne semble pas correspondre à une disparition des oiseaux locaux due par exemple au froid, car avant et après cette période, des chanteurs sont présents sur certains sites suivis (ex : étang du Crannic / Brec'h, étang de la Forêt / Brandivy).

En mars des chanteurs se font entendre à Brec'h, Erdeven, Languidic, Locmariaquer, Locmiquélic et Locoal-Mendon. Notons 6 chanteurs le 04/03/2003 à Pen Mané / Locmiquélic et 6 le 08/03 sur la zone humide de la Falaise / Erdeven.

Mois	Nov.	Décembre			Janvier			Février			Mars
Décade	du 16 au 30	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	du 01 au 15
Nombre de données	4	0	2	2	3	0	0	1	2	1	10
Nombre de sites	4	-	2	2	2	-	-	1	2	1	7

Bou. carle de Cetti, présence dans le Morbihan : hiver 2002-2003

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

(4 données)

1 chanteur le 21/11/2002 aux lagunes de Bonnervo / Theix. 1 individu le 03/12, puis 2 le 05/12 au Petit Loc'h / Guidel.

Reprise des chants le 23/02/2003 à Kersahu / Gâvres avec 2 chanteurs, les 2 suivants le 04/03 à Pen Mané / Locmiquélic.

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

(5 données)

Une Pitchou le 22/11/2002 à l'étang des Basses Landes / Sérent, 2 le 12/01/2003 à Kerpenru / Camors, 1 le 17/01 à la tourbière de Kerfontaine / Sérent et 2 mâles le 08/03 à l'étang de Kéravéon / Erdeven.

Contactée en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

(5 données)

1 le 25/11/2002 à la Ville Gleuhiel / Guégon, 1 mâle et 1 femelle du 10/12/02 au 27/01/2003 à Rugdual / Quéven, 1 couple le 28/01 à Vannes, 2 mâles le 07/03 dans un jardin en ville à Ploermel et 1 chanteur le 15/03 en vallée du Sedon / Guégon.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

(1 donnée)

Un individu est trouvé mort dans un jardin du centre-ville de Ploemeur le 19/11/2002.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

(15 données)

Seulement 3 données avant la mi-février et sur 2 sites littoraux : 6 le 20/11/2002 et 2 le 14/01/03 à Pen Mané / Locmiquélic, 4 le 27/01 dans les dunes de Plouhinec.

Premiers chanteurs entendus au lagunage d'Auray le 25/02. Quelques regroupements lors de la remontée printanière : 8 le 07/03 dans un jardin en ville à Vannes, 10+ le 08/03 au Varquez / Erdeven et 15+ le 12/03 à la pointe er Hourél / Locmariaquer.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

(3 données)

Les premiers retours sont notés à des dates classiques : 1 le 12/03/2003 à Lann Bougeol / Inguiniel, 1 le 15/03 à Kermoran / Bubry et 1 autre le même jour au Pont-Neuf / Languidic.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

(2 donnée)

Présent en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/2002.

Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus*

(7 données)

A Languidic : 5 le 29/12/2002 et 6 le 02/01/2003 à Kergal , 5 le 18/01 à Kergolaire.

Présent en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

(4 donnée)

Ces données proviennent uniquement de Pen Mané / Locmiquélic : 6 le 20/11/2002, 14 le 29/11, 7 le 14/01/03 et 6 (dont 3 mâles) le 07/03.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

(12 données)

Date	24/12	30/12	04/01	11/01	14/02	22/02
Effectif	10	15	30	15	8	10

Mésange à longue queue, étang de la Forêt / Brandivy (Morbihan) ; hiver 2002-2003

12 le 23/12/2002 à Rugdual / Quéven, 12 le 19/01/2003 à Bodavel / Camors, 21 le 11/02

à l'étang Fleuri / Bubry, 11 le 27/02 et 9 le 05/03 à l'étang du Crànic / Brec'h.
Présente en forêt de Quénécán lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Mésange nonnette *Parus palustris*

(2 données)

4+ individus, dont 3 chanteurs, sur 800 mètres en forêt de Floranges (Ligne de Coët Quennec / Brandivy) le 24/02/2003.

Présente en forêt de Quénécán lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Mésange huppée *Parus cristatus*

(4 données)

Un couple est observé en ville le 24/12/2002 à Vannes.

Présente lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Mésange noire *Parus ater*

(0 donnée)

Mésange bleue *Parus caeruleus* (4 données), **Mésange charbonnière *Parus major*** (4 données), **Sittelle torchepot *Sitta europea*** (2 données), **Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*** (2 données)

Espèces généralement présentes lors des opérations Avifaune Forestière.

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

(3 données)

6 le 08/03/2003 au Varquez / Erdeven et 4 le 15/03 au Pont-Neuf / Languidic.

Présent en forêt de Quénécán lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/2002.




Geai des chênes

Pie bavarde *Pica pica*

(22 données)

Mis à part les rassemblements observés en campagne à Pratel Locoal / Camors, peu de regroupements sont vus par ailleurs : 5 le 10/01/2003 au Moustoir / Neulliac, 20 le 12/01 à la sablière de Kérouriec / Erdeven, 6 le 08/02 à l'étang de la Forêt / Brandivy et 10 le 08/03 à l'étang de Kéravéon / Languidic.

Présente en forêt de Quénécán lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.



Pie bavarde à Pratel Locoal/Camors (Morbihan) ; hiver 2002-2003

Choucas des tours *Corvus monedula*

(7 données)

Pas de rassemblement rapporté. 7 en vol vers l'est le 28/11/2002 au Grand Loc'h / Guidel. L'église de Baud en accueille 20 le 14/01/2003 et 10+ le 25/02. Trois sont aussi présents autour de l'église de Grand-Champ le 30/01.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

(1 donnée)

Seulement une mention : 22 Freux en vol vers l'ouest au-dessus du bourg de Saint-Gérand le 06/12/2003.

Corneille noire *Corvus corone*

(10 données)

80 le 18/12/2002 à la Ville Mainguy / La Croix-Hélléan, 45 le 25/01/2003 à Kerauffret / Camors, 150+ se rassemblant dans un bosquet en fin de journée le 02/02 toujours à Kerauffret (40 sont vues en vol prenant la direction de ce rassemblement à 1,5 km de là), 120 le 13/02 à la Ville Guimard / Cruguel et 47 le 20/02 sur la vasière de l'anse de l'Istrec.

Reproduction : transports de matériaux à Camors le 03/03 sur deux sites différents. Contactée en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

(14 données)

Plusieurs dortoirs ont été recensés :

- Des "milliers" le 18/11/2002 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon.
- 4000 à 4500 le 01/12 au marais du Bas du bourg / Ambon.
- 4000 à 5000 le 19/01/2003 au centre-ville de Vannes, 9200 le 22/02, 2100 le 01/03. 100 le 10/03 et aucun le 15/03.

En journée : 1000 sur un pré le 26/11 à Lann-er-Groëz / Guénin, 1000 le 08/12 au marais du Bas du bourg / Ambon.

Noté en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Moineau domestique *Passer domesticus*

(1 donnée)

Contacté en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

(15 données)

Quelques rassemblements :

Effectif	Date	Remarque	Lieu-dit	Commune
400	31/12/02		Saint-Patern	MESLAN
100	05/01/03	sur chaumes de maïs.	Kergornic	CAMORS
150	18/01/03		La Ville Gleuhiel	GUEGON
200	23/01/03		La Ville Allain	GUEGON
100	24/01/03		Kerauffret	CAMORS
300	24/02/03	passage en soirée durant 30 min.	Forêt de Floranges	BRANDIVY

Un premier chanteur est entendu le 07/02/2003 à la Ville Gleuhiel / Guégon.
Présent lors des recensements Avifaune Forestières.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

(6 données)

L'espèce s'est montrée discrète. En décembre, quelques individus séjournent à l'étang de Bel Air / Priziac : 5 le 10/12/2002, 2 le 16/12 et 16 le 19/12. Elle a aussi été vue à l'unité à Plumelec et Cruguel.

Noté lors du recensement Avifaune Forestière en Forêt de Quénécan le 08/12/02.

Serin cini *Serinus serinus*

(3 données)

Un premier chanteur est entendu le 19/02/2003 dans le bourg de Landévant, le second le 12/03 à la pointe er Hourél / Locmariaquer.

Indice de la remontée prénuptiale : 12 dans les dunes de Plouhinec le 04/03.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

(16 données)

Quelques beaux effectifs ont été notés cette période : 200 le 18/12/2002 à Coët Méan / Guégon, 50 le 05/01/2003 à Kergornic / Camors, 200 le 12/01 au Gouarde / Nostang, 130 le 23/01 aux Trentes Chênes / Cruguel, 50 à Kerauffret / Camors et 140 le 09/03 à Magouëro / Plouhinec.

Présent en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

(11 données)

30 le 17/11/02 à Pen er Lé / Plouharnel, 25 le 31/12 à Saint-Patern / Meslan, 35 le 22/01/03 à la Ville Gleuhiel / Guégon, 38 le 25/01 à Kerauffret / Camors et 40 le 14/02 à Pen Mané / Locmiquélic...

Contacté en forêt de Quénécan lors de l'opération Avifaune Forestière du 08/12/02.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

(14 données)

In extenso, les bandes ayant rassemblé plus de 10 individus : 15 le 07/12/2002 à l'étang de la Forêt / Brandivy, 26 le 20/12 à Kernoran / Languidic, 12 le 04/01/2003 au Grand Loc'h / Guidel, 18 le 11/02 à l'étang Fleuri / Bubry et 40 le 01/03 à Kerzec Izel / Quéven.

Des chanteurs sont entendus en fin de période à Camors : 2 le 06/03 à Kerpenru et 1 (avec 3 femelles) le 09/03 à Bodavel.

Noté lors du recensement Avifaune Forestière en Forêt de Quénécan le 08/12/01.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

(9 données)

A Bodavel / Camors, 60 dans un bosquet le 01/12/02 et 121 le 15/12.

Toujours à Camors, à Kerauffret : 150 le 24/01/03, 30 le lendemain et 30 à nouveau le 02/02. Sinon 20 à Pen Mané / Locmiquélic le 14/02 et 40 à Kergurune / Languidic le 14/03.

Beccroisé des sapins *Loxia curvirostra*

(11 données)

L'espèce a été contactée sur 10 sites différents sur les 9 communes de Baud, Brandérion, Camors (3 mentions), Inzinzac-Lochrist, La Chapelle-Neuve, Lanouée, Les Forges, Meslan et Sainte-Brigitte. Il s'agit généralement d'oiseaux vus à l'unité ou par paire (7 données), sauf une bande de 15 le 17/01/03 à la Faisanderie / Brandérion et de 3+ le 24/02 en Forêt de Floranges (ligne de Coët Quennec / Brandivy).

Noté lors du recensement Avifaune Forestière en Forêt de Quénécan et à Trémelin / Inzinzac-Lochrist le 08/12/02.

Bouvreuil pivoine *Pyrhula pyrrhula*

(14 données)

Des petits groupes (souvent 2-3 individus) sont notés sur 8 communes : Auray, Carnac, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Plumelin, Quéven, Sainte-Brigitte et Saint-Guyomard.

Noté lors du recensement Avifaune Forestière en Forêt de Quénécan et à Trémelin / Inzinzac-Lochrist le 08/12/02.

Date	16/11	25/11	24/12	09/01	06/02	08/03
Effectif	2	3	5	4	2	7

Bouvreuil pivoine à Kergollaire / Languidic (Morbihan) : hiver 2002-2003

Grosbec casse-novaux *Coccothraustes coccothraustes*

(0 donnée)

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

(12 données)

Signalé à Camors, Inguiniel, Languidic, Meslan, Sainte-Brigitte et Sérent.

10 le 17/01/2003 à la tourbière de Kerfontaine / Sérent. A Kerauffret / Camors, en bordure d'une parcelle agricole, 10 le 24/01, 20 le 25/01 et 15 le 02/02. Le 09/02, 6 à Lann Bourgeol / Inguiniel.

Noté lors du recensement Avifaune Forestière en Forêt de Quénécan le 08/12/02.

Bruant zizi *Emberiza cirlus*

(4 données)

Signalé à Camors, Erdeven, Guégon, Languidic, Ploermel et Sérent.

3 le 04/12/02 à la Ville Gleuhiel / Guégon, 8 le 15/12 et 3 le 19/01 à Bodavel / Camors, 5 le 25/01/03 à Kerauffret / Camors, 2 mâles chanteurs le 25/02 à Kergal / Languidic.

Bruant nain *Emberiza pusilla*

(1 donnée)

Un individu est présent en bordure de la zone humide de la Falaise / Erdeven le 08/03/2003.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

(18 données)

Quelques sites sont suivis à peu près régulièrement, bien que les dénombrements ne soient pas toujours exhaustifs, surtout sur les sites les plus vastes :

- la tourbière de Kerfontaine / Sérent : 8 le 21/11/2002, 10 le 05/12 et le 12/12, 12 le 17/01/2003.
- le marais de Pen Mané / Locmiquélic : 7 le 29/11, 2 le 14/01, 2 mâles le 14/02, 4 chanteurs le 07/03.
- les dunes de Plouhinec : 6 le 24/01, 11 le 27/01, 16 le 04/03.

12+ (dont 3 chanteurs) le 08/03 sur la zone humide de La Falaise / Erdeven.

Une petite bande hiverne en compagnie d'autres passereaux en bordure d'une parcelle agricole à Kerauffret / Camors : 3+ le 25/01 et 10+ le 02/02.

Contacté en forêt de Quénécan lors du recensement Avifaune Forestière le 08/12/02.

ACTIVITES DU G.O.B. MORBIHAN

SAISON 2003 DU PROGRAMME NATIONAL STOC EPS DANS LE MORBIHAN

GWENAEL DERIAN

Cette troisième saison du programme national du suivi des oiseaux communs a vu les observateurs du Morbihan se répartir sur neuf carrés dont huit avaient déjà été prospectés en 2002.

Nombre de points couverts : 2 passages sur 90 points		
passage	premier	second
dates	05/04-02/05 ; 27 jours	21/05-07/06 ; 17 jours

- les habitats

Leur représentation est peu modifiée par rapport à l'année précédente, les milieux agricoles dominent.

Habitats 2003	%
Forêts	16
Buissons	8
Prairies, marais et landes	6
Milieux agricoles	46
Milieux anthropiques	13
Milieux aquatiques	1
Rochers terrestres ou côtiers	0

- les espèces

Ce printemps est marqué par une nette hausse des contacts et du nombre d'espèces, respectivement 13% et 17,9% par comparaison avec 2002.

Passage	premier	second	total
espèces	70	74	80
contacts	1056	911	1967

place	espèce	Fréquence 2003 %
1	Pinson des arbres	81,11
2	Pouillot véloce	76,11
3	Merle noir	73,89
4	Troglodyte mignon	72,22
5	Pigeon ramier	70,00
6	Rougegorge familier	63,33
7	Corneille noire	56,67
8	Grive musicienne	47,78
9	Fauvette à tête noire	45,56
10	Mésange bleue	41,67
11	Accenteur mouchet	30,00
12	Mésange charbonnière	27,22
13	Etourneau sansonnet	26,11
14	Goéland argenté	22,78
15	Verdier d'Europe	22,22
16	Pie bavarde	21,11
17	Coucou gris	19,44
18	Grive draine	16,67
19	Tourterelle turque	15,00
20	Pic vert	14,44

place	espèces	Abondance 2003 %
1	Pigeon ramier	8,26
2	Pinson des arbres	8,23
3	Merle noir	7,05
4	Pouillot véloce	6,32
5	Troglodyte	5,95
6	Corneille noire	5,95
7	Rougegorge	4,68
8	Etourneau	4,07
9	Mésange bleue	3,67
10	Grive musicienne	3,38
11	Goéland argenté	3,26
12	Fauvette à tête	3,09
13	Martinet noir	2,80
14	Verdier d'Europe	2,05
15	Mésange	1,96
16	Accenteur mouchet	1,91
17	Hirondelle	1,65
18	Pie bavarde	1,50
19	Moineau	1,33
20	Tourterelle turque	1,21

STOC – EPS Morbihan, printemps 2003

Avant d'apporter des enseignements sur l'évolution des espèces, ces trois premières éditions du programme nous indiquent quelques variables dont dépendent nos résultats. Chaque observateur, quelque soit son expérience et la finesse de son oreille, est tributaire de la météo : une semaine de pluie retarde la date d'un passage prévu, que le mauvais temps revienne et la sortie devra être annulée sous peine de dépasser exagérément la date normale. Mais, d'autre part, si les points d'écoute sont ponctuels, fixes dans l'espace et dans le temps, ils reflètent la météo dominante de la saison. Le printemps 2003 a été largement moins pluvieux et plus chaud que le printemps 2002 (station de Lann Bihoué). Les augmentations soulignées plus haut peuvent y trouver une explication, appuyée par l'abondance relative du coucou et des martinets, espèces plus entendues ou plus présentes par beau temps.

Dix espèces ont fait leur apparition dans nos relevés en 2003 : Bondrée apivore, Busard saint-martin, Faucon hobereau, Courlis cendré, Hirondelle de fenêtre, Pipit farlouse, Fauvette pitchou, Locustelle tachetée, Tarier des prés, Bruant des roseaux. Ces espèces sont représentées par un ou deux contacts seulement et portent à 90 le nombre total d'espèces en trois campagnes.

Les participants dans le Morbihan : Patrick Bailleul, Gaëtan Cornec, Gwenael Derian, Francis Guillemot, Bernard Iliou, Marc Jamet, Yann Kerninon, Jean-Luc Lemonnier, Régis Morel, Yannick Ordureau, Jean-François Robic, François Urvoaz.

NOTES POUR LE SUIVI DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE DES PASSEREAUX SUR LA COTE MORBIHANNaise : AUTOMNE 2003

JEAN-LUC LEMONNIER

Si l'on évoque la migration postnuptiale des passereaux dans le Morbihan, c'est inmanquablement l'image de l'île Hoëdic qui s'impose. A juste titre, puisque des ornithologues de tous horizons ont eu la joie d'y observer diverses espèces rares ou occasionnelles, y compris à l'échelon national. Cependant, quelles routes ont conduit ces oiseaux jusqu'au large de nos côtes ? N'existe-t-il pas sur le littoral morbihannais un axe migratoire tel qu'il puisse être détecté, puis suivi ? On trouvera ici les raisons qui ont poussé quelques-uns d'entre nous à se livrer à un guet migratoire à l'automne 2003 et les résultats, encourageants ou décevants, de ces quelques séances.

1. Quelques arguments géographiques.

Au nord et au nord-est de notre département, plusieurs sites littoraux font ou ont fait l'objet d'un suivi de la migration diurne des passereaux : cap Gris-Nez et baie de Canche (Pas-de-Calais), baie de Somme, pointe de Carolles (Manche) et baie de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor). Si, jusqu'à Carolles, l'axe nord-est sud-ouest est clairement dessiné, il y a une inflexion nécessaire de cette route vers le sud dès la baie du Mont Saint-Michel. Mais toutes les observations de Beaufils (2002) indiquent une très large dispersion du flux migratoire sitôt en aval de la pointe de Carolles. Une fois sur le rivage breton de cette baie, aucun point de comptage n'est aussi significatif que le verrou de Carolles. A ces entrées orientales dans notre région, s'ajoutent les oiseaux issus directement des îles Britanniques ou Anglo-normandes. Le front d'entrée est donc très large et les directions suivies semblent beaucoup varier également. Jouant le rôle de butées, l'île d'Ouessant et la baie d'Audierne.

Dans ces conditions, qu'en est-il du flux émergent ? Le Golfe de Gascogne peut ne pas rebuter tous les oiseaux, mais ici comme partout ailleurs, les conditions météorologiques doivent présider au choix de la route suivie. Et les milliers de migrants observés à la pointe de l'Aiguillon (Vendée) ont eux préféré une option au moins partiellement côtière. On peut imaginer que cette option soit suivie avant même la sortie des terres bretonnes, et si tel est le cas, doit pouvoir être détectée sur le littoral morbihannais, même si tout le long de ce trait de côte, certains oiseaux quittent cet itinéraire pour une route maritime, encouragés en cela par le chapelet des îles jalonnant la côte atlantique.

2. Les résultats de l'automne 2003

Afin de vérifier cette hypothèse, plusieurs observateurs décidèrent de séances d'observation sur la presqu'île de Quiberon, barrière naturelle en travers de cette possible route côtière. Ces premiers essais sont bien loin de couvrir toute la migration

postnuptiale, puisque n'ayant démarré qu'en octobre 2003. Comme il ne s'agissait ici que de simples sondages, certains s'essayèrent à des sites proches mais significativement distincts de la presqu'île : on le verra, ce fut une heureuse initiative.

Liste des sites ayant fait l'objet d'au moins une séance de guet :

- Kerhostin / Saint-Pierre Quiberon
- Ferme marine des Sables blancs / Plouharnel
- Hameau de Sainte-Barbe / Plouharnel
- Kerminihy / Erdeven

On pourra s'étonner de l'absence de la pointe du Conguel / Quiberon au sein de cette liste. A cela, deux raisons : cette pointe est particulièrement éloignée du domicile des observateurs, cette situation extrême l'écartant de l'hypothèse strictement côtière que nous souhaitions vérifier.

Les tableaux sont présentés par ordre chronologique et relatent l'ensemble des résultats de l'automne 2003, mais les données ou ensemble de données paraissant les plus significatifs sont en caractères gras.

3. Quelques commentaires

Si d'intéressantes pistes ont été découvertes ou corroborées, bien des questions restent en suspens dont bien sûr celle de la réelle possibilité de suivre le mouvement postnuptial sur notre côte. Et l'émergence tardive de l'idée de ce suivi a empêché de détecter convenablement les espèces au passage précoce, tels certains motacillidés et les hirondelles. Mais les essais de la première décade d'octobre ont tout de même permis de récolter des données tardives d'Hirondelle rustique et de fenêtré. Malgré tout, à plusieurs reprises cet automne et malgré l'inexpérience des différents observateurs pour ce genre de guet, d'importants flux ont pu être constatés.

Ces passages concernent principalement :

- des fringilles dont majorité de Pinsons des arbres,
- en vol vers le secteur est à sud est,
- lors d'épisodes anticycloniques à vent nul ou modéré de secteur est.

Les environs d'Etel ont constitué le secteur le plus favorable pour détecter ce passage. Le hameau de Sainte-Barbe doit pouvoir offrir un vaste point de vue, mais ce potentiel reste à vérifier. La presqu'île de Quiberon se révèle comparativement et pour l'instant décevante.

Toutefois, le secteur semble manquer d'un quelconque relief permettant un étranglement, une concentration du flux. Peut-être, trouvera-t-on une géographie adéquate plus à l'est de notre département, à l'approche de la baie de Vilaine par exemple. En effet, comment évaluer l'importance d'un flux si on ne sait sur combien de kilomètres s'étend son front ?

Les possibilités de guet postnuptial sont réelles sur notre côte et – espérons le – encourageront de plus nombreux observateurs l'automne prochain. Il conviendra d'explorer encore d'autres hypothèses que celles vérifiées en 2003 : nouveaux essais en presqu'île de Quiberon, à Sainte-Barbe, au franchissement de la ria d'Etel (Vieux Passage ou Magouër / Plouhinec) et aussi Damgan, Pénestin. Rappelons que le site de

Carolles offre régulièrement des matinées en octobre et novembre permettant le dénombrement de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'oiseaux. Beaufils estime de 200 000 à 500 000 le seul passage des Pinsons des arbres sur le site manchot. Il sera sans doute difficile d'obtenir dans le Morbihan des effectifs de cette importance, mais les estimations d'Etel à 100 oiseaux / minute sont prometteuses et permettent déjà d'entrevoir des différences significatives avec Carolles dans la répartition spécifique : à titre d'exemple, les Pigeons ramiers ne fournissent sur la pointe normande qu'au plus 500 migrateurs par saison, ce qui semble très au-dessous des centaines comptées... en dix minutes !

Un grand merci à tous les observateurs de l'automne dernier : ils ont su persévérer sur leur point de guet malgré une météo parfois difficile, et surtout malgré une absence notoire d'oiseaux ; c'est pourquoi je citerai en tête A. Le Doze, B. Le Port, auxquels il faut adjoindre Y. Keminon, F. Lemonnier, M. et Gw. Derian.

BIBLIOGRAPHIE :

BEAUFILS, M. (2002) - Suivi de la migration postnuptiale des passereaux à Carolles (1985 - 1997). *Le Cormoran*, 12 : 217 - 241.

Comptages effectués lors du suivi migratoire des passereaux, Morbihan, 2003

Date :10/10/03	Heure :15:00	Durée :30 min	Observateur :Lemonnier JL
Site :Ferme marine / Plouharnel		Conditions :couvert, sans vent.	
espèce	nb	en vol vers	
Pigeon ramier	quelques	S	
Hirondelle rustique	1	S	

Date :11/10/03	Heure :09:45	Durée :1 h	Observateur : Lemonnier JL
Site :Ferme marine / Plouharnel		Conditions :soleil, sans vent.	
espèce	nb	en vol vers	
Hirondelles de fenêtre	2	?	en altitude
passereaux dont majorité de Fringilles (verdier notamment)	244	ESE	approximativement vers la pointe Saint-Colomban / Carnac.

Date :22/10/03	Heure :09:30	Durée :1 h 10	Observateur :Lemonnier JL
Site :Kerhostin / Plouharnel		Conditions :orage, vent d'ouest violent	
espèce	nb	en vol vers	
Pigeons ramiers	175	N	dont 100 ensemble dès 9:30
Pipits farlouses	10n	au sol	
Bergeronnette des ruisseaux ou printanière	1	N	
Rougequeue noir	1	au sol	
Etourneaux sansonnets	167	S	vols de qqes dizaines
Fringilles sp.	50	S	
Serins cinis	3	au sol	

Date :26/10/03	Heure :08:30	Durée :02:00	Observateurs :Le Doze A Le Port B
Site :Kerhostin / Plouharnel		Conditions :soleil voilé, sans vent	
espèce	nb	en vol vers	
Martin pêcheur d'Europe	1	au sol	
Fauvette pitchou	2	au sol	

Date :26/10/03	Heure :08:30	Durée :02:00	Observateurs :Lemonnier JL Kerninon Y Derian Gw
Site :Ferme marine / Plouharnel		Conditions :soleil voilé, sans vent	
espèce	nb	en vol vers	
Paridés (Mésange bleue surtout) et Roitelets des deux espèces dans les baccaris, ces oiseaux progressant par vols très courts d'un buisson à l'autre	10n	N	mouvement difficilement détecté, mais remarqué plusieurs fois durant les deux heures
Turdidés sp. (Gr. Mauvis probables)	120	SE	en un vol dès 08:30
Emberizidés	6	au sol	1 Br. Jaune, 2 Br. Zizis, 3 Br. des roseaux
Fringilles sp. (Chardonnerets, Serins cinis, Bouvreuils pivouines, Pinsons des arbres)	10n	au sol	ou petits vols dispersés

Date :28/10/03	Heure :08:30	Durée :01:00	Observateur :Kerninon Y
Site :Kerminihy / Erdeven	Conditions :brouillard, léger vent de NE		
espèce	nb	en vol vers	
Alouette des champs	13	NW	
	28	SE	
Pipit farlouse	5	NW	
	15	SE	
Bergeronnette grise	8	SE	
Grive litorne	1	E	
Grive musicienne	5	E	
Pinson des arbres	1	NW	
	34	SE	
Verdier d'Europe	15	SE	
Linotte mélodieuse	2	NW	
Fringille sp.	8	E et SE	
Bruant jaune	2	E	

Date :22/10/03	Heure :09:30	Durée :1 h 10	Observateur :Lemonnier JL
Site :Kerhostin / Plouharnel	Conditions :orage, vent d'ouest violent		
espèce	nb	en vol vers	
Pigeons ramiers	175	N	dont 100 ensemble dès 9:30
Pipits farlouses	10n	au sol	
Bergeronnette des ruisseaux printanière	1	N	
Rougequeue noir	1	au sol	
Etourneaux sansonnets	167	S	vols de qqes dizaines
Fringilles sp.	50	S	
Serins cins	3	au sol	

Date :26/10/03	Heure :08:30	Durée :02:00	Observateurs :Le Doze A Le Port B
Site :Kerhostin / Plouharnel	Conditions :soleil voilé, sans vent		
espèce	nb	en vol vers	
Martin pêcheur d'Europe	1	au sol	
Fauvette pitchou	2	au sol	

Date :26/10/03	Heure :08:30	Durée :02:00	Observateurs :Lemonnier JL Kerninon Y Derian Gw
Site :Ferme marine / Plouharnel	Conditions :soleil voilé, sans vent		
espèce	nb	en vol vers	
Paridés (Mésange bleue surtout) et Roitelets des deux espèces dans les baccaris, ces oiseaux progressant par vols très courts d'un buisson à l'autre	10n	N	mouvement difficilement détecté, mais remarqué plusieurs fois durant les deux heures
Turdidés sp. (Gr. Mauvis probables)	120	SE	en un vol dès 08:30
Emberizidés	6	au sol	1 Br. Jaune, 2 Br. Zizis, 3 Br. des roseaux
Fringilles sp. (Chardonnerets, Serins cins, Bouvreuils pivoines, Pinsons des arbres)	10n	au sol	ou petits vols dispersés

Date :28/10/03	Heure :08:30	Durée :01:00	Observateur :Kerninon Y
Site :Kerminihy / Erdeven		Conditions :brouillard, léger vent de NE	
Alouette des champs	13	NW	
	28	SE	
Pipit farlouse	5	NW	
	15	SE	
Bergeronnette grise	8	SE	
Grive litorne	1	E	
Grive musicienne	5	E	
Pinson des arbres	1	NW	
	34	SE	
Verdier d'Europe	15	SE	
Linotte mélodieuse	2	NW	
Fringille sp.	8	E et SE	
Bruant jaune	2	E	

Date :29/10/03	Heure :08:00	Durée :01:00	Observateurs :Lemonnier JL, F Derian Gw, M
Site :Ferme marine / Plouharnel		Conditions :pluie, fort vent de SW	
Grives mauvis		20	N

Date :01/11/03	Heure :08:15	Durée :02:00	Observateur :Kerninon Y
Site :Kerminihy / Erdeven		Conditions :temps calme	
direction		altitude en vol vers	
Alouette lulu	4	NW	soit environ 2500 passereaux en deux heures dont 75% de Pinsons des arbres
Alouette des champs	86		
Pipit farlouse	40		
Bergeronnette grise	8		
Mésange à longue queue	22		
Mésange bleue	5		
Mésange charbonnière	2		
Etourneau sansonnet	229		
Pinson des arbres	1701		
Pinson du nord	5		
Bouvreuil pivoine	2		
Verdier d'Europe	30		
Chardonneret élégant	37		
Linotte mélodieuse	84		
Bruant jaune	5		
Passereaux non identifiés	200 +		

Date :04/11/03	Heure :08:15	Durée :02:00	Observateur :Kerninon Y
Site :Kerminihy / Erdeven		Conditions :calme, nuages bas	
	nb	en vol	vers
Faucon pèlerin	1	au sol	
Alouette lulu	1	ESE	Ces comptages concernent la dune de Kerminihy. En quittant son poste d'observation, YK a pu constater un "mouvement presque continu de passereaux" à 1 - 2 km plus au nord de sa position initiale.
Alouette des champs	25		
Pipit farlouse	50		
Bergeronnette grise	4		
Etourneau sansonnet	148		
Pinson des arbres	337		
Pinson du nord	3		
Verdier d'Europe	23		
Linotte mélodieuse	9	ESE	 en 30 minutes, au-dessus du bourgd'Etel
Etourneau sansonnet	800		
Pigeon ramier	200		

Date :07/11/03	Heure :08:15	Durée :02:00	Observateur :Kerninon Y
Site :Kerminihy / Erdeven		Conditions :calme	
	nb	en vol	vers
Bécasse des bois	1	au sol	
Pigeon colombin	2	ESE	soit environ 1274 passereaux en deux heures dont 49% d'Etourneaux sansonnets et 26% de Pinsons des arbres. Ces comptages concernent la dune de Kerminihy. A l'issue du comptage, YK constate un passage au nord de son poste d'observation, soit au-dessus du bourg d'Etel.
Alouette lulu	1		
Alouette des champs	182		
Pipit farlouse	34		
Bergeronnette grise	2		
Etourneau sansonnet	628		
Pinson des arbres	327		
Pinson du nord	5		
Verdier d'Europe	15		
Chardonneret élégant	8		
Tarin des aulnes	12		
Linotte mélodieuse	58	ESE	 en 5 min. en 5 min.
Passereaux sp.	630		
Passereaux sp.	420		

Extrapolés aux deux heures durant lesquelles un passage était enregistré au-dessus de la dune, ces deux comptages ponctuels fournissent un total de 10000 à 15000 oiseaux de passage cette matinée.

Date :08/11/03	Heure :08:10	Durée :01:00	Observateurs :Derian Gw
Site :Kerminihy / Erdeven		Conditions :beau temps, vent faible SE	
espèce	nb	en vol	au sol
Pigeon colombin	3	E	en plus de ce mouvement vers l'est, seuls 43 oiseaux ont été vus en vol vers le nord ou l'ouest
Pigeon ramier	14		
Alouette des champs	1		
Bergeronnette grise	3		
Etourneau sansonnet	792		
Fringille sp.	658		
Bruant jaune	3		

L'observateur a de plus noté l'importance des différentes bandes.

Pour les fringilles, leur répartition était :

114 (17 %) par bandes de 1 à 10 individus,

434 (66%) par bandes de 11 à 50 individus,

110 (17%) en une bande.

Pour les étourneaux, leur répartition était :

42 (5 %) par bandes de 1 à 10 individus,

250 (32%) par bandes de 11 à 50 individus,

et trois bandes de 70, 130 et 300 individus (63%).

Date :08/11/03	Heure :10:00	Durée :1 h 30	Observateurs :Lemonnier JL Derian Gw
Site :Sainte-Barbe / Plouharnel		Conditions :beau temps, vent faible SE	
espèce	nb	en vol	au sol
Milan royal	1	E	
Faucon émerillon	1	au sol	
Turdidés sp. (surtout Gr. Mauvis)	10n	E	au sol : abondance de Merles noirs et Grives Musciennes et mauvis.
Etourneau sansonnet	10n		très nombreux au sol
Fringilles sp.			bandes de qqes unités

OBSERVATION D'UN BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* A ERDEVEN,
LE 08 MARS 2003

YANN KERNINON

Le samedi 08 mars 2003, à la recherche de migrateurs précoces sur le massif dunaire d'Erdeven, je rejoins la zone humide occupant l'ancienne carrière entre Kérouriec et Kerminihy. En arrivant sur le site, mon attention est attirée par un passereau qui décolle du fond d'un fossé et se pose sur un buisson de ronce. Je lève les jumelles et je suis intrigué par son allure générale. L'oiseau n'ayant pas l'air trop effarouché, j'installe tranquillement la longue-vue pour le détailler. Notamment grâce à la forme de son bec, je comprends que j'ai peut-être devant les yeux un bruant que je ne m'imaginais pas rencontrer : un Bruant nain *Emberiza pusilla* adulte. Près de 15 minutes d'observation entre 8 et 15 mètres environ me permettront de noter les détails confirmant son identification spécifique et écartant la possibilité d'une autre espèce.

Ce bruant se laissera d'abord observer durant une première phase de 5 minutes pendant laquelle il se tient essentiellement au sommet du buisson de ronce, bien en évidence et en se tenant face à moi ou de trois-quarts face. A la fin de cette première période, il s'envole pour se diriger vers un saule à 4-5 mètres de là où je le perds en voulant réorienter la longue-vue. Après quelques instants, je m'éloigne d'une quinzaine de mètres pour observer une petite bande de Bruants des roseaux présents dans les phragmites ou perchés dans les saules, il y a là 2-3 femelles et 5-6 mâles dont 3 chanteurs. Les Bouscarles de Cetti et les Râles d'eau se font entendre.

Je retourne ensuite à mon premier poste d'observation et, à nouveau, je trouve le Bruant nain qui décolle du fond du fossé et va se percher sur le buisson de ronce. Pendant près de 10 minutes, je peux l'observer, mais, cette fois, il se montre plus craintif, se faufilant souvent dans le buisson où il m'échappe de courts instants. Comme lors de la première partie de l'observation, il finit par s'envoler pour rejoindre le même saule que précédemment et, une nouvelle fois, il disparaît de ma vue. Espérant le retrouver un peu plus tard, je décide de continuer ma ballade en parcourant près de 200 mètres le long du marais. Assez loin de la première bande, je retrouve quelques Bruants des roseaux (2 femelles et 3 mâles).

En revenant à mon point de départ, je repère le Bruant nain sur son buisson, mais en voulant rejoindre mon premier poste d'observation, je le perds définitivement. De retour à la voiture, le Guide Ornitho confortera mon identification *a priori* de cette espèce dont je n'avais jamais vue que des photos ou des illustrations.

D'occurrence annuelle en France, notamment sur Ouessant, les apparitions de ce bruant ont surtout lieu en septembre-octobre. En dehors de cette période, il se fait plus occasionnel encore, mais depuis quelques années, les mentions hivernales ou printanières deviennent régulières montrant un hivernage disséminé à travers le pays (Finistère, Camargue, Corse...). Difficile d'affirmer un tel cas pour cet oiseau vu ce 08 mars. Sans doute accompagnait-il les Bruants des roseaux présents ce jour-là.

Eléments d'identification :

Plus petit et d'allure plus « élégante » qu'un Bruant des roseaux.

Bec gris et pointu avec la mandibule inférieure plus forte que la supérieure*, lui donnant un air "prognathe".

Calotte un peu hérissée lorsque l'oiseau se tient à découvert.

Œil sombre et cercle oculaire très clair nettement marqué.

Face et raie de la tête brun roussâtre avec arrière de la joue plus clair et sous-moustache pâle. Joue bordée de noir.

Parties supérieures brunes rayées de noir.

Dessous blanc finement strié de noir, notamment sur le haut et les côtés de la poitrine.

2 barres alaires blanchâtres, une aux petites couvertures et la seconde bien visible aux couvertures moyennes.

Rectrices externes blanches.

Pattes couleur chair*.

Quelques cris secs à l'envol.

* L'oiseau devait se nourrir au sol à mon arrivée, la pointe du bec et les doigts sont d'abord apparus sales, et il se nettoiera d'ailleurs le bec contre une tige dans le premier temps de l'observation.

Quelques mentions hivernales et printanières en Bretagne

1988 : 1 adulte les 2-3 janvier à Plouezoc'h / Finistère .

1993 : 1 le 12 avril à Hoëdic / Morbihan.

1998 : 5 du 26 avril au 3 mai à Brasparts / Finistère, des chanteurs sont notés à cette occasion.

1999 : 1 à Cléden-Cap-Sizun dans une bande de Bruants des roseaux, du 16 janvier au 14 février.

Bibliographie

Comité d'Homologation Nationale.- Rapports annuels 1994-2000. Ornithos.

Groupe Ornithologique Breton.- Synthèses des observations ornithologiques (1986-1999). Ar Vran.


Mullarney (K.), Svensson (L.), Zetterström (D.) & Grant (P.J.) 1999.- Le guide Ornitho. Delachaux et Niestlé. 384 p.

OBSERVATION D'UNE MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus* LEUCIQUE EN RADE DE LORIENT.

JEAN-LUC LEMONNIER

Par cette froide après-midi du 06 décembre 2003, nous décidons (J.-L. Lemonnier et Gw. Derian) d'achever nos observations en Petite Mer de Gâvres par une visite à l'embouchure du Riant en Riantec. Dans son extrémité aval, ce cours d'eau serpente entre deux quartiers de l'agglomération. Malgré l'aménagement d'une digue-pont et d'un petit bassin d'agrément, l'eau saumâtre peut remonter le cours sur plusieurs centaines de mètres, élargissant le lit en petites vasières bordées de minces phragmites. Bien qu'il soit longé sur ses deux rives de chemins piétonniers et de rues que rien ne dissimule, le ruisseau accueille régulièrement plusieurs espèces d'oiseaux : foulques, laridés, quelques limicoles et, bien connues des riverains, les spatules hivernantes de la rade de Lorient trouvent parfois ici la tranquillité que n'a pu leur offrir la Z.P.S. toute proche.

En dénombrant les Goélands cendrés *Larus canus* dans un groupe de laridés, Gwenael Derian remarque immédiatement un laridé à dos blanc. Comme tous ceux de cette bande, cet oiseau est au repos, se protégeant du vent et de la pluie en abritant régulièrement sa tête sous l'aile. Mais la silhouette qu'il nous révèle est celle d'une Mouette rieuse *Larus ridibundus*, de taille sensiblement inférieure à ses congénères toutes proches. Les tarsi, notamment sont visiblement plus courts, mais tout le squelette de cet oiseau doit présenter cette anomalie de croissance, puisque les proportions d'une Mouette rieuse sont conservées. Bec et pattes ne présentent pas la couleur habituelle : ces parties sont plus claires et plus orangées qu'à l'ordinaire. L'œil est sombre et tranche sur la tête entièrement blanche. Toutes les autres parties du plumage visible (nous n'avons pu voir les ailes déployées) sont de ce même blanc immaculé à l'exception des rémiges primaires : la projection de celles-ci hors des tertiaires est noire avec la pointe à peine marquée de blanc (cette pointe n'étant franchement visible que sur la troisième primaire) – voir photo suivante.



L'anomalie de plumage n'est pas rare, mais il nous semble intéressant de souligner qu'elle s'accompagne ici d'une anomalie squelettique telle qu'elle puisse être révélée par la simple observation à distance. Il semble peu probable que le leucisme de cette mouette ait pu induire une difficulté à accéder aux ressources alimentaires et donc un problème de croissance, quelque chose comme l'histoire du "vilain petit canard". A l'opposé, le cas de cet oiseau semble relever d'un accident génétique ayant induit divers problèmes de développement dont le plus visible serait la mauvaise répartition ou le dysfonctionnement des cellules productrices de mélanines. Enfin, cette Mouette rieuse n'appartient pas au groupe des oiseaux schizochromes c'est-à-dire ne pouvant synthétiser que l'eumélanine (responsable des gris - noir) ou la phéomélanine (responsable des gris - brun). De tels oiseaux sont alors décrits comme présentant la tête blanche avec un manteau normal ou à l'inverse, le manteau blanc avec une pigmentation normale de la tête.

Les aberrations de plumage sont l'un des sujets de prédilection de Fred Malher, et on lira avec intérêt ses vulgarisations disponibles sur les archives de la liste de discussion "Ornithologie" sur Internet et sur son site personnel : <http://ourworld.compuserve.com/homepages/fredmahler>.

LE CHOUCAS DES BOIS

JEAN-LUC BLANCHARD

Il était une fois ... Les contes commencent toujours ainsi. L'histoire de notre choucas perdu au pays de Languidic pourrait en être un. Elle débute le 17 novembre 2001. Dans les haies en bordure du village de Kerhan (sud de Languidic), un choucas lance des cris en volant de branches en branches, comme s'il était perdu. A-t-il été oublié par ses congénères ? Est-ce un jeune étourdi du dernier printemps ?

Une semaine plus tard, son manège n'a pas cessé et il semble toujours seul. Début décembre, les cris se sont atténués et le choucas a pris contact avec un groupe de cinq pies, mais se fait pourchasser dès qu'il s'en approche un peu trop. Ce manège continuera une bonne partie de l'hiver.

Le 15 mars 2002, (toujours à Kerhan), trois pies jacassent dans un chêne. Elles sont accompagnées du Choucas et semblent accepter sa présence.

Début avril, trois oiseaux sont à la recherche de victuailles au bord d'un champ : deux pies et le Choucas qui finalement a trouvé de nouveaux compagnons. En fait les deux pies construisent leur nid accompagnées dans tous leurs va-et-vient par le Choucas. Les aide-t-il ? Porte-t-il la lanterne ?.... Je n'ai pas trouvé la réponse. Fin avril, le Choucas accompagne toujours les deux pies quand elles viennent se nourrir au sol, puis peu à peu avec une seule pie, l'autre s'occupant de sa future progéniture. Mi-mai, les pies nourrissent les jeunes et le Choucas ne voudrait pas être en reste : il semble quémander de la nourriture. Que ce soit au sol ou dans l'arbre à proximité du nid, le Choucas se rapproche des pies le bec en avant pour avoir droit à la pitance.

Le 7 juin 2002 au village de Kergollaire (situé à un kilomètre de Kerhan) un Choucas est pourchassé par quatre pies... bizarre... encore un Choucas qui recherche la compagnie des pies ! Sans doute le même, car à Kerhan le Choucas n'a pas reparu. Les jeux aériens avec les pies, de Kergollaire cette fois, vont recommencer de plus belle, sans oublier les gagnages en commun au sol dans la prairie.

Début juillet, ce sont deux autres oiseaux intéressants qui viennent se nourrir au sol sur la même parcelle et pendant une semaine : deux Huppes fasciées.

Le 31 octobre 2002, deux autres Choucas en passage à Kergollaire. Malgré leurs cris «notre Choucas» se contente de répondre et reste avec ses copines les pies. Le 4 novembre, nouvelle séquence presque identique: douze choucas vont tourner et crier pendant quinze minutes au dessus de Kergollaire. Les cris de « notre choucas » provoquent sans doute ce comportement, mais il n'a, semble-t-il, plus du tout envie de rejoindre ses frères... rien ne l'en empêchait pourquoi reste t-il ? Fin novembre, le Choucas a disparumes recherches restent infructueuses.

Notre histoire n'allait pas s'arrêter ainsi. Je m'apprêtais à tourner la page quand le cinq décembre, je découvre le Choucas blotti contre la haie en bordure des bâtiments de la ferme. Sans trop de difficultés, je l'ai attrapé. Affamé et tout maigreux, il est blessé à l'aile droite avec les plumes collées par le sang desséché. Est-ce une conséquence des bagarres fréquentes avec les corneilles ?

Afin de m'en occuper je l'emmène chez moi (j'habite à 6 kilomètres de mon lieu de travail) pour le mettre dans une pseudo volière (un enclos grillagé de 2 m de hauteur).

Après quelques soins apportés à son aile (ce n'est pas la première fois que je m'occupe d'un oiseau blessé) je lui présente de la nourriture (restes de purée et morceaux de viande). Ce mélange lui convient parfaitement, peut-être parce qu'il est affamé.

Au bout de trois jours, alors que je lui apportais à manger comme chaque midi ... le Choucas a disparu. Il s'est échappé par dessus le grillage profitant sans doute des quelques branches de châtaigner qui descendent assez bas dans l'enclos. J'essaye d'imiter son cri pour l'attirerquel plaisir de l'entendre répondre quelques mètres au dessus de ma tête, posté sur une branche du châtaigner. Il a sans doute récupéré une partie de son énergie, mais son aile droite pend sur le côté.

A partir du dix décembre, il se nourrit seul sur le tas de compost où nous mettons les déchets de cuisine ; ma visite journalière ne le surprend pas et il s'écarte de quelques mètres avant de se percher sur les branches de *forsytia* à 1,50 m du sol. Ce sera le même cérémonial tous les midis jusqu'au 19 décembre. Au cours de ces deux semaines, j'ai découvert que le Choucas apprécie les châtaignes. De le voir les consommer me rappelle plutôt la façon de procéder du perroquet : il saisit la châtaigne au sol entre les griffes d'une patte, se perche puis replie la patte rapprochant sa prise de son bec et commence à la décortiquer. Le 19 décembre, le Choucas a de nouveau disparu. La forme revenue, il vole de mieux en mieux malgré son aile droite retombant sur le côté et une plume manquante Peut-être a-t-il suivi un groupe de passage ? Le 20 décembre, un Choucas crie à nouveau au village de Kergollaire, caché au sommet de grands pins maritimes. Mes appels restent sans succès et je ne peux le voir. Cela fait maintenant quatre jours que je n'ai pas revu le Choucas et il y a toujours de temps à autre quelques cris qui proviennent des pins

La surprise n'allait pas tarder ! Le 24 décembre, 8h15mn : il fait encore nuit ; un Choucas perché dans un chêne à quelques mètres des bâtiments pousse des cris au moment où je passe. Je m'approche de l'arbre : à 2 mètres de moi « notre Choucas » à l'aile droite pendante ... il a retrouvé le chemin de Kergollaire deux semaines après l'avoir emmené chez moi (à 6 km, enfermé dans un carton). Je viens de comprendre pourquoi il a disparu de Brandérion. Mais pourquoi s'est-il perché dans l'arbre devant les bâtiments pour crier au moment où je passais ?.... mystère comme pour se présenter et dire qu'il était bien arrivé à Kergollaire ? Pur hasard ou avait-il repéré les zones de passage des personnes ? De toute évidence, il a retrouvé la forme.

Après ce conte de Noël, les fêtes de fin d'année se préparaient également chez les pies. Elles sont de plus en plus nombreuses (19 le 31 décembre) volant de branches en branches, jacassant à qui mieux mieux ... faisant comme la fête au Choucas revenu. C'est la première année que j'observe autant de pies pendant tout l'hiver. Au printemps 2003, le Choucas passe toujours ses journées avec les pies, au sol dans les prairies ou en vol avec courses poursuites et jeux aériens. Le 29 mars, les pies ont formé les couples et le Choucas reste cette fois au village avec un couple. Au mois de septembre s'opère un rassemblement inhabituel de corneilles (une centaine). Elles passent leurs journées dans les prairies entre les villages de Kergollaire et de Kerhan (distants de 1 km). Surprise, un Choucas passe quelques journées en leur compagnie ... un Choucas à l' aile droite blessée. Très vite il retrouvera ses copines les pies.

En novembre, par deux fois le passage de 2-3 Choucas générera de nombreux cris mais « notre Choucas » est toujours là et en décembre un groupe de 11 pies se forme provoquant beaucoup de cris et de jacassements...

Cette année les fêtes de fin d'année se sont déroulées très tranquillement à Kergollaire. Ecoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Il était une fois

Documents

Comptages des oiseaux d'eau, janvier 2003, résultats pour le Morbihan
Source : Wetlands International

	Total	étang au duc	littoral Guidel Ploemeur et Loc'h	Golfe du Morbihan	Baie de Vilaine	Baie de Quiberon	rade de Lorient	rivière d'Étel	presqu'île de Rhuys	autres sites
Plongeon indéterminé	1				1					
Plongeon catmarin	2			1					1	
Plongeon arctique	1								1	
Plongeon imbrin	2						1			1
Grèbe castagneux	426		3	191	19	35	52	99	21	6
Grèbe huppé	741	58	14	394	120	17	27	18	85	8
Grèbe jougris	1				1					
Grèbe esclavon	6					3			3	
Grèbe à cou noir	1709			1456	47	55	11	66	73	1
Grand Cormoran	1266	98	134	470	33		265	237		29
Cormoran huppé	3		3							
Butor étoilé	1		1							
Aigrette garzette	476			193	103	104	61		12	3
Grande Aigrette	1									1
Héron cendré	77	2	5		26	9		28		7
Ibis sacré	179				131	22	26			
Spatule blanche	35			30		5				
Cygne tuberculé	32			2	6	12	7	5		
Cygne noir	2			2						
Oie cendrée	13		12					1		
Bernache nonnette	2			2						
Bernache cravant	9969			6394	711	1117	1472	218	57	
Tadorne de Belon	5171			3512	846	253	289	271		
Canard siffleur	1698	12	55	1211	78	4	50	288		
Canard chipeau	20		3				17			
Sarcelle d'hiver	1313		141	1050	32	49			41	
Canard colvert	4619	192	170	2677	488	199	299	22	95	477
Canard pilet	1937			1105	828	4				
Canard souchet	929		15	399	511		2		2	
Fuligule milouin	449			366	3		59	19		2

	Total	étang au duc	littoral Guidel Ploemeur et Loc'h	Golfe du Morbihan	Baie de Vilaine	Baie de Quiberon	rade de Lorient	rivière d'Etel	presqu'île de Rhuys	autres sites
Fuligule morillon	253	16		24	111		90	12		
Fuligule milouinan	967				967					
Eider à duvet	18				8	9				1
Macreuse noire	55				1	54				
Garrot à oeil d'or	581			574		2		5		
Harle huppé	1948		1	1753	53	21	4	11	105	
Busard des roseaux	5		2		1		2			
Gallinule poule-d'eau	4				1		3			
Foulque macroule	8694	185	159	5553	143	34	1617	757	490	56
Huîtrier pie	1953		10	75	887	791	92	12	86	
Avocette élégante	2566			930	1631		5			
Grand Gravelot	2377		89	483	878	426	378	21	102	
Pluvier doré	959		325	4	1	230	399			
Pluvier argenté	3495		2	2345	93	226	677	147	5	
Vanneau huppé	6214		576	3035	1128	380	175	720		200
Bécasseau maubèche	420			255	27	128	10			
Bécasseau sanderling	1620		266		84	1076	170		24	
Bécasseau minute	4			4						
Bécasseau violet	28		28							
Bécasseau variable	42153		254	21360	8255	2973	6626	2395	290	
Combattant varié	5		5							
Bécassine des marais	193		15		26	17	62	18		55
Barge à queue noire	1135			1135						
Barge rousse	384			102	65	170	47			
Courlis corlieu	1						1			
Courlis cendré	1254		18	375	596	109	35	121		
Chevalier arlequin	24			24						
Chevalier gambette	649		6	250	162	104	56	68	3	
Chevalier aboyeur	23			13	3		1	2	4	
Chevalier culblanc	1					1				
Chevalier guignette	8			3	1	2	1	1		
Tournepipe à collier	1056		119	19	345	360	64		149	
Mouette pygmée	4				4					
Mouette rieuse	9297	9000			297					
Goéland cendré	166		13		106		47			
Goéland brun	652	644			8					
Goéland argenté	775				775					
Goéland marin	12				12					
Sterne caugek	25		15		2				8	
Pingouin torda	1					1				

