

AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

**Ti ar Vro B.P. 103
29833 CARHAIX**



**Courriel :
gob@gob.fr**

N°27 ANNEE 2004

Sommaire du numéro 27 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 mars 2003 à 15 novembre 2003	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 16
Groupe 3 de l'Huitrier pie au Tournepierre à collier	page 20
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 28
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 36
 Activités du G.O.B. Morbihan	
Saison 2004 du programme national STOC EPS dans le Morbihan	page 55
 Notes de terrain	
Deux observations d'une Sterne élégante <i>Sterna elegans</i> à Locmiquelic (Morbihan)	page 59

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE :

16 MARS 2003 A 15 NOVEMBRE 2003

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
 Artel Jean-Pierre ; Bailleul Patrick ; Blanchon Thomas ; Blanchon Yoann ; Blond
 Cyrille ; Bozec René ; Christophe Guenolé ; Corlou Pierre ; Crochet Erwan ; Derian
 Gwenaël ; Derian Muriel ; Dufour Sylvain ; Ermel Gérard ; Gaillard Elizabeth ; Gautier
 Sébastien ; Gélinaud Guillaume ; Gérard Sourget ; Guillemot Francis ; Guillevic Yvon ;
 Hamet Loïc ; Iliou Bernard ; Joannès Gérard ; Kergoat Laurent ; Kerninon Yann ;
 Lamour Joël ; Le Corre Gilles ; Le Doze Anthony ; Le Duc Jean-Patrick ; Le Huitouze
 Serge ; Le Turnu Brigitte ; Lemonnier Fanchon ; Lemonnier Jean-Luc ; Loiseau Jean-
 Paul ; LPO Loire-Atlantique ; Mahéo Roger ; Maillart Willy ; Maout Jacques ; Marie-
 Paule Le Gall ; Michelle Le Corre ; Morin Hervé ; Nédellec Sébastien ; Orain
 Catherine ; Philippon Patrick ; Teigner Laurent ; Urien Xavier ; Urvoaz François ; Vinot
 Alexandre... sauf erreur ou omission !

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton
 (Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre
 au 15 mars.

Un fichier de saisie rapide peut être demandé auprès du coordonnateur morbihannais.
 Dans le cas d'une transmission sur papier, merci de respecter l'ordre suivant :

abréviation ou nom d'espèce	effectif	remarque	indice de reproduction	date	lieu-dit	commune
ech bla (Echasse blanche)	8	le nid est installé sur un bassin désaffecté	nid occupé	25/05/04	Kerlapous	SILFIAC

Relecture : B. Iliou et J.-L. Lemonnier.

Illustration : couverture et dessin p27 Patrick Bailleul. Photos p22 auteur X ? ; p12, p29 Gwenaël Derian.

AR VRAN MORBIHAN N°27

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwenael Derian

Plongeur catmarin *Gavia stellata*

(1 donnée)

Le premier est signalé devant Penthievre / Saint-Pierre-Quiberon le 22/10/2003.

Plongeur imbrin *Gavia immer*

(4 données)

Un Imbrin longe la côte entre Gâvres et Larmor-Plage le 01/06/2003, vers le nord.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

(178 données)

Reproduction :

- er Varquez / Erdeven : 3-4 chanteurs sont présents le 22/03/2004, transport de matériaux constaté le 30/03. Parmi des adultes, on note un juvénile et deux poussins de quelques jours le 08/07.
- sur l'étang des Basses Landes à Saint-Marcel, un jeune accompagne 6 adultes le 02/07.
- l'étang de Kernivinen / Bubry a été remis en eau l'année précédente, deux couples s'y reproduisent en 2003 avec 3 et au moins 1 poussins le 09/07.

Rassemblements :

Le plus fort effectif observé se rassemble sur les lagunages de Bonnervo / Theix, le 18/08, 80 individus. 29 Castagneux le 24/08 à Kersahu / Gâvres, sans suite.


Les Grèbes castagneux se dispersent sur le Blavet maritime et Pen Mané / Locmiquélic, sans qu'il y ait de forts effectifs.

En rivière d'Étel, les premiers retours sont enregistrés début juillet (graphiques). Près de là, l'estivage est faible sur l'étang du Crannic / Brec'h (max. 5-6). Plus tard dans l'automne, un petit rassemblement est noté aux Basses Landes : 2 le 06/09, 8 le 19/09, 10 le 10/10, 19 le 28/10.

date	effectif	remarque
06/07	35	dont 6 jeunes
21/07	70	dont 2 jeunes
18/08	99	
31/08	66	
18/09	80	
09/11	5	recensement incomplet, lagunes cloturées

*Grèbe castagneux sur les lagunages de Bonnervo / Theix
(Morbihan) : été - automne 2003*

Grèbe castagneux sur les étangs de Locoal-Mendon (Morbihan) ; été 2003



décades mensuelles	effectif	décades mensuelles	effectif
Jt1	10	S1	15
Jt2		S2	19
Jt3	3	S3	17
A1	6	O1	17
A2		O2	17
A3	10	O3	18
		N1	17

Grèbe castagneux sur le Blavet / Locmiquélic (Morbihan) ; été – automne 2003

Bassins d'épuration, lagunages où ont été observés des Grèbes castagneux en période de reproduction : Kergourio (désaffecté), Kersahu / Gâvres, Auray, Bézit et Bonnervo / Theix, Pen Mané / Locmiquélic (bassin de décantation), station de Meslan, Varquez Rongal / Edeven...

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(182 données)

Reproduction certaine :

- un couple et deux jeunes non volants à Château-Trô / Guilliers, le 09/05/2003.
- sur l'étang de Coët-Rivas / Kervignac, deux couveurs le 04/04 puis un seul le 16/04 puis aucun.
- un couple élève un jeune sur l'étang de Lannénec (grande mare) / Ploemeur.
- 4 poussins de deux semaines et un couple sur l'étang de Lopheret / Erdeven le 04/05, encore trois jeunes le 07/06.

- la reproduction aura réussi cette année sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, deux poussins accompagnent un adulte le 08/07.
- deux couples conduisent respectivement 2 et 3 jeunes sur les étangs de Branguily / Gueltas le 13/07.
- au Stum / Saint-Barthélémy, un couveur les 01 et 03/05.
- réservoir du Loc'h / Brec'h, trois jeunes le 28/07.


Reproduction possible ou probable :

- 3 couples dont un parade sur l'étang au Duc / Ploërmel.
- un couple parade sur l'étang de la Forêt à Brandivy les 26/03 puis 04/04.
- un couple sur l'étang du bourg de Saint-Marcel, le 15/05.


Rassemblements :

Sur l'étang au Duc / Ploërmel : 29/03, 66 ; 14/04, 53 ; 06/09, 57 ; 20/10, 55 ; 31/10, 80.

Le 10 juillet, deux juvéniles sont visibles au Crannic / Brec'h mais ne sont pas issus d'une reproduction locale, il n'y aura pas de concentration estivale.



Grèbe huppé, étang de Saint-Jean et Goh Lenn / Locoal-Mendon (Morbihan) ; été 2003



Grèbe huppé, Blavet maritime et Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan) ; été 2003

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

(4 données)

Le 16/03/2003, un individu au Lenn et Le Sail / Damgan, 4 en plumage nuptial le 02/04 devant la pointe er Hourél / Locmariaquer puis, après l'été, un individu au même endroit le 12/11.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* (50 données)

Sur l'étang du Crannic /Brec'h, entre le 20/03/2003 et le 16/04, jusqu'à dix Grèbes à cou noir s'attardent, dont une paire parade. Deux couples en plumage nuptial le 21/03 à Sterbouët / Locmiquélic. Deux couples passent dans une dépression dunaire de Plouhinec le 01/04. Lacune après le 16/04. Les retours sont enregistrés après le 01/07 (37 données). Le 27/10, dans la Petite Mer de Gâvres, 35 ; le 15/11, 24 ; 12 devant la côte ouest le 22/10 à Penthievre / Saint-Pierre-Quiberon.

Puffin indéterminé *Puffinus sp* (7 données)

Le 27/04/2003, 12 puffins indéterminés qui pourraient être des Fuligineux sont observés depuis Kerroch / Ploemeur.

Les autres observations sont réalisées d'août à octobre, pour 1 à 7 individus.

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* (1 donnée)

Pendant une séance de guet à la mer, un Fuligineux, le 05/08/2003 à la pointe des Saisies / Gâvres.

Puffin des anglais *Puffinus puffinus* (9 données)

Huit données devant Damgan et Gâvres, entre août et septembre, pour un maximum de 20 individus ; une observation de Belle-Ile le 10/11/2003, un individu.

Puffin des Baléares / Yelkouan *Puffinus yelkouan* (11 données)

date	effectif	lieu-dit	commune
20/07	1	plage de Kérouriec	ERDEVEN
23/07	7	pointe des Saisies	GAVRES
02/08	16	pointe de Kerroch	PLOEMEUR
05/08	11	pointe des Saisies	GAVRES
26/08	>200	Treutan	DAMGAN
29/08	10	Côte sauvage	QUIBERON
02/09	80	Kervoyal	DAMGAN
07/09	140	Treutan	DAMGAN
08/09	8	pointe des Saisies	GAVRES
15/09	60	Treutan	DAMGAN
21/09	20	Treutan	DAMGAN

Puffin des Baléares / Yelkouan (Morbihan) ; été 2003

Fou de Bassan *Sula bassana* (20 données)

Un groupe de 25 pêche devant l'île Dumet le 06/04/2003, il faut attendre le 23/07 pour observer un groupe important : 113 au moins en pêche et un total de 239 en passage devant Gâvres.


Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (114 données)

Reproduction : au moins 52 nids occupés sur un îlot du Golfe.

date	effectif	remarque	lieu-dit	site
07/06	37	au dortoir = total rade	port de guerre	rade de Lorient
22/08	145	comptage crépusculaire	"	
05/11	121	total rade = 277	port de guerre	
	125		île aux Souris	
11/11	130	reposoir sur l'île de Roëlan vers 17h00.	plage de Kérourec	rivière d'Etel
02/11	136	entrent dans la rivière, 08h30		

Grand Cormoran, dortoirs (Morbihan) ; été – automne 2003

A partir de Roëlan, on note la proximité des résultats obtenus au dortoir et pendant la dispersion des oiseaux. Une autre partie des cormorans qui séjournent dans la rivière d'Etel en été est liée à l'étang du Cranic / Brec'h avec lequel des mouvements pendulaires (matin – soir) sont relevés : 32 en vol sur un axe probable étang Saint-Jean / Locoal-Mendon - étang du Cranic à 9h00 le 17/10 et 64 en vol à 16h30 selon un axe probable étang du Cranic - étang Saint-Jean le 16/10.



Grand Cormoran sur l'étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; été – automne 2003

dates	effectif		dates	effectif	
24/07	59	Treutan	11/09	61	et plus, sur Méaban.
16/08	95	Treutan	02/10	85	plusieurs reposoirs.
26/08	90	Treutan	12/11	180	en reposoir sur Méaban, en pêche et en vol.
03/09	90	Treutan	<i>B.-</i>		
21/09	95	Treutan			
21/08	70	Treutan -Lenn			
26/08	85	Tour des Anglais			
<i>A.-</i>					

Grand Cormoran, reposoirs
A.-, devant Damgan
B.-, devant Locmariaquer
(Morbihan) ; été – automne 2003

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

(17 données)

Visible depuis les pointes de Gâvres et Locmariaquer.

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

(3 données)

- 2 le 22/10/2003 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon.
- 1 le 09/11 au Petit Loc'h / Guidel.
- 1 le 08/11 à l'étang de Pomper / Larmor-Baden.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

(9 données)

- séjour autour de la rivière de Pénérff à partir de mi-juillet, maximum de 13 le 04/10 à Kerguizec / Surzur.
- un groupe de 7 individus entre le 25/09 et le 07/10/2003 au Grand Loc'h / Guidel.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

(167 données)

Reproduction : 10 aires occupées le 04/07/2003 avec jeunes, Kerzo / Port-Louis.

Rassemblements :

- 65 pêchent ensemble le 09/08 à Banastère / Le Tour-du-Parc.
- sur les vasières de la partie haute de la rivière d'Étel à partir de fin août ; 76 dispersées le 05/10. La héronnière de Riec'h était fréquentée.
- dans la Petite Mer de Gâvres et Pen Mané / Locmiquélic, dès juillet : 56 le 07/07, 83 le 20/08 à Kersahu.

Données dans l'intérieur du département : 5 le 24/08 sur l'étang des Salles / Sainte-Brigitte ; les étangs de Branguily à Gueltas sont régulièrement fréquentés : 2 le 16/08, 4 le 06/09, 8 le 27/09, 1 le 13/10.

Dortoirs : 140-150 au Castel / Le Tour-du-Parc le 14/11 et 197 le 11/11 ; à l'étang de la Forêt / Brandivy, aucune le 01/09 et 3 le 14/11 ; le groupe de 23 perchées en fin d'après-midi du 07/09 à Pen Inez / Locoal-Mendon, marée haute, se rapporte à un reposoir de transit vers les dortoirs.

Grande Aigrette *Egretta alba*

(30 données)


Une observation printanière : 1 le 17/03/2003 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon. Ensuite des séjours plus ou moins longs sont notés à partir du 05/07.

- 1 individu bagué, le 16/07, vannage de l'Isac / Théhillac.
- rivière de Pénérff ; 6 le 14/09 à Kergall / Surzur, 1 le 27/09 et 1 le 04/11 ; 2 à Pont-Caden / Surzur le 04/10.
- rivière d'Étel ; 1 le 18/07 à Saint-Jean puis 1 entre les 20 et 31/08 ; pendant presque trois mois, 1 à 4 individus fréquentent les étangs du Crannic / Brec'h et Saint-Jean (20/08 – 14/11).
- région lorientaise ; plusieurs passages se distinguent : 1 entre Locmiquélic et Gâvres (05-19/07) ; 2 les 09 et 10/08 puis le 07/09 au Grand Loc'h / Guidel ; 1 sur l'étang de Lannéc / Ploemeur le 12/09.
- 1 au Roc'h Du / Crac'h le 12/11.

Héron cendré *Ardea cinerea*

(226 données)

Reproduction : 11-12 aires occupées avec jeunes à Kerzo / Port-Louis le 07/05/2003.

*Héron cendré, étang du Crannic / Brec'h (Morbihan) : été – automne 2003***Cigogne noire** *Ciconia nigra*

(2 données)

Deux individus prennent une pompe, le 07/08/2003 à l'entrée du port / Vannes. 2 le 25/08 au Grand Loc'h / Guidel.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(62 données)

Imaginons la surprise du visiteur qui découvre 55 Ibis sacrés se nourrissant à Banastère / Le Tour-du-Parc (09/08/2003) ! Il y en aura 170 ensemble au Duer / Sarzeau le 11/11. Il y a une lacune du 04/05 au 13/07 – en dehors du Golfe – puis l'espèce se disperse sur le littoral.

Dortoirs : 207-220 au Castell / Le Tour-du-Parc le 02/11 et 214 le 11/11.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

(27 données)

Les retours sont perçus à partir de début août : 1 jeune séjourne au Petit Loc'h / Guidel entre les 07/08 et 21/08/2003 ; 1 à Susicinio / Sarzeau le 09/08.

Les 13-14-15-21/09, respectivement 12, 11, 14 et 22 individus sur l'étang de Noyalo.

Un groupe majoritairement composé de jeunes entame un long séjour dans la Petite Mer de Gâvres : 17 le 23/09.

Le 09/11, 7 à Banastère / Le Tour-du-Parc et 8 à Susicinio.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

(41 données)

Un couple nicheur à Kersahu / Gâvres le 04/04/2003, un autre à Susicinio / Sarzeau le 10/04... 24 individus sur la vasière de Saint-Colombier / Sarzeau le 08/09.

Oie cendrée *Anser anser*

(1 donnée)

Une oie en Petite Mer de Gâvres le 08/11/2003.

Bernache du Canada *Branta canadensis*

(2 données)

Un individu le 24/08/2003 à l'étang des Salles / Sainte-Brigitte et un groupe de 19 oiseaux très farouches comptant deux jeunes sur l'étang de Pont-Caden à Surzur.

Bernache cravant *Branta bernicla*

(30 données)

Les dernières sont signalées à Sarzeau, 16 le 12/05/2003. Les retours sont ressentis fin-septembre : 2 à la pointe du Conguel / Quiberon, 60 le 29/09 dans le Golfe du Morbihan, les deux premières dans la Petite Mer de Gâvres le 30/09. Sur ce dernier site, on en compte 1320 dont 15,33% d'individus de premier hiver le 15/11.

Baie de Plouharnel : 10 le 12/10, 517 le 22/10.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*

(1 donnée)

Un Casarca passe à Kersahu / Gâvres le 24/08/2003.



Tadorna casarca, Kersahu / Gâvres (Morbihan) ; août 2003

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(122 données)

Printemps : 270 individus encore le 29/03/2003 dans la Petite Mer de Gâvres, 56 au repos dans les lagunes de Damgan le 30/03, un comptage dans l'estuaire de la Vilaine aboutit à un total de 127 le 18/04, 82 à Pen Mané le 23/04.

Reproduction : des nichées sont signalées à partir du 29/04. 5-6 familles à Pen Mané, 31 poussins dans une saline / Le Hézo le 15/06, une famille de 6 poussins le 16/06 à la Forest / Locoal-Mendon, 1 famille sur les lagunages de Sainte-Hélène, 2 aux lagunages de Bézit / Theix, dix familles à Kersahu / Gâvres...

Canard mandarin *Aix galericulata*

(2 données)

Un mâle de Mandarin s'intéresse à une femelle Colvert au Petit Loc'h / Guidel, 30/04/2003.

Canard siffleur *Anas penelope*

(30 données)

A Kerbodec / Sarzeau, 5 le 30/08/2003. Les arrivées sur les sites habituels se déroulent fin septembre : maximum de 89 à l'étang du Crannic / Brec'h, 78 dans la Petite Mer de Gâvres le 15/11. Les effectifs sont plus suivis dans la rivière d'Etel, 7 (anse de l'Istrec) le 01/10, 15 le 11/10 à Saint-Jean / Locoal-Mendon, 65 le 15/10, 86 le 24/10, 210 le 14/11.

Canard chipeau *Anas strepera*

(7 données)

Au printemps, 2-3 entre les 25 et 30/04/2003 au Petit Loc'h / Guidel.

Passages : 4 à Kersahu / Gâvres le 19/10. Au Stum / Saint-Barthélémy, 3 le 28/10, 2 le 01/11. Sur l'étang du Ter / Ploemeur, 3 individus les 07 et 14/11.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(63 données)

On retrouve l'espèce dès le mois d'août sur divers sites, en très faible effectif mais 140 individus à Kerbodec / Sarzeau le 30/08/2003. 130 le 05/10 à la pointe des Emigrés / Vannes et 600 au Duer / Sarzeau le 10/11.


Canard colvert *Anas platyrhynchos*

(194 données)

Des pontes sont signalées entre le 06/04 et le 18/07/2003 : er Varquez / Erdeven, étang de la Forêt / Brandivy, Loperhet / Erdeven, le Crannic / Brec'h, le Pérello / Ploemeur, Branguily / Gueltas, le Scave / Quéven, Pomper / Baden, Pen Mané / Locmiquélic, Loc'h / Guidel ...

date	effectif	lieu-dit	commune
11/08	122	Lédec Néguan	LOCOAL-MENDON
16/08	150	étangs de Branguily	GUELTAS
24/08	110	étang des Salles	SAINTE-BRIGITTE
26/08	160	étang de Toulvern	BADEN
30/08	112	Bénance	SARZEAU
	1300	Kerbodec	SARZEAU
06/09	261	étangs de Branguily	GUELTAS
18/09	230	lagunes de Bonnavo	THEIX
27/09	382	étangs de Branguily	GUELTAS
06/10	111	étang du Roc'h Du	CRACH
28/10	174	Moulin de bruié d'en bas	BUBRY
31/10	340	étang au Duc	PLOERMEL

Canard colvert, rassemblements (Morbihan) ; été - automne 2003



Canard colvert, étang du Crannic / Brec'h (Morbihan) ; été - automne 2003

Canard pilet *Anas acuta*

(13 données)

Le 03/04/2003, 11 individus sont présents sur l'étang du Crannic / Brec'h, un couple parade. Ce petit passage est perçu près de là à Kerfaute / Plouhinec, 7 individus le 29/03, maximum de 16 Pilets à Pen Mané / Locmiquélic le 29/03, encore 3 le 10/04.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

(7 données)

- 6 le 04/04/2003 à Pen Mané / Locmiquelic et 3 (1 mâle et 2 femelles) le 10/04.
- 3 (2 mâles et 1 femelle) le 12/04 à er Varquez / Erdeven.
- 1 le 11/05 dans les marais de Suscinio / Sarzeau, 2 le 09/08.
- 1 femelle ou juvénile le 26/08 sur l'étang du Crannic / Brec'h.
- 1 le 13/09 à Kersahu / Gâvres.

Canard souchet *Anas clypeata*

(30 données)

Ici et là au printemps (13 dans les étangs du Lic / Damgan), la lacune d'été prend fin le 19/08/2003 avec 43 sur l'étang de Lannéc / Ploemeur, 25 le 08/11 au même endroit.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

(74 données)

Reproduction : une femelle et deux poussins à Suscinio / Sarzeau, le 25/06/2003. La reproduction est également constaté dans la vallée de Vilaine, avec une femelle suivie de 4 poussins âgés de 2-3 semaines à l'étang du Lezay / Saint-Dolay, le 03/07.

Une femelle handicapée estive sur l'étang du Crannic / Brec'h où les hivernants tardent à arriver : 35 et 36 les 11 et 14/11. Les effectifs étaient déjà plus élevés du côté de Vannes mais les comptages compromis par la clôture du site (tableaux).

date	effectif	remarque
22/10	21	dont 2 femelles ou juvéniles
01/11	88	dont 21 femelles
09/11	121	dont 22 femelles
11/11	170	27 femelles
15/11	103	

Fuligule milouin, étang au Duc / Vannes (Morbihan) ; été-automne 2003

date	effectif	remarque
06/07	2	femelles
21/07	4	dont 1 juvénile
18/08	10	
31/08	8	
18/09	11	
22/10	15	9 femelles - recensement incomplet, lagunes clôturées
01/11	24	10 femelles - recensement incomplet
09/11	50	
11/11	26	
15/11	43	

Fuligule milouin, lagunes de Bonnervo / Theix (Morbihan) ; été-

Sur ces deux sites voisins, une femelle à tête blanche est suivie.

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*

(1 donnée)

Une femelle accompagne des Morillons, le 30/03/2003 sur le bassin d'épuration du Varquez Rongal / Plouharnel.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

(1 donnée)

Sur les lagunes de Bonnervo / Theix, un mâle adulte le 22/10/2003.

Fuligule morillon *Aythya morillon*

(26 données)

Pas de données entre le 06/04 et le 21/07/2003 (hormis un couple à Suscinio / Sarzeau le 25/06). Les sites traditionnels ne voient arriver que peu d'oiseaux avant la fin de la période : moins de 10 à Theix et Vannes, 4, 13 puis 29 sur l'étang du Ter / Ploemeur les 03-07-14/11.

Fuligule milouinan *Aythya marila*

(1 donnée)

Une femelle sur l'étang de Lannénec / Ploemeur le 30/10/2003.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

(8 données)

Autour de Méaban, 1 mâle adulte et trois immatures le 08/05/2003 ne suffisent pas à conclure sur la nidification locale de l'espèce.

Devant Damgan, l'observateur fidèle ne trouve pas de concentration d'oiseaux en mue.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

(2 données)

Le 17/03/2003, 5 dans la baie de Kerdélan / Larmor-Baden puis encore une femelle au Roc'h Du / Crac'h le 02/04.

Harle huppé *Mergus serrator*

(10 données)

La dernière observation : 6 individus à Pen Mané / Locmiquélic le 04/04/2003.

Retours : 7 au moulin de Coët Courzo / Locmariaquer le 12/11.

AR VRAN MORBIHAN N° 27

Groupe n° 2 Des rapaces aux rallidés.

Choix et rédaction établis par Franz URVOAZ

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

(13 données)

Cette espèce a fait l'objet d'observations sur 11 communes, entre le 25/05/2003 et le 09/09 : Surzur, Nostang, Le Cours, Saint-Guyomard, Plouharnel, Sérent, Guidel, La Chapelle-Neuve, Brec'h et Riantec. Des parades sont mentionnées à Nostang les 27 et 28 mai 2003.

Milan noir *Milvus migrans*

(31 données)

Le premier Milan noir de la saison est noté le 19/03/2003 et le dernier nous quitte le 31/07. Les données proviennent de 13 communes : Sarzeau, Plougoumen, Noyal, Brec'h, Gestel, Vannes, Plescop, Pont-Scorff, Locoal-Mendon, Erdeven, Brandérion, Damgan et Théhillac. Des couples se sont reproduits de façon certaine sur les communes de Sarzeau et Pont-Scorff.

Milan royal *Milvus milvus*

(1 donnée)

Un individu observé sur les dunes d'Erdeven et de Plouharnel le 08/11/2003.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

(90 données)

Cette espèce est observée sur 16 communes : Locoal-Mendon, Gâvres, Brec'h, Baden, Ambon, Plouhinec, Larmor-Baden, Sarzeau, Guidel, Ploemeur, Surzur, Locmiquélic, Le Tour du Parc, Belz, Landaul et Erdeven. Plusieurs couples formés sont notés sur Erdeven, Plouhinec, Locmiquélic, Locoal-Mendon ou Sarzeau mais les preuves de la reproduction manquent. Le 02/11/03, 5 individus sont rassemblés à Plouhinec et Gâvres.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

(42 données)

Ces données proviennent de 21 communes différentes : Lantillac, Locoal-Mendon, Surzur, Merlevenez, Lanouée, Rieux, Nostang, Saint Marcel, Languidic, Guégon, Landaul, Monteneuf, Sérent, Quily, Cruguel, Plouhinec, Camors, Brec'h, Les Forges, Gueltas et Ploemeur. 2 couples sont notés nicheurs certains à Merlevenez et Monteneuf. Plusieurs couples sont également notés à Plouhinec, Landaul et Quily mais aucune preuve de reproduction n'est fournie.

Busard cendré *Circus pygargus*

(2 données)

Les observations sont faites respectivement le 24/04/2003 sur la commune de Cruguel et le 12/07 sur celle de Campénéac.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

(4 données)

Observations d'une femelle effectuées à Crucuno / Erdeven le 21/08/2003 et le 03/09 au Ter / Ploemeur. Un individu en forêt de Floranges le 23/04 et un au Cranic / Brec'h le 09/09.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

(86 données)

L'espèce est notée nicheuse sur les communes d'Erdeven, Plouhinec, Merlevenez, Kervignac, Noyal et Riante. A Erdeven, le 15/06/2003, 5 pulli sont observés dans le même bosquet. A Languidic, le 29/09, une femelle se repaît d'un pigeon à 5 mètres de l'observateur.

Buse variable *Buteo buteo*

(136 données)

La reproduction est prouvée à Erdeven, Merlevenez, Languidic et Campénéac. Des couples appariés sont notés à Pont-Scorff, Brandérion, Surzur, Pont-Scorff et Locoal-Mendon.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

(33 données)

Noté deux fois au printemps le 09/09/2003 au marais du Duer / Sarzeau. Il est observé dans les communes suivantes à partir du 18/07 : Damgan, Noyal (3 individus simultanément), Brec'h, Locoal-Mendon, Surzur, Plouhinec, Sainte-Hélène et Nostang. La dernière observation faite le 19/10 à Kersahu / Gâvres concerne 1 adulte.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

(101 données)

Des preuves de reproduction sont notées à Ploemel, Quéven, Locoal-Mendon, Brandivy, Damgan et Erdeven et des indices intéressants existent pour les communes suivantes : Languidic, Plumelin, Sainte-Hélène et Pont-Scorff.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

(12 données)

Des observations sont effectuées dans 7 communes différentes : Guidel, Ploemeur, Sérent, Gâvres, Saint-Pierre-Quiberon, Erdeven, Locmariaquer et Plouharnel. Ces observations concernent toujours un seul individu à la fois, se terminent au printemps le 03/04 et reprennent au 19/09/2003. A noter également à titre anecdotique un conflit de voisinage répété entre un Faucon crécerelle et un Faucon émerillon le 08/11/03 à Plouharnel.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

(32 données)

19 communes fournissent des observations à savoir : Saint-Marcel, Sérent, Pont-Scorff, Erdeven, Bubry, Plouay, Sarzeau, Guidel, Languidic, Damgan, Saint-Armel, Plouhinec, Plouharnel, Erdeven, La Chapelle-Neuve, Camors, Brec'h, Gueltas, Nostang et Campénéac. La reproduction est probable dans la forêt de Camors.

- observation remarquable de 5 individus le 01/05 à Sérent.
- capture d'une hirondelle le 07/06 à Lann Hir / Pont-Scorff.
- attaque d'une Mouette rieuse le 25/08 à Goeven / Languidic.

Faucon lanier *Falco biarmicus*

(1 donnée)

Cette observation restée exceptionnelle est effectuée le 14/10/2003 en Petite Mer de Gâvres. Elle concerne deux individus simultanément. L'un est une femelle et l'autre une femelle ou un jeune. Echappés de fauconnerie ?

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(16 données)

L'oiseau est noté dans les communes de Guidel, Sarzeau et Plouhinec à partir du 15/08. Le 04/09/2003 au Marais du Duer / Sarzeau 3 individus (2 adultes et un jeune) sont présents.

Perdrix rouge *Alectoris rufia*

(6 données)

Des paires sont observées à Languidic : Kerguenodic, Goeven le 20/04/2003 ; Nostang, Saint-Thomin, le 03/06.

Perdrix grise *Perdix perdix*

(1 donnée)

Deux individus sont notés à Kervihan / Locoal-Mendon le 12/05/2003.

Caille des blés *Coturnix coturnix*

(3 données)

- entendue les 15 et 25/06/03 à Kergollaire et Goeven / Languidic.
- au Chemin de Cornevec / Brandivy le 30/03.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

(13 données)

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(56 données)

- 6 individus sont notés sur la basse vallée du Loc'h, ZNIEFF à Brec'h, le 25/04/2003.
- la reproduction est prouvée au Varquez / Erdeven, plusieurs poussins le 09/07 ; à Pen Mané / Locmiquélic, un jeune le 09/07 ; au Petit Loc'h / Guidel où 3 juvéniles sont observés le 07/08.

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

(4 données)

- Petit Loc'h / Guidel, entre le 09/08/2003 (un juvénile) et le 21/09.
- Brenneguy / Locmariaquer, un adulte le 11/09.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

(116 données)

La reproduction est prouvée à Kergollaire / Languidic, Le Grand Roze / Langoëlan, Tallen / Baud, lagunes de Bonnervo / Theix, Bouillon Ruz / Bubry, Kernivinen / Bubry ainsi que sur les communes de Saint-Marcel, du Hézo, et des Forges.


Foulque macroule *Fulica atra*

(241 données)


- 1 couveur le 22/03 au Varquez / Erdeven.
- 135 dont 55 à 60% de juvéniles le 27/07/2003 au marais de Tréhervé / Ambon.

Les chiffres les plus importants lors des rassemblements pré ou post-nuptiaux sont obtenus dans les lieux suivants :

- 10 le 02/04 – 433 le 11/09 – 581 le 02/10 – 524 le 06/10 – 640 le 12/11 au Roc'h Du / Crac'h.
- 95 le 13/07 – 172 le 16/08 – 249 le 06/09 – 208 le 27/09 – 108 le 13/10 aux étangs de Branguily / Gueltas.
- 10 le 30/03 – 15 le 06/04 – 748 le 06/07 dont 35-40% d'immatures – 750 le 21/07 – 735 le 18/08 – 405 le 31/08 – 365 le 18/09 – 70 le 22/10 mais recensement incomplet, lagunes clôturées.
- 1026 à Quélisoye / Larmor-Plage, le 06/10.



Foulque macroule, étang du Cranic/Brec'h (Morbihan) ; mars – novembre 2003



Foulque macroule, Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan) ; mars – novembre 2003

AR VRAN MORBIHAN N° 27

Groupe n° 3 De l'Huîtrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Yannick Ordureau

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

(47 données)

Le 29/07/2003, 34 au reposoir de Redion / Damgan, puis 26 le 13/08 et 56 le 16/08.

A Treutan-Larmor / Damgan : 120 le 21/08, 150 le 15/09 et 130 le 21/09.

122 devant er Hourel / Locmariaquer le 02/10.

Le 08/05 découverte de 4 œufs à l'Île aux Chevaux / Île de Houat.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

(42 données)

Dès le 18/03/2003, présence signalée de 4 individus à Susicinio / Sarzeau.

Reproduction :

- à Susicinio / Sarzeau, 4 couveuses le 19/04 puis 2 jeunes le 11/05.
- au Dreff / Riantec, deux grands poussins le 4/07, un juvénile puis trois jeunes non volants le 13/07, en tout 3 familles.
- à Kersahu / Gâvres, 3 familles le 13/07.
- à Pont-Caden / Le Tour du Parc, un juvénile le 27/08.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(15 données)

Une couveuse dans les marais de Susicinio / Sarzeau le 11/05/2003 et un couple avec 2 jeunes le 25/06/03. 25 avocettes au Cranic / Brec'h le 07/10, un regroupement de 350 individus est signalé le 16/11/03 au Bronzais / Pénestin.

Oedicnème criard *Burhinus oedichenus*

(26 données)

Le premier est vu le 13/04/2003 à Sainte-Barbe / Plouharnel. Deux individus contactés en juillet dans les dunes de Plouhinec et un jeune en août à Susicinio / Sarzeau. Du 19/01 au 01/11/03, aucune observation durant 50 séances à Kermineh / Erdeven.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

(19 données)

Deux adultes dont un en position de couveur le 26/03/2003 à Pen Mané / Locmiquélic, 4 parquent encore le 10/04 parmi 7 individus présents.

Trois individus dans les carrières de Lauzach le 29/06/03.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

(52 données)

Encore 110 en Petite Mer de Gâvres le 11/04/2003. Les retours s'amorcent mi-juillet. Le 30/08 un regroupement de 50 à Penthièvre / Saint-Pierre-Quiberon et de 85 à Larmor / Damgan. 250 dans la baie de Locmalo / Gâvres le 18/09 et 200 dans la Petite Mer le 20/10. 150 le 06/10 à l'île Stuhan / La Trinité-sur-Mer. Le 03/11, 150 individus à Kerguelen / Larmor-Plage et le même nombre le 08/11/03 en Petite Mer de Gâvres.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (35 données)

Première observation de 2 individus le 21/03/2003 aux Grands Sables / Groix.

Reproduction :

- le 15/04/03, accouplement et parades à Kerminihy / Erdeven ; 4 couveurs le 27/04, 7 couveurs le 03/05, les 25-26/05 la colonie est vide, des individus à l'écart.
- dunes de Plouhinec, 4 couples le 04/06.
- Kersahu / Gâvres, 2 couples le 18/05 sur la plage.
- Kerouriec / Erdeven, 1 adulte et 2 poussins le 22/06.
- Suscinio / Sarzeau, un couple le 16/04.
- le 17/04/03, 1 mâle, 1 femelle et 1 jeune sur la plage de Men Ar Mor / Pénestin

10 en reposoir à Kersahu le 05/08.

Pluvier guignard *Charadrius morinellus* (1 donnée)

Un individu observé le 15/09/2003 à Kerminihy / Erdeven.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (21 données)

80 le 24/03/2003 à Sainte-Barbe / Plouharnel. Lacune jusqu'au 30/08. 228 le 01/11/03 en Petite Mer de Gâvres. Un regroupement de 2800 à 3000 individus à la Pointe / Guégon le 10/11 et un de 569 le 15/11/03 à Linès / Gâvres.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (11 données)

Présence de 60 individus le 19/03/2003 à Landrezac / Sarzeau et de 30 le 23/03/03 à Pentès / Surzur, 60 dans la Petite Mer de Gâvres le 11/04. Au retour, 3 le 25/09 à la pointe de Gâvres et un maximum de 20 entre Locmalo et la Petite Mer.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (131 données)

Reproduction :

- Pen Mané / Locmiquélic, un couveur le 11/06/2003.
 - Le Dreff / Riantec, un couple le 15/05.
 - Le 16/03, plusieurs couples parquent à Kervran-Kerzine / Plouhinec ; plusieurs juvéniles sont par la suite signalés le 04/06.
 - Le 14/04 et le 03/05, 11 couples dans les dunes de Plouhinec, seulement 3 couples le 22/05.
 - 5-6 couples à Kerminihy / Erdeven le 01/05.
 - le 15/04, 5-6 couples à Sainte-Barbe / Plouharnel.
- Cela fait un total approché de 24-30 couples de Riantec à Plouharnel sur le site Natura 2000.
- Er Varquez Rongal / Erdeven, un couveur le 30/03.
 - Un couveur à Luzern / Merlevenez le 02/04.
 - Le 17/03/03, parade nocturne d'un couple à Ty Rhu / Locoal-Mendon ; deux couples s'installeront, les nids détruits par labourage le 22/04.
 - Mané Ménégo / Locoal-Mendon, un couple sur semis le 28/04.

- Groix, sans précision, 2 couples le 06/05.
- Suscinio / Sarzeau, 1 couple le 11/05.

93 au moulin de Pomper / Baden le 17/09, 300 à Guénin le 13/10, 150 à Mauron le 06/11. Le 13/11/03 un regroupement de 1000 individus est signalé à la Pointe / Guégon et 1400 à Bocneuf la Rivière / Lanouée. Les vanneaux arrivent au Grand Loc'h / Guidel dès mi-septembre, il y en a 225 le 09/11.

A-. dates	Effectif	<i>Vanneaux huppé</i> (Morbihan) : été – automne <u>2003</u>	B-. dates	Effectif
12/09	15	<i>A-. Grand Loc'h / Guidel</i>	23/07	66
02/10	34		03/09	50
06/11	90		18/09	25
09/11	225		20/10	120
		<i>B-. Petite Mer de Gâvres</i>	23/10	20
			08/11	200

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

(7 données)

Un regroupement de 70 individus le 19/03/2003 à Landrezac / Sarzeau. 15 individus le 07/09 à Larmor / Damgan et autant le 11/09 à la pointe du Bil / Damgan. Deux le 03/09 dans la Petite Mer de Gâvres et 1 à Kersahu / Gâvres.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

(30 données)

Encore 252 entre Locmalo et la Petite Mer / Gâvres le 11/04/2003 puis lacune jusqu'au 04/06 avec 52 sur la plage de Plouhinec. Le 30/08, une centaine au fort de Penthièvre / Saint-Pierre-Quiberon et 180 en baie de Locmalo le 18/09, 120 à Stuhan / La Trinité-sur-Mer le 06/10, 250 le 3/11 à Kerguelen / Larmor plage.



Bécasseau sanderling

Bécasseau minute *Calidris minuta*

(7 données)

Observé entre le 15/07/2003 et le 21/10.

- 1 en plumage nuptial le 15/07/03 au Lenn / Damgan.
- 2 le 29/07, marais de Bétahon / Ambon.

- 1 le 09/09 à Pen Mané / Locmiquelic.
- 3 dont 2 adultes et 1 juvénile le 25/09 à Kersahu / Gâvres.
- 4 dont 3 adultes et 1 juvénile le 29/09 à Kersahu.
- 1 adulte le 17/10 à l'étang du Cranic / Brec'h.
- 1 adulte le 21/10 à l'étang du Cranic.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

(4 données)

- 1 le 16/03/2003 à Pen Mané / Locmiquelic.
- 3 le 29/07 au marais de Bétahon / Ambon.
- 12 à l'étang de Noyal à sec, en queue d'étang le 13/09.
- 4 le 08/09 à Kersahu / Gâvres.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(2 données)

Le 11/11/2003, 9 à Kerpape / Ploemeur et 15 le 6/11 à Penthievre / Saint-Pierre-Quiberon.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(69 données)

Lacune du 23/04 au 15/07. 250 individus le 16/03/2003 au Lenn et au Sail / Damgan. A Larmor / Damgan, 300 le 27/03/03, 110 le 7/09/03 et 120 le 21/09/03.

Des regroupements conséquents de 750 individus en Petite Mer de Gâvres et de 4500 au Bronzais / Pénestin le 16/11/03.


Combattant varié *Philomachus pugnax*

(20 données)

Lacune du 10/04 au 11/08. Le 16/03/03, 3 individus à Pen Mané / Locmiquelic dont un avec tête et cou blancs. Un juvénile le 20/08/03 au Petit Loc'h / Guidel. Observation de 7 individus le 13/09/03 à Kersahu / Gâvres. 6 au Grand Loc'h de Guidel le 09/11.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

(98 données)



Bécassine des marais, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; été – automne 2003

Lacune du 25/04 au 07/08. 34 données concernant 1 ou 2 individus mais 25 données atteignent ou dépassent la dizaine d'oiseaux, presque toutes du Cranic / Brec'h, étang au Duc / Ploërmel, 13 le 24/10/2003, moulin de Pomper / Baden, 40 le 7/11/03 et 60 le 8/11/03.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

(6 données)

- 1 le 18/03/2003 à Kerblei / Locoal-Mendon.
- 1 le 16/10/03 à Kergal / Languidic.
- 2 le 18/10/03 à Kergollaire / Languidic.
- 1 le 27/10/03 sur la RN 166 à Elven et 1 cinq minutes après à Saint-Nolff.
- 1 décolle de sous un buisson de saule le 07/11 à Kerminihy (dunes) / Erdeven.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

(40 données)

Une observation printanière de 107 individus le 07/04/2003 au moulin de Pomper / Baden puis lacune entre les 23/04 et 15/06. 50 à Banastère / Le Tour-du-Parc le 22/07. Le 8/08/03 à Falguérec / Séné, 111 individus ; 54 dont deux bagués couleur le 27/08/03 à Pont-Caden / Le Tour du Parc. Des rassemblements conséquents de 700 le 10/11/03 à Bénance / Sarzeau.

Barge rousse *Limosa lapponica*

(11 données)

Lacune du 18/05 au 29/07. Le 17/05/2003, 17 sur la plage de Kersahu / Gâvres et 32 le 12/10/03 dans la baie de Plouharnel.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

(37 données)

Plusieurs données au printemps dont une centaine le 22/04/2003 au port d'Étel. Lacune du 13/05 au 12/07. Au retour, peu d'observations avec des effectifs importants : 22 le 15/07 à Damgan et 18 le 31/07 au Foisigo / Damgan.

Courlis cendré *Numenius aquaria*

(64 données)

Trois données printanières dont 18 individus en vol au Petit Loc'h / Guidel. Lacune du 25/05 au 08/07. Augmentation des effectifs dès la mi-août :

- 80 en vol au milieu de la rivière de Pénerf / Surzur le 16/08/2003.
- 250 dans les marais de Saint Guénin / Damgan le 21/08.
- 255 à Redion / Damgan le 14/09.
- 310 au Duer / Sarzeau le 27/09.
- 250 à Pentès / Surzur le 27/09.
- 120 en petite Mer de Gâvres le 08/11.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

(5 données)

Lacune du 14/04 au 29/07. Une donnée printanière le 14/04/2003 au Dreff / Riantec. Deux individus au Duer / Sarzeau le 30/08. Plusieurs observations d'un individu au Cranic / Brec'h d'août à octobre.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

(92 données)

Reproduction :

- deux poussins le 22/06/2003 à Kersahu / Gâvres,
- un couple de nicheurs le 26/06 au Dreff / Riantec,
- un couple à Suscinio / Sarzeau le 11/05.

Rassemblements :

- 105 à Foisigo / Damgan le 31/07.
- 117 au Duer / Sarzeau le 30/08.
- 120 à Treutan – Larmor / Damgan le 21/09.
- 46 à Quélisoye / Larmor-Plage, le 06/10.
- 72 à Penhoët / Merlevenez le 22/10.
- 71 à Bénance / Sarzeau le 10/11.



Chevalier stagantile *Tringa stagnatilis*

(2 données)

Observation d'un individu le 3/08/2003 et le 7/08 à Falguérec / Séné.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

(77 données)


*Chevalier aboyeur, étang du Cronic / Brec'h (Morbihan) ; été – automne 2003**Chevalier aboyeur Kersahu / Gâvres (Morbihan) ; été – automne 2003*

Une seule donnée printanière, le 7/05/2003 au Moulin de Pomper / Baden comptabilisant 6 individus. Lacune entre les 07/05 et 23/07. De nombreuses données à partir du début août dont 12 individus le 13/09 à l'étang de Noyal, 31 le 17/09 au Moulin de Pomper / Baden et 27 le 21/09 à Linès / Gâvres.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

(95 données)

Lacune du 16/04 au 29/06. Une seule donnée printanière : 2 individus le 5/04/2003 à Coët-Morn / Crédin. Les données sont éparpillées à l'image des sites visités. 5 à Saint-Jean / Locoal-Mendon le 12/09. 4 individus le 24/10 à l'étang au Duc / Ploërmel.



Chevalier culblanc, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; été – automne 2003

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

(3 données)


Lacune du 16/04 au 06/08/2003. Vu à er Varquez / Erdeven, le Cranic / Brec'h, Pen Mané / Locmiquélic, Petit Loc'h / Guidel, étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, Kersahu / Gâvres, moulin de Pomper / Baden, Pont Caden / Le Tour-du-Parc, un à cinq individus, du 06/08 au 17/09.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

(125 données)

Toujours de nombreuses observations dont 7 au printemps.

De bons regroupements fin août : 35 le 28/08/2003 à Pénerf / Damgan et 25 le 03/09, 11 le 11/09 à Pen Mané / Locmiquélic.



Chevalier guignette, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; été – automne 2003

Tournepipe à collier *Arenaria interpres*

(34 données)

Deux observations printanières : 9 à Gâvres le 4/04/2003 et 4 le 11/05 dans les marais de Susicinio / Sarzeau. Une concentration de 80 individus à Kersahu / Gâvres le 05/08 ; 80 le 11/11 à Kerpape / Ploemeur.



AR VRAN MORBIHAN N°27

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Yann Kerninon.

Stercorariidae sp.

(2 données)

6 labbes "pomasites" avec des Grands Labbes et des laridés suivent un chalutier dans la baie de Quiberon le 02/10/2003. Le 04/10, 15 sont observés devant Treutan / Damgan.

Labbe pomarin *Stercorar us pomarinus*

(1 donnée)

Le 23/08/2003, un individu passe devant la pointe de Kerroc'h / Ploemeur.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*

(9 donnée)

Au passage prénuptial : 1 oiseau de la forme pâle devant la pointe er Hourél / Locmariaquer le 02/04/2003.

Au retour, l'espèce est uniquement observée sur la côte de Damgan (Kervoyal, Le Lenn, pointe du Bill et Treutan) avec de 1 à 4 individus, sauf 10 le 26/08 et 12 le 07/09 (cependant, un Labbe pomarin est suspecté dans ce dernier groupe).

Grand Labbe *Catharacta skua*

(4 données)

En début de période : 1 cadavre le 19/03/2003 à Suscinio et 1 autre mazouté le 21/2003 à Landrézac / Sarzeau.

Au passage post-nuptial : 2 harcèlent des sternes le 08/09 devant la pointe des Saisies / Gâvres et 4 suivent un chalutier dans la baie de Quiberon le 02/10.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

(14 données)

Une seule mention en début de période : 2 le 19/04/2003 dans le marais de Suscinio / Sarzeau.

Au retour, la première est vue le 15/07 au marais de Pen en Toul / Larmor-Baden. Suivent des observations avec des effectifs toujours faibles, généralement de 1 à 3 individus, sauf le 29/09 où 12 mouettes se nourrissent sur le dune de Kerminihy / Erdeven.

Deux mentions hors littoral avec 1 adulte le 10/10 et le 07/11 à l'étang du Cranic / Brec'h.

Mouette pygmée *Larus m nutus*

(3 données)

Deux observations en mars-avril : 1 le 16/2003/2003 au marais de Caden / Damgan et 1 le 26/04 à Pen Mané / Locmiquélic.

Un adulte est présent le 26/08 au Loc'h / Damgan

Mouette de Sabine *Larus sabini*

(2 données)

Une Mouette de Sabine est vue le 23/08/2003 à la pointe de Kerroc'h / Ploemeur et une autre le 21/09 à Treutan / Damgan

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(135 données)

Les rassemblements les plus notables concernent 5 communes :


- Damgan : 400 le 15/07/2003 entre Larmor, Le Lenn et Treutan
- Locmiquélic : 440 le 29/07 à Pen Mané, 2200 le 03/09, 800 le 30/09 et 600 le 09/10 à Sterboust
- Brec'h : notamment 2100 le 11/08 (voir le graphique pour le suivi de ce site)
- Locoal-Mendon : 476 le 11/08 à Goh Lenn, 616 le 12/09 420 le 01/10 dans l'anse de l'Istrec
- Plouhinec : 2000 le 18/09 et 400 le 20/10 en Petite Mer de Gâvres
- le premier jeune de l'année est noté le 07/07. La proportion de juvéniles a été relevée dans plusieurs groupes (seuls les groupes de plus de 50 oiseaux ont été considérés) :

Lieu-dit	Commune	Date	Effectif total	Nbre de juvéniles	% de juvéniles
Pen Mané	Locmiquélic	07/07	73	1	1,36 %
Le Croyal	Locoal-Mendon	08/07	50	4	8 %
Pen Mané	Locmiquélic	09/07	272	16	5,8 %
Larmor/Le Lenn/Treutan	Damgan	15/07	400	10	2,5 %
Bassins de lagunage	Damgan	16/07	250	35	14 %
Pen Mané	Locmiquélic	19/07	195	13	6,66 %
Lann er Groëz	Riantec	24/07	116	3	2,58 %
Pen Mané	Locmiquélic	29/07	440	66	15 %
Etang du Cranic	Brec'h	11/08	2100	42	2 %
Goh Lenn	Locoal-Mendon	11/08	476	6	1,2 %

Un individu schizochrome (manteau blanc, rémiges blanches et taches parotiques sombres) parmi 220 mouettes le 19/08 à l'étang du Cranic / Brec'h.



Mouette rieuse à Riantec, cf ar Vran Morbihan n°26



Mouette rieuse, juin-novembre 03, Etang du Cranic / Brec'h, Morbihan

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

(0 donnée)

Au cours de la période, un oiseau de deuxième été a fréquenté à plusieurs reprises l'embouchure du Riant à Riantec à partir du mois de mars (*comm. pers. P. Davoust et photographie*.)

Goéland cendré *Larus canus*

(31 données)

Dernières mentions au printemps : 6 à l'étang du Cranic et 5 au réservoir du Loc'h / Brec'h le 20/2003/2003, et 4 à Kerouarc'h / Locmariaquer le 02/04.

Le premier est de retour le 16/07 à Damgan et les 2 suivants le 23/07 à Kersahu / Gâvres. Les plus gros effectifs sont de 12 le 26/08 à Berder / Larmors-Baden et de 13 le 01/11 à Lann er Groëz / Riantec.

Les autres données de 1 à 5 individus concernent les sites habituels des ensembles suivants : golfe du Morbihan, rade de Lorient, rivière de Pénerf, rivière d'Etel...

Dans l'intérieur du département, l'espèce aura été détectée quatre fois à l'étang du Cranic et une fois sur le réservoir du Loc'h / Brec'h.

Goéland brun *Larus fuscus*

(89 données)

Élément de la reproduction : au cours de la période un couple est noté nicheur probable sur l'église Saint-Louis à Lorient.

Les rassemblements les plus importants ont eu lieu sur deux secteurs habituels :

Goéland brun, rivière d'Etel / Loccal-Mendon (Morbihan) : septembre – octobre 2003

Lieu-dit	Anse de l'Istrec	Kerihuello	Anse de l'Istrec	Vasière du Gouarde	Anse de l'Istrec
Date	le 22/09	28/09	01/10		15/10
Effectif	236	160	224	110	230

Goéland brun, rivière de Pénerf (Morbihan) : septembre 2003

Lieu-dit	Treutan / Damgan	Le Roz / Surzur	Treutan / Damgan
Date	08/09	27/09	28/09
Effectif	80	150	200

Dans les terres : 40 le 20/2003/2003 au réservoir du Loc'h / Brec'h, 30 le 22/2003 sur un labour à Kerrouz / Pluvigner, 25 le 29/2003 à l'étang au Duc / Ploermel, 30 le 02/04 à Chapeau Rouge / Neulliac, 35 le 16/04 à l'étang du Cranic / Brec'h, 50 le 06/09 et le 13/10 sur les étangs de Branguily / Gueltas...

Sur le littoral : 42 le 23/2003 à l'étang de Pomper / Baden, 30 le 20/08 à la pointe de Saisies / Gâvres, 30 le 10/10 au lagunage d'Auray, 50 le 20/10 en Petite Mer de Gâvres / Plouhinec, 30 le 10/11 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc...

Goéland argenté *Larus argentatus*

(100 données)

Eléments de la reproduction :

- à Kerolay / Lorient, le 13/06/2003, deux nids (1 poussin) sont découverts à terre à la place de hangars abattus et dont les toits étaient précédemment occupés. Belle fidélité à un site de reproduction !
- Le 20/07, une dizaine d'oiseaux se tiennent en position de couveur sur la partie de l'île de Roëlan / Erdeven visible de la côte.
- Au Champ des Oiseaux / Saint-Avé, la nidification est notée probable à l'usine Saupiquet, car des couples semblent bien cantonnés et un poussin y aurait été recueilli.

C'est en rivière de Pénérif que sont notés les rassemblements post-nuptiaux les plus importants :

Commune	Damgan	Damgan	Damgan	Damgan	Damgan	Ambon	Damgan
Lieu-dit	Larmor, Le Lenn et Treutan	Treutan	Treutan	Treutan	Treutan	Bédume	Treutan
Date	15/07	26/08	30/08	08/09	15/09		28/09
Effectif	510	500	2000	1100	700	5000	10 550

Goéland argenté, rivière de Pénérif (Morbihan) , juillet-septembre 2003

Concernant les 10 550 goélands du 28/09 à Treutan : tous les ans à cet endroit, il y a un regroupement d'importance variable en fonction des coefficients de marée, de la nourriture accessible, de la météo, des champs plats (sans culture) disponibles pour le repos ou la toilette... D'après les mouvements constatés, ce rassemblement regroupe probablement les goélands de l'estuaire de la Vilaine, en mer, de l'île Dumet et peut-être ceux de la presqu'île de Rhuys (*comm. pers. P. Philippon*)

Sur le littoral : 250 le 20/08, 200 le 03/09 et 357 le 29/09 devant la pointe des Saisies / Gâvres, 300 le 20/10 et 200 le 23/10 en Petite Mer de Gâvres / Plouhinec, 300 le 11/11 devant la plage de Kérouriec / Erdeven...

Dans les terres : 190 le 20/2003 sur le réservoir du Loc'h / Brec'h, 60 le 22/2003 à Kerrouz / Pluvigner, 150 le 27/09 aux étangs de Branguily / Gueltas, 95 le 14/11 à l'étang du Cranic / Brec'h...

Goéland leucopnée *Larus cachinnans*

(2 données)

Au Lenn / Damgan, 2 Leucopnées sont présents le 30/08/2003. Un mois plus tard, 3 le 27/09 à Roz / Surzur.

Goéland marin *Larus marinus*

(33 données)

Les 250 individus comptés dans un vaste rassemblements de goélands le 28/09/2003 à Treutan / Damgan constituent un effectif record dans cette chronique.

Cette période-ci, les reposoirs ont été aussi mieux détectés :

- 25 le 20/07, 32 le 10/10 et 45 le 11/11 sur l'île de Roëlan / Erdeven ou à proximité
- 35 le 23/07, 25 le 20/08 et 23 le 03/09 devant la pointe des Saisies / Gâvres
- 21+ le 11/09 et 30+ le 12/11 sur l'île de Méaban

Deux mentions sur des sites intérieurs : 1 juvénile le 06/09 aux étangs de Branguily / Gueltas et 1 adulte le 17/10 à l'étang du Cranic / Brec'h.

Sternidae sp.

(2 données)

1 guifette indéterminée à l'étang de Noyal le 19/09/2003.

1 juvénile de Sterne de Dougall ou arctique à Sterbouest / Locmiquélic le 10/10.

Sterne caspienne *Sterna caspia*

(1 donnée)

Une espèce rare dans cette chronique qu'un chanceux aura eu la chance d'observer pendant près de 20 minutes le 07/08/2003 au Petit Loc'h / Guidel.


Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(90 données)


La Sterne caugek s'est reproduite en rivière d'Etel sur la colonie de Sternes pierregarins : deux couples. Le site avait déjà accueilli l'espèce en 1999.

Sterne caugek, guet à la mer, Pointe des Saisies / Gâvres (Morbihan) : 2003

Date	11/04	23/07	05/08	20/08	03/09	08/09	29/09
Effectif	40	5	20	15	15	20	8
Durée	1 heure	45 min	01h45	1 heure	-	1h30	-



Sterne caugek, Blavet maritime / Locmiquélic (Morbihan) : juin-novembre 2003



Sterne caugek, Damgan (Morbihan) : juin-novembre 2003

Au printemps : 23 le 30/2003/2003 au Sail / Damgan, 25 à Kerouarc'h et 50 à la pointe er Hourél / Locmariaquer le 02/04...

Plus tard : 20 le 22/06, 15 le 20/07 et 30 le 17/08 devant la plage de Kérouriec / Erdeven, 20 le 23/07, 15 le 18/09 et 12 le 23/10 dans la baie de Locmalo / Gâvres...

A noter : 1 adulte et 1 juvénile à l'étang du Cranic / Brec'h le 01/08 constitue une donnée originale, l'espèce étant très rarement observée sur des sites intérieurs.

Sterne de Dougall *Sterna dougallii*

(6 données)

L'espèce est notée entre le 26/08 et le 14/09/2003 surtout aux abords de certains sites habituels du golfe (Hent Tenn et l'île de la Jument / Arzon, l'île de Berder et l'île Longue / Larmor-Baden) avec de 1 à 2 individus. En rivière de Pénérff, ce sont 7 sternes qui sont observées entre Pentès et Port-Groix / Surzur le 14/09.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

(63 données)

L'espèce est signalée du 11/04 au 10/10/2003.

Eléments de la reproduction :

- 4 sternes couvent le 11/05 au marais de Suscinio / Sarzeau.
- des poussins sont notés le 08/06 sur la colonie d'Iniz er Mor / Sainte-Hélène.
- 2 couples (un nid) sont présents le 10/06 sur une saline près de l'étang du Hézo.
- un couple couve le 14/06 sur Logoden / Plouhinec.
- 5 couples défendent leur cantonnement le 14/07 à Redion Penerff / Damgan.

Au printemps, un seul regroupement est rapporté : 130 le 14/04 à la Barre d'Etel. Le rassemblement post-nuptial le plus important repéré a lieu le 19/07 à Pen Mané / Locmiquélic où, parmi 65 individus, une dizaine de juvéniles sont nourris par des adultes. Plus tard, 40 en reposoir le 11/09 à la pointe du Bill / Damgan et 30 le même jour à Kerouarc'h / Locmariaquer (seul donnée notable pour le golfe).

Deux sites sur Locmiquélic (Sterbouest, Pen Mané) et quatre sur Damgan (Rédion, Treutan, Larmor, pointe du Bill) ont été en partie suivis :

A. dates	Effectif	<u>Sterne pierregarin</u>	B. dates	Effectif
11/06	3	A. Blavet maritime / Locmiquélic B. Sterne pierregarin, Damgan (Morbihan) : juin-novembre 2003	29/06	7
09/07	15		14/07	10
19/07	65		15/07	15
29/07	12		25/07	50
29/08	5		26/08	20
06/09	8		07/09	15
10/09	4		08/09	15
30/09	5		11/09	40
09/10	2		15/09	15
10/10	10		21/09	5

Après 2 Sternes caugeks le 01/08, l'étang du Cranic accueille 5 Pierregarins (4 adultes et 1 juvénile) le 11/08, observation qui reste tout aussi rare sur ce site bien que l'espèce se reproduise à environ 9 kilomètres de là en rivière d'Etel.

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

(1 donnée)

Une seule donnée : un juvénile se repose le 03/09/2003 sur les roches des Saisies à Gâvres.

Sterne naine *Sterna albifrons*

(13 données)

Une seule mention au printemps : 1 le 08/06/2003 à proximité de la colonie de Sternes pierregarins d'Iniz er Mor / Saint-Hélène.

Le passage post-nuptial est bien noté en septembre avec 7 données et les plus gros effectifs sont relevés sur les sites de Damgan.

Lieu-dit	Treutan	Treutan	Foisigo /Larmor	Treutan	Treutan	Treutan	Pointe du Bill	Treutan
Date	25/07	29/07	10/08	07/09	08/09	10/09	11/09	15/09
Effectif	10	5	3	15	5	10	35	8

Sterne naine, Damgan (Morbihan) : juillet-septembre 2003

Les dernières sont notées en baie de Locmalo / Gâvres : 2 le 18/09 et 1 le 25/09.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus*

(1 donnée)

Un individu de premier été passe à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 08/07/2003.

Guifette noire *Chlidonias niger*

(12 données)

Une seule mention lors du passage prénuptial : 1 le 14/04/2003 à la barre d'Etel.

Le passage postnuptial se déroule du 17/08 au 09/10 sur les sites suivants : étang du Cranic / Brec'h (1 juvénile du 16 au 23/09), plage de Kérouriec / Erdeven (1 le 17/08), Kerouarc'h / Locmariaquer (1 le 28/08 et le 11/09), Le Gouarde / Nostang (1 le 28/09). Seul le site de Sterbouest / Locmiquélic se démarque de ces observations à l'unité : 1 seul juvénile le 23/09, mais 6 individus le 30/09 et 4 le 09/10.

Alcidae sp.

(1 donnée)

3 en vol vers l'est lors d'un guet à la mer le 05/08/2003 à la pointe des Saisies / Gâvres.

Guillemot de Troïl *Uria aalge*

(5 données)

Un cadavre mazouté dans l'anse de Ty Douar / Locmiquélic le 16/2003/2003. 24 guillemots comptés lors d'une traversée entre Lorient et Groix le 21/2003. Un oiseau devant la pointe de Porh-Lineneu / Erdeven le 30/2003, 2 à Porcoubar / Ploemeur le 01/04. Un individu en baie de Quiberon le 01/06.

Pingouin torda *Alca torda*

(4 données)

Le 26/2003/2003, 1 un peu mazouté devant les Grands Sables / Groix. Rien ensuite jusqu'au 02/11 où 1 est observé dans le port d'Etel. 60 sont vus quittant la baie de Quiberon vers Belle-Île le 06/11. Une observation dans le golfe : 1 avec un hameçon dans le bec le 08/11 à l'île de Berder / Larmor-Baden.

AR VRAN MORBIHAN N° 27

Groupe n°5 Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick PHILIPPON

Pigeon biset *Columba livia*

(6 données)

Toutes les données sont postérieures au 03 août. Celles du 04/08/2003 à Sarzeau (Grand Mont et Suscinio) concernent certainement la population nichant dans le château de Suscinio dont les individus se dispersent jusqu'à Surzur en automne et hiver. Vingt et un "de forme urbaine" fréquentent la carrière de Plumelin le 03/08/2003. Quant à l'observation à Pen Mané / Locmiquélic de 100 individus (par groupes de 5 à 15) arrivant du NNW vers la rade de Port-Louis, ne s'agirait-il pas d'un retour de concours pratiqués régulièrement par les colombophiles ?

Pigeon colombin *Columba oenas*

(13 données)

Quatre observations en période de reproduction à la carrière de Plumelin, jusqu'à deux chanteurs. Cinq individus vus au nord du bourg de Brandérion le 30/06/2003 sur un site où nidifie le Pic noir. Des mouvements sont sensibles à l'automne : 2 et 3 à Kerminihy / Erdeven les 07-08/11 et un total de 100 à Tremoyec / Surzur le 14/11.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

(48 données)

Bien présent dans tout le département. Des regroupements existent encore (30 le 01/04/2003 à Neulliac) alors qu'un juvénile volant est observé le 04/04 à l'étang de la Forêt / Brandivy, traduisant une ponte en février ! La construction de nid est observée début septembre (les 05 et 07/09 à Vannes).

Plusieurs regroupements en juillet, août, septembre ; puis la migration est remarquée le 04/11 avec 200 plein sud à Keranroué / Erdeven alors que le 22/10 175 remontaient vers le nord à Kerhostin / Saint-Pierre-Quiberon, mouvement local.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

(16 données)

Données provenant de l'ensemble du Morbihan. Regroupements de 15 à 30 individus dans les chaumes de maïs en octobre 2003 (Brec'h, Langeant, Plouhinec). Un couple pond le 03/10 dans un jardin mais arrêtera la couvaison le 11/10.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

(53 données)

Le premier chanteur est à Kergollaire / Languidic le 17/04/2003 et un individu est encore sur le site le 08/10. En avril, les migrateurs sont notés à l'unité sur cinq sites. En mai sur treize sites. A partir de juin, l'espèce est notée sur l'ensemble du département. En août et début septembre, des concentrations sont notées : 70 le 13/08 à Kergall / Surzur sur des chaumes, 30 le 08/09 au Prieuré / Plouhinec. La dernière est vue le 16/10 au Petit Loch / Guidel par deux personnes, soit 1 mois plus tard qu'en 2002.

Perruche à collier *Psittacula krameri*

(1 donnée)

Une le 20/09/2003 à Kermoran / Bubry.

Coucou gris *Cuculus canorus*

(70 données)

Avec dix données dans la deuxième décade de mars, la migration est lancée. En avril (23 données), deux pics migratoires se dessinent: entre le 01 et le 06 puis du 21 au 25. Enfin le dernier chanteur est entendu le 09/06/2003 sur le territoire de la commune de Camors.

Effraie des clochers *Tyto alba*

(15 données)

Notée à Locoal-Camors / Camors dans le clocher de la chapelle (13 et 19/07/2003 puis le 22/10), à Ty Rhu / Locoal-Mendon (27/09 et 24/10), dans une ruine à Goëven / Languidic le 13/06.

Quinze données concernent des chocs contre véhicule pendant la période : Brec'h (3 chocs), Guénin (2 lieux-dits), Languidic (2 lieux-dits), Noyal-Pontivy, Pluméliau (3 lieux-dits), Sarzeau.

Chevêche d'Athéna *Athena noctua*

(3 données)

Données de moins en moins nombreuses d'année en année. Défaut de prospection ou raréfaction de l'espèce ? L'espèce n'est contactée que dans l'ouest du Morbihan : 2 individus crient sans chant nuptial le 01/04/2003 à Saint-Thomin / Nostang et 1 le 23/10 à Légevén / Nostang, lieu-dit situé à environ deux kilomètres. 1 le 04/07 à Kergaton / Merlevenez.

Chouette hulotte *Strix aluco*

(22 données)

L'espèce est entendue et/ou observée à Baud, Belz, Brandivy, Brec'h, Camors (bourg et forêt), Kervignac, La Chapelle-Neuve, Les Forges, Nostang, Pluméliau, Pont-Scorff, Sainte-Brigitte, Sarzeau, Vannes...

Hibou moyen-duc *Asio otus*

(7 données)

Un chanteur le 15/03/2003 en forêt de Floranges / Camors et à Ty Rhu / Locoal-Mendon. Noté nicheur à Ty Rhu / Locoal-Mendon (01/05, jeunes au nid et 17/05 hors du nid) et à Kerascouet / Languidic (3 jeunes le 21/05).

Hibou des marais *Asio flammeus*

(1 donnée)

Migration automnale marquée par un individu à la Rougeraie / Lanouée le 20/09/2003.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

(25 données)

Aucun chanteur le 21/04/2003 sur les sites connus autour de Vannes. Premier contact le 01/05 en forêt de Floranges / Camors. Sa présence en période de nidification est constatée sur les communes de Baud, Brec'h, Camors, La Chapelle-Neuve, Elven,

Erdeven, Languidic, Locol-Mendon, Sainte-Hélène, Sérent. Le dernier chanteur se manifeste le 24/08 à Le Gouvello / Sainte-Brigitte.

Martinet noir *Apus apus*

(21 données)

Le 15/04/2003 les 10 premiers arrivent à Inzinzac-Lochrist. Dates d'arrivées des années antérieures: en 2001, le 10/04 et le 25/03 en 2002. Entre le 15 et le 18 avril, l'espèce est vue à l'unité ; puis du 20 au 28/04 des groupes de 50 à 120 sont vus à Baud, Brandérion, Erdeven, Josselin, Ploemeur, Vannes. A partir de fin mai (le 28/05 à Nostang) les martinets recherchent leurs sites de nidification. L'espèce est présente sur tout le département.


La migration de retour débute le 27/07 avec ces 300 individus en vol vers le sud-est à l'étang du Cranic / Brec'h. Conformément aux années antérieures, avec des départs massifs au début d'août, des groupes de migrateurs sont observés à Pénérif / Damgan (25 le 03/08) et à Kervoyal / Damgan (50 le 06/08). Dernier individu vu le 22/08/03 au centre ville de Muzillac.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(133 données)

Un record ! 133 données du 16/03 au 14/11/2003 concernant cinquante sites situés aussi bien sur le littoral que sur les étangs et cours d'eaux de l'intérieur. Les données de mars à juin concernent 1 individu vu à chaque fois sur les étangs ou rivières des communes de Baud, Brandivy, Brec'h, Gestel, Guégon, Guéhenno, Josselin, Priziac, et Réguiny.

La nidification est trouvée uniquement à Brandivy (étangs de la forêt) le 11/07.



Martin-pêcheur d'Europe (Morbihan) : données 2003

En juillet, bien qu'il s'agisse toujours d'un individu par observation, la fréquence des données s'amplifie à compter du 11/07 sur 11 sites dont les lagunes de stations d'épuration (le 16/07 lagunes de Damgan, le 23/07 lagunes de Theix). A compter du 15/08, les observations concernent plusieurs individus vus ensemble sur le même site (8 le 16/08 sur les étangs de Branguily / Gueltas) et de nouveaux sites sont fréquentés, en particulier le bord de mer (4 ensemble le 07/09 à Larmor / Damgan, 3 le 13/09 à l'île Berder / Larmor-Baden).

L'étang du Stum / Saint-Barthélemy retrace l'erratisme estival et la migration de septembre et d'octobre : 2 individus en août (17/08) puis 5 le 15/09, 6 du 09/10 au 06/11 et 5 le 10/11/03. En novembre l'espèce est présente, en nombre plus faible sur les sites classiques d'hivernage.

Huppe fasciée *Upupa epops*

(12 données)

Première observation le 01/04/2003 à La Ville Pierre / Sérent, puis 2 individus sont vus le 08/06 aux tourbières de Sérent, distantes de 1,5 km du premier lieu-dit. Entendue quotidiennement à Ty Rhu / Locoal-Mendon, à partir du 21/05. Deux individus vus les 12/06 et 20/08 à la Rougeraie / Lanouée ainsi que deux individus du 01 au 05/07 à Kergollaire / Languidic. Une en vol le 09/07 à Kerdreven / Crac'h. Un individu contacté le 09/06 et le 04/07 à Kerdavid / Sainte-Hélène et 1 le 18/06 à BodaveI / Camors sans contact ultérieur.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

(4 données)

Pas de données concernant la migration de printemps. Un le 29/08/2003 aux lagunes de Damgan et 1 du 05 au 07/09 à Ty Rhu / Locoal-Mendon.

Pic vert *Picus viridis*

(53 données)

Contacté sur 23 communes du département comme nicheur ou en simple présence.

Pic noir *Dryocopus martius*

(48 données)

Certaines observations concernent plus d'un contact (visuel ou auditif) par site. Comportement de nicheur le 26/03/2003 au Ter / Ploemeur ainsi qu'à Kerfrezec / Sainte-Hélène le 20/04.

Il ne semble pas y avoir de nouveaux sites occupés par l'espèce en 2003 en comparaison des données de 2001 et 2002 pour la même période. Ainsi l'espèce est vue en forêts de Pontcalleck (Berné), de Floranges (Camors), de Lanouée et dans les landes de Lanvaux (Sérent, Molac, Questembert...). Les bois et parcs des communes de Baud, Brandérion, Brandivy, Campénéac, Erdeven, Gestel, Guégon, Gueltas, Landaul, Languidic, Locoal-Mendon, Meucon, Persquen, Plouhinec, Plumelec, Quily, Sarzeau accueillent la présence d'au moins un oiseau (cantoné et/ou en dispersion) toute l'année, exploitant, *a priori*, un vaste territoire.

Pic épeiche *Dendrocopos major*

(40 données)

Les données proviennent d'observations ou de l'écoute dans les communes de Belz, Berné, Brandérion, Brandivy, Brec'h, Bubry, Camors, Gueltas, Landaul, Languidic, Larmor-Baden, Merlevenez, Nostang, Plouay, Pont-Scorff, Saint-Barthélemy, ainsi que dans tous les massifs forestiers.

Il est noté nicheur à Kerlapined / Landaul le 08/05/2003, un couple niche à la Madeleine / Belz le 22/05 ; le 25/05, une femelle transporte de la nourriture au Grégo / Surzur, une autre le 28/05 à Beg er Lann / Merlevenez.

Pic mar *Dendrocopos medius*

(2 données)

Noté en forêt de Lanouée (les Cinq-Chemins) le 13/04/2003. La donnée du 20/06 à Callac / Plumelec est intéressante par son éloignement des sites connus et à approfondir.

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

(1 donnée)

Les observations se répartissent entre le 17/06 et le 09/11/2003. Le couple observé le 17/06 à La Faisanderie / Brandérion sera en compagnie de 2 juvéniles le 28/08, seule preuve de nidification pour cette année. Du 09 au 12/07, un mâle chante dans le parc de Ménimur à Vannes et un individu à Lasné / Saint-Armeur le 13/07. Entendu en septembre à Guégon (17 et 18/09 en deux endroits différents) et 1 le 09/11 au moulin de Saint-Yves à Cléguer.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(2 données)

Deux observations en avril : 1 le 06/04/2003 plage des kaolins / Ploemeur et 1 le 23/04 au Petit Loch / Guidel.

Alouette lulu *Lullula arborea*

(52 données)

Les chanteurs se manifestent dès le 20/03/2003 à raison d'un individu par site. (Languidic, Locol-Mendon, Locmiquélic). En avril, chaque site comptabilise 2 à 3 chanteurs (Locol-Mendon, Pénestin, Sérent) marquant peut-être un passage. A Camors, l'espèce n'est repérée qu'à compter de mai alors que les sites sont régulièrement prospectés. Pendant les mois de mai et juin, les données, peu nombreuses (6) apportent des sites supplémentaires, comme le Grégo / Surzur (le 25/05) ou l'étang du Cranic / Brec'h le 25/06.

Les chanteurs se manifestent à nouveau en septembre, dans la seconde décade, (Surzur: 3 individus à Sainte-Anne Grapon et 2 à Pentès le 27/09) traduisant peut-être un mouvement migratoire, alors que les autres sites restent stables en effectif. La migration est très faible (1 à 4 individus) les 01, 04 et 07/11 à Kerminihy / Erdeven alors que 6 chanteurs ensemble sont entendus le 06/11 au Haligan / Concoret et 7 le 11/11 sont sur des chaumes de maïs à l'étang du Cranic / Brec'h.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

(65 données)

Espèce présente sur l'ensemble du département, avec des densités élevées sur les dunes côtières comme en attestent les groupes de 3 à 10 chanteurs entendus entre mars et juin à Erdeven, Locmiquélic, Plouhinec. Le premier nid est trouvé à Kergollaire / Languidic le 12/04/2003 tandis qu'un adulte nourrit le 16/07 au Lenn / Damgan.

Les regroupements semblent se dessiner dès le 30/07 avec 20 individus dans la lande au Fort-Bloqué / Ploemeur, se poursuivent en septembre (12 le 10/09 au Lenn / Damgan). La dernière décade d'octobre, et surtout début novembre, la migration est observée en bordure de côte à Kerminihy / Erdeven : 41 le 28/10, 25 le 04/11, 186 le 07/11. Dans les terres, à noter 70 individus le 10/11 à La Pointe / Guégon et 150 le 13/11 à Bocneuf la Rivière / Lanouée.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

(54 données)

Arrivée tardive puisque les trois premières sont vues à Kervran / Plouhinec le 16/03/2003. Quelques groupes de 15 à 50 individus ensemble dans la dernière décade de mars (50 le 22/03 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 30 le 29/03 à Pen Mané / Locmiquélic) puis peu de données en avril : quelques individus, y compris sur les sites de nidification.

Les premières constructions de nid sont observées le 04/05 à Kerzine / Plouhinec et à Fétan Lereg / Erdeven le 28/05. En juin, les sites de nidification sont occupés : 21 cavités le 04/06 dans les dunes de Plouhinec, 35 couples le 29/06 aux carrières de Lauzac'h, enfin une colonie très active de 120 nids à la carrière de Quillan / Radenac le 13/07.

Enfin 100 oiseaux sont posés à terre au vannage de l'Isac / Théhillac le 13/07. Un guet à la mer permet de noter les premières migrations : 250 en 2 heures filent vers l'est à la pointe des Saisies / Gâvres le 05/08. Des petits groupes (5 à 15 individus) chassent à Brec'h, Gâvres, Locmiquélic, Theix entre le 18 et le 20/08. Derniers individus contactés à Pen Mané / Locmiquélic le 30/09.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

(125 données)

Le premier adulte est vu le 16/03/2003 au bourg de Saint-Nicolas-des-Eaux / Pluméliau. Jusqu'au 30/03, 1 à 8 individus par données sont repérés sur l'ensemble du département. Hormis un groupe de 200 le 02/04 au Grand Loch / Guidel, avril apporte 25 données comportant une moyenne de 3,5 oiseaux par données. Un groupe de 80 le 02/05 à Pen Mané / Locmiquélic.

En juillet et août, les groupes composés de juvéniles et d'adultes (30 à 100 oiseaux) sont vus un peu partout. Les premiers départs apparaissent début août : 150 restent 3 heures à Bodavel / Camors le 04/08 puis disparaissent, 150 en vol vers l'est en 2 heures de guet à la mer le 05/08 à la Pointe des Saisies / Gâvres, un vol de 500 oiseaux vers le sud à 21h30 à Coët Fournio / Baud, 200 puis 100 le 14/08 à l'étang du Cranic / Brec'h en vol vers le sud. Dans la seconde quinzaine de septembre, les départs sont visibles : 50 le 17/09 à Nostang à la tombée de la nuit, 10 le 20/09 à Lann Plumelin / Plumelin, 11 en vol vers le sud à l'étang du Cranic / Brec'h le 26/09, 30 le 27/09 aux étangs de Branguily / Gueltas, 25 le 27/09 à l'étang de Pont Caden / Surzur. Dernière donnée : 1 à Pen Mané / Locmiquélic le 31/10.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

(47 données)

Les trois premières sont observées le 31/03/2003 à l'Etang-Fleuri / Bubry. Les arrivées s'échelonnent du 22/04 au 07/05, avec des groupes de 30 à 50 individus à Josselin, Ambon, Guégon.

Première construction de nid le 15/05 au bourg de La Trinité Langonnet, 8 nids et des coquilles à terre le 24/05 à Meslan, elle est donnée comme nicheuse à Ambon, Berné, La Roche-Bernard, le Petit Lambel / Camors, Nostang... Un recensement des nids occupés au bourg de Brandérion en dénombre 41 le 13/06. Nourrissages : le 03/09 au nid au bourg de Landévant et le 06/10 aux anciens marais salants de Carnac.

En août et septembre, les groupes se forment : 200 le 07/08 au Champ des Martyrs / Brec'h ; 35 le 18/08 aux lagunes de Theix, 70 au Chemin de Cornevec / Brandivy le 02/09. Les migrants : 20 le 20/09 en vol direct vers le sud à Lann Plumelin / Plumelin, 15 le 27/09 à l'étang de Pont Caden / Surzur. Dernière observation : 2 le 11/10 au Bois d'Amour / Plouharnel.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

(17 données)

Premier individu repéré au chant le 26/03/2003 en forêt de Paimpont / Campénéac. Trois données en avril pour les communes de Languidic, Saint-Guyomard et Sérent. L'espèce est ensuite notée en mai et juin sur les communes de Brandivy, Camors, Languidic, Locol-Mendon, Sainte--Brigitte, Tréhorenteuc. Dernier individu le 13/09 sur l'île Berder / Larmor-Baden.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

(72 données)

Bien présent au moins sur le littoral en mars et avril par groupes de 3 à 10 individus : Erdeven (4 stations), Plouhinec et Camors. En mai, les nicheurs locaux sont vus sur les mêmes sites. En juin, il est noté à Neulliac le 28/06/2003 où 2 individus alarment et à Campénéac, dans le camp de Coëtquidan le 09/06.

Le premier dortoir, comprenant 25 à 30 individus dormant dans l'obione (Le Foisigo / Damgan) est repéré le 31/07 tandis que, dès le 11/09, des groupes de 10 à 50 oiseaux se constituent sur les communes de Locmariaquer, Erdeven, Gâvres, Locmiquélic. Les arrivées de migrateurs s'intensifient en octobre (28 données avec une moyenne de 15 individus par observation), les oiseaux fréquentant les landes à bruyères, les bois clairs de conifères, quelquefois en compagnie de Bergeronnettes grises. Les données obtenues par l'observation de la migration à Kerminihy / Erdeven, apportent quelques enseignements: les 28/10, 01/11, 04 et 07/11, ce sont plus de 200 oiseaux, par vols de 20 à 50 qui sont notés.

Pipit maritime *Anthus petrosus*

(20 données)

Nicheur à Mané Hellec / Sainte- Hélène (jeunes non volants le 03/06/2003) ; le 09/06 2 adultes nourrissent à 2 endroits différents à Penerf / Damgan. Fin septembre, plusieurs individus sont vus ensemble : 30 en 2 sites à Gâvres le 29/09.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

(7 données)

Données comprises entre le 20/10 et le 14/11/2003 dont 6 le 20/10 à l'étang au Duc / Ploërmel et 4 le 14/11 à l'étang du Cranic / Brec'h.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

(25 données)

A Fougeu / Erdeven, le premier mâle est entendu le 22/03/2003. A partir du 19/04, l'espèce est plus présente à Sarzeau, Plouharnel, Ambon, Locmiquélic. Dans le marais de Pen Mané / Locmiquélic, 1 juvénile avec ses parents le 18/06. L'erratisme et la migration post-nuptiale sont marqués par 12 individus à Pen Mané / Locmiquélic (7 adultes et 5 juvéniles), 23 le 13/09 à Kergollaire / Languidic. La dernière est vue le 27/10 à la flèche de Gâvres / Gâvres.

Bergeronnette flavéole *Motacilla flavissima*

(2 données)

Deux le 29/08/2003 à Pen Mané / Locmiquélic et 1 mâle le 16/09 à Kerminihy / Erdeven

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (67 données)

25 communes sont concernées par au moins une observation (29 en 2002), l'espèce est bien implantée sur le littoral mais aussi dans l'intérieur, en particulier le long des canaux et rivières. Sa nidification est prouvée le 03/05/2003 à Saint-Barthélemy, en deux endroits le long du Blavet et le 24/07 à Kergollaire / Languidic (2 adultes et 3 juvéniles). Fin octobre l'erratismo ou la migration se remarquent au Stum / Saint-Barthélemy avec un maximum de 4 individus le 28/10.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (98 données)

L'espèce est notée nicheuse sur l'ensemble du département pendant la période, aussi bien sur le littoral (Sarzeau, Locmiquélic, Languidic, Le Hézo) qu'à l'intérieur (Camors, Saint-Barthélemy, Les Forges, Ploërmel, Gueltas). Quelques regroupements en fin d'été : 15 le 16/08/2003 aux étangs de Branguily / Gueltas, 35 le 01/09 à l'étang de la forêt / Brandivy, 40 à Pen Mané / Locmiquélic le 19/09. Migration observée les 11/10, 28/10, 04 et 07/11 à Kerminthy / Erdeven. Pas de dortoirs importants remarqués mais des rassemblements à la tombée du jour à Damgan, Brandérion, à Bubry (70).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrelli* (6 données)

Observée entre le 07/10 et le 14/11/2003 sur les communes de Brec'h, Guidel, Locmariaquer, Saint-Barthélemy.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (34 données)

Bien présent (ZNIEFF, avifaune forestière, STOC EPS....).

Accenteur mouchet *Prunella modularis* (18 données)

Noté sur l'ensemble du département. 6 sur 600m le 22/03/2003 à Fougueu / Erdeven. Nidification en mai (04/05) et juillet (08/07) respectivement à Plouhinec et Camors ;

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (37 données).

Nicheur en avril à Camors et une famille en juillet à Campénéac. Présent sur l'ensemble du département.

Noté comme "abondant et présent partout" sur Belle-Ile le 10/11/2003 : un mouvement migratoire ?

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (44 données)

Arrivée en nombre dès le 19/03/2003. Les trois premiers chanteurs sont dans les marais de Suscinio / Sarzeau le 19/03/03, simultanément sur les dunes du Magouër au sémaphore / Plouhinec (7 le 25/03), Pen Mané / Locmiquélic (5 le 29/03). En avril, chaque observation apporte un minimum de trois oiseaux sur les secteurs précédents plus Brec'h, Erdeven, Gâvres, Pénestin. Le 22/05 sur les dunes de Plouhinec, deux couples sur trois sont nicheurs alors que le 15/06 un jeune quémante sa nourriture à Kersahu / Gâvres. Dernière observation d'un juvénile le 27/08 au Petit Loch / Guidel.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

(21 données)

Présent pendant toute la période et comme nicheur sur les communes de : Allaire, Baud, Brandérion, Elven, Erdeven, Etel, La Croix-Helléan, Locmiquélic, Ploërmel, Plumelin, Quiberon, La Roche-Bernard, Saint-Pierre-Quiberon, Sarzeau, Sérent, Vannes.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

(3 données)

Migration de printemps: 1 le 11/05/2003 aux Cinq Chemins / forêt de Lanouée.

Migration d'automne: 1 le 05/09 à Ty Rhu / Locoal-Mendon et 1 le 13/09 chemin de Cornévec / Brandivy.

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

(31 données)

Un très bon passage aux deux saisons en 2003, particulièrement cerné dans le temps à l'automne.

Trois données concernant la migration de printemps : 1 couple le 26/03/2003 à la Faisanderie / Brandérion, Imâle le 12/04 à Goeven / Languidic et 4 (2 mâles et 2 femelles) le 18/04 plage de Lomer / Pénestin.

28 observations, du 09/08 au 30/09 : premier individu pris au filet le 09/08 dans les marais de Suscinio / Sarzeau, alors que 4 étaient le même jour à Pen Mané / Locmiquélic. 28 sur les dunes de Kerminihy / Erdeven le 31/08.

L'espèce est vue 21 fois en septembre à Brandivy, Camors, Damgan, Erdeven, Gâvres, Guégon, Languidic, Locmiquélic, Locoal-Mendon et Plouhinec. 16 le 13/09 à an Telen Kervégant / Plouhinec, 25 à Kerminihy / Erdeven le 16/09 et 30 le 19/09 sur une zone de remblais à Pen Mané / Locmiquélic. Du 20 au 30/09, 3 données uniquement concernant 1 ou 2 individus par sites. L'espèce disparaît ensuite.

Tarier pâle *Saxicola torquata*

(70 données)

Vu (et noté !) sur 24 communes : Ambon, Baud, Belz, Brandivy, Brec'h, Camors, Erdeven, Gâvres, Guégon, Guidel, Inguiniel, Languidic, Larmor-Plage, Locmariaquer, Locmiquélic, Nivillac, Ploemeur, Plouhinec, Quily, Saint-Gildas de Rhuys, Saint-Marcel, Sarzeau, Sérent, Tréhorenteuc. La nidification a lieu dès avril (nid avec ponte le 01/04/2003 à Landrezac / Sarzeau, transport de nourriture le 21/04 à Crucuno / Erdeven), les jeunes sont émancipés en mai (le 03/05 à Kergurune / Languidic), en juin (déchetterie de Belz le 14/06). Des jeunes "à peine volants" le 21/07 à Kersahu / Gâvres sont peut-être issus d'une seconde ponte.


En septembre, les regroupements postnuptiaux sont sensibles (16 entre Kerminihy et Kerouriec / Erdeven le 02/09, 20 le 26/09 à La Falaise / Erdeven). Un mouvement migratoire se dessine en octobre (30 le 10/10 à Kerminihy / Erdeven), alors qu'ensuite, une moyenne de 6 oiseaux par observation est enregistrée.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

(62 données)

Un maximum de 5 individus ensemble le 25/03/2003 dans les dunes de Plouhinec, 8 le 03/05 (deuxième vague de migration ?) et encore 4 le 18/06 sur le même site, sont les principales caractéristiques de la migration de printemps. L'espèce est notée sur les communes de Erdeven, Gâvres, Guidel, Larmor-Plage, Locmiquélic, Ploemeur, Plouhinec, Sarzeau. 2 couples alarment le 14/07 sur les dunes de Plouhinec.

Si deux individus sont le 31/07 sur la digue de Pen Mané / Locmiquélic, la migration est lancée à partir du 13/08 avec 1 juvénile à Port Groix / Surzur et 3 (dont 1 juvénile) le 16/08 au Lenn / Damgan. Pic migratoire du 26/08 au 08/09 : 3 le 26/08 à Beg Lann / Sarzeau, 12 le 29/08 à Pen Mané / Locmiquélic, 12 le 30/08 à Larmor / Damgan, 20 entre Kerminihy et Kerouriec / Erdeven, et 50 le 04/09 à la Falaise / Erdeven. Le deuxième passage, plus faible, a lieu du 15/09 au 29/09. Hormis 30 le 16/09 à Kerminihy / Erdeven, les données fournissent 1 à 5 individus par site et date sur les communes de Damgan, Gâvres, Languidic, Locmiquélic. Dernière observation le 11/10 à Kergollaire / Languidic.



Traquet motteux, nombre de données (Morbihan) ; mars – novembre 2003

TURDIDAE

- 120 le 26/10/2003 au Bois d'Amour / Plouharnel, en une bande en vol vers le sud est, 1 h après le lever du jour, Grives mauvis probables.
- Le 08/11/2003, dans les dunes de Plouharnel, passage vers l'est de bandes de quelques unités entre 10h00 et 11h30 surtout des Grives mauvis ; au sol : abondance de Merles noirs, Grives musiciennes et mauvis plus discrètes.

Merle noir *Turdus merula*

(44 données)


Contacté partout. Augmentation du nombre d'individus vus à chaque observation (plus de 20) à partir du 12/11/2003.

Grive litorne *Turdus pilaris*

(34 données)

La migration pré-nuptiale est peu remarquée : 3 données en mars (Camors et 50 le 27/03/03 à Kergal / Languidic) et 1 en avril (2 le 27/04 à Prat Locoal / Camors).

L'observation de la migration post-nuptiale dans un verger à Bodavel / Camors fait apparaître les mouvements migratoires sur la période.



Grive litorne, verger à Bodavel / Camors (Morbihan) ; automne 2003

Grive musicienne *Turdus philomelos*

(32 données)

Deux observateurs pour cette espèce sur la période ! Nicheur sur l'ensemble du département. Migration observée à partir du 28/10/2003 à Kerminehy / Erdeven.

Grive mauvis *Turdus iliacus*

(19 données)

Migration printanière : observée uniquement en forêt de Paimpont / Campénéac le 26/03/2003 avec plus de 300 individus passant NNW-SSE par groupes de 10 à 15 individus.

Migration automnale : passage détecté le 17/10/2003 à Augan avec 15 individus. Des bandes d'une dizaine d'individus sont vues ensuite à Brec'h, Camors, Locoal-Mendon, Locmiquélic, Plouharnel jusqu'au 1^{er} novembre. Du 04 au 09/11, les contacts auditifs et visuels se multiplient sur le département. A signaler les 99 en 20 minutes à Sainte-Anne du Scorff / Plouay le 07/11.

Grive draine *Turdus viscivorus*

(32 données)

Chanteurs et nicheurs pendant la période à Brec'h, Bieuzy, Brandivy, Brandérion, Bubry, Camors, Crac'h, Erdeven, Languidic, Larmor-Baden, Ploërmel, Pont-Scorff, Saint-Barthélemy, Surzur, Theix.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

(104 données)

A Locmiquélic : 5 le 21/03, 8 le 29, 10 le 19/04, 6 le 23/04, pour 3 à 4 individus en période de reproduction. A la Falaise / Erdeven : 10 le 12/04.

Les effectifs contactés en septembre et octobre sur les 15 sites régulièrement suivis, ne permettent pas une analyse des mouvements automnaux.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

(63 données)

Stabilité des données par rapport à 2002, mais uniquement en secteur côtier, sauf une donnée

dans les tourbières de Kerfontaine / Sérent. En juillet et août, les visites dénombrent de 1 à 5 chanteurs sur les sites appropriés à la nidification. L'erratisme des non nicheurs est remarqué dès juillet comme cet individu chanteur le 06/07 aux lagunes de Bézit, non revu par la suite. 4 les 01 et 04/11 dans les dunes de Kerminihy.

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

(7 données)

Passage de printemps noté cette année avec cinq données entre le 19/04 et le 03/05/2003 regroupant 6 chanteurs sur les sites de : Loperhet / Erdeven, Pen Mané / Locmiquélic, Kerfrézec / Sainte-Hélène, Kerfontaine / Sérent. En juillet, la tourbière de Kerfontaine / Sérent accueille cette espèce le 25/07.

Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides*

(10 données)

Six sites regroupent ces 10 données comprises entre le 10/04 et le 11/06/2003 où un seul individu est contacté par observation : étang du Cranic et basse vallée du Loch / Brec'h, la Falaise et étang de Kéraveon / Erdeven, Pen Mané / Locmiquélic, étang de Kervran / Plouhinec.

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

(4 données)

Les opérations de baguage permettent de contacter l'espèce : 1 le 03/08/2003 et un autre le 09/08 dans les marais de Suscinio puis un chanteur le 12/09 au même endroit. 1 le 18/09 à Pen Mané / Locmiquélic.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

(45 données)

Premier chanteur le 23/03/2003 à Kersahu / Gâvres. Les 28 données d'avril et mai montrent une moyenne de 3-4 chanteurs par observations et concernent les communes de Brec'h (étang du Cranic), Brandivy (étang de la forêt), Erdeven (étang de Loperhet, Fétan-Lereg, Fougueu, er Varquez, la Falaise), Guidel (Petit Loch), Locmiquélic (Pen Mané), Locoal-Mendon (étang de Saint-Jean), Plouharnel (station d'épuration), Ploemeur (Lannéec), Plouhinec (étang de Kerzine), Sarzeau. C'est autour du 12/04 que le maximum d'arrivée est noté à la Falaise / Erdeven avec 12 chanteurs. Nidification constatée le 04/05 à Kerzine / Plouhinec.

15 à 20 le 09/08 à Pen Mané / Locmiquélic, en période d'émancipation. Dernière le 10/10 à Pen Mané / Locmiquélic.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

(53 données)

Premier chanteur noté le 19/03/2003 (en 2002, le 28/04, le 16/04 en 2001) à Suscinio / Sarzeau. La première arrivée de migrants est marquée à partir du 25/04 (6 dans la basse vallée du Loch / Brec'h et 7 le même jour au baguage dans les marais de Suscinio / Sarzeau pour s'amplifier d'un maximum de 12 chanteurs à l'étang du Cranic / Brec'h le 08/05.

Le 30/06, un transport de nourriture est noté dans la roselière du Scave / Quéven, puis des nourrissages vus au Cranic / Brec'h, à Pen Mané / Locmiquélic, à Fétan Lereg / Erdeven en juillet et août.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*

(17 données)

Premier individu vu le 30/04/2003 à Launay / Quily. 4 le 02/06 à l'étang des basses landes / Saint-Marcel. Deux juvéniles sont nourris le 01/08 à Roscouedo / Inguiniel

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

(33 données)

Notée sur les communes de Belz, Pluméliau, Brandivy, Brec'h, Camors, Erdeven, Gâvres, Locmiquélic, Pénestin, Saint-Marcel, Saint-Pierre-Quiberon, Surzur, Tréhorenteuc. Nidification réussie à la déchetterie de Belz le 23/06/2003 avec nourrissage.

Fauvette grisette *Sylvia communis*

(33 données)

La première le 30/03/2003 à l'étang de Noyalo, puis notée à l'unité en avril. 8 chanteurs sont entendus le 03/05 dans les dunes de Plouhinec. La nidification a lieu à Long Champ / Baud le 17/06, le 10/07 à l'étang du Cranic / Brec'h. Dernier individu vu le 29/08 aux lagunes de Damgan.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

(17 données)

Premiers chanteurs le 15/04/2003 à Goeven / Languidic puis 3 le 20/04 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon et 3 le 25/04 lors du baguage dans les marais de Suscinio. L'espèce est aussi contactée à Brandivy, Languidic, Quily, Theix, Tréhorenteuc.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

(39 données)

Bien implantée dans tous les secteurs du département et présente dans les opérations "Avifaune Forestière".

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

(2 données)

Deux le 20/09/2003 à la lande de Saint-Yves / Bubry.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

(4 données)

Curieusement, aucune donnée de printemps, mais toutes concernent la migration post nuptiale: 1 le 16/08/2003 au Stum / Saint-Barthélemy, 1 le 20/08 à Pen Mané / Locmiquélic, 2 le 31/08 à le Cosquer / Erdeven et 1 le 13/09 sur l'île Berder / Larmor-Baden.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

(70 données)

L'espèce est déjà en nombre le 19/03/2003 avec 25 individus à l'étang de la forêt / Brandivy, 25 le 25/03 dans les dunes de Plouhinec, est bien présente lors des opérations "Avifaune Forestière".

Un couple nourrit 3 juvéniles volants dans un jardin à Vannes du 26/05 au 01/06, 3 juvéniles le 31/07 à Bodavel / Camors. Migration (ou regroupements) observée à partir de fin août (20 aux lagunes de Bonnervo / Theix le 31/08) et début septembre (30 le 02/09 chemin de

Cornévec / Brandivy). Seconde vague dans la seconde quinzaine de septembre (30^{ie} 19/09 et 20 le 30/09 à Pen Mané / Locmiquélic) diminuant d'intensité jusqu'au 15/10. A partir de mi octobre, les contacts vont en diminuant (2 à 3 individus par observation).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

(40 données)

Arrivée précoce en 2003 : premier chanteur le 16/03/2003 à Kermoran / Bubry puis 2 le 23/03 aux lagunes de Damgan et 2 le 28/03 à Les Placieux / Augan et 1 le 30/03 à Kercran / Plouhinec. Il faudra attendre le 10 avril pour contacter encore l'espèce (3 à l'étang du Cranic / Brec'h), mois au cours duquel 5 observations seront faites (Erdeven, Campénéac, Saint-Guyomard). 3 données de mai dont 5 chanteurs cantonnés au Moulin des Moines / Tréhorenteuc le 07/05, sans preuve ultérieure de nidification pour ces données.

La migration postnuptiale débute dès le 02/08 avec 1 oiseau 10 secondes dans un jardin à Penerf / Damgan, 2 le 16/08 au Stum / Saint-Barthélemy, 1 le 22/08 à Penerf et 1 le 28/08 à Ty Rhu / Locoal-Mendon. 12 données en septembre. Enfin 3 le 15/10 à Kerguelen / Larmor Plage.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

(24 données)

Présent lors du recensement "Avifaune Forestière" du 18/05/2003. 2 familles nourrissent le 12/07 dans le parc urbain de Ménimur à Vannes et 2 juvéniles le 16/08 au Stum / Saint-Barthélemy. Groupes de 2 à 10 individus à partir de fin octobre.

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapillus*

(5 données)

L'espèce fréquente Brandérion, Inguiniel, Larmor-Baden et Locoal-Mendon. A noter 4 chants le 13/09/2003 sur l'île Berder / Larmor-Baden.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

(14 données)

Rarement plus d'un individu par observation. Les données de juillet à Bubry, Gueltas, Ploërmel, Rochefort-en-Terre, Taupont, Vannes peuvent laisser supposer une nidification. L'erratisme ou la migration sont peu remarqués : 8 données en août et septembre sur les secteurs de Guégon, Inguiniel, Locoal-Mendon, Pont-Scorff, Saint-Barthélemy.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

(27 données)

L'observation de 2 individus (1 femelle et 1 mâle ?) à la déchetterie de Belz le 07/06/2003, mais absents le 08/06, concerne-t-elle des migrateurs attardés ?

La migration postnuptiale est bien notée cette année. Le 19/08, 1 adulte et 1 juvénile sont présents à Brandivy tandis que 3 à 5 oiseaux par observation et site fréquentent les secteurs de Penerf / Damgan, parc de Ménimur / Vannes ou les lagunes de Bonnavo / Theix. Du 2 au 18/09, l'espèce se signale par 1 individu par observation sur le département, sauf 6 ensemble le 11/09 à la Faisanderie / Brandérion. Dernier vu le 01/11 parc de Ménimur / Vannes.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

(9 données)

3 sites principaux visités : Pen Mané / Locmiquélic (6 données : 29/03/2003, 19/04, 17/05, 30/09, 10/10, 31/10 pour 2 à 4 individus), Petit Loch / Guidel (2 données : 5 les 09 et 10/11) et la Pointe de Becudo / Sarzeau (présente le 22/07).

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

(32 données)

Une nidification le 30/05/2003 à la Crozetière en Riantec. A partir du 17/08, les rondes allant jusqu'à 22 individus sont vues sur tout le département. Espèce observée lors du recensement "Avifaune Forestière".

Mésange nonnette *Parus palustris*

(11 données)

Un couple nourrit 2 juvéniles volants le 25/05/2003 au Grégo / Surzur et nidification à Kervily / Languidic. Espèce observée à Brandivy, Brec'h, Bubry, Camors, Les Forges, Locoal-Mendon.

Mésange huppée *Parus cristatus*

(25 données).

Un couple avec 5 jeunes à la Faisanderie / Brandérion le 19/06/2003. Espèce observée autant dans les jardins de ville qu'en milieu campagnard.

Mésange noire *Parus ater*

(1 donnée).

Deux chanteurs le 09/10/2003 en forêt de Floranges / Camors.

Mésange bleue *Parus caeruleus* (32 données) ; **Mésange charbonnière *Parus major*** (23 données) ; **Sittelle torchepot *Sitta europea*** (13 données)..

Toutes ces espèces ont été observées lors du recensement "Avifaune Forestière" et sont bien présentes sur l'ensemble du département.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

(12 données)

Les 11 et 12/07/2003, une famille à Ploërmel et Campénéac. Bieuzy, Brec'h, Brandivy, Bubry, Camors, Erdeven, Gueltas, Languidic, Plouhinec sont fréquentés par l'espèce.

LANIIDAE

(1 donnée)

Un bousier trouvé empalé sur un fil barbelé : passage d'une pie-grièche le 17/08/2003 à Kerpenru / Camors ?

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

(3 données)

Le recensement dans les marais de Redon du 21/06/2003 fait apparaître 15 couples nicheurs sur l'ensemble des marais. 1 couple avec 2 juvéniles à peine volants plus 1 mâle isolé le 15/07 à Aucfer / Rieux.

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

(6 données)

Espèce observée lors du recensement "Avifaune Forestière", présente sur tout le département.

Pie bavarde *Pica pica*

(18 données)

Des regroupements de 10 à 25 individus à partir de septembre sans observation de dortoir.

Choucas des tours *Corvus monedula*

(19 données)

Espèce présente dans plusieurs villes et bourgs du département : Baden, Brec'h, Bubry, Campénéac, Gourhel, Guégon, Gueftas, Languidic, Larmor-Baden, Le Bono, Mauron, Néant-sur-Yvel, Plougoumelen, Quily, Saint-Barthélemy, Sarzeau, Sérent, Vannes.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

(5 données)

Deux le 05/04/2003 à Ménéantoux / Bubry. 20 le 07/06 sur les dunes de Kerouriec / Erdeven. 1 longeant la côte de Penvins vers l'estuaire de la Vilaine le 11/09.

Corneille noire *Corvus corone*

(55 données)

15/06	11/07	19/08	02/09	13/09	21/09	11/10	26/10
40	67	35	30	50	40	+120	60

Corneille noire, Cornévec / Brandivy (Morbihan) ; été - automne 2004

Grand Corbeau *Corvus corax*

(0 donnée)

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

(2 données)

La construction d'un nid est notée dès le 01/04/2003 à Saint-Gérard. Les premiers dortoirs estivaux ont lieu dès le 11/07 (300 à Grandcastel / Ploërmel) ; celui de Penerf / Damgan aura duré du 25/07 au 06/09 avec 1200 oiseaux. A Vannes, les rassemblements commencent autour du 23/09 (300 et plus), mais le dortoir sera "pris en charge par la Ville" en novembre. Près de 1000 (148 posés et 800 en migration en 1 heure) sont notés à Kerminihy / Erdeven le 04/11; 628 le 07/11, période marquant l'arrivée des migrateurs. 8 000 et plus traversent la rade de Lorient en 20 minutes vers l'ouest le 09/11.

Moineau domestique *Passer domesticus*

(12 données)

Moineau friquet *Passer montanus*

(1 donnée)

A l'église de Lanouée, 1 adulte nourrit ses jeunes le 05/06/2003 et 1 à 2 adultes présents également.

FRINGILLIDAE

(5 données)

Le 11/10/2003 244 fringilles passent vers l'est en bandes de quelques unités entre 10h00 et 11h30 ; au sol Pinson des arbres, Verdier d'Europe, Serin cini. 50 maximum en vol vers le sud entre 9h30 et 10h40 à Kerhostin / Saint-Pierre-Quiberon le 22/10. Passage vers l'est de bandes de quelques unités entre 10h00 et 11h30 ; au sol Pinson des arbres, Verdier d'Europe, Serin Cini le 08/11.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

(33 données)

Premiers groupes notés : 150 le 12/10/2003 à la lande de Kerbogn / Bubry puis 1700 à Kerminihy / Erdeven le 01/11 ; en migration : 337 le 04/11 et 327 le 07/11 au même lieu.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

(6 données)

5 le 01/11/2003 à la Ville Gleuhel / Guégon et 5, 3 et 5 en migration sur le site d'Erdeven respectivement les 01, 04 et 07/11.

Serin cini *Serinus serinus*

(18 données)

Présent pendant toute la période. Une famille de 3 jeunes le 30/08/2003 au Lic / Damgan.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

(4 données)

La nidification s'étend d'avril à fin août. Les premières troupes se forment fin septembre (200 le 27/09/2003 à Sainte-Anne Grapon / Surzur dans un champ de sarrasin). Des groupes de 30 à 100 sont vus régulièrement entre le 01/10 et le 28/10. La migration "active" est repérée les 01, 04, 06, 07/11 à Erdeven. 120 le 10/11 à Le Stum / Saint-Barthélemy.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

(33 données)

Nourrissage le 02/08/2003 à Camors. Les premiers mouvements sont dès le 26/08 (50 à Bodavel / Camors) puis en septembre (150 le 27/09 à Sainte-Anne Grapon / Surzur dans un champ de sarrasin). Les effectifs notés en octobre et novembre varient de 8 à 40 individus ensemble.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

(4 données)

Une femelle le 28/03/2003 à la station d'épuration de Meslan. Le passage automnal est remarqué à partir du 13/10/03 à Kerguelen / Larmor-Plage et le 17/11 à Saint-Nicolas-du-Tertre avec 35 oiseaux. Le 07/11, 12 tarins passent à Erdeven.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

(55 données)

Les bandes de plus de 30 individus sont vues à partir du 08/09/2003 (80 le 10/09 au Lenn / Damgan, 100 le 30/09 au Lannic / Locmiquélic). A compter du 07/10 puis du 04 au 08/11, la migration est visible.

Bec croisé des sapins *Loxia curvirostra* (1 donnée)

Un entendu le 09/04/2003 en forêt de Camors.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (55 données)

Un couple avec jeunes volants le 19/06/2003 à la pointe de Bernon/ Sarzeau.

Gros bec casse noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (1 donnée)

1 en vol le 26/03/2003 forêt de Paimpont / Campénéac.

Serin du Mozambique

Un mâle adulte chanteur avec 40-50 linottes dans un champ de choux, millet et autres graminées. Plumage magnifique les 16, 18, 19, 22, 24/07 et 16/08/2003.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* (2 données)

1 femelle le 06/11/2003 à Penthievre / Saint-Pierre-Quiberon et 1 femelle ou individu de premier hiver le 10/11 à Le Loch / Guidel.

Bruant jaune *Emberiza citrinella* (47 données)

Présent durant la période. Vu à l'unité ou par couple. Quelques concentrations de 12 (le 11/07/2003 à Brandivy) ou 10 (04/11 à l'étang du Cranic / Brec'h).


Bruant zizi *Emberiza cirrus* (26 données)

Construction de nid le 27/05/2003 à Kerassio / Languidic, et le même jour, nourrissage à Le Cosquer / Landévant.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (59 données)

Le dénombrement régulier à Pen Mané / Locmiquélic permet de cerner l'évolution de la présence de l'espèce. 3 à 5 mâles chanteurs vus de mars à août laissent supposer la reproduction locale. La nidification est prouvée le 04/05/2003 à Fetan Lereg / Erdeven et le 18/06 dans les dunes de Plouhinec.

En juillet et septembre, des groupes se forment (apport de jeunes, d'adultes d'autres secteurs ?) et la migration est à son maximum (sur ce site) le 10/10. L'espèce est observée sur les sites de Brandivy (étang de la forêt), Brec'h (étang du Cranic, vallée du Loch), Bubry (étang Fleuri), Baud (le long du Blavet), Guidel (Petit Loch), Plouharnel, Quéven (le Roze et la roselière du Scave), Radenac (sablière de Quillan).



Bruant des roseaux, Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan) : mars -- nov. 2003

Bruant proyer *Milaria calandra*

(1 donnée)

3 le 03/05/03 à la tourbière de Kerfontaine / Sérent.


ACTIVITES DU G.O.B. MORBIHAN

SAISON 2004 DU PROGRAMME NATIONAL STOC EPS DANS LE MORBIHAN

GWENAEL DERIAN

Dix carrés tirés au sort ont été suivis ce printemps parmi lesquels deux carrés ont été attribués pour la première fois. La répartition des cartes s'équilibre davantage entre l'intérieur des terres et le littoral.

Nombre de points couverts : 2 passages sur 100 points		
passages	premier	second
dates ; écart	16/04-06/05 ; 20 jours	13/05-05/06 ; 23 jours



Points d'écoute STOC EPS en 2004, Morbihan

- les habitats

La part des milieux agricoles, notamment prairies et cultures, s'affirme encore à la faveur des nouvelles cartes.

Habitats 2004	%
Forêts	17
Buissons	7
Prairies, marais et landes	4
Milieux agricoles	57
Milieux anthropiques	14
Milieux aquatiques	1

- les espèces

Passages	premier	second	total
espèces	76	75	86
contacts	1179	1061	2240

Le Goéland marin, le Phragmite des joncs, Le Chevalier culblanc, la Cigogne blanche, la Mouette rieuse font leur apparition dans la liste des oiseaux détectés. Pour de faibles effectifs à chaque fois, leur prise en compte a dépendu d'un passage inopiné. Par contre, la Caille des blés, chanteur peu commun dans le Morbihan, le Pouillot siffleur, le Roitelet à triple-bandeau et la Mésange nonnette ont été trouvés dans des milieux apparemment favorables à leur reproduction, et sur de nouvelles cartes, ce qui autorise à penser qu'on les retrouvera. Quatre-vingt-dix-neuf espèces ont donc été contactées en quatre campagnes.

place	espèce	Fréquence 2004 %
1	Pinson des arbres	81
2	Merle noir	74
3	Pouillot véloce	74
4	Pigeon ramier	73
5	Troglodyte mignon	70
6	Rougegorge familier	65
7	Corneille noire	55,5
8	Fauvette à tête noire	51,5
9	Grive musicienne	49,5
10	Mésange bleue	37
11	Etourneau sansonnet	35
12	Mésange charbonnière	27,5
13	Verdier d'Europe	27
14	Accenteur mouchet	27
15	Goéland argenté	24
16	Hirondelle rustique	21
17	Coucou gris	21
18	Pic vert	20
19	Tourterelle turque	16,5
20	Geai des chênes	16

place	espèce	Abondance 2004 %
1	Pinson des arbres	8,77
2	Pigeon ramier	7,63
3	Merle noir	6,45
4	Pouillot véloce	6,14
5	Corneille noire	5,92
6	Etourneau sansonnet	5,76
7	Troglodyte mignon	4,99
8	Rougegorge familier	4,67
9	Goéland argenté	3,49
10	Fauvette à tête noire	3,49
11	Grive musicienne	3,23
12	Mésange bleue	2,94
13	Hirondelle rustique	2,72
14	Moineau domestique	2,26
15	Accenteur mouchet	2,12
16	Verdier d'Europe	2,10
17	Martinet noir	1,71
18	Mésange charbonnière	1,69
19	Pic vert	1,42
20	Canard colvert	1,32

STOC – EPS Morbihan, printemps 2004


Qu'il s'agisse du nombre de points où l'espèce est contactée sur 200 points possibles (fréquence) ou la part relative des individus de chaque espèce sur le total (abondance), les mêmes espèces occupent d'une année sur l'autre le haut du tableau. Il ne faut pas perdre de vue la modestie des effectifs : dès la vingtième-troisième abondance (Geai des chênes) on est en dessous de la cinquantaine d'individus repérés et les 37 dernières places correspondent à moins d'une dizaine d'oiseaux à chaque fois.

En attendant de se risquer à une comparaison des résultats annuels pour y déceler des évolutions d'effectifs, on peut utiliser les résultats de ces premières années pour caractériser la représentativité actuelle des espèces dans différents milieux. Pour cela, ont été pris en compte les descriptions d'habitats et les relevés d'espèces de tous les carrés prospectés au moins une fois, en gardant l'année la plus récente (tableau 1).

	Forêt	Buissons	Pelouses, marais et landes	Milieux agricoles	Milieux bâti, urbanisés
points	19	10	5	60	15
espèces	42	44	45	69	48

Tableau 1 : nombres de points d'écoute et d'espèces contactées suivant les milieux

Ce sont donc les milieux agricoles qui proposent la collection d'espèces la plus étendue mais ces milieux sont bien plus représentés que les autres. Et c'est sur les pelouses, marais et landes que l'on peut s'attendre à repérer le plus d'espèces à chaque point d'écoute (graphique 1).



Graphique 1 : rapport entre les contacts d'espèces et le nombre de points suivant les milieux

- Forêts : peuplements feuillus, conifères ou mixtes – 323 contacts. Atteignent ou dépassent le seuil de 4% de fréquence, par ordre décroissant : le Pinson des arbres, le Troglodyte mignon, le Pigeon ramier, le Pouillot véloce, la Grive musicienne, le Merle noir, le Rougegorge familier, la Fauvette à tête noire, la Corneille noire, la Mésange bleue.
- Buissons : landes et jeunes taillis – 207 contacts. Atteignent ou dépassent le seuil de 4% de fréquence, par ordre décroissant : le Pouillot véloce, le Pinson des arbres, le Merle noir, le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, la

Fauvette à tête noire, le Pigeon ramier, la Grive musicienne. Soit presque les mêmes espèces.

- Pelouses, marais, landes – 112 contacts. Le Pouillot véloce, la Corneille noire, le Merle noir, le Bruant jaune, le Pigeon ramier, la Grive musicienne, le Rougegorge familier, le Coucou gris, la Fauvette à tête noire, dépassent le seuil de 4 %, pour de faibles effectifs totaux (7 à 5).
- Milieux agricoles : surtout prairies et cultures – 1319 contacts. Au delà des 4% de fréquence on trouve les mêmes espèces, sauf une, qu'en forêt : le Pinson des arbres, le Pigeon ramier, le Pouillot véloce, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, la Corneille noire, la Fauvette à tête noire, la Grive musicienne. Presque tous les contacts avec l'Alouette des champs (25/27), tous ceux avec le Busard saint-martin (3/3) et le Milan noir (2 fois), l'unique contact avec le Pipit farlouse et la Caille des blés proviennent de cette catégorie de milieux.
- Milieux bâtis, urbanisés : situés aux alentours de bourg ou de hameaux, ils sont caractérisés par une importante présence de la végétation – 316 contacts. Le Merle noir est l'espèce la plus fréquente, suivi des pinson, Ramier, troglodyte, Etourneau sansonnet dont c'est la seule incursion au delà des 4%, rougegorge, corneille, Verdier d'Europe, Pouillot véloce et Fauvette à tête noire.

Le faible nombre de carrés prospectés expose bien sûr à des biais, par exemple liés à la situation géographique dans le département. Ainsi, un seul point se rapporte aux milieux aquatiques. Il ne reste qu'à convaincre d'autres ornithologues à rejoindre le réseau STOC EPS du Morbihan !

Participants dans le Morbihan au STOC-EPS en 2004 : Marc Jamet, Francis Guillemot, Patrick Bailleul, Gaëtan Cornec, François Urvoaz, Yannick Ordureau, Gwenael Derian, Jean-Luc Lemonnier, Yann Kerninon, Anthony Le Doze, François Quinot.

NOTES DE TERRAIN

DEUX OBSERVATIONS D'UNE STERNE ELEGANTE *Sterna elegans* A LOCMIQUELIC (MORBIHAN)

KERNINON YANN et DERIAN GWENAEEL

Le bassin et le marais de Pen Mané à Locmiquélic sur la rade de Lorient accueillent habituellement en fin d'été des Sternes pierregarins et caugeks, adultes et jeunes volants, à partir de la dispersion des colonies. Pêches et quémantes sont alors d'observation quotidienne sur les surfaces dégagées. Ces espèces courantes sont parfois accompagnées de Sternes arctiques ou de Dougall, Sternes naines, Guifettes noires et moustacs. Deux observations d'une sterne à bec coloré motivent la présente note.

Les observations

○ Observation du 14 juillet 2004, Yann Kerninon

Peu de diversité ce jour-là sur le bassin du marais de Pen Mané, situation compensée par la présence d'une sterne à bec orange posée dans un petit reposoir réunissant une vingtaine de Mouettes rieuses, cinq Sternes caugeks et deux Sternes pierregarins.

Description détaillée :

- silhouette : taille et corpulence un peu supérieures à celles des Sternes caugeks présentes, mais le bec long et coloré a pu encore accentuer cette impression. La queue n'atteint pas le bout des ailes.

- plumage : les parties inférieures sont blanches, les parties supérieures sont d'un gris comparable à celui de la Sterne caugek et les 3-4 rémiges primaires externes sont plus foncées. Les plumes de la calotte noire sont visiblement plus longues que celles des Caugeks, le vent les agitant facilement. Observée de 3/4 dos, la calotte descend distinctement plus bas sur la nuque que chez les Caugeks. La base du front commence à blanchir très légèrement.

A l'envol, queue et croupion sont apparus blancs, caractère qui n'a pu être correctement vu ensuite sur l'oiseau en vol puisqu'il s'est éloigné rapidement.

- parties nues : le bec est long, sensiblement de la longueur de la tête, fin et un peu arqué vers le bas. Il est d'un orange vif, sauf la pointe qui semble un peu plus jaune. Les yeux noirs se distinguent peu de la calotte. Les pattes sont aussi noires que celles des

Caugeks. L'oiseau ne porte aucune bague.

o Observation du 31 août 2004, Gwenael Derian

En cette fin d'après-midi, peu d'oiseaux sont visibles autour du bassin. Les passages de l'eau venant de la rade ne sont pas réglés, les actuelles marées à fort coefficient entretiennent un niveau élevé, les berges sont étroites. Quelques limicoles malgré tout s'en accommodent. Sur un banc de sable, un peu élevé sur la vase, des Tadornes de Belon sommeillent, les échasses y font une pause avant de se nourrir à nouveau. Entre eux, une silhouette plus basse attire mon regard. Une impression de familiarité le dispute à la surprise quand je découvre en même temps un triangle blanc qui rappelle le front caractéristique d'une Sterne naine mais associé à une taille et une stature fortes, plus proches de celles de la Caugek. Un instant à peine plus tard, je vois le bec, qui n'évoque ni l'une ni l'autre de ces deux espèces.

L'oiseau se tient debout et inactif. Aucune autre sterne ne l'accompagne. Une bague métallique au tarse gauche.

Au bout de deux à trois minutes d'observation de ma part, à quelques dizaines de mètres, sous bon éclairage, il s'envole vers le Blavet, vers les Sternes caugeks et pierregarins qui pêchent. Je n'ai entendu aucun cri. Les jours suivants, les visites seront infructueuses.

Description détaillée :

- silhouette : isolée, la sterne observée n'a pas été directement comparée à des espèces communes de l'endroit. L'allure générale est celle d'une forte sterne, au cou relativement long dressé, à la tête longue, massive. Vue de face, la poitrine paraît large.

- plumage : ~~les parties inférieures sont blanches, les parties supérieures grises.~~ D'un gris uni qui ne m'a pas semblé plus foncé que celui des Caugeks observées à quelques minutes de là. Au repos, cependant, un soupçon de sombre interrompt cet uniforme sur les grandes couvertures, les primaires portent du noir. Au vol, apparaît un pinceau et non un bandeau terminal noir sur les ailes, pour autant je n'ai pas positivement noté quelles primaires et quels vexilles étaient noirs. Sont visibles également au vol la queue et le croupion blancs qui contrastent avec le dos gris. La calotte ébouriffée, on ne peut pas parler d'une crête, est noire et entamée d'un front blanc entre deux brides noires incluant et dépassant les yeux mais sans rejoindre le bec.

- parties nues : le bec est assez haut à sa base et s'effile, il se courbe vers le bas. Il est indubitablement long, caractère frappant au premier abord mais, faute d'une observation de profil, je peux seulement dire que sa longueur est comparable à celle de la tête. Il est d'un jaune franc, de bout en bout, et porte environ un centimètre après sa base, une petite tache noire sur la mandibule inférieure gauche (la face droite n'a pas été détaillée).

Les yeux noirs se perdent dans les brides de la calotte.

Les pattes et les pieds sont oranges, tirant vers le rouge.

L'identification

○ Observation du 14 juillet 2004

Les caractères de terrain de cette sterne à bec orange ont pu être confrontés et comparés à ceux des Sternes pierregarins et caugeks présentes. La silhouette, la couleur des pattes et du bec font penser aux Sternes voyageuses et élégantes. Mais la forme caractéristique du bec oriente la détermination vers la S. élégante (*Sterna elegans*). Le contraste entre le gris du dos et le blanc du croupion et de la queue, ainsi que l'aspect de la huppe sont deux caractères renforçant cette identification. On aurait ainsi affaire à un adulte en plumage nuptial.

○ Observation du 31 août 2004

L'oiseau est moins typique car si l'allure générale, le plumage, la forme du bec ont rapidement fait penser à une Sterne élégante et si le contraste déjà évoqué sur les parties supérieures a pu être suffisamment constaté et vérifié pour écarter la possibilité d'une S. voyageuse *Sterna bengalensis* les hésitations naissent de la couleur du bec et des pattes. Elles ne correspondent pas en effet à ce qu'en montrent les guides courants d'identification européens : typiquement, la Sterne élégante, au moins pour les adultes, allie un bec orange à des pattes noires. Cependant, après consultation de sites Internet sud-américains, nous avons remarqué la coexistence sur les colonies d'individus à bec orange ou jaune vif.

Quant à la couleur des pattes, elles sont noires pour la plupart des adultes mais ce n'est que l'élément dominant d'une plus large palette (P. Unitt, San Diego Natural History Museum, *comm. pers.*), les pattes peuvent être mêlées de jaune ou orange, voire être à dominante orange, surtout chez les jeunes individus. De fait, une recherche d'images a abouti à la photographie d'une Sterne élégante (adulte non reproducteur) à pattes orange sombre (Californie).

Les yeux inclus dans les brides du front dégagé confortent l'identification d'une Sterne élégante en plumage internuptial.

Quant à la zone sombre esquissée sur le dessus, elle a été trop furtivement vue et mal localisée mais on pourrait y trouver les traces d'un plumage de jeune âge. Un doute subsiste donc sur l'âge de la sterne observée ce jour là.

L'origine des oiseaux

Espèce américaine fréquentant le côte pacifique, la Sterne élégante *Sterna elegans* a déjà été observée sur le littoral atlantique français et des cas d'hybridation ont été relevés avec la Sterne caugek *Sterna sandvicensis* sur l'archipel des Glénan et au banc d'Arguin où des poussins bagués portent une combinaison de bagues colorées et métalliques. L'oiseau du 30 août, détenteur d'une seule bague en métal, n'en proviendrait donc pas. Il est à signaler que des hybrides ont été bagués *métal* en Espagne mais on ne les connaît pas sous leur aspect adulte.

Une Sterne élégante était présente sur l'île aux Moutons (Glénan) encore à la mi-juin (A. Le Névé, liste de discussion OBSBZH, Internet), aucun indice ne nous autorise à y reconnaître l'individu du 14/07 à Pen Mané même si on soupçonne que les effectifs de Caugeks qui y sont annuellement observés participent de la dispersion de la colonie finistérienne. On précisera simplement que ni la sterne des Glénan ni celle vue ce jour-là ne sont porteuses de bague.

Une Sterne voyageuse et une sterne non déterminée étaient en juillet sur le banc d'Arguin (Julien Gernigon, *comm. pers.*) mais porteuses de bagues couleurs, ce qui écarte l'oiseau du 31/08.

Bibliographie

Alström P. et *al.* 1991.- Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe. Delachaux et Niestlé.

Beaman M. et Madge S. 1998- Guide encyclopédique des oiseaux du paléarctique occidental. Nathan

Dubois P.-J. 1994.- La Sterne élégante *Sterna elegans* en France. Ornithos 1-2.