

AR VRAN – MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton

Ti ar Vro B.P. 103
29833 CARHAIX



Courriel :
gob@gob.fr

N°28 ANNEE 2005

Sommaire du numéro 28 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 novembre 2003 à 15 mars 2004	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 16
Groupe 3 de l'Huitrier pie au Tournepierre à collier	page 19
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 23
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 27
Activités du G.O.B. Morbihan	
Recensement morbihannais des Grands Cormorans <i>Phalacrocorax carbo</i> , hiver 2004-2005	page 38
Notes de terrain	
Un dortoir mélangé de Bruant des roseaux (<i>Emberiza shoeniclus</i>) et de Pipits spioncelles (<i>Anthus spinoletta</i>)	page 43
Suivi d'un groupe colonial de goélands argentés (<i>Larus argentatus</i>) sur les criées de Lorient (I ^o partie)	page 46
Après-midi faste	page 51

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE :

16 NOVEMBRE 2003 A 15 MARS 2004

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
Artel Jean-Pierre, Bailleul Patrick, J. Besnault, Blanchard Jean-Luc, Bozec René,
Corbière Jacques, Corlou Pierre, Cornec Gaëtan, Crochet Erwan, Derian Gwenael,
Derian Muriel, Ermel Gérard, Gautier Sébastien, Gélinaud Guillaume, Guillemot
Francis, Hamet Loïc, Hémerly François, Holden Richard, Iliou Bernard, Kergoat
Laurent, Kerninon Yann, Le Corre Gilles, Le Doze Anthony, Lemonnier Françoise,
Lemonnier Jean-Luc, Le Mouél Arno (Maison de la Nature et de l'Environnement de
Gueltas), Leport Bruno, Loiseau Jean-Paul, , Maout Jacques, Marie-Laure Sigaud,
Olivier Sigaud, Marie-Paule Le Gall, Orain Catherine, Ordureau Yannick, Philippon
Patrick, Teigner Laurent, Urvoaz François, Vinot Alexandre... sauf erreur ou omission !

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton
(Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre
au 15 mars.

Un fichier de saisie rapide peut être demandé auprès du coordonnateur morbihannais.
Dans le cas d'une transmission sur papier, merci de respecter l'ordre suivant :

abréviation ou nom d'espèce	effectif	remarque	Indice de reproduction	date	lieu-dit	commune
ech bla (Echasse blanche)	8	le nid est installé sur un bassin désaffecté	nid occupé	25/05/04	Kerlapous	SILFIAC

Relecture : B. Iliou et J.-L. Lemonnier.

Illustration : couverture et dessin p27 Patrick Bailleul. Photos p40, p47 Gw. Derian ; p42 B. Iliou.

AR VRAN MORBIHAN N°28

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwenael Derian

Plongeur indéterminé *Gavia sp.*

(12 données)

Observations entre le 09/12/2003 et le 09/12, entre Gâvres et Locmariaquer d'un à deux P. imbrins ou arctiques, un possible Catmarin.

Plongeur catmarin *Gavia stellata*

(8 données)

Un à quatre individus observés entre les 24/11/2003 et 08/02/2004.

Plongeur arctique *Gavia arctica*

(4 données)

Seulement observé entre les 04/11/2003 et 19/01/2004 devant Erdevén et Saint-Philibert.

Plongeur imbrin *Gavia immer*

(13 données)

Les observations sont réalisées entre le 15/12/2003 et le 17/02/2004, avec un groupe de 7 individus le 17/02 à Locmariaquer.

Grèbe indéterminé *Podiceps spe*


(2 données)

Deux Grèbes (esclavons) le 22/02/2004 dans la baie de Plouharnel.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

(164 données)

Aucun lieu d'hivernage habituel ne montre de fortes concentrations, seulement une observation de 49 Castagneux à Pen en Toul / Larmor-Baden le 23/01/2004 et



Grèbe castagneux, étangs de Locoal-Mendon (Morbihan) ; automne-hiver 2003-2004


37 au Breno / Carnac le 19/01. Ainsi le maximum est d'une vingtaine sur le Blavet entre Pen Mané et Sterbouët / Locmiquélic. Sur la rivière d'Etel, les Grèbes castagneux sont dispersés, le total atteint 114 le 20/01.

Plusieurs chanteurs se manifestent dans un groupe de 16 à er Varquez / Erdeven le 08/02/2004 ; à Keravéon / Erdeven, un chanteur le 09/03.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(199 données)

Données éparées d'hivernage (68 sur l'étang au Duc / Ploërmel le 18/01) jusqu'aux premières parades observées le 14/01 puis le 17/02/2004. Une dizaine de Grèbes huppés fréquentent les étangs de Branguily / Gueltas et quelques dizaines la rivière d'Etel.



Grèbe huppé Sterbouët / Locmiquélic (Morbihan) : hiver 2003-2004

Date	effectif	remarque	lieu-dit	Commune
14/01	7	ébauche de parade pour un couple	Réservoir du Loc'h	Brec'h
17/02	6	3 couples dont 2 paradent	étang de Coët-Rivas	Kervignac
26/02	2	un couple parade, grande mare	étang de Lannénec	Ploemeur
02/03	25	dont 1 couple paradant	Sterbouët	Locmiquélic
03/03	4	dont 1 couple paradant	étang du Crannic	Brec'h
05/03	3	dont 1 couple paradant	étang de la Forêt	Brandivy

Grèbe huppé (Morbihan), indices de nidification précoces : 2004

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

(1 donnée)

Un individu le 08/02/2004 à Kerpenhir / Locmariaquer.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

(13 données)

Tableau page suivante.

Date	effectif	lieu-dit	Commune
26/01	2	Kerjouanno	Arzon
27/01	2		
27/11	5	pointe er Hourél	Locmariaquer
10/12	2	pointe de Porh-Lineneu	Erdeven
16/12	2	pointe er Hourél	Locmariaquer
01/01	1	pointe de Penvins	Sarzeau
02/01	8		
19/01	3	pointe er Hourél	Locmariaquer
19/01	3		
08/02	13	Kerpenhir	
17/02	6	pointe er Hourél	
19/02	1	pointe des Saisies	Gavres
07/03	1	plage du Feso	Saint-Pierre-Quiberon

Grèbe esclavon (Morbihan) ; hiver 2003-2004

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(63 données)

Là aussi les données sont éparpillées le long du littoral avec des points d'observations constants devant les pointes de Locmariaquer : plus de 30 le 19/01 à er Hourél, 50 à Kerpenhir le 08/02. L'espèce est présente en rivière d'Etel (20 à Fandouillec / Plouhinec le 11/01, 28 à la pointe de la Vieille Chapelle / Sainte-Hélène le 20/01) et dans la rade de Lorient, particulièrement autour de l'île de Kerner / Riantec (21 le 17/01, 33 le 05/02) et Sterbouët / Locmiquélic (18 le 29/12). Les forts effectifs restent donc cantonnés dans le Golfe.

Au Plec / Locoal-Mendon, le 28/02, un couple en plumage nuptial amorce une parade.

Fou de Bassan *Sula bassana*

(6 données)

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*


(124 données)

Le 07/03/2004, sur l'île Téviec, un Grand Cormoran transporte des matériaux pour construire un nid.

Date	Effectif	Remarque	Lieu-dit	Commune
29/11	6	dortoir	moulin de Saint-Yves	Cleguer
22/12	300	entrent dans la rade	port	Etel
10/01	57	au dortoir, s'envolent suite à des coups de feu sur une autre rive	étang de Saint-Jean	Locoal-Mendon
15/01	10	dortoir à 17h30.	étang de Régigny	Régigny

20/01	134	entre 17h15 et 18h30 en dortoir	Le Parco	Hennebont
21/01	423	au sortir du dortoir	Méaban	Locmariaquer
21/01	144		Pont-Saint-Maurice	Guidel
28/01	157	total rade de Lorient = 267	île aux Souris	Port-Louis
28/01	86		port militaire	Lorient
05/03	135	total rade de Lorient = 237	île aux Souris	Port-Louis
05/03	72		port militaire	Lorient

Grand Cormoran, dortoirs dans le Morbihan : hiver 2003-2004



Grand Cormoran, dortoir sur l'étang de la Forêt / Brandivy (Morbihan) : hiver 2003-2004

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

(20 données)

Observé sur les pointes du littoral, en reposoir ou pêche, par exemple : 25 à Porh Lineneu / Erdeven le 18/12/2003. L'espèce est présente sur Méaban, site de reproduction connu, encore à la fin de l'hiver.

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

(11 données)

Ces observations ont repéré le butor à Saint-Jean/ Locoal-Mendon le 25/02/2004 et suivi un nouvel hivernage entre Le Loc'h / Guidel et l'étang de Lannénec, un voire deux individus vus entre les 26/11/03 et 25/02/04.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

(1 donnée)

4 individus sont vus dans une pâture à bovins à Kerhoazic / Plouay le 28/11/2003, observation isolée cet hiver après un court séjour de l'espèce, près de là, à Guidel (ar Vran Morbihan n°27).

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

(136 données)

Dortoirs : 148 le 26/01/2004 au Castell / le Tour-du-Parc ; sur l'île Kerner / Riantec, 96 le 26/11/2003, 76 le 24/01 ; à la Forest / Locoal-Mendon un dortoir

regroupe 57 individus le 11/01 à l'abri d'un fort vent de sud-ouest. Le dortoir de l'étang de la Forêt à Brandivy change plusieurs fois de place, accueille un maximum de 22 aigrettes le 23/01.

Grande Aigrette *Egretta alba*

(4 données)

L'hivernage n'est pas noté cette année, en dépit d'observations isolées : 1 à l'étang du Cranic / Brec'h le 25/11/2003, 1 le 03/01 à Branguily / Gueltas et deux à l'étang du Lezay / Théhillac.

Héron cendré *Ardea cinerea*

(117 données)

Étang de Pontcalleck / Berné : 21 le 10/01/2004, 22 le 04/02. Un Héron cendré se baigne (comportement rarement noté dans la littérature) le 04/02/04 dans l'étang du moulin de Pomper / Baden.

Reproduction : apparemment 11 aires occupées sur Riec'h / Brec'h le 13/02/2004 et 2 à 3 trois aires à Kerzo / Port-Louis dès le 04/01.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(59 données)

315 Ibis sacrés au dortoir du Castel / Le Tour-du-Parc le 26/01/2004.

L'espèce est présente tout au long du littoral morbihannais, de la Vilaine (249 sur la rive nord le 17/01) à la rade de Lorient (23 le 26/11/03 à Kerner / Riantec), sur des pâtures (39 au Braden / Crac'h le 19/01) ou des zones humides (54 à Falguérec / Séné le 24/01).

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

(76 données)

L'essentiel des données provient du Golfe du Morbihan et de la rade de Lorient. 54 aux salines de Mézentré-Michot / Séné le 18/11/2004. Une trentaine d'individus séjournera sur cette partie du Golfe. Des observations dans le bassin ouest permettent aussi de contrôler des oiseaux bagués. Un groupe d'une quinzaine de spatules signalé dès le mois de septembre passe l'hiver entre la Petite Mer de Gâvres et le Blavet, rejoignant le dortoir d'aigrettes de Kerner / Riantec. Les bagues lues indiquent une origine néerlandaise des jeunes et d'un adulte déjà connu.

Ailleurs : 9 à Kerdual / La Trinité-sur-Mer le 02/03, 1 à Berringue / Plouhinec les 10-19/02.

Anatidae sp

(3 données)

Plusieurs observations d'un tadorne présentant des caractéristiques qui en feraient un hybride Belon x Casarca, sur l'étang de Pomper / Baden.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

(42 données)

11 individus à Falguérec / Séné le 24/ 01/2004.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

(1 donnée)

Au Varquez / Erdevén, deux adultes le 09/01/2004.

Oie des moissons *Anser fabalis*

(5 données)

Au moins 2 individus se posent pour un séjour au Grand Loc'h / Guidel, elles y sont vues entre les 18/12/2003 et 09/01.

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus*

(13 données)

Attraction de la période, une Oie à bec court se laisse observer sur les marais de Séné depuis la mi-novembre 2003.

Oie rieuse *Anser albifrons*

(4 données)

Les données proviennent du Grand Loc'h / Guidel où parmi les oies de passage, 2 à Oies rieuses se sont posées entre au moins les 8 et 12/12/2003.

Oie cendrée *Anser anser*

(29 données)

Les données sont inhabituellement nombreuses avec plusieurs passages et un hivernage morbihannais. Les passages sont remarqués à partir de la fin novembre :

- 30 en migration nord vers sud 18h00, 24/11/2003, Boderhaf / Le Tour-Du-Parc.
- 70 le 25/11, Caden / Le Tour-Du-Parc.
- 20 en migration nord vers sud 18h15, le 25/11, Surzur / Sarzeau.
- 7 en vol, 30/11, Brillac / Sarzeau et 60 en migration nord vers sud, centre de Sarzeau.
- 40 en migration nord vers sud, 01/12, centre de Sarzeau et 40 à Luderé / Sarzeau.
- 35, 04/12, Boderhaf / Le Tour-Du-Parc.
- 13, 07/12 à Bétahon / Ambon.

C'est à cette époque (08/12) qu'arrive un groupe d'Oies cendrées au Grand Loc'h de Guidel, composé d'une douzaine d'individus accompagnés d'abord d'Oies des moissons et d'Oies rieuses mais qui resteront seules jusqu'au mois de mars.

Un séjour plus court : 1 le 01/12 au marais du Duer / Sarzeau jusqu'au 13/12.


Ailleurs : 1 en vol le 12/12 au Pont Lorois / Plouhinec ; 2 aux étangs de Branguily / Gueltas les 30 et 31/12 ; 10 s'envolent au matin du 21/01/04 du dortoir de cormorans de Méaban ; 2 à Larmor / Damgan le 29/01 ; 4 sur le marais de Pen Mané / Locmiquélic le 24/02.

Bernache cravant *Brenta bernicla*

(75 données)

En rivière d'Etel, les effectifs restent faibles, conformément aux années antérieures ; environ deux centaines sur les vasières.

Les bernaches se posent habituellement devant les pointes de Locmariaquer, entre le Golfe, la rivière de Crac'h et la baie de Plouharnel : 370 à Kerpenhir le 14/02/2004. 200 le 16/01 de Kervoyal à Lenn / Damgan ; 1 individu *nigricans* le 10/02 au Dibenn / Damgan.



Bernache cravant dans la rade de Lorient (Morbihan) : automne-hiver 2003-2004

Rade de Lorient : maximum de 2027 le 14/12 dans la Petite Mer de Gâvres, 470 dans l'anse de Kerzo / Port-Louis, 130 à Ty Douar / Locmiquelic le 29/12. La brusque chute des effectifs à la fin de décembre coïncide avec une fréquentation plus intense des Kite surf sur la Petite Mer.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(148 données)

Rivière d'Étel : les tadornes fréquentent l'ensemble des vasières, 447 à la mi-janvier.


Baie de Vilaine : 336 le 17/01/2004 sur la rive sud et 223 sur la rive nord.

Baie de Plouharnel : 86 le 22/12/03, 112 le 1/2, 160 le 04/02.

Toulvern / Baden : 170 le 04/02, 104 le 08/03.

Sur l'étang du Roc'h Du, la présence est constante, 84 le 06/03. Maximum de 55 à Coët-Courzo le 19/01.

Pentès / Surzur : 380 le 07/12, 181 le 25/01.



Tadorne de Belon, Petite Mer de Gâvres (Morbihan) : hiver 2003-2004

Rade de Lorient : le maximum est atteint à la mi-janvier dans la Petite Mer ; sur le Blavet les tadornes se concentrent sur les vasières de Sterbouët plus qu'à Pen Mané, 75 le 02/02. Des couples se cantonnent dès janvier à Pont-Lesdour / Locoal-Mendon, en mars sur le lagunage de Sainte-Hélène ; explorent des terriers sur les dunes de Kerminihy / Erdeven.

Canard mandarin *Aix galericulata*


(4 données)

Une femelle séjourne sur l'étang de Pont-Nivino / Plouay.

Canard siffleur *Anas penelope*

(44 données)

L'hivernage est suivi sur la rivière d'Etel, la remise de Saint-Jean permettant les recensements dans de bonnes conditions. Petite Mer de Gâvres : 62 le 30/11, 27 le 14/12 puis aucun. Un petit groupe d'une quinzaine d'individus est visible sur l'étang du Ter / Ploemeur entre les 15/12 et 05/02.



Canard siffleur sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon (Morbihan) ; automne-hiver 2003-2004

Canard chipeau *Anas strepera*

(16 données)

L'espèce hiverne sur l'étang du Ter / Ploemeur : d'abord quelques uns dès le 05/12/2003 puis une vingtaine à partir du 20/12 jusqu'au départ mi-février.

Etangs de Branguily / Gueltas : 4 le 18/12, 5 le 14/01, 7 le 08/12 à Ludré / Saint-Armel ; 8 le 01/0/2004 à Bernus / Vannes.

Les retours : 5 individus à la mi-février à l'étang de Lezay / Thehillac puis 6 et 5 les 01 et 07/03 sur Lannénec / Ploemeur, 3 le 10/03 près de là au Grand Loc'h / Guidel le 10/03.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(42 données)

Concentrations autour du Golfe : 282 à la pointe des Emigrés / Vannes et 390 sur la saline de Mézentré-Michot / Séné le 23/12/2003 ; 130 le 01/11 à Bernus / Vannes ; 500 au Duer / Sarzeau le 26/01 ; 253 à Toulvern / Baden le 04/02 ; 110 à Falguérec / Séné le 07/02 (2-3 paraden) ; 131 à Toulvern le 08/03. On note un modeste, très modeste, hivernage sur l'étang de Lannénec / Ploemeur, d'une cinquantaine d'individus entre les 28/11 et 01/03. Roc'h Du / Crac'h : 24 le 02/01, 28 le 19/01, 33 le 17/02, 53 le 13/03.

Canard colvert *Anas platyrinchos*

(40 données)

Date	Effectif	Remarque	Lieu-dit	Commune
20/11	111	reposoir devant l'île de Roëlan.	pointe de Porh-Lineneu	Erdeven
	250	et plus	Pontouar (plan d'eau)	Cleguerec
27/11	120	et plus en reposoir près des roches ar Gazec.	pointe er Hourel	Locmariaquer
30/11	100	recensement incomplet	lagunes de Bonnervo	Theix
01/01	380		Bernus	Vannes
09/01	114		étang de Pont-Nivino	Plouay
14/01	127			
15/01	220		étang de Régigny	Reguiny
15/01	120		étang du bourg	Saint-Gonnery
16/01	314		étang du Ter	Ploemeur
17/01	415		rive nord _ baie de Vilaine	
17/01	133		rive sud et baie de Pont-Mahé	
18/01	256		étang au Duc	Ploermel
19/01	180	reposoir près de ar Gazec.	pointe Erlong	Locmariaquer
19/01	167		étang de Pont-Nivino	Plouay
20/01	100	entre 17h15 et 18h30 en dortoir	Parco	Hennebont
20/01	400		Fort-Bloqué	Ploemeur

*Canard colvert (Morbihan) ; hiver 2003-2004***Canard pilet** *Anas acuta*

(20 données)

Quelques concentrations dans l'est du Morbihan : 247 le 26/11/2003 sur le marais du Duer / Sarzeau ; 464 le 17/01/2004 sur la rive de la baie de Vilaine ; 328 le 12/01 sur la vasière de Tascon / Saint Armel et 123 le 11/02/.

Canard souchet *Anas clypeata*

(38 données)


Les forts effectifs proviennent de la Vilaine et de Séné : au cours de l'hiver : 160 le 17/01/2004 sur la rive nord de Vilaine et 140 le 20/01 ou lors du passage : 150 dont de nombreuses parades le 07/02 à Falguérec / Séné.

Sinon les données sont fragmentaires : un hivernage de quelques individus a été constaté à Lannénec / Ploemeur ; 40 au Fort-Bloqué / Ploemeur le 20/01.


Fuligule milouin *Aythya ferina*

(12 données)

L'hivernage est suivi sur trois sites : Vannes, le Cranic et le Ter où il devient très faible (49 le 05/12/2003).



Fuligule milouin sur l'étang aux Ducs / Vannes ; hiver 2003-2004




Fuligule milouin sur l'étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; hiver 2003-2004

A noter aussi : 56 à la mi-février au Lezay / Théhillac, 200 le 18/11 et 103 le 24/11 à Calzac / Sarzeau.

Fuligule morillon *Aythya morillon*

(63 données)



Fuligule morillon sur deux étangs du Morbihan ; hiver 2003-2004

Deux sites d'hivernage sont suivis : le Ter et le Cranic, pour des effectifs faibles. Le séjour tourne court au Ter. Un hybride Milouin x Morillon à Vannes en décembre.

Fuligule milouinan *Aythya marila*

(6 données)

Le Milouinan se concentre dans l'estuaire de la Vilaine : 524 le 17/01/2004, 1100 le 20/01, 450 le 15/02.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

(9 données)

Les observations ne proviennent que de deux endroits :

- baie de Vilaine, 2 le 17/01/2004 devant la pointe de Bile / Pénestin.
- Locmariaquer, 2 à 3 individus (mâles et femelles) en décembre et janvier.
- une observation isolée devant Erdevén, une femelle pêche devant Porh Lineneu le 10/12.

Macreuse noire *Melanita nigra*

(8 données)

Quelques petites bandes sont repérées devant :

- Locmariaquer, le 27/11/2004, une cinquantaine près de Méaban.
- Porh-Lineneu, 15 le 18/12, 47 le 01/01/04.
- au moins 20 devant Saint-Colomban / Carnac, le 01/03 ;

Macreuse brune *Melanita fusca*

(12 données)

12 devant le Fort-Bloqué / Ploemeur le 10/12/2003.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

(26 données)

A proximité des sites traditionnels du Golfe du Morbihan, le moulin de Coët-Courzo accueillent des bandes de garrot durant l'hiver : 63 en 3 bandes remontant la rivière d'Auray, le 02/01/2004, 31 le 19/01, 70 le 17/02, 17 le 06/03, 31 le 19/01. Ailleurs, dans la rivière d'Etel ou la rade de Lorient, l'espèce n'est vue que par unités ou petits groupes.

Harle huppé *Mergus serrator*

(57 données)

Hors les concentrations du Golfe : maximum seulement de 17 dans la rivière d'Etel le 24/12/2003, 29 le 17/02/2004 à Coët-Courzo / Crac'h,

AR VRAN MORBIHAN N° 28

Groupe n° 2 Des rapaces aux rallidés.

Choix et rédaction établis par Franz URVOAZ

Milan royal *Milvus milvus*

(1 donnée)

Un individu est noté le 13/02/2004 à Aucfer / Rieux.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

(58 données)

Cette espèce est observée sur 16 communes : Locoal-Mendon, Erdeven, Guidel, Ploemeur, Sarzeau, Damgan, Surzur, Séné, Brec'h, Plouhinec, Locmiquélic, Crac'h, Plouharnel, Saint-Armel, Saint-Philibert et Baden.

Deux observations méritent une mention particulière : le 08/03/2004, à l'étang de Lannéac / Ploemeur un couple est décrit avec précision, la femelle a une calotte très pâle et le mâle est tricolore. Le 27/01, à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 5 individus sont notés simultanément à savoir 2 mâles adultes et un mâle immature accompagnés de 2 femelles.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

(15 données)

Les observations parviennent de 8 communes différentes à savoir : Locoal-Mendon, Nostang, Gueltas, Brandivy, Camors, La Chapelle-Neuve, Grandchamp et Languidic. L'anecdote la plus étonnante concerne un mâle immature posé sur des chaumes de maïs retournés et glanant à terre des proies à la manière d'un vanneau (des vers de terre ?).

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

(46 données)

Des observations sont faites dans 23 communes : Vannes, Sarzeau, Saint-Armel, Quéven, Larmor-Plage, Quistinic, Plouay, Bubry, Locmariaquer, Brec'h, Locmiquélic, Gueltas, Locoal-Mendon, Camors, Pluvigner, Erdeven, Brandivy, Brandérion, Languidic, Gourin, Riantec, Nivillac et Rochefort en Terre. Le harcèlement par des corneilles noires est noté à plusieurs reprises. L'une de ces mentions fait état d'une femelle qui après avoir été harcelée prend de la hauteur puis attaque une corneille noire posée au sommet d'un sapin. (réservoir du Loc'h / Brec'h). Une autre mention fait état d'une femelle traversant l'étang de Saint Jean / Locoal-Mendon puis d'un mâle en chasse alors qu'un dortoir de pipits farlouses et de bergeronnettes grises est en formation.

Buse variable *Buteo buteo*

(62 données)

26 communes sont concernées par ces données : Nostang, Gueltas, Séné, Arzon, Plouay, Surzur, Baden, Penestin, Arzal, Quistinic, Saint-Barthélémy, Bubry, Berné, Melrand, Inguiniel, Locmiquélic, Cléguer, Brec'h, Locoal-Mendon,

Brandivy, Plouharnel, Crac'h, Languidic, Le Faouët, Surzur et Theix. A plusieurs reprises 3 individus sont notés ensemble, ainsi 5 simultanément au cours d'un vol circulaire à Varquez Rongal / Plouharnel le 18/01/2004. Des vols en feston et des parades sont notés début mars sur les communes de Brandivy et de Languidic.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

(23 données)

Cette espèce est notée sur les communes suivantes : Séné, Damgan, Arzon, Penestin, Surzur, Quistinic, Plouay, Saint-Barthélémy, Noyal-Pontivy, Brec'h, Caudan, Le Saint, Erdeven, Plouharnel, Plouhinec, Crac'h, Gueltas, Baud, Plumelin, Sain- Aignan et Brandivy. La plupart des individus sont aperçus seuls soit perchés, soit effectuant le « vol du Saint Esprit ». Cependant, les observations peuvent être très rapprochées. Ainsi, 5 individus sont notés sur le marais de Falguérec / Séné le 24/01/2004, 3 à Toul Siac'h / Plouharnel le 20/11/03, 3 à Kerjouanno / Arzon le 27/01, 3 encore dans l'estuaire de la Vilaine le 28/01. Le 04/01, à Lann Plumelin / Plumelin, 1 mâle adulte, 1 mâle immature et une femelle sont notés. Un couple parade près d'une haie de cyprès le 09/03 à Kerguevin / Erdeven.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

(6 données)

Les observations s'étalent du 07/12/2003 au 14/03/2004. Elles sont effectuées sur 5 communes différentes à savoir : Guidel Surzur, Marzan, Séné et Theix. Le 07/12, une paire est observée à l'étang de Pont Caden / Surzur.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(8 données)

Ces observations sont effectuées sur les communes suivantes : Guidel, Sarzeau, Surzur, Cléguer, Lorient, Gueltas et Séné. Une donnée mentionne 1 individu planant au-dessus du clocher de l'église Saint-Louis / Lorient pendant quelques minutes.

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

(3 données)

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

(5 données)

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(16 données)

Communes où est notée cette espèce : Brandivy, Brec'h, Locoal-Mendon, Locmiquélic, Larmor-Baden, Saint-Philibert, Plouharnel, Séné et Ambon soit en tout 9 communes différentes. 6 individus sont entendus le 27/01/2004 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon ; 4 individus sont entendus le 30/01 à l'étang de la forêt / Brandivy ; 5 individus sont notés en différents points de la réserve de Pen en Toul / Larmor Baden le 04/02 ; 5 individus sont également entendus le 02/02 à Pen Mané / Locmiquélic ; enfin, un chanteur est noté au Grand Falguérec / Séné le 10/02.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

(67 données)

Les rassemblements les plus importants sont notés aux endroits suivants :


- étang de la CAM / Vannes, 10 individus le 30/11/2003.
- station d'épuration / Meslan, 5 individus le 13/01/2004 puis 16 le 19/01.
- Pontouar / Cléguérec, 5 individus le 21/11.
- étang de la forêt / Brandivy, 5 individus le 02/12 et le 13/02/04 puis 7 le 12/03.
- étangs de Branguily / Gueffas, 7 individus le 07/12.
- Varquez Rongal / Plouharnel, 6 individus le 18/01.
- plan d'eau de Riantec, 6 individus le 05/02.
- étang de Kercadoret / St Philibert, 20 individus le 13/03.
- étang du Ter / Ploemeur, 11 le 16/01.
- Grand-Loc'h / Guidel, 16 le 19/01.

Foulque macroule *Fulica atra*

(176 données)

Rassemblements les plus importants :

- 776 individus le 28/11/2003 à Quélisoye / Larmor Plage puis 721 le 02/02/2004.
- 684 individus à l'Isle / Le Hézo le 12/01.
- 475 individus à l'étang de Toulvern / Baden le 04/02.
- 378 individus à l'étang du Ter / Larmor Plage le 16/01.
- 270 individus à la Pointe du Perche / Belz le 20/01.
- 288 individus sur la vasière de Tascon / Saint-Armel le 08/12.

*Foulque macroule, étangs de Locoal-Mendon (Morbihan) : novembre 2003-mars 2004**Foulque macroule,
Roc'h Du / Crac'h*

dates	Effectif
27-nov	477
2-janv	380
19-janv	357
17-févr	71
6-mars	20

*Foulque macroule,
Pen Mané / Locmiquélic*

Dates	Effectif		
24-nov	355	17-janv	410
1-déc	349	26-janv	346
15-déc	368	2-févr	283
29-déc	370		
7-janv	363		

AR VRAN MORBIHAN N° 28

Groupe n° 3 De l'Huïtrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Yannick Ordureau

Huïtrier pie *Haematopus ostralegus*

(50 données)

Toujours de nombreuses données pour cette période . le 07/12/2003 , 350 individus dont un albinos à Treutan / Damgan et 220 sur la plage de Kernevest / Saint-Philibert le 10/02/2004. A la pointe er Hourel / Saint-Philibert des données régulières : 120 , le 27/11 en reposoir ; 60 le 16/12 ; 120 le 2/01 ; 180 le 19/01 ; 231 le 17/02.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(25 données)

Un bon nombre de données pour cette période et des regroupements intéressants :

- 280 le 07/12/2003 puis 500 le 25/01/2004 à Pentès / Surzur.
- 350 le 17/01 au port de Tréhiguier / Pénestin.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

(36 données)

Un regroupement de 850 individus en reposoir et gagnage à marée montante à la petite Mer de Gâvres le 24/11/2003. A Stêr er Véred / Locmariaquer 210 en gagnage à marée montante le 27/11 et 250 à marée basse le 16/12. A la Pointe er Hourel / Locmariaquer, 230 individus le 19/01/2004.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

(1 donnée)

Un individu observé le 22/02/2004 à la Pointe du Conguel / Quiberon.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

(36 données)

Des regroupements intéressants : 565 individus répartis sur plusieurs champs le 28/12/2003 à Kermorduel / Saint-Barthélémy ; 380 le 04/02/2004 à Plouharnel.
A la Petite Mer de Gâvres / Plouhinec : 605 le 24/11, 524 le 17/01, 822 le 01/02.

Date	Effectif	09/01	0
17/11	83	16/01	286
28/11	0	29/01	335
04/12	129		
31/12	426		

*Pluvier doré, Grand Loc'h / Guidel (Morbihan) ;
hiver 2003-2004*

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

(51 données)

De nombreuses données pour cette période et des regroupements conséquents à la Petite Mer de Gâvres / Plouhinec : 680 en reposoir à marée montante le 24/11/2003, 350 le 17/01/2004, 822 le 01/02.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

(104 données)

- 600 au Grand Loc'h / Guidel, le 04/12/2003.
- 620 en reposoir à marée descendante dans la Petite Mer de Gâvres, le 01/02/2004.
- 420 à Plouharnel, le 04/02.
- 1500 à Falguérec / Séné le 08/02.
- 1143 le 8/02/04 à Penhoët / Merlevenez
- 187 le 28/12/03 à Kermorduel / Saint Barthélémy.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

(4 données)

Dans la Petite Mer de Gâvres, 10 individus observés le 17/01/2004 et 18 en reposoir le 01/02. 23 à Bénance / Sarzeau le 07/02.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

(29 données)

De nombreuses données pour cette période : observation de 150 le 24/11/2003 à Kerguelen-Plage / Larmor-Plage, de 200 en gagnage et reposoir à la Petite Mer de Gâvres le 24/11/, de 207 le 16/01 à Les Saisies / Larmor-Plage et de 120 à Port-Maria / Quiberon le 23/02.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(10 données)

Observation de 30 individus le 23/02/2004 à Beg er Goalonnet / Quiberon et passage de 20 individus début mars devant la plage du Loc'h / Guidel.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(78 données)

A Larmor / Damgan 900 le 25/01/2004 et 1300 le 29/01. Dans la Petite Mer de Gâvres : 2400 le 24/11, 3500 le 17/01, 3400 le 01/02.

Combattant varié *Philomachus pugnax*

(10 données)

Des données plus nombreuses que d'habitude. Parmi elles, huit proviennent du Grand Loc'h / Guidel où 1 individu a été observé du 17/11/2003 au 26/01, le 29/11 observation de deux individus. A Falguérec / Séné le 07/02/2004 observation de deux individus et au Moulin de Coët-Courzo / Locmariaquer, une femelle est observée le 27/11.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

(44 données)

De nombreuses observations pour cette période et des regroupements de petite ampleur : 44 le 22/12/2003 dans les anciennes salines de Brégo / Carnac ; 30 le 07/12 dans les lagunes de Damgan ; 21 le 19/01/2004 au Grand Loc'h / Guidel ; 36 le 04/02 au Moulin de Pomper / Baden.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

(6 données)

Les données ne concernent que des individus isolés :

- le 17/11/2003 à Ty Rhu / Locoal-Mendon.
- le 11/12 à La Vieille en Forêt de Camors.
- le 17/12 à Toul Broc'h / Baden.
- le 07/02/2004 à Croez-er-Voten / Quistinic.
- le 21/02 à Kéravéon / Erdeven.
- le 23/02 à Kergal / Languidic.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

(12 données)

De bons regroupements durant cette période : 560 à Kergeorget / Sarzeau le 11/02/2004 et 425 au pont de Noyal le 07/03.

Barge rousse *Limosa lapponica*

(4 données)

Très peu de données pour cette période : 3 individus le 24/11/2003 et le 14/12 à la Petite Mer de Gâvres, 67 à Pentès / Surzur le 25/01/2004

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

(1 donnée)

Un seul individu observé le 13/03/2004 à Lédec Néguan / Locoal-Mendon.

Courlis cendré *Numenius aquata*

(71 données)

Le 14/12/2003 observation de 73 individus à la Petite Mer de Gâvres, plus de 100 le 07/12 et 150 le 25/01/2004 à Pentès / Surzur et 83 se reposent près de l'Île aux Pins / Riantec le 05/02.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

(10 données)

Un minimum de 30 individus le 31/12/2003 et 25 le 07/02/2004 à Falguérec / Séné. Le 14/12, observation de 14 individus puis de 50 le 08/02 à La Saline de Mézentré-Michot / Séné.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

(80 données)

De nombreuses données pour cette période.

- le 23/12/2003, 83 individus dans Les Salines de Bréno / Carnac.
- le 16/01/2004, 41 individus à Quélisoye / Larmor-Plage.
- le 04/02, 41 individus à l'étang de Toulvern / Baden.
- le 05/02, 37 individus en reposoir à l'Île de Kerner / Riantec.

Chevalier aboeur *Tringa nebularia*

(36 données)

14 le 04/02/2004 puis 13 le 28/02 à l'étang de Pomper / Baden. A l'étang du Roc'h Du / Crac'h présence de 15 individus le 19/01, de 14 le 28/02 et de 13 le 06/03.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

(36 données)

Les données concernent en majorité des individus isolés, néanmoins 7 individus sont observés le 18/12/2003 à l'étang de Branguily / Gueltas, 5 le 22/11 à l'étang du Crannic / Brec'h

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

(27 données)

Deux individus au Port de Tréhiguiier / Pénestin et 3 dans la baie de Vilaine le 17/01/2004. Toutes les autres données sont des cas isolés.

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres*

(49 données)

Des regroupements modestes :

- le 04/02/2004, 85 individus à la pointe du Conguel / Quiberon.
- le 02/01, 80 en reposoir et gagnage à la Pointe er Herouel / Locmariaquer.
- le 17/01, 112 à Kersahu / Gâvres.

AR VRAN MORBIHAN N°28

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Yann Kerninon.

Stercorariidae sp.

(0 donnée)

Laridae sp.

(2 données)

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

(31 données)

31 données ! Difficile de conclure à une plus grande présence de l'espèce dans le département : présence d'observateurs sur le terrain et contacts plus systématiquement transmis sont probablement la cause de cette inflation.

Rare aussi, 38,7 % de ces données (12/31) concernent des groupes d'au moins 10 individus. L'hivernage est bien noté avec 58 % d'observations (18/31) entre le 1^{er} décembre et le 20 février.

L'espèce a été observée sur 17 sites du Golfe du Morbihan, du littoral Erdeven-Quiberon et de la rivière d'Étel. Aucune donnée en provenance de la région lorientaise.

- 25 le 23/12/2003, 55 le 04/02 et 11 le 28/02/2004 à l'étang du Moulin de Pomper / Baden.
- 10 le 02/01 et 11 le 19/01 à la pointe er Hourél / Locmariaquer.
- 14 le 03/03 dans l'anse de l'Istrec / Locoal-Mendon.
- 25 le 22/12, 80 le 07/03 et 100 le 11/03 à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon.

Ces 2 derniers chiffres sont liés à la migration prénuptiale et sont surtout des effectifs records pour cette chronique. L'étang du Crannic / Brec'h est le seul site intérieur où l'espèce a été vue et avec des effectifs intéressants en début de période, 26 le 19/11 et encore 13 le 22/11, ensuite de 1 à 3 individus jusqu'en mars.

Mouette pygmée *Larus minutus*

(1 donnée)

Les synthèses se suivent et se ressemblent pour cette espèce avec 1 le 02/03/2004 à l'étang de Lannénec / Ploemeur.


Mouette rieuse *Larus ridibundus*

(98 données)

40,8 % de ces données (40/98) concernent des regroupements d'au moins 100 mouettes, une poignée dépassant le millier d'individus :

- 1260 le 24/12/2003, 1500 le 27/01/2004 et 1651 le 11/02 au Néguan / Locoal-Mendon.
- 9000 environ le 18/01 à l'étang au Duc / Ploermel.
- 1258 le 14/02 aux étangs de Branguily / Gueltas

Lors des comptages Wetlands : 1818 le 17/01 en baie de Vilaine (9 sites recensés) et 1482 le 20/01 dans le secteur nord-est de la ria d'Étel (5 sites).



Mouette rieuse, étang du Crannic / Brec'h (Morbihan) ; novembre 03 – mars 04

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*


(0 donnée)

L'oiseau signalé dans la précédente synthèse a été détecté ponctuellement à Riantec au moins jusqu'en décembre 2003. (comm. pers. P. Davoust)

Goéland cendré *Larus canus*

(67 données)

67 données ! Même remarque que pour la Mouette mélanocéphale. Notons que 32,8 % de ces données (22/67) correspondent aux comptages Wetlands et que 82 % d'entre elles (55/67) concernent la période hivernale du 1^{er} décembre au 20 février. L'espèce a été bien détectée sur notre littoral, sauf entre Erdeven et Saint-Philibert, secteur délaissé par les observateurs contribuant à cette synthèse.



Goéland cendré, embouchure du Riant / Riantec, (Morbihan) ; décembre 03 – mars 04

Lors des comptages Wetlands, au moins 201 Cendrés sont recensés le 20/01/2004 dans la ria d'Etel et 59 en baie de Vilaine le 17/01. Par ailleurs, les dortoirs et reposoirs du golfe restent sous renseignés.

Autres rassemblements :

- 30 le 24/12/2003 et 22 le 11/02/2004 au Néguan / Locoal-Mendon.
- 70 le 26/01 entre Saint-Guéryn et Le Lenn / Damgan.
- 114 le 23/12/03 et 32 le 04/02 sur l'étang du Moulin de Pomper / Baden.

Sites intérieurs : 1 à 3 individus fréquentent l'étang du Crannic / Brec'h et, dans le nord du département, 3 sont trouvés le 14/02 sur les étangs de Branguily / Gueltas.

Goéland brun *Larus fuscus*

(57 données)

Aucun suivi régulier des dortoirs et reposoirs du département n'a été réalisé, mais plusieurs rassemblements sont cependant notés.

Dans l'intérieur :

- 86 le 18/12/2003, 200-260 le 15/01/2004 et 190 le 14/02 aux étangs de Branguily / Gueltas.
- un seul comptage en provenance de l'étang au Duc / Ploërmel avec 248 le 18/01.

Sur le littoral est :

- 150 le 17/01 à Saint-Laurent / Muzillac.
- 52 le 04/02 à l'étang du Moulin de Pomper / Baden.

En rivière d'Étel :

- 348 le 20/12 dans le secteur nord-est de la ria entre Le Gouarde, l'Istrec et le Néguan.
- 120 le 24/12 et 97 le 11/02 dans l'anse de l'Istrec / Locoal-Mendon, 65 le 27/01 au Néguan.

Goéland argenté *Larus argentatus*

(88 données)

Les données se répartissent à peu près équitablement sur l'ensemble du littoral avec des regroupements plus notables (plus systématiquement dénombrés ?) entre la rivière de Pénérff et la baie de Vilaine. A l'ouest, la rade de Lorient est le parent pauvre de ces dénombrements avec seulement 7 données et un effectif maximum de 100 le 10/03/2004 dans l'embouchure du Riant / Riantec.

Quelques concentrations :

- Damgan : plus de 6000 le 07/12/2003 à Treutan, 1200 le 19/01 entre Kervoyal et Le Lenn, 5000 le 26/01/2004 entre Saint-Guénin et Le Lenn.
- Gueltas : 1585-2000 le 15/01 à Branguily sur les labours et les étangs et 980 le 14/02, uniquement sur les étangs.
- plus de 3522 le 17/01 en baie de Vilaine (comptages Wetlands In.).

Peu de rassemblements dans l'intérieur : 240 le 30/11 sur une pâture au chemin de Cornévec / Brandivy et plus de 200 en vol sud le 21/12 au même endroit.

Dates	20/11	03/12	18/02	08/02	26/02	09/03
Effectifs	122	120	110	183	174	292

Goéland argenté (reposoir diurne) îlot de Roëlan / Erdeven (Morbihan) ; novembre 03 - mars 04

Goéland marin *Larus marinus*

(48 données)

31,25 % des données (15/48) concernent des groupes de 10 individus et plus.

Dates	20/11	03/12	18/12	18/01	08/02	26/02	09/03
Effectifs	28	16	45	47	23	22	26

Goéland marin, île de Roëlan / Erdeven (Morbihan) ; novembre 03 - mars 04

En rade de Lorient : 15 le 15/12/2003 et 10 le 29/12 à Sterboust / Locmiquélic, 27 le 05/01/2004 sur l'îlot Souris / Port-Louis, 27 le 01/02 en Petite Mer de Gâvres / Plouhinec.

A l'entrée du golfe : 25 le 27/11 et 19 le 15/12 sur Méaban, 12 le 26/01 à Kerjouanno / Arzon.

10 données émanent de la ria d'Étel où l'espèce fréquente très régulièrement et en petit nombre le secteur de l'Istrec / Locoal-Mendon (max. de 5 le 27/01 et le 11/02).

Sites intérieurs : 1 le 25/11 à l'étang du Crannic / Brec'h, 1 deuxième hiver le 15/01 et 1 premier hiver le 14/02 aux étangs de Branguily / Gueltas.

Anecdote : 10 sont présents le 02/03 sur le bassin de Pen Mané / Locmiquélic où le niveau d'eau bas leur permettaient de tenter leur chance à la pêche aux anguilles (1 capture réussie) ou d'essayer de parasiter quelques hérons.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

(0 donnée)

20 mois sans aucun contact avec la Mouette tridactyle : nouveau record à battre pour ceux qui transmettent leurs données !!!

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(25 données)

L'hivernage est bien noté avec 80 % de données (20/25) entre le 1^{er} décembre et le 20 février, mais les effectifs sont faibles avec en moyenne 2,47 individus par observation (64 % des données concernent 1 ou 2 individus). Un observateur note cependant que les Sternes caugeks sont "nombreuses" (effectif ?) en rivièr d'Étel le 13/12/2003. Le 05/01/2004, 12 sont présentes en baie de Locmalo / Gâvres.

Répartitions géographiques des observations : 8 proviennent de la rade de Lorient et ses abords, 7 de la ria d'Étel, 5 du golfe et ses environs, 4 du secteur Erdeven-Presqu'île de Quiberon.

Lors de la remontée prénuptiale, un groupe de 27 est devant la plage du Feso / Saint-Pierre-Quiberon le 07/03.

Erratum : ar Vran 19, page 27, **Guifette moustac**, remplacer la rubrique par :

21/09/1999, étang de Lannénec / Ploemeur, 2 adultes puis 1 le 24/09.

09/05/1999, Grand Loc'h / Guidel, 1 pêche.

25/07/1999, Pen Mané / Locmiquélic, 1 en plumage internuptial puis le 26/09/1999 1 adulte.

27/08/1999, pointe du Talut / Talut, 1.

Guillemot de Troïl *Uria aalge*

(4 données)

En l'absence de donnée relative à des traversées entre les îles et le continent, aucun regroupement n'est rapporté. Espèce contactée à l'unité sur les communes de Billiers, Erdeven, Ploemeur et Saint-Pierre-Quiberon.

Pingouin torda *Alca torda*

(9 données)

Des observations à l'unité sur la côte entre Arradon et Ploemeur, reflet fantomatique de la présence de l'espèce dans les eaux morbihannaises.

AR VRAN MORBIHAN N° 28

Groupe n°5 Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Yann KERNINON et Gwenael DERIAN

Pigeon biset *Columba livia*

(2 données)

Données concernant la forme urbaine du Biset.

Pigeon colombin *Columba oenas*

(7 données)

2 le 09/12/2003 aux Fontenelles / Saint-Malo-Les-Trois-Fontaines, 2 le 23/12 à l'île de Riec'h / Belz. 1 couple probable à proximité de loges de Pic noir le 23/02/2004 en forêt de Floranges / Camors.

Date	16/11	07/12	04/01	25/01
Effectif	112	25+	Pas contacté	10

*Pigeon colombin à Tremoyec / Surzur (Morbihan) ; hiver 2003-2004***Pigeon ramier *Columba palumbus***

(24 données)

Seuls trois observateurs ont prêté attention aux palombes, mais aucun grand rassemblement a été trouvé : 40 le 30/11/2003 au Chemin de Cornévec / Brandivy, 30 le 06/01/2004 à l'étang du Crannic / Brec'h, 30 le 15/01 aux étangs de Branguily / Gueltas...

Comportements nuptiaux observés à partir de la première décade de février.

Contacté le 14/12 au cours de la sortie ZNIEFF forestière de Quélennec / Languidic.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

(14 données)

Peu de rassemblements : 35 le 20/11/2003 à Kerbrévost / Belz, 30 le 09/12 aux Fontenelles / Saint-Malo-Les-Trois-Fontaines, 16 le 07/01/2004 à Mané Salud / Camors...

Comportements nuptiaux (chants et parades) observés à partir de décembre.

Présente le 14/12 lors de la sortie ZNIEFF forestière de Quélennec / Languidic.

Effraie des clochers *Tyto alba*

(12 données)

La moitié de ces données concerne des individus trouvés morts sur les routes.

L'effraie est notée sur 9 communes : Brec'h, Camors (1 le 07/02/2003 dans le clocher de la chapelle de Locoal), Hennebont, Languidic, Locoal-Mendon, Nostang (chuintements le 27/11 à Saint-Thomin / Nostang), Pluneret, Pluvigner et Sarzeau.

Chevêche d'Athéna *Athena noctua*

(2 données)

Une chevêche crie le 23/02/2004 à Saint-Thomin / Nostang et une autre est entendue le 13/03 à Ty Rhu / Locoal-Mendon.

Chouette hulotte *Strix aluco*

(20 données)

Notée sur 9 communes : Brandérion, Brandivy, Camors, Gueltas, Languidic, Nostang, Ploemeur, Quéven et Saint-Armel.

Chants entendus durant toute la période.

Hibou moyen-duc *Asio flammeus*

(1 donnée)

Une seule donnée d'un individu contacté le 07/03/2004 au Grand Loc'h / Guidel.

Hibou des marais *Asio flammeus*

(0 donnée)

Pas de contact cette année en provenance des sites favorables à l'hivernage.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(63 données)

L'hivernage est encore mieux noté que précédemment avec 77,7 % des données (49/63) entre le 1^{er} décembre et le 20 février. L'espèce est vue sur 13 communes littorales (Belz, Dangan, Erdeven, Étel, Gâvres, Guidel, Larmor-Baden, Larmor-Plage, Locmariaquer, Locmiquélic, Locoal-Mendon, Ploemeur, Sainte-Hélène) et 8 communes intérieures (Berné, Brandivy, Brec'h, Bubry, Gueltas, Plouay, Régigny, Saint-Barthélémy).

44,4 % des données (28/63) concernent l'observation de 2 oiseaux ou plus : 3 le 28/11/2003 sur le réservoir du Loc'h / Brec'h, 3 le 04/12 au Néguan / Locoal-Mendon, 3 à l'étang de la Forêt / Brandivy, 5 le 03/01/2004, 6 le 19/01 et 4 le 08/03 au Stum / Saint Barthélémy, 3 le 08/03 au marais de Pen en Toul / Larmor-Baden...

Un couple parade le 13/02 à l'étang de la Forêt / Brandivy et un autre le 01/03 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon.

Pic vert *Picus viridis*

(25 données)

Espèce vue et entendue sur 14 communes : Berné, Brandérion, Brandivy, Brec'h, Bubry, Camors, Erdeven, Gueltas, La Chapelle-Neuve, Languidic, Locmiquélic, Nostang, Plouay et Séné. Contacté le 14/12/2003 lors de la sortie ZNIEFF forestière de Quélenec / Languidic.

Pic noir *Dryocopus martius*

(22 données)

Noté sur 11 communes : Baden, Belz, Berné, Brandivy, Brec'h, Camors, Erdeven, Languidic, Merlevenez, Nostang et Quistinic.

Comportements reproducteurs à partir de fin janvier : oiseaux par paire (Chemin de Cornévec / Brandivy, Forêt de Floranges, bois départementale d'Erdeven), tambourinage (Forêt de Camors), activités autour des loges... Un accouplement observé le 14/03/2004 dans le parc de Kéravéon / Erdeven. Présent le 14/12/2003 lors de la sortie ZNIEFF forestière de Quélenec / Languidic.

Pic épeiche *Dendrocopos major*

(20 données)

Espèce vue et entendue sur 14 communes : Berné, Brandérion, Brandivy, Brec'h, Bubry, Camors, Cléguer, Erdeven, Gueltas, Languidic, Larmor-Baden, Locoal-Mendon, Plouay et Saint-Barthélémy.

Espèce contactée le 14/12/2003 lors de la sortie ZNIEFF forestière de Quélennec / Languidic.

Pic mar *Dendrocopos medius*

(0 donnée)

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

(5 données)

1 le 17/11/2003 à Rugdual / Quéven, 1 le 19/11 à Lasné / Saint-Armel, 1 femelle à l'étang du Moulin / Gestel, 1 le 12/02/2004 en lisière de forêt de Floranges à Poulihuern / La Chapelle-Neuve.

Espèce contactée en forêt de Quélennec lors de l'opération Avifaune Forestière du 14/12.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

(0 donnée)

Alouette lulu *Lullula arborea*

(18 données)

La Lulu a été rencontrée sur 7 communes : Brandérion, Brandivy, Brec'h, La Chapelle-Neuve, Languidic, Locoal-Mendon et Plouharnel.

Quatorze de ces 18 données concernent un seul oiseau généralement repéré à son chant.

4 le 16/11/2003 à Ty Rhu / Locoal-Mendon, 14 le 25/11 et 3 le 02/12 près de l'étang du Crannic / Brec'h, 4 le 30/11 au Chemin de Cornévec / La Chapelle-Neuve.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

(21 données)

Plusieurs bandes hivernantes sont observées (tableau). Reprise des chants à partir de la deuxième décennie de février.

Date	Effectif	Remarque	Lieu-dit	Commune
16/11	60		Tremoyec	Surzur
14/01	18		Kermignan	Plouay
19/01	35	sur chaumes de maïs.	Pointe er Hourél	Locmariaquer
23/01	60	sur chaumes retournés.	Etang de la Forêt	Brandivy
26/01	60	sur chaumes retournés.	Berhuider	Grand-Champ
29/01	60		Chemin de Cornévec	Brandivy
07/02	40	sur chaumes de blé.	Kerpenru	Camors

Alouette des champs, Morbihan ; hiver 2003-2005

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

(7 données)

Les 50 premières sont observées le 07/03/2004 au Grand Loc'h / Guidel. Les jours suivants, elles sont revues sur ce site et sur les étangs de Lannénec / Ploemeur (12/03) et de Saint-Jean / Locoal-Mendon (09/03).

Hirondelle de rocher *Ptyonoprogne rupestris* (2 données)

Espèce rare sous le ciel breton, et encore plus en hiver, une Hirondelle de rocher a séjourné à Locmariaquer. L'oiseau a été vu une première fois le 15/01/2004 près de l'église puis elle a été observée le 28/01 en chasse au-dessus des laisses de mer de la pointe de Kerpenhir.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* (6 données)

La première est vue précocement le 04/02/2004 dans le bourg de Saint-Pierre-Quiberon. Le passage débute réellement vers le 07/03 avec 25-30 au Grand Loc'h / Guidel.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* (1 donnée)

Un groupe d'une cinquantaine d'oiseaux le 10/03/2004 au Grand Loc'h / Guidel, effectif plutôt inhabituel à cette date.

Motacillidae sp. (1 donnée)

Une bande mixte non détaillée de Pipits farlouses et spioncelles et de Bergeronnettes grises et de Yarrel le 12/03/2004 à Billiers.

Pipit farlouse *Anthus pratensis* (49 données)

55,1 % des données (27/49) proviennent de communes littorales. Notons : 30 le 15/12/2003 à Pen Mané / Locmiquélic, plus de 30 le 16/12 autour de la pointe er Hourél / Locmariaquer et 50 en dortoir le 19/01/2004 au Foisigo / Damgan.

Les observations sur les sites intérieurs concurrencent fortement les données littorales :

- 32 sur un pré le 28/11 à Mané er Groëz / Brec'h,
- 30 le 02/01 et 60 le 03/02 près de l'étang du Crannic / Brec'h,
- 40-50 le 31/12 et 49 le 20/01 en soirée à Kerpenru / Camors,
- 85 le 08/02 à Kervégant / Quistinic.

Pipit maritime *Anthus petrosus* (13 données)

Noté sur les communes de Arzon, Camoël, Damgan, Gâvres (5 le 05/01/2004 à la pointe des Saisies), Locmariaquer, Locmiquélic, Pénestin, Riantec (12 le 05/02 à l'Île de Kerner), Saint-Pierre-Quiberon et Séné. Les effectifs rapportés sont faibles avec en moyenne 3 oiseaux par donnée.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (12 données)

4, puis 3, puis 2 du 19/11/2003 au 18/12 à l'étang du Crannic / Brec'h. Plus de cinq parmi des Farlouses le 24/11 à Pen Mané / Locmiquélic et 1 le 15/12. Une dizaine le 01/01/2004 aux bassins de lagunage de Plouharnel. 1 le 24/01 sur la dune de Fort-Bloqué / Ploemeur et 2 le 07/02 au marais de Falguérec / Séné.

Bergeronnette printanière *Motacilla flavissima* (1 donnée)

Un avant-coureur très précoce est présent le 26/02/2004 à Guellian / Plouhinec.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (25 donnée)

Notée sur 18 communes, surtout dans l'intérieur : Auray, Baud, Brandivy, Brec'h, Cléguérec, Erdeven, Gourin, Gueltas, Languidic, Larmor-Baden, Le Faouët, Locmiquélic, Plouay, Plouharnel, Riantec, Saint-Barthélémy, Saint-Philibert et Vannes.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (39 données)

Dortoirs et pré-dortoirs recensés :

- le dortoir du centre-ville de Vannes accueille 1200 individus le 10/01/2004 et au moins 500 (comptage partiel) le 06/02.
- plus de 100 en soirée le 27/01 au marais de l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon.
- le 12/02, plus de 100 rejoignent le site de l'hôpital Bodélio / Lorient (comptage très partiel).
- des dortoirs plus modestes ou sous-évalués sont détectés par ailleurs (27 et plus sur le parking d'un supermarché le 03/12/03 à Pluvigner, de 11 à 20 individus dans des touradons à l'étang de la Forêt / Brandivy...).

Espèce contactée le 14/12 lors de la sortie ZNIEFF forestière de Quélennec / Languidic.

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla yarrellii* (20 données)

70 en soirée le 24/12/2003 sur les pontons du port de plaisance de la Trinité-sur-Mer. Les autres données concernent de maigres effectifs. La distinction *alba* et *yarrellii* n'est sans doute pas toujours faite par les observateurs, les effectifs des unes se confondant sûrement avec celui des autres.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (21 donnée)

Espèce contactée en forêt de Quélennec lors de l'opération Avifaune Forestière du 14/12/2003.

Accenteur mouchet *Prunella modularis* (25 données)

Espèce présente le 14/12/2003 lors de la sortie ZNIEFF forestière de Quélennec / Languidic.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (21 données)

Des chanteurs durant toute la période. 15 individus contactés le 24/01/2004 au marais de Falguérec / Séné, 10 les 29/01 et 29/02 sur 2800 mètres au Chemin de Cornévec / Brandivy.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (9 données)

Hivernage noté entre le 1^{er} décembre et le 20 février à Guidel (2 le 23/12/2003 au Loc'h), Larmor-Plage (2 le 27/01/04 à Kerguelen), Pénestin, Ploemeur, Plouhinec et Séné.

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

(0 donnée)

Tarier pâtre *Saxicola torquata*

(20 données)

Noté sur 10 communes : Brandivy, Carnac, Damgan, Erdeven, Gâvres, Locmariaquer, Locmiquélic, Locoal-Mendon, Pénestin et Séné.

Les cantonnements des couples se remarquent surtout à partir de la troisième décade de février. Offrande de nourriture d'un mâle à sa femelle le 22/02/2004 au Pô / Carnac.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

(0 donnée)

Merle noir *Turdus merula*

(27 données)

Jusqu'en décembre, de 15 à 34 individus avec d'autres turdidés dans un verger à Bodavel / Camors. Autres regroupements : 15 sur 100 mètres le 02/12 et le 09/12/2003 à l'étang de la Forêt / Brandivy, 23 le 25/01/2004 à Larmor / Damgan, 18 le 26/01 au marais du Duer / Sarzeau... Le 08/12, à Kerhan / Languidic, 2 individus leucistiques : l'un avec une remige blanche et l'autre avec deux rectrices blanches. Transport de matériaux par une femelle le 06/03 à Bodavel / Camors. Contacté en forêt de Quélennec lors de l'opération Avifaune Forestière du 14/12.

Grive litorne *Turdus pilaris*

(44 données)

Dates	24/11	27/01	12/03	15/03
Effectifs	120	50	80	35

Grive litorne, Kergollaire / Languidic ; novembre 03-mars 04

Dates	03/03	04/03	06/03	15/03
Effectifs	25	120	60	150

Grive litorne, Kergal / Languidic ; mars 2004

Autres rassemblements : 120 le 21/12/2003 et 80 le 29/01/2004 au Chemin de Cornévec / Brandivy, 80 le 04/01 à Grégo / Surzur, 72 le 14/01 et 77 le 29/01 à Kermignan / Plouay, 80 le 11/03 dans le bourg de Tréhorenteuc, 140 le 12/03 à l'étang de la Forêt / Brandivy...

Grive musicienne *Turdus philomelos*

(35 données)

68,5 % de ces données (24/35) concernent des effectifs de 5 oiseaux et moins. Peu de regroupements sont observés : 12 le 16/12/2003 à la pointe er Hourél / Locmariaquer, 10 le 27/01/2004 et 11 chanteurs (sur 700 mètres) le 03/02 à l'étang du Crannic / Brec'h. Le passage (non dénombré) est signalé du 12/03 au 14/03 à la Croix de Brambanen / Plouay.

Grive mauvis *Turdus iliacus*

(37 données)

Les bandes de 50 individus et plus : 100 le 06/12/2003 au Saint, 60 le 07/12 près des étangs de Branguily / Gueltas, 100 le 09/12 aux Touches / Mohon, 110 le 17/12 et 130 le 21/12 à Kerlan / Nostang, 50 à Kerdrého / Brec'h, 67 le 06/02/2004 à Ty Név-Manébail / Plouay, 51 le 15/02 à Nézarh / Bubry, 50 le 03/03 à Kergal / Languidic, 60 le 12/03 à l'étang de la Forêt / Brandivy... Aucun site n'a été recensé plus de trois fois durant la période. Comme pour la Musicienne, le passage est également signalé du 12/03 au 14/03 à la Croix de Brambanen / Plouay. Présente le 14/12 lors de la sortie ZNIEFF forestière de Quélennec / Languidic.

Grive draine *Turdus viscivorus*

(25 données)

Maximum de 6 oiseaux ensemble le 15/12/03 sur les dunes de Moténo / Plouhinec. 4 au matin le 07/03/04 sur la dune de Kérouriec / Erdeven, indice d'un passage nocturne ?

Beaucoup de ces données concernent de 1 à 3 individus et il est donc difficile de faire la part entre hivernants, migrateurs et oiseaux locaux. Un chanteur en novembre, mais les chants reprennent véritablement en janvier. Présente en forêt de Quélennec lors de l'opération Avifaune Forestière du 14/12/03.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

(20 données)

La donnée la plus à l'intérieur du département vient de Gestel, ce qui n'est pas représentatif de la présence de l'espèce, plus discrète en hiver ; chants hivernaux, 8 le 02/02/2004 à Pen Mané / Locmiquélic.

Cisticole des joncs *Cisticola jundicis*

(8 données)

Trois individus au Petit Loc'h Guidel le 19/12/2003. Un chanteur à Kerner / Riantec le 05/02/2004.

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

(5 données)

Un individu à chaque fois à Pen Mané / Locmiquélic, Kerpenru / Camors, Kerminihy / Erdeven et Brec'h

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

(2 données)

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

(3 données)

Deux observations d'automne : un dans la saulaie au nord de l'étang de Loperhet / Erdeven, le 20/11/2003 puis un individu qui accompagne un Pouillot véloce le 24/11 à Pen Mané / Locmiquélic.

Erratum : ar Vran Morbihan n°27, page 48, à la place de **Pouillots à grands sourcils** Deux le 20/09/2003 (...) lire **Pouillot véloce** (...).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

(16 données)

Premiers chants : 1 le 07/02/2004 à Falguerec / Séné, 1 le 22/02 à Roch Priol / Quiberon. Passages : 10 le 07/03 au Petit Loc'h / Guidel.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

(25 données)

Données de groupes hivernaux comme cette douzaine d'individus le 26/11/2003 en forêt de Floranges / La Chapelle-Neuve ou cette vingtaine de roitelets sur 200 mètres dans une jeune plantation le 12/12 en forêt de Camors, 6 dans les pins de la pointe er Hourél / Locmariaquer le 02/01/2004 pointe .
Chanteurs : 3 le 09/02 en forêt de Camors.

Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus*

(6 données)

- 2 le 20/11/2003 à er Varquez / Erdeven.
- 1 tué par un chat le 10/01 dans un jardin / Vannes.
- 2 se nourrissent sur chênes et ajoncs le 06/02/2004 à Ty Rhu / Locoal-Mendon.
- 2 le 25/11/2003, 3 le 09/12, 2 le 12/12 à l'étang du Crannic / Brec'h.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

(5 données)

- l'espèce est présente le 18/12/2003 à Landrezac / Sarzeau.
- 8 le 30/12 à Pen Mané / Locmiquélic et 3 le 15/12 puis au moins 7 en deux points du marais (5+ et 2) le 02/02.
- 2 le 09/01/2004 à Fetan-Léreg / Erdeven.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

(26 données)

Bandes hivernales : une bande d'au moins 40 individus le 19/12/2003 en forêt de Floranges, 20 le 09/01/2004 à l'étang de la forêt / Brandivy, 25 en deux bandes le 03/01 aux étangs de Branguily / Gueltas, 25 en deux bandes le 20/11 à er Varquez / Erdeven, 15 dans une ronde d'une vingtaine de mésanges le 14/01 à l'étang du Crannic / Brec'h, 18 le 19/01 à la pointe er Hourél / Locmariaquer.

Mésange nonnette *Parus palustris*

(25 données)

Aux mangeoires. Chanteurs dès le 09/02/2004 en forêt de Camors.

Mésange huppée *Parus cristatus* (7 données).

Une observation qui nous éloigne des forêts : 5 M. huppées dans les pins de la pointe er Hourél à Locmariaquer le 27/11/2003.

Mésange noire *Parus ater* (25 données).

- 1 le 20/11/2003 à er Varquez / Erdeven.
- 1 le 03/02/2004 à Kergal / Languidic.

Mésange bleue *Parus caeruleus* (27 données) ; **Mésange charbonnière** *Parus major* (21 données) ; **Sittelle torchepot** *Sitta europea* (8 données) ; **Grimpereau des jardins** *Certhia brachydactyla* (23 données)

Geai des chênes *Garrulus glandarius* (14 données)

Une bande dans un verger rassemble 14 individus à Bodavel / Camors le 01/03/2004.

Pie bavarde *Pica pica* (25 données)

Un rassemblement crépusculaire ou dortoir à Pratel-Locoal / Camors draine jusqu'à 34 individus (25/01/2004) entre décembre et mars.

Choucas des tours *Corvus monedula* (8 données)**Corbeau freux** *Corvus frugilegus* (2 données)

- 35 le 24/01/2004 sur les marais de Falguérec / Séné.
- 60 le 26/01 au marais du Duer / Sarzeau.

Corneille noire *Corvus corone* (28 données)

effectif	Date	Lieu-dit	Commune
148	21/12/2003	Sterville ; sur les vasières du Blavet	Kervignac
120	06/03/2004	Kerjean	Locmariaquer
90	15/01/2004	étangs de Branguily	Gueltas
80	14/02/2004	étangs de Branguily ; sur des labours	Gueltas
60	21/12/2003	Chemin de Cornévec dont 40+ sur des chaumes de blé	Brandivy
60	22/11/2003	Kerrouz ; sur un labour	Pluvigner

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (22 données)

Les données hivernales concernent souvent des dortoirs dont quelques précisions concernent la ville de Vannes : 11000 le 29/11/2003 ; 18 000 à 20 000 en dortoir le 12/12 ; 15 000 en plusieurs groupes le 29/12.

Premiers chants : 29/02/2004, chemin de Cornévec / Brandivy...

Moineau domestique *Passer domesticus* (11 données)

Moineau friquet *Passer montanus*

(0 donnée)

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

(31 données)

Concentrations hivernales : 130 le 29/01/2004 au moulin de Poul / Melrand ; 220 le 30/01, Le Mané / Bubry ; 200 à Kergollaire / Languidic le 23/02 ; 300 en deux groupes et plusieurs petites bandes le 29/02 sur le chemin de Cornévec / Brandivy ...

Premiers chants : un chant incomplet Falguérec / Séné et chant à Brouel-Le Goho / Séné le 07/02/2004 ; 1 chanteur le 08/02/2004, étang de Kéravéon / Erdeven ; parmi des hivernants, chanteur le 29/02/2004, chemin de Cornévec / Brandivy.

Pinson nord *Fringilla montifringilla*

(9 données)

Entre mi-décembre et début mars, observations intérieures à Bubry, Plumergat, Camors, Melrand, Cleguer, Brec'h, maximum 17 le 30/01/2004 Le Mané / Bubry

Serin cini *Serinus serinus*

(1 donnée)

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

(30 données)

Bandes hivernales sur chaumes, jachères, roselières (150 à Pen Mané le 30/12/2004).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

(25 données)

41 au Crannic / Brec'h le 27/02/2004...

Tarin des aulnes *vvcvc vvcvvc*

(15 données)

Sur toute la période mais faibles effectifs 23 30/01 etag Forêt.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

(14 données)

Une bande d'un millier d'individus à Kergall / Surzur le 04/01/2004. Premiers chants : 1 le 07/03 Crannic / Brec'h.

Bec croisé des sapins *Loxia curvirostra*

(1 donnée)

2 à 3 le 07/12/2004 en forêt Camors, Le Nerven.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

(30 données)

Contacté par paires au cœur de l'hiver, chanteurs en novembre et janvier.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

(16 données)

40 le 29/01/2004 à Cornévec / Brandivy.

Premiers chants : 2 chanteurs le 15/02, 1 le 24/02, plus de 5 dont 2 chanteurs le 07/03, étang du Crannic / Brec'h ; 15 dont 3 chanteurs le long du chemin de Cornévec / Brandivy, le 29/02.

Bruant zizi *Emberiza cirius*

(8 données)

Maximum de 12 le 04/01/2004 à Manéantoux / Bubry. Chant le 05/01/2004 à Bodavel / Camors.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

(26 données)

70 dans jachère le 19/01/2004, Le Lenn / Damgan ; 80 environ en dortoir à l'étang Fleuri / Bubry, le 06/02.

ACTIVITES DU G.O.B. MORBIHAN

RECENSEMENT MORBIHANNAIS DES GRANDS CORMORANS *Phalacrocorax carbo*, HIVER 2004-2005

GWENAEL DERIAN

En suivant l'écart maintenant habituel d'une saison vide entre deux recensements, l'hiver 2004-2005 a été marqué par un nouveau comptage des Grands Cormorans hivernants en France. Pour le département du Morbihan, des observateurs de Bretagne Vivante, de la Maison de la Nature et de l'Environnement de Gueltas, de la brigade morbihannaise du CSP, de l'ONCFS et du G.O.B. ont assuré une couverture satisfaisante des sites connus ou susceptibles d'accueillir des dortoirs. Les mêmes consignes que les hivers précédents se sont appliquées au présent comptage, la plupart des participants ont privilégié une visite crépusculaire. Le suivi sur plusieurs mois a été rarement réalisé.

RESULTATS A la MI-JANVIER 2005

Secteurs	dénominations	effectifs mi-janvier 2005	Recensés par
Oust Vilaine	étang de Pen Mur	0	CSP
	Bourgerel	115	GOB
	la Grionnais	70	CSP
	Boro	0	CSP
	l'étier (Saint-Mathurin)	25	CSP
	la Blangeraye	nc	
	Iles aux Pies (35)	35	CSP
	Buttes du Rouge (44)	3	CSP
	Blouzéréuil	70	ONCFS
	Villeneuve	23	ONCFS
	Roncin	0	GOB
S/Total		341	

Golfe du Morbihan	étang de Noyalo	70	GOB
	Bailleron	146	BV-SEPNB
	Méaban	366	GOB
	Saint-Goustan	25	GOB
S/Total		607	
Rivière d'Etel	étang de Saint-Jean	58	GOB
	Roëllan	130	GOB
S/Total		188	
Blavet	île aux Souris	115	GOB
	port de guerre	68	GOB
	le Parco	80	GOB
	le Stum	3	GOB
	étangs de Branguily	18	MNEG
	Guerlédan	?	
S/Total		284	
Laïta-Ellé	Pont Saint-maurice	125	GOB
Autres	étang de la Forêt	17	GOB
TOTAL Morbihan janvier 2005		1562	

Remarques :

- le site de l'étang de Muzillac pourrait n'être qu'un reposoir diurne de même que l'ancien dortoir de la Butte du Rouge (44).
- dans l'estuaire de la Vilaine, le dortoir de Bourgerel a récupéré l'ensemble des cormorans qui s'étaient disposés précédemment sur deux sites proches (Bourgerel et Vieille-Roche).

COMPARAISON

Par rapport aux dénombrements précédents, effectués dans les mêmes conditions d'ensemble, le recensement des Grands Cormorans en janvier 2005 marque une décroissance marquée (tableau suivant), à vrai dire inégalement répartie entre deux secteurs très affectés et d'autres où l'évolution est moins sensible.

Année du recensement	1999	2001	2003	2005
minimum	1588*	1702*	1746*	
maximum	1638*	1830*	1805*	1562
moyenne	1613*	1766*	1776*	

* D'après Marion L.

Le nombre de dortoirs n'a pas varié entre les deux derniers recensements, une vingtaine de sites sont occupés en janvier. Les dortoirs de petite à moyenne importance dominent (tableau suivant).

Année	classes, effectif				Total de dortoirs
	1 à 50	51 à 100	101 à 200	plus de 200	
1999	5	7	3	1	16
2001	4	6	3	2	14
2003	8	7	4	1	20
2005	8	6	5	1	20



- Oust-Vilaine : la baisse est nette (505 en 2003) mais est encore plus remarquable sur le cours de l'Oust (tableau suivant).

	1998/1999	2000/2001	2002/2003	2004-2005
la Grionnais	84	77	56	70
Boro			84	0
l'étier (Saint-Mathurin)	15	23	22	25
la Blangeraye	22	nc	29	nc
Iles aux Pies (35)	50	33	37	35
Buttes du Rouge (44)	75	99	0	3
Blouzèreuil				70
Roncin	86	118	98	0
Total Oust	332	350	326	203

Certains dortoirs ont disparu. C'est le cas du Roncin / Taupont, du Boro / Saint-Vincent sur Oust, de la Butte du Rouge / Fégréac (aucun oiseau en février). Sur le premier de ces dortoirs désertés des tirs de régulation sont autorisés. A l'opposé, le dortoir de la Grionnais où ont lieu également des tirs augmente son effectif. Le site de Blouzereuil, par sa proximité avec l'ancien dortoir de la Blangeraye, pourrait être le résultat du déplacement de ce dortoir voire une solution de repli pour les oiseaux absents du Roncin.

- Golfe du Morbihan : la hausse est nette (472 en 2003) alors que les dortoirs précédemment visités sont stables. C'est qu'un nouveau site, Bailleron, a suivi la même évolution que l'étang de Noyalo. Connu d'abord comme perchoir diurne, il s'est mué au cours de ces dernières années en dortoir (R. MAHEO, *com. pers.*). Ceci pose la question d'une redistribution des cormorans entre le Golfe et ses entours, par exemple à partir de la Vilaine.

• Blavet : au delà de l'incertitude sur la situation actuelle de Guerlédan, le présent dénombrement révèle une baisse des effectifs sur le Blavet (en 2003, 396 entre Saint-Adrien et la mer). Le Parco fait l'objet de tirs de régulation depuis plusieurs saisons, en février, seulement 19 individus sont posés sur les pins du dortoir et autour mais ce n'est pas le cas des deux dortoirs du Blavet maritime.



Carte : JPLB

Répartition des dortoirs de Grands Cormorans (Morbihan) janvier 2005

CONCLUSION

Pour la quatrième recensement consécutif, les observateurs de différents organismes et associations ont assuré une couverture satisfaisante des dortoirs de Grands Cormorans dans le Morbihan. Contrairement aux précédents constats, le bilan de janvier 2005 montre une baisse des effectifs, particulièrement sur le cours de l'Oust.

Les presque 1600 Grands Cormorans recensés se répartissent dans des dortoirs en cours de renouvellement. Les abandons et les baisses d'effectifs de dortoirs se rapportent à des contextes différents, impliquant ou non des tirs de régulation.

Une inconnue est aussi levée, concernant l'importance des effectifs de Grands Cormorans sur les îles : ni Groix (*fide* C. PICHOT) ni l'archipel d'Houat – Hoëdic (*fide* A. LE NEVE) n'accueillent de dortoirs hivernaux.



Grands Cormorans au Parco, février 2005

MARION L., (1999). – Recensement national des Grands Cormorans hivernants en France durant l'hiver 1998-1999, MNHN - Univ. Rennes.

MARION L., (2000-2001). – Recensement national des Grands Cormorans hivernants en France durant l'hiver 2000-2001, MNHN - Univ. Rennes

MARION L., (2002-2003). – Recensement national des Grands Cormorans hivernants en France durant l'hiver 2002-2003, MNHN - Univ. Rennes.

NOTES DE TERRAIN

UN DORTOIR MELANGE DE BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza* *shoenichus*) et de PIPITS SPIONCELLES (*Anthus spinoletta*)

ANTHONY LE DOZE

Situation géographique : tourbière de Manéantoux (48°N – 3°16' O), commune de Bubry, tourbière inondée située en queue de l'étang Fleuri à une altitude de 140 m, les environs immédiats sont composés de champs, bocages, de pâturages et de plantations de résineux

Comportement des oiseaux


Les Bruants des roseaux arrivent par petits groupes ou à l'unité, toujours du nord-est et toujours de façon directe. Ils ne tournent pas comme les Spioncelles mais un vol direct se termine par un plongeon dans la végétation (petits saules et touffes de Carex). Ils ne sont pas facilement repérables lorsqu'ils arrivent, car leur vol est rapide et ils ne sont vraiment pas bruyants. Ils restent quelques minutes à se toiletter puis se déplacent de touffes en touffes. Quelquefois tous se déplacent en même temps, traversant la tourbière jusqu'à la partie la plus à l'ouest, puis revenant toujours ensemble vers la zone la plus au sud. Cet aller-retour se déroule durant trente minutes environ, j'ai pu le constater à partir de 18h15 (le 21/02). Pour finir, lorsque la nuit approche, les Bruants des roseaux se sont concentrés dans des petits saules sur les branches les plus basses mais la plupart semble s'enfoncer dans les touffes de carex...

Le 21/02/05, quelques Pipits Spioncelles sont visibles dès 17h30, ils se déplacent alors assez souvent et changent de perchoir. Mais le plus impressionnant, ordinairement, est l'arrivée massive du reste de la troupe. En effet, eux aussi arrivent du nord-nord-est mais en un gros groupe : de 80 à 100 individus environ. Il peut se passer plus de vingt minutes avant que tous les oiseaux soient posés. Dès que le groupe principal arrive sur le site, tous les pipits déjà présents le rejoignent et tournent au dessus de la tourbière. Ce vol est quasi circulaire et le plus souvent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et, pour rejoindre la végétation protectrice, les oiseaux prennent leur temps (sans doute plusieurs vérifications de la tranquillité du site). Ce grand groupe tourne environ cinq minutes avant que les premiers ne plongent dans la végétation (avec une préférence certaine pour les arbres et arbustes). Lors de ces

nombreuses révolutions certains oiseaux se détachent du groupe et descendent, toujours en tournant, puis seul ou par paire, les pipits piquent (impression qu'ils se laissent véritablement tomber). Cette grande ronde continue pendant plus de 20 minutes, perdant peu à peu des individus. Certains, quant à eux, font une pose de quelques minutes (maximum 3 à 4) dans des grands peupliers bordant la partie nord de la tourbière, puis rejoignent le groupe qui lui, tourne toujours.

Dénombrements

- le 28/12/04 : environ 100 Bruants des roseaux.
- le 30/12/04 : environ 20 pipits spioncelles et 100 bruants.
- le 05/01/05 : env. 80 bruants et 60 pipits.
- le 16/02/05 : env. 80 pipits et 60 bruants.
- le 20/02/05 : 60/70 bruants et env. 100 pipits.
- le 02/03/05 : env. 70 pipits et autant de bruants.
- le 04/03/05 : env 70 pipits et 60 bruants.
- le 24/03/05, 30/35 Spioncelles mais aucun bruants.



Pipit spioncelle, Bubry - 2005

Deux opérations de baguage ont permis d'y baguer le 27/01/05 38 individus des deux espèces et 23 le 08/03/05. Tout cela sous la responsabilité de Bernard Iliou, secondé par Bruno Le Port et moi même. Les oiseaux ont été munis d'une bague métallique du Muséum (Paris), parmi les 58 Bruants des roseaux un contrôle local a pu être réalisé.

Discussion

Les Bruants des roseaux sont connus pour se rassembler en dortoirs hivernaux (GEROUDET) mais, curieusement, les données morbihannaises sont exceptionnelles concernant ce comportement : les marais de Pen Mané accueillent régulièrement une bande qui se rassemble sur des phragmites et « herbe de la pampa » (45 individus le 04/11/2002, J. Corbière *in* archives du GOB Morbihan). Le 06/02/2004, sur ce site de Bubry, j'avais déjà repéré un dortoir d'environ quatre-vingts Bruants des roseaux. Faute de visites plus précoces, je ne peux pas préciser la période où se constitue le dortoir.


Les observations de Pipits spioncelles sont en nombre limité dans le département, d'août à avril et quelques observations s'inscrivent au cœur de l'hiver. Le 26 novembre 1996, plus de cinquante Spioncelles sur les bords de l'étang au Duc / Ploërmel (B. Iliou *in* archives du GOB Morbihan) illustrent la fréquentation hivernale ou en période migratoire du site quand le niveau d'eau est bas dans l'étang.

SUIVI D'UN GROUPE COLONIAL DE GOÉLANDS ARGENTÉS (*Larus argentatus*) SUR LES CRIEES DE LORIENT (1^{re} partie)

DERIAN GWENAEAL

HISTORIQUE

Dans une évolution déjà largement décrite (Cadiou, 1997) des effectifs de Goélands argentés nicheurs et d'un déplacement partiel des colonies vers des sites urbains aux dépens de sites naturels, la ville de Lorient a, à son tour, été investie par des reproducteurs. Dès 1982 (Cadiou, 1977) un couple est signalé. L'installation se fait d'abord sur les ports de pêche et de commerce. Là, comme ailleurs, on peut penser que le double attrait d'une alimentation d'accès facile à base de déchets industriels et la tranquillité assurée sur les toits des bâtiments et entrepôts a conditionné la réussite de la colonisation. A la fin de la décennie quatre-vingt-dix quelques nids sont repérés dans la ville proprement dite, ce nouvel essor est confirmé lors du recensement de 2001 (Cadiou, 2002).



Couples nicheurs de Goélands argentés nicheurs à Lorient ; source G.O.B. et Bretagne-Vivante

La progression des effectifs nicheurs a été forte sur toute la période considérée, entraînant divers désagréments et plaintes consécutives des riverains. Depuis 2002, des campagnes de stérilisation des œufs par double aspersion de produits toxique et conservateur ont pour but de limiter les gênes causées par ces nouveaux sites de nidification. Les interventions sont limitées à la ville et excluent les ports (D. Crublet, *com. pers.*).

Dans cet historique, les criées du port de pêche ont été rapidement occupées, elles représentaient en 1990 la moitié des nids recensés au mois de mai (54 sur un total de 116 ; J.-P. Aucher *in* archives du G.O.B. Morbihan). Leur part relative a bien sûr rapidement décliné devant l'expansion des goélands qui ont trouvé de nombreux autres endroits où installer leur nid sur les zones portuaires (port de commerce, base des sous-marins...) puis en ville. Cela n'a pas empêché que de nouveaux couples s'y sont


continûment ajoutés. De ce fait, en 2001, l'ensemble des criées est plus densément colonisé mais ne représente plus qu'une modeste part du total lorientais (Tableau 1.).

Recensements	% criées / Lorient
1990	46,55%
1998	9,83%
2001	5,13%

Tableau 1.

EFFECTIFS

Le présent travail a pour base une fraction seulement de ces toits industriels, la crie n°3, face au bassin long. Les premiers essais de recensement (G.O.B., 1990) ne mentionnent pas la répartition des couples sur les criées mais (observation personnelle) nous pouvons la considérer comme précoce. Sur la période considérée, l'augmentation du nombre de nids y a été presque constante, plus forte que sur l'ensemble des criées.



Goélands nicheurs (couples) sur les criées de Lorient, 1997-2004

Année	Couples couveurs	Couples producteurs	Couples à succès
1997	15	14	13
1998	26	26	20
1999	31	24	21
2000	33	29	23
2001	36	30	26
2002	40	29	24
2003	35	29	22
2004	43	25	16

Couples de Goélands argentés sur la crie n°3 : 1997-2004

- Couples nicheurs

A partir de 15 couples en 1997, la progression est forte l'année suivante (+70%) puis s'amoin-drit pendant quatre ans. Un recul (-5 unités) enregistré en 2003 est inversé dès l'année suivante où l'effectif installé culmine à 43 couples.

- Couples producteurs (c'est à dire tout couple ayant produit au moins un poussin ou jeune)

L'évolution des effectifs montre plusieurs épisodes : sur une base de 14 couples, un palier s'installe autour de 25 entre 1998 et 1999 puis un second dure quatre ans près de 30 couples. Enfin, 2004 marque une chute des couples producteurs avec -13,79%.

La part des couples producteurs sur les couples nicheurs est d'abord élevée. En effet tous produisent des jeunes en 1998, puis le taux se situe entre 72 et 87% pendant cinq ans sans tendance définie mais, en 2004, il y a un fort échec des couples installés, seuls 28% d'entre eux produisent un poussin.

- Couples à succès (ou tout couple ayant produit au moins un poussin en plumage juvénile même si l'envol n'est pas constaté)

La hausse est continue entre 1997 et 2001, l'effectif double de 13 à 26 couples. Suivent deux années de baisse et une diminution marquée en 2004 (-6)

Pendant cette période, et mise à part l'année 1997, le rapport Couples à succès / Couples producteurs a oscillé entre 75 et 87%, sans tendance affirmée et ne baisse qu'en 2004. Corrélativement, la part des Couples à succès sur Couples nicheurs est plutôt à la baisse. Les trois quarts des couples nicheurs ont d'abord élevé une couvée puis, par à-coups, la part est passé à moins de deux-tiers. L'année 2004 se singularise, logiquement, avec un succès minimal de 37% des Nicheurs.

Année	Pourcentage		
	Cp/Cc	Cs/Cp	Cs/Cc
1997	93,33%	92,86%	86,67%
1998	100,00%	76,92%	76,92%
1999	77,42%	87,50%	67,74%
2000	87,88%	79,31%	69,70%
2001	83,33%	86,67%	72,22%
2002	72,50%	82,76%	60,00%
2003	82,86%	75,86%	62,86%
2004	58,14%	64,00%	37,21%

Goélands argentés, parts relatives des Couples nicheurs Cc, Couples producteurs Cp, Couples à succès, Cs.


CALENDRIER ANNUEL

Toutes les dates proviennent du suivi assuré entre 1997 et 2004 du groupe de goélands reproducteurs de la criée n°3 du port de pêche. Les visites ont été au moins hebdomadaires, jusqu'à l'apparition des premiers jeunes puis ont pu être plus rapprochées selon les disponibilités du moment, cela pour mieux suivre le développement et les déplacements des grands poussins.

A chaque fois, pour chaque nid, étaient notées l'occupation des nids, le nombre et l'âge apparent des jeunes, jusqu'à ce qu'ils revêtent le plumage juvénile. Cependant, quand un nid occupé par des jeunes en plumage juvénile presque complet, à l'exception de plumes duveteuses sur le cou et la tête, est vide la semaine suivante, les jeunes sont réputés avoir quitté le nid à cette date (dernière observation + 1 semaine). C'est la seule occasion où un calcul remplace une observation.

En effet, de nombreuses naissances de poussins sont passées inaperçues lors d'une voire plusieurs visites jusqu'à ce que je les trouve à un stade déjà avancé. Aucun calcul n'est effectué pour situer une date de naissance, ces nids ne contribuent donc pas à la recherche des paramètres statistiques liés à la couvaison.

Une nichée est considérée comme un tout puisqu'il n'y a pas moyen de distinguer en son sein les différents poussins. C'est la date du premier poussin et du premier jeune qui vaut pour le nid.



Crée n°3 du port de pêche de Lorient

Entre 1998 et 2003 inclus, 201 couples couveurs ont été suivis pendant leur couvaison et l'élevage. Ils correspondent à 70 sites de nids individualisés. Cependant tous n'ont pas fourni à tout coup l'ensemble des renseignements calendaires recherchés. En moyenne, la date d'installation est connue pour 96,71% des nids chaque année, sans grande variation. En revanche, la part de nids dont les poussins sont vus dès leurs premiers jours est inférieure et décroît. En moyenne 63,41% des nids sont renseignés pour ce paramètre. L'année 2003 est nettement en deça des précédentes. L'acquisition du plumage juvénile – assimilée à l'envol des poussins – est connue dans 68,23% des cas, avec des variations interannuelles. Ces renseignements sont ensuite attribués à une période de dix jours, selon un découpage décadaire de l'année, à partir du premier janvier.


Tous nids confondus, sur la période de six années,

- la moyenne décadaire ($n = 195$) d'installation est de 11,79 soit vers le 28 avril (écart type = 1,0702), la médiane se situe à 11 (20 avril) et le seuil de 80% des nids installés à 12 (30 avril).
- Le premier poussin est vu en moyenne à 15,38 (3 juin) pour $n = 124$, l'écart type égale 0,942. La médiane est à 15 (30 mai) et le seuil de 80% des nids à 16 (9 juin).
- L'acquisition du plumage juvénile est constaté en moyenne à 18,77 soit vers le 07 juillet ($n = 134$ et écartype = 0,965), la médiane à 19 comme le seuil 80%.

C'est dire que l'installation se produit massivement sur une courte période ce qui n'exclut pas quelques couples retardataires.

La période d'éclosion suit ce même schéma et si les dates d'envol sont plus étalées, ce n'est le fait que de quelques jeunes, presque toutes les dates se concentrent sur deux décades.

Les trois périodes se suivent sans solution de continuité, le chevauchement est marginal.



Déroulement de la saison

BIBLIOGRAPHIE

- Cadiou B., 1997.- La reproduction des goélands en milieu urbain : historique et situation actuelle en France. *Alauda*, 65 : 209-227
- Cadiou B. / Bretagne Vivante - SEPNEB, 2002 – Les oiseaux marins nicheurs de Bretagne.
- Groupe Ornithologique Breton, 1991 – ar Vran Morbihan n°2 Observations ornithologiques du Morbihan pour la période du 16 mars 1990 au 14 novembre 1990.

APRES-MIDI FASTE

Franz URVOAZ et Yannick ORDUREAU

En ce samedi 19 février 2005, un vent glacé du nord-est nous accueille lorsque nous ouvrons les portières de la voiture. Depuis le 15 janvier, lors de la sortie Wetlands 2005, nous avons repéré l'accès à ce coin de nature qui surplombe la rive nord de la Vilaine et nous nous étions promis de revenir pour une découverte plus approfondie. Je ne suis pas encore sorti du véhicule que Yannick s'écrie :

« - Viens voir, des garde-bœufs ! ».

En effet, émergeant par dessus l'herbe haute, parmi les pattes d'un troupeau de vaches qui paissent à environ 150 mètres de nous, une ou deux têtes apparaissent par intermittence. Equipés contre la température et la longue-vue sur l'épaule, nous contournerons la ferme et nous dénombrons pas moins de huit petits hérons au bec jaune qui s'affairent dans le pré, se déplaçant avec rapidité d'une vache à l'autre pour venir saisir une proie que les ruminants ont dérangée.

Plus tard, en cette même après-midi, après avoir arpenté l'allée de châtaigniers multi centenaires et pour la plupart morts, à la recherche de loges de pics, nous débouchons sur le bord de la Vilaine recouverte d'herbe grasse. A une petite distance, soixante dix bernaches profitent du garde-manger. Nous dérangeons deux groupes de tadornes de Belon qui, au repos en contrebas sur les berges envasées de la rivière ne prennent leur envol qu'au dernier moment tout aussi surpris que les deux observateurs qui s'attardent à les compter.

C'est en nous retournant vers le bosquet de pins où nous soupçonnions l'existence d'une petite héronnière que nous apercevons le faucon pèlerin qui tourne à la hauteur des cimes, dérangé sans doute dans sa sieste par notre arrivée impromptue. Il ne paraît guère effarouché et revient même vers nous comme s'il avait délaissé son perchoir à regret. Puis il s'éloigne au-dessus de la rivière tout en prenant de l'altitude de son puissant vol battu et c'est en le suivant à la jumelle que nous apercevons un puis deux groupes de vanneaux qui, à bonne hauteur se dirigent vers l'embouchure. Le pèlerin poursuit son ascension et soudain nous comprenons qu'il fonce droit sur un vanneau qui s'étant laissé distancer par ses congénères se retrouvait attardé, seul à l'écart du groupe.

Parvenu à bonne distance, le faucon effectue un premier piqué ailes fermées pour attaquer sa victime qui, au moment de l'impact fait un brusque écart pour échapper à son prédateur. A plus de dix reprises les attaques vont se succéder à un rythme soutenu et nous sommes persuadés que le pèlerin va parvenir à « lier » sa proie en plein vol. Mais cette dernière, loin de se résigner, s'efforce également de prendre de l'altitude pour parer les assauts. Plusieurs fois, elle paraît ne pouvoir échapper mais toujours au dernier moment, un soudain changement de direction fait échec au poursuivant. Alors que nous nous imaginions que le faucon finirait par épuiser sa proie, c'est le contraire qui se produit, le pèlerin arrête ses attaques et d'un long vol plané descend vers la berge opposée de la Vilaine puis disparaît sous le couvert d'un pin.

Quatre remarques nous viennent à l'esprit suite à cette observation :

- le pèlerin que nous avons dérangé a su faire preuve d'opportunisme croyant pouvoir s'offrir un repas facile.
- son attaque mal préparée car, à l'origine il n'était pas véritablement en chasse, ne lui a permis ni de surprendre sa proie en plein ciel ni de prendre suffisamment de vitesse pour fondre sur celle-ci : deux éléments essentiels d'une attaque réussie.
- en prenant lui-même de l'altitude, le vanneau a empêché le pèlerin de se placer de façon idéale pour effectuer son piqué final.
- toutes les attaques ne sont pas fructueuses. Dans son livre « Le faucon pèlerin », publié chez Delachaux et Niestlé, René-Jean Monneret estime que le taux de réussite des attaques est « d'une prise pour dix à quinze attaques manquées ». D'autres observateurs plus optimistes jugent que le faucon mènerait à son terme une attaque sur trois ou cinq.