

Sommaire du numéro 29 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 mars 2004 à 15 novembre 2004	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 16
Groupe 3 de l'Huïtrier pie au Tournepipe à collier	page 22
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 28
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 36
 Activités du G.O.B. Morbihan	
Saison 2005 du programme national STOC EPS dans le Morbihan	page 53
 Notes de terrain	
<i>Gallicus</i> au pays gallo	page 55
Suivi d'un groupe colonial de Goélands argentés (<i>Larus argentatus</i>) sur les criées de Lorient (2 ^e partie)	page 57
Pénestin au temps des canes mouquetières	page 62
 Documents	
Synthèse ornithologique hoëdicaise annuelle du 16 juillet 2003 au 15 juillet 2004	page 65
En guise d'inventaire...	page 107

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE : 16 MARS 2004 A 15 NOVEMBRE 2004

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises :
 Artel Jean-Pierre ; Blanchard Jean-Luc, Boussion Dominique, Bozec René ; Corlou
 Pierre ; Derian Gwenael ; Derian Muriel, Egen Roger, Ermel Gérard, Gautier
 Sébastien ; Guérard Anthony, Guillas Arnaud, Guillemot Francis, Hamet Loïc ; Holden
 Richard, Iliou Bernard ; Kerninon Yann, Le Doze Anthony ; Le Galludec Marc,
 Lemonnier Jean-Luc ; Loiseau Jean-Paul ; Maout Jacques ; Mauguin Paul, Orain
 Catherine ; Ordureau Yannick, Philippon Patrick ; Gérard Sourget ; Urien Xavier ;
 Urvoaz François, Zgiski Gabrielle... sauf erreur ou omission !

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton
 (Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre
 au 15 mars.

Un fichier de saisie rapide peut être demandé auprès du coordonnateur morbihannais.
 Dans le cas d'une transmission sur papier, merci de respecter l'ordre suivant :

abréviation ou nom d'espèce	effectif	remarque	indice de reproduction	date	lieu-dit	commune
ech bla (Echasse blanche)	8	le nid est installé sur un bassin désaffecté	nid occupé	25/05/04	Kerlapous	SILFIAC

Illustration : couverture Patrick Bailleul. Dessins p62 Françoise Lemonnier. Photos pp22, 40, 57 et 61
 Gwenael Derian, p35 Yannick Ordureau, p65 Arnaud le Nevé.

AR VRAN MORBIHAN N°29

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwenael Derian

Plongeur indéterminé *Gavia sp.*

(1 donnée)

Deux plongeurs imbrins ou arctiques devant la pointe des Saisies à Gâvres le 28/10/2004.

Plongeur catmarin *Gavia stellata*

(2 données)

Un individu en plumage d'hiver le 15/04/2004 à la pointe du Conguel / Quiberon et 1 en plumage de premier été le 21/10 à la pointe des Saisies / Gâvres.

Plongeur arctique *Gavia arctica*

(2 données)

Pas d'observation printanière. Un Arctique le 03/11 au Loc'h / Guidel. La rareté des données de plongeurs nous laisse penser que nous manquons de renseignements sur l'hivernage en baie de Quiberon mais on peut trouver inhabituelle l'observation suivante : 1 le 15/11 sur l'étang de Bel-Air à Priziac !

Plongeur imbrin *Gavia immer*

(4 donnée)

Un individu de plumage de premier été probable le 30/03/2004 à la pointe de Porh-Lineneu / Erdeven ; 5 adultes nuptiaux posés le 18/10 à la pointe des Saisies / Gâvres ; 4 le 08/11 ; 3 le 15/11 à la pointe er Hourél de Locmariaquer.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

(215 données)

Reproduction certaine :

- Crucuno / Erdeven, un poussin le 10/06/2004.
- Er Varquez / Erdeven, chanteurs fin mars, quatre couples présents le 12/04 puis 2 gros poussins le 16/06.
- Kercadoret / Saint-Philibert, 2 nids au début de juin, 1 poussin le 14/06. Le 11 juin un nouveau nid et 6 poussins et 3 jeunes plus développés.
- Kerran / Saint-Philibert, deux nids la première quinzaine de mai.
- lagunages de Damgan, un couple et 1 jeune le 04/08.
- Le Puil / Lauzach, un couveur le 15/06.

Reproduction possible à probable :

- Château-Trô / Guilliers, un couple le 12/07.
- marais salant du Hézo, un couple le 6 avril.
- Moténo / Plouhinec, deux couples dans dépression dunaire le 26 avril.
- Chanteurs sur la station d'épuration de Meslan le 17/07.


Rassemblements :

103 à Bonnavero / Theix constituent la plus forte concentration constatée.

dates	effectif
23/03	1
05/08	3
19/08	13
24/08	13
27/08	2
09/09	5
11/09	3
26/09	1
30/09	4
05/10	14
08/10	3
15/10	8
03/11	18
05/11	17
15/11	13

dates	effectif
02/07	16
10/07	8
17/07	18
22/07	15
27/07	22
06/08	26
14/08	11
19/08	16
25/08	18
01/09	34
12/09	31
17/09	27
25/09	21
01/10	33
08/10	21
22/10	13
02/11	25
12/11	23

Grèbe castagneux à Pen Mané / Locmiquélic et sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon (Morbihan) ; mars – novembre 2004



Grèbe castagneux sur l'étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; mars – novembre 2004

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

(181 données)

Reproduction certaine :

- Coët-Rivas / Kervignac, 3 couples paradent le 27/03/2004, ensuite un couple conduit un poussin de deux à trois semaines le 30/06.


- étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 3 couples et jeunes le 11/06.
- étang du Cranic / Brec'h, des parades dès fin mars, 5 couples entre les 09/05 et 13/07, au moins 3 couples produisent des poussins.
- étang de Noyalo, au moins 7 couples nichent.
- étang de Branguily / Gueltas, au moins deux couples nicheurs.
- Château-Trô / Guilliers, un couple.
- étang de Lopheret / Erdeven, un couveur le 09/04, un nouveau nid le 18/05, peut-être un nid de remplacement.
- réservoir du Loc'h / Brec'h, 3 couveurs le 06/05.
- étang au Duc / Ploermel : nicheurs.

Reproduction possible à probable :


- Kervran / Plouhinec, un couple parade le 20/04.
- étang de la Forêt / Brandivy, deux couples paradent le 28/04.

Les cartes suivantes permettent de comparer la situation en 2004 avec celle de l'enquête spécifique de 1998.


Rassemblements : 34 à Damgan le 19/09 ; sur le Blavet maritime les retours sont sensibles à partir de mi-juillet, 17 le 21/07.



Grèbe huppé sur l'étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) printemps-automne 2004



Grèbe huppé sur l'étang de Saint-Jean / Locol-Mendon (Morbihan) ; été-automne 2004



1998

Grèbe huppé


● Reproduction certaine

▲ Reproduction possible / probable



2004

Données JPLS



Grèbe huppé sur l'étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) printemps-automne 2004

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

(1 donnée)

Toutes observations effectuées depuis la pointe er Hourel / Locmariaquer : 3 le 29/03/2004, 4 le 08/11 et 6 le 15/11.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

(69 données)

Encore 35 à Kerner / Riantec le 25/03/2005 puis une lacune s'étend entre les 11/04 et

25/06 à partir de laquelle date on signale l'espèce sur les côtes et des étangs. Ainsi 3 individus dont un jeune au Cranic / Brec'h vus dès le 22/07 sont parfois accompagnés de congénères (8 les 8 et 12/10). 30 le 27/10 à Penthievre / Saint-Pierre-Quiberon, 36 le 08/11 et 40 devant er Hourel / Locmariaquer.

Fulmar boréal *Fulmaris glacialis*

(1 donnée)

Une dizaine de couples installés sur les falaises le 26/04/2004 à Pen Men / Groix.

Puffin indéterminé *Puffinus ou Calonectris sp*

(6 données)

3 individus le 23/08/2004 puis 1 à 4 devant Gâvres, Houat et Damgan.

Puffin fuligineux *Puffinus griseus*

(1 donnée)

3 à la pointe des Saisies / Gâvres le 29/10/2004.

Puffin des anglais *Puffinus puffinus*

(1 donnée)

5 le 29/08/2004 à Treutan / Damgan.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

(12 données)

Aux deux extrémités du département :

- Surzur, 7 le 27/05/2004 à Kergénêt puis 10 le 22/07 à Kerguizec, 29 à l'Epinay le 25/07 ; 14 à Camoël le 30/09.
- Guidel, du 16/09 au 04/10, jusqu'à 7 individus au Grand Loc'h.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

(175 données)

Reproduction : île Cuhan / la Trinité sur Mer, au moins 12 nids le 07/05/2004, cette colonie n'était pas connue. Kerzo / Port-Louis, 9 aires occupées le 02/06. Pont-Challand / Muzillac, une vingtaine de nids le 15/05. La colonie de Riec'h / Belz est occupée mais malaisée à recensée.

Dortoirs : 8 à l'étang de la Forêt / Brandivy le 22/03 puis le retour s'effectue en novembre (2 le 05/11). 110 à Tréhuiguier / Pénestin, le 21/08.

Rassemblements : 87 le 31/08 au Pô / Plouharnel, 84 à Cuhan le 18/06 dont de nombreux jeunes de la colonie, 69 le 17/07 à Kersahu / Gâvres représentent la presque totalité des aigrettes alors présentes dans la rade, 64 au Cranic / Brec'h le 01/10.

Grande Aigrette *Egretta alba*

(20 données)

Une seule donnée au printemps (1 au Grand Loc'h / Guidel le 29/03/2004) puis reprise à partir de mi-juillet :

- Kersahu / Gâvres, 1 le 17/07, 1 le 01/11 dans la Petite Mer.
- Saint-Jean / Locoal-Mendon, 3 le 06/08, 1 le 22/10, 1 le 12/11.
- Grand Loc'h / Guidel, 3 le 18/08, 2 le 30/08, 1 le 06/09.
- étang de Lezay / Saint-Dolay, 1 le 26/08.

Héron cendré *Ardea cinerea*

(196 données)

Reproduction : Cuhan / la Trinité sur Mer, 2 nids le 07/05/2004, cette héronnière n'était pas connue. Kerzo / Port-Louis, 11 aires occupées et des jeunes le 02/06. Riec'h, des aires occupées et des jeunes le 15/06. Marais du Bézo / Saint-Dolay, au moins deux jeunes le 08/04. Pont Chaland / Muzillac, une vingtaines de nids le 15/04.

Rassemblements : 46 le 12/10, 41 le 05/10, 39 le 08/10, 34 le 01/10, 35 le 15/10, à l'étang du Cranic / Brec'h, autour des poissons en manque d'oxygène.

Héron pourpré *Ardea purpurea*

(4 données)

1 le 30/06/2004 au marais du Bézo / Saint-Dolay ; 1 le 04/09 au marais du Bill- Larmor / Damgan ; 1 juvénile le 13/09 sur l'étang du Moulin de Pomperà Baden ; 1 le 18/09 au Loc'h / Guidel.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

(61 données)

L'espèce reste plus présente dans l'est du département : le 30/06/2004, 152 sur Govihan / Sarzeau, jusqu'ici site de nidification ; 115 à Coët Digel / Berric le 25/09. Noter 2 individus harcelés par des sternes nicheuses sur l'îlot de Rédion en rivière de Pénérf.

28 le 30/08 à Kerpenhir / Locmariaquer. 3 le 06/06 sur la héronnière mixte de Cuhan / la Trinité sur Mer.

L'ibis est à peu près absent de la rivière d'Étel pendant l'été mais deux individus dont un jeune visitent la héronnière de Riec'h / Belz le 13/06. En septembre-octobre, un groupe est assidu au Cranic / Brec'h, 19 le 12/10.

Rade de Lorient : absence entre les 23/03 et 18/07 avec 46 individus sur le Blavet. Puis on trouve l'Ibis sacré sur les marais salés et les vasières de la rade ou sur des prairies proches (38 au Guerno / Plouhinec le 29/10).

Spatule blanche *Platalea leucorodia* (29 données)

Seules sont représentatives de la situation les données de l'ouest du Morbihan :

- anse de l'Istrec / Locoal-Mendon, 14 le 26/03. Pas revue en été sur la rivière.
- Cranic / Brec'h, une fin d'estivage entre les 09/07 et 02/09/2004 de la part d'un (jeune) adulte.
- rade de Lorient : dernière vue à Pen Mané / Locmiquélic le 14/05, retour constaté le 31/08 à Kersahu / Gâvres, aucune jusqu'au 09/10 avec 6. Ensuite seulement 1 les 05 et 08/11 dans la Petite Mer de Gâvres, 1 au Guerno / Plouhinec avec les Ibis le 11/11, 3 dans la Petite Mer le 13/11.

Cygne tuberculé *Cygnus olor* (58 données)

Reproduction : étang de la Brousse / Sarzeau, un couple parade le 07/04/2004 puis est accompagné de deux jeunes le 09/06. Pen Mané / Locmiquélic, un couveur le 08/04. Etang du moulin de la Motte / Camors, le 27/04, un couveur...

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* (1 donnée)

L'originale des chroniques précédentes était encore sur les marais de Falguérec / Séné au moins le 08/04/2004.

Oie cendrée *Anser anser* (5 données)

- le 29/03/2004 au Grand Loc'h / Guidel, 13 le 09/04.
- 16 le 09/10 en Petite Mer de Gâvres et 2 le 15/10.

Bernache du Canada *Branta bernicla* (1 donnée)

Une le 06/04/2004 sur les bassins du Matz / Sarzeau.

Bernache nonnette *Branta leucopsis* (1 donnée)

Deux le 06/04/2004 sur les bassins du Matz / Sarzeau.

Bernache cravant *Brenta bernicla* (49 données)

Dernière signalée le 05/04/2004 dans l'anse de Kerlédan / Larmor-Baden.

Estivage : 1 les 12 et 27/06 en Petite Mer de Gâvres n'a pas été recherchée ensuite. 2 le 22/08 à l'île Bacchus à Pénestin, d'après des témoins une au moins avait été vue durant juillet et août.

Premiers retours : 5 au Bile / Pénestin le 25/09, 6 le 16/10 à Treutan / Damgan, 73 le

Puffin des Baléares / Yelkouan *Puffinus yelkouan*

(2 données)

18 le 26/10/2004 au Conguel / Quiberon et 1 le 28/10 à la pointe des Saisies / Gâvres.

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus*

(1 donnée)

A la pointe des Saisies / Gâvres, le 28/10/2004, 1 individu.

Fou de Bassan *Sula bassana*

(22 données)

Devant Gâvres, des observations répétées : 123 le 11/09/2004, 70 le 13/10, avec une majorité de jeunes oiseaux, en direction de l'est.


Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

(105 données)

Reproduction : 75 individus le 30/06/2004 et des nids encore visibles sur les cyprès dénudés de Govihan / Sarzeau le 05/08.

Dortoirs : à Bourgerel/ Arzal, 135 le 21/08. Le dortoir de l'étang de la Forêt / Brandivy est vide pendant l'été, 7 individus le 05/11. Sur Roelan / Erdeven, 30 individus le 07/11, 179 sur Méaban / Locmariaquer le 15/11, 40 au port de guerre / Lorient le 02/06.

Reposoirs diurnes : 31 le 23/08 dans le secteur Lenn-Treutan-grande plage-Larmor / Damgan, faible présence estivale sur l'étang de Cranic / Brec'h puis hausse des effectifs en septembre - octobre avant de décliner (max : 93 le 05/10). Sur l'étang de Saint-Jean, l'estivage est plus marqué.

*Grand Cormoran sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon (Morbihan) ; juin-octobre 2004***Cormoran huppé** *Phalacrocorax aristotelis*

(3 données)

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

(2 données)

Un individu au Varquez / Erdeven le 09/04/2004. Deux points d'écoute à Saint-Jean / Locoal-Mendon le 01/04 se soldent par une absence de contact.

23/10 au Duer / Sarzeau, 2 le 02/10 dans la Petite Mer de Gâvres puis 38 le 09/10, 600 au Moustoir / Arzal le 10/10. 1675 le 12/11 à Gâvres, 1170 dans la baie de Plouharnel le 07/11. 1 hrota à Gâvres le 06/11.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

(160 données)

Reproduction : dans la rade de Lorient, l'inventaire semble exhaustif avec deux sites de rassemblements des familles. 14 familles totalisant jusque 126 poussins à Kersahu / Gâvres et 5 familles à Pen Mané / Locmiquélic.

Ailleurs, les données sont éparées mais on relève davantage de renseignements en rivière d'Etel : 12 poussins à Kerfrézec / Sainte-Hélène le 28/04/2004 qui ont pu gagner le lagunage de Sainte-Hélène, un couples et 7 poussins à Lizaloué / Nostang le 24/07 puis 11 poussins à Nostang sur le lagunage 28/06 (peut-être la même famille), 1 femelle et 4 poussins le 02/07 à Saint-Jean / Locoal-Mendon. 1 à 2 familles à l'île Cuhan / la Trinité sur Mer, 9 poussins sur les bassins de Poulben / Auray le 21/05.

Rassemblements :

111	24/03	Marais de Pen en Toul	Larmor-Baden
169	25/03	Petite Mer de Gâvres	Riantec
280	05/04	Pen en Toul	Larmor-Baden
200	11/04	Banc de strado	Muzillac
192	02/11	Port Groix - Pentes- Le Lic	Surzur
111	12/11	Lédec Néguan	Locoal-Mendon

Canard siffleur *Anas penelope*

(35 données)

Les retours sont ressentis en mi-septembre et s'accroissent à la mi-octobre : 1100 au Duer / Sarzeau le 23/10/2004, 124, 177 et 390 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon respectivement les 22/10, 02 et 12/11. La Petite Mer de Gâvres est effleurée par ces mouvements : 20 le 09/10, 65 le 30/10, 45 le 06/11.

Canard chipeau *Anas strepera*

(7 données)

Données isolées.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

(80 données)

175 à Toulvern / Larmor-Baden le 24/03/2004 et 67 à Pen en Toul. 35 à 40 à Lannéac / Ploemeur signalent une fin d'hivernage modeste sur place. Lacune du 13/04 au 178/07. 145 à Toulvern le 09/10 et 160 le 06/11, 270 au Duer / Sarzeau le 23/10.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

(203 données)

Des familles sont signalées entre le 24/03 et le 29/07/2004.

Dates	Effectif	Lieu-dit	commune
18/06	118	Pen Mané	Locmiquelic
17/07	120	étang du Cranic	Brec'h
17/07	100	station d'épuration	Meslan
22/07	132	étang du Cranic	Brec'h
25/07	127		Brec'h
28/07	164		Brec'h
29/07	102	Pen Mané	Locmiquelic
29/07	122	Roc'h Du	Locmariaquer
01/08	152	étang du Cranic	Brec'h
04/08	124		Brec'h
07/08	110		Brec'h
08/08	115		Brec'h
12/08	145		Brec'h
15/08	151		Brec'h
20/08	149		Brec'h
25/08	145	étang de Saint-Jean	Locoal-Mendon
31/08	100	étang des Basses Landes	Saint-Marcel
14/09	234	étang du Roc'h Du	Crac'h
24/09	113	étang de Toulvern	Baden
23/10	400	Le Duer	Sarzeau
23/10	175	Pont Nivino	Plouay
24/10	145	étang de Toulvern	Baden
06/11	108	baie de Kerdréan	Baden
08/11	106	pointe Erlong	Locmariaquer

Canard pilet *Anas acuta*

(6 données)

120 le 19/03/2004 à Falguérec / Séné.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

(23 données)

Quelques couples de passage au printemps : le Loc'h / Guidel, Lannéec / Ploemeur, Suscinio / Sarzeau, le Cranic / Brec'h, Bétahon / Ambon, Pen Mané / Locmiquelic, Kercadoret / Saint-Philibert. 13 le 06/09/2004 au Grand Loc'h / Guidel.

Canard souchet *Anas clypeata*

(36 données)

200 à Falguérec / Séné le 19/03/2004. Fin d'hivernage à Lannéec / Ploemeur, avec au moins 15 le 29/03. Lacune entre les 02/05 et 01/08. 50 puis 30 le 12/09 et le 16/10 sur le lagunage de Damgan.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

(42 données)

Au printemps : 4 mâles à Suscinio / Sarzeau le 28/03 et 22 le 04/04/

- étang au Duc / Vannes : 25 le 02/11, 53 le même jour après dérangement à Bonnervo / Theix.

- Bonnervo / Theix, 6 le 03/10 et le 21/10, 54 le 07/11.
- le Cranic / Brec'h : le dernier est vu le 02/04 les retours observés partir du 18/07, 1 possible jeune de l'année. Un petit estivage se déroule : maximum de 28 le 22/08 puis l'effectif décroît.
- le Ter / Ploemeur : le premier mâle est vu le 21/10, 23 individus le 05/11.

Fuligule morillon *Aythya morillon*

(32 données)

Un couple à Suscinio / Sarzeau le 04/04/2004, 2 jeunes le 10/09... Sur l'étang au Duc / Vannes, 3 le 02/11. Au Cranic / Brec'h, 45 le 24/03. Un seul mâle séjourne d'août à octobre. Bonnervo / Theix, 3 le 03/10, 7 le 24/10, 12 le 31/10, 8 le 07/11.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

(10 données)

- Fort-Bloqué / Ploemeur, 12 en vol vers le sud le 04/11/2004, 4 le 15/11 d'er Hourel / Locmariaquer.
- la baie de Vilaine est fréquentée par les eiders en mue : 47-49 dont 17 mâles le 02/05 puis 2 en mue entre les 11/07 et 12/09. Sous les falaises du Bile / Pénestin, un groupe de 56 eiders est composé d'oiseaux en plumages divers.

Macreuse noire *Melanitta nigra*

(13 données)

Une macreuse à l'étang de Brézéhan / Inguiniel le 01/04/2004 a su montré son sens de la date ! En été : quelques passages observés depuis Gâvres, 2 le 18/10, 80 le 28/10, 2 le 29/10, 75 le 30/10.

Macreuse brune *Melanitta fusca*

(1 donnée)

Une seule donnée mais pour 70 Macreuses brunes face à l'île Dumet le 06/10/2004.

Harle huppé *Mergus serrator*

(12 données)

68 à Kerdréan / Baden le 29/03/2004, 59 dans la rivière de Saint-Philibert le 11/04. Retours : 1 le 21/10 devant Gâvres, 49 au moulin de Coët Courzo / Locmariaquer le 15/11.

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis*

(8 données)

Deux femelles puis une seule sur l'étang du Cranic / Brec'h séjournent entre les 07 et 9/08/2004.

AR VRAN MORBIHAN N° 29

Groupe n° 2 Des rapaces aux rallidés.

Choix et rédaction établis par Franz Urvoaz

Accipitridae sp

(1 donnée)

Le 04/06/2004, deux plumées provenant respectivement d'un geai et d'un ramier sont découvertes sur la même souche dans la forêt de Floranges / Camors. Le prédateur pourrait avoir été un autour.

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

(16 données)

Cette espèce a fait l'objet d'observations sur 8 communes : Camors, Nostang, Plouhinec, Ambon, Locmariaquer, Brec'h, Landaul et Brandivy.

Une femelle et un mâle de forme claire effectuent un vol circulaire le 25/07/2004 à Brec'h et deux individus dont au moins un jeune cerclent en effectuant de longs miaulements à Nostang le 14/08.

Milan noir *Milvus migrans*

(32 données)

Les données proviennent de 9 communes : Sarzeau, Plougoumen, Noyal, Brec'h, Surzur, Plescop, Pont-Scorff, Locoal-Mendon et Muzillac. Le premier Milan noir de la saison est noté le 02/04/2004 et le dernier le 04/08/.

Des couples se sont reproduits de façon certaine sur les communes de Sarzeau (2), Muzillac (1) et Guidel (1). Un couple parade le 22/04/2004 à Brec'h.

Milan royal *Milvus milvus*

(2 données)

Le 13/02/2004, un individu est observé sur la commune de Rieux et le 07/11, un oiseau vole vers l'ouest à Locoal-Mendon.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

(96 données)

Cette espèce est observée sur 22 communes : Locoal-Mendon, Gâvres, Brec'h, Baden, Ambon, Plouhinec, Sarzeau, Guidel, Ploemeur, Surzur, Locmiquélic, Séné, Erdeven, Saint-Dolay, Crac'h, Damgan, Riantec, Béganne, Sainte-Hélène, Saint-Philibert Muzillac et Rieux.

Un couple nicheur est noté à Plouhinec le 03/04/2004, un passage de proie est observé à Erdeven le 12/04 et le 21/06, un couple alarme au même endroit. & Un couple est également noté nicheur à Muzillac le 15/05. Un passage de proie est observé à Locoal-Mendon les 11/06 et 10/07. 2 juvéniles sont vus à Locmiquélic le 15/08, 1 mâle et un juvénile à Brec'h le 22/10.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

(49 données)

Ces données proviennent de 18 communes différentes : Languidic, Brec'h, La Chapelle

Neuve, Plouhinec, Landaul, Grand-Champ, Brandivy, Locoal-Mendon, Camors, Bohal, Elven, Campénéac, Merlevenez, Landévant, Gueltas, Noyal-Muzillac, Arzal et Malansac.

A noter les parades d'un couple à Brec'h le 13/04. Un adulte crie sur le site de reproduction à Camors le 24/04; un juvénile sera entendu au même endroit le 26/06. Transport de nourriture le 24/04 sur la commune de Landaul.

Busard cendré *Circus pygargus*

(1 données)

Une femelle est notée dans la commune de Campénéac sur le camp militaire le 27/06/2004.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

(2 données)

La première observation est faite sur la commune de Brec'h le 22/10/2004 et la seconde sur la commune de Ploemeur durant l'été.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

(80 données)

41 communes sont concernées par ces observations à savoir : Ploemeur, Nivillac, Rochefort en Terre, Brandivy, Bubry, Surzur, Camors, Erdevén, Plumelin, Noyal, Saint-Armel, Plescop, Saint Dolay, Brec'h, Pont-Scorff, Languidic, Landaul, Sérent, Saint-Barthélémy, Plouhinec, Merlevenez, Crac'h, Plunéret, Pluvigner, Locmiquélic, La Trinité sur Mer, Saint-Pierre Quiberon, Larmor-Baden, Berric, Brandérion, Gâvres, Arzon, Plouharnel, Theix, Locoal-Mendon, Damgan, Locmariaquer, Hennebont, Pluherlin, Muzillac et Ambon.

Une femelle capture un pigeon le 20/04/2004 à Languidic et est longuement observée à courte distance, plumant et dépeçant sa proie. Un individu chasse des insectes sur la pelouse littorale le 31/08 à Saint-Pierre Quiberon. Une femelle capture un étourneau sansonnet le 13/09 à Pen en Toul / Larmor-Baden. Un mâle manque son attaque sur un Chevalier guignette le 19/10 à l'étang du Cranic / Brec'h. Un autre mâle échoue dans sa tentative d'attaque sur un reposoir de limicoles le 08/11 à Locmariaquer. Deux mâles sont découverts morts, l'un à Pluvigner sur la D16 le 25/07 et l'autre à Hennebont sur la N165 le 09/11.

Quelques données de reproduction : Une femelle alarme à Plouhinec le 03/06, une autre à Merlevenez le 07/06. Une femelle couve à Crac'h le 09/06 et deux jeunes y seront vus quémendant le 08/08. Une aire vide avec un mâle et un jeune se pourchassant aux alentours est découverte à La Trinité sur Mer le 04/08.

Buse variable *Buteo buteo*

(143 données)

Les données proviennent de 41 communes. A Camors le 24/04/2004, puis à Brec'h le 21/05 des individus sont observés transportant un serpent dans leurs serres. Une buse est trouvée morte sur la D768 le 05/11 à Camors. Une buse de phase très claire est aperçue à Saint Dolay le 28/11.

Quelques données concernant la saison de reproduction : une aire occupée le 06/04 à Sarzeau. Le 01/07 des jeunes seront vus sur l'aire. Un couple alerte le 07/04 au Hézo. Un couple parade le 16/04 à Camors. Un couple nicheur à Plouhinec le 24/04. Deux jeunes sur l'aire le 23/06 à Plunéret. Des juvéniles crient dans l'aire le 01/07 à Saint-Guyomard. Dès le début du mois de juillet des juvéniles qui quémendent ou qui crient

sont notés posés ou en vol sur les communes de Vannes (01/07), de Guiliers (12/07), de Surzur (25/07), de Camors (31/07) et de Locoal-Mendon (06/08).

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* (36 données)

Ce rapace est noté sur 13 communes différentes : Theix, Locoal-Mendon, Nostang, Noyal, Brec'h, Pénestin, Damgan, Plougoumelen, Locmiquélic, Baden, Crac'h, Guidel et Hennebont. Une seule donnée printanière : le 12/04/2004 à l'étang de Saint-Jean de Locoal-Mendon. Les 35 autres données concernent la migration post-nuptiale entre les 09/07 et 12/10. Parmi les 36 observations, 6 concernent 2 individus aperçus simultanément.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (85 données)

Les observations concernent 40 communes : Séné, Vannes, Le Saint, Lanester, Guidel, Surzur, Languidic, Bubry, Plumelin, Sarzeau, Baud, Erdeven, Treffléan, Sulniac, Le Hézo, Grand-Champ, Locmiquélic, Plouhinec, Brec'h, Pont-Scorff, Brandivy, Plumelin, Ploëren, Le Faouët, Pluherlin, Ambon, Inzinzac-Lochrist, La Trinité-sur-Mer, Billiers, Crac'h, Sainte-Hélène, Ploemeur, Plouharnel, Guern, Arzon, Theix, Quistinic, Damgan et Marzan.

Données relatives à la saison de reproduction : accouplement le 23/03/2004 à Languidic, deux couples cantonnés à Plumelin/Inzinzac le 23/05, nourrissage de jeunes le 01/06 à Inzinzac-Lochrist, le 06/06 à Brandivy, le 10/06 à La Trinité sur Mer, le 20/06 à Plumelin. Des jeunes sont entendus à Crac'h le 18/06, à Sainte-Hélène le 22/06. Une aire est découverte sur un pylône le 26/06 à Plouharnel : 3 jeunes sont au pied du pylône et deux sont encore sur le nid. A Erdeven, le 29/06, une aire contient 4 jeunes. Un cinquième est pendu par une patte dans l'arbre. Un mâle, une femelle et un juvénile sont aperçus près d'une ferme à Brandivy le 10/07. A Surzur un juvénile crie le 25/07. Une femelle et un juvénile chassent des insectes dans un pré à Brandivy le 26/07. Un mâle et deux jeunes dont l'un chasse à terre (des sauterelles ?) le 22/08 à Pénestin. Deux adultes accompagnés de 3 jeunes sont notés le 26/07 à Plouhinec. Une anecdote pour conclure : le 13/04, un mâle mange un lézard vert *Lacerta viridis* à Pen Mané / Locmiquélic.

Faucon émerillon *Falco columbarius* (10 données)

Des observations sont effectuées dans 6 communes différentes : Erdeven, Rieux, Guern, Riantec, Plouhinec et Muzillac. Au printemps, le dernier individu nous quitte le 12/04/2004 (Sainte-Barbe / Erdeven) et à l'automne, le premier est de retour le 17/10 (Kerperh / Guern).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* (51 données)

28 communes fournissent des observations à savoir : Plouhinec, Locoal-Mendon, Camors, Brec'h, Etel, Damgan, Langonnet, Elven, Erdeven, Merlevenez, Vannes, Brandivy, Ambon, Surzur, Sainte-Hélène, Crac'h, Plescop, Rochefort-en-Terre, Pluherlin, Cléguer, Pénestin, Noyal, Campénéac, Guidel, Landévant, Berné, Kervignac et Lauzach.

La première arrivée est notée le 20/04/2004 à Plouhinec et le dernier départ le 09/10 à Lauzach. Deux couples se sont reproduits sur la commune de Camors. Un adulte et un

juvénile sont notés ensemble à Brec'h le 28/09.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

(7 données)

Le Faucon pèlerin est observé dans 4 communes durant cette période à savoir : Ambon, Damgan, Gâvres et Muzillac. L'observation la plus marquante concerne un adulte posé sur le rocher de Bédume / Damgan le 06/11/2004, en pleine mer et stationnant paisiblement parmi les huîtres, grands cormorans, tadornes, sternes, hérons et autres courlis.

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

(7 données)

Une dizaine de couples sont répertoriés sur Groix le 26/04/2004 entre Port-Tudy et le Trou de l'Enfer. Les autres données proviennent de Languidic, Pluvigner, Ambon et Le Tour du Parc.

Perdrix grise *Perdix perdix*

(1 donnée)

Le 05/11 à l'étang du Cranic / Brec'h.

Caille des blés *Coturnix coturnix*

(2 données)

Les 2 données concernent le même endroit : Bodavel / Camors les 3 et 13 septembre 2004.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

(6 données)

Une femelle et 8 jeunes à Kermoisan / Languidic le 11/06.

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

(57 données)

Les observations proviennent des communes de Locmiquélic, Larmor-Baden, Erdeven, Locoal-Mendon, Ambon, Saint-Philibert, Brec'h, Gâvres, Camoël, Brandivy et Plouhinec.

Dans la quasi totalité des cas, il s'agit d'individus entendus, cependant un juvénile est vu à l'étang du Cranic / Brec'h le 08/09/2004. De nombreuses observations faites en ce lieu font état de 4 individus entendus.

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

(1 donnée)

Un individu est entendu le 11/06/2004 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

(136 données)

15 individus sont rassemblés à l'étang du Loch / Damgan le 20/03/2004.

Les preuves de reproduction proviennent de : la station d'épuration de Meslan le 17/07 (une famille), Le Hahon / Carnac le 22/05 (un adulte couve), l'étang de Kercadoret / Saint-Philibert le 06/06 (2 pulli) puis 3 familles notées le 24/06 et enfin 10 adultes avec 9 jeunes et 3 poussins le 23/08, l'étang de la Forêt / Brandivy le 14/06 (2 adultes avec 2+2 poussins) puis un couple avec 3 poussins le 12/07, les Prières / Billiers le 16/06 (4

juvéniles), l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 25/06 (1 adulte avec un poussin), l'étang de Tréhervé / Ambon le 02/07 (1 jeune), l'étang du Cranic / Brec'h le 09/07 (des adultes et 3 jeunes). 3 adultes et 12 juvéniles y sont notés le 04/08, le marais de Kerpenhir / Saint-Philibert le 29/07 (3 jeunes), l'étang du Château / Guilliers le 12/07 (plusieurs couples avec des juvéniles, Plascaër / Crac'h le 08/08 (1 poussin), Poulbert / La Trinité sur Mer le 16/08 (1 juvénile est nourri).

Pour terminer quelques rassemblements post-nuptiaux remarquables : 13 individus à l'étang du Cranic le 15/09, 7 individus à l'étang du Moulin / Baden le 07/10 et 9 le 19/10 à l'étang de la Forêt / Brandivy.

Foulque macroule *Fulica atra*


(242 données)

Données concernant la reproduction :


- marais salants / Le Hézo : 1 couveur le 06/04/2004.
- étang du Cranic / Brec'h : 1 couveur le 09/04, 2 couveurs le 17/04, 3 couveurs le 27/04, un couple avec 4 poussins le 06/05, 2 familles de 4 et 4 poussins le 09/05, 3 familles de 3, 4, 5 poussins le 26/05 et finalement 5 familles le 30/05.
- Loperhet / Erdeven : 1 couveur à 1 mètre d'un Grèbe huppé couveur le 09/04, 2 couveurs le 11/04.
- étang de Kercadoret / Saint-Philibert : 3 pulli le 11/04.
- Cromenac'h / Ambon : 4 juvéniles le 11/04, puis 6 jeunes le 18/06.
- Crucuno / Erdeven : 3 jeunes le 26/04, 5 jeunes le 01/06.
- marais de Tréhervé / Ambon : 1 couveur et un adulte avec 2 jeunes le 24/05.
- plan d'eau du Matz / Sarzeau : 2 jeunes le 27/05.
- étang de la Brousse / Sarzeau : 4 jeunes le 09/06.
- marais de Suscinio / Sarzeau : 1 jeune le 09/06.
- étang de Rhodes / Sainte-Hélène : 1 couveur le 11/06.
- Er Varquez / Erdeven : environ 10 jeunes le 15/06.
- le Loc'h / Damgan : 6 jeunes le 16/06.
- étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon : des juvéniles et quelques gros poussins le 02/07.
- lagunes / Damgan : 3 juvéniles le 11/07
- étang du Château / Guilliers le 12/07 : 15 juvéniles et 2 poussins.
- étang de Kervran / Plouhinec : plusieurs gros poussins le 07/08.

Rassemblements post-nuptiaux les plus remarquables :

- 1220 individus aux lagunes de Bonnavo / Theix le 26/08, puis 713 le 03/10.
- 650 individus à Quélisoye / Larmor-Plage le 07/09, puis 763 le 05/10.
- 440 individus à l'étang de Toulvern / Baden le 13/09, puis 720 le 06/11.
- 445 individus à l'étang du Roc'h Du / Crac'h le 07/10, puis 333 le 15/11.
- 361 individus à Pen Mané / Locmiquélic le 15/10.



*Foulque macroule sur l'étang de Saint-Jean/ Locoal-Mendon (Morbihan) ;
juillet – novembre 2004*



*Foulque macroule sur l'étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ;
mai – novembre 2004*

AR VRAN MORBIHAN N° 29

Groupe n° 3 De l'Huîtrier pie au Tournepierrre à collier

Choix et rédaction établis par Yannick Ordureau

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

(32 données)

De nombreuses données avec des effectifs importants à Damgan : 115 le 23/08/2004 à Treutan, 95 le 29/08, 177 le 19/09, 128 à Bétahon le 06/11. Plus d'une centaine le 22/08 à l'Île Bacchus / Pénestin. Plusieurs données émanant de la presqu'île de Quiberon dont 140 individus le 26/10 à Le Conguel / Quiberon, 158 en reposoir à marée haute à la pointe er Hourel / Locmariaquer le 8/11 et 140 le 15/11.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

(62 données)

Les trois premières sont repérées le 02/04/04 dans le marais de Kerpenhir / Locmariaquer. Un regroupement de 20 individus dans le marais de Suscinio / Sarzeau le 04/04/04 et de 26 individus le 26/04 au Dreff / Riantec.

Reproduction certaine :

- Kersahu / Gâvres, 3 couples à partir du 04/04 ; 2 poussins le 27/06. Au moins deux familles réussissent.
- Le Dreff / Riantec, au moins deux couples avec succès.
- Kerpenhir / Locmariaquer, un couple.

Reproduction possible ou certaine (données isolées ou déplacement estival) :

Cromenac'h / Ambon, lagunes de Damgan, PontCaden / Le Tour-du-Parc (un couple), le Brénéguy / Locmariaquer (un couple), Kercadoret / Saint-Philibert (uncouple).

Pen Mané accueille entre fin juin et début septembre deux familles de jeunes volants, peut-être issues du Dreff.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

(24 données)

Un regroupement de 90 individus le 19/03/2004 à Falguérec / Séné, de 68 dans le marais de Pen en Toul / Larmor Baden, de 345 à Kerentré / Noyalo.

Reproduction :

- 14 individus sont cantonnés pour nicher le 6/04 à l'étang du Hézo
- deux couples couvent le 20/06 dans le marais de Suscinio / Sarzeau

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

(20 données)

Le 22/08/2004 un individu est observé dans un champ de navets à Kerzine / Plouhinec, puis un dans les dunes le ¼ à Kerbasquin / Plouhinec et un est entendu le 12/04 Kerminihy / Erdeven.

Reproduction :

Le 26/04 un couple est observé au nid à Kerbasquin / Plouhinec, mais le 15/05 le nid est vide (forte pression des promeneurs et des chiens).

A Kerminihy, un couple est observé au nid dès le 20/05 et donnera naissance à 2 jeunes observés les 14/06, 15/06, 27/06 et 28/06.

Glaréole à collier *Glareola pratincola* (1 donnée)

Un individu est observé le 12/07/2004 dans le marais de Cran / Rieux

Petit Gravelot *Charadrius dubius* (10 données)

40 individus sont observés le 9/05/2004 à Le Lenn / Damgan en zone de repos à marée haute.

Reproduction :

- un couple observé dans un habitat favorable à la reproduction le 24/05/2004 dans le marais de Tréhervé / Ambon
- un autre donnera naissance à 2 jeunes à Pen Mané / Locmiquélic.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* (45 données)

Des regroupements importants dans la Petite Mer de Gâvres sont consignés dans le tableau suivant :

Date	21/08	26/09	02/10	01/11	06/11	13/11
Effectif	800 à 1000	360	380	>400	250	470

Une concentration de 600 individus dans un bassin à marée haute le 24/08/2004 à Bétahon / Ambon.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (20 données)

La plupart de ces données concernent la reproduction :

- deux accouplements le 22/04/2004 à Kerminihy / Erdeven.
- un couple couveur le 09/06 à Suscinio / Sarzeau.
- 2 jeunes le 20/06 dans les marais de Suscinio / Sarzeau.
- 2 jeunes et une femelle le 02/07 à Bétahon / Ambon.
- un couple avec poussins le 14/07 dans l'Îlot de Riom / Damgan.

Pluvier guignard *Charadrius* (1 donnée)

Un individu entendu sur les dunes de Kerbasquin / Plouhinec le 26/04/2004.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (27 données)

Les données en Petite Mer de Gâvres / Plouhinec sont consignées dans le tableau suivant :

Date	25/04	26/04	2/10	9/10	15/10	23/10	1/11	6/11	13/11
effectif	45	64	84	149	122	455	393	359	364

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

(35 données)

*Pluvier argenté dans la Petite
Mer de Gâvres (Morbihan) ;
octobre-novembre 2004*

Dates	effectif
02/10	32
09/10	93
01/11	190
06/11	230
13/11	462

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

(122 données)

Reproduction :

- à Ty Rhu / Locoal Mendon, parades le 16/08/2004, une femelle au nid le 21/04 et une femelle avec 3 jeunes le 25/05.
- un couveur le 13/04 à l'Isle / Plouhinec.
- un couple et un poussin le 26/04 à Pen Men / Groix.
- un couple et 3 jeunes le 05/05 dans le marais de Cran / Rieux.
- un poussin à Kersahu / Gâvres le 2/07.

Date	Effectif	Localité	Commune
26/09	98	Petite Mer de Gâvres	
02/10	106		
09/10	80		
18/10	11		
01/11	324		
02/11	355	Pentès	Surzur
06/11	530	étang de Pomper	Baden
09/11	450	Fontenelles	Taupont
28/11	3500	étang du Lezay	Saint Dolay
28/11	400	marais de Cran	Rieux

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

(13 données)

A partir du 21/08/2004, il est régulièrement et en petit nombre (max. 22 le 26/09) observé dans la Petite Mer de Gâvres. Un regroupement de 48 individus est signalé le 07/11 dans la baie de Plouharnel.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

- (18 données)

Des regroupements intéressants à la Petite Mer de Gâvres : 100 le 21/08/2004, 130 le 2/10, 140 le 01/11 et 80 le 13/11; un autre de 121 individus le 19/10 à Fort Bloqué / Ploemeur.

Bécasseau minute *Calidris minuta*

(7 données)

La dernière donnée printanière est notée le 25/07/2004 à Kersahu / Gâvres . Le retour est notifié le 03/09 à Pen Mané / Locmiquélic. Le maximum est de 15 individus observés le 12/09/ à Pen Mané.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

(15 données)

La dernière observation a lieu le 05/06/2004 à Iniz er Mour / Sainte Hélène. On retrouve l'espèce à partir du 30/07 dans le marais de Suscinio / Sarzeau. Les trois derniers sont signalés le 13/11 à la Petite Mer de Gâvres / Plouhinec.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

(4 données)

Observation de 2 individus le 20/10/2004 à la Pointe des Saisies / Gâvres, de 2 le 31/10 à Le Loc'h / Guidel, de 3 le 03/11 à Fort Bloqué / Ploemeur et de 6 le 08/11 à Keriourec / Erdeven.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

(79 données)

Quelques concentrations intéressantes en dehors de la Petite Mer de Gâvres :

- 450 le 01/05/2004 à Larmor / Damgan.
- 350 le 09/05 à Le Lenn / Damgan.
- 750 le 07/11 dans la baie de Plouharnel.
- 800 le 08/11 à la Pointe er Hourel / Locmariaquer.

Date	19/07	21/08	10/09	26/09	2/10	9/10	01/11	06/11	13/11
Effectif	346	2000	1500	820	1400	600	>1200	1400	>1100

Bécasseau variable, Petite Mer de Gâvres (Morbihan) ; juillet-novembre 2004

Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellu*

(1 donnée)

Présence le 09/09/2004 d'un juvénile parmi des Bécasseaux variables à Pen Mané / Locmiquélic.

Combattant varié *Philomachus pugnax*

(14 données)

Il est surtout noté à Pen Mané / Locmiquélic, mais aussi à Cremenac'h / Ambon le 15/09/2004, à Kersahu / Gâvres le 26/09 et à Le Loc'h / Guidel le 31/10.

Date	19/08	24/08	27/08	03/09	09/09	11/09	12/09	15/09	23/09
Effectif	3	5	2	2	7	5	20	3	1

Combattant varié, Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan) ; août – septembre 2004

Bécassine sourde *Lymnocyrtus minimus*

(1 donnée)

Un individu observé le 06/12/2004 à Le Passoué / Allaire.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

(86 données)

Observations au printemps du 23/03/04 au 24/04/04 dont 26 individus à l'étang de Pomper / Baden. Le reste des observations se situe surtout à partir de la mi-Août avec quelques concentrations intéressantes :

- 27 le 01/09/2004 à Suscinio / Sarzeau.
- 25 le 27/09 à Cremenach' / Ambon.
- 25 le 16/10 dans les lagunes de Damgan.
- 60 le 6/11 à l'étang de Pomper / Baden.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

(9 données)

La dernière donnée du printemps est notée le 20/04/2004 à Bocolo / Elven. Deux individus sont observés le 26/11 à La Foix / Pluherlin.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

(31 données)

Des observations printanières dont 3 individus le 19/03/2004 à Falguérec / Séné. Des regroupements de 136 individus le 24/03 à Pen en Toul / Larmor Baden, 2500 le 11/04 au Banc de Strado / Muzillac.

Au retour, 232 le 24/09 à Pen en Toul / Larmor Baden, puis 128 le 07/10.

Barge rousse *Limosa lapponica*

(25 données)

Plusieurs observations printanières dont 40 individus le 20/03/2004 dans le marais de Castel / Le Tour du Parc, 19 le 27/06 à Le Dreff / Riantec. Les autres commencent fin août dont 38 individus le 23/08 à Lenn-Treutan / Damgan et 22 le 10/10 à la Petite Mer de Gâvres.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

(53 données)

Près de la moitié des observations sont printanières dont 74 individus dans les prairies et vasières du Listrec / Locoal-Mendon le 23/04/2004, 105 en vol vers la ria d'Étel à Ty Rhu / Locoal-Mendon le 24/04 et 50 en vol à Le Lenn / Damgan le 09/05. Ensuite 96 individus sont notés le 25/07 au Listor / Landévant et une trentaine le 22/08 au Bronzais / Pénestin.

Courlis cendré *Numenius aquata*

(61 données)

Cinq données printanières dont 29 individus le 25/03/2004 à La Petite Mer de Gâvres / Plouhinec et 33 dans un champ labouré à la Lande du Moulin / Damgan le 2/05. De bonnes concentrations dès la fin août dont 248 individus, avec l'albinos, le 04/09 dans le marais du Bill-Larmor / Damgan, 290 le 19/09 à Redion / Damgan, 205 le 13/11 au Duer / Sarzeau et 129 le 23/11 au Banc de Strado / Muzillac.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

(9 données)

Quatre données printanières dont la présence de 20 individus à Pen en Toul / Larmor-Baden le 05/04/2004, 47 individus le 24/09 à Pen en Toul / Larmor-Baden et 81 le 07/10 à l'étang de Toulvern / Baden.

Chevalier gambette *Tringa totanus* (95 données)

Pour la reproduction, un accouplement est signalé le 24/04/2004 à Le Dreff / Riantec, un couple nicheur à Kergal / Surzur et la présence d'un poussin le 11/07 à Redion / Damgan. Les rassemblements s'amorcent dès fin juin avec la présence de 59 individus à Pen Mané / Locmiquélic le 28/06 et atteignent leur maximum courant septembre avec 210 individus le 04/09 dans le marais du Bill / Damgan puis 154 le 19/09 à Redion / Damgan et 117 le 24/09 à Pen en Toul / Larmor-Baden.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (57 données)

Un nombre conséquent de données pour cette espèce dont 10 printanières. A Kersahu / Gâvres, 12 le 26/09, le premier est signalé le 17/07.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (77 données)

Un nombre important de données dont 5 printanières. Le passage post-nuptial est amorcé dès le début juillet avec un pic à la mi-septembre et début octobre.

Chevalier sylvain *Tringa glareola* (10 données)

Un à quatre individus entre le 12/08 et le 13/09/2004 dont 4 le 19/08 à Pen Mané / Locmiquélic.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (117 données)

Parmi ces très nombreuses données, huit sont printanières. Le retour est sensible dès début juillet. Quelques concentrations avec 25 individus le 29/07/2004 à Pen Mané / Locmiquélic, 25 le 01/08 au port de Pénerf / Damgan, 25 le 04/08 dans les lagunes de Damgan, 25 le 23/08 à Lenn-Treutan / Damgan et 25 dans le Marais du Bill / Damgan.

Tournepierre à collier *Arenaria interpres* (39 données)

Au printemps, 140 individus sur la Grande Plage / Damgan le 20/03/2004 et plus de 100 le 02/05 à Bétahon / Ambon. Une concentration de 170 individus le 23/08 à Lenn-Treutan / Damgan et de 110 le 07/11 dans la Baie de Plouharnel.

AR VRAN MORBIHAN N°29

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Yann Kerninon.

Stercorariidae sp.

(1 donnée)

Une donnée d'un labbe "pomasite" juvénile lors d'une séance "tal ar mor" le 18/10/2004 à la pointe des Saisies / Gâvres.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*

(2 donnée)

5 le 09/09/2004 à la pointe du Conguel / Quiberon et 2 passent le 29/10 à la pointe des Saisies / Gâvres.

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*

(1 donnée)

Début juin, un individu est observé dans le golfe près du Duer / Sarzeau. La date, le lieu et le fait que l'oiseau était posé rendent cette observation rare à plus d'un titre. Il a même pu être photographié dans de bonnes conditions (*comm. pers. Pierre Le Goff*).

Un second oiseau pour cette période, un juvénile, harcèle des Sternes caugeks le 23/08/2004 à la pointe du Halguen / Pénestin.

Grand Labbe *Catharacta skua*

(3 données)

Devant la pointe des Saisies / Gâvres : 1 le 18/09/2004 et 1 le 13/10.

Bel effectif le 26/10 à la pointe du Conguel / Quiberon avec 14 individus, mais sans autre précision (migration ? stationnement ?).

Laridae sp.

(2 données)

Deux regroupements de grisards sur les étangs de Branguily / Gueltas : 400 le 19/09/2004 et 250 le 03/10.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

(30 données)

Comme pour la période précédente, le nombre de données est en hausse.

Les dernières sont vues en mars (3 le 16/03/2004 à l'étang du Cranic / Brec'h, 1 le 24/03 au marais de Pen en Toul / Larmor-Baden) et les retours sont notés à compter de la troisième décade de juillet. 80 % de ces données (24/30) concernent des observations de 1 à 5 individus, pour le reste relevons :

- 26 le 21/07 dans un champ à Kerpenhir / Locmariaquer,
- 15 le 04/09 à la Roche Sèche / Erdeven
- 8 le 09/09 au Conguel / Quiberon
- 11 le 28/09 à l'étang du Cranic / Brec'h, seul site intérieur où l'espèce se montre régulièrement

- 44 le 15/11 à la pointe er Hourél / Locmarquer, effectif qui annonce l'hivernage de l'espèce dans ce secteur.

Mouette pygmée *Larus minutus*

(5 données)

In extenso : 1 le 22/08/2004 à Tréguier / Pénestin, 2 le 16/10 sur les lagunes de Damgan, 1 le 22/10 à Cromenac'h / Ambon, 3-4 parmi des Mouettes rieuses le 28/10 à Porh Puns / Gâvres et 4 en migration le 30/10 devant la pointe des Saisies / Gâvres.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*


(135 données)

Le premier jeune de l'année est noté le 13/06/2004 à Iniz er Mor / Sainte-Hélène. La proportion de juvéniles a été relevée dans plusieurs groupes (seuls les groupes de plus de 50 oiseaux ont été considérés) :

Lieu-dit	Commune	Date	Effectif total	Nombre de juvéniles	% de juvéniles
Pen Mané	Locmiquélic	18/06	199	3	1,5
		25/06	66	2	3
		28/06	145	1	0,68
		05/07	73	4	5,47
embouchure du Riant	Riantec	05/07	79	3	3,79
Pen Mané	Locmiquélic	14/07	160	2	1,25
		15/07	123	3	2,43
Penhoët	Merlevenez	16/07	300	8	2,67
Pen Mané	Locmiquélic	17/07	293	4	1,36
		21/07	156	8	5,1
étang du Cranic	Brec'h	22/07	93	8	8,6
Pen Mané	Locmiquélic	23/07	136	5	3,67
étang du Cranic	Brec'h	25/07	80	8	10
		02/09	301	35	11,62
		05/09	298	17	5,7

Quelques rassemblements :

- 2800 et plusieurs centaines encore (posées ou moucheronnant) le 07/08 sur et autour de la Petite Mer de Gâvres, 650 le 21/08 uniquement sur la Petite Mer et 434 le 18/10.
- 450 le 18/08 et 1050 le 02/11 dans l'anse de l'Istrec / Locoal-Mendon.
- 432 le 24/09 et 700 le 06/11 à l'étang du Moulin de Pomper / Baden.
- 400 le 29/08 à Treutan / Damgan.
- 2000 le 19/11 à Moustoir / Arzal.
- 2500 le 23/11 sur le banc du Stado / Muzillac.



Mouette rieuse, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) , juin-novembre 2004

Goéland cendré *Larus canus*

(34 données)


Dernières mentions au printemps : le 24/03/2004, 2 à l'étang du Cranic / Brec'h et 1 au marais de Pen en Toul / Larmor-Baden.

Les 2 premiers sont de retour le 05/07 dans l'embouchure du Riant / Riantec, mais il faut attendre début août pour que l'espèce soit à nouveau signalée avec 3 (1 + 2) le 04/08 à Larmor et Treutan / Damgan, ensuite elle devient régulière, mais en petit nombre.

Seulement 4 données concernent des groupes de 10 individus et plus :

- une dizaine le 22/08 au Bronzais / Pénestin,
- 66 (43 + 23) le 15/11 entre Saint-Cado et la pointe de Levein / belz,
- 16 le 15/11 à la pointe er Hourél / Locmariaquer.

Dans l'intérieur du département, l'espèce aura été détectée six fois à l'étang du Cranic avec de 1 à 4 individus. L'espèce reste peu détectée sur les sites "terrestres" : 2 sur un pré le 29/10 au Guerno / Plouhinec.



Goéland brun, étang du Cranic / Brec'h, (Morbihan) ; mars-novembre 2004

Goéland brun *Larus fuscus*

(93 données)

Aucun élément pour évoquer la reproduction.

Peu de grands rassemblements. 56,9 % des données (53/93) concernent des effectifs de 10 individus et moins. Dans les terres : 65 le 06/04/2004 au réservoir du Loc'h / Brec'h, 20 le 19/09 et 19 le 14/11 aux étangs de Branguily / Gueltas...

Sur le littoral :

- 80 le 10/09 en Petite Mer de Gâvres,
- 400 le 02/10 à Port Parnec / Hoëdic,
- 81 le 17/09, 127 le 27/09 et 195 le 02/11 autour de la presqu'île du Néguan / Locoal-Mendon,
- 70 le 02/11 entre Port Groix et Le Lic / Surzur.

Goéland argenté *Larus argentatus*


(88 données)

Fort peu d'éléments de la reproduction :

- 18 nids comptés le 10/06/2004 sur l'église Saint-Louis / Lorient,
- 2 nids avec poussins le 02/07 sur l'île aux Souris / Port-Louis.

Quelques rassemblements :

- 2600 le 01/08 et 2300 le 29/08 à Treutan / Damgan,
- 193 grisards parmi d'autres goélands le 13/08 au port de pêche de Lorient,
- 498 (dont un individu blanc) le 21/08 à Bel Air / Pénestin,
- 200 le 21/08, 232 le 26/09, 173 le 02/10 et 147 le 18/10 en Petite Mer de Gâvres,
- 300 le 01/09 autour de l'étang de Kéravéon / Erdeven,
- 250 le 07/11 sur l'îlot de Roëlan / Erdeven
- 192 le 14/11 aux étangs de Branguily / Gueltas...



Goéland argenté, étang du Cranic / Brec'h (Morbihan) ; mars-novembre 2004

Goéland marin *Larus marinus*

(27 données)

Noté nicheur le 12/06/2004 au port de pêche de Lorient et le 02/07 sur l'île aux Souris / Port-Louis (un nid avec un poussin).

Peu de rassemblements rapportés :

- 15 le 01/09 autour de l'étang de Kéravéon et 38 le 07/11 sur l'îlot de Roëlan / Erdeven,
- 12 le 19/07, 16 le 21/08, 22 le 01/11 et 11 le 06/11 en Petite Mer de Gâvres...
- 50 le 01/08 et 20 le 29/08 à Treutan / Damgan.

L'espèce n'a pas été vue dans l'intérieur du département.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

(1 donnée)

Après avoir disparu durant près de 27 mois de cette chronique, l'espèce réapparaît à la faveur d'une donnée transmise par un observateur extérieur au GOB : 3 le 10/10/2004 sur l'étang de Lannénec / Ploemeur.

Sternidae sp.

(4 données)

Ces 4 données concernent des sternes "pierrarctiques" de passage devant la pointe des Saisies / Gâvres (ex : 8 le 30/10/2004).

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(77 données)

Pour la deuxième année consécutive, la Sterne caugek s'est reproduite en rivière d'Étel sur la colonie d'Iniz er Mour : 3-4 couples (2 en 2003) et des poussins y sont vus en juin et juillet.

Date	13/10	18/10	20/10	21/10	23/10	28/10	29/10	30/10
Effectif	12	9	31	14	5	4	10	12
Durée	45 min	30 min	40 min	50 min	45 min	60 min	60 min	40 min

Guet à la mer, Pointe des Saisies / Gâvres

Beaucoup de petites bandes : 57,14 % des données (44/77) concernent des effectifs de 10 individus et moins.

Au printemps : une centaine les 21 et 22/04/2004 devant la Barre d'Étel où un observateur les note encore "très nombreuses" le 01/05... Les principaux rassemblements ont été observés à Damgan : 220-230 le 01/08 à Saint-Guérin, 160 le 04/08 à Treutan, 117 le 23/08 entre Le Lenn et Larmor, 130 le 12/09 à Treutan... Au moment de la dispersion post-nuptiale, Pen Mané / Locmiquélic a apparemment accueilli peu d'oiseaux par rapport aux années passées.

Ailleurs : 32 le 22/08 au Bronzais-Plage / Pénestin, 30 le 23/08 à la pointe du Halguen / Pénestin, 32 le 26/10 au Conguel / Quiberon...

Sterne élégante *Sterna elegans*

(2 données)

Deux observations de cette sterne exotique et pour deux individus différents sur le site de Pen Mané / Locmiquélic : 1 le 14/07/2004 et 1 (bague métal) le 31/08 (cf. Ar Vran 56 n°27).

Sterne de Dougall *Sterna dougallii*

(0 donnée)

Personne a été visité cette sterne sur ses sites du golfe.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

(86 données)

L'espèce est signalée à partir du 11/04/2004 et jusqu'au 03/11, soit une période d'observation plus longue que lors des synthèses précédentes.


Éléments de la reproduction :

- 2 juvéniles parmi 12 adultes le 18/05 à Suscinio / Sarzeau,

- 1 couple transporte des matériaux le 27/05 à l'étang du Hézo,
- 160 à 180 couples reproducteurs sur la colonie d'Iniz er Mor / Sainte-Hélène,
- l'espèce s'est reproduit dans la rade de Lorient pour la première fois depuis 1973 avec 1 couple qui produit 1 jeune à l'envol (sur 2 poussins) à Kersahu / Gâvres,
- en rivière de Saint-Philibert, 5 pulli sur une barge le 18/06, puis 7 jeunes sternes sur leurs nids le 24/06,
- le 11/07, 15 couples nicheurs dénombrés avec poussins et jeunes non volants à Redion / Damgan
- 30 à 50 couples le 14/07 sur l'îlot de Riom / Damgan

En marge de ces observations, un couple se cantonne tardivement à l'étang du Cranic / Brec'h à partir du 04/07 jusqu'à la mi-août, mais, malgré les alarmes et d'autres manifestations, il n'y entreprend rien de sérieux. Ce site voit également passer d'autres oiseaux, adultes et juvéniles, jusqu'à la mi-octobre (16 données au total) avec un maximum de 4 individus le 20/08 (2 adultes et 2 juvéniles) et le 12/10 (1 adulte et 3 juvéniles).

Effectifs : 68,6 % des données (59/86) concernent des groupes de 10 individus et moins. Le passage printanier n'est pas renseigné. Le rassemblement post-nuptial le plus important réunit 73 sternes le 13/08 à Quélisoye / Larmor-Plage. Les sites de Ty Douar et Pen Mané / Locmiquélic, régulièrement suivis, fournissent les effectifs suivants :



Sterne pierregarin, Ty Douar et Pen Mané / Locmiquélic (Morbihan) ; juin-octobre 2004

Aucun rassemblement en provenance du littoral est.

Dernières observations : 2 adultes et 3 juvéniles le 02/11 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 1 juvénile le lendemain à Pen Mané / Locmiquélic.

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

(1 donnée)

Une observation intérieure : 1 adulte accompagne 4 Sternes pierregarins le 12/10/2004 à l'étang du Cranic.

Sterne naine *Sterna albifrons*

(9 données)

En juin : 1 le 11/06/2004 près de la colonie de sternes d'Iniz er Mor / Saint-Hélène, 2 le 18/06 à Pen Mané / Locmiquélic.

En août : 3 le 21/08 en baie de Locmalo / Gâvres, 1 à Pénerf / Damgan et 1 au Bronzais-Plage / Pénestin le 22/08, et 1 le lendemain devant la grande plage de Damgan.

Les 3 dernières données proviennent de l'étang de Lannénec / Ploemeur : 2 à 6 le 10/10, 12 le 12/10 et 1 très tardive observée le 10/11.



Sterne arctique, le Rohu / Saint-Pierre Quiberon (Morbihan) ; août 2005

Guifette moustac *Chlidonias hybridus*

(4 données)

- étang du Cranic / Brec'h : 1 juvénile le 28/07/2004 et le 01/08, puis 1 adulte le 15/08.
- Le Bronzais / Pénestin : 1 le 22/08.

Guifette noire *Chlidonias niger*

(21 données)

Deux mentions lors du passage prénuptial : 2 le 27/04/2004 à l'étang du Cranic / Brec'h et 1 le 23/05 près de la colonie de sternes d'Iniz er Mor / Sainte-Hélène.

Le passage postnuptial se déroule du 25/07 au 01/10 sur les sites suivants : Bétahon / Ambon (1 donnée), étang de Toulvern / Baden (1 donnée), étang du Cranic / Brec'h (9 données et un maximum de 6 individus le 22/08), lagunage de Damgan (1 donnée avec 5 oiseaux le 12/09), le Grand Loc'h / Guidel (1 donnée), Pen Mané / Locmiquélic (2 données), étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon (3 données), étang de Noyalo (1 donnée). Les 2 dernières sont vues au Cranic / Brec'h le 01/10.

Alcidae sp.

(5 données)

78 alcidés ("surtout des guillemots") le 15/2004 devant la pointe du Conguel / Quiberon.

Guillemot de Troïl *Uria aalge*

(1 donnée)

Le 30/03, un jeune en pêche devant la pointe de Porh-Lineneu / Erdeven.

Date	09/10	13/10	18/10	21/10
Effectif	12	1	2	11
Durée d'observation	60 min	45 min	30 min	50 min

Guillemot de Troïl, guet à la mer, pointe des Saisies / Gâvres (Morbihan) ; octobre 2004

Pingouin torda *Alca torda*

(9 données)

En été, 1 le 11/07/2004 à Treutan / Damgan. Dans le même secteur, 1 le 19/09 et 1 le 16/10.

Quelques-uns devant la pointe des Saisies lors de guets à la mer : 4 le 09/10 et 7 le 20/10, 1 le 28/10. Toujours en octobre, le 26 : 1 à Pen er Lé / Plouharnel et 1 au Conguel / Quiberon.



Le nouveau prédateur des sternes ?

AR VRAN MORBIHAN N° 29

Groupe n°5 Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Yann Kerninon, Gwenaél Derian et Jean-Luc Lemonnier

Effraie des clochers *Tyto alba* (10 données)

Les données proviennent des communes suivantes : Camors, Houat, La Chapelle-Neuve, Languidic, Locoal-Mendon, Nostang, Noyal-Pontivy, Saint-Thuriau. Elle est notée nicheuse uniquement à Kergollaire / Languidic avec au moins 2 jeunes observés le 04/07/2004. La donnée de l'île d'Houat concerne la découverte le 03/10 d'une rémige aux abords du fort.

Chevêche d'Athéna *Athena noctua* (13 données)

13 données, mais elle est uniquement contactée sur 2 sites à Erdeven et Nostang. Après un contact avec 1 individu le 09/04/2004, 3 dont 1 juvénile sont trouvés le 27/06 à Crucuno / Erdeven, puis encore 1 oiseau le 29/06 et le 31/08. A Saint-Thomin / Nostang, les 8 contacts auditifs et 1 visuel recueillis (3 individus entendus le 30/07 et 13/08) laissent espérer une reproduction locale.

Chouette hulotte *Strix aluco* (37 données)

Contactée sur 19 communes : Allaire, Ambon, Arradon, Baud, Brandérion, Brandivy, Brec'h, Camors, Grand-Champ, La Chapelle-Neuve, Languidic, Molac, Nostang, Ploeren, Pluherlin, Pluméliau, Surzur, Tréfléan, Vannes. La plupart des données concernent des chanteurs, trois évoquent des couples (Forêt de Floranges / Camors et 2 sites à Arradon) et deux des jeunes (2 le 09/05/2004 dans le bourg de Grand-Champ et 1 le 16/07 à la Pointe / Arradon).

Hibou moyen-duc *Asio otus* (8 données)

Reproduction :

- des jeunes suspectés le 14/05/2004 à Lamgonbrac'h / Landaul,
- 1 juvénile le 18/05 à Lamblat / Surzur,
- 3 juvéniles sortis du nid et 1 trouvé mort le 22/05 à Quelvezin / Carnac,
- au moins 2 juvéniles le 18/07 à la Grande Brèche / Saint-Dolay.

Les autres contacts :

- 1 le 01/04 au Moustoir et 1 chanteur (à 11h30, grand soleil) le 24/04 à Poul Ollier / Locoal-Mendon
- 1 le 09/04 en Forêt de Floranges / Camors,
- 1 en vol le 26/11 à la Marauière / Pluherlin.

Hibou des marais *Asio flammeus*

(2 données)

- 1 en migration vers l'est le 09/10/2004 à la pointe des Saisies / Gâvres,
- le même jour, 1 venant de Plouhinec à Kerminihy / Erdeven.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

(13 données)

L'espèce est présente à Camors, Baud, Brandivy, Bubry, Monterblanc, Plescop, Saint-Philibert et Vannes. Notons : 3 le 17/05/2004 au camp de Meucon / Monterblanc, 6 le 25/05 au bois de Meudon / Vannes, 3 le 13/06 à Coët Fournio / Baud, 8 le 18/07 à Mongolerian / Monterblanc... 2 chanteurs se manifestent quelques instants vers 16h15 le 28/05 en forêt de Lanvaux / Brandivy.

Le 13/09, 1 migrateur chasse au-dessus d'un verger à Bodavel / Camors.

Martinet noir *Apus apus*

(52 données)


Le premier est vu le 13/04/2004 à Montauban / La Trinité-sur-Mer et le dernier vole avec des Hirondelles rustiques le 13/09 au Ter / Larmor-Plage. Le passage et les arrivées sur les sites de reproduction se déroulent de la mi-avril à la fin mai : 40 à Lann Hir / Pont-Scorff, 38 le 17/04 sur les anciennes salines de Carnac, 130 le 22/04 au centre-ville de Vannes, 80-100 le 01/05 à l'étang du Cranic / Brec'h...

Le départ des colonies n'est pas signalé, mais les bandes en migration se multiplient dès les premiers jours d'août, parfois contrariées par le mauvais temps : 120 le 08/08 à Kerminihy / Erdeven, 100-150 le 11/08 à Pen Mané / Locmiquélic, 50 le 15/08 à l'étang du Cranic / Brec'h...

Martinet à ventre blanc *Apus melba*

(1 donnée)

Overshooting : le 18/03/2004, un individu va et vient au-dessus du port de Kergroise / Lorient.



Martin-pêcheur d'Europe (Morbihan) ; présence de mars à novembre 2004

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(137 données)

Reproduction :

- l'espèce fréquente toute la période l'étang de la Forêt / Brandivy et, le 05/05/2004, la présence de 6 oiseaux y laisse supposer une reproduction,
- le 11/06, un individu transporte un poisson à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon.

Notons : 3 le 18/07 à l'étang du Cranic / Brec'h, 4 à l'étang du Roc'h Du / Crac'h, 5 le 01/09 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 3 aux étangs de Branguily / Gueltas, 3-4 le 24/09 au marais de Pen en Toul / Larmor-Baden...

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

(1 donnée)

Observation d'une bande de 34 guêpiers le 16/05/2004 à Merlevenez.

Huppe fasciée *Upupa epops*

(20 données)

Reproduction :

- une huppe chante tandis qu'un second oiseau attaque une femelle de Faucon crécerelle le 05/04/04 à Kerdaniel / Locmariaquer (2 déjà présentes le 03/04),
- 2 adultes et 2 juvéniles dans un jardin le 26/06 à Kérizel / Arzal ;
- 2 adultes et 1 juvénile le 28/06 à Canaplaye-Keroch / Saint-Philibert

La simple présence de l'espèce, en migration pour l'essentiel, est notée sur les communes de Belz, Languidic (3 sites), Locoal-Mendon (1 chanteur le 15/06 au Branhoc), Merlevenez, Nostang (1 chanteur le 25/04 à Saint-Thomin), Plouharnel, Plouhinec, Rieux et Vannes.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

(2 données)

Présent dans un jardin du 05/09/2004 au 14/09 à Keranguen / Vannes. Le 05/10, un individu est trouvé, sa migration ayant été arrêté par un véhicule, à Toulchignanet / Brec'h.

Pic vert *Picus viridis*

(41 données)

Contacté sur 22 communes, mais noté nicheur certain seulement à Camors (1 adulte et 1 juvénile dans un verger le 27/06/2004 à Bodavel) et Languidic (3 jeunes le 29/05 à Kergurune). 3 le 28/03 au Grégo / Surzur et 4-5 le 04/08 à Poulbert / La Trinité-sur-Mer...

Pic noir *Dryocopus martius*

(42 données)

Cité sur les 18 communes suivantes : Brandérion, Brandivy, Brec'h, Camors, Campénéac, Carnac, Erdeven, Guidel, Kervignac, La Chapelle-Neuve, Landaul, Languidic, Locoal-Mendon, Plescop, Pluherlin, Pluneret, Rieux et Saint-Dolay.

Changement de partenaires au nid observé le 06/05/2004 en forêt de Floranges, mais ultérieurement, le 08/06, la loge est occupée par un essaim de mouches à miel. Un couple à la mi-mai à Goeven Languidic, un autre alarme le 03/06 au bois de Kerfuns / Plescop, 1 jeune émancipé le 17/06 au Manio / Carnac.

Pic épeiche *Dendrocopos major* (45 données)

Ces données concernent 21 communes. Des loges avec des jeunes sont trouvées en forêt de Camors, en forêt de Lanvaux, au Chemin de Cornévec / Brandivy, à Guernic / La Chapelle-Neuve et à Meudon / Vannes.

Pic épeichette *Dendrocopos minor* (17 données)

Noté à Brandérion, Brandivy, Brec'h, Camors, Carnac, Larmor-Baden, Locmariaquer, Nostang, Surzur et Vannes.

Reproduction :

- une nichée ravitaillée par un individu le 20/05/2004 à Pen en Toul / Larmor-Baden,
- nourrissage au nid par un couple le 25/06 à Coët Courzo / Locmariaquer,
- reproduction probable à l'étang de la Forêt / Brandivy (mâle et femelle contactés en juin et mai, une alarme en présence d'un Geai des chênes),
- transport de nourriture le 19/06 à la Faisanderie / Brandérion.

Alouette lulu *Lulula arborea* (20 données)

Des chanteurs cantonnés sur les communes de Brandivy, Brec'h, Languidic et Surzur, mais l'espèce est notée aussi sur d'autres sites sans que ces observations soient répétées. Peu de rassemblements à la fin de la saison de reproduction ou au moment de la migration : 7 le 14/08/2004 au Chemin de Cornévec / Brandivy, 5 le 29/10 aux abords de l'étang du Cranic / Brec'h, 15 le 02/11 à Kergal / Languidic.

Alouette des champs *Alauda arvensis* (41 données)

Sa présence est notée sur 10 communes littorales et 8 dans les terres. Peu de regroupements : 10 le 27/06/2004 à la Ville Regnaud / Campénéac, 15 sur 2500 mètres le 29/09 à la Falaise / Erdeven, 30 le 16/10 en migration à Treutan / Damgan, , 100 le 02/11 à Kergal / Surzur, 30 sur des labours le 14/11 à Branguily / Gueltas...

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (52 données)

Peu de colonies recensées :

- 3 terriers utilisés (tranchée dans dune) le 17/05/04 à Fort-Bloqué / Guidel,
- en juin, une recherche dans le secteur Kérouriec et Fetan-Léreg sur les dunes d'Erdeven donne moins d'une dizaine de terriers occupés (les ébauches et les terriers effondrés indiquent des échecs plus nombreux),

- le 29/06, une douzaine d'oiseaux en vol et au moins 5 cavités occupées dans le mur de la rue de la Motte à Pontivy,
- au moins 2 terriers occupés (sur 15-20 trous) le 17/07 à la station d'épuration de Meslan.

Les dernières sont vues le 27/08 à Pen Mané / Locmiquélic où le mauvais temps retenait 100 à 150 individus.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

(151 données)


La deuxième quinzaine de mars et la première décade d'avril voient passer de nombreux petits groupes d'oiseaux, en général de 2 à 9 individus, parfois plus (20-30 le 06/04/2004 à l'étang du Cranic / Brec'h).

Une première installation sur un site de reproduction est notée le 12/04 à Bodavel / Camors. On peut noter que dans les quelques données de reproduction transmises (le plus souvent des juvéniles récemment envolés), il n'est fait mention d'aucune colonie ou de recensement, par exemple dans les bâtiments agricoles ou sur des sites plus vastes (quartiers, villages).

Les premiers regroupements post-nuptiaux débutent fin juillet avec parfois des rassemblements importants : 200-230 le 01/08 à Bodavel / Camors (cf. graphique pour le suivi de ce site), 100-150 le 12/08 et le 20/08 à l'étang du Cranic / Brec'h...

Quelques comptages d'oiseaux en migration active : 100 le 31/08 à Kersahu / Gâvres, 156 en 55 min le 05/09 à Linès / Gâvres, 120 le 25/09 à Vannes, 3200+ en 2h20 le 26/09 à Kerhio / Erdeven, 288 en 1 heure le 27/09 à Locqueltas / Larmor-Plage.

Un dernier individu est vu en chasse sous une légère bruine le 02/11 dans la Z.A. de Talhouët / Pluvigner.



Hirondelle rustique, stationnement, Bodavel / Camors (Morbihan) ; 2004

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

(52 données)

Très peu de données de regroupements au passage prénuptial : 300-400 le 01/05/04 et 150-200 le 06/05 à l'étang du Cranic / Brec'h.

Peu de colonies ont été dénombrées :

- 22 nids sur une maison le 06/07/2004 au Petit Lambel / Camors.
- 19 nids sur la bibliothèque municipale de Landévant le 12/07.
- une recherche spécifique permet de recenser seulement 36 nids le 20/07 dans le bourg de Pluvigner.
- 14 nids le 14/09 sur au n°2 de la rue des Druides à Carnac.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

(52 données)

Très peu de données de regroupements au passage prénuptial : 300-400 le 01/05/04 et 150-200 le 06/05 à l'étang du Cranic / Brec'h.

Les regroupements post-nuptiaux passent moins inaperçus : 200-250 le 12/08 et 150-200 le 20/08 à l'étang du Cranic / Brec'h, 40 le 05/09 et 60 le 06/09 à Bodavel / Camors, environ 1000 individus le 06/09 à Treusal / Plougoumelen.

Date	11/08	18/08	19/08	24/08	27/08	09/09
Effectif	250-300	200-250	200-250	150-200	200-250	20
Remarques	par mauvais temps.	par mauvais temps.	87,6 % de juvéniles sur un échantillon de 113 ind.		par mauvais temps.	

Hirondelle de fenêtre, regroupements post-nuptiaux, à Pen Mané / Locmiquélic Morbihan ; 2004

Les dernières vues sont 33 et plus à voler au dessus des anciennes salines du Bréno / Carnac le 14/09.

Motacillidae sp.

(1 donnée)

Quelques dizaines en migration vers l'est le 31/10/2004 en Petite Mer de Gâvres.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*


(47 données)

Un premier chanteur est contacté le 08/04/2004 à Gouézac / Grand-Champ, le second le 13/04 à l'étang du Cranic / Brec'h. Des chanteurs sont notés sur 10 communes : Brandivy, Brec'h, Camors (5 sites), Grand-Champ, Guilliers, Landaul, Landévant, Languidic (3 sites). Un nid avec 3 œufs le 18/06 à Kergurune), Locoal-Mendon, Vannes.

Peu de densités notées :

- 10 chanteurs le 16/04, 11 le 02/05, 9 le 06/06 et encore 4 le 10/07 sur les 2800 mètres du Chemin de Cornévec / Brandivy.

- 3 chanteurs entre le 27/05 et le 09/07 à Locoal en forêt de Camors (parcelle 53).
 - 3 chanteurs sur 100 mètres de plantation le 25/04 à Listoir / Landévant.
- 3 en migration active le 02/10 à Kerminihy / Erdeven.



Hirondelle rustique, Creuse ; juillet 2005

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

(36 données)

En période de reproduction l'espèce est contactée sur le littoral, mais le nombre de données ne permet pas d'estimer les densités (Gâvres, Erdeven). A noter, 1 chanteur sur une prairie humide le 23/04/04 à Trévezun / Merlevenez, 1 le 04/05 à Kerassio et 1 le 08/05 à Kergurune / Languidic.

Migration : 131 en 75 minutes le 02/10 à Kerminihy / Erdeven, 120 en migration active le 16/10 à Treutan / Damgan, 30+ au dessus de l'eau le 30/10 à la pointe des Saisies / Gâvres...

Regroupements : 150-200 le 30/10 à Pont-er-Hiour / Bubry, 100 le 06/11 à l'étang de Tréhervé / Damgan, 40 le 08/11 à la pointe er Hourél / Locmariaquer

Pipit maritime *Anthus petrosus*

(12 données)

1 chanteur le 06/04/2004 à Tréhervé / Ambon et 1 le 13/04 et le 03/05 sur les enrochements de Ty Douar / Locmiquélic. En juin, l'espèce est notée au port de pêche de Lorient et à Iniz er Mor / Sainte-Hélène.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

(5 données)

Passage prénuptial : 3 le 20/03/2004 à Banaster / Sarzeau, 12 le 23/03 à Pen Mané / Locmiquélic, 3 le 02/04 au Grand Loc'h / Guidel. Passage post-nuptial : 2 le 19/10 à l'étang du Cranic / Brec'h et 1 le 4/11 au port de pêche de Lorient.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

(54 données)

Des indices de reproduction sont relevés sur les communes de Ambon (jeunes), Arzal (nourrissage), Erdeven (chanteurs), Gâvres, Locmiquélic (jeunes), Rieux et Surzur.

A partir de fin août, le passage se fait sensible :

- 22 le 19/08 et 10 le 27/08 à Pen Mané / Locmiquélic.
- à Erdeven, 26 le 03/09 sur la dune de Kéranroué, 13 le 04/09 à Fetan-Léreg, 31 le 06/09 et 46 le 08/09 entre Fetan-Léreg et Kéranroué, 12 le 07/09 sur la plage de Kérouiec.
- 10 le 12/09 sur des laisses de mer à Treutan / Damgan le 12/09.
- 30-40 le 21/09 à Grand-Champ (lieu-dit non précisé).
- 12 le 05/10 au Loc'h / Guidel.

Bergeronnette flavéole *Motacilla flava flavissima*

(4 données)

Ces observations concernent le passage post-nuptial : 1 mâle le 29/06/2004, 2 le 27/08 et 1 le 15/09 à Pen Mané / Locmiquélic, 3-5 le 03/09 et 2 le 06/09 dans des bandes de Bergeronnettes printanières *type* sur la dune de Kéranroué / Erdeven.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

(49 données)

Des couples sont observés à Inguiniel, Languidic et Rieux. La reproduction est constatée sur deux étangs du Petit Bois / Camors, à l'étang de la Forêt / Brandivy, à Kergollaire / Languidic, au Moulin de Treuroux / Brec'h et au lagunage de Nostang.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

(62 données)

Notée nicheuse à Baud, Brec'h, Damgan, Guilliers, Locmiquélic et Plescop.

Les premiers regroupements s'observent à partir de la fin juillet : 20 le 21/07/2004 et 23 le 31/08 à Pen Mané / Locmiquélic, 20 le 06/09 à Treusal / Plougoumelen, 15 le 19/09 à Treutan / Damgan, 20 le 31/10 au lagunage de Lanfloy / Theix. Un seul dortoir est observé : centaines sur les ponton du port de plaisance d'Etel (date ?). Le 18/09 à Etel, un observateur note un individu au "leucisme avancé".

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*

(5 données)

Le 05/07/2004 à Pen Mané / Locmiquélic, un mâle est présent parmi une douzaine de Bergeronnettes grises. La date d'observation rend possible une reproduction dans ce secteur. Quatre données en octobre-novembre indiquent l'arrivée des hivernants, arrivée probablement sous détectée et sous notée par les observateurs (10 le 08/11 à la pointe er Hourél / Locmariaquer).

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

(37 données)

Un nid dans une passiflore le 23/03/2004 à Bodavel / Camors est encore sans revêtement interne et voisine une ébauche. A Cornévec / Brandivy, sur 2800 m : 6 chanteurs puis 8, 15 les 28/03, 16/04 et 16/05.

Accenteur mouchet *Prunella modularis* (23 données)
 Sur 2800 m, à Cornévec / Brandivy, 2 à 4 chanteurs entre les 28/03/2005 et 10/07.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (43 données).
 Sur 2800 m, à Cornévec / Brandivy, 10 à 13 chanteurs entre les 28/03/2004 et 16/09.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (21 données)
 Premier chanteur signalé seulement le 04/04/2004 à Sarzeau. Chanteurs à Tréhervé / Ambon, Suscinio / Sarzeau, la Falaise, Kerminihy et Fetan Lereg / Erdeven, Magouëro et Moténo /

Plouhinec, Kersahu / Gâvres, Pen Mané / Locmiquélic et, qui échappe au domaine strictement littoral, des individus dans les marais de Basse Vilaine à Rieux, Château et le Grand Pré de Roru.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (18 données)
 Dans les zones industrielles de Vannes, 15 mâles chanteurs sont recensés le 31/05/2004.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (4 données)
 • 1 mâle le 02/08/2004 aux salines de Kerdual / La Trinite-sur-Mer.
 • 1 mâle en plumage nuptial le 06/09 à Treusal / Plougoumelen.
 • 1 cadavre au pied d'une vitrine (1^{er} hiver) le 11/10, zone commerciale de Kerbois / Auray.
 • 1 individu très fatigué, un doigt manquant, le 04/11 dans les dunes du Fort Bloqué / Ploemeur.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (18 données)
 Une observation printanière (1 à Tremoyec / Surzur le 06/04/2004) puis passage remarqué entre les 15/08 et 18/10 : 10 à Kerminihy / Erdeven le 08/09, 14 à Keranroué / Erdeven le 06/09, 4 le 18/10 au Magouëro / Plouhinec.

Tarier pâtre *Saxicola torquata* (67 données)
 Sur 2800 m, à Cornévec / Brandivy, 2 couples le 06/06/2004. Au moins 18 individus dont au moins 6 couples cantonnés le 07/04 sur les dunes de La Falaise à Erdeven. Une femelle construit, seule, un nid à Langombrac'h / Landaul, le 24/04. Un mâle accompagné d'un jeune le 13/05 dans le bois de Meudon / Vannes. Plus de 20 Pâtres sur une boucle de 2500 m sur la Falaise / Erdeven le 29/09.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

(63 données)

Quatre chanteurs à Kervran – Kerzine / Plouhinec le 04/04/2004 n'ont pas été suivis pendant le printemps. 25 à 35 individus sont repérés à Groix dans les landes de la partie ouest le 26/04.

Passage postnuptial : dès le 21/08, nombreux individus de premier hiver dans les dunes d'Erdeven, plus de 20 le 01/09 à Kerminihy / Erdeven et encore 20 à Penvins / Sarzeau le 08/10.

Merle à plastron *Turdus torquatus*

(1 donnée)

Un mâle est surpris pendant sa halte à la pointe des Saisies / Gâvres le 29/10/2004.

Merle noir *Turdus merula*

(40 données)

Sur 2800 m, à Cornévec / Brandivy, 2 à 9 chanteurs entre les 28/03/2004 et 16/09. Le 14/11, 18 merles dans un verger à Bodavel / Camors.

Grive litorne *Turdus pilaris*.

(29 données)

Encore de petits groupes jusqu'à mi-avril : 160 à Kergall / Surzur le 18/03/2004, 4 en vol vers le nord le 14/04 à l'étang de la Forêt / Brandivy. Les retours sont perçus à partir du début de novembre mais ne concernent pas encore de véritables bandes (1 le 01/11 au Monument des Fusillés / Quistinic).

Grive musicienne *Turdus philomelos*

(32 données)

Sur 2800 m, à Cornévec / Brandivy, 1 à 2 chanteurs entre les 16/04/2004 et 10/07. Une quinzaine de Musiciennes à Pen Mané / Locmiquélic autour des remblais, le 03/11.

Grive mauvis *Turdus iliacus*

(23 données)

Jusqu'à la fin du mois des mars, des bandes réduites trainent : quelques dizaines sur les lisières au Cosquer / Nostang, sur site d'hivernage. Dès le début d'octobre, elles sont de retours : 2-3 le 09/10 à Vannes puis passage important (...) entre les 04 et 05/11.

Grive draine *Turdus viscivorus*

(42 données)

Sur 2800 m, à Cornévec / Brandivy, 1 à 5 chanteurs entre les 28/03/2004 et 16/09. En juillet, concentration habituelle quoique non recensée avec précision de dizaines de Grives draines à Kerminihy / Erdeven sur les dunes.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

(94 données)

La bouscarle est bien représentée sur le littoral mais aussi à : Kian / Béganne, étang du Cranic / Brec'h, Branguily / Gueltas, Kergollaire / Languidic.

Cisticole des jones *Cisticola jundicis*

(69 données)

Très présent de la rade de Lorient au Golfe du Morbihan et la Basse Vilaine. Un nourrissage à Poulbert / La Trinité sur Mer le 04/08/2004.

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

(14 données)

Ce sont surtout des oiseaux de passage : Erdeven, Saint-Philibert, Gâvres, Locmiquélic, Locoal-Mendon mais aussi Langonnet, Sérent et Camors. Notons plus tard : un couple cantonné à Kergall / Surzur, 30/05/2004, un individu à la Vile Régnaud / Campénéac le 27/06, un chanteur à Trébotu / Tréhorenteuc le 15/07.

Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides*

(4 données)

A Pen Mané / Locmiquélic, Saint-Jean / Locoal-Mendon et le Cranic / Brec'h de fin-avril à mi-juin.

Phragmite des jones *Acrocephalus schoenobaenus*

(20 données)

Chanteur dès le 07/04/2004 à la Falaise / Erdeven puis les effectifs augmentent, 10 dans les sablières du Magouëro / Plouhinec le 24/04. Un individu à Kian / Béganne le 26/09.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

(38 données)

L'espèce est repérée entre les 30/04 et 30/09/2004 et uniquement sur des sites proches de la côte.

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

(4 données)

Les seuls contacts avec la Turdoïde proviennent de l'étang du Cranic où deux puis un individus chantent entre les 26/05 et 05/06/2004, ce ne sera qu'un passage.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*

(23 données)

Contacts sur Brandivy, Brec'h, Camors, Carnac, Crac'h, Pluherlin, Saint-Philibert, Surzur entre les 21/04 et 28/07/2005. Une famille nourrit au Manio / Carnac le 26/07.

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

(27 données)

Les contacts réguliers sur des sites intérieurs ou côtiers se rapportent aux oiseaux locaux, par contre la mention de « nombreux » individus sur la pointe du Talud à Ploemeur fait penser à un passage migratoire.

Fauvette grisette *Sylvia communis*

(43 données)

Contacts entre le 08/04 et le 26/09/2004. Un transport de nourriture est noté dès le 15/04 à Kerminihy / Erdeven. Sur 2800 m, à Cornévec / Brandivy, 1 à 4 chanteurs entre les 02/05 et 10/07.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

(26 données)

Notée entre le 23/04 et le 16/07/2004... Sur 2800 m, à Cornévec / Brandivy, 2 chanteurs mai et juin

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

(52 données)

Sur 2800 m, à Cornévec / Brandivy, 1 à 9 chanteurs entre les 28/03/2004 et 06/10. Un adulte nourrit encore un jeune le 03/08 à Damgan.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

(16 données)

Ces observations proviennent des massifs de Camors et Floranges à partir du 10/05/2004, avec un minimum de 15 chanteurs sur 13 parcelles prospectées.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

(103 données)

Passage printanier : 20 au Cranic / Brec'h le 24/03/2004 et 34 à Cornévec / Brandivy le 28/03. Sur 2800 m, à Cornévec / Brandivy, 1 à 24 chanteurs entre les 28/03/2004 et 06/10. Passage de retour : Cornévec, plus de 20 le 16/09, Bonnervo / Theix, 12 le 31/10, plus de 20 le 16/10 sur le lagunage de Damgan.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

(21 données)

Entre les 26/04 et 26/09/2004.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

(37 données)

Le chemin de Cornévec / Brandivy a été parcouru régulièrement durant cette période : ses 2800 mètres permettent d'y découvrir un maximum de 3 chanteurs les 18/04 et 18/05/2004. Une densité linéaire nettement plus élevée est détectée sur la ligne de Bodavel / Camors où les 650 mètres de Sapins du Canada accueillent 5 chanteurs le 16/04. Aucune donnée printanière n'évoque de reproduction probable ou certaine. A l'automne, aucune bande notée n'excède 8 individus.

Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus*

(42 données)

Une comparaison intéressante est permise par le dénombrement des 650 mètres de la ligne de Bodavel / Camors : 1 seul chanteur de cette espèce contre 5 *R. regulus* le 16/04/2004. Il s'agissait là de Sapins du Canada, mais l'espèce est aussi trouvée chanteuse dans une parcelle de Thuya *sp.*, dans des Sapins blancs, et dans des feuillus

avec lierre toujours à Camors. Les lignes forestières parcourues ne permettent jamais de contacter plus de deux chanteurs.

Le 02/08, 2 juvéniles quémangent auprès d'un adulte à Bodavel / Camors. Les bandes automnales sont moins strictement forestières : ainsi 15 sont au Dreff / Riantec le 10/11.

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (24 données)

Un seul indice de reproduction certaine : 4 poussins vus au nid, le Manio / Carnac, le 19/06/2004. Mais la nidification est probable à la Ville Regnaud / Augan, où un individu alarme le 29/06 et seulement possible à Locoal-Camors, Brandivy, Vannes et Crac'h.

Le passage post-nuptial n'est pas ressenti avant le 02/09 et se tarit le 21/09. Maximum de 7 oiseaux le 14/09 dans un verger de Bodavel / Camors.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (10 données)

Classiquement, les données s'étalent entre le 25/08 et le 23/09. Maximum de 5 au Manio / Carnac le 07/09/2004.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* (5 données)

Deux sites seulement : données printanières de quelques oiseaux à Pen Mané / Locmiquélic et à l'étang Saint-Jean / Locoal-Mendon.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (37 données)

Une famille est notée dès le 30/03/2004 au Grégo / Surzur, cette étonnante observation devançant d'un mois et demi tout autre contact avec de jeunes oiseaux ! En juillet, les groupes familiaux sont peu à peu remplacés par les rondes, comptant souvent de 15 à 20 individus.

Mésange nonnette *Parus palustris* (17 données)

Les indices de reproduction les plus probants sont obtenus en forêts de Camors et Lanvaux ou dans leurs abords immédiats (une famille nourrit à Pont Deur / Brandivy le 12/06/2004, de même dans un jardin de Bodavel / Camors le 06/07). A l'automne, les contacts sont tardifs (au-delà du 30/10) et peu nombreux, rassemblant jusqu'à 4 individus.

Mésange huppée *Parus cristatus* (12 données)

Un seul test de la densité linéaire est conduit : sur le chemin de Cornévec / Brandivy, 1 individu sur 2800 mètres parcourus le 04/05/2004. Cependant, c'est ce même chemin qui permet l'intéressante découverte d'un nid occupé dans une ancienne loge de Pic épeiche le 08/06. La reproduction est également constatée à Camors mais n'est documentée nulle part ailleurs.

Mésange noire *Parus ater* (6 données)

La rareté de l'espèce dans le département mérite le détail des observations :

- 1 à Lann Bourgeol / Bubry le 13/04/2004,
- 1 chanteur au Nerven en forêt de Camors le 17/04.

Plus sûres que ces données précoces, celle d'un chanteur dans un autre secteur de cette même forêt pourrait concerner un reproducteur local. Et qu'en est-il du chanteur contacté les 04 et 09/09/04 ? Ces dates étant somme toute avancées pour concerner un oiseau de passage.

Mésange bleue *Parus caeruleus* (40 données)

Citons encore le chemin de Cornévec / Brandivy : la densité linéaire la plus importante est obtenue le 18/04/2004 avec 5 chanteurs en 2800 mètres. Quelques suivis de nichoirs attestent de certains succès de reproduction : 12 jeunes à l'envol le 02/06/2004 pour 12 oeufs pondus (Camors).

Mésange charbonnière *Parus major* (24 données)

Chemin de Cornévec / Brandivy : 2 chanteurs en 2800 mètres le 18/04/2004.
8 jeunes à l'envol le 25/05 pour 8 oeufs pondus (Camors).

Sittelle torchepot *Sitta europaea* (31 données)

Même si 3 décomptes linéaires sur les 2800 mètres du chemin de Cornévec / Brandivy ne révèlent jamais plus d'un chanteur, les forêts de Floranges et de Lanvaux accueillent bien sûr l'espèce. Ainsi trois loges de Pic noir y sont découvertes maçonnées et occupées par les sittelles ce printemps.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (21 données)

Les indices de reproduction sont difficilement obtenus.

Chemin de Cornévec / Brandivy : 3 chanteurs en 2800 mètres le 30/03 et le 04/05/2004.
Même nombre de chanteurs en seulement 250 mètres au Cranic / Brec'h le 08/04.

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* (1 donnée)

Une seule donnée mais laquelle ! Les cris, alarmes et poursuites contre une corneille de ces deux Loriots, le 08/06/04 au Manegwen / Plouhinec cadrent avec un indice de reproduction certaine. Les quatre données antérieures concernant cette espèce dans nos archives n'avaient jamais permis de conclure à une probable ou même possible nidification.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

(30 données)

La reproduction dans les marais de Redon est toujours très bien suivie. Voici par commune et par site, l'indice maximal obtenu :

Sites	Nombre de sites à nidification...			Précisions
	...possible	...probable	...certaine	
Saint-Nicolas de Redon (44)	2	X	1	Un couple avec deux jeunes le 16/07
Fégréac (44)	1	X		
Théhillac	X	X	2	Il pourrait cependant s'agir du même couple vu sur deux sites les 06 et 11/07
Rieux	1	3	8	5 couples avec 2 jeunes (dont un constaté dès le 07/06), deux couples avec 3 jeunes, un couple avec un jeune
Nivillac	X	X	1	Un couple avec deux jeunes le 22/07
Saint-Dolay	X	X	1	Un couple avec quatre jeunes le 12/07

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

(40 données)

Aucune donnée de nidification certaine n'est recueillie.

Pie bavarde *Pica pica*

(24 données)

Une nidification certaine en milieu urbain, à Kerolay / Lorient. Un couple visite régulièrement un poulailler de Camors pour y prendre des oeufs, un puis deux jeunes y sont capturés (et relâchés !). Des groupes de 10 à 20 individus sont contactés tout au long de la période.

Choucas des tours *Corvus monedula*

(15 données)

Nidification possible à Plouay, probable à Vannes (où des choucas sont vus pillant des nids de ramiers le 17/04/2004), Elven, Ploemeur et certaine à Billiers (colonie dans la chapelle de Prières).

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

(8 données)

A Sarzeau, la colonie sise au croisement des RD 199 et 324 compte 138 nids au 09/04/2004. Il faut lui adjoindre un petit satellite de 6 nids au bois de Calzac. Des oiseaux peut-être issus de cette colonie sont vus à Damgan traversant la Vilaine le 21/09. Mais que penser de ces freux vus régulièrement à Erdeven et Plouharnel ? Ils étaient 4 le 08/06 puis 20 dont au moins 4 jeunes le 27 du même mois. Seuls deux individus y sont revus en septembre.

Corneille noire *Corvus corone*

(57 données)

La nidification est facilement prouvée. Le nourrissage de jeunes est observé dès le

05/06/2004 à Plescop. Cette période d'émancipation des jeunes tente les piègeurs : 30 corneilles sont prisonnières d'une nasse à Kergonan / Pluneret le 25/06. A l'automne, des rassemblements de plusieurs dizaines, mais jamais plus, sont notés ici ou là, notamment sur les estrans (Locoal-Mendon, Plouharnel).

Grand Corbeau *Corvus corax*

(2 données)

- 18/04/2004 : un individu se nourrit dans une pâture de Guerjean / Bubry.
- 28/04/ : un adulte nourrit un jeune volant à partir d'un poussin de goéland cueilli au nid, sur la côte nord de Groix.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

(36 données)

La nidification est facilement prouvée. Des jeunes volants sont notés dès le 04/06/2004. Les bandes dénombrées dépassent la centaine, pour parfois avoisiner le millier seulement à l'approche de septembre. Un seul dortoir estimé : quelques milliers s'installent le 07/11 aux abords de l'étang Saint-Jean / Locoal-Mendon, apparemment dans la phragmitaie.

Moineau domestique *Passer domesticus*

(21 données)

La nidification est facilement prouvée. Une façade de maison abrite cinq nids à Pluherlin. 4 jeunes à peine volants quémangent encore le 25/08/2004 à Camors.

Moineau friquet *Passer montanus*

(1 donnée)

Un seul individu dans le bourg de Tréhorenteuc le 17/07/2004.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

(52 données)

Les données de nidification certaine ne sont somme toute pas si nombreuses. Pourtant, l'espèce est localement abondante comme l'attestent les comptages linéaires : 29 chanteurs sur les 2800 mètres du chemin de Cornévec / Brandivy le 04/05/2004 ! A l'automne, l'espèce est repérée en migration active ici ou là le long de la côte mais il s'agit tout au plus de quelques oiseaux (maximum de 109 le 18/10 à Treutan / Damgan).

Pinson du nord *Fringilla montifringilla*

(1 donnée)

Une donnée hâtive de 7 oiseaux au sol au Petit Mont / Sarzeau le 21/09/2004 et c'est tout... quelle discrétion !

Serin cini *Serinus serinus*

(19 données)

Des chanteurs sont contactés un peu partout dans le département (par exemple Gourin, Brandérion, Billiers) mais les indices de reproduction notés demeurent faibles. L'espèce

est notée deux fois en migration active à Treutan / Damgan les 21/09 et 18/10/04 mais il s'agit de 4 et un individus seulement.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

(25 données)

Les indices de nidification sont bien moins nombreux que pour le Pinson des arbres. Pour nous aider à quantifier l'abondance relative de ces deux fringilles, comparons la densité linéaire de chanteurs du chemin de Cornévec / Brandivy : 3 verdiers contre 29 pinsons en 2,8 km le 04/05/2004. Une belle troupe de 300 verdiers en migration est observée à Treutan / Damgan le 18/10.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

(30 données)

Construction de nid notée le 24/04/2004. Jeunes volants vus à partir du 07/07. Les premières bandes se constituent autour de la mi-août (par exemple, 50 à Pen Mané / Locmiquélic le 21/08). Petits groupes migratoires visibles depuis Gâvres ou Damgan de début octobre à début novembre.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

(4 données)

Le premier est vu à l'étang du Cranic / Brec'h le 21/10/2004. Puis ce sont 2 à Vannes le 27, 11 à Bubry le 31. Enfin, 14 survolent les lagunes du Saindo / Theix le 02/11.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

(38 données)

Transport de matériau dès le 09/04/2004 à Erdeven. Les premières bandes se rassemblent dans la première décade d'août. De petits mouvements migratoires (quelques dizaines d'oiseaux au plus) sont visibles en bord de mer en octobre.

Bec croisé des sapins *Loxia curvirostra*

(32 données)

31 données sur 32 sont issues d'un seul et même observateur ! Le premier contact date du 02/07/2004 et concerne 2 oiseaux entendus dans un bois d'épicéas à Bodavel / Camors. Les contacts sont réguliers tout le mois sur ce secteur et font penser à des nicheurs locaux. L'effectif maximal est alors de 7 oiseaux, le 31/07. Y aurait-il eu également une reproduction au Cranic / Brec'h où 5 bec croisés sont vus dans des pins le 30/07 ? Difficile d'être affirmatif alors que de nets mouvements sont observés dès le 06/08 : à Bodavel, cinq bandes totalisant 54 oiseaux font toutes route vers l'ouest. Cette direction restera privilégiée lors des déplacements observés d'août à la fin de la période. Ces vols comptent souvent moins de 10 individus et sont chronologiquement bien répartis avec toutefois un renforcement du nombre de données à partir de fin octobre avec, par exemple :

- 19 en 3 groupes vers l'ouest le 27/10 à Camors,
- au moins 10 en vol vers l'ouest le lendemain à la pointe des Saisies / Gâvres,

- 14 vers l'ouest le 13/11 encore à Camors.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

(38 données)

Le premier jeune est noté le 27/06/2004.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*

(1 donnée)

2 mâles en plumage d'hiver le 20/10/2004 à la pointe de Kerroc'h / Ploemeur.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

(33 données)

Sur le chemin de Cornévec / Brandivy, régulièrement parcouru, le pic des chanteurs est obtenu légèrement plus tard que pour les fringilles : le 18/05 contre le 04/05/2004 ; ils sont alors 8 chanteurs en 2,8 km. Les indices de reproduction sont nombreux mais ne désignent souvent qu'une possibilité de nid. Aucune donnée postérieure au 10/09.

Bruant zizi *Emberiza cirrus*

(40 données)

5 données situent l'apparition des familles hors du nid entre le 28/07 et le 09/08/2004. Toutes les données de fin d'été / automne concernent de petits groupes de 3 à 5 (familles ?).

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

(34 données)

Les contacts avec des chanteurs sont multiples jusque fin juillet. Ne citons que les sites non littoraux : étang de la Forêt / Brandivy, étang du Cranic / Brec'h, le Garff le long du Blavet / Quistinic, marais des Robeaux / Rieux. Le seul indice de nidification certaine provient de Kersahu / Gâvres. Aucune donnée n'est recueillie en août, septembre et octobre.


ACTIVITES DU G.O.B. MORBIHAN

SAISON 2005 DU PROGRAMME NATIONAL STOC EPS DANS LE MORBIHAN

GWENAEL DERIAN

Ce printemps, une carte supplémentaire a été prospectée, les observateurs précédents ont parcouru les mêmes carrés, autant dire qu'une comparaison directe est possible... Quant aux milieux, leur description ne diffère que dans le détail.

Nombre de points couverts : 2 passages sur 110 points		
passages	premier	second
dates ; écart	09/04 à 16/05 soit 38 jours	14/05 à 12/06 soit 30 jours



Points d'écoute STOC EPS en 2005, Morbihan

- les habitats

Habitats 2005	%
Forêts	17
Buissons	6
Prairies, marais et landes	4
Milieus agricoles	57
Milieus anthropiques	13
Milieus aquatiques	3

- les espèces

Passages	premier	second	total
espèces	70	72	81
contacts	1283	1265	2548

Le nombre d'espèce est un peu inférieur à ce qu'il était en 2004, mais la liste se trouve épurée d'espèces occasionnelles comme la Cigogne blanche ou d'espèces rares comme la Caille des blés qui n'a pas été retrouvée. Elle atteint à présent la centaine d'espèces avec l'entrée du Pigeon colombin.

place	Espèces	Fréquence %
1	Pinson des arbres	87,27
2	Pigeon ramier	75,45
3	Merle noir	73,64
4	Troglodyte mignon	71,82
5	Rougegorge familier	64,55
6	Pouillot véloce	64,09
7	Corneille noire	61,82
8	Grive musicienne	54,09
9	Fauvette à tête noire	46,82
10	Mésange charbonnière	42,27
11	Mésange bleue	42,27
12	Coucou gris	30,45
13	Etourneau sansonnet	30,00
14	Goéland argenté	29,09
15	Hirondelle rustique	28,18
16	Verdier d'Europe	26,82
17	Accenteur mouchet	23,64
18	Pic bavarde	20,45
19	Pic vert	19,09
20	Tourterelle turque	16,36

place	Espèce	Abondance %
1	Pinson des arbres	8,48
2	Corneille noire	8,38
3	Pigeon ramier	6,89
4	Merle noir	6,36
5	Goéland argenté	5,46
6	Etourneau sansonnet	4,95
7	Troglodyte mignon	4,87
8	Pouillot véloce	4,77
9	Rougegorge familier	4,27
10	Grive musicienne	3,48
11	Mésange bleue	3,04
12	Hirondelle rustique	2,92
13	Fauvette à tête noire	2,82
14	Martinet noir	2,58
15	Mésange charbonnière	2,48
16	Verdier d'Europe	2,03
17	Moineau domestique	1,75
18	Coucou gris	1,47
19	Pic bavarde	1,41
	Hirondelle de rivage	1,41

STOC - EPS Morbihan, printemps 2005

Participants dans le Morbihan au STOC-EPS en 2005 : Marc Jamet, Francis Guillemot, Bruno Le Port, Patrick Bailleul, Gaëtan Cornec, François Urvoaz, Yannick Ordureau, Gwenaël Derian, Jean-Luc Lemonnier, Yann Kerninon, Anthony Le Doze, François Quinot.

NOTES DE TERRAIN

GALLICUS AU PAYS GALLO

FRANZ URVOAZ et LOÏC HAMET

La journée avait déjà apporté son lot de satisfactions et de déceptions. Seulement deux Fauvettes pitchou avaient été entendues, pas un seul Pipit des arbres contrairement aux années précédentes et après beaucoup d'efforts, sept heures de prospection n'avaient produit qu'un seul tarier pâtre. Fort heureusement un mâle d'Alouette lulu nous avait gratifié de son concert matinal, perché sur un fil électrique et s'était laissé admirer pendant cinq bonnes minutes. Heureusement aussi un Pouillot fitis était venu alimenter la discussion sur le chant des petits passereaux tandis que nous prenions nos sandwiches.

Que dire des busards ? Un seul échange de proie entre un mâle et une femelle Saint-Martin ; peut-être un autre mâle ou était-ce le même ?

Il faut dire que le biotope avait bien évolué. Les plantations faites après les grands incendies des années 1990 avaient pris de l'ampleur, modifiant radicalement le paysage et, sur les sommets, là où la roche affleure empêchant toute plantation, on avait jugé bon de créer des enclos pour les bovins, les chevaux ou les moutons.

Pas un seul « Baron Gris » comme le dit *La Hulotte* à se mettre sous la longue vue, nous avions pris la décision d'effectuer une dernière observation à partir d'un point de vue qui, à distance, nous semblait favorable. Une Jeep avait obliqué dans le chemin juste devant nous et son ronflement étouffait les chants des quelques passereaux qui en cette chaude après-midi du 28 mai 2005 s'efforçaient de tenir nos oreilles en alerte.

Sur le bord du chemin, le feu avait eu raison des châtaigniers à présent morts et noircis mais à leur pied de nombreux rejets atteignaient déjà une taille respectable. Nous longions la clôture réservée aux moutons lorsque, de l'autre côté du vallon deux rapaces se présentèrent dans mon champ de vision :

-« Loïc, viens voir ! »

Sans doute alerté par le timbre inhabituel de ma voix, il accourt pendant que je mets ma longue-vue en batterie et, encore raté, je ne parviens pas à faire la mise au point. Sans doute ai-je tourné la mollette dans le mauvais sens. Je reprends mes jumelles en pestant juste à temps pour voir notre oiseau disparaître d'un long vol glissé derrière l'écran que forment les arbres.

-« Tu as vu la taille ? On aurait cru un vautour. »

Le deuxième rapace est toujours là, décrivant des orbes tout en prenant de l'altitude et bientôt rejoint par un congénère : deux buses variables !

Frustration ! Non seulement il n'y a plus de busard dans ce coin de lande où nous avons vu tant de nicheurs s'installer, mais quand l'occasion se présente de faire une super obs, l'oiseau nous file entre les doigts.

Dépités, nous gagnons tout de même le point d'observation que nous nous étions fixés et nous nous asseyons ruminant notre déconvenue. Aucune certitude, pour Loïc aussi l'observation a été trop fugitive.

C'est au bout d'une dizaine de minutes que le miracle se produit. Deux rapaces réapparaissent devant nous à distance respectable. L'un deux est sans aucun doute une buse qui houspille un rapace de taille imposante. Ce dernier malgré les piqués incessants dont il fait l'objet, se contente d'éviter le contact sans montrer beaucoup d'agressivité. Incroyable, c'est un circaète !

L'individu est frappant par la blancheur éclatante de sa tête dans le soleil. La buse a abandonné son harcèlement et Jean-le-Blanc se met en chasse. Il fait du sur-place face au vent, la queue largement déployée en éventail, les pattes pendantes. Son attitude fait penser à un Faucon crécerelle faisant le « Saint Esprit » mais les battements sont bien plus lents, les ailes bougent peu, par moments il paraît onduler dans les airs comme une barque ballottée dans des petits rouleaux rapprochés. Il peut aussi relever très nettement les ailes pour former un V très marqué pendant qu'il poursuit l'examen minutieux du terrain.

Tout en poursuivant ses stations régulièrement, il se dirige droit sur nos deux observateurs médusés contraints d'abandonner la longue-vue pour les jumelles tant il est proche. On aperçoit très distinctement le trou laissé par la rémige manquante sur son aile gauche. Le dessous de cet individu est particulièrement blanc, la gorge et la poitrine n'arborent que quelques flammèches brunes, les ailes sont pratiquement sans marques, les barres de la queue peu visibles.

Il nous dépasse de quelques centaines de mètres puis rebrousse chemin et nous survole à nouveau à la verticale. A quelle hauteur se trouve-t-il ? 50 mètres ? Davantage ? difficile de l'affirmer mais quel régal ! Il s'éloigne sur notre droite en suivant la déclivité du coteau et ses parties supérieures se révèlent car il est à présent plus bas que nous. Le contraste entre les couvertures de couleur chamois et les rémiges beaucoup plus sombres est frappant. C'est certainement ce contraste associé à la taille imposante qui lors d'une première vision trop furtive m'avait fait penser à un vautour. Deux corneilles, les pattes pendantes effectuent des piqués spectaculaires sans qu'il y prête vraiment attention, il s'éloigne nonchalamment s'arrêtant régulièrement pour scruter le sol.

Alors, Loïc, nous nous perdons en conjectures. Un jeune a été vu l'an dernier à la fin de l'été en forêt de Brocéliande. Cette fois, il s'agit bien d'un adulte et en pleine période de reproduction qui plus est.

L'oiseau ne réapparaît pas et après un quart d'heure, nous nous décidons à partir. Un dernier coup d'œil au coteau d'en face avant de quitter les lieux. Il est là, venu d'on ne sait où. Sa silhouette se découpe parfaitement au sommet d'un pin décharné qui domine les alentours. A l'œil nu, le contraste entre sa tête blanche qui fait irrésistiblement penser à celle du balbuzard pêcheur, et le reste de son corps est frappant. Une bande sombre traverse l'œil. Il effectue sa toilette. Une plume de duvet s'envole. Une autre encore. Il fixe tour à tour trois corneilles noires qui se sont perchées sur le pin mais n'osent pas s'approcher trop près du seigneur des lieux. Il semble faire partie du paysage.

Une interrogation s'impose à nous : après tout pourquoi ne nicherait-il pas ici ? Ce serait une entrée de choix pour le prochain Atlas des Oiseaux Nicheurs de Bretagne.

SUIVI D'UN GROUPE COLONIAL DE GOELANDS ARGENTES (*Larus argentatus*) SUR LES CRIEES DE LORIENT (2^o partie)

DERIAN GWENAEL

PRODUCTION DE JEUNES


Années	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Couples totaux	15	26	31	33	36	40	35
Couples producteurs	14	26	24	29	30	29	29
Producteurs sur totaux	93,33%	100,00%	77,42%	87,88%	83,33%	72,50%	82,86%
Nombre de poussins vus	33	61	56	68	75	69	66
Nombre de juvéniles à l'envol	29	39	41	43	61	53	43
Juvéniles/Poussins	87,88%	63,93%	73,21%	63,24%	81,33%	76,81%	66,15%
Poussins par couples totaux	2,20	2,35	1,81	2,06	2,08	1,73	1,86
Juvéniles par couples producteurs	2,07	1,50	1,71	1,48	2,03	1,83	1,48
Juvéniles par couples totaux	1,93	1,50	1,32	1,30	1,69	1,33	1,23
perte de poussins avant l'envol, %	12,12%	36,07%	26,79%	36,76%	18,67%	23,19%	34,85%

Tableau 1 : production de jeunes

En définitive, la période d'étude est marquée par une alternance d'années creuses et d'années pleines si on considère les paramètres *poussins par couples totaux*, *juvéniles par couples producteurs*, *juvéniles / poussins*. De son côté, la variable *juvéniles par couples totaux* marquerait une baisse.




Goéland argenté, criée du port de Lorient




Graphique 1 : juvéniles / couples totaux

TAILLE DES COUVEES

Durant l'étude, le maximum de poussins puis de jeunes pour un couple de Goélands argentés a été de trois. Chaque année, une fraction des couples durablement installés ne produit aucun poussin, ou plus exactement aucun poussin n'est vu sur leur nid mais les variations inter-annuelles sont évidentes. Pour ne prendre que la part des couples obtenant trois jeunes l'envol, les valeurs s'étalent de 19,23% en 1998 à 50% en 2001.



Graphique 2 : production de poussins par couples totaux entre 1997 et 2003




Graphique 3 : jeunes à l'envol par couples producteurs entre 1997 et 2003

PERTES DE POUSSINS

La perte des poussins intervient tout le long de leur développement à proximité du nid, sur le territoire où les parents les nourrissent et les protègent. Les pertes sont importantes dans les premiers stades mais de nombreux décès surviennent aux étapes

ultérieures de l'élevage, les cadavres de poussins âgés restant sur les toits ont permis d'assurer une cause à ces disparitions même si des envols précoces, ou tout au moins échappant à l'observateur, ne sont pas à exclure et pourraient avoir du coup majoré les pertes de poussins âgés. Tout au long de ces heures de surveillance de la colonie, aucun cas n'a été constaté de cannibalisme, aucun adulte n'a été vu agressant ou tuant un poussin étranger. Les congénères ne sont pas ici une cause importante de disparition des poussins.

Année	Poussins vus		
	0-pls	prem	jd
1997	6,06%	6,06%	0,00%
1998	18,03%	14,75%	1,64%
1999	8,93%	17,86%	0,00%
2000	13,24%	5,88%	17,65%
2001	1,30%	9,09%	7,79%
2002	14,49%	4,35%	4,35%
2003	10,77%	13,85%	10,77%
moyenne 97-03	10,40%	10,26%	6,03%



Pertes de poussins au cours de l'élevage

CAS DES SAISONS 2004 ET 2005


Après la période s'étendant de 1997 à 2003, qui a permis de faire la connaissance du déroulement de la saison sur le toit de la criée et d'établir les valeurs de quelques paramètres, les deux saisons suivantes ont été marquées, à des titres divers, pour diverses raisons, par des variations qui s'écartent de cette référence.

➤ 2004 Le nombre de poussins envolés (35) paraîtra modeste au regard du nombre de couples installés (43), le plus haut enregistré jusqu'ici. En effet, après un début de reproduction normal, une part importante des couveurs, de plus parmi les couples les plus productifs, a subi un dérangement pendant l'incubation. Une visite inopportune les a vraisemblablement obligés à une ponte de remplacement, moins productive. Ensuite, plus du quart des poussins vus disparaissent précocement. En

définitive, avec 0,81 juvénile par couples totaux, la saison 2004 se solde par une productivité médiocre.

Les opérations qui, à Lorient, régulent la présence des goélands nicheurs, se déroulent au centre-ville et n'atteignent pas les ports. Ce qui a affecté le groupe de la criée n°3 découle donc d'une initiative sans contrôle.

➤ 2005 Les dates-repères se coulent sans difficulté dans les moyennes précédentes et, avec un taux de important de couples producteurs (90%), 2005 s'annonçait comme une année faste, 41 couples installés produisent 98 poussins vus. Quelques jours de fortes chaleurs diurnes et de tiédeurs nocturnes ont été marqués par une importante mortalité des poussins âgés. En une semaine, une quinzaine d'entre eux, qui n'étaient pas encore aptes à l'envol, ont disparu. Quelques cadavres sont restés, desséchés, sur le toit. Cette mortalité tardive s'est ajoutée aux pertes habituelles des jeunes poussins, aboutissant à une perte finale de 47%, valeur jamais atteinte encore.



Pertes des poussins et décades, 2005

CONCLUSION

Le groupe de Goélands argentés reproducteurs sur le toit de la criée n°3 à Lorient représente un échantillon de colonie urbaine durable et d'observation facile. La productivité y est élevée, supérieure aux valeurs notées sur des colonies naturelles en 2005 mais en deça des presque deux jeunes à l'envol relevés à Brest (Cadiou B., *comm. pers.*). Le suivi pluri-annuel montre que même s'il y a des fluctuations le groupe étudié est à l'abri des à-coups brutaux, épargné par des échecs massifs, souvent liés à la prédation et au cannibalisme des adultes.


En utilisant les taux de survie annuelle proposés par Rock (2003), on calcule qu'environ quatre-vingts jeunes issus de cette sous-colonie on atteint l'âge de la reproduction et qui'ils auraient eux-même produit près de 200 jeunes. On peut penser que ces nouveaux reproducteurs contribuent à l'expansion numérique du centre-ville. Les goélands nés en milieu urbain tendent à y retourner nicher et sont capables d'émigrer pour ce faire (Rock, 2004). Dans le contexte sud-breton, on trouve des implantations déjà anciennes (ports bigouden, Quimper, Concarneau, Lorient) florissantes. Faute de reconnaissance individuelle, on ne peut distinguer la part des échanges et du recrutement local.

Au risque d'une contradiction dans les termes, le groupe de la criée n°3 est en évolution et stable. L'effectif a augmenté et des sites sont constamment occupés. La méthode utilisée sur plusieurs années a permis de dresser un historique de ces nids et de

quantifier leur réussite. S'il est raisonnable de penser que le même couple utilise le même site d'une année à l'autre il est hors de nos moyens de le vérifier, de même que les remplacements partiels, si un partenaire disparaît, ou complet nous échappent. Il est cependant patent que tous ne se valent pas. Il y en a d'éphémères qui sont voués à l'échec, de constants qui assurent une très large fraction de la cohorte annuelle. On vérifiera dans la suite la disposition et le déroulement de la saison des uns et des autres.

BIBLIOGRAPHIE

- Bukacinska Monika, Bukacinski Dariusz., Spaans Arie L., 1996.- Attendance and diet in relation to breeding success in herring gull. *The Auk* 113(2):300-309.
 Rock, Peter., 2003.- The status and numbers of roof-nesting gulls in Worcester.
 Rock Peter., 2004.- Roof-nesting gulls in Cardiff Survey conducted in May 2003 by Peter Rock for Cardiff County Council.
 Tinbergen Niko., 1953.- L'univers du goéland argenté. Elsevier.




PENESTIN AU TEMPS DES CANES MOUQUETIERES

JEAN-LUC LEMONNIER

Les séances de guet à la mer pourraient parfois sembler bien longues lorsque les oiseaux n'y sont pas. Mais c'est alors l'occasion de nouer conversation avec les promeneurs, perplexes devant ces énergumènes collés à leur longue-vue, scrutant inlassablement l'horizon.

Une matinée d'août à Pénestin avec Gwenaél Derian. Un balbuzard a semé la pagaille sur l'Île à Bacchus, les eiders sont maintenant sous nos pieds, au bas de la falaise du Bile. Depuis, tout est calme. Deux messieurs, la soixantaine bien engagée, cèdent à leur curiosité. Le dialogue s'annonce fructueux : nous apprenons l'estivage de deux Bernaches cravants. Mais de toute évidence, les eiders intriguent l'un de nos interlocuteurs. Dans sa prime jeunesse, que nous situons dans les années 50, le garçon qu'il était alors accompagnait de temps en temps ses aînés à la pêche à la "cane mouquetière".



«De la côte, on repérait quelques jours avant les moulières sur lesquelles les canes plongeaient à marée haute. C'était souvent un peu au sud de Bacchus. Alors, à marée basse, on allait poser des filets sur quatre pieux. Ils étaient tendus assez haut, à un mètre, un mètre cinquante au-dessus des roches. Les canes, lorsqu'elles revenaient plonger, se glissaient dessous et se noyaient, prisonnières dans leur remontée vers la surface. On partait les récupérer avec le reflux suivant, souvent la nuit ; il ne faisait pas chaud. Je ne me souviens pas en avoir souvent mangé. Ça n'était pas mauvais, sans plus. Je me rappelle bien, il y en avait des noires et des brunes.»

C'est cette dernière remarque qui nous remet sur la piste. Les canes mouquetières d'alors n'étaient pas des eiders, mais des macreuses. Noires, bien sûr ; le sexe des oiseaux expliquant seul les deux colorations des oiseaux capturés.

Quelques pages du Jonsson plus tard, le doute était entièrement levé.

Documents

L'île morbihannaise d'Hoëdic, si loin du littoral où nous avons nos habituels terrains d'observation, n'est pas si inaccessible pourtant qu'on ne la visite depuis longtemps et que sa renommée ne soit plus à faire parmi les ornithologues. Pour la deuxième fois, une synthèse annuelle a été rédigée à partir des données de nombreux observateurs. Le résultat porte aussi bien sur la reproduction sur l'île que sur les migrations. C'est cette seconde édition que ses auteurs nous ont autorisés à reproduire dans ar Vran Morbihan.



Bruant des neiges, Hoëdic ; 2005



Dessin de couverture : Fauvette épervière et Fauvette à tête noire

SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE HOEDICAISE ANNUELLE **du 16 juillet 2003 au 15 juillet 2004**

Juin 2005

Textes de

Arnaud Le Nevé (Groupe ornithologique breton), 5 rue Le Guennec, 29200 Brest, tél. dom : 02 98 49 84 31, courriel : arnaud.le-neve@wanadoo.fr

Yves Kayser (Comité d'homologation national), mas Boisverdun, Le Sambuc, 13200 Arles, tél. dom : 04 90 97 22 29

Bernard Iliou (Groupe ornithologique breton), La ville Gluhel, 56120 Guegon, tél. dom : 02 97 75 67 64

Dessins de

Alban Larousse, 3 square de la Limagne, 75013 Paris, tél. dom : 01 44 24 13 27, courriel : alban.larousse@wanadoo.fr

Liste des observateurs

Richard ALLANIC, N. AVRIL, Christophe BARBRAUD, Jean-Louis BOSSARD, Claudine BOUFFET, B. BURNOUF, Michel CHAUCHEPRAT, Damien COHEZ, Frédéric CONSIGNY, A. DUFOUR, Alain FOSSE, Sébastien GAUTIER, Emmanuel GFELLER, Julien GONIN, Benjamin GUYONNET, François HALLIGON, François HEMERY, C. HERVÉ, Bernard ILIOU, Yann JACOB, James JEAN-BAPTISTE, Jean-Pierre JORDAN, Raphaël JORDAN, Jacky JUDAS, Yves KAYSER, Éric LAPOUS, Alban LAROUSSE, Anthony LE DOZE, Violette LE FEON, A. LE LEUXHE, Arnaud LE NEVÉ, Dominique LE NEVÉ, Robert LE NEVÉ, Jean-Paul LE PALMEC, LPO-44, Willy MAILLARD, Paul MAUGUIN, Aymeric MIONNET, Émilie MOISDON, Simon MOISDON, Raphaël MUSSEAU, Daniel PLAZANET, Jo POURREAU, Gaël RAULT†, Laurent SPANNEUT, C. RIDEAU, P. SPIROUX, J. VITTIER,

Remerciements particuliers à :

Bernard SPAANS du « Department of Marine Ecology and Evolution » aux Pays-Bas pour l'information sur une Barge rousse baguée, Didier VANGELUWE de « l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique » pour l'information sur un Goéland brun bagué, Alain GENTRIC pour la transmission de la demande d'informations à la LPO44 et Émilie MOISDON pour la collecte de données par le biais de l'Association pour la gestion du Fort et de son environnement.


Statistiques

Nombre de jours d'observation : 68 (fig. 1).
 Nombre de données : 2 876 (fig. 1).
 Nombre d'espèces : 168.

Dans le texte, chaque nom d'espèce est suivi de deux chiffres entre parenthèses. Le premier chiffre représente le nombre de données hoedicales enregistrées dans la base de données jusqu'au 15 juillet 2003 (statistique obtenue sur un total de 18 536 données). Le deuxième chiffre représente le nombre de données du 16 juillet 2003 au 15 juillet 2004, soit 2 876 au total.

L'année 2003 – 2004 représente donc 15% du nombre de données précédemment enregistrées. Cette forte proportion est liée au nombre important d'observateurs ayant contribué à cette synthèse (n=48).

Fig. 1 - Importance et répartition journalière des données en 2003 - 2004



BILAN DES OBSERVATIONS

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (51/4)

L'espèce est observée du 26 au 29 décembre. L'effectif maximum observé est de 2 individus le 26 décembre à l'est de Beg Lagad (A. Le Nevé).

Hivernage : il est estimé à 4 individus minima autour de l'île (Passage des Sœurs inclus) en 2003 – 2004. L'hiver précédent, le nombre d'oiseaux avait été estimé à au moins 12 individus. Cet écart peut provenir des difficultés de comptage en mer depuis la côte, dépendantes des conditions météorologiques et de la dispersion des oiseaux dans l'archipel de Houat-Hoëdic.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (146/8)

Les premières observations sont faites le 26 décembre et l'espèce est notée jusqu'au 30 avril.

Hivernage : 5 le 26 décembre depuis le courrier dans le Passage des Sœurs mais 14 sont notés dans ce secteur le 29 décembre depuis la Pointe du Vieux Château. Ce jour là et la veille, 2 autres stationnent à proximité du Grand Mulon (A. Le Nevé). L'effectif hivernant autour de l'île (Passage des Sœurs inclus) est donc estimé à 16 individus (5 individus en 2002-2003).

Migration pré-nuptiale : 1 le 25 avril dans le Passage des Sœurs (A. Le Nevé), 1 le 28 avril à Beg Lagad (F. Hémerly, A. Le Nevé) et 4 le 30 avril dans le Passage des Sœurs (A. Le Nevé).

GRÈBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis* (33/12)

Grèbe noté à partir du 24 avril au 30 mai. Les maxima concernent 3 adultes (2 mâles, 1 femelle) le 25 avril (A. Le Nevé) et 4 individus dont 1 jeune le 29 mai (F. Consigny, A. Le Nevé).

Nidification : 2 chanteurs du 25 avril au 27 mai dans le Grand Marais ou le Lenn Chipont (A. Le Nevé, L. Spanneut), puis 1 adulte avec 1 jeune au Lenn Vihan le 29 mai et 2 adultes avec 1 jeune dans le Grand Marais le 30 mai. Deux couples se sont reproduits en 2004 (indice D12).

GRÈBE HUPPÉ *Podiceps cristatus* (80/8)

L'espèce est observée du 17 octobre au 29 décembre.

Migration post-nuptiale : 1 est présent du 17 au 21 octobre (G. Rault et al.).

Hivernage : 2 individus sont observés du 26 au 29 décembre (A. Le Nevé).

GRÈBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (19/3)

Le Grèbe esclavon est observé les 26 et 29 décembre le long des côtes est et sud (A. Le Nevé).

Hivernage : 7 pêchent en groupe le 26 décembre devant Beg er Sennerion. Il s'agit du deuxième effectif le plus important après celui de 19 individus observés le 4 avril 1974 (Annézo J.P., 1976).

GRÈBE À COU NOIR *Podiceps nigricollis* (2/1)

Le Grèbe à cou noir est un migrateur et un hivernant accidentel à Hoedic. Un individu est observé le 20 octobre au Beudgel (D. Cohez, É. Lapous).

Les précédentes observations concernent 1 individu le 5 avril 1973 (Annézo, 1976) et 2 individus le 21 novembre 1996 (A. Le Nevé).

FULMAR BORÉAL *Fulmarus glacialis* (23/3)

Un individu est observé le 2 août dans le Passage des Soeurs (A. Le Nevé). Puis 2 oiseaux fréquentent les Grands Cardinaux le 19 avril (S. Moisdon) et 1 Fulmar boréal rase en vol Beg Melen le 28 mai (A. Le Nevé).

PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus* (10/2)

Un le 4 août à la Pointe du Vieux Château (A. Le Nevé). Quatre individus sont observés le 16 octobre auprès du Madavoar (J. Jean-Baptiste et al.).

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus* (40/1)

L'espèce est observée le 16 octobre, avec 6 individus dans les parages du Madavoar (J. Jean-Baptiste et al.).

PUFFIN DES BALÉARES *Puffinus mauretanicus* (57/0)

Aucune observation rapportée cette année.

Océanite Tempête *Hydrobates pelagicus* (44/0)

Aucune observation rapportée cette année.

FOU DE BASSAN *Morus bassanus* (133/14)

L'espèce est notée du 3 août au 28 mai. Le maximum est observé le 21 octobre avec 350 oiseaux autour de l'île (G. Raultt et al.).

Cet effectif est le plus important jamais contacté autour de l'île. Le précédent concernait 200 individus le 12 octobre 2002 (J. Jean-Baptiste et al. (bis)).

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo* (125/14)

Noté du 20 octobre au 31 mai. Le maximum est observé les 28 et 29 décembre avec respectivement 13 et 18 individus (A. Le Nevé).

Ce chiffre est le deuxième plus important observé sur Hoedic depuis 25 individus le 25 août 1987 (G. Raultt).

CORMORAN HUPPÉ *Phalacrocorax aristotelis* (90/14)

Contacté du 20 octobre au 13 juillet. Le maximum est observé le 29 décembre avec 48 individus sur le Grand Mulon (A. Le Nevé).

HÉRON CENDRÉ *Ardea cinerea* (168/18)

Ce héron est observé du 7 septembre au 30 mai. Le maximum est de 25 individus le 13 octobre (J. Jean-Baptiste et al.). Cet effectif est le plus important connu sur Hoedic, similaire à celui de l'observation du 9 septembre 1992 (G. Raultt).

Dispersion post-nuptiale : 2 sont présents le 7 septembre (J. Pourreau & LPO 44). Puis le 13 octobre, Hoedic accueille 25 individus (J. Jean-Baptiste et al.) et 15 sont encore présents le 14 octobre (R. Le Nevé). Le 28 octobre, un individu est toujours sur l'île (G. Raultt et al.).

Hivernage : le 26 décembre, 2 oiseaux sont observés à Beg Melen (A. Le Nevé).

Présence printanière : 2 individus sont présents le 30 avril, 2 subadultes le 28 mai, puis 1 adulte le 30 mai (A. Le Nevé).

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta* (168/33)

L'espèce est présente toute l'année sur l'île, observée du 2 août au 29 mai.

Estivage : 2 les 2 et 3 août (A. Le Nevé), et 2 le 7 septembre (J. Pourreau & LPO 44).

Dispersion post-nuptiale : 4 individus le 5 octobre (J. Pourreau & LPO 44), 10 les 14 et 17 (J. Jean-Baptiste et al.) puis 5 le 19 (A. Le Nevé), 8 le 23 (É. Lapous) et 9 les 27 et 28 octobre (G. Raultt et al.).

Hivernage : jusqu'à 5 individus du 26 au 29 décembre (A. Le Nevé).

Présence printanière : de 1 à 3 oiseaux du 26 avril au 29 mai (F. Consigny, A. Le Nevé, L. Spanneut).

OIE CENDRÉE *Anser anser* (2/1)

En 2003, un individu est observé le 27 octobre (G. Raultt et al.).

Cette observation serait la *troisième* pour l'île, mais l'espèce semble régulièrement observée par les Hoedicaïs.

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna* (352/31)

Le Tadorne de Belon est observé toute l'année, du 2 août au 15 juillet. L'effectif le plus important est noté le 30 mai avec 92 individus sur la Station de Lagunage (A. Le Nevé). Ce chiffre est par ailleurs le plus important depuis 90 individus le 30 mars 2003 (A. Le Nevé).

Observations automnales : 1 du 24 au 28 octobre (G. Raultt et al.).

Hivernage : 12 fréquentent le Port de la Croix le 16 décembre (É. Moisson) et 5 sont notés sur l'île le 26 décembre (A. Le Nevé).

Nidification :

Les 2 et 3 août 2003, 10-12 jeunes volants sont présents sur Hoedic (indice D12) (A. Le Nevé).

En 2004, 7 couples sont cantonnés dans des habitats favorables le 26 avril et 38 individus au total sont observés le 27 avril (A. Le Nevé). Un couple accompagné de 10 poussins (indice D16) est présent à la Station de Lagunage le 30 mai (A. Le Nevé), puis 1 couple avec 6 gros poussins est observé au Beudgel et à la Carrière du 5 au 15 juillet (indice D16) (V. Le Féon).

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope* (7/3)

Cette année fournit un nombre relativement important de données pour cet Anatidé, toutes en octobre.

L'effectif de 40 individus observé le 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.) correspond au deuxième chiffre le plus important depuis un hiver dans les années 1970 où « plusieurs centaines » avaient été notées sans plus de précisions (Annézo, 1976). Puis une femelle est présente les 24 et 25 octobre (G. Rault† et al.).

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca* (29/10)

En 2003-2004, l'effectif maximum est de 7 individus le 19 octobre.

Cette sarcelle n'est observée qu'en migration post-nuptiale : 1 le 5 octobre (J. Pourreau & LPO 44), 4 les 16 et 18 octobre (J. Jean-Baptiste et al. ; E. Lapous), 7 le 19 octobre (A. Le Nevé ; G. Rault† et al.), 4 jusqu'au 23 octobre puis 2 jusqu'au 27 octobre (G. Rault† et al.).

L'amélioration du milieu naturel pour la Sarcelle d'hiver à la suite des travaux de curage du Grand Marais en 1999, se confirme puisque 5 données sont antérieures à cette date et 34 ont été obtenue depuis.

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos* (181/44)

Le Canard colvert est présent toute l'année sur Hoedic. Le nombre le plus important est de 27 individus le 13 octobre (J. Jean-Baptiste et al.). *Coincidence, hasard du calendrier, en 2002 l'effectif maximum était de 30 individus le 13 octobre (J. Jean-Baptiste et al. (bis)).*

Dispersion et migration post-nuptiale : 7 individus sont présents le 3 août sur le Lagunage et 9 sont observés le 4 août dans le Grand Marais (A. Le Nevé). C'est en octobre que les effectifs augmentent : 27 le 13 (J. Jean-Baptiste et al.), 20 le 17 et 25 le 20 (A. Le Nevé) et encore 4 le 28 (G. Rault† et al.).

Hivernage : 20 individus le 28 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : du 25 au 27 avril, 3 femelles accompagnées respectivement de 3, 4 et 15 poussins fréquentent le bas de Parkeu Meing et le Grand Marais (indice D16). Le 28 avril une femelle accompagnée de 6 poussins est observée au Lenn Vihan et constitue une quatrième couvée. Le 29 mai, 1 femelle avec 2 poussins est observée au Lenn Chipont et pourrait constituer un cinquième couple tandis que les 5 canetons observés ce jour là dans le Grand Marais correspondent sans doute aux poussins d'avril (A. Le Nevé). Le nombre de couples nicheurs est évalué à 4-5 couples. La dernière observation concerne 13 mâles et 2 femelles le 30 mai au Lenn Vihan (A. Le Nevé).

CANARD PILET *Anas acuta* (11/7)

Cette année fournit un nombre important d'observations.

L'espèce est observée du 13 au 24 octobre. L'effectif maximum est de 3 individus le 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.), puis 1 femelle est présente jusqu'au 24 octobre, souvent sur le Lagunage (A. Le Nevé ; G. Rault† et al.).

FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula* (1/3)

Un couple est présent du 28 au 30 avril dans le Grand Marais (A. Le Nevé).

L'observation précédente concernait une femelle le 7 novembre 1993 au Lenn Vihan (G. Rault†). Par ailleurs cette observation fournit la **deuxième mention** du Fuligule morillon à Hoedic.

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (90/5)

Ce canard marin est observé à l'automne mais aussi en hiver.

Migration post-nuptiale : 1 mâle le 17 octobre dans le Passage des Sœurs (A. Le Nevé), 1 femelle les 21 et 22 octobre et 5 individus le 26 octobre (G. Rault† et al.).

Hivernage : 23 le 26 décembre (A. Le Nevé).

La Macreuse noire ne fait décidément plus l'objet d'importants effectifs comme par le passé : 1 200 le 1^{er} avril 1975 (Anonyme, in Annézo, 1976), 300 le 21 novembre 1996 dans le Passage des Sœurs (A. Le Nevé).

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus* (251/5)

Seulement 5 données et pas de reproduction en 2004.

Un individu le 15 octobre 2003 (J. Jean-Baptiste et al.), 1 femelle le 21 octobre et 1 immature le 27 octobre (G. Rault† et al.). Puis 1 femelle les 28 et 29 décembre dans le Grand Marais (A. Le Nevé).

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus* (32/10)

L'espèce se fait remarquer par le nombre important d'observations provenant de 2 immatures au moins, présents du 14 au 25 octobre (J. Jean-Baptiste et al. ; A. Le Nevé ; G. Rault† et al.).

BUSARD CENDRÉ *Circus pygargus* (7/1)

Un mâle est observé en vol le 26 avril 2004 dans la Lande du Menhir Nord (A. Le Nevé). L'espèce n'avait plus été observée depuis un immature le 21 août 1990 (A. Le Nevé).

ÉPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus* (117/23)

Observé à partir du 21 septembre, en octobre, en décembre, en avril et jusqu'au 30 mai. En 2004, ce rapace a **probablement niché pour la première fois sur Hoedic**.

Dispersion post-nuptiale : noté du 21 septembre (J. Pourreau & LPO 44) au 28 octobre (G. Rault† et al.) avec un maximum de 2 individus les 20 et 21 octobre (J. Jean-Baptiste et al.) et les 24, 25 et 27 octobre (G. Rault† et al.).

Hivernage : une femelle les 27 et 28 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : un couple est présent du 26 avril au 30 mai et alarme dans le Bois le 29 mai (indice C7), alors que deux petites aires semblent avoir été construites (A. Le Nevé). Mais il n'y a pas d'indices de reproduction certaine.

FAUCON CRÉCERELLE *Falco tinnunculus* (249/27)

Ce faucon est observé à partir du 7 septembre, en octobre, en décembre, en avril et jusqu'au 30 mai. L'effectif maximum observé est de 3 individus le 5 octobre (J. Pourreau & LPO 44).

Nidification : à partir du 26 avril, un couple est régulièrement observé. Le 29 mai, le mâle transporte de la nourriture aux abords du Fort, site traditionnel de reproduction (indice D14) (A. Le Nevé).

FAUCON ÉMERILLON *Falco columbarius* (76/17)

Migration post-nuptiale : le Faucon émerillon est contacté en octobre du 12 au 28. L'effectif maximum est de 3 individus le 20 octobre (A. Le Nevé, G. Rault† et al.), ce qui constitue le chiffre le plus important jamais noté sur Hoedic.

Migration pré-nuptiale : 1 individu le 1^{er} mai à Beg er Faut (A. Le Nevé).

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo* (15/7)

Migration post-nuptiale : un immature tardif est présent du 22 au 25 octobre (G. Rault† et al.).

Migration pré-nuptiale : noté les 27, 28, 30 avril et 2 mai (A. Le Nevé).

FAUCON PÉLERIN *Falco peregrinus* (29/6)

Migration post-nuptiale : un immature est observé quatre fois du 18 au 27 octobre (G. Rault† et al.).

Migration pré-nuptiale : un immature le 1^{er} mai (A. Le Nevé) et un immature le 7 mai (L. Spanneut).

CAILLE DES BLÉS *Coturnix coturnix* (0/1)

Un individu est levé dans le Vallon de la Décharge, le 29 mai (A. Le Nevé).

Première observation de la Caille des blés à Hoedic.

FAISAN VÉNÉRÉ *Syrnaticus reevesii* (0/3)

Un mâle est observé du 27 avril au 30 mai à Parkeu Meing et au Lagunage (A. Le Nevé : P. Mauguin).

Cette espèce exotique a été introduite récemment sur l'île en petit nombre d'après des Hoédicais.

FAISAN DE COLCHIDE *Phasianus colchicus* (17/16)

Nidification : au moins 12 mâles chanteurs du 27 au 30 mai et une nichée de 3 ou 4 poussins le 29 mai dans le Vallon de la Décharge (indice D12) (A. Le Nevé).

Ce faisan a été réintroduit à Hoedic en 1991. Il était présent au début des années 1970 jusqu'au printemps 1974 au moins (J.P. Annézo).

RÂLE D'EAU *Rallus aquaticus* (108/15)

Le Râle d'eau est contacté en octobre, en décembre, en avril et en mai. Les effectifs maximum concernent 6 individus le 21 octobre (A. Le Nevé, E. Lapous, G. Rault† et al.).

Migration post-nuptiale : de 3 à 6 oiseaux sont notés du 17 octobre (A. Le Nevé, E. Lapous) au 22 octobre (G. Rault† et al.). Le Grand Marais, le Lenn Chipont et le Paluden fournissent les localités.

Hivernage : 2 à 3 sont observés quotidiennement au Fort, à Parkeu Meing et dans le Grand Marais du 26 au 28 décembre (A. Le Nevé). L'effectif minimum hivernant serait de 5-7 individus.

Nidification : l'espèce est notée le 24 avril et le 30 mai dans le Grand Marais (indice C4) (A. Le Nevé). Mais il n'y a pas d'indice certain de reproduction.

GALLINULE POULE-D'EAU *Gallinula chloropus* (199/27)

La Gallinule poule-d'eau est contactée en septembre, octobre, décembre, avril, mai et juillet. Les effectifs maximum concernent 7 individus le 28 décembre (A. Le Nevé).

Hivernage : 7 sont présentes dans les Jardins et Parkeu Meing le 28 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : en 2004, l'espèce produit au moins 2 nichées en avril et mai : 1 nichée de 1 poussin sur la mare dans les Jardins le 25 avril puis 1 juvénile le 27 mai ainsi qu'une autre nichée de 3 poussins dans la Carrière le 28 mai (indice D16). Par ailleurs, 2 mâles s'affrontent le 25 avril à Parkeu Meing (indice C4) (A. Le Nevé). Le nombre de couples nicheurs est estimé à 2-4 couples.

FOULQUE MACROULE *Fulica atra* (86/35)

La Foulque macroule est observée toute l'année du 3 août au 15 juillet. L'effectif maximum concerne 13 individus le 28 décembre (A. Le Nevé).

Hivernage : 13 sont observées sur la Station de Lagunage le 28 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : au printemps 2004, des couples nicheurs sont présents dans 5 localités de l'île : le Lenn Vihan, la Carrière, le Lenn Chipont, le Grand Marais et Parkeu Meing. Ils produisent au minimum 7 nichées : 5 fin avril – début mai puis deux nouvelles fin mai (indice D12). Le nombre de poussins éclos est au minimum de 16 fin avril et de 5 fin mai. Par ailleurs, 4 jeunes volants issus des poussins de fin avril sont observés fin mai (tandis que 3 autres ont été tués par un seul et même chien au cours du mois de mai). La population reproductrice peut être estimée à 5-7 couples.

L'espèce se maintient donc pour la cinquième année consécutive depuis sa réapparition sur l'île en 2000, à la suite des travaux de curage du Grand Marais en 1999. Auparavant, elle n'avait plus été revue depuis 1984.

On peut cependant signaler l'impact destructeur des chiens non tenus en laisse autour des marais puisque l'un d'eux a tué au moins 3 jeunes foulques au cours du printemps 2004.

HUÎTRIER PIE *Haematopus ostralegus* (273/28)

Observé toute l'année, du 3 août au 13 juillet. Le maximum est atteint avec 110 individus le 27 octobre (G. Rault et al.).

Migration post-nuptiale : 17 sont présents le 17 octobre puis 40 le 20 (A. Le Nevé), 80 le 23 et 110 le 27 (G. Rault et al.).

Hivernage : 54 le 28 décembre au Port de la Croix (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : les maxima sont de 37 individus le 28 avril et 43 le 31 mai (A. Le Nevé).

Nidification : aucun indice en 2004 contrairement à 2003 (Le Nevé, Kayser, Iliou, 2004).

VANNEAU HUPPÉ *Vanellus vanellus* (31/1)

Une seule donnée pour le Vanneau huppé, peu commun à Hoedic. Sur la période considérée, il n'est observé qu'en migration post-nuptiale : 1 le 24 octobre (G. Rault et al.).

PLUVIER DORÉ *Pluvialis apricaria* (29/3)

Tout comme le Vanneau huppé auquel il s'associe en hiver, ce pluvier est peu commun à Hoedic. Sur la période considérée, elle n'est observée qu'en migration post-nuptiale : 2 le 13 octobre à Beg Lagad (J. Jean-Baptiste et al.), 2 le 26 octobre et 1 le 27 (G. Rault et al.).

PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola* (106/17)

L'espèce est observée du 17 octobre au 29 avril, avec un effectif maximum de 5 individus les 26 et 28 décembre (A. Le Nevé).

Migration post-nuptiale : 1 oiseau est observé presque quotidiennement du 17 au 28 octobre (A. Le Nevé, G. Rault† et al.) mais 2 autres sont observés le 25 octobre (G. Rault† et al.).

Hivernage : 5 individus les 26 et 28 décembre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 2 le 26 avril puis un seul les 28 et 29 (A. Le Nevé).

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula* (432/20)

Observé du 3 août au 1^{er} mai, avec un effectif maximum de 50 individus le 23 octobre (G. Rault† et al.).

Migration post-nuptiale : 23 individus sont présents le 3 août puis 27 le 19 octobre à Beg er Faut (A. Le Nevé), 50 le 23 octobre et 20 le 25 (G. Rault† et al.).

Hivernage : 43 le 28 décembre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 7 les 27 et 29 avril puis 3 le 1^{er} mai (A. Le Nevé).

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (299/27)

Le Gravelot à collier interrompu est noté à chaque passage d'ornithologues, y compris en hiver. Mais l'effectif maximum ne concerne que 9 individus le 4 août (A. Le Nevé). On est loin des chiffres des mois d'août des années 80 et début 90 où les groupes d'une cinquantaine d'individus étaient courants. L'effectif record de 84 individus a d'ailleurs été enregistré les 8 août 1989 et 9 août 1990 (A. Le Nevé).

Migration post-nuptiale : 9 individus le 4 août (A. Le Nevé), 1 du 18 au 22 octobre (A. Fossé, F. Halligon, G. Rault† et al.), puis 2 du 23 au 26 octobre (G. Rault† et al.).

Hivernage : 1 les 26 et 28 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : en avril, 1 couple est observé à partir du 25 à Portz Guen et un autre est présent à partir du 28 à Beg er Faut. Le 30 avril, 1 femelle est observée sur la dune grise de Portz Guen (indice C6) et le 1^{er} mai 2 couples sont présents sur cette plage, tandis qu'un autre fréquente Beg er Faut. Le 28 mai, 1 couple est noté avec 1 poussin en duvet à Portz Guen (indice D16), tandis qu'un nid est découvert à Beg Lagad couvé par la femelle. Le 31 mai, le mâle couve le nid de Beg Lagad (indice D15). Par ailleurs, 3 mâles sont présents au Beudgel le 30 mai. (A. Le Nevé).

La population nicheuse est estimée à 2-3 couples et trois localités sont fréquentées.

**BÉCASSE DES BOIS *Scolopax rusticola* (7/3)**


Un individu le 19 octobre (G. Rault†), puis 1 les 24 et 25 (G. Rault† et al.).

Ce limicole n'est pas contacté souvent par les ornithologues. Il est pourtant probablement présent tous les hivers, aux dires des chasseurs.

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus* (1/5)

Un individu est observé dans le Grand Marais à partir du 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.). Le 19 octobre, 2 oiseaux y sont présents dont l'un d'eux est très peu farouche. Il se montre à découvert sur la vase d'une mare exondée à quelques mètres seulement de leurs observateurs chanceux (A. Larousse & A. Le Nevé). Encore 1 individu le 20 octobre (G. Rault†).

Cette observation constitue la **deuxième mention** de l'espèce à Hoedic, la première provenant d'un individu 2 ou 3 ans auparavant par une observation anonyme (G. Rault†, comm. pers.).



BÉCASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago* (128/21)

L'essentiel des données provient d'octobre (n=16) mais l'espèce est également observée en août, en décembre et en mai. L'effectif maximum est de 9 individus le 18 octobre.

Migration post-nuptiale : la première est observée le 3 août (A. Le Nevé). Puis 1 est observée le 17 octobre et 9 le 18 (É. Lapous & A. Le Nevé), 6 les 20 et 21 et encore 2 le 28 (G. Rault† et al.).

Hivernage : 1 le 26 décembre au Lenn Vihan, 1 dans le Grand Marais et 1 au Lenn Chipont le 28 décembre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 1 à Parkeu Meing le 9 mai (D. Plazanet & A. Le Leuxhe).

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (116/20)

L'espèce est observée du 3 août au 20 octobre, puis du 24 avril au 31 mai. La migration pré-nuptiale est marquée et constitue l'essentiel des données (n=16) et les plus forts effectifs : 85 individus le 29 avril (A. Le Nevé).

Migration post-nuptiale : 1 le 3 août à Beg er Faut et 12 en vol le 4 août (A. Le Nevé), 1 le 7 septembre (J. Pourreau & LPO 44), 1 le 20 octobre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 2 le 25 avril, 9 le 27, 85 le 29 au Beudgel, 8 le 1^{er} mai, 4 le 27 mai et 1 le 31 (A. Le Nevé).

Individu bagué :

- 1 individu bagué couleur parmi les 85 individus présent au Beudgel le 29 avril, bagué adulte le 3 mai 2001 dans les dunes près de Castricum aux Pays-Bas (52°32'N – 004°37'E).

Des Barges rousses sont fréquemment notées en compagnie de Courlis corlieux à la recherche de vers de terre dans les prairies de Parkeu Meing. L'effectif historique maximum est de 97 individus le 11 septembre 1972 (Annézo, 1976).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (344/25)

Noté du 3 août au 31 mai, y compris en décembre. L'effectif maximum est atteint le 30 avril avec 90 individus (A. Le Nevé), ce qui constitue le chiffre le plus important sur Hoedic depuis 42 le 17 avril 2001 (G. Rault†).

Migration post-nuptiale : les effectifs maxima concernent 5 individus le 3 août (A. Le Nevé) et 3 les 22 et 25 octobre (G. Rault et al.).

Hivernage : 1 les 26 et 28 décembre et 2 le 29 (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 33 le 25 avril, 26 le 27, 36 le 28, 63 le 29, 90 le 30, 75 le 1^{er} mai (A. Le Nevé) et 10 le 8 mai (L. Spanneut), soit un beau passage. Encore 2 le 31 mai (A. Le Nevé).

COURLIS CENDRÉ *Numenius arquata* (237/15)

Ce courlis est observé du 17 octobre au 26 avril avec un maximum de 12 individus le 20 octobre.

Migration post-nuptiale : 3 individus sont observés le 17 octobre au Beudgel (A. Le Nevé), 12 sont dénombrés le 20 octobre (A. Le Nevé, G. Rault et al.), puis 1 à 3 jusqu'au 28 octobre (G. Rault et al.).

Hivernage : l'espèce est contactée les 26 et 28 décembre. Six individus sont présents le 28 à Beg Melen (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 1 le 26 avril au Grand Mulon (A. Le Nevé).

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus* (117/18)

Noté du 2 août au 25 octobre puis du 25 avril au 28 mai. Le nombre le plus important est de 9 individus le 4 août.

Migration post-nuptiale : 1 dès le 2 août puis 9 le 4 (A. Le Nevé). Un individu du 17 au 25 octobre au Lagunage (A. Le Nevé, G. Rault et al.).

Migration pré-nuptiale : 1 oiseau à partir du 25 avril, 2 les 29 et 30 avril, 1 le 2 mai et 1 le 28 mai (A. Le Nevé).

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia* (38/5)

L'espèce est observée en migrations post-nuptiale et pré-nuptiale. L'effectif maximum est de 7 individus le 26 avril.

Migration post-nuptiale : 1 le 13 octobre (J. Jean-Baptiste et al.).

Migration pré-nuptiale : 7 en vol au-dessus du Fort le 26 avril (B. Iliou, A. Le Nevé), 1 le 28 avril au Port de l'Argol et 1 le 2 mai à Portz Guen (A. Le Nevé).

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus* (46/6)

Contacté du 4 août au 19 octobre puis le 25 avril avec un effectif maximum de 5 individus le 25 avril.

Migration post-nuptiale : 1 le 4 août sur la petite mare des Jardins (A. Le Nevé), 1 le 7 septembre (J. Pourreau & LPO 44), 1 le 12 octobre au Lenn Vihan (J. Jean-Baptiste et al.) et 1 le 19 à Beg er Faut (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 5 le 25 avril (A. Le Nevé) au Paluden et à Parkeu Meing.

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos* (224/18)

L'espèce est observée du 3 août au 20 octobre puis du 25 avril au 28 mai. L'effectif maximum est de 8 individus les 3 et 4 août.

Migration post-nuptiale : 8 les 3 et 4 août (A. Le Nevé) puis 4 le 7 septembre (J. Pourreau & LPO 44) et 1 le 20 octobre (G. Rault et al.).

Migration pré-nuptiale : 2 le 25 avril, 3 le 28, et jusqu'à 5 les 29 et 30 (A. Le Nevé). Le dernier de la saison est noté le 28 mai (A. Le Nevé).

TOURNEPIERRE À COLLIER *Arenaria interpres* (359/54)

Ce limicole est présent toute l'année. Il est observé du 3 août au 8 juillet. Le 29 avril, 334 individus constituent le nombre le plus important rapporté sur Hoedic depuis celui de 210 le 22 octobre 2002 (G. Rault et al. (bis)).

Ce sont sans doute les récents efforts de comptage sur cette espèce qui permettent d'obtenir chaque année depuis 2001 un nouvel effectif maximum.

Migration post-nuptiale : 62 le 3 août (A. Le Nevé), jusqu'à 160 le 23 octobre (G. Rault et al.).

Hivernage : maximum de 100 le 26 décembre et noté jusqu'au 29 (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 190 le 25 avril, 286 le 28, 334 le 29, 261 le 1^{er} mai, encore 71 le 31 mai (A. Le Nevé) et 2 le 8 juillet (V. Le Féon).

BÉCASSEAU MAUBÈCHE *Calidris canutus* (51/6)

L'espèce est notée pour la seconde fois en hiver depuis 1 individu le 31 décembre 1996 (G. Rault).

Migration post-nuptiale : 1 le 16 octobre au Beudé (J. Jean-Baptiste et al.).

Hivernage : 1 le 26 et 3 le 28 décembre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 1 le 2 mai (A. Le Nevé), 2 le 7 et 3 le 8 (L. Spanneut).

BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (326/43)

Observé du 3 août au 31 mai. L'effectif maximum est de 200 individus les 7 et 8 mai.

Migration post-nuptiale : 15 individus le 3 août (A. Le Nevé) et jusqu'à 52 le 23 octobre (É. Lapous) et 50 le 27 octobre (G. Rault et al.).

Hivernage : présent du 26 au 29 décembre avec un chiffre maximum de 39 individus le 29 (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 30 le 25 avril, 56 le 27, 81 le 29 et 175 le 30 (A. Le Nevé), puis 200 individus les 7 et 8 mai (L. Spanneut). Encore 36 individus le 31 mai (A. Le Nevé).

BÉCASSEAU MINUTE *Calidris minuta* (28/3)

Migration post-nuptiale : 1 le 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.) et 1 le 20 octobre (G. Rault et al.).

Migration pré-nuptiale : 1 le 27 avril à Lann er Hoz Plat (A. Le Nevé).

BÉCASSEAU VIOLET *Calidris maritima* (73/18)

Ce bécasseau est observé du 23 octobre au 8 mai. Le maximum est de 26 oiseaux le 25 avril.

Migration post-nuptiale : 1 individu le 23 octobre (G. Rault et al.).

Hivernage : 3 le 26 décembre et 4 les 28 et 29 (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 26 le 25 avril, encore 24 le 30 (A. Le Nevé) et 5 le 8 mai (L. Spanneut).

BÉCASSEAU VARIABLE *Calidris alpina* (304/43)

Cette espèce est observée du 3 août au 31 mai. L'effectif maximum est de 80 individus les 7 et 8 mai (L. Spanneut) ce qui représente le nombre le plus important depuis 67 individus le 13 août 1991 (A. Le Nevé).

Migration post-nuptiale : 18 le 3 août (A. Le Nevé), 2 le 7 septembre et 4 le 5 octobre (J. Pourreau & LPO 44) puis entre 1 et 4 du 17 au 26 octobre (G. Rault et al.).

Hivernage : noté du 26 au 29 décembre avec un maximum de 7 individus le 28 (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 2 le 25 avril, 6 le 26, 19 le 27, 31 le 29, 38 le 30 (A. Le Nevé) et 80 les 7 et 8 mai (L. Spanneut). Encore 20 le 31 mai (A. Le Nevé).

GRAND LABBE *Stercorarius skua* (31/1)

Un le 16 octobre au rocher du Madavoar (J. Jean-Baptiste et al.).

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus* (15/1)

Un individu forme sombre le 4 avril à la Pointe du Vieux Château (A. Le Nevé).

GOÉLAND CENDRÉ *Larus canus* (24/2)

Deux immatures sont observés le 20 octobre et 1 adulte le 24 octobre (G. Rault et al.).

Ce goéland est peu fréquent et toujours observé en petit nombre malgré la présence de l'espèce dans les estuaires voisins du Morbihan comme par exemple 50 le 12 septembre 1999 en rivièr de Pénérif (Maout & Mauvieux, 2004).

GOÉLAND MARIN *Larus marinus* (34/10)

L'espèce est commune mais peu notée dans les carnets des naturalistes.

L'effectif maximum est de 42 individus le 31 mai (A. Le Nevé). Pas de reproduction observée.

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoideus* (0/1)

Un immature 1^{er} ou 2^{ème} hiver parmi de nombreux goélands qui suivent un chalutier longeant Beg Lagad, le 28 avril (A. Le Nevé).

Première observation de cette espèce à Hoedic. Observation soumise à homologation nationale.

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus* (31/18)

Parmi les chiffres les plus importants on peut noter 461 le 3 août (A. Le Nevé), 240 le 20 octobre (G. Rault et al.) et 512 le 31 mai (A. Le Nevé). Les effectifs comptés le 3 août et le 31 mai sont les plus importants observés sur Hoedic.

Nidification : 1 couple cantonné et territorial fin avril sur les toits du Paluden (indice C4) (A. Le Nevé), 6-11 adultes couvent sur Kasperakis les 28 et 30 mai (J.P. Le Palmec & A. Le Nevé) (indice D13), 30 nids contiennent des œufs le 28 mai à la Pointe du Vieux Château

(indice D15) et 10 adultes sont en position d'incubation le 30 mai sur le Grand Mulon (indice D13) (A. Le Nevé).

La population reproductrice sur Hoedic est donc estimée à 46-51 couples nicheurs.

GOÉLAND LEUCOPHÉE *Larus michahellis* (5/5)

L'année 2003-2004 offre un bon cru d'observation pour cette espèce habituellement peu notée.

Un adulte le 20 octobre et 1 individu les 22 et 23 (G. Rault et al.) puis 2 adultes le 8 mai au Port de la Croix (A. Le Leuxhe & D. Plazanet) et 1 adulte le 30 mai à Beg er Faut (A. Le Nevé).

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus* (50/15)

Ce Laridé est commun mais peu noté.

A signaler un groupe remarquable de 325 individus le 3 août (A. Le Nevé) et qui constitue un record depuis 300 le 13 octobre 2002 (J. Jean-Baptiste et al. (bis)).

Pas de reproduction mentionnée mais l'espèce est présente sur le littoral en avril et mai.

Individus bagués :

- 1 immature 1^{er} hiver trouvé mort le 2 octobre 2003 et bagué poussin le 6 juillet 2003 à Zeebrugge en Belgique (numéro de bague : L102643) ;
- 1 immature 1^{er} été le 31 mai 2004 (bague couleur bleu clair à code noir Y042) bagué en Islande mais la date, le lieu exacte et l'âge de l'oiseau au moment du baguage ne sont pas disponibles actuellement.

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus* (268/16)

L'espèce est observée du 3 août au 28 avril. L'effectif maximum est de 42 individus le 19 octobre (A. Le Nevé).

Migration post-nuptiale : 30 le 3 août, 42 le 19 octobre (A. Le Nevé) et 6 le 27 octobre (G. Rault et al.).

Hivernage : contactée du 26 décembre au 29 décembre avec un maximum de 29 individus le 26 décembre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 8 le 28 avril en vol au-dessus du Fort (C. Barbraud, J. Judas, A. Le Nevé).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Larus melanocephalus* (12/2)

Un juvénile le 2 août dans le Port de l'Argol (A. Le Nevé) et 2 individus le 25 octobre (G. Rault et al.).

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus* (40/3)

Présente en automne et en hiver avec un effectif maximum de 13 individus le 29 décembre.

Migration post-nuptiale : 1 adulte le 19 octobre sur le Lagunage et 1 en vol au-dessus de la Lande du Menhir Nord (A. Le Nevé).

Hivernage : 13 (8 adultes et 5 immatures) le 29 décembre au Port de la Croix (A. Le Nevé).

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (92/6)

Notée en août, en décembre et en avril. Le nombre le plus important est de 23 individus le 26 décembre.

Migration post-nuptiale : 2 le 2 août (A. Le Nevé).

Hivernage : présence de l'espèce du 26 au 29 décembre avec un effectif maximum de 23 individus le 26 (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 4 le 30 avril dans le passage des Soeurs (A. Le Nevé).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (339/25)

Cette sterne est observée du 4 août au 29 mai avec un maximum est de 60 individus le 30 avril.

Migration post-nuptiale : 10 le 4 août (A. Le Nevé), 8 les 22 et 23 octobre (G. Rault† et al.) pour les effectifs les plus importants.

Hivernage : présence notée du 26 au 29 décembre ; jusqu' 6 individus le 26 (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 44 le 26 avril, 56 le 28, 60 le 30 et 31 individus le 1^{er} mai. Encore 1 le 29 mai (A. Le Nevé).

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo* (47/7)

Cette sterne est observée en août, en octobre, en avril et en mai. L'effectif maximum est de 27 individus le 29 avril.

Migration post-nuptiale : 4 le 2 août dans le Passage des Soeurs (A. Le Nevé), 1 individu les 23 et 24 octobre dans le Port de l'Argol (É. Lapous, G. Rault† et al.).

Migration pré-nuptiale : 3 le 26 avril et 27 le 29 au Port de la Croix, puis 1 le 1^{er} mai à Portz Guen (A. Le Nevé).

STERNE NAINE *Sterna albifrons* (16/1)

Quatre individus le 29 avril au Port de la Croix (A. Le Nevé).

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger* (9/1)

Trois le 30 avril dans le Passage des Soeurs (A. Le Nevé).

GUILLEMOT DE TROÏL *Uria aalge* (70/9)

Présent du 26 décembre au 31 mai. L'effectif maximum est de 6 individus le 28 avril.

Hivernage : 3 sont observés autour d'Hoedic, Passage des Soeurs inclus, du 26 au 29 décembre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 1 le 25 avril, 6 le 28 à Beg Lagad (A. Le Nevé), 1 le 7 mai dans le Port de l'Argol (L. Spanneut) et peut-être le même les 28 et 31 dans le Port de l'Argol (A. Le Nevé).

PINGOUIN TORDA *Alca torda* (89/6)

Cet Alcidé est présent du 21 octobre au 28 décembre. L'effectif maximum simultanée dans une journée est de 6 individus les 26 et 27 décembre.

Hivernage : environ 10 individus sont présents autour d'Hoedic, Passage des Sœurs inclus, du 25 au 28 décembre (A. Le Nevé).

MERGULE NAIN *Alle alle* (0/1)

Un individu est observé posé sur l'eau à la Pointe du Vieux Château le 4 novembre (E. Gfeller).

Première observation de cette espèce à Hoedic.

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas* (26/8)

Ce Colombidé est peu fréquent à Hoedic. Avec 8 données, l'année 2003-2004 est celle qui en fournit le plus : 11 individus le 13 octobre (J. Jean-Baptiste *et al.*), puis 10 le 18 octobre (É. Lapous & A. Le Nevé), et 1 à 4 oiseaux du 22 au 28 (G. Rault *et al.*).

PIGEON RAMIER *Columba palumbus* (253/42)

L'espèce est observée du 3 août au 30 mai. Le nombre le plus important est de 26 individus le 18 octobre (A. Le Nevé).

Migration post-nuptiale : 19 le 3 août, 26 le 18 octobre (A. Le Nevé), 20 les 20 et 22 octobre et 2 le 28 (G. Rault *et al.*).

Hivernage : 2 dans les Jardins le 29 décembre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 22 les 25 et 28 avril, 16 le 2 mai, 10 le 27 mai et 2 le 30 (A. Le Nevé).

Nidification : elle est vraisemblablement sous estimée. Un couple fréquente un nid le 28 avril à l'ancien phare (indice D13) (A. Le Nevé) et 1 couple est cantonné au Fort le 29 avril (indice C3) (S. Gautier & B. Iliou).

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur* (143/22)

Observée du 25 avril au 31 mai. L'effectif maximum est de 25 individus le 30 avril.

Migration pré-nuptiale : 1 le 25 avril à Parkeu Meing, 13 le 27 (S. Gautier & A. Le Nevé), 25 le 30, 23 les 1^{er} et 2 mai (A. Le Nevé), 12 le 12 mai (L. Spanneut), 20 le 28 mai (A. Le Nevé).

Nidification : 2 mâles chantent le 27 mai au Fort et dans les Jardins (indice B2) (A. Le Nevé).

TOURTERELLE TURQUE *Streptopelia decaocto* (126/23)

La Tourterelle turque doit être présente toute l'année mais elle n'est notée que du 18 octobre au 31 mai. L'effectif maximum est de 12 individus le 26 avril.

Hivernage : 2 le 27 décembre dans le Village (A. Le Nevé).

Nidification : 1 couple dont le mâle chante le 28 mai dans le Village (indice C3) (A. Le Nevé).

COUCOU GRIS *Cuculus canorus* (112/24)

L'espèce est notée du 5 avril au 31 mai. L'effectif maximum est de 4 individus les 28 et 29 mai.

Migration pré-nuptiale et reproduction : le 1^{er} Coucou gris est entendu le 5 avril (J.P. Le Palmec), 2 mâles et 1 femelle sont observés ensemble le 25 avril et le 28 mai (indice C4) (A. Le Nevé). Encore 2 chanteurs le 31 mai (A. Le Nevé).

HIBOU MOYEN-DUC *Asio otus* (10/1)

Un Hibou moyen-duc est observé le 13 octobre dans le Village (J. Jean-Baptiste et al.).

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (17/3)

Migration post-nuptiale : 1 le 15 octobre à la Décharge (J. Jean-Baptiste et al.), 1 le 20 octobre au Lenn Vihan (R. Allanic) et 1 le 21 octobre dans le Grand Marais (G. Rault† et al.).

MARTINET NOIR *Apus apus* (154/21)

Observé les 3 et 4 août puis du 25 avril au 30 mai. Le nombre le plus important est de 180 individus le 3 août.

Migration post-nuptiale : 180 le 3 août et 20 le 4 août (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : le premier est contacté le 25 avril, 65 le 29 avril et 11 le 28 mai (A. Le Nevé) pour les effectifs les plus importants.

Nidification : le 1^{er} mai 1 couple fréquente le nid de 2003 dans le Village (indice C6) (A. Le Nevé).

MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis* (84/18)

L'espèce est observée du 3 août au 28 octobre. L'effectif maximum est de 3 individus les 20 et 21 octobre.

Migration post-nuptiale : 1 le 3 août à Beg er Faut (A. Le Nevé), 1 le 21 septembre et 1 le 5 octobre (J. Pourceau & LPO 44) puis 1 à 3 du 17 au 28 octobre (A. Le Nevé, G. Rault† et al.).

**HUPPE FASCIÉE *Upupa epops* (48/1)**

La Huppe n'est contactée qu'une fois au passage pré-nuptial : 1 individu le 26 avril au Fort (F. Hémery).

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla* (34/3)

Migration post-nuptiale : 1 le 21 septembre (W. Maillard), 1 les 12 et 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.).

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* (17/1)

Remarquable observation d'un oiseau (vraisemblablement de la sous-espèce *brachydactyla* d'Europe du sud-ouest et d'Afrique du Nord) le 2 mai. Il est observé longuement à Parkeu Meing se nourrissant à terre sur l'herbe rase pâturée par les chevaux (A. Le Nevé).

L'espèce n'avait plus été vue depuis 1 individu les 1^{er} et 2 octobre 1994 (G. Rault) et depuis la reproduction de l'espèce dans les années 1970 (Nicolau-Guillaumet, 1975 ; anonyme, in Annézo 1976).

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis* (232/23)

Notée du 17 octobre au 30 mai, mais est vraisemblablement présente toute l'année sur Hoedic malgré l'absence de données lors l'été 2003. L'effectif maximum est de 44 individus le 20 octobre.

Migration post-nuptiale : 15 le 17 octobre (É. Lapous), 44 le 20 octobre (A. Le Nevé) et 30 le 28 (G. Rault et al.).

Hivernage : 1 le 26 décembre à Beg er Faut (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale et reproduction : 1 mâle chanteur du 25 avril au 30 mai à Portz Guen et aux Réservoirs (indice B2) (A. Le Nevé).

ALOUETTE LULU *Lulula arborea* (22/10)

Nombreuses observations d'Alouette lulu du 17 au 28 octobre 2003. Cette alouette peu commune à Hoedic a toujours été observée en octobre, à l'exception d'une fois en août 1974.

Migration post-nuptiale : 1 individu les 17, 18, 20 et 21 octobre (J. Jean-Baptiste et al. ; A. Fossé & F. Halligon ; A. Le Nevé, G. Rault et al.), puis 14 individus le 24 octobre, 5 le 25 et 2 à 3 jusqu'au 28 (É. Lapous ; G. Rault et al.).

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia* (157/6)

Cette hirondelle a été peu notée en 2003-2004 malgré sa reproduction certaine en deux points de l'île. Elle est observée une fois en migration post-nuptiale et du 25 avril au 30 mai. L'effectif maximum est de 26 individus le 26 avril.

Migration post-nuptiale : 9 le 21 octobre (G. Rault et al.).

Nidification : 26 individus le 26 avril fréquentent des terriers dans la dune du Port de la Croix (indice D11), 8 individus sont trouvés devant une dizaine de terriers qui semblent occupés sur 22-25 creusés à la Pointe du Vieux Château le 28 mai (indice D13) et 22 individus sont observés avec transport de sacs fécaux, devant 14 terriers fréquentés dans la dune du Port de la Croix le 30 mai (indice D14) (A. Le Nevé). Estimation : ± 25 couples nicheurs.

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica* (163/16)

L'espèce est notée du 14 au 25 octobre, puis du 17 mars au 29 mai (défaut d'observation par la suite). L'effectif maximum est de 30 individus le 28 mai (A. Le Nevé).

Migration post-nuptiale : à noter 15 le 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.) et 18 le 21 octobre (É. Lapous & A. Le Nevé ; G. Rault et al.).

Nidification : un comptage partiel rend compte de 5 nids occupés dans le Village et 1 nid au Paluden (indice D13) (A. Le Nevé).

HIRONDELLE DE FENÊTRE *Delichon urbica* (80/11)

L'Hirondelle de fenêtre est observée du 14 au 24 octobre, puis du 26 avril au 29 mai. Le nombre le plus important est de 12 individus le 28 avril (A. Le Nevé).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis* (126/36)

Commun à Hoedic, il y est observé toute l'année. L'effectif maximum est de 50 individus le 21 octobre (G. Rault et al.).

Hivernage : observé quotidiennement du 26 au 29 décembre avec un maximum de 48 individus le 27 décembre dispersés sur l'ensemble de l'île (A. Le Nevé).

Nidification : 19 à 21 chanteurs sont repérés entre fin avril et fin mai. Par ailleurs, 1 couple couvant 1 nid contenant 4 œufs et trouvé le 25 avril aux Réservoirs (indice D15), 1 adulte transporte de la nourriture le 27 avril à Portz Guen (indice D14), 1 autre transporte des matériaux aux Réservoirs de même qu'un semble construire à la Pointe du Vieux Château le 28 mai (indice C9), 1 adulte avec 1 juvénile récemment envolé au Gadouere et 1 autre au Port de l'Argol le 28 mai (indice D12) (A. Le Nevé). Par ailleurs, l'effectif maximum est de 29 individus le 28 mai.

PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni* (1/1)

Un le 20 octobre dans la Prairie du Fort (G. Rault et al.).

Deuxième observation sur l'île de cette espèce rarissime en France, après celle d'un individu dans les années 1980 (G. Gélinaud, comm. pers.). Donnée homologuée par le CHN (Frémont & le CHN, 2005).

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis* (75/11)

Ce pipit est observé le 17 octobre, puis du 24 avril au 9 mai. Le plus grand nombre a été de 5 individus le 30 avril.

Migration post-nuptiale : 1 le 17 octobre dans la Prairie du Fort (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 2 le 27 avril dans le Village, 2 le 29, 5 le 30, 2 le 1^{er} mai, 3 le 2 (A. Le Nevé) et 3 le 9 à Port l'Eglise (L. Spanneut).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta* (15/12)

L'effectif maximum est de 6 individus les 24 et 26 octobre ce qui représente le chiffre le plus important depuis 3 individus le 26 octobre 1997 dans la Carrière (P.J. Dubois et al.).

Migration post-nuptiale : 1 le 17 octobre, 2 le 18 au Lagunage (A. Le Nevé), maximum de 6 les 24 et 26 octobre et encore 2 le 28 (G. Rault et al.).

Deuxième année record avec 12 données après 2002 – 2003 qui totalisait déjà 8 données.

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* (97/32)

Le Pipit maritime est présent toute l'année. L'effectif maximum est de 50 individus le 27 octobre ce qui représente le nombre le plus important depuis 17 individus le 12 novembre 1994 (A. Le Nevé).

Migration post-nuptiale : 30 le 23 octobre et 50 le 27 octobre (G. Rault et al.) sur l'ensemble de l'île pour les chiffres les plus importants.

Hivernage : jusqu'à 10 individus le 29 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : 1 couple niche aux alentours de la tour sud-ouest du Fort (cantonnement fin avril et transport de nourriture fin mai ; indice D14). Le 28 mai, 23 individus (16 adultes et 7 jeunes volants) sont dénombrés sur l'ensemble du littoral de l'île (donc hors Fort) : 5 couples sont observés à la Pointe du Vieux Château dont 2 avec 1 jeune volant et 1 avec 3 jeunes volants, 1 couple avec 2 jeunes volants est observé au Gadouere (indice D12), et 1 mâle chante au Port de l'Argol. Le 30 mai, 1 nouvel adulte est observé au Port de la Croix transportant des sacs fécaux (indice D14) (A. Le Nevé). Le nombre de couples nicheurs en 2004 est donc estimé à 6-9 couples.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba alba* (232/18)

La sous-espèce type *alba* est observée du 19 au 28 octobre puis du 25 avril au 1^{er} mai. L'effectif maximum est de 15 individus le 27 octobre (G. Rault et al.). Pas d'oiseaux observé en hiver, et aucun indice de reproduction.

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* (46/10)

Cette sous-espèce britannique est contactée du 15 au 28 octobre. L'effectif maximum est de 5 individus le 19 octobre (A. Le Nevé).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (138/10)

La sous-espèce type *flava* est uniquement présente en migration pré-nuptiale. Elle est observée du 25 avril au 1^{er} mai. L'effectif maximum est de 3 individus le 25 avril (A. Le Nevé).

Bergeronnette « centratlantique » *Motacilla flava flava x iberiae* : 1 mâle de cette forme intermédiaire entre la Bergeronnette printanière type et la Bergeronnette ibérique *Motacilla flava iberiae* (Dubois, 2001) est observé le 1^{er} mai à Parkeu Meing en compagnie d'autres Bergeronnettes printanières de sous-espèces différentes (A. Le Nevé).

La Bergeronnette « centratlantique » niche sur la façade atlantique française.

Bergeronnette flavéole *Motacilla flava flavissima* : 1 mâle de cette sous-espèce provenant des îles britanniques et des côtes françaises de la Manche, est observé le 25 avril puis un autre le 1^{er} mai (A. Le Nevé) aux pieds des chevaux à Parkeu Meing.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea* (45/3)

Cette bergeronnette n'est observée qu'en migration post-nuptiale : 1 les 17 et 18 octobre au Lagunage (É. Lapous & A. Le Nevé), 2 le 19 dans le Grand Marais (A. Larousse & A. Le Nevé).

TROGLODYTE MIGNON *Troglodytes troglodytes* (75/41)

Cette espèce commune sur Hoedic a été fortement notée cette année grâce aux captures effectuées lors des programmes de baguage. L'effectif maximum est de 18 individus le 27 octobre (R. Musseau et al.).

Malgré cela aucune preuve de reproduction n'est rapportée, ce qui correspond en toute logique à un défaut de prospection.

ACCENTEUR MOUCHET *Prunella modularis* (121/48)

Comme le Troglodyte, l'Accenteur mouchet est bien mentionné en 2003-2004 grâce aux programmes de baguage. L'effectif maximum est de 9 individus le 21 octobre (G. Rault et al.).

Nidification : 1 adulte accompagné d'un jeune volant sont observés le 28 mai à Parkeu Meing (indice D12) et 1 adulte transportant de la nourriture est noté le 29 mai dans le Vallon de la Décharge (indice D14) (A. Le Nevé).

Individus bagués :

- 1 individu capturé le 24 octobre était porteur d'une bague norvégienne (G. Rault† et al.) mais il n'y a pas plus d'information disponible sur la date et le lieu précis de baguage.

ROUGEGORGE FAMILIER *Erithacus rubecula* (509/94)

Espèce observée toute l'année dont les programmes de baguage fournissent l'essentiel des données. L'effectif maximum est de 17 individus le 17 et le 27 octobre (R. Musseau et al.).

Migration post-nuptiale : noté du 17 au 31 octobre dont 17 le 17 et 16 le 18 (A. Le Nevé), 15 le 26, 17 le 27 et 13 le 28 ((G. Rault† et al. ; R. Musseau et al.).

Hivernage : 2 par jour du 26 au 29 décembre correspondant au moins à 6 oiseaux différents (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 1 individu observé 7 fois entre le 25 avril et le 31 mai dont 2 chanteurs, cf. nidification ci-après (A. Le Nevé).

Nidification : au moins 2 jeunes récemment envolés du 2 au 4 août dans les Jardins (indice D12) puis 1 chanteur le 2 mai et le 31 mai dans les Jardins (indice B2) (A. Le Nevé).

ROSSIGNOL PHILOMÈLE *Luscinia megarhynchos* (8/4)

Migration pré-nuptiale : 1 du 26 au 29 avril au Bois (B. Iliou, A. Le Nevé) et 1 le 30 au Paluden (A. Le Nevé).

GORGEBLEUE À MIROIR *Luscinia svecica* (11/1)

Migration post-nuptiale : 1 le 14 octobre au Lenn Vihan (J. Jean-Baptiste et al.).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus* (116/12)

Ce rougequeue est observé du 6 septembre au 24 octobre, puis le 25 avril. L'effectif maximum est de 7 individus le 14 octobre ce qui est le chiffre le plus important observé sur Hoedic, également noté le 16 octobre 1999 (G. Rault†).

Migration post-nuptiale : les effectifs les plus importants sont 1 femelle et 1 immature le 6 septembre dans la Lande du Menhir Sud (Y. Jacob), 7 le 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.), et 3 le 20 octobre (A. Le Nevé ; G. Rault† et al.).

Migration pré-nuptiale : 1 femelle le 25 avril à Portz Guen (A. Le Nevé).

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros* (247/19)

L'espèce est observée du 17 octobre au 28 octobre, puis du 30 avril et 1^{er} mai. L'effectif maximum est de 10 individus les 20 et 21 octobre.

Migration post-nuptiale : 1 le 17 octobre, 9 le 18, 10 les 20 et 21 et encore 6 le 28 (A. Le Nevé ; G. Rault† et al.).

Migration pré-nuptiale : 1 le 30 avril à Portz Guen et 1 mâle le 1^{er} mai à Lann er Hoz Plat (A. Le Nevé).

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe* (534/33)

Contacté 3 août au 28 octobre, puis du 25 avril au 2 mai. L'effectif maximum est de 32 individus le 30 avril.

Migration post-nuptiale : 1 le 3 août et 3 le 4 (A. Le Nevé), 5 le 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.) puis 1 à 2 individus du 20 au 28 octobre (É. Lapous ; A. Le Nevé ; G. Rault† et al.).

Par ailleurs, 1 individu de la sous-espèce *leucorhoa* du Groenland est observé le 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.).

Migration pré-nuptiale : 15 le 25 avril, 6 le 28, 32 le 30 et 6 le 2 mai (A. Le Nevé).

Nidification : aucun indice.

TARIER DES PRÉS *Saxicola rubetra* (210/8)

Noté du 14 au 26 octobre, puis le 2 mai. Maximum de 2 individus les 14 et 16 octobre et le 2 mai.

Migration post-nuptiale : 2 les 14 et 16 octobre (J. Jean-Baptiste et al.), 1 les 17, 18, 21 et 26 octobre (A. Fossé & F. Halligon ; É. Lapous ; A. Le Nevé ; G. Rault† et al.).

Migration pré-nuptiale : 1 mâle et 1 femelle le 2 mai (A. Le Nevé).

TARIER PÂTRE *Saxicola torquata* (292/36)

Observé toute l'année. Le chiffre le plus important est de 25 individus le 23 octobre.

Migration post-nuptiale : les plus forts effectifs concernent 11 individus le 20 octobre, 14 le 21 (É. Lapous ; A. Le Nevé), 20 le 22, 25 le 23 et 10 le 24 (G. Rault† et al.).

Hivernage : 1 femelle du 27 décembre à Portz Guen (A. Le Nevé).

Nidification : 1 jeune récemment envolé le 3 août 2003 à Parkeu Meing (indice D12) puis 1 couple transporte de la nourriture le 25 avril au même endroit et 1 autre le 27 avril aux Réservoirs (indice D14) (A. Le Nevé). Le 8 mai, 1 couple nourrit 2 jeunes récemment envolés au Lenn Vihan (indice D12) (L. Spanneut) et 3 jeunes volants sont observés dans 3 points différents de l'île du 27 au 30 mai (indice D12) (A. Le Nevé). Estimation en 2004 : au moins 3 couples nicheurs.

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos* (261/70)

L'espèce est notée du 13 octobre au 30 mai. L'effectif maximum est d'environ 1 000 individus le 13 octobre ce qui représente le nombre le plus important depuis 300 individus le 22 octobre 1995 (M. Duquet & J-Y. Frémont).

Migration post-nuptiale : notée du 13 au 31 octobre dont 1 000 individus le 13 octobre (J. Jean-Baptiste et al.), 123 le 18 octobre (A. Le Nevé), 100 le 19 et 87 le 20 (G. Rault† et al.).

Hivernage : 3 oiseaux différents sont observés du 26 au 28 décembre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 4 le 6 avril (A. Le Nevé).

Nidification : 7-9 chanteurs de fin avril à fin mai (indice C4) et 1 nid contenant 2 œufs et 2 poussins fraîchement éclos le 28 avril (indice D16) (D. & A. Le Nevé), 1 jeune récemment envolé dans le Village le et 1 adulte transportant de la nourriture dans le Vallon de la Décharge le 29 mai (indice D14) (A. Le Nevé).

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus* (87/17)

Cette grive est rencontrée du 14 au 29 octobre. L'effectif maximum est de 100 individus le 14 octobre ce qui représente le chiffre le plus fort depuis 51 le 1^{er} novembre 1989 (G. Rault†).

Migration post-nuptiale : 100 le 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.), 10 les 19 et 20 octobre (A. Le Nevé) et 31 le 27 (G. Rault† et al. ; R. Musseau et al.).

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus* (28/7)

L'espèce n'est observée qu'en migration post-nuptiale, du 20 au 27 octobre. Deux individus du 20 au 22 octobre représentent l'effectif maximum (É. Lapous ; A. Le Nevé ; G. Rault† et al.).

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris* (57/19)

La Grive litorne est contactée du 13 au 28 octobre, puis du 26 au 28 avril. L'effectif maximum est de 100 individus le 13 octobre ce qui représente le nombre le plus important depuis 28 le 8 novembre 1993 (G. Rault†).

Migration post-nuptiale : un groupe de 100 le 13 octobre (J. Jean-Baptiste et al.), 26 le 18 à Parkeu Meing (A. Le Nevé), 30 le 22 et encore 15 le 28 (G. Rault† et al.).

Migration pré-nuptiale : 2 du 26 au 28 avril au Fort (C. Barbraud, J. Judas, A. Le Nevé).

MERLE NOIR *Turdus merula* (141/100)

Un des oiseaux les plus communs sur Hoedic et présent toute l'année bien qu'il ne soit noté que du 20 au 31 octobre puis du 27 au 29 avril. C'est aussi une espèce très peu notée par les observateurs. Le grand nombre de données provient des captures de baguage avec un maximum de 23 individus le 27 octobre (R. Musseau et al.).

Nidification : pas notée faute d'attention (nicheur certain en 2003).

MERLE À PLASTRON *Turdus torquatus* (74/21)

Passage impressionnant de l'espèce du 14 au 27 octobre, puis 1 le 1^{er} mai. L'effectif maximum est de 30 individus le 14 octobre alors que l'île enregistre une forte migration de Turdides. Ce nombre est le plus important depuis 11 individus le 18 avril 1973 (in Annézo, 1976).

Migration post-nuptiale : 30 le 14 octobre (J. Jean-Baptiste et al.), 5 le 17 et 8 le 18 (É. Lapous ; A. Le Nevé), 14 le 20 (D. Cohez ; É. Lapous ; A. Le Nevé), puis les effectifs déclinent. Encore 1 le 27 octobre (G. Rault† et al.).

Migration pré-nuptiale : 1 femelle le 1^{er} mai à Port l'Église (A. Le Nevé).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin* (149/9)

Contactée les 2 et 3 août puis du 27 avril au 9 mai.

Présence estivale : 1 mâle chanteur est observé les 3 et 4 août 2003 au même endroit que celui présent du 22 avril au 9 juin de la même année (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 1 chanteur le 27 avril dans les Jardins (A. Le Nevé), 1 le 29 (B. Iliou), 1 le 30 au Paluden et 2 dont 1 chanteur au Lenn Chipont le 1^{er} mai (A. Le Nevé), enfin 2 le 9 mai (L. Spanneut).

FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (1/5)

Observation remarquable d'un immature 1^{er} hiver peu farouche, présent du 22 au 27 octobre dans les Jardins (É. Lapous ; G. Rault et al.).

Deuxième mention de la Fauvette épervière à Hoedic. Donnée homologuée par le CHN (Frémont & le CHN, 2005).

Rappel de la mention précédente : 1 immature 1^{er} hiver le 22 octobre 1995 (M. Duquet & J-Y. Frémont).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE *Sylvia atricapilla* (277/86)

L'espèce est observée du 17 au 31 octobre, puis du 25 avril au 30 mai. L'effectif maximum est de 17 individus les 27 octobre. De nombreuses données proviennent des captures de baguage.

Migration post-nuptiale : 12 le 21 octobre (Y. Kayser ; A. Le Nevé), 10 le 26 et 17 le 27 (R. Musseau et al. ; G. Rault et al.).

Pas d'hivernage observé.

Migration pré-nuptiale : 3 le 25 avril (A. Le Nevé), 5 le 27 (B. Iliou), 4 les 1^{er}, 2 et 27 mai (A. Le Nevé) dont quelques chanteurs qui pourraient être aussi des nicheurs (cf. nidification ci-après).

Nidification : 4-5 mâles chanteurs de fin avril à fin mai (indice B2) (A. Le Nevé).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (7/5)

Un individu est présent du 19 au 23 octobre entre le Bois et le Village (É. Lapous ; A. Le Nevé ; G. Rault et al.).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis* (299/55)

Observée le 3 août et le 17 octobre puis du 25 avril au 31 mai. Un recensement des mâles chanteurs est mené en avril et en mai.

Migration post-nuptiale : 3 le 3 août (A. Le Nevé) et 1 le 17 octobre (J. Jean-Baptiste et al.).

Migration pré-nuptiale : la première donnée provient de 6 chanteurs le 25 avril (A. Le Nevé) mais il n'y avait pas d'observateurs avant cette date.

Nidification : 37-46 chanteurs sont dénombrés du 25 avril au 2 mai, puis du 27 au 31 mai (indice C4). Par ailleurs le 28 mai, 1 individu transporte des matériaux au Grand Marais (indice C9), 1 femelle apporte de la nourriture au Paluden (indice D14) et le 29 mai, 1 mâle transporte des sacs fécaux au Lenn Vihan et 1 femelle transporte également de la nourriture dans la Lande du Menhir Nord (indice D14) (A. Le Nevé).

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (158/19)

La Fauvette pitchou a été observée à chaque saison sur Hoedic. Peu notée par les observateurs en raison de sa discrétion, la taille de sa population reste difficile à évaluer. Quelques chanteurs furent notés lors du comptage de la Fauvette grisette en juin.

Nidification : 5 chanteurs fin avril et fin mai et 1 jeune récemment envolé accompagné de 2 autres individus non vus le 29 mai dans le Vallon de la Décharge (indice D12) (A. Le Nevé).

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus* (106/9)

Cette espèce est observée le 17 octobre, puis du 24 avril au 27 mai.

Migration post-nuptiale : 1 le 17 octobre dans la Prairie du Fort (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 1 trouvé mort le 28 avril au Fort depuis quelques jours (C. Barbraud, B. Iliou, J. Judas, A. Le Nevé), 2 les 30 avril, 1^{er} et 2 mai (A. Le Nevé), 1 chante le 8 mai dans le Grand Marais (L. Spanneut) et 1 chante au Lenn Chipont le 27 mai (A. Le Nevé).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (89/25)

La Cisticole des joncs est notée du 3 août au 23 octobre et du 25 avril au 30 mai.

Nidification : 2 mâles chanteurs sont présents fin avril, puis 3 début mai et 5 fin mai (indice C4) (A. Le Nevé, L. Spanneut).

LOCUSTELLE TACHETÉE *Locustella naevia* (6/4)

Migration pré-nuptiale : 1 individu chante pendant 5 jours du 28 avril au 2 mai au Paluden dans le même buisson (B. Iliou, A. Le Nevé).

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti* (288/56)

Un des oiseaux les plus abondants de l'île. Il est présent toute l'année. Un grand nombre de données provient des captures de baguage. L'effectif maximum est de 17 individus le 27 octobre (R. Musseau et al.).

Nidification : pas de recensement cette année. Le 3 août 2003, 2 jeunes récemment envolés sont observés au Paluden (indice D12) (A. Le Nevé).

A signaler 51 chanteurs lors d'un comptage partiel du 7 au 9 juin 2003 (A. Le Nevé) et 77 chanteurs en avril 2002 sur l'ensemble de l'île (Iliou & Dérian, 2002).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus* (177/36)

Notée du 3 août au 24 octobre, puis du 25 avril au 30 mai. L'effectif maximum est de 20 chanteurs le 8 mai dans le Grand Marais.

Nidification : 20 chanteurs le 8 mai dans le Grand Marais (L. Spanneut) ainsi que 16 chanteurs sur l'ensemble de l'île du 28 au 30 mai : 14 dans le Grand Marais, 1 au Lenn Chipont et 1 au Lenn Vihan (indice C4) (A. Le Nevé). Le 30 mai dans le Grand Marais, 1 individu transporte de la nourriture (indice D14) (A. Le Nevé).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta* (53/1)

Observée en migration post-nuptiale : 1 immature le 3 août au Paluden (A. Le Nevé).

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus* (294/22)

L'espèce est observée du 3 août au 27 octobre, puis du 25 avril au 9 mai. L'effectif maximum est de 4 individus le 9 mai.

Migration post-nuptiale : 3 le 3 août (A. Le Nevé), puis 11 observations de 1 individu du 14 au 27 octobre (J. Jean-Baptiste et al. ; É. Lapous ; A. Le Nevé ; G. Rault et al.).

Migration pré-nuptiale : 1 le 25 avril, 2 les 30 avril, 1^{er} et 2 mai dont 1 *acredula* le 1^{er} mai (A. Le Nevé) et 4 le 9 mai (L. Spanneut).

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita* (690/142)

Le Pouillot véloce est vraisemblablement une des espèces les plus capturées en baguage. Il est observé toute l'année. Le nombre le plus important est de 37 individus le 18 octobre (A. Le Nevé).

Deux *abietinus* sont notés : 1 le 21 octobre au Lenn Vihan (A. Le Nevé) et 1 le 28 (G. Raultt et al.).

Hivernage : 6-7 oiseaux les 26 et 27 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : 9 chanteurs sont dénombrés fin avril, puis 15 chanteurs le sont fin mai (indice C4) (A. Le Nevé). La population de mâles chanteurs peut être estimée à 15-17 individus.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (18/12)

L'effectif maximum quotidien est de 4 oiseaux le 14 octobre et 6-8 oiseaux différents fréquentent l'île du 12 au 28 octobre.

Migration post-nuptiale : 2 au Lenn Chipont les 12 et 13 octobre et 1 à la Décharge le 13, puis 4 au Lenn Chipont le 14 octobre, 1 au Bois et 1 dans le Grand Marais le 15, 1 au Lenn Chipont le 16 (J. Jean-Baptiste et al.) ce qui totalisent 4-6 individus selon que l'on considère les oiseaux de la Décharge et du Bois comme différents ou pas de ceux du Lenn Chipont.

Puis, 1 dans le Village du 18 au 20 octobre et 1 dans le Grand Marais les 27 et 28 (R. Musseau et al. ; É. Lapous ; A. Le Nevé ; G. Raultt et al.).

Seules les observations des individus des 18-20 et 27-28 octobre ont été soumises à homologation nationale et acceptées (Frémont & le CHN, 2005).

L'automne 2003 est témoin d'un afflux sans précédent de cette espèce sibérienne en France qui se place juste derrière l'automne 1988 (Frémont & le CHN, 2005). C'est une **année record** pour Hoedic avec 12 données concernant 6-8 individus différents.

Rappel des précédentes mentions : 1 individu hiverné de l'automne 1988 au 1^{er} avril 1989 (G. Raultt & A. Le Nevé), 1 le 31 octobre (G. Raultt) et 1 les 2 et 3 novembre 1996 (A. Larousse & G. Raultt), 1 les 21 et 22 et 1 autre du 22 au 25 octobre 2000 (Y. Kayser, A. Larousse, G. Raultt), soit 5 individus de 1988 à 2000.

ROITELET HUPPÉ *Regulus regulus* (99/39)

Ce roitelet est observé en migration post-nuptiale, du 17 au 30 octobre. L'effectif le plus important est de 19 individus le 27 octobre.

Migration post-nuptiale : 10 le 21 octobre (A. Le Nevé ; G. Raultt et al.) et 19 le 27 (R. Musseau et al.) pour les chiffres les élevés.

ROITELET À TRIPLE BANDEAU *Regulus ignicapillus* (239/77)

L'espèce est présente du 17 au 31 octobre, en hiver et du 30 avril au 2 mai. L'effectif maximum est de 22 individus le 27 octobre.

Migration post-nuptiale : 19 le 17 octobre, 17 le 18 (É. Lapous ; A. Le Nevé), 20 le 21 (A. Le Nevé ; G. Raultt et al.), 22 le 27 et 19 le 28 (R. Musseau et al.) pour les effectifs les plus forts.

Hivernage : 1 le 28 décembre dans le Grand Marais (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 1 chanteur le 30 avril et le 1^{er} mai dans les Jardins ainsi que le 2 mai au Bois (A. Le Nevé).

GOBEMOUCHE GRIS *Muscicapa striata* (215/12)

Observé le 3 août et le 15 octobre, puis du 26 avril au 9 mai. L'effectif maximum est de 3 individus le 15 octobre et les 1^{er} et 2 mai.

Migration post-nuptiale : 1 le 3 août dans le Village (A. Le Nevé) et 3 le 15 octobre dans le Village (J. Jean-Baptiste et al.).

Migration pré-nuptiale : 1 le 26 avril dans les Jardins, jusqu'à 3 les 1^{er} et 2 mai (A. Le Nevé) et 2 le 9 mai dans le Village (L. Spanneut).

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (10/2)

Comme pour le Pouillot à grands sourcils, l'automne 2003 voit un afflux de Gobemouche nain en France et se place derrière 1995 (Frémont & le CHN, 2005). L'île d'Hoedic n'est pas épargnée par cet afflux puisque 1 à 2 individus sont découverts en octobre : 1 immature le 14 octobre dans le Vallon de la Décharge et 1 immature le 15 octobre au Bois (J. Jean-Baptiste et al.).

Ces deux observations n'ont pas été soumises à homologation nationale.

Rappel des précédentes mentions : 1 immature le 22 octobre 1995 (M. Duquet, F. Frémont, G. Raultt), 1 immature le 21 octobre 1996 (P.J. Dubois, P. Crouzier, G. Sabatier), 1 le 30 octobre 1999 (J. Corbière & G. Dérian), 1 le 30 septembre 2000 (R. Le Nevé), 1 immature le 15 octobre 2000 (J. Pourreau & LPO44), 1 immature le 22 octobre 2000 (G. Raultt), 1 immature le 24 octobre 2000 (Y. Kayser & G. Raultt), 1 mâle adulte les 25 et 26 octobre 2000 (S. Guérin, G. Raultt, G. Sabatier), 1 le 21 octobre 2001 (B. Iliou, F. Pelsy, G. Raultt), soit 9 individus de 1995 à 2001.

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca* (225/5)

Contacté du 2 août au 17 octobre, puis le 30 avril.

Migration post-nuptiale : 1 le 2 août et 2 le 4 (A. Le Nevé), 1 le 17 octobre dans le Village (J. Jean-Baptiste et al.).

Migration pré-nuptiale : 1 femelle le 30 avril dans la prairie du Fort (A. Le Nevé).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE *Parus major* (29/24)

L'effectif maximum est de 6 individus les 24 et 25 octobre. C'est le plus important depuis 5 individus le 31 octobre 1996 (M. Duquet, F. Frémont, B. Gaudemer, G. Raultt).

Migration post-nuptiale : 2 le 21 octobre (E. Gfeller, É. Lapous, A. Le Nevé), 5 les 22 et 23, 6 les 24 et 25 (G. Raultt et al.), encore 5 le 28 et 2 le 31 octobre (R. Musseau et al. ; G. Raultt et al.).

Hivernage : 2 le 27 décembre dans le Bois (A. Le Nevé).

L'espèce est peu commune, mais un afflux a lieu à l'automne 2003 et constitue un record pour Hoedic depuis le dernier en 1996 (23 données). La Mésange charbonnière est observée en hiver pour la seconde fois.

MÉSANGE NOIRE *Parus ater* (44/1)

Une le 22 octobre (É. Lapous).

MÉSANGE BLEUE *Parus caeruleus* (53/8)

Migration post-nuptiale : 1 à 2 individu du 24 au 28 octobre (R. Musseau et al. ; G. Rault† et al.).

Hivernage : 2 les 27 et 28 décembre (A. Le Nevé).

Bien qu'elle ait niché par le passé, la Mésange bleue est peu commune, parfois observée en automne. Cette année, elle est aussi observée en hiver, pour la première fois depuis 1989.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus* (2/13)

Espèce rare à Hoedic, une petite troupe de 9 individus est présente du 26 et 28 octobre (R. Musseau et al. ; G. Rault† et al.) et se fait capturée dans les filets de baguage (d'où le nombre élevé de données).

RÉMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (7/6)

Nombreuses données en octobre 2003. L'effectif maximum est de 3 individus le 27 octobre ce qui est le chiffre le plus important depuis 2 individus le 29 octobre 1997 (P.J. Dubois & J. Gonin) et le 3 novembre 2001 (L. Spanneut).

Migration post-nuptiale : 1 le 20 octobre 2003 à Parkeu Meing (G. Rault†), 1 les 22 et 26 (G. Rault† et al.), 3 le 27 et 1 le 28 (R. Musseau et al. ; G. Rault† et al.).

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris* (0/6)

Observation remarquable d'un individu du 19 au 27 octobre (A. Le Nevé ; G. Rault† et al.).

Première mention de cette espèce à Hoedic. Il s'agissait probablement de la sous-espèce familiaris, originaire de Scandinavie et de l'est de l'Europe. Cette observation a coïncidé avec d'autres sur Ouessant au même moment.

PIE-GRÈCHE ÉCORCHEUR *Lanius collurio* (38/1)

Migration pré-nuptiale : 1 femelle le 29 mai dans le Vallon de la Décharge (A. Le Nevé).

PIE-GRÈCHE À TÊTE ROUSSE *Lanius senator* (15/3)

Migration pré-nuptiale : 1 mâle du 25 au 27 avril à Parkeu Meing (B. Iliou, F. Hémerly, S. Gautier, A. Le Nevé).

PIE BAVARDE *Pica pica* (37/19)

Présente toute l'année à Hoedic, mais peu notée. Néanmoins, 2003 - 2004 fournit de nombreuses données. L'effectif maximum est obtenu le 18 octobre avec 16 individus (A. Le Nevé).

Hivernage : 1 à 3 oiseaux les 27 et 28 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : aucune mention.

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone* (48/15)

L'espèce est observée toute l'année à Hoedic, mais peu notée. Cependant, 2003 - 2004 fournit un nombre relativement élevé de données. Le chiffre le plus important est obtenu le 28 décembre avec 28 individus, comme l'année dernière.

Hivernage : 28 le 28 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : 1 couve sur son nid le 26 avril au Lenn Chipont (indice D13), 1 adulte et 1 jeune aux Réservoirs (indice D12) et 2 gros poussins trouvés morts à Beg Lagad (indice D16) le 28 mai, 3 jeunes le 30 mai dans le Grand Marais (indice D12) (A. Le Nevé).

GRAND CORBEAU *Corvus corax* (77/4)

Observations post-nuptiales : 2 les 27 et 28 septembre dans la Lande du Menhir Sud (R. Le Nevé).

Observations pré-nuptiales : 2 les 27 et 28 avril dans la Carrière et en vol au-dessus du Grand Marais (S. Gautier & B. Guyonnet).

Les oiseaux observés viennent sans doute de Belle-Île.

ÉTOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris* (45/16)

Présent toute l'année à Hoedic, mais peu notée. Néanmoins, 2003 - 2004 fournit de nombreuses données. L'effectif maximum est obtenu le 23 octobre avec 250 individus (G. Rault et al.).

Hivernage : un maximum de 150 individus a été compté le 26 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : le 28 avril, un nid est occupé au Fort (indice D13), le 28 mai, 4 jeunes avec commissures sont observés à Kasperaquiz (indice D12) et le 29 mai, un couple occupe un nid à Port l'Église (indice D13) (A. Le Nevé).

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus* (14/7)

Le loriot est observé du 8 au 31 mai, jusqu'à 3 individus (femelles ou mâles immatures) le 31 mai.

Migration pré-nuptiale : 1 mâle le 8 mai au Fort et 1 le 9 mai aux Blockhaus (L. Spanneut), 1 mâle le 17 mai (J-L. Bossard), 2 mâles immatures chantent les 29 et 30 mai, 3 (femelles ou mâles immatures) sont observés ensembles à la recherche de chenilles de Bombyx cul-brun *Euproctis phaeonhaea*, abondantes dans la Lande du Menhir Sud et sur toute l'île cette année là (A. Le Nevé).

MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus* (30/22)

Une des espèces les plus commune de l'île et présente toute l'année mais peu notée par les observateurs. Cependant, 2003 - 2004 fournit de nombreuses données. L'effectif maximum est de 25 individus ensembles le 3 août (A. Le Nevé).

Hivernage : 5 les 27 et 28 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : le 26 avril, 1 individu transporte des matériaux au Paluden et 1 couple fait de même au Fort le 28 mai (indice C9). Le 30 mai, 1 femelle occupe un nid dans le Village (indice D13) (A. Le Nevé).

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs* (232/38)

Le Pinson des arbres est présent toute l'année. Le nombre le plus important est de 43 individus le 21 octobre.

Migration post-nuptiale : 19 le 17 octobre (A. Le Nevé), 30 le 20, 43 le 21 (A. Le Nevé ; G. Rault et al.), encore 4 le 26 (R. Musseau et al.).

Hivernage : 4-6 individus les 28 et 29 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : 2 jeunes récemment envolés le 3 août 2003 dans le Village (indice D12), puis 3 couples dont les mâles chantent sont notés du 25 avril au 31 mai 2004 dans le Village, le Bois et les Jardins (indice C4) et au moins 6 individus sont présents le 28 mai dans les Jardins (A. Le Nevé).

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla* (62/21)

Observé du 12 au 21 octobre. L'effectif maximum est de 26 individus le 27 octobre (R. Musseau et al. ; G. Rault et al.).

LINOTTE MÉLODIEUSE *Carduelis cannabina* (88/22)

Une des espèces d'oiseaux les plus communes de l'île, mentionnée du 3 août au 14 juillet. Le maximum est de 72 individus le 25 avril.

Migration post-nuptiale : 50 le 20 octobre et 30 le 27 (G. Rault et al.).

Hivernage : 6 individus le 27 décembre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 72 le 25 avril (A. Le Nevé).

Nidification : le 1^{er} mai, 1 couple ramasse des matériaux à Parkeu Meing (indice C9), 1 couple avec 2 jeunes aux Réservoirs et 2 couples avec 2 jeunes à Portz Guen le 28 mai (indice D12) (A. Le Nevé).

CHARDONNET ÉLÉGANT *Carduelis carduelis* (84/23)

Également un des oiseaux les plus communs de l'île et présent toute l'année. Maximum de 30 individus le 27 octobre.

Migration post-nuptiale : 12 le 18 octobre (A. Le Nevé), 16 le 20, 17 le 26 et 30 le 27 (G. Rault et al.).

Hivernage : 5 le 27 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : 6 adultes avec 1 jeune le 28 mai dans les Jardins (indice D12) (A. Le Nevé).

VERDIER D'EUROPE *Carduelis chloris* (135/61)

Il figure parmi les oiseaux les plus abondants de l'île et présents toute l'année. Il est noté du 17 octobre au 11 juillet. De nombreuses données proviennent de captures de baguage. L'effectif maximum est de 77 individus le 27 octobre, ce qui constitue le chiffre le plus élevé observé à Hoedic, depuis 70 individus le 12 octobre 2002 (J. Jean-Baptiste et al. (bis)).

Migration post-nuptiale : 32 le 17 octobre et 50 le 20 (A. Le Nevé), 77 le 27 (R. Musseau et al. ; G. Rault et al.).

Hivernage : 32 le 27 décembre (A. Le Nevé).

Nidification : peu d'attention portée... 1 mâle parade le 28 mai à Parkeu Meing (indice C5) (A. Le Nevé).

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus* (91/11)

Ce Fringille est observée du 17 au 27 octobre. L'effectif le plus important est de 10 individus le 22 octobre.

Migration post-nuptiale : 3 le 17 octobre (A. Le Nevé), 7 le 20, 10 le 22 et 6 les 25 et 27 (G. Rault et al.).

SERIN CINI *Serinus serinus* (93/18)

L'espèce est contactée du 16 au 28 octobre, puis les 25 avril et 2 mai. Le maximum est de 10 individus le 20 octobre.

Migration post-nuptiale : 1 le 16 octobre (É. Lapous), 3 le 17 (É. Lapous ; A. Le Nevé), 10 le 20 (G. Raultt et al.), 6 le 21 (É. Lapous ; A. Le Nevé), 6 le 26 et 9 le 28 (G. Raultt et al.).

Migration pré-nuptiale : 1 mâle chante le 25 avril dans le Village et 1 individu le 2 mai à Parkeu Meing (A. Le Nevé).

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula* (91/18)

Le Bouvreuil pivoine est observé du 13 au 28 octobre, en hiver puis le 2 mai. Le chiffre le plus important est de 5 oiseaux du 22 au 25 octobre, ce qui est le plus fort effectif observé sur Hoedic et similaire aux 5 individus du 19 août 1988, incluant alors 2 jeunes volants (A. Le Nevé & G. Raultt).

Migration post-nuptiale : 1 couple le 13 octobre (J. Jean-Baptiste et al.), 3 les 17 et 20 (É. Lapous ; A. Le Nevé ; G. Raultt et al.), 4 le 21 et 5 du 22 au 25 (É. Lapous ; G. Raultt et al.).

Hivernage : 1 femelle le 27 décembre (A. Le Nevé).

Migration pré-nuptiale : 1 femelle le 2 mai (A. Le Nevé).

BEC-CROISÉ DES SAPINS *Loxia curvirostra* (6/1)

Septième observation avec 1 mâle le 27 octobre (G. Raultt et al.).

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (9/2)

Un immature le 26 octobre crie en vol (G. Raultt et al.) et observé posé le 27 octobre (Y. Kayser & A. Larousse).

Données homologuées par le CHN (Frémont & le CHN, 2005).

Rappel des précédentes mentions : 1 individu les 26 et 27 octobre 1997 (P.J. Dubois et al.), 1 immature les 23 et 24 octobre 2000 (G. Raultt), 1 immature du 18 au 23 octobre 2001 (F. Pelsy & G. Raultt), soit 3 oiseaux de 1997 à 2001.

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus* (75/17)

L'espèce est observée du 17 au 28 octobre, puis le 28 décembre. L'effectif maximum est obtenu le 27 octobre avec 11 oiseaux.

Migration post-nuptiale : 1 le 17 octobre, 3 le 18 (É. Lapous ; A. Le Nevé), 6 le 20, 11 le 27 (G. Raultt et al.).

Hivernage : 2 le 28 décembre dans les Jardins (A. Le Nevé).

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (4/2)

Un les 21 et 22 octobre dans le Village (É. Lapous ; A. Le Nevé ; G. Raultt et al.).

Cinquième mention de l'espèce à Hoedic. Donnée homologuée par le CHN (Frémont & le CHN, 2005).

Rappel des précédentes mentions : 1 individu le 12 avril 1993 dans les Jardins (G. Raultt), 1 le 12 novembre 1994 au Village (C. Barbraud, J. Bride, A. Le Nevé, F. Mougeot, G. Raultt), 1 le 29 octobre 1998 (A. Perthuis), 1 mâle le 23 avril 2003 à Parkeu Meing (A. Le Nevé).

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (2/3)

Deux individus du 1^{er} au 3 novembre à Beg Lagad (E. Gfeller & G. Rault†).

Troisième observation du Bruant des neiges à Hoedic.

Rappel des précédentes mentions : 1 femelle le 10 mars 2001 à Portz Guen parmi des Verdiers (A. Le Nevé), 1 mâle et 1 femelle à Vas Plat le 1^{er} novembre 2002 (A. Le Nevé).

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus* (17/8)

Séjour d'un à deux individus du 12 au 20 octobre au Port de la Croix.

Un oiseau est découvert le 12 octobre au Port de la Croix (J. Jean-Baptiste et al. ; A. & R. Le Nevé). Il sera rejoint le 19 par 1 mâle (A. Fossé & F. Halligon). Le 20 octobre, l'un d'eux est toujours présent (G. Rault† et al.).

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (11/2)

Migration post-nuptiale : 1 le 7 septembre (J. Pourreau & LPO44).

Migration pré-nuptiale : 1 mâle le 1^{er} mai à Portz Guen (A. Le Nevé).

BRUANT ZIZI *Emberiza cirius* (22/6)


Le Bruant zizi est observé en migration post-nuptiale du 21 au 28 octobre. L'effectif maximum est de 4 oiseaux le 27 octobre (G. Rault† et al.).

BRUANT PROYER *Miliaria calandra* (159/0)

C'est sans doute la première année sans observation depuis la première mention en 1960.



Pie-grièche à tête rousse



Droits et citations

Les données présentées restent la propriété entière de leurs observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature : **Fauvette épervière** – 1 immature 1^{er} hiver du 22 au 27 octobre 2003 dans les Jardins, île de Hoedic - 56 (C. Bouffet, D. Cohez, E. Gfeller, Y. Kayser, J-P. Jordan, R. Jordan, E. Lapous, A. Larousse, G. Rault, in Le Nevé, Kayser & Iliou, 2005).

Diffusion

La synthèse est envoyée à tous les observateurs ainsi qu'à des ornithologues connus pour fréquenter l'île régulièrement.

Les données sont communiquées aux centrales ornithologiques bretonnes (Ar Vran & Ar Vran Morbihan) avec les noms des observateurs et avec leur accord. Les données de reproduction sont particulièrement utiles dans le cadre de « l'atlas des oiseaux nicheurs » mené par le Groupe ornithologique breton entre 2004 et 2008.

Une copie du fichier est également adressée à l'association hoedicaise qui gère les terrains du Conservatoire du littoral (Association pour la gestion du Fort et de son environnement).

Par ailleurs, la synthèse précédente pour l'année 2002 – 2003, a été publiée par l'association Melvan dont le but est la connaissance du patrimoine architectural, culturel et naturel des îles de Houat et d'Hoedic, dans le deuxième numéro de sa « Revue des deux îles ».

Précision sur les observateurs mentionnés dans la synthèse

- P.J. Dubois *et al.* = O. Bardet, J-C. Beaudoin, P. Camberlein, Y. Créau, P.J. Dubois, G. Flohart, T. Fournet, A. Gentic, C. & J. Gonin, E. Lapous
- J. Jean-Baptiste *et al.* = N. Avril, B. Burnouf, A. Dufour, C. Hervé, J. Jean-Baptiste, A. Mionnet, C. Rideau, P. Spiroux, J. Vittier.
- J. Jean-Baptiste *et al.* (bis) = B. Burnouf, A. Dufour, C. Hervé, O. Hesnard, J. Jean-Baptiste, A. Mionnet, F. Noël, C. Rideau P. Spiroux, J. Vittier.
- R. Musseau *et al.* = M. Chauchepiat, J. Gonin, R. Musseau.
- G. Rault *et al.* = C. Bouffet, D. Cohez, E. Gfeller, Y. Kayser, J-P. Jordan, R. Jordan, A. Larousse, G. Rault.
- G. Rault *et al.* (bis) = C. Augier, C. Bouffet, D. Cohez, E. Gfeller, J.P. & R. Jordan, Y. Kayser, A. Larousse, G. Rault, A. Renaudier.

Cartographie utilisée (cf. carte à la fin)

Les lieux-dits mentionnés correspondent à la cartographie utilisée par les ornithologues depuis la fin des années 70 – début 80 (Le Garff, non datée). Cette cartographie a été actualisée en 2003 par des documents plus récents (cadastre d'avril 2003, orthophotoplan IGN 2000) pour tenir compte des aménagements intervenus depuis ces deux dernières décennies : station de lagunage, extension du village...

Par souci de précision, la toponymie des lieux-dits utilisée par Le Garff a été complétée de certains noms historiques figurant sur le cadastre ou dans la bibliographie (Buttin, 1984).

Par ailleurs, les coordonnées géographiques (latitude et longitude en degrés) ont été ajoutées, ainsi que le quadrillage UTM utilisé par les naturalistes bretons pour les besoins d'inventaires faunistiques et floristiques régionaux.

Indices de nidification

Les indices de nidification utilisés dans le texte sont ceux déterminés par le Groupe ornithologique breton (Gob) pour l'atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne 2004 – 2008 (Gob, 2004).

Tableau 1 : Indices de nidification utilisés en Bretagne

Comportements	Probabilité de nidification	Indices
NIVEAU A	Simple présence	
Espèce observée en période de nidification		A
NIVEAU B	Nidification possible	
Espèce observée en période de nidification dans un habitat favorable		B1
Chant (ou autre manifestation vocale associée à la reproduction) en période de reproduction		B2
NIVEAU C	Nidification probable	
Couple(s) dans un habitat favorable en période de reproduction		C3
Territoire permanent attesté par des comportements territoriaux à plusieurs dates en un lieu donné		C4
Parades ou vols nuptiaux, accouplement		C5
Visite d'un site de nid probable (cavité,...)		C6
Adultes agités ou inquiets (alarme,...)		C7
Plaque incubatrice (sur un oiseau tenu en main)		C8
Construction de nid (ou forage de cavité)		C9
NIVEAU D	Nidification certaine	
Manœuvre de dissuasion ou de diversion (aile cassée)		D10
Nid utilisé (ou coquilles)		D11
Juveniles récemment envolés (espèces nidicoles) ou en duvet (espèces nidifuges)		D12
Adultes dans un site (y entrant ou en sortant) dans des conditions indiquant l'existence d'un nid occupé (cas des nids élevés ou en cavité dont le contenu ne peut être vu) ou adultes sur un nid (couvant ou abritant des poussins)		D13
Transport d'aliments pour les jeunes ou de sacs fécaux par des adultes		D14
Nid contenant des œufs		D15
Nid contenant des jeunes (vus ou entendus)		D16

Bibliographie

Annézo J-P., 1976 – *Hoedic - En Eidig*. Ministère de la protection de la nature et de l'environnement / Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne. 76 p.

Buttin P., 1984 – *Toponymie des côtes de l'isle de Hoedic*. Carte non publiée.

Dubois P.J., 2001 – Les formes nicheuses de la Bergeronnette printanière *Motacilla flava* en France. *Ornithos* 12 : 44-73.

Frémont J-Y. & le CHN, 2005 – Les oiseaux rares en France en 2003. *Ornithos* 12 : 2-45.

Groupe ornithologique breton, 2004 – Protocole atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne 2004 – 2008. *Bulletin de liaison* n°48.


Iliou B. & Dérian G., 2002 – Recensement de la population de Bouscarle de Cetti sur l'île de Hoedic en 2001. *Ar Vran Morbihan* 22 : 42-43.

Le Nevé, Kayser, Iliou, 2005 – Synthèse ornithologique hoedicaise annuelle, du 16 juillet 2002 au 15 juillet 2003. *Melvan, la revue des deux îles* (2) : 119-140.

Maout J. & Mauvieux S. 2004 – Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1999 et 15/07/2000. *Ar Vran* 15 (2) : 75-121.

Nicolau-Guillaumet P. 1975 – Recherches sur l'avifaune « terrestre » des îles du Ponant. *L'oiseau et RFO* 45 (2) : 139-163.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES SUR L'ÎLE DE HOËDIC		Association pour la protection du fort et de son environnement 55170 Île de Hoëdic		Année :
NB : pour les espèces rares en France, merci d'envoyer votre description au Comité d'homologation national (CHN).				
NOM : Prénoms : Adresse : CP : Ville : Pays :				
Espèce	Lieu dit (carte au dos)	date	effectif	Renseignements divers (sexe, âge, chant, reproduction...)





Pouillot à grands sourcils

EN GUISE D'INVENTAIRE...

— 374 —

RAPPORT

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Messieurs,

Les collections du Musée d'histoire naturelle se sont enrichies en 1905 de 24 nids, offerts par notre collègue M. Lallement et par moi, et dont voici le détail.

d'Oiseaux sylvains, nids de :

Pinson ordinaire.	Traquet motteux.
Linotte ordinaire.	Traquet pâle.
Bruant jaune.	Rubiette rossignol.
Bruant zizi.	Rubiette gorge-rouge.
Mésange à longue queue.	Accenteur mouchet.
Pie-grièche écorcheur.	Fauvette à tête noire.
Alouette des champs.	Fauvette babillarde.
Alouette lulu.	Fauvette grisette.
Pipi des prés.	Fauvette pitchou.
Pipi des arbres.	Pouillot véloce.
Merle noir.	Troglodyte d'Europe.

de Colombiens, nids de :

Pigeon ramier.	Pigeon tourterelle.
----------------	---------------------

En outre, M. Lallement a fait don d'un goéland tridactyle. Je vous signalerai en terminant la capture d'une outarde barbut à l'Ile-d'Arz, le 23 novembre 1905.

Mes dépenses s'élèvent à la somme de 19 fr. 50

Vannes, le 6 janvier 1906.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

A. LEGUILLON-GUYOT.

Source : Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan.

Bravo et merci, Gwenael !

D'abord, il y a du papier, beaucoup de papier. Puis viennent les heures de clavier, interminables heures de saisie...

Depuis plus de dix ans, Gwenael DERIAN dépense son énergie pour assurer la parution régulière de notre revue. Il a tenu le pari, bon an mal an, malgré nos fichiers illisibles, nos disquettes récalcitrantes et plus tard en dépit des aléas du courrier électronique. Numéro après numéro, nous avons vu le travail de notre groupe prendre forme. Fidèle à ses prédécesseurs, Gwenael a accordé une place prépondérante aux données collectées mais c'est sous son impulsion que nous nous sommes lancés dans des synthèses rédigées. Il a su persuader plusieurs d'entre nous de la nécessité de l'exercice. Pour qu'Ar Vran Morbihan soit la revue du plus grand nombre, il nous a sans cesse encouragés à partager nos études, nos observations, nos notes.

Toujours avec le souci qu'aucun travail ne reste dans un carnet sans être publié, Gwenael a naturellement commencé à cumuler les charges de coordinateur pour plusieurs enquêtes régulières : Wetlands International, dortoirs de Grands Cormorans, STOC EPS... relançant inlassablement les incorrigibles retardataires que nous sommes parfois.

On peut donc aisément comprendre son essoufflement d'aujourd'hui et aussi son impatience à renouer avec un travail ornithologique plus personnel. Souhaitons lui donc bonne chance pour ses études à venir et espérons que nous saurons reprendre dignement le flambeau pour avoir le plaisir de lire dans nos pages le fruit de ses analyses de terrain.

Bravo et merci, Gwenael ! De la part de ces quelques-uns...

Confiance, disponibilité, Bon & toi
Sérieux... du bon
travail...
donc à continuer
Patrick

Merci Gwenael pour ta
aide et ton soutien
Merci. François HETTER

Chapeau pour la synthèse que
tu as faite et l'aide que tu
m'as apportée pour transcrire
mes données. Merci Luc

Merci et merci
à co-buteurs
remerciements et
regrets
Danielle

Gwenael, c'est avec grand
regret que je te vois abandonner
certaines de tes responsabilités
Avec sa la me. Ben vent.

Aussi efficace que modeste.
Merci de ton amitié. Luc

RN2

...et de tant d'autres qui ont croisé ta route.

