

Vanneaux huppés et Pluviers dorés hivernant en Morbihan intérieur, recensement 1996.

Le 21 janvier 1996, quelques observateurs ont recensé les Pluviers dorés et les Vanneaux huppés en Morbihan intérieur. 4025 pluviers et 10460 vanneaux ont ainsi été comptabilisés.


Cette opération concertée doit être menée sur une seule journée afin de s'affranchir des problèmes posés par les déplacements de populations de vanneaux et de Pluviers dorés. Ce comptage initialement prévu dans la première décade de décembre dut être ajourné à cause des vagues de froid qui ont sévi jusqu'à la mi-janvier et qui ont à maintes reprises provoqué l'éclatement des groupes stationnant dans l'intérieur et chassé les oiseaux vers le littoral sur des sols non gelés. Si la date du 21 janvier, finalement choisie pour ce recensement, ne coïncide pas avec la présence maximale des populations hivernantes de pluviers et vanneaux, elle présente cependant l'avantage de fournir des résultats qui complètent ceux obtenus en zone maritime par le BIROE ⁽¹⁾ dont la période d'enquête s'étendait cette année du 6 au 21 janvier.

A fin de comparaison, les résultats obtenus par communes ont été regroupés en secteurs définis lors des précédentes enquêtes ⁽²⁾ et cartographiés sur la figure 1. Le nombre insuffisant d'observateurs présents simultanément sur le terrain n'a pas permis une couverture exhaustive de l'aire d'hivernage:

- Dans le triangle Pontivy - Baud - Ploërmel, où toute crête dégagée, a fortiori orientée sud ou sud-ouest, peut accueillir des bandes de plusieurs centaines de vanneaux ou de pluviers, seuls les environs de Pontivy ont été négligés.
- Le nord-est de Ploërmel n'a pas été couvert.
- Le plus lourd défaut de prospection de cette opération concerne évidemment la basse Vilaine ; pour s'en convaincre, il n'est que de consulter les chiffres de la dernière synthèse réalisée sur ces deux espèces en 1987-88 ⁽³⁾ (tableau 3).

Fig. 1 - Délimitation des secteurs 1 à 5.

N. B.: secteur 6: basse Vilaine.



Tab. 1 - Dénombrement du 21/01/96.

Secteur	1	2	3	4	5	6	TOTAL INTERIEUR	littoral (BIOE) (3)	TOTAL MORBIHAN
Vanneaux huppés	1445	2880	335	5800	ND	ND	10460	14150	24610
Pluviers dorés	1050	1025	250	1700	ND	ND	4025	1450	5475

Tab. 2 - Dénombrement de l'hiver 1986/87 ⁽²⁾.

Secteur	1	2	3	4	5	6	TOTAL INTERIEUR
Vanneaux huppés	985	325	1620	2000	ND	900	5830
Pluviers dorés	1600	10	1460	1000	ND	550	4620

Tab. 3 - Dénombrement de l'hiver 1987/88 ⁽²⁾.

Secteur	1	2	3	4	5	6	TOTAL INTERIEUR
Vanneaux huppés	1230	1245	1040	1000	750	5000	10265
Pluviers dorés	1240	710	920	1000	100	550	4520

Malgré les lacunes du recensement du 21 janvier 1996, les zones d'hivernage de l'intérieur du département apparaissent clairement prépondérantes, puisqu'elles accueilleraient environ 40% des Vanneaux huppés et 70% des Pluviers dorés présents dans le Morbihan à cette date. Est-ce là l'image d'un "attachement" aux zones intérieures plus marqué pour les pluviers que pour les vanneaux ? Ces 4000 à 5000 pluviers seraient-ils moins enclins à gagner le littoral en cas de froid ? Cela expliquerait peut-être que ce même chiffre ait pu être relevé lors des précédents recensements pourtant réalisés à des dates et avec une météo sans doute différentes.

Pour mieux apprécier le rôle de ces secteurs intérieurs dans l'hivernage de ces deux espèces, il conviendrait de répéter de telles opérations, et de manière idéale, d'y associer les départements voisins, sur lesquels se prolongent quelques uns des secteurs jusqu'à présent étudiés ⁽³⁾.

J.-L. Lemonnier

Remerciements aux observateurs du 21/1/96:

G. Dérian, L. Hamet, B. Ilion,
F. Le Strat, F. Urvoaz,
A., G., M. & R. Quilléré.



(1) Bureau International de Recherche sur les Oiseaux d'eau, récapitulatif du littoral morbihanais, janvier 1996.

(2) Ar Vran: actualités ornithologiques morbihanaises, année 1991, n°3.

(3) Atlas de la présence hivernale des oiseaux de Bretagne 1977-1981, Ar Vran 196 - TOME XII, fasc. 3.