

SOMMAIRE -

- Synthèse Atlas 10km x 10km année 1984
Jo Le Lannic
 - Actualités du 16 Mars au 15 juillet 1983
Fanch PUSTOC'H
 - Actualités du 16 juillet ~~19~~ au 15 Novembre 1983
Jo. LE LANNIC.
-

ACTUALITÉS ORNITHOLOGIQUES

Période du 16 mars au 15 juillet 1983

Rédaction : F. PUSTOC'H

Frappe : LE GUEN'S Brothers

Grèbe huppé : 3 données

Quelques nouveaux sites de nidification cités : Etang de St-Morand/Forêt d'Araize (35), Château de Landal/La Boussac (35), Noyal-sur-Brutz (35 - 44), Etang de la Vallée/Chevré (35).

Castagneux : 1 donnée

Un couple sur une mare de 300m² le 15 mai au Bignon/Martigné-Ferchaud.

Puffin des Baléares : 1 donnée

3 le 15 juillet en Baie de Lancieux.

Grand Cormoran : 1 donnée

193 nids ont été dénombrés à l'Ile des Landes (35) le 8 juin.

Cormoran huppé : 1 donnée

275 nids notés toujours à l'Ile des Landes le 8 juin.

Héron cendré : 4 données

Un adulte, très vraisemblablement nicheur, présentant le bec rose-orange vif est observé à l'Etang d'Andouillé-Neuville le 19 avril. Cette coloration vive du bec peut-être considérée comme un critère de probabilité de nidification.

Aigrette garzette : 1 donnée

1 pêche dans une mare de gabion en baie du Mt St-Michel le 4 juillet.

Cigogne blanche : 2 données

Un individu est observé le 19 mars à Noyal-sur-Vilaine, et un autre le 25 mars à Retiers. Ces observations sont à mettre en relation avec celles du 6 mars (Une à Rennes et l'autre déjà à Noyal-sur-Vilaine) : un individu aurait-il séjourné plusieurs jours dans la région, ou les routes migratoires effleurent-elles la Bretagne ?

Tadorne : 4 données

Dans les polders du Mt St-Michel (35 - 50) la nidification a été établie sur une petite mare, sans précision de date. La population nicheuse des Ilôts de Cancale semble être toujours aussi importante : le 8 juin, 63 adultes minimum à l'Ile des Landes + 1 nid occupé et 1 poussin à l'eau, 20 adultes sur les Rimains et 14 adultes sur le Châtellier.

Colvert : 4 données

Pilet : 1 donnée

1 mâle est observé le 16 avril à l'Etang de la Taberge/Ste-Anne-sur-Vilaine (35).

Sarcelle d'Eté : 3 données

Première observation à Chaillou/Montauban (35) le 12 mars.
A Sougeal, cette espèce semble toujours bien établie : 1 couple et 5 poussins le 26 mai, 2 à 3 couples le 30 mai dont un accompagné de 2 jeunes et un autre de 3 jeunes.
En tout, 17 individus sont observés en mai.

Souchet : 1 donnée

Le 16 avril les mouvements migratoires ne sont pas terminés : 5 individus dont 3 mâles sont observés à la Taberge/Ste-Anne-sur-Vilaine.

Milouin : 2 données

A l'étang de Daniel/Louvigné-de-Bais, 3 individus dont 2 mâles sont observés.

Morillon : 1 donnée

Eider à duvet : 1 donnée

Un mâle et une femelle sont observés à Cancale courant mars.

Buse : 4 données

Une donnée de nidification : un nid avec jeunes le 4 juin en forêt de Montauban.

Epervier : 15 données

Le nombre important des observations de l'espèce laisse-t-il supposer une plus grande abondance de celle-ci ?

Milan royal : 1 donnée

Un adulte vole vers l'ouest le 15 avril, en forêt d'Araize

Bondrée : 6 données

Une donnée curieuse : un couple fréquente un site de mai à août, y construit un nid qu'il recharge régulièrement en feuillage frais, mais ne pond pas. S'agit-il d'un couple stérile ou d'un couple immature ? Par ailleurs, l'espèce est bien notée, ce qui montre sa relative abondance dans notre département.

Busard des roseaux : 3 données

Une donnée classique des marais de Redon et trois données concernant des sites potentiels : 1 immature est observé à St-Benoit-des-Ondes et un autre vers le Mt St-Michel au printemps ; un mâle immature est observé dans le Nord-Est des marais de Dol en avril - mai. Il sera intéressant de suivre ces sites dans les années à venir.

Busard St-Martin : 8 données

De 5 à 8 couples sont notés sur le versant Sud du Massif de Paimpont (De Tréhorenteuc au Sud du camp de Coëtquidan).
Par ailleurs, une femelle est observée à la Chambre au Loup /Iffendic le 24 avril (affaire à suivre), un mâle aux landes de Langon le 2 juillet et un couple chasse sur les herbus de la Baie du Mt St-Michel les 8, 9, et 11 juillet.

Busard Cendré : 2 données

Contrairement à l'espèce précédente, le nombre des observations s'amenuise~~nt~~. L'espèce a été notée absente le 8 juin d'un secteur de Coëtquidan où deux couples étaient notés en 82.
Par ailleurs, un nid est trouvé toujours à Coëtquidan en juin.

Busard sy : 1 donnée

Une femelle "Culblanc" est observée chassant sur les pistes de Rennes/St-Jacques le 24 mai.

Circaète : 1 donnée

A la suite d'une donnée provenant du Val sans Retour/Tréhorenteuc (56) du 5 juin, une prospection systématique dans tout le secteur Coëtquidan/Paimpont est restée sans résultat.

Faucon Pèlerin :

Une observation très intéressante : 1 individu est noté le 2 mai dans les herbus à l'ouest de la Baie du Mt St-Michel.

Hobereau : 17 données

Même remarque que pour l'Epervier.

Caille : 3 données

La population de la Baie du Mt St-Michel semble stable et importante : 1 couple sur la digue le 8 juillet et 3 sites avec chanteur le 16 juillet.
Par ailleurs, 1 chanteur le 5 mai à Trans.

Perdrix rouge : 1 donnée

1 le 24 juin aux Landes Rennaises/Campénéac.

Foulque : 3 données

10 à 12 couples en mai sur les carrés de Trans et Pontorson (Marais de Sougeal).

Huitrier Pie : 2 données

2 à 3 couples nicheurs à l'Île des Landes et un couple au Châtellier/Cancale le 8 juin.

Vanneau : 4 données

17 couples nicheurs sont recensés dans les marais de Sougeal. D'autre part, l'espèce est signalée nicheuse sur le carré de Dingé, sans précision de lieu ni de date.

Petit Gravelot : 5 données

2 données pouvant se rapporter au passage : 1 le 21 avril à La Planche/Rennes et 2 le 7 juillet à la Piblais/St-Jacques. 3 données de nidification : à Rennes/Beaulieu 1 le 3 mai revu alarmant le 12 mai ; 4 (2 adultes + 2 jeunes) à Laillé le 3 juin.

Goéland marin : 2 données

Le 8 juin, 30 à 50 couples nichent sur l'Ile des Landes et 1 couple sur les Rimains/Cancalle. Un individu est également observé sur le rocher de Cancalle.

Goéland brun : 2 données

30 à 50 couples sont installés à l'Ile des Landes le 8 juin et deux adultes alarment en plaine de Baud/Rennes le 26 juin.

Goéland argenté : 1 donnée

Le 8 juin on dénombre 200 à 250 couples nicheurs sur l'Ile des Landes ce qui démontre une nette diminution des effectifs par rapport à 82.

Mouette rieuse : 2 données

Dans les marais de Sougeal, une colonie s'installe le 26 mai avec des ébauches de nids dues à des individus immatures. Le 4 juin, 4 nids avec pontes sont trouvés.

Sterne naine : 1 donnée

A la ZAC des Longchamps à Rennes, 5 individus pêchent le 30 juin.

Sterne vierregarin : 1 donnée

362 nids sont dénombrés à la Colombière/St-Jacut (22).

Sterne caugek : 1 donnée

110 nids recensés toujours à la Colombière.

Tourterelle des bois : 4 données

Premier chanteur le 3 mai à Rennes - Beaulieu.

Tourterelle turque : 2 données

Un couple chanteur les 19 mars et 14 avril à Miniac-ss-Bécherel. Cette installation récente montre que l'espèce n'a pas encore colonisé tous les sites favorables et que son expansion semble se poursuivre.

Coucou : 5 données

Premier chanteur le 4 avril à Ste-Anne-sur-Vilaine.
Un couple dont la femelle est une phase rousse, est observé le 21 mai en Forêt d'Araize.

Moyen duc : 2 données

Le 1er juillet une prospection systématique dans tout le secteur Chavagne, Goven, Lassay, Baulon, St-Thurial, Monterfil, Talensac n'a permis de localiser qu'un seul site de nidification : un juvénile est entendu aux Grandes Landes/St-Thurial.

Brachyote : 1 donnée

Un individu est observé le 1er juillet à Rennes-St Jacques.

Chevêche : 2 données

Dans la presqu'île de St-Juliac, 4 couples nicheurs certains sont recensés entre le 20 avril et le 26 juin. Compte tenu de la raréfaction continuelle de cette espèce, la densité qu'elle présente dans ce secteur semble fort honorable.

Hulotte : 6 données

De nombreuses familles ou juvéniles sont notées ce printemps. Notamment dans le secteur prospecté pour le Moyen Duc, un minimum de 6 familles sont notées.

Engoulevent : 9 données

- 3 chanteurs paradant le 28 mai à la Chambre au Loup/Iffendic et le 4 juin dans la vallée du Serein/St-Péran.
- Au Boulet/Feins une femelle et un poussin sont notés le 29 juin, un mâle avec un juvénile volant et une femelle avec une deuxième ponte de deux oeufs le 20 juillet et un mâle sur un autre territoire le 2 août.
- Dans la Lande de Langon un individu chante le 2 juillet.
- Au Semis/St-Pierre-de-Klesguen un individu crie le 8 juillet.
- A Dingé une femelle et un poussin sont observés le 23 juillet.

Martinet : 9 données

Première observation de 2 individus, vraisemblablement en migration, le 13 avril à Rennes. Les premiers oiseaux stables sont notés le 18 avril, puis le gros des troupes arrive le 26 avril.

Martin-pêcheur : 4 données

4 observations d'1 individu du 5 mai au 11 juin.

Huppe : 5 données

A Tizé/Cesson-Sevigné, 1 le 26 avril. Dans les polders de la Baie du Mt St-Michel, un chanteur est entendu les 26 et 31 mai, (Cet oiseau a été entendu régulièrement pendant 1 mois par le fermier fréquentant l'endroit). A Lieuron/Maure, un couple est observé dans un verger le 8 juin, et un individu à la Bosse-de-Bretagne le 15 juin.

Pic cendré : 1 donnée

Aux Landes Rennaises/Campénéac - Paimpont un chanteur est entendu le 24 juin.

Pic mar : 5 données

Un individu le 20 mars au carrefour du Trécélieu/Paimpont ; un individu le 14 avril en Forêt de Rennes ; une alarme le 5 juin au Bois du Loup/Campénéac/Coëtquidan ; un chant le 15 juin en Forêt d'Arcaize et une alarme le 13 juin en Forêt de Villecartier.

Pic épeichette : 3 données

Des chanteurs sont notés en mars et juillet.

Alouette lulu : 5 données

L'espèce est notée dans ses sites d'abondance : Forêt de Paimpont et ses annexes et Sud du département.
Une observation plus originale : 4 individus notés au Temple du Cerisier/St-Jacques de la Lande le 15 juillet.

Hirondelle de rivage : 2 données

Notée sur des sites habituels : gravières de Bruz et de Langon.

Hirondelle de cheminée : 5 données

Plusieurs dizaines d'individus le 26 mars à la Piblais/St-Jacques. A Miniac/Bécherel, l'arrivée massive se fait entre le 8 et le 13 avril.

Hirondelle de fenêtre : 2 données

2 le 16 avril aux Hautes Folies/Messac.

Pipit des arbres : 2 données

4 chanteurs le 15 avril en forêt de Rennes.

Pipit farlouse : 7 données

Une bande d'environ 50 individus les 19 et 23 mars à Miniac-sous-Bécherel.

En outre, 2 chanteurs sont notés le 15 avril en Forêt de Rennes, 2 chanteurs également le 19 avril à la Lande Plaine /Andouillé, un chanteur à la Lande Cojoux/St-Just le 22 mai et plusieurs chanteurs les 31 mai et 26 juin dans la ZI du Sud-Est à Rennes.

Bergeronnette printanière : 3 données

Un mâle flavéole est noté le 12 mai à Rennes - Beaulieu ; un couple type est noté à Fouy/Ste-Marie de Redon le 2 juillet ; 2 chanteurs flavéoles et des nourrissages sont notés le 14 juillet en Baie de Lancieux.

Pie-Grièche écorcheur : 1 donnée

Au Fédeuil/Marais de Dol un mâle est cantonné du 15 mai au 8 juin (Chasse, Chant, Défense territoriale).

Trachet tarier : 2 données

Noté dans les lieux habituels : marais de Dol et de Redon.

Rouge-queue noir : 4 données

Premiers chants le 25 mars dans la ZAC Patton/Rennes et le 25 mars à Rennes - Beaulieu.

Rouge-queue à front blanc : 9 données

Premières observations : un mâle le 13 avril au Bois de Champaufour/Thorigné ; un mâle le 15 avril à Martigné-Ferchaud. Premier chant le 12 mai en Forêt de Rennes.

Rossignol : 10 données

Premiers chanteurs le 15 avril à la Forge/Martigné-Ferchaud et à Poligné.

Un nouveau site : 2 - 3 chanteurs le 10 juin à l'Etang de Tauloux/Servon-sur-Vilaine.

Grive litorne : 1 donnée

L'espèce est entendue le 6 avril à Miniac/Bécherel.

Locustelle tachetée : 7 données

L'espèce est notée régulièrement dans le nord du département (Dingé, Rouvre, Tanouarn, St-Pierre-de-Plesguen) et dans le massif de Coëtquidan - Paimpont.

Rousserolle effarvatte : 4 données

Un chanteur le 3 mai et un couple + un chanteur le 27 mai à la faculté des sciences de Rennes - Beaulieu.

Hypolaïs polyglotte : 3 données

Les premiers chanteurs sont entendus le 3 mai à la faculté des sciences de Rennes - Beaulieu.

Fauvette grisette : 4 données

1ère observation le 15 avril à Martigné-Ferchaud.

Fauvette pitchou : 5 données

1er chanteur le 16 avril au Val/Redon.

Cisticole :

L'espèce a été notée nicheuse certaine au Boulet ce printemps. Elle a également été notée sur la plupart des sites qu'elle occupait déjà : ZI du Sud-Est à Rennes, aérodrome de Rennes/St-Jacques, Marais de Redon.

De plus un nouveau site a été trouvé : 1 chanteur est noté le 11 juin à la sortie de Betton sur la route d'Antrain.

Pouillot fitis : 5 données

Le premier chanteur est noté le 4 avril à Ste-Anne-sur-Vilaine.

Pouillot de bonelli : 3 données

Un chanteur le 15 avril en Forêt d'Araize, 2 chanteurs le 15 avril et 3 le 21 mai en Forêt de Javardan(44).

Pouillot siffleur : 10 données

Premiers chanteurs en Forêt de Rennes le 21 avril.
Les observations sont faites soit dans les grandes forêts (Rennes, Araize, Chevré, Paimpont) soit dans des bois de taille beaucoup plus modeste et au peuplement forestier moins élevé (Forêt de Javardan, Bois de Champaufour/Thorigné, Bois du Loup/Coëtquidan, Bois des chapelles/Irodouër).

Roitelet triple-bandeau : 11 données

Premiers chanteurs le 14 avril au SW de la Forêt de Rennes.
Pour cette espèce les données proviennent sensiblement des mêmes sites que pour l'espèce précédente, mais elle fréquente en plus les parcs de châteaux peuplés de grands arbres, même de superficie modeste (Château de Landal, Château de Montmuran).

Gobe-mouche noir : 1 donnée

Un mâle le 15 avril en Forêt d'Araize.

Gobe-mouche gris : 3 données

Première observation le 12 mai aux Hautes Folies/Messac.

Bruant proyer : 5 données

L'espèce est présente à Rennes/St-Jacques le 7 juin. Un adulte chanteur est noté le 15 juin au Sud de la Forêt d'Araize, un chanteur également au Val/Redon le 2 juillet ainsi qu'à Fouy/Ste-Marie de Redon. En Baie du Mt St-Michel 4 chanteurs sont entendus à partir d'un point d'écoute sur la digue le 8 juillet.

Tarin des aulnes : 1 donnée

Un vol vers le Nord le 31 mars à Rennes/Beaulieu.

Gros bec : 4 données

1 le 31 mars à Rennes/Beaulieu ; 1 couple le 28 mai en Forêt de Montauban ; 1 le 18 juin à Montreuil-sur-Ille et 1 le 26 juin à la station biologique de Paimpont.

Moineau friquet : 2 données

2 "sites" à l'Etang de Carcraon le 14 mai et 3 individus le 27 mai à Rennes/St-Laurent.

Loriot : 8 données

En Forêt de Rennes dans le secteur de Maisons Neuves - Ecures, une femelle est observée le 21 avril, un couple et deux mâles probables sont observés le 4 mai et un couple le 19 mai. Dans les Marais de Dol, 8 à 10 couples sont notés en avril, mai et juin. Dans les polders du Mt St-Michel, l'espèce est notée en mai et juin (chants dans 3 sites le 3 juin). Deux mâles se battent le 15 juin en Forêt de Javardan et enfin l'espèce est notée sans précision de date dans les Marais de Sougeal.

Choucas : 3 données

L'espèce a niché dans la Cathédrale de Dol, dans le Château de Landal et en ville de Redon.

Freux : 1 donnée

Une colonie de 7 nids est découverte dans le bourg de Rougé(44) le 15 avril.

Liste des observateurs, sauf omissions involontaires:

Y. BOURGAULT, J. DELAMAIRE, P. DELEPORTE, P. FONQUERNIE,
P. FOUILLET, G. GÉLINAUD, L. & X. HÜE, J.M. JOLY,
Y. LE GARS + S.E.P.N.B., J. LE LANNIC, A. MAUXION, F. PUSTOCH,
L. THEBAULT.

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

Période du 16 juillet au 15 novembre 1983.

Synthèse : J. LE LANNIC

Groupe 1 :

Grèbe huppé :

Noté le 23 juillet à l'étang de la Serpaudais/Ercé-en-Lamée, site de nidification. Par la suite bien suivi à l'étang de Paintourteau : 20 le 4 et 50 le 26 septembre, 45 les 17 et 30 octobre. Le 23 octobre, 9 à Marcellé-Robert et 65 à Carcraon, le 10 novembre, 2 à la Piblais/St Jacques.

Castagneux :

A Paintourteau : 15 le 4 septembre, 4 le 17 et 15 le 30 octobre. 1 à la Piblais/St Jacques le 9 octobre, 2 à Carcraon et 7 à l'étang de Daniel le 23 octobre.

Fulmar :

1 "essaye" de se poser à la pointe du Grouin/Cancalle le 28 août.

Fou de bassan :

A la pointe du Grouin, 1 les 19 et 27 et 2 le 24 août.

Grand cormoran :

1 imm. à Carcraon le 23 octobre et 3 aux Bougrières/St Jacques le 6 novembre.

Héron cendré :

3 notés aux Maffey's/St Jacques en septembre, et à Paintourteau, 1 le 4 et 18 le 26 septembre puis 12 le 17 et 10 le 30 octobre.

Aigrette garzette :

Au Boulet/Feins, 1 le 25 août et 2 début septembre. 1 en baie de Lancieux les 2 et 3 septembre. 1 à Paintourteau/Vitré les 26 septembre et 3 octobre. 1 à St Jacques-de-la Lande les 9 et 15 octobre. A part Lancieux, tous les sites fréquentés sont des plans d'eau intérieurs.

Spatule :

3 individus à la Roche Torin/Mt St Michel (50) le 1er septembre.

Oie sp :

1 vue en vol à la Piblais/St Jacques le 9 octobre et entendues en vol à l'aéroport de St Jacques le 12 novembre.

Bernache cravant :

3 en vol à la pointe du Grouin/Cancalle le 5 novembre.

Tadorne :

1 à Paintourteau/Vitré le 14 novembre.

Colvert :

A Paintourteau, 400 le 4 septembre et 50 les 17 et 30 octobre. 8 à Marcillé-Robert le 23 octobre et 11 à la Taberge/Ste Anne-sur-Vilaine le 30 octobre.

Sarcelle d'hiver :

A Paintourteau, 10 le 17 et 15 le 30 octobre.

Sarcelle so :

A la mare des Maffey's/St Jacques 1 noté le 24 août.

Siffleur :

Plus de 100 à l'embouchure du Couësson/Mt St Michel le 29 octobre.

Souchet :

A Paintourteau, 5 le 4 septembre, 2 le 17 et 20 le 30 octobre. 1 mâle et 1 femelle à Carcraon le 23 octobre.

Milouin :

A Paintourteau, 20 le 4 septembre, 300 le 17 et 700 le 30 octobre. 7 (2 mâles) à Carcraon le 23 octobre. A St Jacques, 2 mâles et 1 femelle le 6 et 7 mâles et 3 femelles le 10 novembre.

Morillon :

A Paintourteau, 15 le 4 septembre, 15 le 17 et 30 le 30 octobre. 5 mâles + 4 femelles à la Piblais/St Jacques le 10 novembre.

Garrot :

1 femelle à l'embouchure du Couësson/Mt St Michel le 29 octobre.

Groupe 2 :

Aigle botté :

1 individu en phase sombre observé au barrage de la Chaize/St Thurial le 29 septembre (observation de P. BOISNEAU).

Autour :

1 mâle au barrage de la Chaize/St Thurial le 29 septembre.

Epervier :

2 données en ville de Rennes : 1 au Thabor le 27 septembre et 1 rue de St Malo le 14 novembre. Par ailleurs 1 individu en forêt de Teillay le 15, à Ste Anne-sur-Vilaine le 27, à Orgères, au marais de Gannedel le 31 octobre et 2 individus à l'étang de Chaillou/Montauban le 13 octobre.

Bondrée :

1 couple parade au moulin de la Grée Charuel/La Dominelais le 16 et 1 individu en forêt de Teillay le 23 juillet, 1 notée sur le carré de la Bosse le 15 août et 1 entendue aux Loges/St Sulpice la forêt le 6 septembre.

Busard des roseaux :

Dans le marais de Gannedel, site de nidification, 1 mâle adulte le 27 août et 4 (1 mâle & 1 femelle ad.) le 31 octobre. Dans la baie du Mt St Michel un minimum de 8 individus a été noté le 14 octobre.

Busard St Martin :

A la Dominelais, 4 le 30 août et dans la réserve du Mt St Michel 1 mâle le 14 et 1 femelle + 1 mâle le 29 octobre.

Balbuzard :

1 au Boulet le 7 septembre.

Faucon pèlerin :

Au Mt St Michel, 1 à l'ouest du Mont le 14 et 1 (le même?) dans la réserve le 29 octobre.

Faucon hobereau :

1 noté sur le carré de La Bosse le 22 août et 1 au parc des Bois/Rennes le 17 septembre.

Faucon émerillon :

2 dans la réserve du Mt St Michel les 14 et 29 octobre.

Râle d'eau :

1 à Bourgbarré le 20 juillet, 1 à Murin/Massérac (44) le 27 août et 2 chanteurs dans le marais de Gannedel le 31 octobre.

Foulque :

A Paintourteau : 700 le 4 septembre, 250 le 17 et 500 le 30 octobre. Par ailleurs 10 en ZAC de Longschamps/Rennes le 4 septembre, 80 à Marcillé-Robert, 80 à Carcraon et 11 à l'étang de Daniel le 23 octobre, 17 à la Taberge/Ste Anne-sur-Vilaine le 30 et 20 à Gannedel le 31 octobre. 46 à la Piblais/St Jacques le 10 novembre.

Groupe 3 :

Vanneau :

150 au marais de Gannedel le 27 août.

Pluvier doré :

22 dans la réserve du Mt St Michel le 29 octobre.

Pluvier arctique :

1 à la Piblais/St Jacques le 9 octobre.

Bécassine des marais :

Une dizaine à la Piblais/St Jacques le 9 octobre, 12 à Marcillé-Robert et 4 à l'étang de Daniel le 23 octobre, 1 à la Prévalaye/Rennes le 10 novembre.

Bécassine sourde :

1 au champ Courtin/Melesse le 6 septembre.

Courlis cendré : (sites intérieurs)

1 à la Piblais/St Jacques le 9 octobre et 2 à Carcraon le 23 octobre.

Aboyeur :

3 au Couësnon/Mt St Michel le 6 septembre.

Culblanc :

1 à la réserve du Mt St Michel le 29 octobre.

Guignette :

1 à Corps-Nuds le 26 juillet, 1 à la Piblais le 9 octobre et 2 aux Bougrières/St Jacques le 6 novembre.

Combattant :

2 au Couësnon/Mt St Michel le 6 septembre.

Bécasseau de temminck : (site intérieur)

1 au Boulet début septembre.

Bécasseau tacheté :

1 dans la Rance début septembre.

Avocette :

1 au Mt St Michel le 29 octobre.

Groupe 4 :

Tourterelle des bois :

Départs notés à la Bosse-de-Bretagne le 12 septembre.

Coucou :

1 juv. à la Bosse le 25 juillet.

Chevêche :

1 sur le carré de la Bosse le 30 août.

Hulotte :

Cris de juv. en forêt de Chevré le 22 juillet et sur le carré de la Bosse le 5 août.

Effraie :

Cris de juv. sur la Bosse le 13 août.

Enroulement :

1 chant en forêt de Rennes le 21 juillet et au moins 3 individus + 2 chanteurs en forêt de Chevré le 22 juillet.

Huppe :

1 sur le carré de la Bosse le 23 juillet.

Torcol :

1 entendu sur le carré de la Bosse le 23 juillet.

Alouette lulu :

1 chant à Ste Anne-sur-Vilaine les 30 et 31 octobre.

Hirondelle de rivage :

Notée à la Piblais/St Jacques le 20 septembre.

Hirondelle de cheminée :

Encore notée à la Bosse les 2 et 8 octobre.

Hirondelle de fenêtre :

1 nid unique et habité sur une maison de ferme isolée à Lanvau/Ste Anne-sur-Vilaine le 30 août. Départs notés à Ercée-en-Lamée le 26 septembre et à la Bosse le 2 octobre.

Bergeronnette printanière :

2 flavéoles à Cherrueix le 4 août.

Bergeronnette de ruisseaux :

4 min. à la Prévalaye/Rennes le 10 novembre.

Bergeronnette grise :

1 mâle Yarrell à Rennes-Beaulieu le 20 octobre et plusieurs dizaines de Yarrell à l'étang de Daniel (dortoir probable) le 23 octobre.

Traquet tarier :

8 individus à Massérac (44) le 27 août.

Traquet motteux :

1 à Massérac le 27 août.

Rouge-queue noir :

1 à Rennes-Patton le 7 novembre, noté 5-6 fois chanteurs à Rennes en septembre.

Rouge-queue à front blanc :

1 chanteur sur le carré de la Bosse le 28 août et 1 mâle à la Dominelais le 30 août.

Rossignol :

1 alarme à la Dominelais le 16 juillet.

Grive mauvis :

Premiers passages à la Bosse le 15 octobre puis des regroupements sont notés : 20 à Marcillé-Robert et 40 à Carcraon le 23 octobre.

Groupe 5 :

Bouscarle :

1 dizaine à la Piblais/St Jacques le 9, 2 chanteurs à Marcillé-Robert, 1 chanteur à Carcraon le 23 et 1 chanteur dans le marais de Gannedel le 31 octobre.

Cisticole :

1 chanteur sur le Don à Murin/Massérac (44) le 27 août.

Locustelle tachetée :

1 à la Grée Gallière/Ercé-en-Lamée le 20 et 10 chanteurs min. en forêt de Rennes le 21 juillet.

Rousserolle effarvate :

Notée à la mare des Maffey/St Jacques le 12 novembre.

Fauvette pitchou :

1 chanteur en forêt de Rennes le 21 juillet, 1 au Boël/Laillé le 20 septembre et 1 aux Maffey/St Jacques le 12 novembre.

Pouillot fitis :

1 début de chant aux Gayeulles/Rennes le 6 septembre.

Gobe mouche noir :

Dans les parcs de Rennes, 1 à oberthur et 2 au Thabor le 3 septembre.

Loriot :

5 individus (1 mâle + 4 femelles ou juv.) dans le marais de St Coulban/Chateauneuf le 4 août.

Freux :

Plusieurs dizaines à l'aérodrome de St Jacques le 10 novembre.

Grand corbeau :

A la pointe du Grouin, 2 à 5 individus posés sur l'île des Landes en août et 2 individus le 5 novembre.

Tarin des aulnes :

Cris en vol à Rennes-Beaulieu le 26 octobre.

Gros bec :

1 juv. capturé à Beauvais/Paimpont en septembre.

Bruant proyer :

1 à Bourgbarré le 19 juillet.

Liste des observateurs : M. BEAUFILS, D. BELLIER, P. BOISNEAU, Y. BOURGAUT,

J-P COCO, P. FOUILLET, L. & X. HUE, J-M. JOLY, M. LEDARD, P. & C.

LE GUEN, J. LE LANNIC, J-Y. LOUIS, F. PUSTOC'H, L. THEBAULT.

Actualités Ornithologiques
du 16 novembre 82 au 15 mars 83.

Ont participé à ces actualités :

J.P. Coco, P. Fouillet, L. et X. Hue, J.M. Joly,
J. Le Lannic, J.Y. Louis, F. Pustoc'h.

-LE GREBE-

Publication de la section Ar Vran Ille et Vilaine.

Fascicule N° 3

- SOMMAIRE -

- Actualités du 16 Novembre 1982 au 15 Mars 1983. F.PUSTOC'H

- Synthèse atlas des nicheurs 10x10 de la saison 1983. F.PUSTOC'H

(Frappe réalisée par P.LE GUEN.)

Une remarque s'impose après la compilation des données pour la période 16 nov. 82 - 15 mars 83. Lorsqu'un site est relativement bien suivi (minimum de 3 visites pour la période) il est impératif de noter l'absence d'une espèce généralement observée sur celui-ci. Cela facilite grandement la compréhension des mouvements de l'espèce considérée durant la période. L'étude des données du Grèbe huppé illustre bien cela.

Grèbe huppé : 31 données

Lieux \ Dates	30/1/83	19/2/83	26/2/83
Trémignon/Combours	12	0 gelé à 95 %	
Combours	8	4 gelé à 90 %	
Bazouges-sous-Hédé		2 gelé à 80 %	2 dégelé
La Bézardière/Hédé		0 gelé à 100%	3 dégelé
Hédé		0 gelé à 98 %	4 dégelé
La Péronaye/Romillé		0 gelé à 90 %	2 dégelé
La Taberge/Ste-Anne-sur-Vilaine	1 également le 2/1	7 gelé à 25 %	

A la lecture de ce tableau on s'aperçoit que les étangs du Nord du département gelés à plus de 80 % durant la petite vague de froid de la mi-février ont généralement été désertés par le Grèbe huppé durant cette période.

Corrélativement un étang moins gelé au Sud du département; La Taberge/Ste-Anne-sur-Vilaine, présente un très net maximum au même moment : 7 ind. le 19/1, contre 1 ind. les 2 et 29 janvier. A noter en outre 20 le 22 nov. à la Valière/Vitré, 20 les 16 et 23 janvier à Châtillon, 12 le 30 janvier à Trémignon/Combours, 12 le 19 février au Boulet et 11 du 27 février au 3 mars à la Piblais/St-Jacques.

Grèbe castagneux : 11 données

L'étang de Paintourteau, particulièrement bien suivi, montre une grande stabilité des effectifs sur la période, avec un maximum début décembre correspondant peut-être à la fin des mouvements postnuptiaux, et un autre maximum début mars correspondant à l'amorce des mouvements prénuptiaux : 4 ind. le 12 déc., 2 les 30 déc., 22 janvier, 26 février et 6 le 8 mars.

Grand cormoran : 11 données

Présence très régulière dans les Gravières de St-Jacques.
Par ailleurs, 4 ind. les 19 et 27 février à Bazouges-ss-Hédé
(1 en plumage nuptial le 19) et 3 ad. en plumages nuptial le
27 février à Hédé.

Héron cendré : 7 données

Au moulin d'Apigné/Rennes 14 le 8 janvier.

Cigogne blanche : 2 données

Une en vol vers l'Est au-dessus de la rocade Sud à Rennes et
une volant vers le Sud à Noyal-sur-Vilaine, le 6 mars.
Peut-être s'agissait-il du même oiseau ?

Oie cendrée : 2 données

1 le 19 février à l'Est de la Taberge/Ste-Anne-sur-Vilaine et
1 le 26 février à Gannedel/La Chapelle St-Mélaine.

Tadorne : 2 données

2 à 300 le 29 janvier à l'Ouest du Mont St-Michel.
2 en vol vers l'Ouest le 13 déc. à St-Jacques.

Colvert : 26 données

A Paintourteau 20 le 21 nov., 80 le 12 déc., 350 le 30 déc.,
450 le 9, 400 le 17 et 300 le 22 janvier ; puis chute à 30
le 26 février, et 60 le 8 mars.

Le gros de l'hivernage se fait donc entre fin déc. et
fin janvier. Nous ne savons malheureusement pas ce qui s'y
passe en février, pendant la petite vague de froid. Les étangs
suivis dans cette période semblent montrer un phénomène similaire
à celui que nous avons remarqué chez le Grèbe huppé. A la
mi-février nous constatons une nette concentration sur les étangs
non gelés, ou faiblement gelés : 550 - 600 ind. le 19 février à
Bazouges-ss-Hédé et 160 ind. le 19 février à la Taberge/Ste-Anne.

Sarcelle d'hiver : 16 données

Les effectifs semblent assez peu stables.
A noter 200 le 12 déc. et 150 le 22 janvier à Paintourteau.

Chipeau : 3 données

13 le 19 février à Bazouges-ss-Hédé.

Siffleur : 14 données

L'espèce préfère certains étangs : Paintourteau (120 le 22 janv.),
Châtillon (+ 100 le 6 mars) et La Chèze/St-Thurial (50 le 13 fév.).

Pilet : 7 données

15 le 12 déc. à Paintourteau, 18 dont 11 mâles le 19 fév. à la
Taberge, 10 mâles et 6 femelles à Carcraon le 20 février.

Souchet : 10 données

Après un pic début déc. (20 le 12 à Paintourteau) les effectifs sont faibles jusqu'à mi-janvier puis remontent fin janvier (20 à Paintourteau le 22 janvier) et continuent d'augmenter pendant le reste de la période (40 à Paintourteau le 8 mars).

Milouin : 29 données

Les effectifs de l'espèce augmentent régulièrement jusqu'à fin janvier (maximum de 1500 à Paintourteau le 22 janvier et de 1100 à Châtillon le 23 janvier) se maintiennent sensiblement à ce niveau jusque fin février (1100 à Paintourteau le 26) puis diminuent jusqu'en fin de période (450 à Paintourteau le 8 mars). Il est à noter également que les trois grands plans d'eau de l'Est du département (La Valière, Paintourteau et Châtillon) retiennent 80 % des effectifs hivernants.

Fuligule Nyroca : 1 donnée

5 ind. sont observés sur un étang très isolé à Maure de Bretagne au mois de novembre. Là se repose l'éternel problème des anatidés élevés comme espèces d'ornement sur les pièces d'eau privées : " Savage or not savage, that's the question " ?

Fuligule Morillon : 20 données

Comme pour le Milouin le maximum de l'hivernage se situe en fin janvier - début février (100 à Paintourteau le 22 janvier, 200 à Châtillon le 23 janvier, 70 à Bazouges-ss-Hédé le 19 fév.), mais les effectifs décroissent plus vite que pour l'espèce précédemment citée (20 à Paintourteau le 26 février et 7 à Bazouges le 27 février). A noter aussi le fait que les effectifs hivernants du Morillon sont nettement plus faibles que ceux du Milouin (grossièrement 4 à 500 ind. pour le premier contre 2700 - 3000 ind. pour le second).

Garrot à oeil d'or : 1 donnée

Une femelle le 16 janvier et 2 femelles le 23 janvier à Châtillon.

Harle bièvre : 1 donnée

Un mâle à Carcraon le 20 février.

Buse variable : 3 données

10 le 6 mars planant et paradant en forêt de Rennes dans le secteur de Fouillard.

Epervier :

9 observations concernant toujours 1 ind. durant la période.

Busard des roseaux : 3 données

Dans les marais de Redon le 30 janvier, 2 dont 1 mâle à Gannedel et 1 à Murin ; 1 imm. à Bazouges-ss-Hédé, le 30 janvier.

Busard St-Martin : 3 données

En Baie du Mt-St-Michel le 29 janvier 3 ind. dont 1 mâle dans les Polders et 1 femelle ou imm. à Cherrueix le 30 janvier.

En forêt de la Beaucelais/Guipry 2 mâles et 1 femelle le 26 fév..

Faucon émerillon : 1 donnée

Le 29 janvier en Baie du Mt St-Michel, dans les polders Frémont-Moligné, 3 individus.

Crécerelle : 2 données

3 ind. sur un parcours de 4 kms dans le bocage de Ste-Anne-sur-Vilaine le 31 déc., et 4 sur un parcours de 7 kms dans le même secteur le 30 janvier.

Perdrix grise : 4 données, toutes de l'aérodrome de St-Jacques.

Foulque : 33 données

Le schéma de l'hivernage de l'espèce semble simple : augmentation régulière des effectifs jusque fin janvier - début février (Maximum : 300 à Paintourteau le 22 janvier, 1000 à Châtillon le 23 janvier, 500 à La Valière le 2 fév.), puis diminution régulière jusqu'en fin de période.

Vanneau : 15 données

Le secteur de St-Jacques semble abriter une population importante et ce régulièrement pendant toute la période.

Pluvier doré : 3 données

400 dans les Polders de Frémont en Baie du Mt St-Michel le 30 janvier, zone d'hivernage régulière de l'espèce. Par contre au Fresne/Miniac-ss-Bécherel où l'espèce n'hiverné pas habituellement une petite population s'est établie pendant la vague de froid de la mi-février : 120 le 16 fév. et 80 le 19.

Bécassine des marais : 4 données

A l'étang du Baron à Guipry des chevrottements sont entendus le 26 février.

Bécasse : 1 donnée

1 en hêtraie à Corbinières/Langon le 20 février.

Barge à queue noire : 1 donnée

28 volent vers le Nord à Martigné-Ferchaud le 12 mars.

Combattant : 2 données

En Baie du Mt St-Michel 50 le 29 janvier au Polders Frémont-Moligné et 41 le 30 janvier au Sud de ce polder.

Avocette : 1 donnée

50 près du Mt St-Michel le 22 janvier.

Mouette rieuse : 1 donnée

Maximum de 100 au Parc des Bois/Rennes le 14 février.

Mouette tridactyle : 1 donnée

1 oiseau mazouté trouvé mort à Etrelles le 7 février.

Tourterelle turque : 1 donnée

L'espèce continue son expansion en comblant les vides de sa répartition : au printemps 83 1ère observation de l'espèce à Miniac-ss-Bécherel, au moins depuis 1978.

Hibou moyen-duc : 4 données

1 ind. a hiverné à l'aérodrome de Rennes St-Jacques de janvier jusqu'en fin de période, observé avec l'espèce suivante.

Hibou des marais :

3 ind. observés de déc. à fin fév. puis 2 ind. de fin fév. à la fin de la période, à l'aérodrome de Rennes St-Jacques.

Chouette hulotte : 5 données

Observations régulières dans l'agglomération rennaise, où la reproduction semble très précoce : 1 poussin de 4 semaines en duvet les 3 et 4 mars Rue des Plantes, et 2 juv. Avenue des Buttes de Coësmes le 9 mars. Ces observations laissent supposer des pontes datant de début janvier.

Effraie : 1 donnée

1 à 2 chanteurs à Rennes/Maurepas en janvier.

Martin-pêcheur : 4 données

Pic cendré : 1 donnée

1 à La Tournerais/Goven le 5 mars.

Alouette haussecol : 1 donnée

1 le 23 nov. à la Roche Torin (50) en Baie du Mt St-Michel.

Traquet motteux : 1 donnée

1 mâle le 6 mars sur un terrain vague à Vitré.

Rouge-queue noir : 2 données

1 mâle le 2 janv. à Ste-Anne-sur-Vilaine. L'espèce est rarement observée en période hivernale ailleurs que sur la côte.

Grive litorne : 2 données

Passage le 27 novembre à Miniac-ss-Bécherel.

Grive mauvis : 2 données

Passage diurne le 27 nov. à Miniac-ss-Bécherel.

Bouscarle : 2 données

4 chanteurs sur 1 km le long de la Vilaine le 8 janvier au Moulin d'Apigné et 2 chanteurs le 19 fév. à Montauban par temps très froid.

Fauvette à tête noire : 8 données

L'espèce est observée pendant toute la période à Rennes (l'événière - Beaulieu et Maurepas). Premiers chants le 4 mars à Rennes et le 6 mars à Miniac-ss-Bécherel.

Roitelet huppé : 1 donnée

1 chant assidu le 24 fév. à La Péronaye/Romillé.

Bruant jaune : 4 données

lors chanteurs le 27 fév. à Miniac, le 2 mars à St-Jacques.

Pinson des arbres : 5 données

Chants incomplets de janv. à mi-février. Les chants complets et assidus commence le 19 fév. à Ste-Anne-sur-Vilaine et le 24 fév. à Romillé.

Tarin des aulnes : 2 données

Passage le 27 nov. à Miniac-ss-Bécherel et 2 chanteurs le 8 janvier au Moulin d'Apigné/Rennes.

Linotte : 1 donnée

Une bande de 150 au Fresne/Miniac-ss-Bécherel le 16 février.

Sizerin flammé : 1 donné

2 à la mi-janvier à Cesson.

Serin cini : 3 données

1 le 24 déc. à Miniac-ss-Bécherel, 1 chanteur en janvier et le 14 fév. à Ponchaillou/Rennes.

Gros bec : 5 données

Observé régulièrement à Beaulieu - Rennes en février.

Loriot : 1 donnée

Aussi extraordinaire que cela puisse paraître un mâle est observé le 20 janvier à Crévin.

Choucas : 2 données

20 - 30 le 30 janv. à Trémignon/Combours et 2 minimum dans le clocher de Janzé le 12 mars.

Freux : 1 donnée

Une population d'1 trentaine d'ind.minimum est observée à l'aérodrome de Rennes St-Jacques du 15 déc. au milieu de février.