

GUIDE DE L'OBSERVATEUR EN ILLE-ET-VILAINE

Introduction

Ce document donne des pistes sur la prise de données de terrain, afin d'améliorer la qualité de notre fichier d'observations ornithologiques, afin d'en faire un véritable outil d'études et de protection.

Il tire son origine d'un document du Groupe Ornithologique Normand (GONm), initialement réalisé par Yvon Créau, puis ayant évolué suite aux remarques des ornithologues normands. Avec l'autorisation du GONm, ce document a été remanié et adapté au contexte du département d'Ille-et-Vilaine.

Ce guide s'adresse donc à tous les observateurs avec les objectifs suivants :

- harmoniser les données envoyées au Groupe ornithologique 35 ;
- inciter à la transmission d'un plus grand nombre de données ;
- « rentabiliser » au maximum les sorties ;
- susciter une approche plus scientifique, notamment par la quantification des données ;
- faciliter la tâche des rédacteurs de synthèses.

Si une telle démarche présente des avantages évidents, elle comporte aussi des inconvénients. Si ce guide conduisait à une autocensure de la part des observateurs ou s'il bloquait le débutant, il n'aurait pas atteint son but. Si une donnée vous paraît intéressante, même si elle n'entre pas dans le cadre défini, n'hésitez surtout pas à la noter et à nous la transmettre. Enfin, que les débutants ne fassent pas de complexes, tout le monde a un jour débuté et par bonheur le monde des ornithologiques en France n'est pas encore trop pollué par l'élitisme.

En plus des conseils spécifiques mentionnés dans les pages suivantes, quelques remarques de portée plus générale peuvent être faites :

- pour les données exceptionnelles (par l'espèce ou la date), rédiger une note détaillée ;
- noter les apparitions et les disparitions locales d'espèces considérées comme communes ;
- pour beaucoup d'espèces communes, en particulier les passereaux et proches, des suivis locaux un peu partout sont souhaitables afin de cerner les évolutions d'effectifs.

L'élément qui pose le plus de problèmes est le nombre et les commentaires. On trouvera dans la liste systématique des indications et des repères mais on peut donner dans cette introduction quelques généralités qui s'appliquent à toutes les espèces :

- donner toujours un nombre même approximatif des oiseaux observés ;
- fournir si possible des indications sur le sexe ou l'âge des oiseaux (laridés notamment) ;
- apporter des commentaires sur le comportement (de reproduction par exemple) ou sur des impressions personnelles sur le caractère précoce, tardif ou inhabituel de l'observation.

Bien évidemment, ce guide n'est ni parfait, ni définitif.

Il évoluera en fonction du changement de statut de certaines espèces, de l'état de nos connaissances. Certaines informations, comme les dates extrêmes de chant ou les sites ornithologiques majeurs du département, seront ajoutées à une prochaine version.

Par ailleurs, vos idées et remarques pour améliorer ce guide sont les bienvenues.

Guide d'observation des espèces

Cette liste ne concerne que les espèces observées plus ou moins couramment en Ile-et-Vilaine. Il va de soi que l'observation des espèces non mentionnées doit être systématiquement signalée, et bien circonscrite.

Plongeon catmarin

Plongeon arctique

Plongeon imbrin

Toutes les observations.

Grèbe castagneux

Toutes les observations de groupes de plus de 10.

Pour les décomptes, bien délimiter le site.

Toutes les données de nidification.

Grèbe huppé

Dénombrements : bien délimiter le site, tant à l'intérieur (plan d'eau ou groupe de plans d'eau) que sur la côte (portion de côte, nombre de km).

Assurer si possible un suivi par semaine/décade/...

Données de nidification.



Grèbe jougris

Grèbe esclavon

Toutes les observations.

Grèbe à cou noir

Toutes les observations intérieures.

Sur les sites côtiers, tenter des suivis (arrivées, départs, variations d'effectifs).

En Rance, compilation de données.

Fulmar boréal

Toutes les observations.

Nidification à suivre si l'espèce s'installe.

Puffin des Anglais

Toutes les observations.

En guet à la mer, noter le nombre par unité de temps.

Attention à la détermination de l'espèce en été !

Puffin de Méditerranée

Toutes les observations.

La sous-espèce *P. m. yelkouan* n'est pour l'instant pas connue en Ile-et-Vilaine.

Océanite tempête

Océanite culblanc

Toutes les observations.

Fou de Bassan

Groupes de plus de 10 entre le 15/03 et le 15/11.

Toutes les données entre le 15/11 et le 15/03.

Installation en temps que nicheur à surveiller : toutes les données d'ind. posés sur des îles, îlots ou côtes rocheuses, principalement entre le 15/04 et le 15/07 doivent donc être transmises.

Grand Cormoran

Dortoirs : suivis si possible.

Données relatives à la nidification (attention aux sites intérieurs).

Cormoran huppé

Rassemblements hivernaux (pratiquement pas de données existantes).

Données relatives à la nidification.

Butor étoilé

Blongios nain

Bihoreau gris

Toutes les observations.

Aigrette garzette

Dans les sites bien fréquentés par l'espèce, tenter des compilations.

Espèce à noter (encore) abondamment.

Données relatives à la nidification : surveiller

l'implantation possible sur de nouveaux sites, noter l'espèce coloniale attractive (pour l'instant oiseaux marins).

Héron cendré

En hiver, dortoirs ou groupes de plus de 10.

Données relatives à la nidification.

Être vigilant sur les observations printanières, car de nouveaux sites de nidification sont possibles du fait de la dynamique d'expansion actuelle de l'espèce.

Cigogne noire

Toutes les observations.

Reproduction à rechercher (massif de Paimpont).

Cigogne blanche

Toutes les observations.

Spatule blanche

Toutes les observations.

Cygne tuberculé

Toutes les observations, y compris en ville (statut de l'espèce à préciser dans les années qui viennent).

Oie des moissons**Oie rieuse**

Toutes les observations.

Indiquer si possible la sous-espèce (*A. a. flavirostris* est à soumettre au CHN).

Oie cendrée

Toutes les observations et notamment les groupes en migration.

Lieux de stationnement.

Indiquer si possible la sous-espèce.

Bernache cravant

Toutes les observations intérieures et tous les groupes côtiers de plus de 50 (?).

Les sites principaux d'hivernage sont à suivre : Rance maritime, havre de Rothéneuf, BMSM.

Sites annexes : anse Duguesclin, estuaire du Frémur...

Sous-espèce *B. b. hrota* : toutes les observations.

Sous-espèce *B. b. nigricans* : description CHN.

Tadorne de Belon

Toutes les observations intérieures.

Données relatives à la nidification et recherche des nurseries.

Départs (à partir de mi-juin) et retours (à partir de septembre), stationnements (possibles en août).

Suivi des sites principaux (Rance maritime et BMSM) en hivernage, recherche des sites annexes.

Canard siffleur**Canard chipeau****Sarcelle d'hiver**

Toutes les observations.

Canard colvert

Suivi par sites principaux de stationnement et/ou d'hivernage (arrivées, départs, ...).

Groupes de plus de 50 (?).

Données relatives à la nidification (surtout les dates extrêmes).

Canard pilet**Sarcelle d'été****Canard souchet**

Toutes les observations.

Fuligule milouin


Suivi par site de stationnement et/ou d'hivernage (arrivées, départs, ...). Groupes de plus de 20 (?).

Données relatives à la nidification.

Fuligule morillon

Suivi par site de stationnement et/ou d'hivernage (arrivées, départs, ...). Groupes de plus de 10 (?).

Données relatives à la nidification.

**Fuligule milouinan**

Toutes les observations.

Eider à duvet

Toutes les observations.

Harelde boréale

Toutes les observations.

Macreuse noire

Toutes les observations hors BMSM.

En BMSM, suivi des stationnements (préciser les limites du comptage, et indiquer une fourchette) : hivernage (octobre à mars), migration pré-nuptiale (avril) et estivage (arrivée fin juillet, maximum en août).

Macreuse brune

Toutes les observations.

Garrot à œil d'or

Toutes les observations.

Harle piette

Toutes les observations.

Harle huppé

Toutes les observations.

Données relatives à la nidification (a niché aux îles Chausey).

Harle bièvre

Toutes les observations.

Bondrée apivore

Toutes les observations.

Milan noir**Milan royal**

Toutes les observations.

Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Toutes les observations.

Autour des palombes
Toutes les observations.

Épervier d'Europe
Observations sur des sites originaux en période
internuptiale (en ville, sites côtiers...).
Déterminations des espèces capturées.
Données relatives à la nidification : éventuellement
densité de nicheurs (demande un suivi précis).

Buse variable
Concentrations hivernales.
Compilations possibles (ex : ind. sur x km de voie
express).
Déterminations des espèces capturées.
Données relatives à la nidification : éventuellement
densité de nicheurs (demande un suivi précis).

Balbusard pêcheur
Toutes les observations.

Faucon crécerelle
Données relatives à la nidification
Compilations possibles (ex : ind. sur x km de voie
express).
Rechercher la nidification en milieu urbain.

Faucon émerillon
Toutes les observations.

Faucon hobereau
Toutes les observations.
Les données du 15/10 au 15/03 doivent être très
circonscrites pour être prises en compte.



Faucon pèlerin
Toutes les observations.
Déterminations des espèces capturées.
En hiver, tenter de déterminer la sous-espèce.
Données relatives à la nidification : la réinstallation
de cette espèce en Normandie et en Bretagne étant
acquise, la progression est intéressante à suivre.

Perdrix rouge
Toutes les observations, malgré un statut réel obscurci
par les lâchers cynégétiques.

Perdrix grise
Tenter des dénombrements.
Données relatives à la nidification.
Statut réel obscurci par les lâchers cynégétiques.

Caille des blés
Tous les contacts.
Espèce soumise à de larges fluctuations sans doute
mal appréciées.
Rechercher des zones où les densités sont plus fortes
(statut mal connu en Ile-et-Vilaine).

Faisan de Colchide
Données relatives à la nidification.
Statut réel obscurci par les lâchers cynégétiques.

Râle d'eau
Toutes les observations.

Marouette ponctuée
Tous les contacts (à rechercher la nuit).

Râle des genêts
Toutes les observations.
Données négatives sur des secteurs autrefois occupés
(marais de Redon).

Gallinule poule-d'eau
Tenter des dénombrements (par étang ou par km de
rivière).
Données relatives à la nidification.

Foulque macroule
Suivi des effectifs sur les sites d'hivernage.
Données relatives à la nidification.

Huîtrier pie
Toutes les observations intérieures.
Suivi des effectifs sur les sites d'hivernage
(essentiellement BMSM).
Données relatives à la nidification, effectifs.

Échasse blanche
Avocette élégante
Toutes les observations.

Petit Gravelot
Toutes les observations.

Grand Gravelot

Toutes les observations intérieures.
Suivi des stationnements en migration et en hivernage, sur tout le littoral.
Données relatives à la nidification (non prouvée actuellement).

Gravelot à collier interrompu

Toutes les observations.

Pluvier doré

Toutes les observations.

Pluvier argenté

Toutes les observations intérieures.
Suivi des effectifs sur les sites côtiers d'hivernage (essentiellement BMSM).

Vanneau huppé

Mouvements (dès juin pour la dispersion post-nuptiale).
Suivi des effectifs sur les sites d'hivernage, noter les lieux et les effectifs en stationnement.
Données relatives à la nidification.

Bécasseau maubèche**Bécasseau sanderling****Bécasseau minute****Bécasseau de Temminck****Bécasseau cocorli**

Toutes les observations.

Bécasseau violet

Toutes les observations.
Préciser la portion de côte recensée. Compilations possibles.

Bécasseau variable

Toutes les observations intérieures.
Suivi des stationnements côtiers en migration, en hivernage et en estivage (essentiellement Rance maritime et BMSM).

Combattant varié

Toutes les observations.

Bécassine sourde

Toutes les observations.

Bécassine des marais

Espèce particulièrement difficile à recenser.
Effectifs lorsque des comptages sont possibles.
Penser aux plaines de grande culture en hiver où les effectifs peuvent être importants.
Données relatives à la nidification (y compris chant).

Bécasse des bois

Toutes les observations (espèce probablement plus répandue aux passages et en hivernage, mais assez peu d'observations).

Barge à queue noire

Toutes les observations.
Si possible, indiquer la sous-espèce (*limosa* ou *islandica*).

Barge rousse


Toutes les observations.

Courlis corlieu

Toutes les observations.

Courlis cendré

Toutes les observations intérieures.
Suivi des stationnements sur les sites côtiers en migration et en hivernage (essentiellement Rance maritime et BMSM).
Données relatives à la nidification.

**Chevalier arlequin****Chevalier gambette****Chevalier aboyeur**

Toutes les observations.

Chevalier culblanc

Toutes les observations.
Suivi de migration sur les sites intérieurs, essentiellement à l'est de l'Ille-et-Vilaine (compilation des données).
Espèce assez difficile à détecter dans certains milieux d'hivernage (prairies humides, rives de cours d'eau).

Chevalier sylvain

Toutes les observations.
Cette espèce fréquente peu (pas ?) les milieux estuariens. À rechercher sur les eaux douces, même dans des mares de dimension modeste.

Chevalier guignette

Toutes les observations.

Tournepierre à collier

Toutes les observations intérieures.
Suivi des stationnements en migration et en hivernage, effectifs et portion de côte recensée.

Labbe pomarin**Labbe parasite****Grand Labbe**

Toutes les observations.

Mouette mélanocéphale

Toutes les observations.


Mouette pygmée

Toutes les observations.

Donner si possible l'âge des individus observés.

Mouette rieuse

Estimation d'effectifs dans les dortoirs, d'août à avril.
Toutes les données relatives à la nidification.

**Goéland cendré**

Toutes les données intérieures.
Arrivées en hivernage (fin juin).
Derniers hivernants (mars, avril).
Toutes les observations entre le 1/04 et le 1/07.
Estimation d'effectifs dans les dortoirs hivernaux.

Goéland brun

Estimation d'effectifs en hiver, notamment dans les rassemblements de fin d'après-midi.
Distinguer en hiver les deux sous-espèces *graellsii* et *intermedius* (*fuscus* très improbable, mais pas rigoureusement impossible).
Toutes les données relatives à la nidification, y compris urbaine.

Goéland argenté

Estimation d'effectifs dans les dortoirs.
Distinguer en hiver deux sous-espèces *argenteus* (présente toute l'année) et *argentatus*.
Toutes les données relatives à la nidification, y compris urbaine.

Goéland leucophée

Toutes les observations.

Goéland marin

Estimation d'effectifs dans les dortoirs.
Toutes les données relatives à la nidification, y compris urbaine.

Mouette tridactyle

Toutes les observations.

Sterne caugek

Toutes les observations intérieures.
Passages migratoires.
Toutes les observations hivernales (de début novembre à fin février).
Toutes les données relatives à la nidification.

Sterne de Dougall

Toutes les observations.

Sterne pierregarin

Toutes les observations intérieures.
Passages migratoires.
Toutes les données relatives à la nidification.

Sterne arctique

Toutes les observations.
Il semblerait qu'il subsiste des difficultés pour l'identification spécifique des Sternes arctique et pierregarin, car il pourrait y avoir plus de données de Sterne arctique.

Sterne naine


Toutes les observations.

Guifette moustac**Guifette noire**

Toutes les observations.

Guillemot de Troil**Petit Pingouin**

Toutes les observations.



Pigeon colombin

Toutes les observations.

Pigeon ramier

Premiers et derniers chants

Bandes de plus de 50. Dortoirs.

Données relatives à la nidification.

Tourterelle turque

Bandes de plus de 10.

Données relatives à la nidification.

Tourterelle des bois

Arrivées, départs. Premiers et derniers chants.

Bandes de plus de 5.

Données relatives à la nidification : tenter des suivis à long terme.

Coucou gris

Arrivées, départs. Premiers et derniers chants.

Données relatives à la reproduction, en particulier espèces hôtes.

Effraie des clochers

Données relatives à la nidification.

Victimes de la circulation routière.

Indiquer phase blanche (*alba*) ou rousse (*guttata*).

Chevêche d'Athéna

Compte tenu du statut précaire de cette espèce, toutes les observations doivent être transmises.

Cadavres et causes de mortalité si détectables.

**Chouette hulotte**

Chants.

Données relatives à la nidification.

Victimes de la circulation routière.

Indiquer phase rousse ou grise.

Hibou des marais

Toutes les observations.

Hibou moyen-duc

Toutes les observations, y compris les victimes de la circulation routière.

Engoulevent d'Europe

Toutes les observations (préciser le type de contact : auditif, visuel).

Suivi à long terme de sites témoins.

Martinet noir


Arrivées, départs.

Données relatives à la nidification (suivi de sites).

Martin-pêcheur d'Europe

Toutes les observations.

Le suivi de sites est intéressant.

**Huppe fasciée****Torcol fourmilier**

Toutes les observations.

Pic cendré

Toutes les observations.

Suivi de sites (remarque valable pour tous les Pics).

Pic vert

Données relatives à la nidification.

Pic noir

Tous les lieux d'observations.

Chants, tambours.

Données relatives à la nidification.

Pic épeiche

Premiers et derniers « chants ». Tambours.

Données relatives à la nidification.

Pic mar

Tous les lieux d'observations.

Premiers et derniers « chanteurs ».

Données relatives à la nidification.

Pic épeichette

Tous les lieux d'observations.
Premiers tambours, chants.
Données relatives à la nidification.

Alouette lulu

Toutes les données relatives à la reproduction.
Suivi des sites de concentration hivernale.
Espèce à suivre particulièrement, en raison de sa régression actuelle.

Alouette des champs

Bandes de plus de 100.
Données relatives à la nidification.

Hirondelle de rivage

Arrivées, départs.
Suivi de migration (sites côtiers, étangs, ...).
Colonies : lieu, dates extrêmes d'occupation, nombre de trous, nombre de trous occupés. Une méthode consiste à partir d'un dessin (ou mieux une photo) et à cocher les trous visités.

Hirondelle rustique

Arrivées, départs.
Données relatives à la nidification.
Le suivi d'un site pendant plusieurs années est intéressant, car il est difficile de se rendre compte des tendances d'évolution d'une espèce aussi répandue. De la même façon, les nouveaux sites occupés et les sites abandonnés sont à noter.

Hirondelle de fenêtre

Arrivées, départs.
Noter les grandes colonies (plus de 50 nids).
Le suivi d'un site pendant plusieurs années est intéressant, car il est difficile de se rendre compte des tendances d'évolution d'une espèce aussi répandue. De la même façon, les nouveaux sites occupés et les sites abandonnés sont à noter.

Pipit des arbres

Arrivées, départs.
Données relatives à la nidification.

Pipit farlouse

Concentrations en période internuptiale.
Données relatives à la nidification.

Pipit spioncelle


Toutes les observations.

Pipit maritime

Toutes les observations.
Au printemps, préciser si possible la sous-espèce.

Bergeronnette printanière

Arrivées, départs.
Suivi de migration, par exemple par l'estimation des bandes sur les sites favorables.
Données relatives à la nidification.
La distinction flavéole/printanière devrait être précisée par les observateurs, car la Bretagne accueille les deux (sous-)espèces. La connaissance fine de leurs statuts respectifs est donc importante. Chercher les autres sous-espèces en migration : passage probablement rare mais régulier de *M. f. thunbergi*. Noter tous les plumages ne correspondant pas aux sous-espèces habituelles, ainsi que les cris (parfois indispensable à la détermination !). Attention : certaines sous-espèces rares sont à soumettre à l'homologation du CHN.

**Bergeronnette flavéole**

Arrivées, départs.
Suivi de migration, par exemple par l'estimation des bandes sur les sites favorables.
Données relatives à la nidification.

Bergeronnette des ruisseaux

Toutes les localités où l'espèce est présente.
Données relatives à la nidification.
Suivi de l'espèce sur les cours d'eau où elle est présente, afin de juger de l'influence des vagues de froid et, à plus long terme, de la qualité des eaux courantes.

Bergeronnette grise

Dortoirs (localisation, effectifs).
Bandes de plus de 10.
Données relatives à la nidification.
Le statut hivernal par rapport à *M. a. yarrellii* pose problème en Ile-et-Vilaine : fournir des observations circonstanciées entre octobre et février, notamment la délimitation de la coloration grise sur les flancs, la couleur du croupion...

Bergeronnette de Yarrell

Arrivées, départs.
Dortoirs. Bandes de plus de 10.

Troglodyte mignon


Toutes les observations.

Accenteur mouchet

Suivi de sites.

Rougegorge familier

Données relatives à la nidification.
Essayer de quantifier à partir de sites témoins
(notamment pour dénombrer les chanteurs toute
l'année).



Rossignol philomèle

Toutes les observations.

Gorgebleue à miroir

Toutes les observations.

Rougequeue noir

Toutes les données hivernales.
À l'intérieur, arrivées et départs.
Données relatives à la nidification.

Rougequeue à front blanc

Toutes les observations.

Tarier des prés

Toutes les observations.

Tarier pâtre

Toutes les observations hivernales (du 1/11 au 1/03).
Données relatives à la nidification.

Traquet motteux

Arrivées, départs.
Données de migration, en particulier les groupes en
secteur côtier et les petites bandes en plaine.
Données relatives à la nidification (important pour ce
nicheur en déclin).

Merle noir

Premiers et derniers chants.
Données relatives à la nidification.
Essayer de quantifier à partir de sites témoins.

Grive litorne

Toutes les observations.

Grive musicienne


Premiers et derniers chants réguliers, et chants
hivernaux (du 1/11 au 15/02).
Suivi à long terme par site, pour cette espèce sensible
aux vagues de froid.
Données relatives à la nidification.

Grive mauvis

Arrivées, départs.
Bandes de plus de 30.

Grive draine

Premiers et derniers chants réguliers, et chants
hivernaux (du 1/11 au 15/02).
Bandes de plus de 5.
Données relatives à la nidification.



Bouscarle de Cetti

Tous les lieux d'observation.
Données relatives à la nidification.
Espèce se prêtant bien à la quantification en toutes
saisons (chanteurs par km ou ha).
Suivi à long terme intéressant, car cette espèce est très
sensible à la rigueur des hivers.

Cisticole des joncs

Toutes les observations.

Locustelle tachetée

Arrivées, départs.
Données relatives à la nidification.
Noter les types de milieux fréquentés.

Locustelle luscinioides

Tous les contacts.

Phragmite des joncs

Arrivées, départs.
Données relatives à la nidification.

Rousserolle verderolle

Arrivées, premières observées (détection surtout par le chant).

Données relatives à la nidification.

Tenter des quantifications (chanteurs par km ou ha).

Rousserolle effarvatte

Arrivées, départs.

Données relatives à la nidification.

Tenter des quantifications (chanteurs par km ou ha).

Hypolaïs polyglotte


Arrivées, départs.

Données relatives à la nidification.

Fauvette pitchou

Toutes les observations.

Sa discrétion mérite que les observateurs signalent tous les contacts, tant dans ses habitats traditionnels que dans les sites où l'espèce est occasionnelle.

**Fauvette babillarde**

Toutes les observations.

À rechercher au nord, surtout sur la côte (mais possible aussi dans l'intérieur).

Fauvette grisette**Fauvette des jardins**

Arrivées, départs.

Données relatives à la nidification.

Fauvette à tête noire

Premiers et derniers chants.

Toutes les données entre le 1/11 et le 1/03.

Essayer de quantifier à partir de sites témoins.

Données relatives à la nidification.

Pouillot de Bonelli

Toutes les observations.

Il convient d'être très rigoureux sur la transmission des données. Le chant peut être confondu avec la première partie du chant du Pouillot siffleur.

Pouillot siffleur

Arrivées et départs.

Données relatives à la nidification.

Pouillot véloce

Ce pouillot est un hivernant (peu commun), en conséquence les dates de départ et d'arrivée n'ont de valeur que par rapport à un site donné.

Toutes les données hivernales (entre le 1/12 et 1/03).

Données relatives à la nidification.

Pouillot fitis

Arrivées, départs.

Données relatives à la nidification.

Cette espèce se prête bien à la quantification des chanteurs.

Roitelet huppé

Premiers et derniers chants.

Données relatives à la nidification.

Essayer de quantifier à partir de sites témoins.

Roitelet triple-bandeau

Premiers et derniers chants.

Données relatives à la nidification (particulièrement intéressantes, car l'espèce connaît une expansion de sa zone de reproduction).

Données hivernales.

Gobemouche gris

Arrivées et départs.

Données relatives à la nidification.

Signaler les départs des sites de nidification (niche souvent près des maisons).


Observations à partir du 1/08 pour mieux comprendre la migration post-nuptiale.

Gobemouche noir

Toutes les observations (préciser l'âge des individus en migration post-nuptiale).

Panure à moustaches

Toutes les observations.

**Mésange à longue queue**

Bandes de plus de 5 (?).

Données relatives à la nidification.

Mésange nonnette

En dehors des grands milieux forestiers, espèce à noter systématiquement (statut à préciser).

Données relatives à la nidification.


Mésange boréale

Toutes les observations (possible dans le nord-est du département).

Mésange huppée

Bandes hivernales de plus de 5.

Données relatives à la nidification.

**Mésange noire**

Tenter de repérer les invasions (troupes et sites inhabituels).

Données relatives à la nidification.

Mésange bleue**Mésange charbonnière**

Données relatives à la nidification.

Essayer de quantifier à partir de sites témoins.

Sittelle torchepot

Données relatives à la nidification.

Essayer de quantifier à partir de sites témoins.

Grimpereau des bois

Espèce à rechercher particulièrement.

Rappelons que les meilleurs critères sont auditifs (cris et surtout chant), mais de très bonnes conditions d'observation peuvent permettre une identification « à vue ». À noter que les cris de cette espèce peuvent être confondus avec ceux des jeunes Grimpereaux des jardins à partir du mois de mai.

Grimpereau des jardins

Premiers et derniers chants.

Données relatives à la nidification.

Essayer de quantifier à partir de sites témoins.

Loriot d'Europe

Toutes les observations.

Pie-grièche écorcheur**Pie-grièche grise**

Toutes les observations.

Geai des chênes

Toutes les observations (statut à préciser).

Pie bavarde

Dortoirs, suivis des dortoirs.

Rassemblements en période prénuptiale (effectifs).

Données relatives à la nidification.

Choucas des tours

Données relatives à la nidification (noter toutes les colonies).

Dortoirs.

Corbeau freux


Toutes les observations (statut à préciser).

Corneille noire

Dortoirs.

Données relatives aux nidifications exceptionnelles (lieux inhabituels, dates extrêmes, ...).

Concentrations en zone maritime (vasières, herbus, falaises, ...).

**Grand Corbeau**

Toutes les observations.

Étourneau sansonnet

Dortoirs (localisation, effectifs).

Essayer de quantifier la reproduction à partir de sites témoins.

Moineau domestique

Espèce difficile à suivre en raison de son caractère ubiquiste. Des suivis à long terme (plusieurs années), peuvent se révéler intéressants pour juger des tendances d'évolution.

Données relatives à la nidification aussi bien exceptionnelle (lieux inhabituels, dates extrêmes...) que banale (nombre de jeunes, date d'envol...).

Moineau friquet

Toutes les observations.

Espèce à rechercher activement en raison de sa raréfaction actuelle dont les causes semblent mal connues.

Pinson des arbres

Premiers et derniers chants.

Dortoirs (localisation, effectifs), groupes hivernaux de plus de 200.

Données relatives à la nidification.

Essayer de quantifier à partir de sites témoins.

Pinson du Nord

Arrivées et départs.

Dortoirs (localisation, effectifs), groupes hivernaux de plus de 10.

Serin cini

Toutes les observations (statut à préciser).

Estimer les densités, en particulier en milieu urbain.

Verdier d'Europe

Premiers et derniers chants.

Comptage dans les troupes de fringilles (si plus de 20 Verdiers).

Données relatives à la nidification.

Essayer de quantifier à partir de sites témoins.

Chardonneret élégant

Premiers et derniers chants.

Bandes de plus de 15.

Données relatives à la nidification.

Tarin des aulnes

Arrivées et départs.

Bandes de plus de 20.

Chants.

Linotte mélodieuse

Premiers et derniers chants.

Bandes hivernales de plus de 20.

Données relatives à la nidification.

Sizerin flammé

Toutes les observations (préciser si possible la sous-espèce *flammea* ou *cabaret*).

Bec-croisé des sapins

Toutes les observations.

Rechercher activement les indices de nidification (tôt dans la saison), particulièrement après les invasions.

Bouvreuil pivoine

Bandes de plus de 5.

Données relatives à la nidification.

Essayer de quantifier à partir de sites témoins.

Grosbec casse-noyaux

Toutes les observations.

Bruant lapon**Bruant des neiges**

Toutes les observations.

Bruant jaune

Premiers et derniers chants.

Bandes de plus de 10.

Données relatives à la nidification.

**Bruant zizi**

Toutes les observations (statut à préciser).

Bruant des roseaux

Premiers et derniers chants.

Bandes hivernales, notamment dans les zones de culture (phénomène apparemment peu cerné) et les marais.

Dortoirs (localisation, effectifs si possible) : il semble qu'ils soient à recenser plutôt le matin que le soir.

Données relatives à la nidification, et tout spécialement les sites de nidification en milieu sec.

Bruant proyer

Toutes les observations. En particulier bandes au dortoir en hiver, données relatives à la nidification.

En raison du déclin important en Grande-Bretagne dans les dernières années, des données d'absence dans des lieux autrefois fréquentés sont intéressantes.

Glossaire

Arrivées : en saison de nidification ou d'hivernage, selon les espèces.

Chants : la mention de premier et dernier chant ne vaut que pour un observateur dans sa région. Des différences notables peuvent exister entre différents secteurs de la Bretagne. Par ailleurs il peut s'agir d'un indice intéressant de l'expansion ou de la raréfaction d'une espèce. Si la détection du premier chant est en général simple, celle du dernier est plus délicate. Enfin, les oiseaux chanteurs se prêtent bien à des quantifications. Noter donc des nombres de chanteurs rapportés à des unités de surface ou de longueur sur un parcours.

CHN : Comité d'Homologation National, chargé d'estimer la validité d'une description.

Compilations : pour certaines espèces, on peut tenter des compilations. Pour les sites très bien suivis, les oiseaux séjournant longtemps peuvent faire l'objet d'une donnée par semaine/décade/quinzaine/mois/...

Dénombrement : consiste à compter des oiseaux sur un espace donné (plan d'eau, vasière, etc.), ou dans un temps donné (suivi de la migration). Synonyme : comptage.

Densité : nombre (en général de nicheurs ou de chanteurs) par unité de surface (ha, km²) ou de longueur (ex : 100 m de haie ou de rivière).

Départs : plus difficile à déceler que les arrivées, cette donnée est tout de même intéressante. Noter les individus tardifs.

Données relatives à la nidification : cantonnement, parades, transport de matériaux, construction de nid, nid, œufs, poussins, transport de nourriture, nourrissage de jeunes.

Dortoir : rassemblement d'oiseaux qui passent la nuit dans un même lieu. Les dortoirs se prêtent bien aux dénombrements.

Guet à la mer : traduction de *seawatching*. Donner par espèce, en plus des données habituelles de date et de lieu, les effectifs et la durée de la séance de guet à la mer (voir fiche). Pour les observateurs assidus sur un site, on pourra regrouper des données par semaine/décade afin de ne pas trop encombrer le fichier.

Intérieur (site ou observation) : il est intéressant de noter des données de l'« intérieur des terres » pour certaines espèces fréquentant par ailleurs couramment le littoral.

Lieux : pour certaines espèces dispersées, le signalement de la présence dans un lieu est intéressante, même s'il n'est pas nécessaire de noter tous les contacts avec l'espèce.

Observation : le terme d'observation est systématiquement utilisé, même si dans certains cas il peut s'agir de contact auditif (cri, chant).

Quantification : toute tentative de chiffrage sur un phénomène observé (voir dénombrement ou densité).

Suivi : action qui consiste à suivre un phénomène (par exemple stationnement d'oiseaux d'eau sur un étang, nidification d'une espèce, etc.).

Guet à la mer

Il s'agit de noter les oiseaux qui passent devant une pointe rocheuse pendant un temps donné :

- espèce
- nombre
- direction (ou localisation pour les groupes stationnés)
- conditions météo
- durée de l'observation

Attention : la durée de l'observation doit être précise et suffisamment longue. Il ne faut surtout pas rapporter des données à l'heure à partir de 20 minutes, par exemple.

Exemple :

Pointe du Grouin/Cancalle, le 27/08/2025 ; de 9h00 à 10h00 ; vent de S.E. force 4, ciel clair, bonne visibilité

Espèce	dépl. vers l'ouest	dépl. vers l'est	ind. stationnaires
Fou de Bassan			50 en pêche en BMSM, rejoints par 17 ~10 près de l'île des Landes ~100 près de l'île des Landes
Grand Cormoran			
Cormoran huppé			
Grèbe huppé	8		250 en pêche à 2 miles à l'est (BMSM)
...			
Puffin de Méditerranée			
Sterne caugek	25	30	
Sterne pierregarin	250	12	
Sterne de Dougall	1		
Mouette pygmée	10 en un groupe		
Frégate magnifique	25 *		
...			

* : à cause du réchauffement de la planète...

Envoyer le tableau tel quel pour faciliter les interprétations futures.

Familles et espèces à signaler :

- plongeurs
- grèbes
- fulmar, puffins, océanites
- fous, cormorans
- hérons, aigrettes, spatules, cigognes
- ansériformes
- rapaces
- limicoles
- lariformes
- (passereaux : migration côtière peu connue actuellement en Ile-et-Vilaine ; y a-t-il des voies de passage importantes ?)

Dans le cas d'un guet en milieu terrestre, on procédera de la même manière pour la prise de données, mais cela concernera sans doute plutôt les passereaux. En cas de vague de froid, on peut aussi répertorier les espèces filant vers le sud (vanneaux, pluviers, grives, ...).

Statut européen des espèces en Ile-et-Vilaine

Les listes ci-dessous reprennent les espèces dont le statut de conservation à l'échelle européenne est préoccupant.

Ces informations sont reprises des pages 773 à 782 de :

E.J.M. Hagemeijer and M.J. Blair (Editors). 1997.

The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance

T. & A.D. Poyser, London.

Les espèces sont catégorisées sous l'appellation SPEC (Species of European Conservation Concern) de la manière suivante :

- SPEC cat 1 : espèce concernée par des mesures de conservations (urgentes) ;
- SPEC cat 2 : conservation défavorable, espèce concentrée sur des zones spécifiques en Europe ;
- SPEC cat 3 : conservation défavorable, espèce non concentrée en Europe ;
- SPEC cat 4 : conservation favorable mais espèce concentrée en Europe ;
- Non-SPEC : pas de problèmes décelables.

SPEC cat 1 :

Mis à part le Rôle des genêts, espèce potentielle dans notre département, il n'y pas d'espèce dans cette catégorie.

SPEC cat 2 :

Puffin des Anglais
Océanite tempête
Fou de Bassan
Cigogne blanche
Perdrix rouge

Barge à queue noire
Chevalier gambette
Goéland cendré
Sterne caugek
Engoulevent d'Europe

Pic vert
Alouette lulu
Rougequeue à front blanc
Fauvette pitchou

SPEC cat 3 :

Plongeon catmarin
Plongeon arctique
Butor étoilé
Blongios nain
Bihoreau gris
Cigogne noire
Bernache cravant
Canard chipeau
Canard pilet
Sarcelle d'été
Fuligule milouinan
Macreuse brune
Harle piette
Milan noir
Busard Saint-Martin
Balbusard pêcheur

Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Perdrix grise
Caille des blés
Gravelot à collier interrompu
Bécasseau maubèche
Bécasseau variable
Bécassine sourde
Bécasse des bois
Barge rousse
Courlis cendré
Chevalier sylvain
Mouette pygmée
Sterne de Dougall
Sterne naine
Guifette moustac

Guifette noire
Tourterelle des bois
Chouette effraie
Chevêche d'Athéna
Hibou des marais
Martin-pêcheur d'Europe
Torcol fourmilier
Pic cendré
Alouette des champs
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Tarier pâtre
Gobemouche gris
Pie-grièche écorcheur
Pie-grièche grise

Ne sont pas concernées des espèces comme le Petit Pingouin (SPEC cat 4) ou le Guillemot de Troïl (non-SPEC).

