

LE GREBE N ° 5

**PUBLICATION DU GROUPE
ORNITHOLOGIQUE
D' ILLE ET VILAINE**

**Groupe ornithologique
S.E.P.N.B.
Maison de la Consommation
et de l'Environnement
48 boulevard Magenta
35000 RENNES**

99.30.35.50

OCTOBRE 1990

LE GREBE N ° 5

SOMMAIRE :

- pages 2 à 4 : Informatisation des données,
texte de Christophe WINCKLER.
- page 5 : Les faits marquants de l'année 1987
- pages 6 à 8 : Bulletin météo de l'année 1987
- page 13 : Liste des observateurs pour l'année 1987
- pages 14 à 94 : Actualités ornithologiques pour l'année 1987
- Groupe 1 A : Christophe WINCKLER
Groupe 1 B : Guy-Luc CHOQUENE
Groupe 2 : Jean-Luc CHATEIGNER
Groupe 3 A : Patrick LE MAO
Groupe 3 B : Caroline HOUALET
Groupe 4 : Jean-Luc CHATEIGNER et
Caroline HOUALET
Groupe 5 : Joseph LE LANNIC
- pages 95 à 96 : Un cas d'hybridation entre le goéland argenté
(Larus argentatus) et le goéland brun (Larus
fuscus),
texte de Patrick LE MAO.
- pages 97 à 98 : Quelques données quantitatives sur l'avifaune
de l'étang de Marcillé Robert,
texte de Jean-Luc CHATEIGNER.
- page 99 : Nidification du bec croisé en forêt de Rennes,
texte de Jean-Luc CHATEIGNER.

Couverture réalisée par Philippe GALARD.

Un grand merci à Philippe GALARD, Pierre TILLIER et Laurent CHATAIGNERE pour leurs superbes illustrations, ainsi qu'à Christophe WINCKLER, Caroline HOUALET, Jean-Luc CHATEIGNER, Jacques OLLO, Joseph LE LANNIC, Patrick LE MAO et Guy-Luc CHOQUENE pour leur travail de saisie, de rédaction et de mise en forme du Grèbe n° 5.

INFORMATISATION DES DONNEES ORNITHOLOGIQUES

par Christophe WINCKLER

L'informatisation des données n'est plus un mythe ou un but qu'il faudrait atteindre, c'est aujourd'hui une réalité. Toutes les informatisations transmises sont maintenant saisies, puis stockées sur disquette. Pour chaque observation sont concernées : l'espèce (voir pages 5 à 9), la date, le code INSEE de la commune (voir pages 10 à 12), le lieu-dit, le nombre d'individus, des remarques éventuelles, et bien sûr le nom de l'observateur. L'opération de saisie paraît au premier abord fastidieuse, mais que d'avantages :

- Tri automatique des données, par espèce et par date en vue de la compilation
- Archivage sûr et réutilisable des données dans le but de recherches ultérieures
- exemple : - liste des observations sur un site donnée
 - liste des observations d'hirondelles rustiques pendant les mois d'avril 87, 88 et 89
 - histogramme d'une espèce sur un site
 - etc

D'autres avantages existent et parmi eux la représentation cartographique des données. C'est ainsi que pour les données de 1987, nous avons pu sortir les cartes de prospection d'Ille et Vilaine par commune. La carte n° 1 (voir page 3) met en évidence les sites bien prospectés alors que la carte n° 2 (voir page 4) ceux qui ne le sont pas. On constate rapidement que 7 communes totalisent 40 % des données !

Beaucoup d'autres représentations graphiques, en traitement des données sont maintenant possibles grâce à l'informatique. Prospectez !

p.s. : Si certains souhaitent et ont le moyen de saisir leurs propres observations, cela allègera d'autant les tâches de saisie.


Matériel nécessaire : IBM PC ou compatible avec disque dur de préférence.

Contact : Christophe WINCKLER

5 rue Duperré
35400 Saint-Malo
99-82-39-69


CARTE 1 : SITES REGULIEREMENT VISITES

ILLE-ET-VILAINE 1987



CARTE 2 : SITES NON OU PEU VISITES

ILLE-ET-VILAINE 1987



LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 1987

L'hiver très froid de 1986/87, amena avec lui des oiseaux nordiques rarement observés dans notre région : le cygne sauvage, le cygne de Bewick, l'oie des neiges ou encore la linotte à bec jaune.

Mais c'est surtout la présence importante des hivernants sur le littoral qui est réellement représentative de la rigueur de l'hiver : environ 41 800 bécasseaux variables, 18 100 huitriers pies, 5 200 bécasseaux maubèches, 4 700 bernaches cravants, 4 500 canards siffleurs, 3 000 tadornes de Belon, 2 500 macreuses noires, 2 500 barges rousses, 1 500 barges à queue noire, 150 macreuses brunes, 150 harles huppés. Cette multitude d'oiseaux attire forcément les prédateurs dont plusieurs faucons pèlerins.

Malgré la glace, les étangs accueillent aussi de nombreux canards, notamment pas moins de 9 000 fuligules milouins, ou encore environ 40 harles piettes et 50 harles bièvres. Plus surprenant, la présence d'oiseaux inhabituels sur les étangs : 6 fuligules milouinans et 2 eiders à duvet.

A la fin de l'hiver, les sizerins flammés et surtout les becs croisés des sapins sont régulièrement observés, à tel point que l'on peut considérer comme une invasion la présence de la dernière espèce.

Cette présence va persister jusqu'à provoquer la première surprise du printemps : la reproduction du bec croisé en forêt de Rennes (voir article page 99).

Autres surprises de ce printemps 87 :

- la première reproduction du pingouin torda en Ille et Vilaine,
- le retour du blongios nain (le dernier couple a niché dans le département en 1969, voir Ar Vran tome 2 fascicule 4),
- les premières preuves de nidification du pic noir en Bretagne,
- la progression de la fauvette babillarde sur le littoral,
- l'augmentation importante des colonies de reproduction de sternes pierregarins, de grands cormorans, de cormorans huppés et de hérons cendrés;

D'autre part, un faucon pèlerin survole une caserne à Rennes (surement un espion !).

Comme chaque année, les migrations sont riches en émotions et permettent aux ornithologues de s'enthousiasmer de nouveau.

En 1987, on retiendra au "hit" des observations : les nombreuses spatules blanches mais aussi les cigognes noires et blanches, le milan royal, le pipit rousseline, la corneille mantelée, le bruant des neiges ou encore le merle à plastron.

Dans le même registre, le premier suivi de la migration postnuptiale sur le lac de Haute-Vilaine/la Chapelle Erbrée a prouvé son intérêt. Au programme parmi les nombreuses espèces observées : 1 chevalier stagnatile, 1 labbe parasite, 1 balbuzard pêcheur, 1 grèbe jougris.

A partir de novembre les premiers bruants lapons et les alouettes haussecols annoncent l'hiver où les oies à Chatillon en Vendelais seront à l'honneur : 11 oies des moissons, 4 oies rieuses, 39 oies cendrées et 19 bernaches nonnettes.

Bulletin météo de l'année 1987

L'hiver 1986/87 est marqué par un mois de janvier particulièrement froid (22 jours de gelées).

Une vague de froid s'abat sur toute la France pendant la deuxième décade de janvier.

Des températures excessivement basses sont notées un peu partout. Un tel coup de froid n'est pas sans conséquence sur l'avifaune.


Février et surtout mars restent froids (10 et 9 jours de gelées).

Avril sera un mois chaud et plus spécialement pendant la dernière décade.


Si les températures du reste de l'année sont dans les moyennes, il n'en est pas de même des précipitations, en effet, deux mois ont été particulièrement pluvieux : juin et octobre.

Le mois de juin humide a surement été préjudiciable pour une bonne reproduction.


températures minimales en C
moyennes mensuelles a Rennes St-Jacques




températures maximales en C
moyennes mensuelles a Rennes St-Jacques




nbre mensuel de jours de précipitations a Rennes St-Jacques



Hauteur mensuelle des précipitations a Rennes St-Jacques





ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

Année 1987

Liste des observateurs en 1987 :

BELLIER Daniel

JOLY Jean-Marc

BORET Michel

LADET Alain

CADOR Marcel

LAIR Jean-Michel

CHATEIGNIER Jean-Luc

LE GUEN Pascal

CHOQUENE Guy-Luc

LE LANNIC Joseph

CONTIM Philippe

LE MAO Patrick

DELEPORTE Pierre

LEDARD Michel

FOUILLET Philippe

LOUIS Jean-Yves

GAUDEMER Bruno

MAHEO Roger

GELINAUD Guillaume

MARECHAL Franz

GOHIER Lionel

PIGEARD Jean-Paul

GOHIER Régis

PILARD Philippe

GUILLEMOT Bernard

PUSTOC'H Fanch

HELSENS Bertrand

QUAINTENNE Michel

HOUALET Caroline

THEBAULT Laurent

JAGOREL Roger

WINCKLER Christophe

total : 32 observateurs

avec la collaboration de quelques anonymes de l'ex Centrale Ornithologique Bretonne, de M.N.E. (Mayenne Nature Environnement) et de la S.E.P.N.B. (Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne).

Groupe 1 A :

PLONGEON SP. (*Gavia sp.*) : 1 donnée

2 sur la Rance le 3/12

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) : 6 données

Fin hivernage 86/87 :

Espèce notée en faible nombre sur la côte et sur la Rance, dont la présence est à mettre sur le compte de la vague de froid : 2 le 18/01 sur la Rance, 2 le 1/02 à la pointe du Grouin/Cancale, 2 le 1/02 dans l'anse Duguesclin/St-Coulomb, 1 le 8/02 à la pointe du Meinga/St-Coulomb.

Migration pré-nuptiale :

1 le 21/03 à Orgères

Début hivernage 87/88 :

1 le 13/12 sur la Rance

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) : 4 données

Fin d'hivernage 86/87 :

1 immature le 8/01 sur la Rance, 1 le 8/02 à la pointe du Meinga/St-Coulomb

Migration post-nuptiale :

Un passage est signalé fin novembre sur la côte : 5 le 29/11 dans l'anse Duguesclin/St-Coulomb, 1 le 30/11 sur la Rance

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*) : 58 données

Fin hivernage 86/87 :

Les principales observations sont faites sur la Rance : 52 le 18/01. Des troupes importantes y sont notées jusqu'en mars : 30 le 1/03 à St-Suliac. Les observations sur les plans d'eau de l'intérieur sont peu nombreuses et concernent des groupes inférieurs à 3. L'hivernage est signalé sur le lac de la Chèze/St-Thurial, dans les gravières de Bruz et à Rennes.

Nidification :

Le retour sur les sites de nidification n'a été noté que dans la deuxième quinzaine de mars.

Sites où la nidification a été observée :

Etang de Paintourteau/Erbrée : 2 couples le 26/3, 4 adultes + 5 juvéniles le 14/07

Forêt de Bourgouet/Dingé : 5 adultes + 3 juvéniles le 19/06

Etang de Chatillon en Vendelais : 5 adultes + 1 juvénile le 5/07

Parc des Gayeulles/Rennes : 1 le 13/06 et 20/06, 1 poussin le 6/07

Des sites occupés pendant la période de nidification :

Etang de Marcillé-Robert : 1 adulte en plumage d'été le 4/04, 1 chanteur le 12/04, 2 le 31/05

Anse du Verger/Cancale : 1 le 5/07

Migration post-nuptiale :

La dispersion a lieu dès la première décade d'août, la Rance apparaît comme un site majeur pour notre département.

Rance 13/07 11/08 28/09 11/10 1/11 22/11 12/12 14/12
2 30 32 36 53 24 47 32

Sites de l'intérieur : En dehors d'une donnée en août (13 le 15/08 à Paintourteau), ce n'est que fin octobre que l'espèce y est rencontrée en petits groupes ou de façon isolée :

Etang de Paintourteau/Erbrée : 1 le 5/11

Etang de Chaillou/Montauban : 15 le 31/10, 2 le 11/11

Barrage du Couesnon : 1 le 4/11, 7 le 14/11, 6 le 21/11

Lac la Valière /Vitré : 1 le 14/11

Etang de la Bézardière/Hédé : 1 les 25/10 et 21/11

GREBE HUPPE (*Podiceps cristata*) : 192 données

Fin d'hivernage 86/87 :

La vague de froid survenue au début du mois de janvier, ayant entraîné le gel des étangs, a eu pour conséquence un afflût des individus chassés par le gel sur la côte. Pendant le même moment la population de la Rance était à son niveau habituel soit 58 le 18/01.

St-Malo : hivernage inhabituel par le nombre, 68 le 21/01, 75 le 8/02

Dinard : 16 le 18/01

Havre de Rothéneuf/St-Coulomb : 13 le 18/01, 12 le 1/02

Seuls les sites intérieurs suivants ont accueillis des groupes notables:

Lac de la Chèze/St-Thurial : 10 le 17/01, 15 le 31/01

Gravières de Bruz : 20 le 8/01, 30 le 12/01, 18 le 4/02, 21 le 12/02, 28 le 14/03

Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée : 7 le 11/01, 8 le 13/01, 12 le 17/01, 1 le 5/02, 4 le 12/02, 11 le 17/02

Lac la Valière/Vitré : 11 le 17/01

Le dégel a lieu début février et s'est traduit par un retour abondant des observations sur les étangs et par une régression des effectifs de la côte.

Migration pré-nuptiale :

Durant le mois de février les observations sur les plans d'eau de l'intérieur deviennent courantes. Les premiers individus en plumage nuptial sont notés le 20/02 à Hédé.

Des mouvements sont signalés également en mars sur les étangs :

Etang Ste Suzanne/St Coulomb : 12 le 3/03, 23 le 4/03

Etang Paintourteau/Erbrée : 8 le 18/03, 20 le 26/03, 20 le 5/04, 6 le 30/04

Lac Haute-Vilaine/la Chapelle-Erbrée : 33 le 12/03, 10 le 19/03, 11 le 20/03, 16 le 26/03, 8 le 4/04, 17 le 17/04, 27 le 30/04.

Après mi-avril les bandes deviennent rares, signalons cependant :

30 les 21 et 23/05 à Paintourteau/Erbrée

20 le 14/06 à Carcraon/Domalain

Nidification :

étang de Marcillé-Robert : 3 couples le 12/04, 1 couple le 20/04

étang de Teillay : 1 couple le 6/06 avec nid

étang de Ste Suzanne/St Coulomb : 3 couples + 1 pulli le 5/05, 16 ad +10 juv le 14/07

Gravières de Bruz : 2 couples le 5/5, 3 couples le 10/5

étang Pont Domjean/Paimpont : 3 couples dont 1 nid occupé le 8/05, 3 nids occupés le 5/07

étang Villecartier/Bazouges la Pérouse : 2 ad + 3 juv le 2/06

étang d'Andouille-Neuville : 6 ad + 3 juv le 6/06

étang de Trémelin/Iffendic : 1 couple le 11/06

étang de Beaufort/Plerguer : 2 couples avec pulli le 28/06

étang de la Ville Alain/Sains : 1 couple avec 3 pulli le 11/07

Migration post-nuptiale :

Les premières observations sont très précoces et concernent certainement des estivants non nicheurs : 9 le 25/06, 8 le 27/06, 11 le 5/07 sur la Rance et 50 le 5/07 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

L'absence de données en juillet ne permet pas de suivre le début de la dispersion postnuptiale. Les données ultérieures de la Rance mettent en évidence un premier passage début septembre, puis un deuxième en octobre.

Rance :	2/8	11/8	6/9	28/9	11/10	1/11
	31	62	+80	62	144	93

Etangs de l'intérieur : Les données sont rares en août et septembre et ce n'est qu'à partir de la mi-octobre que les observations deviennent plus nombreuses.

Lac de la Chèze/St Thurial : 25 le 13/09

Etang de Bazouges/Hédé : 12 les 18 et 25/10, 10 le 8/11, 14 le 21/11

Paintourteau/Erbrée : 38 le 2/11, 47 le 5/11, 29 le 21/11, 10 le 29/11

Etang de Ste Suzanne/St Coulomb : 6 le 11/10, 11 le 9/11, 11 le 16/11, 7 le 21/11,

5 le 19/12

Gravières de Bruz : 27 le 27/11

Début hivernage 87/88 :

Littoral : observations dès le début de la 2^e quinzaine de novembre d'individus isolés ou en petits groupes.

Sites de l'intérieur : le mois de décembre est marqué par une vague de froid subite le 11, entraînant le gel de la plupart des étangs. On assiste à la désertification de ces sites et à une concentration des effectifs sur la Rance : 202 le 12//12 (chiffre exceptionnel).

Le dégel est rapide permettant aux oiseaux de se disperser à nouveau : 82 le 14/12 sur la Rance, 15 le 18/12 sur l'étang de Paintourteau, 27 le 28/12 aux Bougrières/Gravières de Bruz, 2 du 6/12 au 31/12 sur le lac de Haute Vilaine/La Chapelle-Erbrée.

GREBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*) : 4 données

1 le 8/02 sur le Couesnon/Baie du Mont St-Michel et 1 les 22/03 et 30/04 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

En migration post-nuptiale une donnée précoce : 1 le 14/09 sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-Erbrée.

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) : 10 données

Fin d'hivernage 86/87 : Noté principalement sur la côte par groupes de 1 à 4 individus : St Malo (Vieille ville), St Enogat/Dinard, l'Islet/St Briac, La Guimorais/St Coulomb, Pte du Nid/Cancale.

Un individu est observé sur le lac de Haute-Vilaine à la Chapelle-Erbrée du 5/02 au 8/02.

Début hivernage 87/88 : 1 le 29/11 à La Guimorais/St Coulomb.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) : 37 données

Fin hivernage 86/87 : L'hivernage de cette espèce ne concerne pratiquement que la Rance (28 le 18/01) et quelques localités côtières abritant 1 à 4 individus.

Migration pré-nuptiale : 12 le 4/04 en plumage nuptiale sur la Rance.

Un estivage est noté à Paintourteau/Erbrée tout au long du printemps :

1 les 23/05 et 14/6, 2 le 23/06, 1 le 5/07.

Migration post-nuptiale : La dispersion a lieu dès le mois de juillet : 4 en plumage nuptial le 5/07 sur la Rance, 1 le 12/07 au Sillon/St Malo.

Les données ultérieures concernent principalement la Rance, site majeur pour le département .

Rance	11/08	28/09	11/10	1/11	22/11
	8	58	61	87	48

Sur les sites de l'intérieur, les données concernent 1 ou 2 individus isolés :
étang de Chatillon en Vendelais : 2 le 27/09, 1 le 18/10, 1 les 5/11 et 14/11

étang de Paintourteau/Erbrée : 2 les 16/10 et 18/10, 1 les 5/11 et 14/11

étang du Boulet/Feins : 2 le 17/10

Début hivernage 87/88 : La vague de froid du 11/12 ayant entraîné le gel de la plupart des étangs provoque un afflux exceptionnel sur la Rance : 147 le 12/12.

L'espèce n'est plus notée sur les autres sites.

PETREL FULMAR (*Fulmarus glacialis*) : 3 données

Les observations trop peu nombreuses concernent à chaque fois des individus isolés aux mois de mai et d'août.

FOU DE BASSAN (*Sula bassana*): 11 données

En période de reproduction :

1 le 19/04 à la Pte du Grouin/Cancale et 1 adulte le 30/05 à St Malo.

Migration post-nuptiale :

Des observations régulières de 1 à 7 individus sont faites au large de la Pointe du Grouin/Cancale, site de passage habituel. D'autre part 4 cadavres sont trouvés à l'étang de la Bézardière/Hédé le 6/11, suite à la tempête qui a ravagé les côtes bretonnes fin octobre.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*): 99 données

Fin d'hivernage 86/87 :

L'intensité de la vague de froid se traduit par des chiffres importants au niveau des dortoirs : Ilot de Bizeux/Rance : 146 le 17/01

Gravières de Bruz :

8/01	12/01	13/01	15/01	18/01	31/01	14/03	23/03
18	64	88	48	30	9	7	10

Notons également 55 en vol le 19/01 à Rennes.

Sur les étangs de l'intérieur, les individus sont en petits groupes de 1 à 4 et sont notés jusqu'à fin mars-début avril.

Reproduction :

Le retour sur le Grand Chevreuil/St Coulomb a été noté le 30/12 : 3 ind.

Sites de reproduction : Le recensement des oiseaux marins nicheurs en 1987 a permis un comptage exhaustif des îlots : TOTAL = 299 nids.

Nous assistons à une véritable expansion de l'espèce. Le nombre de nids a doublé en 2 ans. Cela s'est produit sur les sites traditionnels de Cancale et grâce à la colonisation de nouveaux îlots (Grand Chevreuil et île Agot).

Cette augmentation a permis de dépasser le précédent record de 1983 qui était de 193 couples.

Ile des Landes/Cancale : 137 nids le 17/05

Le Chatelier/Cancale : 92 nids le 17/05

Gd Chevreuil/St Coulomb : 69 nids le 24/05

Ile Agot/St Briac : 3 ad. dont 1 près d'un nid vide

Sites de nourrissage : 2 sites majeurs, la baie du Mont St-Michel et la Rance
80-100 ad. le 13/04 et 45 ad. le 15/06 aux Hermelles/Baie du Mont St Michel,

20 ad. + 2 imm. le 25/05 à l'embouchure de la Rance,


20 ad. le 28/05 sur la Rance.

Migration post-nuptiale et début hivernage 87/88 :

Les premiers individus sont notés dès le début du mois d'août sur les sites intérieurs : 4 le 7/08 à l'étang des Rochers/Redon, 1 le 9/08 à Chatillon en Vendelais, 1 le 11/08 sur la rivière Kerson/Goven.

Les observations deviennent plus nombreuses à partir de septembre et surtout d'octobre. Un suivi des dortoirs aurait permis de mieux appréhender les effectifs. 1 à 3 ind. à Chatillon-en-Vendelais jusqu'à décembre, recrudescence fin décembre : 6 le 26/12, 11 le 31/12.

1 à 5 ind. à Paintourteau/Erbrée de fin septembre à fin décembre.



CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*) : 12 données

Reproduction :

Le dénombrement des oiseaux marins nicheurs de 1987 a permis de visiter tous les îlots côtiers du 17 au 31/05 et de faire un recensement précis de l'espèce.

Le Herpin/Cancale :	11 nids	Le Bénestin/St-Malo :	9 nids
Le Châtelier/Cancale :	26 nids	Ile Cézembre/St-Malo :	90 nids
Les Rimains/Cancale :	6 nids	Petite Conchée/St-Malo :	3 nids
Ile des Landes/Cancale : ..	244 nids	Ile Bizeux/St-Malo :	16 nids
Grand Chevreuil/St-Coulomb : ..	188 nids	Ile Agot/St-Briac :	4 nids

total :597 nids

Ce dénombrement traduit une forte progression des effectifs nicheurs sur l'île des Landes où 160-170 couples avaient été trouvés en 1985.


Automne début hivernage 87-88 :

Quasi absence d'observations. 21 le 28/08 à la Pointe du Grouin/Cancale, 25 dont 11 juv. le 11/10 à l'île au Moine (ou île Notre Dame)/Rance.

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*) : 1 donnée

Une donnée de nidification particulièrement rare pour cette espèce : le 1/07 sur le Frémur/Pleurtaut : 1 couple avec 2 juvéniles.

Il est intéressant de rappeler le dernier cas connu de nidification de cette espèce dans notre département : un couple s'est reproduit 2 années de suite 1968 et 1969 sur l'étang de Marcillé-Robert (Voir article de B. Le Garff dans AR VRAN tome X).



AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*): 31 données

Cette espèce est notée régulièrement sur la côte et la Rance Maritime tout au long de l'année, hormis pendant la période de reproduction.

Fin hivernage 86/87 :

L'espèce est présente sur la Rance en petit nombre (2 ind.). Un passage semble ressenti début mars : 6 le 1/03.

Dernière observation : 2 le 13/04.

Migration post-nuptiale :

L'essentiel des observations nous vient à nouveau de la Rance Maritime avec une concentration des effectifs dans la deuxième quinzaine d'août.

Rance Maritime:

30/06	13/07	11/08	23/08	28/09	11/10	28/10	1/11	22/11	10/12
1	2	17	28	7	11	6	5	1	1

Les sites du littoral sont occupés plus tardivement par des individus disséminés : Havre de Rothéneuf/St-Coulomb : 1 les 24/10 et 1/11, 3 le 8/11, 2 le 28/11, 1 le 13/12.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*): 90 données

Fin hivernage 86/87 :

L'espèce est notée sur l'ensemble du département en petits groupes : 6 le 4/01 sur la Rance, 13 le 13/01 à Chatillon en Vendelais, 13 le 11/02 sur l'étang du Pas du Houx/Paimpont.

En mars et avril, le littoral et la Rance Maritime sont désertés, alors que sur bons nombres d'étangs des observations de 2 à 6 individus sont faites.

Nidification :

L'installation sur les nids est noté dès le 22/02 dans le marais de Gannedel.

Les 2 colonies traditionnelles recensées :

Marais de Gannedel/La Chapelle de Brain : 60-70 nids le 20/04 (stable)

Champcours/Gravières de Bruz : 33 nids le 10/05 (en augmentation).

Dispersion post-nuptiale :

Les observations précoces concernent surtout la Rance Maritime et certains sites de l'intérieur.

La dispersion est notée dès la dernière décade de mai.

Rance Maritime:

20/05	29/05	12/06	25/06	11/08	6/09	4/10	1/11	22/11
1	7	15	25	41	43	46	10	11

Etang de Paintourteau/Erbrée :

21/05	23/05	14/06	12/07	20/08	20/09	2/11
6	20	15	32	15	29	35

Etang Chatillon-en-Vendelais : 18 le 12/07, étang Carcraon/Domalain : 17 le 14/06.

Alors que les groupes importants disparaissent de la Rance en novembre, les sites littoraux sont visités : 4 le 1/11 au Bénestin/St Malo, 1 le 11/11 au havre de Rotheneuf/St Coulomb.

HERON POUPRE (*Ardea purpurea*): 1 donnée

1 en vol le 24/03 à St Méen-le-Grand.

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) : 1 donnée

1 juvénile le 30/09 en vol à St Lunaire en provenance du NNW (depuis les îles anglo-normandes ?).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) : 1 donnée

1 le 30/05 en vol vers l'ouest à Teillay.

IBIS SACRE (*Threskiornis aethiopa*): 1 donnée

1 le 30/05 en vol vers l'ouest à Teillay (sans doute échappé d'un zoo !).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*): 8 données

L'espèce fréquente la partie est du département pendant les 2 migrations.

Migration pré-nuptiale :

1 ad. le 5/04 sur l'étang de Chatillon en Vendelais et 1 ad. le 23/05 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

Migration post-nuptiale :

étang de Paintourteau/Erbrée : 1 le 20/09, 8 le 16/10.

étang de Marcillé-Robert : 12 le 30/09,

baie du Mont St-Michel : 1 le 17/11.

CYGNE Sp. (*Cygnus sp.*): 4 données

2 en vol à Rennes les 20 et 27/01 puis 3 du 31/01 au 2/02 à Montauban.

CYGNE TUBERCULE (*Cygnus olor*) : 4 données

Des individus isolés ont été notés en février sur 3 sites : Rance le 30/01, Hédé les 14 et 20/02, Montauban le 15/02.

CYGNE SAUVAGE (*Cygnus cygnus*): 3 données

1 le 14/02 en baie du Mont St Michel et 2 les 5/12 et 6/12 à Marcillé Robert (1 ad. et 1 imm.).

CYGNE DE BEWICK (*Cygnus bewickii*): 2 données

3 ad. et 1 imm. notés les 17/01 et 14/02 en baie du Mont St-Michel.

OIE Sp. (*Anser sp.*) : 3 données

Hiver 86/87 :

39 en vol vers SW à St Malo le 14/01

Hiver 87/88

70 en vol vers le sud le 2/11 au Sel de Bretagne et 12 en vol vers le SW le 2/12 à Québriac.

OIE DES MOISSONS (*Anser fabalis*): 4 données

Hiver 86/87 : 2 le 22/01 en baie du Mont St-Michel

Hiver 87/88 : stationnement précoce à Chatillon en Vendelais, à mettre sur le compte de la vague de froid du 11/12 : 11 du 12/12 au 3/01/88.

OIE RIEUSE (*Anser albifrons*): 2 données

4 le 20/12 sur l'étang de Chatillon en Vendelais.

OIE CENDREE (*Anser anser*): 13 données

Les données proviennent de sites de l'est du département sur l'axe migratoire.

Fin hivernage 86/87 :

Un stationnement de 2 individus est noté du 4/01 au 15/02 sur l'étang de Chatillon en Vendelais. D'autres sont notés en vol en baie du Mont St-Michel : 4 le 17/01, 13 le 29/01.

Migration pré-nuptiale :

1 le 17/09 à Marcillé-Robert, 21 le 20/10 à Paintourteau/Erbrée et 6 le 5/11 au Vivier-sur-Mer. Un passage est ressenti début décembre, suivi d'observations régulières à Chatillon en Vendelais.

Baie du Mont St-Michel : 21 le 5/12

Châtillon en Vendelais : 39 le 5/12, 8 les 12 et 13/12, 1 le 20/12.

OIE DES NEIGES (*Anser caerulescens*): 1 donnée

2 le 22/01 en baie du Mont St-Michel.

Groupe 1 B

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucoptera*): 7 données

1 observation tardive de printemps : 1 en vol vers l'ouest le 26/04 en baie du Mont st-Michel.

Une donnée surprenante : 1 sur l'étang de St-Suzanne St-Coulomb le 13/07 (peut-être un individu échappé de captivité ?).

20 bernaches nonnette sont observées en baie du Mont St-Michel le 11/12 puis 19 stationnent sur l'étang de Chatillon en Vendelais du 20/12 au 12/01/88. Il est à noter que la mise en réserve de cet étang, permet aux oies de séjourner sur ce site, même si le cadavre trouvé le 13/01/88 mérite une explication.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*): 54 données

Hivernage 87/88 :

	15/12/87	15/01/88	15/02/88	15/03/88
baie du Mont St-Michel	1300	2700	4700	2150

Pas de grosses surprises, mises à part les 6 bernaches cravant à ventre clair (B.b.hrota) observées le 11/01 dans l'anse du Garo sur la Rance.

Les 3 dernières bernaches sont observées le 11/01 dans le port de Cancale.

Observations sur les plans d'eau intérieur :

1 du 28/12/86 au 08/01/87 sur l'étang de Chatillon en Vendelais et 1 du 5/03 au 26/03 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

Printemps : 1 individu est observé le 1/05 dans l'anse du Garo/Rance

Migration pré-nuptiale : Les premiers retours sont signalés le 12/08 avec 6 individus en vol de l'est vers l'ouest à la pointe du Grouin/Cancale. Puis à partir du 22/10 à Cancale avec 25 individus et le 23/10 avec 180 individus en vol au dessus de la Rance.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*): 81 données

Hivernage 86/87 :

	28/12/86	11/01	18/01	03/03	12/04	28/04
Rance maritime	271	613	2100	761	452	200
		17/01	20/01	01/02	06/03	
baie du Mont St-Michel		610	1065	1391	725	

Sites intérieurs :

2 le 22/01 dans les gravières de Bruz, 2 les 7 et 8/02 puis le 29/03 sur l'étang de Chaillou/Montauban, 8 le 27/02 sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-Erbrée, 1 le 8/03 à Chatillon en Vendelais et enfin 80 le 8/04 dans le marais inondé du Mesnil/Pleine-Fougères.

Reproduction :

Cancale	Les Rimains	3 couples
	Le Chatelier	8 couples
	Ile des Landes.....	10-15 couples
	entre l'île des Landes et Port-Pican	6 couples
St-Briac	Ile Agot	2 couples
St-Coulomb	Havre de Rothéneuf	3-4 couples
Rance maritime	Mordreux	1-2 couples
	île Chevet	1 couple
	entre Mordreux et Le Chatellier	10 couples
	bras de Chateaneuf	2 couples
	les Troquetins	1-2 couples
	Mihinic	2 couples
	Anse de Garo	3-4 couples

8 couples et 122 pulli le 7/07 à Biez/Vivier sur Mer, 127 dans le bras de Chateaneuf sur la Rance le 25/06.

Automne -hiver 87/88 : Rance maritime

11/08	28/09	11/10	17/10	01/11	14/11	15/11	22/11	12/12	14/11
35	43	30	25	47	54	112	138	151	204

A partir du 11/08 le nombre de tadornes ne cesse de croître jusqu'à la fin de l'année 1987.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*): 74 données

Hivernage 86-87 :

Le manque de suivi des principaux sites d'hivernage met difficilement en évidence les réactions de cette espèce par rapport aux variations climatiques. Toutefois les chiffres les plus élevés, correspondant aux deux vagues de froid de janvier.

baie du Mont St-Michel : 3500 le 23/01, 2000 le 25/01

Rance maritime : 1000 le 18/01, étang de Beaufort/Plerguer : 150 le 17/01, lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-Erbrée : 121 le 17/01, 136 le 31/01, 121 le 5/02, lac la Chèze/St Thuriel : 200 à 230 le 17/01, 200 le 25/01, 100 le 31/01.

Des chiffres importants subsistent jusqu'au début mars à Chatillon en Vendelais : 370 le 8/03. Fin mars, les sifleurs disparaissent des différents sites, excepté de Chatillon en Vendelais où 61 individus sont observés le 5/04 puis 1 couple le 9/04.

Migration post-nuptiale :

Retour à Chatillon en Vendelais dès le 27/09, où 2 mâles sont notés, puis 18 le 18/10. Novembre amène les futurs hivernants : 70 le 11/11, toujours à Chatillon en Vendelais.

Début hivernage 87/88 :

100 le 5/12 en baie du Mont St-Michel, 400 le 12/12 sur l'étang de Chatillon en Vendelais.

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*): 35 données

Canard peu commun passant facilement inaperçu au milieu des colverts.

Hivernage 86/87 :

Noté toujours en petit nombre : maximum 15 le 25/01 en baie du Mont St Michel et 13 le 18/02 sur l'étang de Chatillon en Vendelais.

Printemps :

Au printemps, le chipeau se raréfie : 8 dont 5 mâles le 20/03 et 1 mâle le 5/05 dans les gravières de Bruz. Aucune observation avant le 23/08 où 2 individus sont notés sur l'étang de Paintourteau/Erbrée puis à nouveau 2 le 3/11 au même endroit.

Début hivernage 87/88 :

9 le 11/11 étang de Chatillon en Vendelais, 16 le 9/12 étang de Bazouges sous Hédé, 13 le 11/12 en baie du Mont St Michel.

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*): 86 données

Hivernage 86/87 :

Peu d'observations sur le littoral, l'espèce hiverne en grand nombre dans l'est du département :

267 le 17/01 sur le lac de la Valière/Vitré, 121 le 17/01 lac de Haute-Vilaine/Chapelle Erbrée, 150 à 200 mi-février à fin-mars sur Chatillon en Vendelais.

Printemps :

Malgré la présence de plusieurs couples, il n'y a semble t'il pas eu de reproduction cette année.

7 couples le 20/03 à Gannedel, 4 couples le 4/04 puis 1 mâle les 22 et 25/04 à Marcillé-Robert, 1 couple le 9/04 à Chatillon en Vendelais.

L'espèce réapparaît dès le 6/08 : 5 individus à Paintourteau/Erbrée.

Début hivernage 87/88 :

60 le 2/11 puis 160 le 5/11 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée, 80 le 5/12 en baie du Mont St-Michel.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*): 122 données

Hivernage 86/87 :

130 le 1/01 puis 110 le 10/01 sur l'étang de Bain de Bretagne, 200 le 3/01 sur l'étang de Chatillon en Vendelais, 100 le 11/01 au marais de Sougeal, 250 le 13/01, 530 le 17/01, 161 le 25/01 sur le lac Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée, 400 à 500 le 17/01, 500 à 600 le 31/01 sur le lac de la Chêze/St-Thurial, 180 sur l'étang de la Ville Alain/Sains, 100 le 17/01, 250 à 300 le 18/01, 500 le 25/01, 200 le 28/01, 360 le 8/02 sur l'étang de Bazouges sous Hédé, 559 le 8/02 sur le lac de la Valière/Vitré, 150 le 18/01 au Parc des Bois/Rennes, 250 le 28/01 sur l'étang de Hédé et 225 le 1/02 en baie du Mont St-Michel.

Reproduction :

La première famille est observée à Marcillé-Robert le 22/04 (1 femelle et 4 pulli). Les dernières familles observées : 4 femelles avec pulli le 23/06 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée et 7 juvéniles le 11/07 sur l'étang de la Ville Alain/Sains.

A partir de juillet, les colverts se rassemblent : 196 le 4/07 en baie du Mont St-Michel, 400 le 17/09 sur l'étang de Marcillé-Robert, 450 le 5/11 au Vivier sur Mer, 144 le 11/11 sur l'étang de Trémelin/Iffendic, 450 le 9/12 sur l'étang de Bazouges sous Hédé, 1200 le 10/12 sur l'étang de Marcillé-Robert, 100 à 150 le 13/12 au Bénétin /St Malo.

CANARD PILET (*Anas acuta*): 25 données

Observé en petite quantité pendant l'hiver 86/87 ; maximum : 35 le 20/02 dans le marais de Sougeal, 21 le 18/01 sur la Rance.

Plusieurs observations sur l'étang de Chatillon en Vendelais : 5 le 8/01, plus de 10 le 10/01, 1 mâle le 11/01, 3 le 8/02, 1 couple le 18/02 et 17 le 8/03. Par contre aucune observation dans la baie du Mont St Michel avant le 16/03 : 92 sont notés aux Hermelles.

Autre indice de regroupement migratoire : 14 le 18/03 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

1 mâle stationne ensuite à Paintourteau du 26/03 au 23/05.

Le Pilet réapparaît au mois de novembre : 17 le 5/11 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée; 2 le 14/11 sur le lac de la Valière/Vitré. Une seule observation en décembre : 2 mâles le 12/12 sur l'étang de Châtillon en Vendelais.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*): 7 données

1ère observation : 3 le 14/03 dans le marais de la Folie/Antrain. Ensuite seulement deux observations au printemps : 5 dont 4 mâles le 8/04 dans le marais du Mesnil/Pleine Fougères. Un couple de 16/04 dans l'estuaire du Couesnon/Baie du Mont St Michel. Pas de reproduction constatée pour cette espèce.

Les 2 premiers migrateurs post-nuptiaux sont observés le 29/08 sur le lac Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée, puis sur ce même site 1 les 2 et 4/09. Dernière observation : 3 le 27/09 sur l'étang du Boulet/Feins.

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*): 44 données

Peu d'observations se rapportent à cette espèce pendant l'hiver 86/87 où de nombreux plans d'eau sont gelés.

Maximum : 8 le 10/01 sur l'étang de Bain de Bretagne; 6 le 11/01 dans le marais de Sougeal ; 7 le 27/02 sur l'étang de Paintouteau/Erbrée.

A partir du mois de mars les oiseaux hivernant plus au sud remontent :

35 le 18/03, 40 le 26/03, 24 le 9/04 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

A cette même époque les couples se forment : 2 couples le 20/03 dans le marais de Ganelle/La Chapelle de Brain; 1 couple le 22/03 sur l'étang du Val d'Izé; 3 couples le 04/04 sur l'étang de Marcillé Robert; 1 couple le 5/04 sur l'étang de Chatillon en Vendelais; 1 couple le 8 /04 dans le marais de la Folie/Antrain.

Sur l'étang de Marcillé Robert un couple est présent jusqu'au 12/04, ensuite seul le mâle est observé jusqu'au 13/05. Aucune preuve de reproduction, ni sur ce site, ni dans le reste du département.

Les retours postnuptiaux sont observés dès le 4/08 : 7 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée, puis 5 le 9/08 sur l'étang de Chatillon en Vendelais.

A partir du mois de septembre les effectifs grossissent : 100 le 17/09 sur l'étang de Marcillé Robert; 150 le 18/10 sur l'étang de Chatillon en Vendelais. Le mois de novembre laisse apparaître une baisse : 50 le 11/11 sur l'étang de Chatillon en Vendelais.

Les hivernants sont peu nombreux en décembre : le maximum de 25 individus est atteint le 5/12 en baie du Mont St Michel.

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*): 6 données

2 mâles observés dans les gravières de Bruz du 17 au 23/01, ensuite 1 seul mâle est noté jusqu'au 13/02 sur ce site.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*): 109 données

200 à 250 le 9/01 sur le lac de la Chèze/St Thuriai; 120 le 13/01, 117 le 17/01 sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée; 125 le 17/01, 100 le 20/02 sur l'étang de Hédé; 151 le 13/01, 330 le 22/01, 486 le 04/02, 600 le 5/02, 190 le 10/02, 110 le 12/02 dans les gravières de Bruz; 100 le 8/02 sur l'étang de Bazouges sous Hédé; 189 le 27/02 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

Peu d'oiseaux se reproduisent dans notre département : 2 couples donnant 7 à 9 jeunes sur l'étang de Chesnais/Guipel; 2 couples donnant 3 et 6 jeunes sur l'étang de Chatillon en Vendelais.

Dès le mois d'octobre, le retour des oiseaux nordiques augmente très nettement l'effectif local : 125 le 16/10 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée. Au mois de novembre les hivernants s'installent sur la plupart des plans d'eau.

FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*): 3 données

Une observation au printemps : 1 mâle le 14/03 dans les gravières de Bruz. 2 observations en automne : un mâle les 27/09 et 16/10 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

Avec cette espèce, il est difficile de savoir si ce sont de réels migrants ou des oiseaux échappés de captivité.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*): 87 données

Seules les gravières de Bruz accueillent pendant l'hiver 86/87 de nombreux individus : 40 le 8/01, 60 le 12/01, 85 le 13/01, 100 le 22/01, 130 le 4/02, 110 le 12/02.

Le nombre sans cesse croissant des morillons dans les gravières correspond à la période où les autres plans d'eau gèlent. Au dégel et à l'annonce du printemps, les effectifs diminuent.

Apparemment un seul couple s'est reproduit en Ille et Vilaine : 1 couple avec 5 pulli le 14/06 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

Novembre est le mois du retour des hivernants : 53 le 21/11 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée; 63 le 24/11 sur l'étang de Trémignon/Lourmais; 40 le 29/11 sur le lac de la Valière/Vitré.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*): 5 données

Peu d'observations pendant l'hiver 86/87 sur la Rance maritime : 1 le 11/01 dans le bras de Chateauneuf; par contre les gravières de Bruz en accueillent 6 le 12/01, 5 le 13/01 et enfin 1 femelle le 04/02. Surprenant pour une espèce fréquentant habituellement le littoral !

Les 15 observés le 3/03 dans l'anse du Garo/Rance maritime sont des oiseaux en cours de migration pré-nuptiale.

EIDER A DUVET (*Somateria mollissima*): 6 données

Une étonnante observation sur un étang à environ 30 km de la mer : 2 femelles le 9/12/87 sur l'étang de la Bézardière/Hédé.

Les autres observations sont faites pendant l'hiver sur littoral : 4 le 1/02 dans l'anse Duguesclin/St Coulomb ; 10 le 7/02 à Rothéneuf/St Malo; 4 le 16/02 à Cancale; 4 le 22/03 à la pointe du Chevret/St Malo; 1 le 5/12 au Mont St Michel.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*): 10 données

Ce canard est très commun au large de la baie du Mont St Michel : plus de 2500 le 30/01. Quelques observations sur les plans d'eau intérieurs : 1 mâle le 15/01 dans les gravières de Bruz, 1 le 27/02 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

A partir du mois de juin, les macreuses fréquentent de nouveau nos côtes : 450 le 15/06 au large des Hermelles/Baie du Mont St Michel.

La Rance en accueille 11 le 9/11.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*): 4 données

4 le 11/01 dans l'anse de Garo/Rance maritime; 150 le 30/01 au large de la Baie du Mont St Michel; 2 mâles le 15/06 aux Hermelles/Baie du Mont St Michel. Cette dernière donnée est très précoce pour l'espèce.

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*): 47 données


Le site le plus fréquenté pendant l'hiver 86/87 est comme chaque année la Rance Maritime : 15 le 9/01, 16 le 11/01, 52 le 18/01, 70 le 1/03, 84 le 3/03, 32 le 14/03.

Pendant cette période très froide, de nombreuses observations de 1 à 6 individus sont faites sur plusieurs étangs. 2 femelles sont présentes jusqu'au 4/04 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

Hiver 87/88 :

Retour dès le mois de novembre : 16 femelles le 21/11 sur la Rance.

A part une observation sur l'étang de Paintourteau et une dans la baie du Mont St-Michel, toutes les autres concernent la Rance Maritime : le maximum de 63 individus est atteint le 13/12.



CHATAIGNÈRE. L

1 couple de harles piette (dessin de Laurent Chataignère)

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*): 41 données

Cet oiseau n'est généralement observé que lors des hivers très froids. Ce fût le cas pendant l'hiver 86/87, où de nombreux harles piette sont notés sur le littoral mais aussi sur les étangs non gelés : 7 à 18 individus du 11/01 au 19/02 sur le lac Haute-Vilaine/La Chapelle-Erbrée, 7 le 11/01 sur l'étang de Bazouges sous Hédé, 13 le 13/01 dans les gravières de Bruz, 8 le 17/01 sur l'étang de Ste-Suzanne/St- Coulomb, 12 le 9/02 sur l'étang d'Andouillé-Neuville.

La remontée de la température fait disparaître ce canard : 2 observations tardives : 2 mâles et 1 femelle le 9/03 sur l'étang de Trémignon/Combours et 1 femelle le 18/03 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

Une seule observation en décembre : 11 le 13/12 sur l'étang de Chatillon en Vendelais.

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*): 23 données

Avec l'hiver froid de 86/87, de nombreux harles huppés fréquentent régulièrement le littoral : 30 le 11/01, 65 le 18/01, 20 le 1/03 et surtout 154 le 8/03 sur la Rance Maritime.

Cette dernière donnée correspond à une remontée migratoire. Dernière observation : 9 le 29/03 aux alentours de l'île Agot/St-Briac.

Une seule donnée sur un site intérieur : 1 le 13/01 sur le lac Haute-Vilaine.

Hiver 87/88 :

Retour hivernal en novembre : 2 le 14/11 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée (site intérieur), puis 27 le 22/11, 72 le 12/12 sur la Rance Maritime. Toutes les autres observations concernent la Rance ou le littoral.

HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*): 30 données

Comme pour les autres harles, l'hiver 86/87 incite cette espèce à fréquenter notre région en nombre élevé. A l'inverse du harle huppé, le bièvre s'installe surtout sur les étangs : 12 le 12/01 dans les gravières de Bruz, 10 le 17/01 sur l'étang de la Ville Alain/Sains, 12 le 8/02 sur l'étang de Carcraon/Domalain.

N'étant que partiellement gelé, le lac Haute-Vilaine/La Chapelle-Erbrée accueille de 1 à 17 individus du 11/01 au 27/02.

Le mois de mars annonce le retour vers les zones de nidification : 4 le 12/03 puis 7 le 19/03 sur le même plan d'eau.

Le dernier hivernant (1 mâle) est curieusement jusqu'au 22/04 sur l'étang de Marcillé-Robert.

Hiver 87/88 :

Le retour tardif des hivernants a lieu au mois de décembre : 1 le 9/12 sur les 2 étangs de Hédé, 1 le 26/12 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée, 1 le 27/12 sur l'étang de Chatillon en Vendelais.

GROUPE 2 :

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*): 8 données

Première donnée : 1 individu le 2/05 sur l'étang du Boulet/Feins, 1 le 12/05 sur l'étang de l'abbaye de Paimpont, 1 couple à Iffendic le 11/06, 1 le 20/06 au parc des Bois/Rennes, 1 à Laillé le 29/06, 1 le 5/07 en forêt de Paimpont, 1 le 11/07 à Sains, 1 le 15/07 à Teillac.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*): 8 données

1 le 20/04 à Rénac, 1 le 25/04 à St Just, 1 le 30/04 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée, 1 le 1/05 à Gannedel/La Chapelle de Brain, 1 le 8/05 à la Chapelle Janson, 2 le 8/05 dans les gravières de Bruz, 1 le 10/05 à Maure de Bretagne, 1 le 17/05 à Poligné.

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*): 2 données

1 individu le 10/01 sur l'étang de Châtillon en Vendelais et 1 le 11/12 en baie du Mont St Michel.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*): 26 données

8 individus notés entre le 13/12/86 et le 8 /01/87 en baie du Mont St Michel, 1 femelle le 22/01 dans les gravières de Bruz, 5 dont 1 mâle le 22/02 dans le marais de Gannedel/La Chapelle de Brain.

Reproduction :

1 femelle à Marcillé Robert du 5/04 au 28/06, avec un mâle le 18/04. Un couple le 20/04 à Rénac, 3 femelles et 2 mâles le 20/04 dans le marais de Gannedel.

Puis 1 couple noté le 28/05 parmi 5 individus en baie du Mont St Michel, 1 couple et 3 juvéniles le 30/06 à la ferme neuve, puis un couple le 28/06 au polder Foucaud.

En fin d'année : 1 femelle le 27/09 à Châtillon en Vendelais, 1 mâle le 14/11 en Rance Maritime.

Les lieux d'observation sont classiques pour l'espèce. Marcillé-Robert reste l'un des meilleurs sites pour une installation future.

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*): 18 données

1 individu le 29/11/86 à St Sulpice des Landes, 1 le 6/12 à Feins.

En Baie du Mont St Michel : 3 le 13/12/86, 6 le 8/01/87, noté jusqu'au 20/02, avec un maximum de 3 mâles et 4 femelles le 23/01 dans la réserve de chasse.

Une donnée peu banale : un mâle en ville de Rennes le 21/01.

1 femelle et 1 mâle le 20/03 au marais Gannedel, 1 couple le 10/05 à Maure de Bretagne, 2 mâles le 17/05 dans le bois de Beaucel/St Ganton, 1 femelle le 14/11 au lac de la Valière/Vitré.

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*): 3 données

Noté uniquement en baie du Mont St Michel : 1 mâle le 26/04 à Hirel, 1 mâle le 27 avril, 1 mâle le 5 juillet à la ferme Neuve.

BUSARD "CUL BLANC" (*Circus cyaneus/pygargus*): 3 données

1 le 1/03 à l'étang du Boulet/Feins, 1 femelle à Rénac le 20/04, 1 femelle le 30/06 à la ferme Neuve en baie du Mont St Michel.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*): 1 donnée

1 femelle le 30/01 à Miniac-Morvan, s'attaquant à des mouettes.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*): 52 données

Noté toute l'année, un peu partout dans le département. Observé régulièrement à Rennes : 9 et 10/12/86, 20/01/87 jusqu'au 11/02, puis le 14/03 principalement au parc des Gayeulles; 1 le 22/09 à Maurepas. Un juvénile tué par des chasseurs à Miniac sous Bécherel le 7/12/86.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*): 41 données

Egalement observée un peu partout dans le département. Sur un parcours de 20 km : Bain de Bretagne/ Ste Anne sur Vilaine, 8 individus le 22/02. Nidification : Visseiche, Guipry.

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*): 1 donnée

Un individu vu le 2/09 à la Chapelle Erbrée.

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*): 9 données

Le peu de données n'est pas représentatif de la population effective. Des données quantitatives sur des parcours témoins seraient sans doute très intéressantes.

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*): 13 données

En baie du Mont St Michel : noté du 19/11/86 au 25/01/87 avec un maximum de 4 individus le 8/01, 1 le 25/01 au-dessus du lac de Haute-Vilaine/Chapelle Erbrée, 1 le 27/01 à St Coulomb, 1 le 11/02 à Domagné, 1 mâle le 20/03 à Gannedel/La Chapelle de Brain. En fin d'année : première observation de 2 individus le 28/11 en baie du Mont St Michel, 1 femelle le 24/12 à la Couyère.

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*): 35 données

Première observation : 1 individu le 21/04 dans les marais de Dol.

Dernière observation : 1 le 3/10 à St Aubin d'Aubigné.

Espèce notée un peu partout dans le département.

A Rennes : 1 le 1/05 au parc Oberthur, 1 le 4/05 à Villejean, 1 le 16/05 aux prairies St Martin, 1 le 4/06 à Villejean.



CHATAIGNÈRE . L

le faucon hobereau en vol (dessin de Laurent Chataignère)

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*): 12 données

Observé essentiellement en baie du Mont St Michel.

1 le 17/11/86 à l'embouchure du Couesnon, 1 le 13/12 à Rochetorin, 1 adulte et 1 immature le 8/01 dans la réserve de chasse, 1 le 16/01, 2 le 1/02, 1 le 6/04, 1 le 4/07, 1 couple et 1 femelle immature le 17/11, 1 le 28/11, 1 femelle le 5/12.

A Rennes : 1 individu en vol au dessus de la caserne Mac Mahon le 26/06.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*): 6 données

Notée en Baie du Mont St Michel, à la Chapelle Bouexic et à Piré sur Seiche.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*): 3 données

27 le 19/01 à Palluel/Roz sur Couesnon.

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*): 13 données

Première observation : 2 chanteurs le 3/05 à Essé, puis un couple au même endroit le 26/05, 1 le 29/05 à Trans, 1 le 30/06 à Chateauneuf d'Ille et

Caille (suite) :

Vilaine, 1 le 5/07 et 12/07 à Châtillon en Vendelais, 10 chanteurs le 4/07 à la ferme Foucault en Baie du Mont St Michel, 1 le 5/07 à Amanlis.

8 chanteurs pour 8 sites le 15/07 à Teillay, 1 le 6/08 à Erbrée.

Les sites occupés restent traditionnels, principalement la baie du Mont St-Michel et à un degré moindre dans le sud du département. Une nouvelle zone semble apparaître le long de la Seiche.

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*): 1 donnée

Rien à signaler.

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*): 11 données

2 le 27/11/86 au parc des Gayeulles/Rennes puis à nouveau 1 le 16/02 et enfin un chanteur le 11/07. 1 chanteur le 1/03 à St Suliac, 1 chanteur le 13/05 puis le 30 à Marcillé-Robert, 1 le 30/08 à Maure de Bretagne, 1 du 2 au 20/08 sur le de Haute-Vilaine/la Chapelle Erbrée.

Nidification prouvée à Chatillon en Vendelais : 1 adulte et 2 pulli le 13/08.

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*): 11 données

Rien à signaler.

Nidification à Châteaugiron et à la Chapelle Erbrée.

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*): 152 données

Quelques suivis :

	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS			
Bazouges sous Hédé	51	88	250	45				
Lac de Haute Vilaine	129		173	120	29			
	MAR	AVR	MAI	JUIL	AOU	OCT	NOV	
Etang Paintourteau	100	56	103	450	575	1400	1300	

Hivernage :

150 le 8/01 sur l'étang de Chatillon en Vendelais, 314 le 13/01 dans les gravières de Bruz, 700 à 800 le 17/01 sur le lac de la Chèze/St-Thurial, 130 le 17/01 sur l'étang de Mirloup/Le Tronchet, 180 le 17/01 sur l'étang de Beaufort/Plerguer, 475 le 17/01 sur le lac de la Valière/Vitré, 931 le 18/01 sur la Rance Maritime.

Nidification :

Etang du Verger/St Coulomb : 5 couples


ZAC des Longchamps/Rennes : 5 couples

Etang de Paintourteau/Erbrée : 11 nids le 23/07

Etang de Ste Suzanne/St Coulomb : 1 couple/3 juvéniles le 11/07

Etang de Ste Ville-Alain/Sains : 1 couple/2 juvéniles le 11/07

Marais de la Goutte/St Suliac : 1 couple /2 juvéniles le 13/07



le râle d'eau (dessin de Pierre Tillier)

GROUPE 3 A :

voir page suivante

Fin d'hivernage 86/87 :

De mi novembre à mi janvier, aucun mouvement notable n'est observé. Les bandes dépassent rarement 50 individus. A noter : 60-100 le 15/11 Ile de Harbour/St Malo, 30-40 Le Bénétin/St Coulomb, env. 50 le 14/12 Ile de Harbour et 56 le 3/01 Banc des Pourceaux/St Malo.

Au recensement de la mi janvier, il a été dénombré 18100 individus en B.M.S.M., ce qui est relativement important (14900 en janvier 1985 cf. Ar Vran 1986, Tome XII, fasc. 2). Avec la vague de froid de mi janvier, un afflux important est observé en Rance et sur tout le littoral. Les oiseaux sont très affaiblis (mortalité élevée) : 318 le 18/01 Total Rance, 1060 le 20/01 de Cancale au Vivier, 1035 le 1/02 de Cancale à Cherrueix.

Migration pré-nuptiale :

Deux données s'y rapportent sûrement : 4550 le 6/03 de Cancale à Cherrueix, et une donnée intérieure : 1 le 5/04 Etang de Châtillon-en-Vendelais.

Nidification :

Les premiers couples cantonnés sont observés le 26/04 avec parades à La Bigne/St Coulomb. Une première ponte le 17/05 à l'Ile des Landes/Cancale.

- Grand Chevreuil/St Coulomb : 1 nid avec 3 oeufs;
- La Bigne/St Coulomb : 1 nid avec 3 oeufs;
- Bizeux/St Servan : 1 nid avec 3 oeufs;
- Ile de Harbour/St Malo : 2 nids avec 1 et 3 oeufs;
- Ile des Landes : 1 nid avec 2 oeufs + 2 couples;
- Haumet/St Lunaire : 2 nids avec 1 et 2 oeufs + 1 couple alarmant;
- Ile Besnard/St Coulomb : 1 couple;
- Le Chateliers/Cancale : 2 couples;
- Les Daviers/Paramé : 1 couple;
- Le Bénétin/St Coulomb : 1 couple;
- Les Rimains/Cancale : 1 couple;
- Ile de Cézembre/St Malo : 4 couples alarmant;
- Haie des Conchées/St Malo : 1 couple;
- Ile Agot/St Briac sur Mer : 3 couples;

Au total, il y a au minimum 25 couples, nicheurs probables ou certains.

Migration post-nuptiale :

Elle semble débuter fin juillet, une donnée de juin ne concernant

sans doute que des non nicheurs : 85 le 28/06 de Vildé de la Marine Hirel/B.M.S.M., 150 le 25/07 de Cancale à Cherrueix et une donnée intérieure, 3 le 4/08 Etang de Paintourteau/Erbrée.

ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) : 1 donnée

Migration pré-nuptiale :

La seule donnée est une donnée intérieure : 1 mâle le 24/04 Etang du Pas du Houx/Paimpont.

AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*) : 18 données

Fin hivernage 86/87 :

Pratiquement 80% des données proviennent de B.M.S.M.. Les effectifs les plus importants précèdent de peu la vague de froid de la fin janvier : 13 le 13/12 B.M.S.M., 7 le 14/12 Etang de Châtillon-en-Vendelais, 12 le 31/12, 44 le 3/01 2 du 17 au 22/01 Couesnon/B.M.S.M., 2 le 18/01 Rance, 1 le 18/01 Le Frémur/St Briac, 3-4 le 25/01 et 2 le 29/01 Couesnon/B.M.S.M..

Migration post-nuptiale :

Une seule donnée : 5 le 21/08 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée.

Début hivernage 87/88 :

Les données deviennent plus régulières à partir du 17/11 pour cesser mi février : 9 le 17/11, 3 le 11/12 et 14 le 12/02 en B.M.S.M..

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) : 37 données

Migration pré-nuptiale :

La première observation est quelque peu précoce : 6 le 8/03 Etang de Châtillon-en-Vendelais. Sinon, 1 le 23/03 La Rochelle/Orgères.

Nidification :

Les premiers couples cantonnés sont observés dans la deuxième décade d'avril. Aucune donnée ne provient de la B.M.S.M..

-Etang de Paintourteau/Erbrée : 2 couples (15 dont 5 juv. le

15/05);

- Les Bougrières/Gravières de Bruz : 2 couples au moins (alarmes et chants) et 7 individus dont 3 juv. le 23/05;
- Plaine de Baud/Rennes : 1 adulte alarme le 4/06;
- Le Luzard/Pont Péan : 1 adulte alarme le 15/05;
- Etang du Bois de Courrouet/Maure de Bretagne : 1 adulte alarme le 10/05;
- Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée : 2 individus notés régulièrement du 17/05 au 13/09 et 1 à 2 juv. les 6 et 18/07;
- Etang de Châtillon-en-Vendelais : 1 immature le 23/08.

Soit, 8 à 9 couples nicheurs probables ou certains, la donnée de Châtillon étant quelque peu tardive.

Sinon : 1 le 12/05 Etang du Pas du Houx/Paimpont et 1 le 2/08 Lac de La Valière/Vitré. Pour ces deux données rien ne permet d'affirmer qu'il s'agisse de nicheurs.

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) : 88 données

Fin hivernage 86/87 :

Les effectifs augmentent régulièrement, puis se stabilisent à partir de février : 63 le 16/11 Rance maritime (6 Fort national/St Malo et 57 Havre de Rothéneuf/St Coulomb), 80 le 13/12 Anse Richardais/Rance, 40 le 11/01 Bras Chateauneuf/Rance, 125 le 20/01 et 110 le 1/02 de Cancale au Vivier sur Mer/B.M.S.M., 35 le 3/02 Havre de Rothéneuf, 61 le 16/02 Plage Duguesclin/St Coulomb.

Migration pré-nuptiale :

A partir de la seconde quinzaine de mars, les données se multiplient sur les sites intérieurs : 1 le 22/03 et 2 le 26/03 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, 1 le 24/04 Etang du Pas du Houx/Paimpont et 2 le 15/05 Etang de l'Abbaye/Paimpont. Ce passage se termine avec une donnée plus tardive : 2 le 28/06 Vildé de la Marine/B.M.S.M..

Migration post-nuptiale :

Surtout perceptible à partir de la troisième décade de juillet. Elle se décompose en plusieurs vagues. Le point fort semble se dérouler dans la première quinzaine de septembre sur les plans d'eau intérieur : 26 le 27/07 de Cancale à Cherrueix, 47 le 2/08, 172 le 12/08 Havre de Rothéneuf, 2 du 8 au 14/08, 1 du 16 au 18/08, 1 juv. du 28 au 31/08 et 7 le 7/09 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, 74 le 10/09 Havre de

Rothéneuf, 8 le 11/09, 9 les 13 et 14/09 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, 3 le 14/09 L'Ilion/Gravières de Bruz, 6 le 18/09 et 1 le 20/09 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, et enfin, une donnée tardive : 1 le 11/10 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée. A partir d'octobre, les effectifs deviennent moins importants.

Début hivernage 87/88 :

Un afflux, correspondant certainement aux hivernants, est sensible début novembre : 60 le 1/10 Havre de Rothéneuf, 68 le 17/10 Anse Richardais, le 1/11 120 Total Rance et 110 Havre de Rothéneuf, soit 220 ce jour.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) :
3 données

Nidification :

-le 28/06, environ 6 à 7 couples nicheurs sur 600 mètres de côte de Vildé de la Marine jusqu'au bout de la ville/B.M.S.M. (soit 1 femelle faisant diversion, 1 couple avec 2 pulli d'une semaine, 4 couples alarmants et 1 couple non démonstratif);

-le 13/06, environ 15 couples à l'ouest du Vivier sur Mer/B.M.S.M., dont 2 couples avec des pulli de moins d'une semaine et 1 femelle avec 2 oeufs et un poussin;

-le 25/07, 9 individus de Cancale à Cherrueix/B.M.S.M..

Une trentaine de couples nicheurs pourrait être une estimation minimale.

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*) : 26 données

Fin hivernage 86/87 :

De mi-décembre à mi-janvier, de 2 à 300 individus séjournent en B.M.S.M. A partir de la deuxième décade de janvier et avec l'arrivée d'une vague de froid très rigoureuse, des mouvements importants sont observés : 220 le 10/01 Balazé, 90 le 10/01 Aubigné, 3 groupes de 20 à 30 individus en 30 mn direction S à Sougeal le 11/01, 5 le 11/01 Etang de Châtillon-en-Vendelais, 400+ le 29/01 Couesnon/B.M.S.M., 18 en vol le 14/02 La Couteyère/Piré sur Seiche et 17 le 21/02 Grand Fougeray.

Migration pré-nuptiale :

1 seule donnée en mars : 54 le 12/03 La Pêcherie/Piré sur Seiche.

Migration post-nuptiale :

Aucune donnée jusqu'au 25/09, date à laquelle un passage nocturne est observé au Bas Verger/Miniac sous Bécherel.

Début hivernage 87/88 :

Les premiers hivernants semblent arriver début novembre, mais ce n'est véritablement qu'à partir de janvier que les données se multiplient, avec un premier pic d'abondance au tout début du mois : 7 le 5/11 Etang de Paintourteau/Erbrée, 3 le 5/12, 11 le 13/12.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squatarola*) : 31 données

Fin hivernage 86/87 :

Les premiers hivernants apparaissent fin novembre. Les effectifs sont assez importants en Rance, sans doute à cause de la vague de froid de mi janvier :

Rance	29/11	28/12	11/01	18/01
	14	112	325	377

En B.M.S.M., malgré le gel, l'espèce est présente en nombre : 2840 lors du recensement de la mi janvier en B.M.S.M., 2265 le 1/02 de Cancale à Cherrueix et 1970 le 6/03 de Cancale à Cherrueix.

Migration pré-nuptiale :

3 le 22/03 Havre de Rothéneuf/St Coulomb, 1 le 8/05 Etang du Pas du Houx/Paimpont (donnée intérieure), 3 le 8/05 Havre de Rothéneuf et 5 le 20/05 Ville-Ger/Rance.

Migration post-nuptiale :

Seulement 2 données : 23 le 25/07 de Cancale à Cherrueix et 500 le 27/09 Le Vivier sur Mer/B.M.S.M..

Début hivernage 87/88 :

A partir de mi décembre, les effectifs augmentent en Rance : 4 le 21/11, 31 le 14/12.

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) : 62 données

Fin hivernage 86/87 :

Comme d'habitude, le passage et le stationnement de cette espèce sont étroitement liés aux conditions climatiques. Il en résulte 3 pha-

ses bien distinctes commandées par la température, la neige et le gel :

-Durant un mois de décembre relativement doux, les stationnements sont importants, tant sur la côte que dans les terres, et les effectifs grossissent jusqu'en fin de mois : plusieurs centaines le 13/12 sur les herbues de la B.M.S.M., 1500 le 14/12 et le 31/12 Etang de Châtillon-en-Vendelais;

-A partir du 10 janvier, des mouvements très importants vers le sud correspondent à l'arrivée de la vague de froid. Les hivernants ont fuit massivement et il ne subsiste que quelques isolés : plusieurs dizaines en vol vers le sud le 10/01 Etang de Bain de Bretagne, mouvements très importants (non quantifiés) notés à Sougeal et en B.M.S.M. le 11/01.

-Le redoux revenu, les mouvements de retour s'amorcent dès le début du mois de février : 65 en vol NE le 7/02 Bas Verger/Miniac sous Bécherel, seulement 30 le 6/03 de Cancale à Cherruëix.

Migration pré-nuptiale :

Importante activité crépusculaire le 7/03 Bas Verger/Miniac sous Bécherel.

Nidification :

Seulement 4 données :

- 4 individus (attitudes territoriales) Marais de Chateauneuf d'Ille et Vilaine;
- 2 couples (vols acrobatiques) Marais de Ste Anne;
- 1 couple avec 2 pulli Marais des Guettes/St Suliac;
- 2 pulli proches de l'envol Marais de Dol;

Aucune approche quantitative globale ne peut-être tentée, les sites de nidification les plus importants n'ayant pas été prospectés, ou du moins pas complètement (Sougeal, B.M.S.M., Marais de Dol ...).

Migration post-nuptiale :

A partir de juillet, quelques petites bandes sont à nouveau observées, mais il faut attendre août pour voir les effectifs gonfler : 41 le 5/07 Etang de Châtillon, 4 le 5/07 Le Moulin/Amanlis, 70 le 12/07, 230 le 9/08, 300 le 18/10 et 270 le 5/11 Etang de Paintourteau/Erbrée.

Début hivernage 87/88 :

33 données en tout, avec un afflux net début décembre : 850 le 5/12 Lac de La Valière/Vitré, 950 le 5/12 Etang de Paintourteau, 80 le 9/12 en vol vers le SW Beaulieu/Rennes et 100 en vol S le 11/12 Gayeulles/Rennes.

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*) : 13 données

Fin hivernage 86/87 :

Les données manquent en novembre pour permettre de déterminer la date d'arrivée des hivernants : 1 le 28/12 Anse Richardais/Rance et 10-15 le 28/12 en vol vers le S en 30 mn à Sougeal. Lors du recensement de la mi janvier, 5180 individus ont été dénombrés, ce qui est un peu plus élevé qu'en 1985 (4200 en janvier, cf. Ar Vran, 1986, Tome XII, fasc. 2). Début février, une petite vague semble arriver en baie de Cancale : 150 le 20/01 de Cancale au Vivier sur Mer, 530 le 1/02 et 110 le 6/03 de Cancale à Cherrueix.

Migration pré-nuptiale :

Il est peu sensible : 1 le 25/04 Havre de Rothéneuf et 4 le 3/05 Marais de Sougeal. Aucune donnée de fin avril à début août.

Migration post-nuptiale :

1 le 2/08 et 1 le 10/09 Havre de Rothéneuf. Ce sont les 2 dernières données pour la période considérée.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) : 7 données

Fin hivernage 86/87 : 12 le 11/01 B.M.S.M., donnée qui est à mettre en rapport avec la vague de froid qui déferle sur l'Europe à cette époque.

Migration pré-nuptiale :

Une seule donnée : 1 Vildé de la Marine/B.M.S.M..

Migration post-nuptiale :

Ce passage est traditionnellement plus sensible : 80 le 25/07 de Cancale à Cherrueix et 3 le 7/09, 1 le 18/09 et 1 le 11/10 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée.

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) : 4 données

Migration post-nuptiale :

Ces 4 données concernent un même individu juvénile observé pendant 8 jours au Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée : 1 les 7, 11, 13 et

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*) : 36 données

Hivernage 86/87 :

Les premiers individus sont notés mi-novembre. Ils quittent nos côtes fin mars : 5 le 30/11, 3 le 10/12, 3 le 30/12 et 1 le 4/01 Fort National/St Malo. Un afflux est observé mi-janvier : 14 le 17/01 et 1 le 1/02 Pointe du Chevreuil-Rothéneuf/St Coulomb. Sinon, 3 le 1/02 Pointe du Grouin, 2 le 21/03 Fort national/St Malo, 7 le 22/03 et 2 le 28/03 La Varde/St Malo, dernière donnée. Il est possible d'estimer la population d'hivernants à au moins une vingtaine d'individus.

Hivernage 87/88 :

La première donnée est plus précoce puisque les premiers hivernants sont observés fin octobre; et il semblerait que les effectifs soient plus importants : 4-5 le 25/10 Roche Pelée/St Enogat Dinard, 2 le 31/10 Fort national/St Malo, 2 le 1/11 Petit Chevreuil-Rothéneuf/St Coulomb, 14+ le 11/11 de La Varde au Fort national/St Malo, 34 le 14/12 de St Coulomb à St Enogat. Certainement plus 34 individus ont hiverné sur la côte.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) : 77 données

Hivernage 86/87 :

Les effectifs augmentent régulièrement jusqu'à la deuxième décade de janvier, puis se stabilisent. Une deuxième vague semble arriver en début février et résulte sans doute des conditions climatiques rigoureuses qui sévissent à cette époque : 790 le 13/12/86, puis 2400 le 28/12/86 et 2695 le 11/01 sur la Rance Maritime, 37600 le 17/01 dans la baie du Mont St-Michel, 4200 le 18/01 sur la Rance Maritime, 200 le 18/01 sur le Frémur/St Briac, 4600 le 20/01 de Cancale au Vivier sur Mer/Baie du Mont St-Michel, 16600 le 1/02 et 12100 le 6/03 de Cancale à Cherrueix/Baie du Mont St-Michel.

Malgré la grande mobilité de cette espèce, il est possible d'estimer la population d'hivernant à la mi-janvier à environ 43800.

bécasseau variable (suite) :

Migration pré-nuptiale :

Elle commence début mars et bat son plein jusqu'à fin mai. Elle est sensible aussi bien sur les étangs intérieurs que sur le côté : 10 le 8/03 Etang de Châtillon-en-Vendelais, 1 le 24/04 Etang du Pas du Houx/Paimpont, 16 en plumage nuptial le 25/04 Havre de Rothéneuf/St Coulomb, 2 le 12/05 Etang de l'Abbaye/Paimpont, 1 le 23/05 Gravières de Bruz et 5 le 28/06 Vildé de la Marine/B.M.S.M..

Migration post-nuptiale :

Elle suit un schéma classique pour l'espèce, elle n'est perceptible qu'à partir de fin juillet et est sensible, sur les sites intérieurs, jusqu'en octobre :

Lac Haute-	2/8	7/8	27/8	4/9	7/9	27/9	4/10	11/10
Vilaine	1	1	1	2	5	1	9	9

Sinon : 522 le 25/07 de Cancale à Cherrueix, 4 le 4/08 Lac de La Valière/Vitré, 2 le 9/08 Lac de La Valière, 1 le 23/08 Etang de Châtillon-en-Vendelais, 1 le 27/09 Etang de Châtillon, et 100 le 17/10 La Richardais/Rance.

Début hivernage 87/88 :

Mi-novembre, les premières bandes importantes arrivent sur la côte. Les effectifs augmentent jusqu'à la fin de l'année et se stabilisent. Le suivi en Rance permet de bien se rendre compte de l'évolution des effectifs : 95 le 1/11, 925 le 21/11 et 3105 le 14/12.

COMBATTANT VARIE (*Philomachus pugnax*) : 47 données

Fin hivernage 86/87 :

2 données intérieures : 2 le 29/11 et 10 le 14/12 Etang de Châtillon-en-Vendelais. Sino, la vague de froid de la deuxième quinzaine de janvier ne semble pas avoir entraîné une arrivée massive : 31 le 17/01 et 12 le 19/01 Couesnon/B.M.S.M., 1 le 22/01 Les Bougrières/Gravières de Bruz, 40 le 22/01, 2 le 23/03 et 2 le 29/01 Couesnon/B.M.S.M.. La deuxième décade de février est marquée par un afflux net, perceptible à l'étang de Châtillon-en-Vendelais : 27 le 15/02 et 30+ du 18/02 au 08/03. Enfin, début mars, ces mouvements désordonnés semblent se calmer.

Migration pré-nuptiale :

Le passage est sensible durant tout le mois d'avril avec un pic la

première quinzaine, et sur les étangs de l'intérieur : 1 le 19/03 et 1 le 4/04 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, 5 le 4/04 Etang de Paintourteau/Erbrée, env. 30 le 08/04 Marais de Vilmorel/Sougeal, 1 le 9/04 Etang de Châtillon, 5 le 16/04 St Jouan des Guérets/Rance, 1 le 20/04 Etang de Paintourteau/Erbrée, 1 le 22/04 Etang de Marcillé-Robert, 1 le 24/04 Les Bougrières/Gravières de bruz, 2 le 17/05 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée et 1 le 23/05 Les Bougrières/Gravières de Bruz.

Migration post-nuptiale :

Comme d'habitude, ce passage est faible et peu perceptible. Il s'étale de juillet à août. Une seule donnée en septembre et aucune en octobre : 1 couple le 5/07 et 12 le 14/07 Etang de Paintourteau/Erbrée, 1 mâle en eclipse le 9/08 Lac de La Valière/Vitré, 1 du 11/08 au 14/08 et 1 le 28/08 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée et enfin, 1 le 27/09 Etang de Châtillon-en-Vendelais.

Début hivernage 87/88 :

Les hivernants arrivent en B.M.S.M. en décembre. Cette arrivée est également sensible dans les terres, avec 3 le 31/12 Etang de Châtillon-en-Vendelais.

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) : 82 données

Fin hivernage 86/87 :

Jusqu'à la fin du mois de décembre, des bandes importantes sont encore notées à l'étang de Châtillon-en-Vendelais : 127 le 23/11, 243 le 29/11, 50+ le 21/12, 80 le 28/12. Ensuite, la décrue est nette en janvier, et une seule donnée à été transmise en février : 25 le 3/01 Etang de Châtillon-en-Vendelais, 1 le 18/01 La Peronaye/Romillé, 3 le 30/01 La Gaudichais/Cancale et 2 La Roche Briand/Montauban.

Migration pré-nuptiale :

Le passage n'est pas très sensible. Il débute la première semaine de mars et fini doucement début mai : 15 le 1/03 et 70+ le 8/03 Etang de Châtillon-en-Vendelais, 3 le 26/03 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, 1 le 28/03 Lourmais, 4 le 4/04 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, 3 le 5/04 Etang de Châtillon-en-Vendelais et 4 le 3/05 Marais de Sougeal. Du 4/05 jusqu'au début du mois d'août, absence totale de donnée.

Migration post-nuptiale :

Le passage est comme d'habitude brusque et fort. Il débute la première semaine d'août. Des bandes de plus de 10 individus sont notées à partir du 9/08 et le passage bat son plein de la troisième décade d'août jusqu'à la fin du mois de septembre :

Lac Haute-	2/08	13/08	28/08	2/09	4/09	20/09
Vilaine	3	13	16	22	27	26

Sinon : 12 le 9/08 Etang de Châtillon-en-Vendelais, 40 le 23/08 Etang de Paintourteau/Erbrée, 27 le 23/08 Etang de Châtillon; 46 le 27/09 Etang de Châtillon, 37 le 27/09 Etang de Paintourteau. A partir d'octobre, le passage faiblit, avec seulement 3 données, dont une importante : 26 le 16/10 Etang de Paintourteau.

Début hivernage 87/88 :

A partir du mois de novembre et durant tout l'hiver, des bandes importantes sont à nouveau observées à l'étang de Châtillon-en-Vendelais : 42 le 7/11, 50 le 11/11, 50 le 5/12; et à l'étang de Marcillé-Robert : 59 le 27/12.

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) : 16 données

La Bécasse est une espèce assez peu suivie par les ornithologistes et le manque de données rend difficile toute interprétation.

Fin hivernage 86/87 :

L'arrivée des premiers hivernants n'est notée que le 16 novembre : 1 le 16/11 Forêt de Rennes/Liffré. Sinon, un fort passage en janvier correspond à des conditions climatiques exceptionnellement rigoureuses. Des individus sont observés à Rennes même : 1 le 6/01 St Jouan des guérets/Rance, 1 le 17/01 Parc des Gayeulles/Rennes, 1 le 17/01 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, 1 le 18/01 Gravières de Bruz, 1 le 20/01 Le Bas Roquet/Gravières de Bruz et 2 le 30/01 Bois de Chevrille/Cancale. Durant la première quinzaine de février, le mouvement se poursuit, mais avec apparemment moins d'intensité : 1 le 7/02 Chateauneuf d'Ille et Vilaine, 1 le 9/02 Etang du Boulet/Feins et 1 le 11/02 Forêt de Rennes.

Migration pré-nuptiale :

1 le 1/03 Beaulieu/Rennes et la présence d'un cadavre sur Tombelaine/B.M.S.M. découvert le 22/03 (dernière donnée avant l'arrivée des hivernants en novembre).

Début hivernage 87/88 :

L'arrivée des hivernants est notée le 1/11 avec 2 individus au Chenay/Guipeil, ce qui correspond à une date normale. Sinon, 1 le 7/11 Forêt de Trans et 1 les 23 et 28/11 Boulet/Feins.

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) : 28 données

Fin hivernage 86/87 :

L'essentiel des données concernant les hivernants se rapporte à la B.M.S.M., zone d'hivernage d'importance internationale pour cette espèce : 200 le 13/12 B.M.S.M., seulement 30 lors du recensement de mi-janvier en B.M.S.M., mais 1535 le 1/02 de Cancale à Cherrueix. A noter d'autre part, une donnée intérieure en novembre : 1 le 23/11 Etang de Châtillon-en-Vendelais. Enfin, début mars, les hivernants ne sont apparemment pas encore tous partis : 250 le 1/03 St Broladre/B.M.S.M., mais seulement 25 le 6/03 de Cancale à Cherrueix.

Migration pré-nuptiale :

De la deuxième décade de mars à la première décade d'avril, l'afflux de données sur des sites intérieurs traduit un passage pré-nuptial bien senti et nettement circonscrit dans le temps : 1 le 12/03 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, 1 le 18/03 Etang de Paintourteau/Erbrée, 5 le 19/03 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, 1 le 20/03 La Chapelle de Brain/Marais de Gannedel, 4 le 26/03 Etang de Paintourteau, 3 le 5/04 Etang de Châtillon-en-Vendelais, 8 le 8/04 Marais de Sougeal et 10 le 8/04 Marais du Mesnil/Pleine Fougères. Aucune donnée en juin.

Migration post-nuptiale :

Le passage est surtout sensible la deuxième décade de juillet sur des sites intérieurs : 98 le 4/07 B.M.S.M., 5 le 5/07 St Jouan des Guérets/Rance, 14 le 14/07 Etang de Paintourteau/Erbrée, 3 le 14/07 Lac de La Valière/Vitré, 10 le 20/07 Etang de Marcillé-Robert, 1 le 20/07 Etang de Paintourteau, 1 le 15/08 Lac de La Valière, 1 le 30/08 Etang de Châtillon-en-Vendelais et 2 le 14/09 Etang de Paintourteau.

Hivernage 87/88 :

A partir d'octobre les hivernants s'installent : 350 le 6/10 Banc des Hermelles/B.M.S.M. et 900+ le 17/11 B.M.S.M..

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) : 12 données

Hivernage 86/87 :

Les conditions climatiques aidant, la B.M.S.M., zone traditionnelle d'hivernage, semble avoir fait le plein de ses hivernants. Lors du recensement de la mi janvier 2480 individus ont été dénombrés, soit plus du double qu'en janvier 1985 (cf Ar Vran, 1986, Tome XII, fasc. 2). Dans la seconde quinzaine de janvier, seulement deux données, concernant la Rance : 5 le 18/01 Total Rance maritime et 2 le 30/01 Bras de Chateauneuf/Rance. En février, des hivernants sont encore observés, avec : 200 le 1/02 de la Laronnière à Cherrueix/B.M.S.M..

Migration pré-nuptiale :

Les observations se réduisent à une seule donnée : 1 le 25/04 Havre de Rothéneuf/St Coulomb.

Migration post-nuptiale :

Seulement deux données : 6 le 27/07 de Cancale à Cherrueix et 1 le 10/09 Havre de Rothéneuf/St Coulomb.

Hivernage 87/88 :

Les données sont trop fragmentaires pour pouvoir tirer des conclusions : 2 le 22/11 et 1 le 13/03 Total Rance maritime. A noter, 1 donnée négative : 0 le 14/12 Total Rance maritime.

COURLIS sp. (*Numenius sp.*) : 1 donnée

9 le 23/04 St Laurent/Rennes en vol vers le N.

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*) : 16 données

Hivernage 86/87 :

Une seule donnée : 1 le 6/01 St Jouan des Guérets/Rance. Cette quasi absence de donnée correspond certainement plus à un manque de prospection plutôt qu'à une absence d'hivernant.

Migration pré-nuptiale :

Le passage débute le 25 avril. Les données sont groupées sur 7 jours : 26 le 25/04 et 6 le 26/04 Havre de Rothéneuf/St Coulomb, 700 le

27/04 La Laronnière/B.M.S.M., 28 le 29/04 Marais de Chateauneuf d'Ille et Vilaine, 16 le 1/05 Le Minihic/Rance, 2 le 1/05 Bras Chateauneuf/Rance, 4 le 1/05 Pointe du Grouin et 14 le 2/05 Ville-ger/Rance. A noter enfin une donnée tardive : 6 le 20/05 Total Rance.

Migration post-nuptiale :

Le passage est beaucoup moins sensible, tant du point de vue du nombre des données que du nombre d'individus : 2 le 13/07 Chateauneuf/Rance, 54 le 25/07 de Cancale à Cherrueix, 19 le 2/08 Bras Chateauneuf/Rance et quelques attardés en septembre avec 2 le 10/09 Havre de Rothéneuf/St Coulomb.

Hivernage 87/88 :

2 données en octobre, concernant un même hivernant : 1 les 24 et 25/10 Pointe du Meinga/St Coulomb.

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) : 89 données

Hivernage 86/87 :

Le début de la période est relativement calme, jamais plus de 50 individus en même temps. Il faut attendre mi-janvier pour voir arriver le gros des hivernants : 16 le 21/12 Chateauneuf/Rance, 16 le 28/12 Anse Garrot/Rance, 23 le 28/12 Anse Richardais/Rance, 21 le 11/01 Bras Chateauneuf/Rance, 35 le 11/01 Richardais et 50 le 11/01 Polders de la B.M.S.M.. Lors du recensement de la mi janvier, il a été dénombré 5830 individus en B.M.S.M.. Ces effectifs plus importants que les années précédentes sont à mettre en rapport avec des conditions climatiques rigoureuses. Les données intérieures sont également nombreuses : 1 le 17/01 Etang de Paintourteau/Erbrée, 1 le 17/01 Lac de la Valière/Vitré, 3 le 17/01 Lac de la Chèze/St Thuriel et 1 le 17/01 Etang de Beaufort/Pleguer. Sinon, 800+ le 17/01 Roche Torin/B.M.S.M., 170 le 18/01 Rance maritime, 680 le 21/01 de Cancale au Vivier sur Mer, 12 le 24/01 Etang de Paintourteau, 1 le 26/01 Les Bougrières/Gravières de Bruz, 900 le 1/02 de Cancale à Cherrueix, 87 le 3/03 Rance maritime, 685 le 6/03 de Cancale à Cherrueix.

Migration pré-nuptiale :

A partir de la deuxième quinzaine de mars, les hivernants partent massivement : 40 le 15/03 B.M.S.M., 9 le 18/03 Havre de Rothéneuf/St Coulomb, 1 le 19/03 Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-erbrée, 11 le 22/03 Havre de Rothéneuf, 2 le 28/03 Chateauneuf-La Goutte/Rance, 4 le 25/04 Havre de Rothéneuf, 2 le 26/04 Etang de Châtillon-en-Vendelais,

Le courlis cendré (suite) :

32 le 3/05 dans le marais de Sougeal.

Le mois de juin est plus calme et marque une pause entre les deux passages : 8 le 27/06 à Châteauneuf d'Ille et Vilaine, puis 3 le 8/07 à la Trappe/Piré sur Seiche.

La deuxième décade de juillet semble marquée par un afflux dû au passage post-nuptial : 15 le 13/07 à Châteauneuf, 64 le 25/07 de Cancale à Cherrueix/Baie du Mont St-Michel, 16 le 2/08 à Châteauneuf.

De début août à septembre, aucun mouvement significatif n'est à signaler : 23 le 11/10 et 25 le 11/11 au havre de Rothéneuf/St-Coulomb, 21 le 11/10 et 46 le 1/11 sur la Rance, 35 le 15/11 à Cancale, 61 le 12/12 et 74 le 14/12 sur la Rance Maritime.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) : 19 données

Seulement 2 données durant l'hiver 86/87 : 10 le 13/12/86 sur le Couesnon/Baie du Mont St-Michel et 10 + le 14/12/86 sur l'étang de Chatillon en Vendelais.

La migration pré-nuptiale est peu sensible dans le département : 1 le 1/03 à St-Suliac/Rance, 1 le 24/04 et 2 le 8/05 à l'étang Pas du Houx/Paimpont.

La migration post-nuptiale commence en juillet : 28 le 4/07 en baie du Mont St-Michel. Puis aucune donnée avant le 10/08, date à laquelle le passage devient régulier sur les étangs de la région de Vitré : 2 le 10/08, 1 les 18 et 20/08, 1 les 21 et 24/08, 1 le 31/08 sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée, 1 le 23/08 et 2 le 30/08 sur l'étang de Chatillon en Vendelais. En septembre, les données s'espacent : 1 le 11/09 et 2 le 23/09 sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée, 1 le 14/09 à Lillion/Gravières de Bruz.

Seulement 2 données jusqu'à la fin de l'année : 1 le 9/10 sur l'étang du Boulet/Feins et environ 10 le 17/11 en baie du Mont St-Michel.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) : 62 données

Dans la deuxième quinzaine de janvier les effectifs sont importants : 23 le 17/01 au havre de Rothéneuf/St-Coulomb, 13 le 18/01 à Taden/Rance, 18 le 18/01 à St-Briac et 67 le 20/01 de Cancale au Vivier sur mer/Baie du Mont St-Michel. Puis 62 le 1/02 sur le même parcours et 19 le 15/02 au havre de Rothéneuf.

Le départ des hivernants est assez important début mars : 15 individus sont dénombrés le 6/03 de Cancale à Cherrueix/Baie du Mont St-Michel.

Migration pré-nuptiale :

un léger passage à partir de la fin mars : 4 le 19/03 sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée, 1 le 22/03, 2 le 26/03, 1 le 5/04 et 1 le 26/04 sur l'étang de Chatillon en Vendelais, 10 le 8/04 dans le marais de Sougeal. En mai le passage devient important : 55 en vol vers l'est dans l'anse de Verger/St-Coulomb, 2 le 8/05, 3 le 11/05 et 6 le 13/05 dans les gravières de Bruz, 1 le 21/05 sur le lac de Haute-Vilaine et 1 le 23/05 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

Migration post-nuptiale :

Une seule donnée en juillet : 14 le 25/07 de Cancale à Cherrueix.

Le passage post-nuptial n'est véritablement perceptible qu'en août sur les étangs de la région de Vitré : 1 le 1/08, 2 le 15/08, 1 le 20/08 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée, 2 le 2/08, 1 les 17/08 et 20/08 sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée, 1 les 23/08 et 30/08 sur l'étang de Chatillon en Vendelais. Une seule donnée côtière : 1 le 2/08 au havre de Rothéneuf/St-Coulomb.

La fin de la période n'est marquée par aucun mouvement significatif, si ce n'est une augmentation légère et régulière des effectifs d'hivernants : 9 le 10/09, 15 le 11/10, 13 le 31/12 au havre de Rothéneuf, 22 le 17/10, 24 le 1/11 et 21 le 14/12 sur la Rance Maritime et 20 le 25/10 sur l'îlot de Bizeux/St-Malo.

CHEVALIER STAGNATILE (*Tringa stagnatilis*): 4 données

Un seul individu est observé du 2 au 13/08 sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée.

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*): 52 données

Migration prénuptiale :

de fin avril à fin mai : 2 le 24/04 sur l'étang du Pas du Houx/Paimpont, 1 le 26/04 sur l'étang de Chatillon en Vendelais, 1 les 30/04, 21/05 et 23/05 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée, 1 le 11/05 aux Bougrières/Gravières de Bruz, 1 le 28/05 dans l'anse du Garo/Rance.

A noter une observation précoce : 1 le 1/02 au Havre de Rothéneuf.

Migration postnuptiale :

début à la deuxième décade de juillet et fini mi-octobre. cette migration est particulièrement forte (122 individus) et localisé essentiellement sur les étangs de la région de Vitré : lac la Valière/Vitré : 2 le 15/08, étang de Paintourteau/Erbrée : 3 le 14/07, 4 le 20/07, 1 le 1/08 et 2 le 15/08, 3 le 20/08, 1 le 23/08, 3 le 30/08, étang de Chatillon en Vendelais : 3 le 23/08, 1 les 30/08, 13/09 et 20/09, lac de Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée : 1 à 6 du 16/08 au 13/09, 12 le 14/09, 7 à 5 du 18 au 27/09, 2 le 11/10, 1 le 16/10.

A noter également 2 données côtières : 5 le 23/08 et 3 le 28/09 dans le marais des Guettes/Rance maritime. Et enfin 1 donnée près de Rennes : 3 le 14/09 à L'Ilion/Gravières de Bruz.

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*): 70 données

Jusqu'en février ce chevalier est présent partout en petit nombre. Quelques oiseaux sont observés pendant la migration prénuptiale : 1 le 19/03 sur le lac de Haute Vilaine/La Chapelle Erbrée, 1 le 29/03 sur l'étang de Chaillou/Montauban et 1 le 8/05 dans les Gravières de Bruz.

La migration postnuptiale débute dès juillet : 2 le 5/07 et 5 le 14/07 sur l'étang de Paintourteau, 2 le 5/07 dans le marais des Guettes/St-Suliac,

1 le 14/07 sur le lac de la Valière/Vitré.

A partir de la deuxième quinzaine de juillet les effectifs gonflent rapidement : 4 le 15/07 sur l'étang de Châtillon en Vendelais, 7 le 20/07, 9 le 4/08 et 13 le 30/08 sur le lac de la Valière, 12 le 2/08, 9 le 9/08, 14 le 11/08 et 9 le 28/08 sur le lac de Haute Vilaine/La Chapelle Erbrée, 10 le 20/08 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée.

A partir de septembre, les effectifs sont moins importants : 4 les 2, 11 et 14/09 et 1 le 11/10 sur le lac de Haute Vilaine, 1 le 20/09 sur l'étang de Paintourteau, 1 les 20/09 et 11/10, 2 le 27/09 sur le lac de la Valière, 1 les 14/11 et 21/11 sur le Couesnon/Baie de Mont St-Michel.

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*): 28 données

Le passage prénuptial est faible en mai : 4 le 8/05 sur l'étang du Pas du Houx/Paimpont, 1 le 22/05 à Tanouarn/Dingé.

Le passage postnuptial est par contre plus fort sur 2 sites traditionnels (pic d'abondance 2ème décade d'août) :

étang Chatillon en Vendelais : 1 le 15/07, 2 le 9/08, 4 le 23/08, 2 le 30/08
lac de Haute Vilaine (voir tableau) :

<u>août</u> :	jours :	8	9	11	13	14	16	17	18	20	21	24	28
	nombre :	2	2	3	3	4	5	4	3	4	5	5	2

<u>septembre</u> :	jours :	1	4	13	15	18	20
	nombre :	2	2	1	1	1	1

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*): 110 données

Hiver 86/87 :

1 le 5/01 à St-Briac, 1 le 22/02 à St-Jouan des Guérets/Rance Maritime.

Migration prénuptiale :

débute mi-avril : 2 le 18/04 sur l'étang de Marcillé Robert, 4 le 20/04 et 8 le 23/05 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée, 1 le 21/04 au Parc des Gayeulles/Rennes, 1 le 24/04 sur l'étang du Pas du Houx/Paimpont, 6 le 1/05 à la pointe du Grouin/Cancale, 2 le 13/05 aux Bougrières/Gravières de Bruz, 3 le 20/05 dans l'anse de Garrot/Rance Maritime, 3 le 21/05 sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée.

Migration postnuptiale :

bien suivi sur les étangs de la région de Vitré, il commence début juillet et le gros des effectifs passe en août : 5 le 7/07 au Biez du Vivier/Baie de Mont St-Michel, 4 le 17/07 sur l'étang de Chatillon en Vendelais, 6 le 20/07 sur le lac de la Valière/Vitré,

Suivi sur le lac de Haute Vilaine : 4 le 16/07, 6 le 20/07, en août et septembre voir tableaux ci-après :

<u>août</u> :	jours :	2	9	11	14	17	18	21	24	27	31
	nombre :	10	20	24	35	42	45	48	54	25	29

septembre :	jours :	2	7	11	13
	nombre :	35	31	15	13

En octobre la chute des effectifs est brutale : 1 le 11/10 sur le lac de Haute Vilaine/La Chapelle Erbrée, 1 le 16/10 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée. Quelques données hivernales ne concernant que des individus isolés ou 2 individus le 22/11 dans l'anse du Garrot/Rance Maritime.

TOURNEPIERRE A COLLIER (*Arenaria interpres*): 65 données

Hiver 86/87 :

85 le 17/01 à Fort National/St-Malo, 10+ le 4/01 et 10 le 17/01 au Havre de Rothéneuf/St-Coulomb, 11 le 17/01 au Petit Chevreuil/St-Coulomb, 15 le 18/01 dans l'anse Duguesclin/St-Coulomb, 25 le 18/01 et 28 le 15/02 à la pointe de la Varde/St-Malo, 20 le 1/02 à la pointe du Grouin/Cancale, 24 le 1/02 à la Guimorais/St-Malo.


Migration pré-nuptiale :

33 le 21/03 à Fort National/St-Malo, 13 le 22/03 au Bénétin/St-Coulomb, 55 le 22/03 et 69 le 28/03 à la Varde/St-Malo. Pas d'observation en avril. Fin du passage pré-nuptial en mai : 35 le 1/05 à Fort National/St-Malo, 5+ le 24/05 au Chevreuil/St-Coulomb, et 15 le 24/05 au Bénétin.

Migration post-nuptiale :

56 le 2/08, 60 le 12/08, 26 le 10/09 et 32 le 13/09 au Havre de Rothéneuf/St-Coulomb, 1 les 10 et 11/08 sur le lac de Haute Vilaine/La Chapelle Erbrée (donnée intérieure).

Les hivernants arrivent à partir du 11 novembre : 70 le 11/11, 60 le 15/11 et 40 le 14/12 à la Varde/St-Malo, 68 le 11/11 et 14 le 14/12 à Fort National et 51 le 11/11 et 45 le 15/11 au Havre de Rothéneuf, 45 le 14/12 à la Roche Pelée/Dinard, 16 le 14/12 au Petit Chevreuil/St-Coulomb.



CHATAIGNÈRE . L .

La sterne pierregarin (dessin de Laurent CHATAIGNÈRE)

GROUPE n° 3 B

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*): 1 donnée

1 adulte en phase sombre au lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-Erbrée le 7/09

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*): 1 donnée

1 près de Fort National/St-Malo le 23/11.

MOUETTE MELANOCEPHALE (*Larus melanocephalus*): 1 donnée

1 à St-Jouan des Guérets/Rance maritime le 1/03. Cette espèce est à rechercher avec attention, plus particulièrement dans les grands rassemblements littoraux de laridés.

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*): 5 données

Une donnée intérieure : 1 adulte à Lillion/Gravières de Bruz le 27/11.
Par ailleurs, seulement 4 données hivernales sur le littoral : 1 à St-Malo le 19/02, 1 immature les 18/11 et 1/12 en Rance Maritime, 1 adulte à Port St-Jean/Rance Maritime le 3/12.

MOUETTE RIEUSE (*Larus rudibundus*): 12 données

Nidification :

Etang des Roches/Chelun : 10 adultes et 5 nids (1 poussin nageant) le 14/06.
Pas de donnée sur les nicheurs de la région de Redon.

Migration et hivernage:

Notons seulement les rassemblements suivants : 1000+ sur l'étang de Châtillon en Vendelais le 29/11/86, 1000+ sur la zone industrielle de Rennes sud le 30/01, 25000 à l'aube sur des reposoirs de marée haute, de Cancale à Cherrueix le 1/02, 260 le 21/11 et 1300 le 5/12 sur le lac de la Valière/Vitré, 4 à 5000 en dortoir sur l'étang de Bazouges sous Hédé le 13/12, 9000 en dortoir sur l'étang de Châtillon en Vendelais le 31/12.

Il serait fortement souhaitable d'entreprendre un recensement le plus exhaustif possible des dortoirs hivernaux de cette espèce pour arriver à une estimation des effectifs hivernant dans notre département.

GOELAND CENDRE (*Larus canus*) : 19 données

Sur le littoral d'Ille et Vilaine, cette espèce se concentre surtout en baie du Mont-St-Michel où sur les reposoirs de marée haute situés de Cancale à Cherrueix, 4500 oiseaux ont été dénombrés, à l'aube, le 1/02 et 450 le 25/07. Outre un essai d'estimation des effectifs totaux hivernant dans cette baie, il serait bon de connaître sa dispersion sur notre littoral (Havre de Rotheneuf et Rance maritime en particulier).

Un net afflux de goélands cendrés a été constaté à l'intérieur des terres pendant l'hiver 1986/1987 (13 données du 30/11/86 au 2/04/87) :

- Parc des Bois/Rennes : 1 immature 1er hiver le 30/11/86, 1 adulte le 17/01, 6 dont 1 adulte le 18/01, 2 immatures 1er hiver et 1 subadulte le 21/01, 1 immature de 1er hiver le 18/02.

- Saint-Laurent/Rennes : 1 immature le 17/01, 3 le 18/01

- Les Bougrières/Gravières de Bruz : 3 le 23/01, 10 le 27/01

- La Planche/Gravières de Bruz : 1 immature le 2/04

- Etang de Combours : 5 le 28/12/86

- St-Christophe de Valains : 5 le 10/01

- St-Ouen la Rouerie : Plusieurs dizaines dans les champs le 14/03

La plupart de ces données sont à mettre en relation avec la forte vague de froid de janvier 87.

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*): 33 données

Nidification :

Au total 336-346 couples nicheurs ont été dénombrés sur 8 îles et îlots d'Ille et Vilaine en 1987. Cette espèce niche également sur certains bâtiments de la ville de St-Malo. Seule la vieille ville intra-muros a fait l'objet d'un décompte exhaustif : 9 couples nicheurs le 27/05.

Données intérieures : Cette espèce est le goéland le plus fréquemment signalé à l'intérieur des terres. On peut retenir plus particulièrement les observations effectuées sur les grands plans d'eau de l'est du département :

- Etang de Paintourteau/Erbrée : 2 adultes et 1 immature le 4/04, 1 le 9/04, 1 adulte le 20/07.

- Lac de Haute-Vilaine/La Chapelle-Erbrée : 1 le 4/08, 1 adulte le 11/08, 1 le 16/08, 2 le 21/08, 1 adulte le 28/08, 1 le 2/09, 1 immature le 7/09, 1 les 13 et 14/09.

- Lac de la Valière/Vitré : 6 le 20/07, 1 les 2 et 9/08, 2 le 15/08, 4 le 21/08, 2 les 13/09, 1 le 20/09, 2 le 14/11.

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*): 23 données

Nidification :

Au total 6176 nids ont été dénombrés sur 16 îles et îlots d'Ille et Vilaine en 1987. La nidification en zone urbaine de cette espèce est loin d'être négligeable mais son importance réelle reste encore méconnue. Seule la vieille ville de St-Malo intra-muros a fait l'objet d'un décompte exhaustif : 102 nids le 27/05. Un effort doit être porté sur les autres villes littorales, en particulier Dinard où la reproduction a été effective en 1984 et 1985 (Le Mao données inédites).

Autres données : En zone littorale notons seulement 2000 oiseaux (5% d'adultes) sur les bouchots à moules dans la baie du Mont St-Michel le 27/04. A l'intérieur des terres peu d'observations nous ont été rapportées. Sur les grands plans d'eau de l'est du département, il n'a été noté que 3 fois contre 20 fois pour le goéland brun.

GOELAND LEUCOPHEE (*Larus cachinnans*): 3 données

Cette espèce reste encore peu notée dans notre département, ce qui correspond sans doute plus à une inattention des observateurs qu'à une rareté réelle :

- 2 adultes dans le bras de Châteauneuf/Rance maritime le 11/08
- 1 dans un champ à Landujan le 25/11
- 1 adulte sur le bassin Duguay Trouin/St-Malo le 16/12.

Le goéland leucophee serait à rechercher dans la vallée de la Vilaine, plus particulièrement sur les gravières au sud-ouest de Rennes.

GOELAND MARIN (*Larus marinus*): 14 données

Nidification : Au total 82 nids ont été dénombrés sur 14 îles et îlots d'Ille et Vilaine en 1987. Il n'y a pas encore eu de nidification urbaine prouvée pour cette espèce bien que quelques adultes fréquentent les toits de St-Malo et Dinard en période estivale.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*): 1 donnée

Cette espèce reste très peu observée en Ille et Vilaine malgré la proximité des colonies de reproduction du Cap Fréhel. Une seule donnée nous a été rapportée : 1 à la pointe du Décollé/St-Lunaire le 19/06.

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*) 11 données

Aucune observation rapportée pour la saison pré-nuptiale. Pour la migration post-nuptiale retenons seulement : 18 vers l'ouest à la pointe du Grouin/Cancale le 30/08, 8 à la Guimorais/St-Coulomb le 25/09, 1 à la Ville Ger/Rance maritime le 11/10, 3 en 2H à la pointe du Meinga/St-Coulomb le 25/10.

Deux données hivernales en Rance maritime : 5 le 9/12 et 1 le 12/12.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*): 17 données

Nidification :

sur l'île Notre-Dame ou île au Moine/Rance maritime : 97 pontes dont 2 de 4 oeufs le 28/05 ; environ 100 jeunes proches de l'envol le 27/06 ; 350 oiseaux dont 150 juvéniles le 11/08.

Migration prénuptiale :

5 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée le 30/04 ; 15-20 dans le havre de Rothéneuf/St-Coulomb le 1/05.

Migration postnuptiale :

notons seulement : 35 dans le port de Cancale le 25/08, 1 sur le lac de Haute-Vilainé/La Chapelle Erbrée le 14/09, 2 sur l'étang de Bazouges sous Hédé le 18/10, 2 en 2H à la pointe du Meinga/St-Coulomb le 25/10, 1 au Minihic/Rance maritime le 1/11.

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*): 3 données

Uniquement observée en migration postnuptiale :

- 4 dont 2 juvéniles aux Hermelles/Baie du Mont Saint-Michel le 10/08/87 ;
- 1 le 23/08 et le 25/08 dans le port de Cancale.

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*): 15 données

Une seule donnée de migration pré-nuptiale :

- 7 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée, le 30/04.

Deux observations doivent se rapporter à des oiseaux en estivage :

- 1 adulte nuptial sur l'étang de Chatillon-en-Vendelais le 1/06 ;
- 1 sur l'étang de Paintourteau/Erbrée le 14/06.

Migration postnuptiale :

La migration postnuptiale est sensible de mi-juillet à fin septembre :

- étang de Chatillon-en-Vendelais : 5 le 5/07 ; 2 le 23/08 ; 1 le 30/08 ;
- étang de Paintourteau/Erbrée : 4 le 5/07 ; 1 le 14/07 ; plus de 10 le 20/08, 1 le 14/09 ;
- lac de La Valière/Erbrée : 2 le 20/09 ; 1 le 27/09 ;
- Rance maritime : 1 dans le bras de Châteauneuf le 20/07
- Baie du Mont Saint-Michel : 1 aux Hermelles le 10/08.

GUILLEMOT DE TROIL (*Uria aalge*): 3 données

Nidification :

- 2 adultes cherchent à se poser à deux reprises dans les falaises nord et est de l'île de Cézembre/St-Malo le 4/07. Ces falaises sont, à priori, favorables à une nidification de quelques couples de cette espèce.

La proximité des colonies en pleine expansion du Cap Fréhel, (220-240 couples en 1987) , rend l'hypothèse d'une nidification future très plausible.

Autres observations :

- 1 à Quelmer/Rance maritime le 30/11,
- 1 à Port-St-Hubert /Rance Maritime le 1/12.

PINGOUIN TORDA (*Alca torda*): 21 données

Nidification :

Pour la première fois en Ile et Vilaine , la nidification de l'espèce a été constatée : sur l'île de Cézembre/St-Malo 1 couple est cantonné le 30/05 ; le 4/07, 8 adultes sont présents sur le site dont 1 couple avec un gros pullus et 2 couples cantonnés (vols de parade).


Il s'agit sans aucun doute d'une implantation récente de l'espèce, ce qui est particulièrement étonnant si l'on considère la régression marquée du pingouin torda sur les côtes bretonnes. Ces oiseaux sont peut-être originaires du Cap-Fréhel où la population nicheuse montre une certaine stabilité (17 couples en 1987).

Autres observations :

En Rance Maritime l'espèce a été abondante à la fin de 1987 : 3 adultes au barrage marémoteur le 13/07 ; 5 le 18/11 ; 10 à Quelmer le 30/11 ; 24 le 1/12 ; 33 le 2/12 ; 61 le 3/12 ; 38 le 12/12.

Ailleurs sur le littoral nous pouvons retenir les observations suivantes :

- 1 dans le Bassin Vauban/St-Malo le 21/01 ;
- 1 adulte nuptial au port de Saint-Servan le 4/07 ;
- 24 en 2 heures à la Pointe du Meinga/St-Coulomb le 25/10.



Le Petit Pingouin (dessin de Philippe GALARD)

GROUPE 4

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*): 8 données

700 à 800 sur les polders du Mont St-Michel le 8/01 puis 50 maximum le 11/01.

2 chanteurs le 8/03 à l'étang de Châtillon en Vendelais, 2 le 15/03 à Châteauneuf d'Ille et Vilaine, 2 le 17/08 à l'Ilion/Gravières de Bruz, 1 le 23/08 à Paintourteau/Erbrée, 1 le 6/07 sur le lac de Haute-Vilaine/La Chapelle Erbrée, 1 le 26/12 à la Mare/Vitré.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*): 6 données

Quelques concentrations : 100 à 150 sur les polders du Mont St-Michel le 8/01, 50 maximum le 11/01 puis 800 le 31/01, 300 le 24/01 à la Bouéxière.

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*): 5 données

80 le 8/01 à Châteaubourg, 150 le 9/10 à St-Malo, 1 vol nuptial le 18/11 à Quédillac.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*): 7 données

1ère Observation : 1 le 23/04 à Rannée

dernières observations : 3 le 25/09 à Miniac sous Bécherel et 7 le 5/10 à la Ville es Nonais.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*): 26 données

1ère donnée : 1 le 9/04 en forêt de Taillis/St Christophe des bois.

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*): 18 données

Notée à Chantepie, St-Aubin du Pavail, Messac, Piré sur Seiche, Cancale, Le Minihic sur Rance, Amanlis, Châteaugiron, Le Grand Fougeray, Janzé, Marcillé-Robert, St-Aubin des Landes.

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*): 11 données

Notée à Piré sur Seiche, Chantepie, St-Suliac, La Chapelle Erbrée, Betton.
A Ercée en Lamée : 2 sites de reproduction.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*): 7 données

Notée à Piré sur Seiche, Rannée, Amanlis, St-Lunaire.

Au Sel de Bretagne : 1 famille avec 2 adultes et 2 jeunes le 3/07.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*): 7 données


Noté exclusivement dans la baie du Mont St-Michel : 2 à 3 individus le 8/01 sur les polders, 3 données en février pour 1 individu, 1 le 4/07 à la ferme Foucault, 1 le 5/07 à la ferme Neuve, 1 le 27/09 au Vivier.

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*): 3 données

Cris de jeunes le 26/04 dans le bois de Pouez/Chanteloup, 1 le 27/04 à Ercée en Lamée, 1 le 23/05 dans le bois de la Richardais/Goven.

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*): 3 données

1 chanteur le 9/05 dans le bois de Courrouet/Maure de Bretagne, 1 migrateur le 16/05 à St-Jouan des Guérets, 2 chanteurs le 22/06 en forêt de Chevré.



L'engoulevent (dessin de Pierre TILLIER)

MARTINET NOIR (*Apus apus*): 12 données

Les premières observations : le 20/04 à Piré sur Seiche, le 23/04 à Rennes, le 26/04 arrivée massive à St-Malo, le 28/04 arrivée massive à Rennes.

MARTIN PECHEUR D'EUROPE (*Alcedo atthis*): 19 données

Observations régulières toute l'année, noté sur divers étangs :

Les Forges/Paimpont, Haute-Vilaine/La Chapelle-Erbrée, Vaux/Dingé, Le Chatenay/Paimpont, Châtillon en Vendelais, Paintourteau/Erbrée, la Valière/Vitré, le Beauchet/St-Suliac, Bazouges sous Hédé.

Puis en fin d'année en milieu maritime : 3 données en Rance en octobre et 1 le 18/11 au Fort National/St-Malo

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*): 6 données

Premières observations : le 6/04 à la Chapelle Ste-Anne/Cherrueix, le 16/04 à Ercé en Lamée, le 20/04 à Piré sur Seiche.

1 chanteur le 24/04 dans le bois au Voyer/Maure de Bretagne, 1 chanteur le 1/05 à Pléchatel, 1 couple nicheur à Renac le 28/05.

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*): 1 donnée

Ercé en Lamée : 1 couple sur un site traditionnel le 16/06. Pas d'observation à St-Jacques de la Lande sur le site occupée en 1984 et 1985.

PIC CENDRE (*Picus canus*): 10 données

1 mâle le 22/01 à St-Jacques de la Lande, 1 le 25/01 à Miniac sous Bécherel, noté de février à avril à Châtillon en Vendelais, 1 chanteur le 9/04 à St-Christophe des Bois, 1 le 8/05 à Landemaraïs/Parigné, 1 autre le même jour à Louvigné du Désert, 1 le 30/05 au barrage de la Rance. Cette dernière donnée est intéressante car c'est la 2ème donnée côtière pour cette espèce en Ille et Vilaine (1ère observation à Cancale).

PIC VERT (*Picus viridis*): 4 données

3 chanteurs le 11/02 sur un parcours de 60 km et 1 couple avec des jeunes le 8/05 à Landemaraïs/Parigné.

PIC NOIR (*Dryocopus martius*): 10 données

1 chanteur le 22/02 en forêt de la Musse/Baulon, 1 chanteur le 24/02 et de nombreuses traces notées le 22/03 en forêt de Montfort. Nidification certaine dans le bois au Voyer/Maure de Bretagne : 1 mâle noté le 20/03 puis le mâle nourrissant la femelle dans la loge le 24/04. le couple nourrit au nid le 10/05. Des cris sont entendus le 10/05 au carrefour Fresnais/Forêt de Rennes et le 20/10 en forêt de Chevré/La Bouexière. Quelques données négatives le 31/01 en forêt de Maxent, en forêt de Fougères, en forêt de Montauban, à la Tournerais/Goven.

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*) : 5 données

Noté à Piré sur Seiche, à Marcillé-Robert et à Saint-Malo de Phily.


PIC MAR (*Dendrocopos medius*): 6 données

1 individu le 18/01 à Hédé, 1 chanteur le 11/02 en forêt de Rennes, 1 chanteur 28/02 en forêt de Villecartier/Bazouges la Pérouse, 1 chanteur le 4/04 au bois de Buisson/Iffendic (nouveau site), 1 chanteur le 24/04 aux Maffrais/Forêt de Rennes et 2 individus le 10/05 au bois de Piriou /St-Malo de Phily (nouveau site).

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*): 15 données

1 couple le 30/06 dans les prairies St-Martin et 1 jeune le 6/07 au parc des Gayeulles. Noté aussi dans les gravières de Bruz, à Marcillé-Robert, à Cancale, à Piré sur Seiche, à Parigné, en forêt de Rennes, à Montauban de Bretagne et au Mihinic sur Rance.

LE PIC NOIR NICHE EN FORÊT DE RENNES



(dessin de Philippe GALARD)

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) : 17 données

Fin hivernage 86/87 :

Un passage est observé à partir de la troisième décade de janvier, mais la faiblesse des chiffres laisse penser que la vague de froid n'a pas eu un impact considérable sur cette espèce : le 23/01, 2 groupes de 80 et 40 individus réserve/B.M.S.M., 100 embouchure du Couesnon/B.M.S.M. et 50 Ste Anne/B.M.S.M.. Une donnée concerne sans doute des retours : 20 à 30 en vol le 8/02 Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel.

Nidification :

Les premiers cantonnements sont observés le 11/02 à Bécherel, avec 4 individus le long d'un parcours de 60 kms à vélo. A noter, la présence de 10 chanteurs pendant la période de nidification à l'Etang de Marcillé-Robert.

Migration post-nuptiale :

Un passage nocturne est noté le 25/10 à St Malo. Le 10/10 ce passage était quasi inexistant avec seulement 2 individus en 1h30 direction N-S à la Pointe du Grouin.

Début hivernage 87/88 :

Quelques bandes importantes sont observées dans les terres : 60 le 23/11 Chavagne, 50 le 2/12 Langouet, 50 à 60 le 7/12 Melesse, 150 le 12/12 Reims/Langouet et 150 le 12/12 La Roche Briand/Montauban.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) : 7 données

Migration pré-nuptiale :

1 individu en vol parmi des Alouettes des champs au Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel.

Nidification :

Les premiers chants assidus sont notés à partir de mi février : 1 le 11/02 Feins et 1 le 22/02 Goven. Des chanteurs sont entendus dans des localités nouvelles : 1 le 1/03 St Benoît des Ondes/B.M.S.M. et 1 16/04 Cherrueix/B.M.S.M. (peut-être s'agit-il du même individu ?), et 1 donnée tardive et sans doute peu significative quant à la nidification : le 21/08 Etang de Haute Vilaine/Chapelle-erbrée. Enfin, 1 chanteur le 20/04 Marais de Ste Anne sur Vilaine.

ALOUETTE HAUSSECOL (*Eremophila alpestris*) : 3 données

Fin hivernage 86/87 :

Comme tous les ans, un petit contingent vient hiverner en B.M.S.M. : 2 le 8/01 et 5 à 10 le 11/01.

Début hivernage 87/88 :

1 donnée, plus précoce : 2 le 28/11.

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) : 32 données

Migration pré-nuptiale :

La première hirondelle est observée le 19/03 Croix rouge/Vitré, mais il faut attendre la fin de la troisième décade pour que les observations se multiplient, et la première quinzaine d'avril pour que des groupes soient observés : 150+ le 9/04 Etang de Châtillon en Vendelais, 30+ le 10/04 Longschamps/Rennes. Arrivée quasi générale le 12/04 dans la région de Bécherel.

Migration post-nuptiale :

Fin août, les premiers rassemblements pour le départ s'amorcent, mais la migration ne commence véritablement que fin septembre. Quelques retardataires sont encore observés en octobre sur la côte : 70 le 30/08 Etang de Châtillon en Vendelais, le 23/09 l'espèce n'est plus observée à Miniac-sous-Bécherel, 45 en 2h vers le Sud Chevrete/St Coulomb, 2 le 2/10 St Méloir-des-Ondes, 1 le 9/10 Ste Anne/B.M.S.M. et 3 en 2h le 25/10 Pointe du Ménga/St Coulomb.

HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*) : 9 données

Migration pré-nuptiale :

Les premiers arrivants sont notés le 26/03 avec 5 au Saussaye/Cancale, puis 4 le 9/04 Etang de Châtillon en Vendelais et 150 le 15/04 Chateauneuf-d'Ille-et-Vilaine.

Migration post-nuptiale :

L'espèce est toujours présente le 23/09 à Miniac-sous-Bécherel, 2 en 2h vers le Sud Chevrete/St Coulomb et une dernière observation avec 1 le 9/10 Ste Anne/B.M.S.M..

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) : 11 données

Migration pré-nuptiale :

Les premiers migrants arrivent fin mars et surtout la première décade d'avril : 9 le 20/03 Lezin/Chapelle-de-Brain, env. 40 le 5/04 Plage du Verger/St Coulomb, 3 le 9/04 Etang de Châtillon en Vendelais, quelques individus le 11/04 Etang de Comper/Paimpont, env. 10 le 19/04 Gravières de Bruz et 15 le 20/04 Etang de Marcillé-Robert.

Nidification :

Une seule donnée concernant les sites de nidification de l'espèce dans le département : 40 nids dans la carrière de sable de La Heuzardière/Le Rheu.

Migration post-nuptiale :

Aucune donnée concernant les départs, si ce n'est : 1 le 25/09 en 2h vers le Sud Chevrets/St Coulomb.

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*) : 1 données

Migration post-nuptiale :

Une donnée précoce : 1 le 18/08 Garde Guérin/St Briac-sur-mer.

PIPIT SPIONCELLE MONTAGNARD

(*Anthus spinoletta spinoletta*) : 16 données

Il convient de remarquer que 80% des données a été fourni par 2 observateurs seulement.

Hivernage 86/87 :

Les premières arrivées se font dans la troisième semaine de novembre et concernent des petites bandes : 15 le 25/11 dans les Herbus du Vivier-sur-mer/B.M.S.M., 4-5 le 26/11 Bazouges-sous-Hédé/Hédé (ces individus seront observés jusqu'au 9/01), 4 le 8/01 Etang de Châtillon en Vendelais, 5 le 10/01 Etang d'Oué/Gosné, et enfin 1 le 20/02 Etang de Châtillon en Vendelais.

Hivernage 87/88

Les données sont moins nombreuses. Première observation le 15/11

avec 2+ individus Etang de Ste Suzanne/St Coulomb, 2 le 21/11 et Bazouges/Hédé, 1 le 12/12 La Roche Briand/Montauban.

PIPIT SPIONCELLE MARITIME

(*Anthus spinoletta petrosus*) : 16 données

Migration pré-nuptiale :

En mars, un passage semble se dérouler : 8 le 18/03 Havre de Rothéneuf/St Coulomb et 3 le 22/03 Réservoir de Haute-Vilaine/Chapelle-erbrée.

Nidification :

Un recensement sur certaines îles a permis de démontrer une présence régulière de cette espèce, même sur des îlots :

- Ile Bénétin/St Coulomb : 1 couple;
- Ile Grand Chevreuil/St Coulomb : 2 couples;
- Ile de Cézembre/St Malo : 3 chanteurs;
- Fort de Harbour/Dinard : 1 couple;
- Ile Agot/St Briac-sur-mer : 5-6 couples
(transport de nourriture et juvéniles volants le 31/05).

Migration post-nuptiale :

A partir d'octobre, un passage est noté dans les terres : 2 le 18/10 et 1 le 25/10 Etang de Bazouges/Hédé, 2 le 21/11 Bazouges, 1 le 12/12 La Roche Briand/Montauban.

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) : 14 données

Nidification :

Premiers chanteurs début avril : 1 chanteur le 5/04 Les quatre chemins/Montreuil-le-Gast, 2 chanteurs le 5/04 Les Ecroutaux/Combourg, 1 chanteur le 9/04 Forêt de Taillis/St Christophe des bois et 1 chanteur le 10/04 Bois de Chevrillé/Cancale. Sinon, l'espèce est signalée dans des sites traditionnels de nidification : 1 couple le 9/05 Parc des Gayeulles/Rennes, 2 chanteurs le 17/05 Bois de Beaucel/St Ganton, 3 chanteurs le 17/05 Bois de Baron/Guipry, 2 chanteurs le 20/05 Etang des Maffrais/Forêt de Rennes, 6 chanteurs le 28/05 Marais de Ste Anne-sur-Vilaine et 7+ chanteurs le 30/05 Forêt de Rennes.

Hivernage 86/87 :

Quelques bandes importantes sont observées : 15 le 23/11 Les Haies/Quedillac, 50+ le 6/12 Pointe du Grouin/Cancale et 30 à 40 le 18/01 La Bezardière/Hédé.

Migration pré-nuptiale :

Des chanteurs sont entendus le 16/02 Parc des Gayeulles/Rennes, mais il s'agit certainement de migrants, le passage se poursuivant au moins jusqu'au 12/04 où une bande d'une quinzaine d'individus est notée à Pleugueuneuc.

Nidification :

Dans la seconde quinzaine d'avril les chants entendus ont certainement trait à des individus cantonnés : 1 chanteur le 19/04 St Onen-La-Chapelle et 2 chanteurs le 23/04 Forêt de la Guerche/Rannée.

Migration post-nuptiale :

Le passage est sensible à partir de fin septembre et bat son plein en octobre : 30 en vol le 28/09 Epargne/Acigné, 5 en vol le 3/10 Le Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel, 20 le 4/10 Guenroc, 55 en 1h30 vers le Sud et env. 10 posés le 18/10 Pointe du Grouin/Cancale, 40 en 20 mn vers le Sud le 18/10 Pointe du Méinga/St Coulomb et env. 70 au sol le 24/10 Pointe du Méinga. Des mouvements sont à nouveau observés en décembre : 30 le 19/12 Le Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel et 10-15 le 21/12 Les Gayeulles/Rennes.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba alba*) : 9 données

Migration post-nuptiale :

Un petit passage est ressenti : 10 le 28/09 Epargne/Acigné et 4 le 18/10 en 1h30 vers le Sud Pointe du Grouin/Cancale. Sinon, à signaler un dortoir de plus de 650 individus à St Malo.

BERGERONNETTE DE YARRELL (*Motacilla alba yarrelli*) : 7 données

Fin Hivernage 86/87 :

Le 24/03 la dernière Yarrell de la saison est notée à La Ville-

Début Hivernage 87/88 :

Les premières hivernantes sont observées le 11/10 avec 1 aux Gayeulles/Rennes et 1 au Réservoir de Haute Vilaine/Chapelle-erbrée. Mais, l'arrivée massive se déroule surtout à partir de fin octobre : env. 10 le 31/10 St Servan/St Malo et 1 bande de 61 individus composée à 100% de Yarrell du 1 au 15/11 St Malo.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) : 9 données

Migration post-nuptiale :

Quelques données quantifiées : 5 migrateurs en 20 mn vers le Sud le 18/10 Pointe du Méinga/St Coulomb, en 1h30 vers le sud le 18/10 Pointe du Grouin/Cancale et seulement 1 en 2h le 25/10 Pointe du Méinga.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*) : 12 données

Nidification :

Aucun changement notable. La sous espèce *flavissima* n'est notée que dans des zones traditionnelles : 1 mâle le 20/04 Tru/Renac, plus de 4 couples le 3/05 Sougeal, plus de 2 couples le 2/06 Pont du Rosais/La Fresnais (jeunes volants), un petit nombre le 28/06 Polder 4 Salines/B.M.S.M., et elle est notée très nombreuse le 28/06 dans les Herbus de la B.M.S.M. (dont des juvéniles).

Migration post-nuptiale :

3 le 23/08 Etang de Paintourteau/Erbrée, 3 le 2/09 Réservoir de Haute Vilaine/Chapelle-erbrée et 1 le 27/09 Etang de Châtillon en Vendelais.

TROGLODYTE (*Troglodytes troglodytes*) : 8 données

Rien à signaler, si ce n'est que sur la frange littorale, l'espèce n'a apparemment pas souffert de l'hiver 86/87 particulièrement rigoureux, et elle semble aussi nombreuse que d'habitude à se reproduire.

Nidification :

Le chant est noté dès le 29/12/86 à Beaulieu/Rennes et le 27/01 à Rennes, mais il ne devient véritablement assidu qu'à partir du 2/02 aux Gayeulles/Rennes. A noter, le recensement de 70 à 80 individus le long d'un parcours de 60 kms à vélo le 11/02 Bécherel. Sur la frange littorale, l'espèce ne semble pas avoir souffert de l'hiver 86/87 et la nidification s'est déroulée normalement.

ROUGE-GORGE (*Erithacus rubecula*) : 3 données

Nidification :

Le chant ne devient assidu qu'après le 2/02. Le long d'un parcours de 60 kms à vélo, 40 à 50 individus ont été recensés le 11/02 à Miniac sous-Bécherel. Enfin, le froid de l'hiver 86/87 ne semble pas avoir eu d'impact sur la reproduction de l'espèce sur la frange littorale.

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) : 14 données

Nidification :

Première donnée le 19/04 : 1 à Ercé en Lamée. Toutefois, il faut attendre fin d'avril et début mai pour une arrivée généralisée avec les premiers chanteurs : 4 chanteurs le 25/04 Les Maffrais/Forêt de Rennes. L'espèce est signalée dans des secteurs de nidification traditionnels : 5 chanteurs le 18/05 Les Maffrais/Forêt de Rennes, 1 chanteur le 31/05 Bois de la Rehaudais/Goven, 2 couples nicheurs La Guitonais/Ercé en Lamée. Par contre, à noter la présence d'un chanteur à Caradeuc/Bécherel noté du 29/04 au 22/05, endroit où l'espèce n'avait pas été revue depuis 1979; et d'un mâle seul le 29/05 Parc des Gayeulles/Rennes.

Migration post-nuptiale :

Le dernier individu est observé le 21/09 La Chevrolais/St Jacques de la Lande.

Un individu observé en janvier 1987 : 1 femelle le 25/01
B.M.S.M..

Nidification :

L'espèce arrive massivement à partir de la troisième décade de mars, époque à laquelle sont entendus les premiers chanteurs : 2 le 12/03 Réservoir de Haute Vilaine/Chapelle-erbrée, 1 chanteur le 23/03 St Laurent/Rennes, 1 chanteur le 29/03 Minac-sous-Bécherel, 1 chanteur le 31/03 St Servan/St Malo et 2 chanteurs le 31/03 St Laurent/Rennes. A noter enfin, une femelle non cantonnée le 6/05 Pointe de la Varde/St Malo. La reprise des chants est très sensible en septembre : 1 chanteur les 17 et 25/09 Les Gayeulles/Rennes et les 29/09 et 16/10 au Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel.

Migration post-nuptiale :

Les deux dernières données concernent des individus seuls, certainement migrateurs : 1 femelle le 11/11 Réservoir de Haute Vilaine et 1 le 24/12 Le Lavoir/Bécherel.

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*) : 21 données

Nidification :

Les données s'étalent du 9/04 au 15/07. L'arrivée massive des migrateurs survient dans la troisième décade d'avril : 1 chanteur le 9/04 Parc des Gayeulles/Rennes, 1 chanteur le 20/04 Rochereuil/Pancé, 1 le 21/04 Ercé en Lamée et 1 chanteur le 21/04 St Laurent/Rennes. Comme tous les ans, la région de Rennes accueille de nombreux couples:

St Laurent/Rennes : 1 chanteur assidu et alarmes le 6/06;

Parc des Gayeulles/Rennes : 1 chanteur assidu;

Aéroport/St Jacques de la Lande : 3 chanteurs;

La Prévalaye/Rennes : 1 chanteur le 10/05;

Sinon, des chanteurs sont entendus dans des sites traditionnels :

Rochereuil/Pancé : 1 chanteur;

Ercé en Lamée : 6 chanteurs sur toute la période;

St Saturnin/Pléchatel : 4 chanteurs;

La Cassière/Pléchatel : 1 chanteur;

Rue de la Goutte/St Suliac : 1 chanteur;

Les Cours Crues/Chatillon sur Seiche : 1 chanteur;

Marais de Ste Anne sur Vilaine : 1 chanteur;

La Trappe/Piré sur Seiche : alarmes les 20 et 28/06;

Marais du Verger/Cancale : 2 chanteurs.

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*) : 5 données

Nidification :

L'espèce est notée dans des zones traditionnelles de nidification dès le 20/03 :

1 le 20/03 Marais de Gannedel/Chapelle de Brain;

1 chanteur le 20/04 et 1 chanteur et 1 couple le 28/05

Tru/Renac.

Migration post-nuptiale :

Le passage est sensible au Réservoir de Haute Vilaine/Chapelle-erbrée : 2 les 1/09 et 4/09.

TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*) : 7 données

Nidification :

Le premier chanteur est noté le 9/03 à Romillé. Le 14/06, une famille avec 3 jeunes volants est observée à Tannée/St Coulomb. Enfin, il convient de remarquer que l'hiver 86/87 ne semble pas avoir eu d'impact sur la reproduction de l'espèce le long de la frange littorale.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) : 18 données

Migration pré-nuptiale :

Elle se déroule du 19/03 au 3/05, avec une affluence plus marquée dans la seconde quinzaine de mars : 3 le 19/03 Réservoir de Haute Vilaine/Chapelle-erbrée, 1 femelle le 20/03 Marais de Gannedel/Chapelle de Brain, 2 le 29/03 La Grandjottière/Marcillé-Robert, 1 le 3/04 Plaine de Baud/Rennes et 2 le 3/05 Esse.

Migration post-nuptiale :

Celle-ci est beaucoup plus sensible, avec 13 données. Le passage est perceptible du 4/08 au 18/10 et bat son plein de la troisième décade d'août à mi septembre : 1 le 4/08 Lac de la Valière/Vitré, 1 le 21/08 Réservoir de Haute Vilaine, 5 le 23/08 Falias Haut-

Bout/Cancale, 1 les 24/08, 27/08, 2, 7, 11 et 13/09 Réservoir de Haute Vilaine, 1 le 19/09 Tinténiac, 1 le 25/09 L'Ecu/Miniac-sous-Bécherel, 1 le 5/10 Les Gassiaux/Miniac-sous-Bécherel et 1 le 18/10 Pointe du Grouin/Cancale.

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*) : 2 données

Migration pré-nuptiale :

Seul le passage pré-nuptial est perceptible : 1 le 10/04 Paimpont et 1 femelle le 6/05 Pointe de la Varde/St Malo.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) : 9 données

Nidification :

Des chanteurs sont entendus en décembre et février : 1 le 2/12 Gayeulles/Rennes et 1 le 8/02 Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel. Un couple a niché sur l'île aux moines/St Jouan des guérets et un couple avec 2 pulli a été noté à St Malo intra-muros. Les premiers jeunes à l'envol sont observés le 4/05. Apparemment, l'hiver rigoureux n'a pas eu d'impact sur la reproduction de l'espèce le long de la frange littorale.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) : 16 données

Nidification :

Le premier chant est entendu le 7/02 Le Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel. D'autre part, l'hiver très froid semble avoir entraîné une importante diminution des effectifs reproducteurs le long de la frange littoral. Seuls quelques couples isolés sont notés de manière sporadique.

Migration post-nuptiale :

Un petit passage est sensible en octobre : passage nocturne le 4/10 Le Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel, 6 en 1h30 vers le Sud le 18/10 Pointe du Grouin/Cancale et env. 20 le 18/10 Havre de Rothéneuf/St Coulomb.

Nidification :

Les premiers chanteurs sont notés tôt : 1 le 28/11 Rennes et 1 le 14/12 Bazouges-sous-Hédé/Miniac-sous-Bécherel. Un recensement le long d'un parcours de 60 kms effectué à vélo le 11/02 à Miniac-sous-Bécherel a permis de décompter seulement 2 individus. D'autre part, contrairement à la Grive musicienne (*Turdus philomelos*), il semble que l'hiver n'a pas eu d'impact sur la reproduction de l'espèce le long de la frange littorale.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) : 34 données

Hivernage 86/87

Les données ont concerné environ 800 individus de mi-novembre à début avril. Un afflux très net est sensible mi janvier et correspond à l'arrivée de la vague de froid : 30-40 le 16/11 Miniac-sous-Bécherel, 100 le 23/11 Les Haies/Quédillac, 100-150 le 11/01 Sougeal, une arrivée massive avec des passages diurnes et nocturnes est notée le 11/01 à Miniac-sous-Bécherel. Par la suite, des bandes d'une quarantaine d'individus, volant vers le Sud, sont notées régulièrement durant la seconde quinzaine de janvier et en février. A noter : 100 le 11/02 St Malon-sur-Mel et un dortoir temporaire de 50-60 individus le 10/03 Le Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel. Enfin, deux dernières données : 80 le 22/03 et 30-40 le 2/04 au Bas Verger.

Hivernage 87/88 :


Plus 1100 individus ont été notés. Pour un même nombre de données que l'hiver dernier, le passage semble donc plus important. Le passage se déroule en deux vagues très nettes. La première vague, début novembre, se traduit par des passages nocturnes importants et apparemment peu de stationnements : de tels passages sont notés le 25/10 à St Malo, le 2/11 et le 10/11 au Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel, et 150 les 3 et 4/11 Barrage du Couesnon/B.M.S.M.; la deuxième vague fin novembre est surtout marquée par une arrivée massive et des stationnements importants : passage nocturne intensif le 21/11 Bécherel, 5 bandes de 10-15 en 1h Forêt/Montauban, dizaines le 2/12 Forêt de Tanouarn/Dingé, 70-80 le 6/12 Le Bas Verger, 120 le 26/12 et 500 le 30/12 Etang de Châtillon en Vendelais.

Hivernage 86/87 :

21 données pour l'hiver 1986/87. Des mouvements sont notés de mi novembre à fin mars, avec un afflux assez net mi janvier qui est sans doute à rapprocher de la vague de froid : 20 le 16/11 Thorigné sur Vilaine, 50 mélangées à des Grives mauvis (*Turdus iliacus*) et à des Pinsons des arbres (*Fringilla coelebs*) le 23/11 Les Haies/Quédillac, arrivée massive le 11/01 Le Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel, 130 le 18/01 La Péronaye/Romillé. Par la suite, une grosse bande de 300 individus est observée le 9/02 à Dingé et des petites troupes d'env. 30 individus sont régulièrement notées en février et mars. Une dernière donnée : 28 le 29/03 La Couteyère/Piré-sur-Seiche.

Hivernage 87/88 :

Beaucoup moins de données (8 en tout); mais il est difficile de dire si cela correspond à un passage plus faible ou à un désintéressement des observateurs ? Une première donnée début novembre: 15 le 3/11 Barrage du Couesnon/B.M.S.M.. Puis, il faut attendre début décembre pour enregistrer une arrivée nette : 30 le 2/12 Forêt de Tanouarn/Dingé, 30 le 6/12 Le Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel, 80 le 9/01 Launay Gaudin/Hédé et 50 le 24/01 Landes de Brin/Forêt de Rennes. Dernière donnée le 12/03, 3 à St Laurent/Rennes.



Bergeronnettes grises (dessin de Philippe GALARD)

GROUPE 5 :

BOUSCARLE DE CETTI

(Cettia cetti)

18 données

Le statut de cette fauvette sédentaire est certainement un des plus intéressants à suivre dans notre département. Son expansion observée pendant plus de 20 ans ne semblait pas terminée lorsque sont apparus les hivers rigoureux de janvier 85, février 86 et janvier 87. Il est donc indispensable de transmettre toutes les observations pour représenter l'aire de répartition actuelle.

La majorité des données concernent des chanteurs et proviennent de sites littoraux et des étangs de la vallée de la Seiche, c'est à dire des deux secteurs les mieux occupés antérieurement.

Sur le littoral :

- à la Garde Guérin/ St Briac-sur-mer : I les 14 avril et 1er juin
- au marais des Guettes / St Suliac : I le 29 mai
- à l'étang du Verger / Cancale : 2 le 1er mai et plus de 6 (non précisés "chanteurs") le 25 octobre
- à l'anse du Haut-Bout / Cancale : I le 17 mai
- à l'étang de Ste Suzanne / St Coulomb : I le 11 juillet.

à l'intérieur :

- à l'étang de Marcillé-Robert (cf note sur Marcillé-Robert)
- à l'étang de Carcraon / Domalain : I les 14 et 28 juin
- au Pré-Namet / Rennes : I le 10 mai
- à l'étang de Bazouges / Hédé : I alarme le 21 novembre et 2 le 19 décembre au marais de Gannedel / La Chapelle de Brain : I le 20/12.

LOCUSTELLE SP

(Locustella sp)

I donnée

un chanteur à l'étang de Paintourteau / Erbrée le 20/04.

LOCUSTELLE TACHETEE

(locustella naevia)

2 données

- un chanteur en forêt de la Guerche / Rannée le 23/04
- un chanteur en forêt de Rennes / Liffré le 26/04.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE

(Locustella luscinioides)

4 données

à l'étang de Marcillé-Robert : 1 les 8, 9 et 15 mai

au Bas Marais / Chateauneuf d'I&V : 1 le 16 mai.

Il faut rappeler qu'un troisième secteur (marais de Redon : plusieurs sites) est habituellement fréquenté par cette espèce au printemps.

PHRAGMITE DES JONCS

(Acrocephalus schoenobaenus)

12 données

Onzes données concernent des chanteurs au printemps :

1 dans les gravières de Bruz le 19/04, 1 à l'étang de Paintourteau le 20/04, 1 au parc des Gayeulles/Rennes le 23/04, 2 les 8, 15 et 31 mai à l'étang de Marcillé-Robert, 1 à Tru / Renac le 20 mai, 1 au marais des Guettes / St Suliac le 29 mai, 2 dans les bras de Rance à Chateauneuf le 27/06, nombreux dans le Biez du Milieu / Dol le 28 juin et 2 à l'étang du Verger / Cancale le 5 juillet.

Par ailleurs, 1 au lac de Haute-Vilaine / La Chapelle Erbrée le 1/09.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE

(Acrocephalus scirpaceus)

20 données

Que des données de chanteurs :

Le site principal, comme pour la Bouscarle, est l'étang de Marcillé Robert où le premier chanteur est signalé le 12/04 (cf note sur Marcillé). En dehors de ce site, il a été noté : 1 le 24/04 puis 5 en 2 sites le 13/06 au parc des Gayeulles / Rennes, 1 à Beaulieu / Rennes le 27/04, plusieurs dans le marais de Chateauneuf d'I&V le 29/04, 3 à Luzard / Orgères le 15/05, 1 à l'anse du Haut Bout / Cancale le 17/05, 7-8 au marais des Guettes / St Suliac le 29/05 et 1 à l'étang de Bazouges / Hédé le 30/05, plusieurs à la plage Du Guesclin / St Coulomb le 14/06, à l'étang de Carcron / Domalain : 1 le 14 et 2 le 28/06, 4 à l'étang de la Rigaudière / Le Theil de Bretagne le 21/06, 3 à l'étang de Chatillon-en-Vendelais le 5 et 1 à l'étang de Paintourteau / Erbrée le 14 juillet.

HYPOLAIS POLYGLOTTE

(Hippolais polyglotta)

18 données

La plupart concernent des chanteurs et le faible nombre de données n'est pas représentatif de l'abondance réelle de cette espèce

largement répandue dans tout le département avec cependant des concentrations locales qu'il faudrait préciser (bordures de marais, friches, clairières ...)

Les premiers chanteurs sont notés à St Laurent / Rennes le 25 et en ZAC Patton / Rennes le 28/04. A Cardroc, un chanteur probablement absent le 27/04 est entendu le 4/05. A partir de fin-mai les observations se généralisent tant sur le littoral qu'à l'intérieur parmi lesquelles il faut retenir 8 hypolaïs notés contre seulement 1 fauvette grisette le long d'un parcours de 50 kms en vélo dans le secteur Bécherel - St Méen le 3 juin. La nidification est bien établie en juin : 1 couple nourrit à Iffendic le 11 et 3 individus dont 2 alarmant sont notés au Rheu le 12/06.

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata) 5 données

Le faible nombre de données confirme la chute importante de ses effectifs après les derniers hivers rigoureux.

- sur le littoral : à la pointe de Meinga / St Coulomb, 1 couple le 18 juin et 2 indiv. le 25/10 ; à la pointe du Grouin / Cancale : 2 le 1/08. Mais elle est donnée absente à la Garde Guérin / St Briac et à la Varde / St Malo.

- à l'intérieur : aux landes blanches / Lassy 1 couple le 21/05 et à la Chambre-aux-Loups / Iffendic 1 chanteur le 11/06.

FAUVETTE BABILLARDE (Sylvia curruca) 7 données

Toutes proviennent du littoral :

- au Nick / St Lunaire : 1 chanteur le 15/05 et 2 chanteurs le 20/06,
- à l'anse du Haut Bout / Cancale : 1 chanteur le 17/05,
- sur l'île Besnard / St Malo, alors qu'elle est notée absente les 1er et 6/05, 1 chanteur est présent les 23 et 24 mai.

Il faut ajouter que l'espèce pour l'instant localisée en quelques points du littoral a également été observée en Côtes d'Armor non loin de St Lunaire à Lancieux et à St Jacut-de-la-Mer.

Par ailleurs une donnée concerne probablement la migration post-nuptiale 2 indiv. dans des saules à l'étang de Ste Suzanne / St Coulomb le 23/08.

FAUVETTE GRISETTE

(Sylvia communis)

II données

Cette espèce mérite d'être régulièrement notée dans notre département pour connaître son niveau d'abondance par rapport à celui de l'hypolaïs, espèce concurrente.

Les 2 premiers sont notés à Corps-Nuds le 17 et au parc des Gayeulles / Rennes le 22/04. Ensuite seuls des chanteurs sont notés au printemps : 1 au bois de Pouez / Chanteloup le 26/04 ; 1 en forêt de Rennes / Liffré le 2 ; 3 aux Bougrières / Gravières de Bruz et 1 à la Pommeraie / Le Sel-de-Br. le 24 6 au marais de Ste Anne-sur-Vilaine le 28 ; 3 au Mont Garo / St Suliac le 29/05 ; 1 seul noté pour 8 hypolaïs sur un parcours de 50 kms en vélo dans le secteur Bécherel - St Méen le 3 juin et 1 au Bel Air / St Jacques de la Lande le 22/06.

Par ailleurs : 1 femelle à l'étang de Chatillon-en-Vendelais le 9/08.

FAUVETTE DES JARDINS

(Sylvia borin)

2I données

En avril : un premier chanteur est entendu en forêt de Rennes / Liffré le 18 et à Ercé-en-Lamée le 19, puis 3 au parc des Gayeulles / Rennes le 21 1 chanteur en forêt de la Guerche / Rannée le 23 ; un chanteur au bois au Voyer / Maure de Br. le 24 ; un chanteur en forêt de Rennes le 26 ; un transport (?) à Rennes le 28 ; 4 chanteurs au parc des Gayeulles / Rennes le 28 et 1 chanteur (1er sur ce site) au Bas Verger / Miniac-sous-Bécherel le 29.

En mai : 1 chanteur le 3 puis 5 au cours de ce mois à Marcillé-Robert 4-5 couples dans une tourbière de 12,5 ha à Landemaraie / Parigné le 8 ; 1 chanteur au bois de Courrouet / Mernel le 10 ; 1 chanteur à St Suliac le 20 ; 1 couple alarme au parc des Gayeulles / Rennes le 28 et 4 chanteurs dans le marais de Ste Anne-sur-Vilaine le 28.

En juin : 1 chanteur à la Pintièrre / Piré sur Seiche,

En juillet : 1 chanteur en forêt du Theil de Bretagne le 4

Cette énumération traduit bien la baisse d'intérêts des observateurs pour cette espèce en dehors des premières arrivées !

FAUVETTE A TETE NOIRE

(Sylvia atricapilla)

23 données

Après 3 observations à Rennes en décembre 86 : 1 femelle le 10, mâle le 13 et une autre femelle le 29, seulement 2 autres observations hivernales sont faites toujours à Rennes : 1 femelle au parc des Gayeulles le 17/01 et 1 à Pontchaillou le 13/03. Ensuite un premier chanteur, peu assidu, est noté en forêt de Montfort le 22 ainsi qu'une femelle en ville de Cancale le 24/03.

En avril, seuls des chanteurs sont notés : 1 en plaine de Baud / Rennes le 3, 1 à la Bosse de Bretagne, 1 à l'étang des Roches / Chelun, 1 à Marcillé Robert et 2 sur la plage du Verger / Cancale le 5, chant généralisé dans le secteur de Bécherel le 12, 7 à Marcillé-Robert le 20 et 3 à Maure-de-Bretagne le 24.

En mai : 3 chanteurs sur l'île Besnard / St Malo et 7-8 couples à Landemerais / Parigné le 8, une famille avec 4 juvéniles au Mont Garo/St Suliac le 29.

En juin : 4 chanteurs à Tannée / St Coulomb le 14. De plus un chanteur a été entendu au Bas Verger / Miniac-sous-Bécherel jusqu'au 10/07.

A l'automne, une reprise de chant du chant est notée : à Montauban de Bretagne, 1 chanteur le 21/09.

Enfin les hivernants sont à nouveau notés à Rennes : 1 à St Laurent le 17/11 et 1 au parc de Maurepas le 21/12.

POUILLOT sp

(Phylloscopus sp.)

1 donnée

1 sur l'île Cézembre / St Malo le 30 mai.

POUILLOT DE BONELLI

(Phylloscopus bonelli)

3 données

Cette espèce, très peu notée en Ille-et-Vilaine, exige à la fois une prospection concentrée dans le temps (fin avril à fin juin) et une grande attention du chant qui peut être confondu avec celui du pouillot siffleur en certaines circonstances.

La première donnée concerne un individu identifié à vue par la tache jaune du croupion, à coup sûr migrateur puisqu'observé au havre de Rothéneuf St Malo le 21/04.

Les deux autres données sont plus habituelles : 1 chanteur en forêt de Rennes / Liffré les 26/04 et 11/05.

Presque toutes concernent des chanteurs, le premier étant noté au parc des Gayeulles / Rennes le 22 avril en un site suburbain à priori peu attractif et pourtant régulièrement occupé ces dernières années. Un chanteur y est noté de nouveau le 24/04. En mai, 2 chanteurs sont présents le 5, 2 indiv. dont 1 chanteur le 9, 3 chanteurs le 10 et enfin 1 chanteur le 25.

Ailleurs en avril : 1 en forêt de la Guerche / Rannée le 23, 8 dans le secteur de Maffrais en forêt de Rennes / Liffré le 26 et 2 au bois du Pouez Chanteloup le 30. Toutes les autres observations sont effectuées en mai : 2 à Villaman / La Bazouge-du-Désert et 1 au bois des Tertres / Louvigné-du-Désert le 8, 2 à la Bandière / Lohéac et 1 à la Barbonnais / Maure de Br. le 10, dans le secteur de Maffrais en forêt de Rennes : 15 chanteurs et 1 couple alarmant le 18 puis 1 femelle commençant à couvrir le 20, le nid étant détruit le 30. Enfin 5 au bois de la Rehaudais / Goven le 31.

POUILLOT VELOCE

(Phylloscopus collybita)

24 données

Après les 2 observations à la fin 86 à Rennes : 1 chanteur le 21/II et 1 indiv. le 18/12, l'hivernage est faiblement noté : 1 au lac de Haute-Vilaine La Chapelle Erbrée et 1 aux Gayeulles / Rennes le 17, 5 dans des saules en bordure d'étang gelé de la Bézardière / Hédé le 18/01, 6 aux Gayeulles/Rennes le 21 février.

En mars : 1 au Verger / Cancale et 1er chanteur à St Laurent / Rennes le 11, 1 chanteur à Teillay le 16, 3 indiv. à la Ville-es-Mullon / Cancale le 12 1 chanteur aux Gayeulles / Rennes le 17 et 1 chanteur au Bas Verger / Miniac sous Bécherel le 22.

Des données du printemps il faut retenir : 8 indiv. à la Ville-es-Mullon Cancale le 4/04, au parc des Gayeulles / Rennes : 1 couple au nid le 21/04, 1 femelle couvant le 8/05 et une famille le 30/05.

En été et automne le faible nombre de chanteurs limite la possibilité de noter l'espèce : 1 chanteur est noté quotidiennement au Bas Verger / Miniac sous Bécherel du 23/08 au 7/10 puis encore les 16 et 20 octobre.

Par ailleurs des concentrations sont notées : plus de 10 au lac de Haute Vilaine / La Chapelle Erbrée le 7/09, plus de 10 à l'anse du Verger / Cancale le 9/II et 5-6 à l'étang d'Andouillé-Neuville le 5/13.

POUILLOT FITIS

(Phylloscopus trochilus)

14 données

Seuls des chanteurs sont notés parmi lesquels de nombreux migrants. Leur arrivée en avril est perçue massivement sur le littoral : 10 à 20 à la plage du Verger / Cancale le 5, et le même jour : 1 à Chenaye / Guipel et 1 à l'étang de Chatillon-en-Vendelais. Puis 1 à St Christophe des bois le 9, 2 au bois de Chevrillé / Cancale le 10, 3 à l'étang de Marcillé-Robert le 12 (non entendus les 5 et 18), 1 aux Gayeulles / Rennes le 14 où un couple parade le 22, 1 au bois au Voyer / Maure de Br. le 24. Ensuite, l'espèce est peu notée ; en mai : 3 sur 12,5 ha à Landemaraïs / Parigné le 8 et 1 au Bois au Voyer / Maure de Br. les 10 et 17.

En période post-nuptiale seulement 2 données : 1 au lac de Haute-Vilaine La Chapelle Erbrée le 14/08 et 1 chantant aux Gayeulles / Rennes le 17/09.

ROITELET HUPPE

(Regulus regulus)

6 données

Cette espèce commune n'est pratiquement pas notée.

Des chanteurs sont entendus en mars : 3 le 7 et 1 le 13 au parc des Gayeulles Rennes, et 4 en forêt de Rennes / Liffré le 14, en mai : 3 sur 12,5 ha à Landemaraïs / Parigné le 8 et en novembre : 1 au parc des Gayeulles le 16. Par ailleurs des mouvements ont été notés aux Gayeulles le 17/09.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU

(Regulus ignicapillus)

6 données

L'espèce est rare en dehors de l'hiver et devrait donc être notée plus systématiquement.

En fin d'hivernage : 1 en forêt de Paimpont le 11/02, 1 à Maurepas / Rennes le 27/02 et 2 au parc des Gayeulles / Rennes le 14/03.

Au printemps : 1 chanteur à Beaulieu / Rennes le 24 avril, non réentendu ensuite.

En hiver : 3 à l'étang d'Andouillé-Neuville le 5 et 1 à l'étang de Chaillou Montauban de Br. le 12/12.

GOBE-MOUCHE GRIS

(Muscicapa striata)

13 données

L'essentiel des données se rapporte au mois de mai, époque d'arrivée

de cette espèce tardive : I chanteur à la Bouxière / Parigné le 8, I chanteur au bois de Piriou / St Malo de Phily le 10, 10 indiv. à l'étang de l'abbaye Paimpont et I au parc Oberthur / Rennes le 12, I chanteur au parc des Gayeulles / Rennes le 19, I chanteur au château de Montmuran / Les Iffs le 21 I chanteur au parc de Caradeuc / Bécherel le 22 et 2 indiv. sur l'île de Cézembre / St Malo le 30. D'autres chanteurs sont notés en juin : I à l'étang de Marcillé-Robert le 21, I à la Piblais / Gravières de Bruz le 22 et I très assidu aux Gayeulles / Rennes le 27. Puis seulement 2 données en août : I au Moulin de Daniel / Louvigné de Bais le 6 et 5 à l'étang de Ste Suzanne / St Coulomb le 23.

GOBE-MOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca) 2 données

En migration pré-nuptiale, il a été observé au parc des Gayeulles / Rennes I femelle le 28/04 et Imâle et une femelle les jours suivants. L'absence de données en migration post-nuptiale est très surprenante.

MESANGE A MOUSTACHES (Panurus biarmicus) 3 données

En attendant des données de nidification ici ou là dans notre département, il nous faut nous contenter de données d'hivernage sur le littoral : 6 les 9 et 29/II puis 3 le 3 décembre à l'anse du Verger/Cancale.

MESANGE A LONGUE-QUEUE (Aegithalos candatus) 3 données

Même nombre de données que pour l'espèce précédente mais cette fois parce qu'il y a peu à noter sur cette espèce commune. En hiver : une bande de 10-20 individus à Bazouges / Hédé le 18/01 en compagnie d'autres mésanges et pinsons. Au printemps : un couple construit à Rennes le 22/04. En fin d'été des mouvements sont notés aux Gayeulles / Rennes le 15/09.

MESANGE NONNETTE (Parus palustris) 6 données

A la fin 86, une bande de 20-30 indiv. était noté à Caradeuc / Bécherel le 19/II. Plus tard une autre bande de 10-15 indiv. est observée avec d'autres

mésanges et pinsons à Bazouges / Hédé le 18/01. Les chants sont devenus réguliers aux Gayeulles / Rennes le 2/02, de même 10 chanteurs sont notés en forêt de Montfort le 22 mars. Ensuite une seule donnée : 5 dont 2 chanteur au bois du Château / Piré sur Seiche le 11/07.

MESANGE HUPPE (Parus cristatus) I donnée

Cette espèce, largement répandue, devrait être notée lorsqu'elle est présente en dehors des sites de nidification, lors de la dispersion post-nuptiale ou de l'hivernage.

Au parc des Gayeulles / Rennes : I le 16/02 en un site suburbain où la nidification n'est qu'occasionnelle.

MESANGE NOIRE (Parus ater) I donnée

L'unique donnée concernant 2 chanteurs en forêt de Montfort le 22/03 n'est pas le reflet du statut réel de l'espèce dans notre département. Si la nidification est toujours très localisée, l'hivernage devrait permettre un grand nombre d'observations un peu n'importe où. L'année 1987 était-elle une mauvaise année ou l'espèce a-t-elle été simplement négligée ?

MESANGE BLEUE (Parus coeruleus) 9 données

A part une bande de plusieurs dizaines d'individus mêlés à d'autres espèces à Bazouges / Hédé le 18/01, ce sont des chanteurs qui sont notés en hiver : I à Beaulieu / Rennes le 8, I aux Gayeulles / Rennes le 19 et I à Miniac-sous-Bécherel le 25/01. Le chant devient régulier aux Gayeulles le 2/02. Enfin sur un parcours de 60 kms en vélo, plusieurs dizaines de chanteurs sont notés le 11/02. Ensuite, l'espèce très commune partout n'est plus du tout noté.

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major) 9 données

La similitude avec l'espèce précédente se vérifie dans les données. En dehors de plusieurs dizaines d'individus observés à Bazouges / Hédé le 18/01, ce sont les chanteurs de l'hiver qui retiennent l'attention : I à Beaulieu / Rennes les 6 et 7/01, I le 19/01 et plusieurs réguliers le 2/02

aux Gayeulles / Rennes, et I à Miniac-sous-Bécherel le 25/01. Ensuite une seule donnée a été transmise concernant I juv. volant à la Bazouge-du-Désert le 8/05.

SITELLE TORCHEPOT (Sitta europaea) 6 données

A la fin de 86, I chanteur était déjà noté à Bazouges / Hédé le 14/12. Ensuite d'autres chanteurs sont entendus en janvier : I à Ste Anne-sur-Vil. le 10, I à La Chèze / St Thurial le 31, et en février : I à St Laurent/Rennes le 2, I aux Gayeulles / Rennes le 12 et par ailleurs 5 sur un parcours de 60 kms en vélo le 11. Une dernière donnée concerne I couple construisant à Rennes le 22/04.

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla) 3 données

Comme pour l'espèce précédente, ce sont les premiers chants qui sont notés mais cette fois en février : I à St Laurent / Rennes le 4, I à Bazouges Hédé le 8 et 2 sur un parcours de 60 kms le 11.

LORIOT D'EUROPE (Oriolus orilus) 6 données

Pratiquement seuls les chanteurs sont notés : I au marais de Sougeal le 3 I à la Louvinais / Rennes le 5, I en forêt du Pertre le 23/05, I en forêt de Rennes le 25/05, I + I couple avec juv. au Biez du Milieu / marais de Dol le 28/06 et I en forêt de Fougères le 2/07.

La répartition très large de l'espèce dans la moitié Nord du département se confirme et l'effort de prospection devra être porté sur la frange occidentale de Paimpont à Dinard.

GEAI DES CHENES (Garrulus glandarius) 2 données

A Cancale, I indiv. à la Saussaye le 9 et I à Chevrillé le 14/03.
Que devient l'espèce dans ces sites littoraux au printemps ?

PIE BAVARDE

(Pica pica)

I donnée

I nid achevé aux Gayeulles / Rennes le 9/03.

L'extrême faiblesse du nombre de données est inversement proportionnelle à l'expansion que prend cette espèce un peu partout. Il serait bon de pouvoir quantifier ce phénomène notamment par les décomptes en dortoir hivernaux qui se multiplient..

CHOUCAS DES TOURS

(Corvus monedula)

I7 données

La plupart des données se rapporte à des nicheurs dans des sites typique églises, châteaux. D'autres sont plus énigmatiques ainsi à Rennes : 2 aux abords des cuisines du Lycée des Gayeulles (!) le 15/01, 12 à Villejean le 4/06, 9 de nouveau aux Gayeulles en vol vers le SW le 13/11 (hivernants ?).

En attendant les résultats d'une enquête systématique menée en 1989 sur la nidification de l'espèce en I-&-V, signalons :

- sur la cathédrale de St Malo : 10 avec poursuites et bagarres le 25/03 puis aucune observation jusqu'au 16/05, ensuite observations régulières jusqu'à la mi-juin, au moins 2 juv. et 10 ad. ensemble début juin et enfin, alors qu'un indiv. est noté intra muros le 29/09, le retour véritable est noté sur la cathédrale le 14/12 par un premier indiv. vu régulièrement après.

- sur l'église de St Aubin des Landes, 4 le 14/03 ; sur l'église de St Aubin d'Aubigné, 4 transportant des matériaux le 22/04 ; sur la cathédrale de Dol, 4 mini. le 18/05 ; sur l'église de Paramé, 4 les 23 et 24/05 ; sur l'église de Pancé, 1 couple et sur l'église de Bain de Br., 2-3 couples au printemps ; à Marcillé-Robert, 4 le 26/05 ; au château du Breil / Iffendic 10-15 couples avec juv. volants le 11/06 ; sur l'église de Combourg, 4 mini. le 10/07. Par ailleurs il faut retenir 1 à la Ville Pian / Cardroc le 29/09.

CORBEAU FREUX

(Corvus frugilegus)

7 données

Des bandes d'hivernants et des mouvements étaient signalés à la fin 86 : 25 à la Boussac le 17 et 20, 40 à Pleine-Fougères le 20/11, 11 vers le sud à Miniac-sous-Bécherel le 13 (pas de stationnement observés) et environ 100 à St Domineuc le 17/12.

De même en janvier : 50 en dortoir complet à Mireloup / Le Tronchet le 16, et février : 40 à Bazouges / Hédé et environ 300 sur du maïs à St Coulomb le 8.

Les données du printemps concernent des nicheurs dont les corbeautières restent parfois à découvrir : 60 à la Louvinais / Rennes le 5 mai (corbeautière), 2 enlisière de la forêt de Teillay et 15 à Pancé au mois de mai. Puis de nouveau une donnée d'hivernants : 10 au sud de St Domineuc le 13/II.

CORNEILLE MANTELEE (Corvus corone cornix) 1 donnée

I à Cherrueix le 6 mars.

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone) 3 données

La seule donnée du printemps provient de l'île Cézembre / St Malo où un nid contenant 2 pulli est trouvé sur la falaise Nord le 30/05. Au cours de l'hivernage des rassemblements sont notés : à la fin 86 une bande de 58 était observée au havre de Rothéneuf / St Malo le 16/II et à la fin 87, ce sont 2 dortoirs qui regroupent 250 indiv. dans un bois de Cardroc le 10/IO et 250-300 à Bazouges / Hédé le 13/I2.

GRAND CORBEAU (Corvus corax) 17 données

Mise à part l'observation de 2 indiv. à l'île Agot / St Briac le 31/05, toutes les données se rapportent à 2-3 couples présents sur le littoral de Cancale et St Coulomb probablement toute l'année.

Sur la commune de Cancale, une succession d'observations donne une idée de la nidification : après les 5 indiv. volant dans l'anse Du Guesclin le 8/02 1 indiv. est vu à la Ville-es-Mulon les 2, 12, 24/03 et 4/04, puis 1 couple à la pointe du Hock et un autre à la Pointe du Grouin le 5/04 tandis que ce même jour 2 indiv. sont observés à la plage du Verger par un autre observateur; le 1er mai alors qu'une exploration en zodiac ne permet aucune observation entre St Malo et la Pointe du Grouin, 2 nids sont découverts, l'un abandonné à la Pointe du Grouin et l'autre occupé à Port Briac auprès duquel 2 indiv. sont vus le 17/05.

Plus tard, toujours dans le même secteur on note 2 indiv. à la pointe du Grouin le 18/IO, 2 au havre de Rothéneuf / St Coulomb les 14 et 31 décembre et 2 à l'anse du Verger / Cancale le 31/I2.

ETOURNEAU SANSONNET

(Sturnus vulgaris)

3 données

Les données pour cette espèce excessivement commune sont tout à fait insignifiantes : une bande de 20 juv. à Gézé le 15/06, 13 vers le Sud en 1h30 à la pointe du Grouin / Cancale et 5 vers le Sud en 0h20 à la Pointe du Meinga / St Coulomb le 18/10.

MOINEAU DOMESTIQUE

(Passer domesticus)

3 données

Toutes mentionnent une nidification sur les îles en mai : sur Bénétin St Malo le 24, sur Cézembre / St Malo (2 couples) le 30 et sur Agot/St Briac le 31.

MOINEAU FRIQUET

(Passer montanus)

6 données

Encore une espèce qui doit être notée systématiquement car il semble qu'elle soit en diminution sensible dans notre département où l'aire de répartition était déjà bien morcelée.

3 à Paintourteau / Erbrée le 22/03, 1 aux Prairies St Martin / Rennes le 16/05, 2 sites en secteur de Teillay et 2 présents tout le printemps à la Coutéyère / Piré sur Seiche, 1 au Bas Verger / Miniac-sous-Bécherel le 20/10 et 2 à la Roche Briand / Montauban-de-Br. le 21/11.

PINSON DES ARBRES

(Fringilla coelebs)

28 données

En novembre 86 des bandes mixtes étaient notées : 40-50 en compagnie de pinsons du Nord au Bas Verger / Miniac-sous-Bécherel le 16 puis 10-15 le 23, plusieurs dizaines marquant une nette arrivée à Caradeuc / Bécherel le 19 et 30-40 avec pinsons du Nord, grives mauvis et litorne aux Haies Quédillac le 23. De même 20-30 sont regroupés à Melesse le 1/12.

L'hivernage est également noté au début de 87 : 20-30 avec pinsons du Nord et mésanges à Bazouges / Hédé le 18 /01, plus de 100 avec 200 verdiers au Verger / Cancale le 8 et 10-15 à Miniac le 11/02.

Les premiers chanteurs sont entendus en février : 1 au parc Oberthur Rennes le 10, 16 sur un parcours de 60 kms le 11 puis 2 assidus aux Gayeulles Rennes les 12 et 19, 1 au Bas Verger / Miniac le 20, 1 à Ste Anne sur Vil. le 22 et 1 à St Laurent / Rennes le 28.

L'espèce est pratiquement délaissée au printemps : un transport de nourriture à la Bazouge-du-Désert le 8 mai et une femelle pourchassant un coucou à Mernel le 10 mai.

L'automne se signale :

- par une reprise des chants : 1 assidu aux Gayeulles/Rennes le 12/10 puis encore entendu les 17/10, 13 et 28/11

- par des mouvements : 10 vers le SW au banc des Hermelles baie du Mont Saint Michel le 6/10, 1160 vers le Sud en 1h30 à la Pte du Grouin/Cancale et 150 vers le Sud à la pointe de Meinga/St Coulomb le 18/10 alors que des vols sont notés également à l'intérieur, à Miniac-sous-Bécherel le 24/10.

- par des stationnements : 50 avec des moineaux domestiques le 17 et 100-200 en dortoir le 28/10 au Mont Garro/St Suliac, 30 avec des pinsons du Nord au Bas Verger/Miniac le 29/11 et 600 à Fayel/La Couyère le 24/12.

PINSON DU NORD

(Fringilla montifringilla)

24 données

De mi-novembre à fin décembre 86 déjà 13 données avaient été transmises et concernaient des stationnements de quelques individus à plusieurs centaines parmi lesquels : 40-50 avec des Pinsons des arbres à Miniac-sous-Bécherel le 16, environ 500 en forêt de Rennes dont une bande importante le 20, 50 au bois Aubry/Saulnières le 23/11 et 250 à Feins le 27/12.

Jusqu'à fin mars 87, 22 données font suite :

- en janvier : 4 à la Ville Pican/Cardroc le 8, 2 au Bas Verger/Miniac le 10, 5-10 à Sougeal le 11, 13 en 2 bandes à la Chèze/St Thuriel le 17, 150 aux gravières de Bruz et 20-30 à Bazouges/hédé le 18, 150 près de St Thuriel le 25, 2 en ville de Cancale le 27, des cris entendus au Bas Verger et 15-20 au Breuil/Miniac-sous-Bécherel le 31.

- en février : 70-80 à Longaulnay et cris entendus à Miniac le 7 puis le 8, 25 à Plélan-le-Grand et 3-4 à Liniac le 11, 1 à St Laurent/Rennes le 12 40 à l'étang de Villecartier/Bazouges-la-Pérouse le 14, cris entendus à Miniac les 15 et 17.

- en mars : 19 au bois de Monbuan/Moulins le 1, au moins 1 en forêt de Montfort et au bois au Voyer/Maure-de-Br. le 22.

A la fin 87, seulement 2 données sont recueillies : une bande mixte (avec pinsons des arbres) au Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel le 29/11 et 100 à Fayel/La Couyère le 24/12.

SERIN CINI

(Serinus serinus)

6 données

Cette espèce pourtant commune en période de nidification n'est notée qu'en début de printemps puis est complètement délaissée ce qui ne nous permet pas de connaître son statut en migration et en hivernage notamment sur le littoral.

Le premier individu est vu aux Gayeulles/Rennes le 17 tandis qu'un chanteur y est entendu le 18. Des chanteurs sont notés début avril à Cancale mais sur le littoral l'espèce doit être recherchée bien plus tôt. Par ailleurs, 1 femelle nourrit des pulli dans un cyprès en cité d'Alet/St Malo, le 2 mai.

VERDIER D'EUROPE

(Carduelis chloris)

20 données

En fin 86, 1 chanteur était encore entendu au parc Oberthur/Rennes le 18/II et quelques bandes étaient notées le 23 du même mois : environ 250 récemment arrivés au bois Aubry/Saulnières, 10-15 avec pipit farlouse, grives et pinsons aux Haies/Quédillac et 5-6 au Bas Verger/Miniac-sous-Bécherel.

Parmi les données ultérieures retenons : 1 bande de plus de 200 avec 100 pinsons des arbres au Verger/Cancale le 8 puis 1 chanteur à Miniac et 4 chanteurs sur un parcours de 60 kms le 11 février. Une bande de 25 est encore notée à Miniac le 22 mars, les autres données se rapportent à de la nidification habituelle.

A l'automne le chant est de nouveau noté : 1 aux Gayeulles/Rennes le 25/09, ainsi que des bandes : 100 sur chaumes de tournesol à la Morandais Tinténia le 18, 300-500 également sur tournesol à la Ville-es-Nonais le 28 30-40 en 2 bandes le 31/10 et en vol vers le sud le 11/II à Miniac-sous-B. 50 le 2 et 20-30 le 22/12 dans ce même site, enfin 100-150 à la Croix Neuve La Baussaine le 23 et 800 à Fayel/La Couyère le 24/12.

CHARDONNERET ELEGANT

(Carduelis carduelis)

10 données

L'unique donnée de fin 86 est importante : 1000 individus au bois Aubry Saulnières le 23/II.

Ensuite cette espèce commune n'est notée que groupée en migration et en hivernage, la nidification étant complètement délaissée.

33 au Verger/Cancale et 7 à la Secouette/St Coulomb le 13, environ 600 avec 200 linottes à St Jouan-des-Guérets le 22/02, 15 à Cancale le 5 et 30 à la Chapelle Erbrée le 7/04. Plus tard, 5 vers le Sud en 1h30 à la Pte du Grouin/Cancale le 18, 25 sur un champ de choux à la Pte du Meinga St Coulomb le 24/10, 80 le 3 et 30 le 4/11 sur la digue de la réserve de la baie du Mont St-Michel et enfin 1500 individus à Fayel/La Couyère le 24 décembre.

TARIN DES AULNES

(Carduelis spinus)

27 données

L'hivernage était noté en fin 86 : 2 aux Gayeulles/Rennes le 25/11 puis en décembre : 3-4 à Melesse le 1er, cris à Miniac-sous-Bécherel le 7 40-50 le 17 et 10 le 21 au canal St Martin/Rennes, 15 au parc des Gayeulles Rennes le 19.

Les observations s'étalent ensuite jusqu'à la mi-avril; 72 vers le Nord à Rennes le 5/01 ; au parc des Gayeulles : 50 dont plusieurs chanteurs le 17, au moins 2 chanteurs le 18/01, 20 dont plusieurs chanteurs le 16/02 et encore 20 le 7/03 avant disparition à la mi-mars.

Ailleurs : environ 50 à la Chapelle Erbrée le 11, 40-50 à la Péronnaye Romillé le 18/01, 3-4 le 18, 26 le 22/01 et 140 le 10/02 en Gravières de Bruz 1 à Maurepas/Rennes le 14/02, 8 à l'étang de Ste Suzanne/St Coulomb le 3, 20-30 à l'étang de Treffendel le 6 et nombreux en forêt de Rennes le 22/03 2 à Beaulieu/Rennes le 1er, 1 à La Chapelle Erbrée le 7, 2 à Maurepas le 8 5 à St Laurent/Rennes le 11 et enfin 5-6 dont des chanteurs en forêt du Mesnil/Le Tronchet le 15/04.

A l'automne, les observations sont précoces : 5 à Montmuran/Les Iffs le 18, passages au lever du jour à Miniac-sous-Bécherel le 23, 6 en forêt de Rennes/Liffré le 27/10, 3 au moulin de Daniel/Vitré le 14/11 puis 30 à l'étang de Chaillou/Montauban de Br. le 12 et 2 chanteurs à Beaulieu/Rennes le 14/12.

LINOTTE MELODIEUSE

(Acanthis cannabina)

20 données

Sauf exception, ce sont des bandes en migration ou en hivernage qui sont notées : après 15-20 les 17 et 18/11 puis 60-70 le 22/12/86 aux Gayeulles Rennes, ce sont 100 à Miniac-sous-Bécherel le 10 et 100 à la Chapelle Erbrée le 11/01, 200 en compagnie de 600 chardonnerets à St Jouan-des-Guérets le 22/02 et 100 à St Laurent/Rennes le 3/03.

Au printemps, l'espèce est délaissée et seul I couple est noté sur l'île Cézembre/St Malo le 30/05.

De nouveau à l'automne : 40 à Acigné le 28/09, 10 vers le Sud en Ih30 à la pointe du Grouin/Cancale le 18 et noté omniprésente au Bas Verger Miniac-sous-Bécherel le 24/10. Puis dans ce dernier site : 20-30 le 21/11 25-30 le 6 et 30-40 le 19/12. Aux Gayeulles/Rennes : 3 dont 1 chanteur les 24, 25 et 26/11, 8 dont 1 chanteur le 3, 11 le 7, 30-35 le 14, 50-60 le 21 et 90 le 22/12. Enfin la plus grosse bande est notée à Fayel/La Couyère : 800 le 24/12.

LINOTTE A BEC JAUNE (Acanthis flavirostris) I donnée

Sur les herbues du Mont St-Michel, un des rares sites où l'espèce est observée en Bretagne : au moins 2 le 20 janvier.

SIZERIN FLAMME (Carduelis flammea) 3 données

Les données proviennent de 3 sites différents de Rennes et environs : à Cesson-Sévigné où 5 indiv. étaient déjà présents le 24 puis 4 le 25 et 6 le 26/12/86, 6 sont encore notés le 4/01, au parc des Gayeulles/Rennes : 8 le 7/03 et à Maurepas/Rennes : 5 identifiés comme C. flammea flammea le 17 mars.

BECCROISE DES SAPINS (Loxia curvirostra) 13 données

L'invasion qui a touché l'ouest de la France a été largement perçue dans notre département puisque les données proviennent de 6 sites bien distincts.

- en forêt de Rennes/Liffré la nidification a pu être observée (cf notule) alors que 8 indiv. étaient notés dès le 17/12/86, plusieurs bandes de 2 à 12 indiv. sont présents le 20/03, puis 6 dont 2 mâles le 21, 4 contacts sont obtenus le 27 et 2 le 31/03, 1 mâle est observé le 7/04 puis 1 femelle le 5/05, 3 dont 2 mâles le 10 et enfin 4 dont 1 mâle et 1 juv. le 13/05. Toutes les autres données ont été obtenues en mars : 1 femelle en forêt de Chevré/La Bouxière le 11, plusieurs indiv. dont des chanteurs à la Tournerais Goven le 12, 2 couples au parc des Gayeulles/Rennes le 14, 1 en Hte forêt Paimpont le 16, 1 vu et plusieurs entendus en forêt de Montfort le 22.

BOUVREUIL PIVOINE

(Pyrrhula pyrrhula)

10 données

Des chants de cette espèce peu loquace sont notés : 1 aux Gayeulles Rennes le 21/02 et 1 à la Ville-es-Mulon/Cancale le 4/04. Par ailleurs : 1 couple construit à Rennes le 22/04, 5 indiv. dont 3 mâles sont notés à Maure de Br. le 24/04 et 1 juv. volant à Cancale le 15/07.

GROS-BEC CASSE-NOYAUX

(Coccothraustes coccothraustes)

10 données

L'espèce présente toute l'année mais en faible nombre est notée principalement dans les bois suburbains et dans les forêts :

- en périphérie de Rennes : 3 à Beaulieu le 5/01, 1 le 16/02 puis 1 couple les 22, 24, 28/04 et 5/05 aux Gayeulles/Rennes, 1 le 14 et un couple le 28/03 à St Laurent.

- par ailleurs : 3 à Chateauneuf d'I-&-V le 13/04 et 1 couple en forêt de Rennes/Liffré le 26/04.

BRUANT LAPON

(Calcarins lapponicus)

8 données

Toutes proviennent de la baie du Mont St-Michel.

- En 86, au moins 20 à la Roche Torin (50) et 10 sur les herbus étaient notés le 13/12.

- Ensuite en janvier : 15-20 sur l'herbus du Vivier le 4, 20-30 en une bande + de nombreux isolés dans la baie le 8, 15 à la Roche Torin le 17, 1 dans la baie le 21, 10 à Ste Anne le 23 ainsi que de nombreux isolés ici et là le 25.

- De nouveau plus tard : 8 le 17 et environ 25 le 28/11.

BRUANT DES NEIGES

(Plectrophenax nivalis)

3 données

Les données proviennent également du littoral : 1 mâle à la pointe de Meinga/St Coulomb le 24¹⁰ et un autre sur les herbus du Mont St-Michel le 25/10, de même 1 en baie du Mont St-Michel le 12/12.

BRUANT JAUNE

(Emberiza citrinella)

5 données

Alors qu'en hiver l'espèce est peu noté : une bande de 26 à Cesson

Sévigné le 26/12/86, ce sont les chanteurs qui retiennent l'attention parmi lesquels retenons les premiers : 5 sur un parcours de 60 kms le 11/02 et les derniers : 3 à Amanlis le 5 juillet. Par ailleurs, 1 transport de nourriture est observé à La Chapelle Erbrée le 16/07. Enfin il faut aussi retenir la donnée d'un chanteur à Quédillac le 18/11, date tout à fait inhabituelle.

BRUANT ZIZI (Emberiza cirrus) 13 données

Des chanteurs sont notés ici et là dès février : 4 au parc des Gayeulles/Rennes le 7, 6 sur un parcours de 60 kms le 11... Par ailleurs 1 chanteur est également noté à l'île Besnard/St Coulomb le 24/05 et 1 juv. est observé à la Chapelle Erbrée le 16/07.

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus) 22 données

En janvier - février, des regroupements sont signalés : 5 - 10 à l'étang d'Ouée/Gosné le 10, 2 à la Gaudichais/Cancale le 29/01, 150 au Vivier-sur-mer sur les herbus le 1er, 2 à la Ville-es-Mulon/Cancale le 3 et 2 à la Chapelle-Erbrée le 19/02.

Au printemps les données sont plus nombreuses et concernent essentiellement des chanteurs : 5-10 à Lourmais le 28/03, 1 couple à la Chapelle Erbrée le 4/04, 2 le 18/04 et 6 en avril-mai à Marcillé-Robert plusieurs dans le marais de Chateauneuf d'I-&-V le 29/04, 2 à Luzard Orgères le 15, 1 mâle (non chanteur) au parc des Gayeulles/Rennes le 22 1 au Maffey/St Jacques de la Lande le 24, 3 dans le marais de Ste Anne sur Vilaine le 28 et 1 au marais des Guettes/St Suliac le 29/05. Puis 1 chanteur au parc des Gayeulles/Rennes le 13, 5 mâles à la plage Du Guesclin/St Coulomb le 14, 1 à l'étang de la Rigaudière/Le Theil-de-Br. le 21 et plusieurs au Biez du Milieu/marais de Dol le 28/06. Enfin 3 à Chatillon-en-Vendelais le 5/07.

Plus tard, plus de 8 indiv. sont notés à la Chapelle Erbrée le 20/08 et enfin 7 à l'anse du Verger/Cancale le 31/12.

BRUANT PROYER (Emberiza calandra) 17 données

Toutes les données proviennent de deux secteurs nettement distincts : le littoral de la baie du Mont St-Michel et de la Rance d'une part, la

vallée de la Seiche d'autre part.

- Dans le premier secteur, les polders du Mont St-Michel constituent le site principal : après une bande de 25-30 le 8 et une autre de 7-8 le 20/OI, 2 chanteurs sont notés à la ferme Foucault le 4 juillet puis de nouveau une bande de 8 indiv. sur la digue de la réserve le 3/II. Par ailleurs I transport de nourriture est observé à la Corderie/Cherrueix le 15/O6 et I chanteur est entendu tout le printemps à la Ville-es-Nonais.

- Dans le second secteur, seuls les chanteurs de printemps sont notés aux Aubrais/Janzé : I les 3 et 7/O4 et le 10 mai, à Marcillé-Robert : I à Meslay le 5/O4, 3 à l'étang et 6 de Marcillé-Robert à Janzé en avril-mai I à la Chantardière le 8 et I à la Cornillère le 21/O6, à la Pironnière Essé : 2 dont I chanteur le 31/O5.



Le bruant jaune (dessin de Pierre TILLIER)

UN CAS D'HYBRIDATION ENTRE
LE GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) ET LE GOELAND BRUN (*Larus fuscus*)

PATRICK LE MAO

Une petite colonie de goélands argentés s'est récemment installée sur l'île Chevret, en Rance maritime. De trois couples nicheurs en 1983, la population reproductrice est passée à 28 couples en 1987.

Le 27 juin 1987, j'observe à la longue vue des goélands argentés accompagnés de jeunes poussins sur une pelouse à l'extrémité nord-ouest de l'île. Un goéland brun se pose parmi eux et se met à régurgiter de la nourriture à la demande de deux pulli âgés de 8 à 10 jours, auparavant réfugiés sous ... un goéland argenté!

Cette étrange observation me fit formuler deux hypothèses :

- ces poussins étaient issus d'un couple mixte brun x argenté.
- le goéland brun a régurgité la nourriture par simple réflexe, les poussins quémandeurs n'étant pas à lui.

La première hypothèse s'avéra vite la plus vraisemblable. En effet, il n'y eut aucun comportement agressif entre les deux goélands et le goéland brun fut observé nourrissant les poussins à deux reprises ... ceux-ci retournant près du goéland argenté entre deux nourrissages. Des attitudes d'accueil (cris, becquotements ...) furent également observées entre deux adultes, renforçant ma conviction qu'il s'agissait bien là d'un couple mixte brun x argenté.

Revue le 29 juin, cette famille fut ensuite perdue de vue, de fréquents débarquements de touristes au début de juillet ayant eu pour conséquence une déstabilisation territoriale des familles et leur dispersion dans des secteurs de végétation dense. Il ne m'est donc pas possible de dire si ces jeunes poussins ont pu s'envoler.

DISCUSSION

Des différences génétiques, morphologiques, anatomiques et/ou éthologiques empêchent les membres d'une espèce de se croiser avec ceux d'autres espèces. Dans le cas des goélands bruns et argentés, le retour tardif du premier sur ses sites de nidification permet un certain isolement génétique par rapport au second. Harris (1970) a aussi démontré que ces deux espèces se reconnaissent à distance par la couleur du manteau et des ailes et, à proximité, par la couleur des pattes et de l'anneau orbital.

Ces séparations, si elles sont suffisantes pour maintenir l'identité génétique des deux espèces là où elles cohabitent, ne sont cependant pas infaillibles. En effet, bien que reconnue comme rare l'hybridation a été constatée à plusieurs reprises (Voous, 1946 ; Harris, 1970 ; Harris et al, 1978).

Il faut également signaler que le goéland argenté s'hybride volontiers avec le goéland bourgmestre (Grant, 1982) et, en Amérique du Nord, avec le goéland marin (Harrison, 1983). Dans ce dernier cas, les hybrides seraient difficilement séparables, sur le terrain, du goéland brun.

CONCLUSION

Une des questions que peut se poser l'ornithologue de terrain est celle se rapportant à l'aspect des hybrides goéland bruns x argentés à l'âge adulte. Cette question reste encore sans réponse très précise. Grant (1982) attribue à de tels croisements des oiseaux à la "puzzling appearance", sans beaucoup plus de détails. En 1983, j'ai pu observer dans le port du Guilvinec (29) un goéland argenté atypique : si la taille et la couleur du manteau et des ailes étaient bien celles du *Larus argentatus argentatus*, il possédait des pattes jaune-pâle et un cercle orbital orangé. Peut-être était-ce là le résultat des amours coupables d'un goéland brun avec un goéland argenté ... Gageons que si nos oiseaux de l'île Chevret arrivent jusqu'à l'âge adulte, ils poseront d'amusants problèmes d'identification à l'ornithologue qui aura la chance de les trouver dans le champ de ses jumelles ...

BIBLIOGRAPHIE

GRANT P.J. (1982) - Gulls ; a guide to identification

T. et A.D. Poyser, Calton : 280 p

HARRIS M.P. (1970) - Abnormal migration and hybridization of *Larus argentatus* and *Larus fuscus* after interspecies fostering experiments. *Ibis*, 112 : 488 - 498

HARRIS M.P., MORLEY C. et GREEN G.N. (1978) - Hybridization of Herring and lesser black-backed Gulls in Britain.

Bird study, 25

HARRISON P. (1983) - Seabirds ; an identification guide

Croom Helm ltd, A.H. et A.W. Reed ltd : 448 p

VOOUS K.H. (1946) - Sur un cas d'hybridation naturelle entre *Larus fuscus* et *Larus argentatus* dans les Pays-Bas

Alauda, 14

QUELQUES DONNEES QUANTITATIVES SUR L'AVIFAUNE
DE L'ETANG DE MARCILLE-ROBERT

J-L CHATEIGNER

Pendant le printemps 87, nous nous sommes attachés à suivre une fois par semaine l'étang de Marcillé - Robert avec pour objet de quantifier quelques espèces de passereaux.

En effet, cet étang, plan d'eau d'une centaine d'hectares présente la particularité d'avoir une belle ceinture de végétation, une phragmitaie importante mais morcellée le long de ses rives.

Nos résultats sont rapprochés de ceux de Jo LE LANNIC effectués le 1 juin 1975. Malgré une méthodologie différente, cette comparaison nous permet d'appréhender un tant soit peu l'évolution de l'avifaune de cet étang.

RESULTATS.

	I juin 1975	printemps 87
rousserolle effarvate	30 chanteurs	48 chanteurs
phragmite des joncs	2 chanteurs	2 chanteurs
locustelle lusciniolide		1 chanteur
bouscarle de Cetti	7 chanteurs	8 chanteurs
bruant des roseaux	non noté	2 à 3 couples

Rousserolle effarvate

L'effectif semble en progression mais les chiffres de 1975 sont certainement sous-estimés, difficulté d'entendre tous les chanteurs au cours d'une seule sortie. Mais c'est sans conteste la fauvette aquatique la plus abondante à MARCILLE - ROBERT.

Phragmite des joncs

Le milieu moins favorable à cette espèce pourrait être l'explication du faible nombre d'individus contactés.

Locustelle lusciniolde

Pas trouvée en 75 mais elle était déjà signalée en 1969 avec quelques chanteurs. Rappelons que MARCILLE - ROBERT est l'un des trois sites occupés en ILLE-et-VILAINE avec le marais de DOL et les marais de REDON.

Bouscarle de Cetti

Elle reste bien présente, sans baisse d'effectifs malgré trois hivers rigoureux.

En dehors des passeraux, il nous a semblé intéressant de citer le cas du grèbe huppé, l'oiseau dont la population apparaît avoir la plus évoluée ces dernières années du moins localement.

I975	I9 couples avec I à 2 juvéniles par couple
I987	7 individus sans reproduction

Surprise de ce recensement avec un effondrement des effectifs de grèbes et de la non reproduction de ceux-ci en 1987. Les causes restent difficilement explicables, le milieu s'étant peu modifié en 12 ans.

En conclusion, on notera la relative stabilité des effectifs de fauvettes aquatiques si ce n'est une légère progression de la rousserolle effarvate et un déclin remarquable du grèbe huppé.

NIDIFICATION DU BEC CROISÉ EN FORET DE RENNES

Jean-Luc CHATEIGNER


L'invasion du bec croisé des sapins pendant l'hiver 86-87 aura été pour nous l'occasion d'observer la nidification de celui-ci en forêt de Rennes.

En effet, début mars, Mathieu BEAUFILS, localise un nid dans le faite d'un pin sylvestre. Un bosquet d'une trentaine de pins, situé en bordure d'un croisement forestier, accueille le couple. Plusieurs d'entre nous observeront les allées et venues du mâle près du nid, pendant que la femelle assure l'essentiel de la couvaison.

Hélas, fin mars, un fort coup de vent détruit le nid. La ponte brisée est retrouvée en bas de l'arbre. Par la suite, le couple ne sera plus revu.

La fragilité de ce nid nous laissa perplexe. Le nid du bec croisé est souvent décrit comme fortement fixé à son support ("Les passereaux tome III" de Paul GEROUDET). Peut-être étions nous en présence d'un jeune couple peu expérimenté.

A notre connaissance, cette nidification (ou du moins "tentative") du bec croisé des sapins est la première notée en Bretagne.



Le bec croisé des sapins vu par Jean-Luc CHATEIGNER

