

L'étang de Châtillon-en-Vendelais : bilan de 10 années de suivi

Guy-Luc CHOQUENE

Bien que connu comme étant un sanctuaire ornithologique dans le département d'Ille-et-Vilaine depuis plus d'une décennie, l'étang de Châtillon-en-Vendelais n'est l'objet d'un suivi régulier que depuis quelques années.

Si en 1982, seules 3 journées d'observation ont été réalisées, en 1992 il y en a eu 119. Le nombre d'ornithologues amateurs augmentant, la présence sur le terrain ne cesse de croître.

année	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
nombre de jours d'observation	3	3	6	18	36	39	59	66	84	90	119

En faisant la synthèse des observations réalisées sur l'étang, nous allons tenter de démontrer le grand intérêt de ce site pour l'avifaune.

Le Conseil Général l'a bien compris en acquérant, en 1985, l'étang et en y créant une réserve.

I . Situation géographique

L' étang de Châtillon-en-Vendelais est situé dans l'est du département d'Ille-et-Vilaine, à mi-chemin entre Vitré et Fougères. C'est un havre important pour les oiseaux. Ses 110 hectares offrent tout à la fois de nombreuses possibilités de nidification, d'alimentation et de repos pour l'avifaune.

L'étang est alimenté par deux ruisseaux (du Pâtis de la Coutancière et des Marmouilles). Ceux-ci forment ensuite la rivière de la Cantache.

La gestion de l'eau est réalisée à partir de la digue située en bas du bourg de Châtillon et est surtout effectuée en fonction des intérêts piscicoles.

De part sa position géographique, l'étang constitue l'un des maillons importants de l'est du Massif Armoricaïn et est considéré comme un site d'intérêt européen pour l'accueil des oiseaux migrants. La réserve créée par le Conseil Général représente près de la moitié de l'étang et protège toutes les zones sensibles (queues d'étang, roselières, vasières).

II . Bilan ornithologique

Nous disposons de plus de 3500 données accumulées depuis plus de 10 ans, qui ont été recueillies par 42 ornithologues bénévoles de la SEPNE, du GOB et de la LPO. Les suivis réalisés ces dernières années pendant les migrations ont fait apparaître un important couloir migratoire pour les limicoles et les anatidés à

l'intérieur du Massif Armoricaïn. Les oiseaux traversent la péninsule bretonne par sa partie orientale pour rejoindre l'Atlantique ou la Manche.

Certaines espèces, comme l'Oie cendrée y sont observées en grand nombre, d'autres passent en bandes de plusieurs dizaines voire une centaine d'individus (Chevalier gambette, Combattant varié, Canard souchet,...).

Ces suivis nous ont permis de découvrir depuis la création de la réserve des dortoirs hivernaux d'une centaine de Courlis cendrés et de Combattants et de plusieurs dizaines de milliers de Mouettes rieuses.

L'étang accueille environ 10 % des Combattants qui hivernent en Bretagne. Il devient également un refuge primordial pour les Canards pendant la saison de chasse.

La population nicheuse, quoique plus banale, est toutefois composée de 10 à 15 espèces selon les années.

Nous allons tenter d'effectuer un bilan exhaustif des espèces d'oiseaux d'eau en définissant leur statut sur l'étang.

- **Plongeon arctique** (*Gavia arctica*) :

Hivernant exceptionnel. Une seule observation lors de l'hiver très froid de 1984-85 : 1 ind. le 3/02/85.

- **Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) :

Noté en toute saison, mais surtout en période post-nuptiale.

Maximum observé : présence de 11 à 21 ind. du 2 au 16/08/92, 13 le 10/08/85, 10 le 14/08/93.

Le Castagneux a niché de façon certaine en 1985, 86 et 87.

- **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) :

Emblème de l'étang de Châtillon, il est présent toute l'année. Maximum observé : 84 le 1/08/92, 80 le 26/08/92, 78 le 26/07/92, 65 le 17/04/93, 63 le 12/07/89.

De 5 à 12 couples nichent selon les années et les variations du niveau de l'eau.

- **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) :

Exceptionnel : 1 le 1/05/90 et 1 le 24/11/91.

- **Grèbe esclavon** (*Podiceps auritus*) :

Exceptionnel : 1 le 8/09/92.

- **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) :

Occasionnel. Il est noté toutefois presque tous les ans depuis 1985 lors de la dispersion post-nuptiale et tendrait à devenir régulier ; 15 observations de juillet à septembre 1992. Maximum : 4 les 11 et 13/07/92, 3 le 10/08/85, 3 le 23/08/93.

Plusieurs prémices de nidification semblent se dessiner : 1 individu a probablement séjourné du 18/03 au 18/06/89, 1 couple est également observé le 12/04/93, puis 1 adulte le 28/05/93. Le groupe de 4 individus observé en juillet 92 était composé d'un couple accompagné de ses 2 jeunes volants.

- **Pétrel culblanc** (*Oceanodroma leucorhoa*) :

Accidentel, 1 cadavre est trouvé le 13/01/88 suite aux tempêtes de la première quinzaine de janvier.

- **Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) :

Occasionnel jusqu'en 1987, il devient régulier toute l'année et sa population augmente chaque année.

année	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
nombre maximum observé	2	3	11	16	25	48	90	150

Les estivants dépassent depuis 1991 la dizaine d'individus : 20 le 2/05/91, 18 le 20/04/92, 26 le 1/05/93.

- **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*) :

Occasionnelle, l'espèce devient également de plus en plus régulière lors de la dispersion post-nuptiale.

La première Aigrette a été notée du 16 au 19/08/88, ensuite 1 ind. le 30/07/92 et 2 le 13/09/92 puis 1 jusqu'au 16/09/92. L'année 1993 conforte cette évolution où de 2 à 9 ind. sont présents du 18/07 au 22/08.

- **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) :

Régulier toute l'année. Une présence importante est notée en 1992 où des chiffres impressionnants sont enregistrés : 56 le 3/08, 53 le 16/09, 95 le 27/09, 76 le 4/10, 59 le 11/10.

Lors des autres années, les maxima sont plus modestes : 41 le 1/10/89, 43 le 10/09/90, 52 le 1/03/93.

Bien que nous n'en ayons pas encore la preuve, il semble qu'une colonie de reproduction de Hérons cendrés se situe dans les environs proches de l'étang. Les observations régulières d'oiseaux en plumage de nicheurs au printemps et celle d'un juvénile avec encore du duvet le 3/05/92 nous confortent dans cette théorie.

- **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) :

Exceptionnel : 1 juvénile est observé les 30/07 et 1/08/92.

- **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) :

Exceptionnel : 1 migrateur est noté le 11/05/91, 1 ind. les 1 et 2/03/93.

- **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) :

Exceptionnel : 1 migrateur est présent le 31/07/93.

- **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*) :

Migrateur occasionnel. La première observation date de 1986, depuis la Spatule est notée presque chaque année. La plupart des oiseaux sont vus lors de la migration post-nuptiale et particulièrement en septembre où des groupes se posent sur les bords de l'étang : 19 le 14/09/86, 11 le 23/09/89, 12 le 24/09/92.

La Spatule la plus tardive (1 immature), est observée le 17/11/91. Seules 2 données d'individus isolés sont répertoriées pendant le printemps : 1 le 5/04/87, 1 le 7/03/93.

- **Cygne tuberculé** (*Cygnus olor*) :

Cet oiseau, en expansion dans l'ouest de la France, n'est noté sur l'étang que depuis 1991 : 1 du 10 au 18/02/91, 1 autre stationne du 4/07 au 05/12/93.

- **Oie des moissons** (*Anser fabalis*) :

Occasionnel : 7 le 18/01/79, 11 du 12/12/87 au 3/01/88, puis 2 le 31/01/92.

Le séjour prolongé du groupe lors de l'hiver 1987-88 reflète l'intérêt de la réserve pour les oies grâce notamment au pâturage effectué par les bovins.

- **Oie rieuse** (*Anser albifrons*) :

Occasionnel : 20 le 7/02/79, 4 le 20/12/87, 5 du 8/01 au 12/02/89, 25 le 14/02/93, 1 les 1/11/93, 20/11/93 et 28/12/93.

Le stationnement de 5 individus pendant plus d'un mois, en 1989, conforte l'intérêt de la réserve.

- **Oie à tête barrée** (*Anser indicus*) :

Echappé de captivité : 1 les 2 et 4/05/86.

- **Oie cendrée** (*Anser anser*) :

Migrateur régulier et hivernant occasionnel. De grosses bandes font une halte sur l'étang lors de la migration : 110 le 18/02/89, 100 le 1/11/91, 115 le 2/11/91, 142 le 3/11/91, 114 le 1/11/93.

Les observations de novembre 91 démontrent la présence d'un couloir migratoire pour cette espèce dans l'est du département d'Ille-et-Vilaine.

Quelques hivernants stationnent sur l'étang : 2 du 4/01 au 15/02/87, 39 le 5/12/87 puis 8 du 12 au 16/12/87, 1 du 11/12/88 au 13/01/89, 18 du 21/12/93 au 28/01/94.

L'observation la plus précoce concerne 13 individus le 27/10/91 et la plus tardive est celle de 13 Oies le 22/04/93.

- **Bernache du Canada** (*Branta canadensis*) :

Hivernant accidentel : 1 adulte et 1 juvénile hiverne du 22/01 au 15/04/90.

- **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*) :

Hivernant exceptionnel : 19 individus stationnent du 16/12/87 jusqu'à la mort de l'un d'entre eux le 10/01/88.

Le 13 janvier, le cadavre est retrouvé sans tête !!!

- **Bernache cravant** (*Branta bernicla*) :

Occasionnel, rarement observé en dehors du littoral : 1 Bernache du 28/12/86 au 8/01/87, 1 ind. de la sous-espèce à ventre pâle (B. b. hrota) du 28/10 au 25/11/90, puis un groupe de 23 migrateurs le 22/03/92.

- **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) :

Régulier, depuis l'apparition de 8 individus sur l'étang le 19/10/86, le Tadorne est noté chaque année.

Auparavant localisé sur le littoral, cet oiseau fréquente de plus en plus les étangs et notamment celui de Châtillon. Autres maxima : 12 le 30/12/92, 8 le 16/12/89, 7 le 22/12/91. Un individu stationne du 1/09 au 7/12/91.

- **Canard siffleur** (*Anas penelope*) :

Hivernant régulier. Maximum : 750 le 9/02/91, 600 le 18/01/79, 600 le 15/01/92.

Les premiers individus sont notés dès août : 2 le 08/08/93, 1 le 21/08/90. L'arrivée des suivants n'a lieu qu'à partir de septembre et octobre. Quelques Siffleurs estive jusqu'en juin. Un mâle restera même jusqu'au 8/07/90.

- **Canard chipeau** (*Anas strepera*) :

Occasionnel. Maximum : 24 le 20/02/87, 14 le 17/11/89, 13 le 15/11/92.

- **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) :

Régulier. Les maxima sont notés en hiver : 250 le 16/02/92, 220 le 11/11/91, 200 le 21/12/86, 200 le 15/02/87.

Malgré l'estivage d'un couple en 1986, aucune preuve de reproduction n'a pu être apportée.

- **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) :

Le plus régulier et le plus abondant des Canards. Maximum : 3000 le 2/10/93, 2500 le 27/09/92, 1800 le 27/11/89, 1800 le 27/12/89, 1800 le 14/10/90, 1700 le 18/12/88.

De 10 à 15 couples nichent chaque année sur l'étang ou dans les prairies voisines.

- **Canard pilet** (*Anas acuta*) :

Migrateur régulier, hivernant occasionnel. Maximum : 25 le 3/02/85, 18 le 9/03/93, 17 le 8/03/87, 17 le 11/09/92.

Présent jusqu'en mai, le Pilet ne réapparaît sur l'étang qu'au mois de septembre.

- **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) :

Migrateur occasionnel, noté presque tous les ans. la Sarcelle d'été est observée dès le mois de mars (dates extrêmes : 1 le 13/03/88, 1 le 15/09/85). Maximum : 8 le 8/04/90, 5 le 8/05/85.

- **Canard souchet** (*Anas clypeata*) :

Migrateur et hivernant régulier. L'espèce semble être de plus en plus abondante, notamment en 1991 et 92. Maximum : 300 le 21/09/92, 296 le 27/09/92, 275 le 3/11/91, 250 le 29/10/91, 243 le 6/10/91, 230 le 1/11/92, 150 le 18/10/87, 150 le 28/12/90.

Bien que plusieurs couples parquent et estivent (en 74, 86, 89, 90 et 92) aucune preuve de reproduction ne nous a été rapportée.

- **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) :

Présent toute l'année. Les plus forts effectifs sont notés en période hivernale. On y recense régulièrement 100 à 200 Milouins voire beaucoup plus lors de certains hivers et notamment celui de 1983. Maximum : 1100 le 23/01/83, 900 le 16/01/83, 312 le 4/01/85, 302 le 22/01/93.

Quelques couples nichent chaque année depuis 1974 (maximum : 4 couples en 1992). Le Milouin se reproduisant tardivement, les familles ne sont observées qu'en juillet. Celles-ci peuvent compter jusqu'à 9 poussins.

- **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*) :

Exceptionnel : 1 mâle le 12/11/89, 2 le 24/12/89, 1 mâle semble stationner du 30/09 au 8/10/92, puis les 1 et 11/11/92. La dernière observation est notée le 20/12/92.

- **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) :

Tout en étant régulier, il est toutefois moins présent que le Milouin. Maximum : 200 le 23/01/83, 135 le 9/02/91, 120 le 16/01/83, 111 le 26/01/92. Le Morillon niche occasionnellement depuis 10 ans (1 couple en 82, 86, 91, 2 couples en 92).

- **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) :

Exceptionnel : 1 individu le 7/02/88, 1 le 9/12/93.

- **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) :

Exceptionnel : 5 femelles en migration le 4/11/88.

- **Macreuse brune** (*Melanitta fusca*) :

Accidentel : 1 femelle notée le 4/01/85.

- **Garrot à oeil d'or** (*Bucephala clangula*) :

Hivernant occasionnel. Noté de novembre à mars. Hivernage de 1 à 3 individus du 11/11/92 au 28/03/93, 1 du 5/12/93 au 20/02/94.

- **Harle piette** (*Mergus albellus*) :

Hivernant rare, observé lors des hivers très froids : 12 le 27/01/85, 8 le 3/02/85, 3 le 7/02/85, 1 mâle du 14 au 21/12/86, 3 le 13/12/87, 3 le 24/02/91.

- **Harle huppé** (*Mergus serrator*) :

Accidentel : 1 le 21/02/93.

- **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) :

Hivernant occasionnel noté pratiquement chaque année. Maximum : 12 le 27/01/85, 10 le 3/02/85, 8 le 17/03/92.

- **Erismature rousse** (*Oxyura jamaicensis*) :

Accidentel : 1 immature est présent du 26/10 au 17/11/91, 1 individu le 20/08/93.

- **Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) :

Notée lors des migrations.

- **Milan noir** (*Milvus migrans*) :

Exceptionnel : 1 le 22/06/85.

- **Milan royal** (*Milvus milvus*) :

Exceptionnel : 1 le 10/01/87, 1 immature le 27/11/89.

- **Pygargue à queue blanche** (*Haliaeetus albicilla*) :

Hivernant exceptionnel : 1 immature de 2ème année hiverne du 28/12/90 au 9/03/91.

Cet oiseau est l'un des rares Pygargues observés en Bretagne depuis le début du siècle.

- **Circaète Jean le Blanc** (*Circaetus gallicus*) :

Exceptionnel : 1 le 1/09/92, 1 le 2/09/93.

- **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) :

Migrateur régulier mais rare. Ce Busard est noté tous les ans depuis 1986. Il est observé d'avril à décembre, principalement lors de la dispersion post-nuptiale.

Maximum : 4 le 26/08/90.

mois	04	05	06	07	08	09	10	11	12
nombre d'observations	2	2	1	4	13	4	1	0	1

Une seule observation en hiver : 1 le 23/12/89.

- **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) :

Occasionnel : 2 le 15/07/87, 1 le 21/08/90, 1 le 24/09/92, 1 le 14/08/93. Une seule observation hivernale : 1 le 27/12/90

- **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) :

Présent toute l'année. Il chasse régulièrement sur l'étang et niche aux abords de l'étang.

- **Buse variable** (*Buteo buteo*) :

Présente toute l'année. La Buse niche aux abords de l'étang. Maximum : 15 individus en migration le 3/09/92.

- **Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) :

Migrateur exceptionnel : 1 le 30/08/89, 1 le 13/09/92.

- **Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) :

Présent toute l'année. Il niche en périphérie de l'étang.

- **Faucon kobez** (*Falco vespertinus*) :

Exceptionnel : 1 le 1/05/93.

- **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) :

Exceptionnel : 1 le 7/01/89, 1 le 8/10/92, 1 le 26/10/92.

- **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) :

Migrateur régulier et estivant occasionnel.

La plupart des observations ont lieu en septembre. L'individu le plus tardif est noté le 11/10/92.

- Faucon pèlerin (Falco peregrinus) :

Hivernant régulier depuis 1991. Auparavant il était exceptionnel : 1 le 7/02/88, 1 le 3/12/89, 1 le 29/08/90. Un immature hiverne du 29/10/91 au 19/04/92. Adulte, il séjourne de nouveau du 24/10/92 au 22/04/93. Retour du même individu le 10/10/93. Sa présence est notée jusqu'au 2/01/94.

Avec l'hivernage d'un Pygargue pendant l'hiver 90-91 et le troisième hivernage successif du Pèlerin, l'étang démontre son attractivité pour les rapaces.

- Caille des blés (Coturnix coturnix) :

Exceptionnel : 1 chanteur les 5 et 12/07/87.

- Râle d'eau (Rallus aquaticus) :

Nicheur exceptionnel : 1 chanteur est entendu le 3/07/82, 1 adulte est accompagné de 2 poussins le 9/08/87. Cette seconde observation concerne probablement une deuxième couvée.

- Poule d'eau (Gallinula chloropus) :

Régulier mais en petit nombre.

- Foulque macroule (Fulica atra) :

Présent toute l'année. Maximum : 1000 le 23/01/83, 800 le 16/12/87, 600 les 4/09/93 et 10/10/93.

De 8 à 27 couples nichent selon les années.

- Huîtrier pie (Haematopus ostrélagus) :

Exceptionnel : 1 le 18/08/86, 1 le 5/04/87, 1 le 6/09/92.

- Echasse blanche (Himantopus himantopus) :

Exceptionnel : 1 mâle le 13/10/90.

- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) :

Occasionnel. Noté d'août à janvier (dates extrêmes : 1 le 15/08/93, 1 le 7/01/89). Quelques groupes sont également observés : 14 le 28/08/93, 7 le 14/12/86.

- Petit gravelot (Charadrius dubius) :

Migrateur régulier. Noté de juillet à septembre (dates extrêmes : 1 le 21/07/92, 2 le 25/09/90).

Maximum : 10 le 29/08/90, 9 le 8/09/90. Au printemps, le Petit gravelot est noté dès le mois de mars (6 le 8/03/87).

- Grand gravelot (Charadrius hiaticula) :

Migrateur régulier. Rare au printemps, il est surtout noté en période post-nuptiale d'août à novembre (dates extrêmes : 2 le 2/08/92, 2 le 16/11/88).

Maximum : 11 le 19/08/90, 7 le 11/09/88.

- Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) :

Exceptionnel : 2 individus le 10/08/85, 1 le 8/08/86.

- Pluvier doré (Pluvialis apricaria) :

Régulier. Noté d'août à mars (dates extrêmes : 1 le 19/08/86, 50 le 16/03/86).

Maximum : 270 le 30/12/90, 200 le 2/03/91.

- Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) :

Occasionnel : 1 le 8/05/85, 1 les 21 et 22/08/90, 1 du 23/09 au 7/10/90.

- Vanneau huppé (Vanellus vanellus) :

Présent presque toute l'année, particulièrement d'août à mars. Il semble que le Vanneau ne niche plus dans les prairies bordant l'étang. Maximum : 6000 le 30/12/90, 5000 le 6/01/91, 2300 le 27/12/89.

- Bécasseau maubèche (Calidris canuta) :

Migrateur occasionnel. Maximum : 15 le 11/11/90, 5 le 27/10/90, 3 le 5/04/87.

- **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) :

Migrateur régulier noté d'août à novembre.

Maximum : 20 le 15/09/90, 11 le 15/09/85, 7 le 7/09/93.

- **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) :

Migrateur exceptionnel : 3 le 24/03/91, 1 le 16/08/92.

- **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) :

Migrateur occasionnel noté en août et septembre (dates extrêmes : 1 le 5/08/93, 1 le 12/09/92).

Les maxima sont observés en 1990 : 15 les 30 et 31/08, 12 le 3/09, 10 le 29/08.

- **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) :

Régulier d'août à mars. La donnée la plus précoce concerne 2 ind. le 31/07/93.

Maximum : 36 le 16/10/88, 34 le 10/11/84, 26 le 13/11/88.

- **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) :

Régulier de juillet à mai (dates extrêmes : 1 le 29/07/92, 3 le 23/05/92). Il est noté en bandes importantes lors de la migration prénuptiale : 160 le 13/03/88, 150 le 1/03/91.

L'étang accueille, chaque hiver, un des dortoirs les plus importants de Bretagne : jusqu'à 140 le 18/12/88.

- **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) :

Exceptionnel : 5 le 9/12/84 lors d'une vidange de l'étang.

- **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) :

Régulier. Sa présence est très importante en hiver. Maximum : 243 le 29/11/86, 180 le 9/12/84, 150 le 24/12/86, 140 le 13/01/89, 130 le 20/11/85.

Quelques individus sont notés au printemps.

- **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) :

Migrateur régulier. Maximum : 25 le 21/07/92, 23 le 30/08/92, 15 le 5/03/88. A noter qu'une bande est observée dès le 15/02/87. Certains individus sont notés jusqu'en avril (1 le 24/04/93).

- **Barge rousse** (*Limosa lapponica*) :

Exceptionnel : 1 du 8 au 29/09/91.

- **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) :

Exceptionnel : 4 le 13/04/88.

- **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) :

Régulier, particulièrement en hiver. L'étang accueille l'un des plus importants dortoirs hivernaux de la Bretagne intérieure. Maximum : 300 le 22/02/90, 134 le 14/02/93.

Quelques individus sont notés jusqu'en mai (3 le 3/05/89).

- **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) :

Migrateur occasionnel. Rare au printemps, il est plus fréquent lors de la migration post-nuptiale. Maximum : 10 le 28/09/86.

Une seule observation en hiver : 10 le 14/12/86.

- **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) :

Migrateur régulier. Maximum : 130 le 22/08/92, 40 le 11/09/92. Quelques bandes plus réduites sont également notées au printemps : 14 le 13/04/88, 10 le 9/04/86.

Des individus isolés sont observés jusqu'en juin.

- **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) :

Migrateur régulier de juillet à novembre. Maximum : 25 le 26/11/88, 16 le 6/09/92, 11 le 22/08/93.

Les observations prénuptiales sont plus rares.

- **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) :

Migrateur régulier de juillet à octobre. Maximum : 30 le 19/08/88, 21 le 17/07/92, 20 le 5/08/93.

C'est un hivernant occasionnel (5 le 14/12/86). Peu d'observations au printemps : 1 le 14/04/91, 2 du 9 au 11/03/93.

- **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) :

Migrateur occasionnel, noté de juillet à septembre (dates extrêmes : 1 les 15/07/87 et 15/07/92, 2 le 7/09/93).

Maximum : 4 le 23/08/87, 3 le 1/09/90.

Un seule observation au printemps : 1 le 1/05/88.

- **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) :

Migrateur régulier, hivernant occasionnel. Maximum : 37 le 8/08/92, 33 le 15/08/92, 30 le 31/07/93, 30 le 28/07/90.

- **Tournepierrre à collier** (*Arenaria interpres*) :

Accidentel : 1 du 29/08 au 3/09/90.

- **Phalarope à bec large** (*Phalaropus fulicarius*) :

Accidentel : 1 le 30/09/90.

- **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) :

Migrateur occasionnel. Noté en avril-mai et août-septembre (dates extrêmes : 1 le 17/04/88, 1 le 10/09/90). Maximum : 18 le 1/05/88, 6 le 1/05/90, 4 le 2/05/91.

La majorité des oiseaux observés est composée de juvéniles ou d'immatures.

- **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) :

Présente presque toute l'année. Des dortoirs importants sont notés en hiver.

Maximum : 30000 le 13/01/91, 18000 le 13/01/89, 15000 le 15/02/88.

- **Goéland cendré** (*Larus canus*) :

Occasionnel, noté principalement en hiver.

Maximum : 15 le 10/02/88.

- **Goéland brun** (*Larus fuscus*) :

Noté presque toute l'année. Il est de plus en plus fréquent sur l'étang. Maximum : 43 le 16/08/93, 20 les 7 et 8/09/92, 22 le 3/09/92, 17 le 24/04/93, 16 le 30/08/90.

- **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) :

Occasionnel. Maximum : 6 le 4/09/85, 6 le 23/04/89, 6 le 7/08/93.

- **Mouette tridactyle** (*Rissa tridactyla*) :

Accidentel : 1 adulte le 13/01/91 après les tempêtes de la première quinzaine de janvier.

- **Sterne caspienne** (*Sterna caspia*) :

Exceptionnel : 1 le 6/09/92, 2 le 11/09/92, 1 le 29/08/93.



- **Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) :

Migrateur régulier, noté de mai à octobre (dates extrêmes : 2 le 2/05/91, 2 le 02/10/93).

Maximum : 14 le 26/08/89, 10 le 27/08/86, 8 le 4/09/85.

- **Guifette moustac** (*Chlidonias hybrida*) :
Migrateur occasionnel, noté d'avril à septembre (dates extrêmes : 1 le 25/04/93, 1 le 11/09/92).
Maximum : 3 le 17/06/90.
- **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) :
Migrateur régulier. Noté d'avril à octobre, avec un net passage en août et septembre (dates extrêmes : 2 le 16/04/88, 2 le 4/10/92).
Maximum : 38 le 20/08/86, 33 le 10/05/92, 22 le 29/08/89.
- **Guifette leucoptère** (*Chlidonias leucopterus*) :
Exceptionnel : 1 juvénile du 3 au 10/09/92.
- **Coucou gris** (*Cuculus canorus*) :
Migrateur régulier, noté en avril et en août.
- **Martin-pêcheur d'Europe** (*Alcedo atthis*) :
Régulier. Nicheur probable le long de la Cantache.
- **Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) :
Migrateur régulier. Noté en mars-avril et août. La date la plus précoce : 2 le 15/03/90. Maximum : 500 le 12/04/92.
- **Hirondelle rustique** (*Hirundo rustica*) :
Migrateur régulier et nicheur local. Noté de mars à octobre (dates extrêmes : 2 le 18/03/90, 3 le 11/10/92).
Maximum : 300 le 20/04/80.
- **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) :
Migrateur régulier et nicheur local. Noté d'avril à septembre (dates extrêmes : 4 le 9/04/87, 30 le 2/09/92).
Maximum : 350 le 22/08/92.
- **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) :
Migrateur et hivernant régulier.
- **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) :
Migrateur et hivernant occasionnel. Noté d'octobre à mars.
Maximum : 40 le 29/03/92.
- **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) :
Migrateur régulier. Noté en mai, août et septembre.
- **Bergeronnette flavéole** (*Motacilla flaveola*) :
Migrateur occasionnel. Noté en avril et septembre.
- **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) :
Migrateur et hivernant régulier en petit nombre.
- **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) :
Présente toute l'année.
Maximum : 500 le 20/09/93
- **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) :
Migrateur occasionnel.
- **Phragmite aquatique** (*Acrocephalus paludicola*) :
Exceptionnel : 1 le 26/08/89.
- **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) :
Migrateur occasionnel. Il a probablement niché en 1974.

- **Rousserolle effarvate** (*Acrocephalus scirpaceus*) :
Nicheur régulier. Maximum : 13 chanteurs le 2/06/74.
- **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) :
Migrateur régulier en avril et août-septembre.
- **Loriot d'Europe** (*Oriolus oriolus*) :
Exceptionnel : 2 le 16/03/93, 1 le 3/07/93.
- **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) :
Présent toute l'année. Nicheur régulier. Maximum : 8 chanteurs le 13/06/93.



Etang de Chatillon
3/07/92

Conclusion

La liste des espèces énumérées démontre l'intérêt primordial de l'étang pour l'avifaune en Ile-en-Vilaine. Il constitue le troisième site du département, en terme qualitatif et quantitatif, après la baie du Mont St-Michel et la Rance maritime.

Avec la création de la réserve et l'interdiction de la chasse, le Conseil Général a valorisé l'étang. Les oiseaux peuvent désormais y stationner en toute quiétude.

La présence des bovins dans la réserve est également un atout et favorise l'hivernage des oies et des canards siffleurs. Le Vanneau devrait probablement pouvoir y nicher de nouveau.

Une meilleure gestion de l'eau augmenterait probablement les capacités d'accueil de l'étang.

L'installation d'un affût, avec possibilité d'accès limité, faciliterait considérablement les dénombrements.

Je remercie tous mes collègues ornithologues amateurs qui ont transmis leurs observations, et particulièrement Laurent Mary et Pascal Lhoutellier qui, depuis 1989, assurent une présence régulière sur le site. Mes remerciements iront également au personnel de la D.A.E. (Direction de l'Aménagement et de l'Environnement) qui nous a également transmis des informations utiles.

Observateurs ayant transmis leurs observations :

Patrick Alber,	Matthieu Beaufile,	Denis Breton,
Marcel Cador,	Emmanuel Chabot,	Laurent Chataignère,
Jean-Paul Cherruault,	Guy-Luc Choquené,	Jean-Pierre Coco,
Filipe Contim,	Alain Desnos,	Benoit Duchenne,
Bruno Gaudemer,	Lionel Gohier,	Régis Gohier,
Nicolas Greff,	Bernard Guillemot,	Laurent Helbert,
Bertrand Helsens,	Caroline Houalet,	Jean-Marc Joly,
Alain Ladet,	Michel Ledard,	J. Le Dru,
Arnaud Le Kervenn,	Joseph Le Lannic,	Patrick Le Mao,
Jacques Le Priol,	Pascal Lhoutellier,	Jean-Yves Louis,
Jacques Maout,	Franz Maréchal,	Laurent Mary,
Maurice Pena,	Patrick Péron,	Fanch Pustoc'h,
Ron Schuddeboom,	Jérôme Templon,	Sylvie Templon,
Pierre Tillier,	Jean-Luc Toullec,	Odile Uzureau.