

# Comment le premier Vanneau sociable (*Chettusia gregaria*) normand est devenu breton

Yann Février, Roland Jamault et Jérôme Isambert.

C'est lors d'une belle journée de novembre 2000 que fut réalisée la première observation homologuée de Vanneau sociable (*Chettusia gregaria*) pour la région normande. L'oiseau, découvert sur la commune de Beauvoir (Manche – 50), au cœur de la Baie du Mont Saint-Michel, a fini par s'envoler en direction de l'ouest, franchissant la frontière bretonne située à quelques centaines de mètres seulement. Cette notule vise donc à préciser la double appartenance (Bretagne/Normandie) de cette donnée et permet surtout de procéder à une description de cette espèce qui reste occasionnelle dans l'ouest de la France.

## Statut de l'espèce en France et dans l'ouest :

Le Vanneau sociable est une espèce originaire d'Asie occidentale, dont les populations nicheuses les plus proches se trouvent dans les plaines du Kazakhstan. En France, il s'agit d'un migrateur et hivernant occasionnel, observé 47 fois jusqu'en 1998 et toujours à l'unité (Dubois *et al.*, 2000). La majorité des observations sont situées dans l'est et le centre du pays, ce qui correspond au couloir principal de migration du Vanneau huppé avec lequel il s'associe généralement. Dans l'ouest, seules la Loire-Atlantique et la Vendée ont déjà accueilli l'espèce et ce, à plusieurs reprises (Dubois *et al.*, 2000). Un oiseau a notamment été observé à Guérande (Loire-Atlantique) en août 2003 (cf. Duquet, 2003).

Le passage automnal de cette espèce est principalement compris entre fin octobre et fin novembre (Dubois *et al.*, 2000), ce qui coïncide bien avec la donnée présente. A noter que, malgré le déclin des populations nicheuses, le nombre d'observations en France a augmenté depuis les années 80, sans doute du fait d'une recherche plus active au sein des troupes de vanneaux (Dubois *et al.*, 2000 ; Frémont & le CHN, 2002).

## Résumé de l'observation.

La journée d'observation du 4 novembre 2000 en Baie du Mont Saint-Michel débute comme souvent par une séance matinale de seawatching. Celle-ci nous agrmente de plusieurs observations tout à fait intéressantes pour le département et la période (Phalarope à bec large, Labbes...). L'après-midi est, elle, consacrée à la coutumière visite des herbus et polders de l'ouest de la Baie. Vers 16h00, un arrêt en face du polder de la ferme Foucault et une rapide inspection d'une troupe mixte de vanneaux et pluviers nous permet de repérer un oiseau au « jizz » particulier. Pensant avoir à nouveau affaire au Pluvier guignard observé au même endroit 15 jours plus tôt, nous garons nos voitures à l'abri de la digue-route et déplaçons les longues-vues en faisant attention de ne rien faire décoller. Au premier coup d'œil dans les longues-vues nous nous rendons rapidement compte que quelque chose ne colle pas. A l'évidence, il ne s'agit pas d'un Pluvier guignard, l'oiseau se rapprochant davantage de la morphologie d'un vanneau. Plus gros que les Pluviers dorés, de longues pattes noires, des primaires noires (soulignées par les secondaires blanches) formant un liséré très net, un large sourcil pâle se rejoignant derrière la tête, un trait sourcilier fin mais bien marqué... il s'agit bel et bien d'un **Vanneau sociable** *Chettusia gregaria*. La consultation des guides ne nous fait pas douter sur l'identification de l'oiseau : il s'agit d'un adulte internuptial.

Nous l'observons pendant une vingtaine de minutes en opérant une description soignée et en griffonnant quelques croquis. Après avoir détaillé le reste du groupe à la recherche d'autres éventuelles bonnes surprises, nous décidons de nous approcher quelque peu pour mieux l'observer.

Nous avons bien noté qu'il semblait vigilant et c'est à peine après avoir fait quelques pas dans sa direction que le vanneau décolle en poussant des cris stridents tandis que les Pluviers dorés, plus proches de nous, continuent de s'alimenter calmement.



Son envol nous permet d'admirer le superbe pattern alaire qui caractérise l'espèce et nous conforte dans notre identification. Après s'être reposé quelques minutes à distance respectable, l'oiseau s'envole à nouveau en compagnie d'un Vanneau huppé, nous permettant au passage la comparaison des deux espèces. Mais cette fois d'un vol décidé il part plein ouest, et c'est finalement au travers des jumelles que nous le voyons disparaître au-dessus d'une haie de peupliers qui délimite la « frontière » bretonne.

Bien malgré nous, cette observation illustre une bien belle métaphore sur la Baie. Elle nous rappelle que ce vaste ensemble écologique qui interagit et vit au rythme des marées et des saisons, ne s'encombre pas des considérations humaines de propriétés, bien loin d'une quelconque notion d'appartenance à une entité administrative ou culturelle...

### Description de l'oiseau :


Taille intermédiaire entre le Pluvier doré (aspect plus rond et dodu) et le Vanneau huppé. Plus haut sur patte que le Vanneau huppé. Paraît plus "élégant" que les pluviers, se tient plus droit (dressé).

Manteau, scapulaires, rémiges tertiaires et couvertures gris-brun (les plumes du manteau, des scapulaires et des couvertures sont gris-brun unies avec un mince liséré pâle). Il s'agit donc probablement d'un oiseau ayant effectué sa mue récemment.



Rémiges primaires entièrement noires  
Rémiges secondaires blanches

Le pattern sus-alaire est très contrasté :  
Il rappelle beaucoup la Mouette de Sabine juvénile.



Très farouche, s'envole bien avant les pluviers dorés et les vanneaux huppés. Le cri rappelle celui du Vanneau huppé mais en plus criard, plus métallique.

Cette donnée a été homologuée par le CHN (FRÉMONT & le CHN, 2002).

### Bibliographie succincte :

- DUBOIS Ph.-J., LE MARÉCHAL P, OLIOSSO G. & YÉSOU P. (2000) — *Inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine*, Nathan, Paris. 397 p.
- DUQUET M. (2003) — "Les nouvelles ornithos françaises en images" in *Ornithos* 10 (6), pp. 286-293.
- FRÉMONT J.-Y. & le CHN (2002) — "Les oiseaux rares en France en 2000", Rapport du Comité d'Homologation National in *Ornithos* 9 (1), pp. 2-33.

Yann Février, La Ville Joie, 35540 Le Tronchet  
Roland Jamault, 5 rue du verger, 35133 Luitré  
Jérôme Isambert, 28000 Chartres