

LE PIC NOIR EN ILLE-ET-VILAINE

En France depuis une quarantaine d'années, l'aire de répartition du pic noir s'est considérablement accrue. Quittant les forêts de montagne, il a envahi progressivement une bonne partie de notre pays, jusqu'à arriver au début des années 1980 aux limites de notre département. Il nous a semblé intéressant de rappeler la chronologie des observations en Ile-et-Vilaine pour cette espèce particulièrement bien suivie par les ornithologues depuis dix ans.

LE PIC NOIR DANS LES DEPARTEMENTS LIMITROPHES

- En Maine-et-Loire, il est observé dès 1969 près de Montjean-sur-Loire puis en février 1972 en forêt de Chandélais. En 1978, sa nidification est prouvée en forêt de Bareilles et sa présence est notée dans plusieurs massifs du Baugeois. Depuis, la colonisation du reste du département s'est poursuivie pour arriver près de chez nous dans le Segréen, avec une nidification certaine en 1982 en forêt des Loges.

- En Mayenne, entendu tous les ans depuis 1979 en forêt de Charnie, il y est observé en 1982, avec une nidification en 1984 dans cette forêt. De nombreuses observations ont été effectuées depuis 1983 dans le département.

- En Loire Atlantique, les premiers contacts ont été établis en forêt de Vioreau : il est entendu en 1975, vu en 1980, avec une reproduction en 1984. En 1984, sa présence est aussi notée en forêt d'Ancenis, à St Mars la Jaille et également en forêt de Teillay à la limite de notre département. En 1985, il est signalé à St Sébastien, Abbaretz, Pen Bé et la forêt du Gavre. Trouvé en 1986 en forêt de Juigné, sa nidification sera prouvée en 1987.

OBSERVATIONS EN ILLE-ET-VILAINE

En Ile-et-Vilaine, le Pic noir a fait l'objet d'une recherche assidue, pendant la période 1980-1985, lors de la réalisation de l'atlas des oiseaux nicheurs d'Ile-et-Vilaine. Le premier indice est antérieur à cette période : un individu est entendu en forêt de Paimpont en avril 1977. Il faudra attendre avril 1981 pour avoir la première observation : un individu est vu à Corbinières/Langon, puis 1985 où de multiples observations sont faites en forêt de Rennes, de St-Aubin du Cormier et de Chevré où des couples et des loges sont notées dans les hêtraies.

CHRONOLOGIE DES DECOUVERTES DE SITES

1977	forêt de Paimpont
1981	bois de Corbinières/Langon
1985	forêt de Rennes forêt de Chevré forêt de Haute-Sève/Saint-Aubin-du-Cormier
1986	forêt de la Guerche/Rannée forêt d'Araize/Martigné-Ferchaud bois au Voyer/Lohéac
1987	forêt de la Musse/Baulon forêt de Monfort forêt de Villecartier/Bazouges
1988	Bazouges sous Hédé forêt de Fougères forêt de Liffre Dingé (bocage)
1989	lac de La Valière

1990	étang Chenais Piquelais/Guipel forêt de Tanouarn/Dingé forêt de Bourgouet/Feins bois de Cornillé/Val d'Izé forêt de Montauban bois de Courrouet/Maure de Bretagne
1991	étang de Châtillon-en-Vendelais bois de Landal/Broualan bois de Saint-thual

TYPES D'OBSERVATIONS PAR SITE

1 - *Forêt de Rennes*

1 le 8/04/85 ; cris le 10/05/87 ; 1 loge le 24/01/88 ; 1 chanteur le 4/4 et le 30/04/88. Deux à trois couples occupent actuellement cette forêt.

2 - *Forêt de Paimpont*

1 individu entendu en avril 1977 ; 1 le 14/07/90 Villedanet ; loges étang des Forges, 2 loges à Hauteforêt en 1991, 2 individus le 4/91

3 - *Forêt de Haute-sève/St-Aubin du Cormier*

1 le 3/04/85 ; 2 ind. entrant dans des loges le 15/04/85 ; 1 chanteur et des traces le 1/12/85 ; 2 ind. le 21/03/86 et 1 ind. le 13/06/86 ; 1 ind. le 21/02/88 ; 2 ind (1 mâle et une femelle) le 12/02/89 ; 1 en mars 1989 et 2 avec un jeune en juillet.

4 - *Forêt de Liffré*

Une loge le 24/01/88 ; 1 ind. le 4/03/89 ; 1 couple nicheur en 1989.

5 - *Forêt de Chevré*

1 ind. tout le printemps en 1985 ; 1 ind. le 19/02/86 ; des cris le 20/10/87 ; 1 ind. alarme le 31/03/91.

6 - *Forêt de La Guerche*

Traces notées le 2/05/86 ; une loge pouvant être attribuée à l'espèce dans un peuplier étêté en 1988 ; recherche négative à la repasse en 1988 et 1989 ; présent d'après un garde forestier depuis 1984 ou 1985.

7 - *Forêt du Theil*

absence

8 - *Forêt du Pertre*

absence, mais observé à proximité.


9 - *Forêt d'Araize/Martigné-Ferchaud*

Traces le 19/01/86, idem le 9/05/86 ; 1 ind. le 13/10/90.

10 - *Forêt de Fougères*

1 ind. le 10/12/88 ; 1 ind. le 19/02/89.

LE PIC NOIR NICHE EN FORÊT DE RENNES



11 - Forêt de Monfort

1 chanteur le 24/02/87 ; traces le 22/03/87 ; traces le 26/02/89 ; cris et loges le 11/03/90.

12 - Forêt de Montauban

1 ind. le 8/09/90

13 - Forêt de la Musse/Baulon

1 ind. le 22/02/87

14 - Bois au Voyer/Lohéac

1 femelle entre dans une loge le 20/4/86 ; idem pour un mâle le 8/06/86 ; nidification en 1987 : 1 mâle le 20/03/87, 1 mâle nourrit la femelle le 24/04/87, le couple nourrit au nid le 10/05/87.

15 - Corbinières/Langon

1 ind. le 9/04/81

16 - Forêt de Villecartier/Bazouges-la-Pérouse

Anciennes loges le 18/03/89 ; 1 chanteur en juillet 1987 ; une loge en avril 1991.

17 - Bazouges-sous-Hédé/Hédé

Traces le 12/11/88 ; 1 ind. le 14/01/89 ; cris le 21/12/89 à l'étang de Bazouges ; 1 ind. le 25/11/90.

18 - Forêt de Tanouarn/Dingé

1 ind. le 28/10/90.

19 - Dingé

Un couple le 18/03/88, couple nicheur dans le bocage en 1988.

20 - Etang Chenay Piquelais/Guipel

1 ind. le 28/01/90.

21 - Lac de La Valière/Vitré

1 ind. le 17/11/89 ; 1 ind. tambourine et crie le 27/04/90 ; 1 ind. alarme le 3/03/91.

22 - Forêt de Bourgouet/Feins

Un couple nourrit des poussins le 19/05/90, envol des jeunes le 6/06/90.

23 - Bois de Cornillé/Val d'Izé

Un chanteur le 16/12/90 ; un chanteur le 13/02/91 ; un mâle le 23/12/90.

24 - Bois de Courrouet/Maure-de-Bretagne

1 ind. le 3/04/90

25 - Etang de Châtillon-en-Vendelais

1 ind. le 10/02/91 tambourine et crie.

26 - Bois de Landal/Broualan

1 ind. le 1/03/91

27 - Bois de St-Thual

Traces.

28 - St-Malo-de-Phily

Entendu en février 1991.

MILIEUX FREQUENTES

Le peu de renseignements fourni par les ornithologues lors de la transcription des données nous permet de nous faire une idée toute relative des milieux occupés par le Pic noir dans notre département. La plupart des nidifications ont eu lieu dans des hêtres souvent de belles tailles, cas des forêts de Rennes, de Paimpont, de Villecartier, bois au Voyer. D'autre part, une loge est notée dans un chêne en forêt de Haute-Sève et une autre dans un peuplier en forêt de la Guerche.

CONCLUSION

Comme le montre les observations, les années 1980 auront été celles de la colonisation de l'Ouest de la France. Notre département n'aura pas dérogé à cette règle. Quelques individus, avant garde dans les années 70, ont été rejoints par d'autres pour une extension rapide en Ile-et-Vilaine. En effet, la plupart des massifs forestiers et des bois d'une certaine importance ont été occupés. Les possibilités d'adaptation de cette espèce lui ont permis d'utiliser des milieux moins typiques comme le bocage.

Nous pouvons maintenant admettre que l'Ile-et-Vilaine est totalement colonisé ce qui n'est pas encore le cas du reste de la Bretagne. Les années à venir verront vraisemblablement la poursuite de cette expansion, d'ailleurs quelque peu entamée en Morbihan (Monterrein en 1986, forêts de la Bourbonnaye et de Lanouée en 1987) et en Côte d'Armor (bois d'Iffignac en 1991).

BIBLIOGRAPHIE

- * AR VRAN tome XI, fasc.2 ; tome XII, fasc.1 et 2 ; tome XIII, fasc 1 ; tome XIV, fasc 1.
- * BEAUDOIN J-C (1980) - Le Pic noir, preuve de nidification, données recueillies en période de reproduction et répartition dans le Maine-et-Loire. Bull. GAEON°28, vol.10.
- * Bulletins N°1,4,5,8,9,10,11 du Groupe Ornithologique de Loire Atlantique.
- * Le Grèbe N°5, Bulletin ornithologique d'Ile-et-Vilaine.
- * BIOTOPES 53, Bulletins N°1 à 7, Mayenne nature environnement.
- * CUISIN M. (1984) - Notes sur la voix du pic noir. L'Oiseau et R.F.O., 54 : pg 263.
- * CUISIN M. (1986) - Le pic noir et les insectes des écorces. L'Oiseau et R.F.O., 56 : 341 - 349.
- * CUISIN M. (1988) - Le pic noir dans les biocénoses forestières. L'Oiseau et R.F.O., 58 : 173 - 274.
- * CUISIN M. (1990) - La répartition du pic noir en France. L'Oiseau et R.F.O., 60 : 1 - 10.
- * GAROCHE J. (1992) - Une reprise douteuse de Pic noir dans les Côtes d'Armor. L'Oiseau et R.F.O., 62 : 278 - 279.

J. Chateignier.