

1984

AR VRAN, Tome XI, fasc. 1

septembre 1984

SOMMAIRE

Avant propos 1

Actualités ornithologiques du 16 novembre 1983 au
15 mars 1984

par : J.P. ANNEZO, G. GELINAUD, A. JEAN,
J.C. LINARD, J. MAOUT et F. PUSTOCH .. 3

Actualisation du statut de la mouette mélanocéphale
(*Larus melanocephalus*) en Bretagne

par : A. THOMAS et P. YESOU 94

AVANT PROPOS

Lors de leur Assemblée Générale du 25 mars 1984, les adhérents de la Centrale Ornithologique Bretonne ont décidé de relancer la publication "AR VRAN" qui végétait depuis plusieurs années, et, en particulier, les actualités ornithologiques qui paraissaient être la meilleure base à un approfondissement de la connaissance de l'avifaune régionale. Pour ce faire a été constitué un comité de rédaction chargé de mettre en forme les données compilées par les groupes locaux. C'est le première livraison de ce comité de rédaction qui fait l'objet du présent fascicule. Compte tenu du nombre réduit d'observations transmises (3000 environ) et de l'absence de points de repère durant les années 1975 à 1983, les commentaires pourront paraître insuffisants ; mais nous voulons bien espérer que le réseau accru d'informateurs (103 personnes !) saura bien nous aider à améliorer le contenu de cette revue... A cette fin, il est utile que tous les observateurs bretons motivés transmettent leurs données à leurs groupes locaux ou à la coordination régionale dont nous donnons les adresses à la suite. Il faut faire vite, le fascicule 2 du tome XI (1984) est déjà en préparation !

Le présent ouvrage sera expédié aux adhérents de 1983 n'ayant pas renouvelé leur cotisation en 1984, mais le fascicule suivant ne parviendra qu'aux personnes ayant réglé la dite cotisation soit 100 F. Le rythme normal de 3 fascicules annuels sera ensuite récupéré en 1985 (tarif fixé au début de l'année prochaine).


Les "actualités" des années 1975 à 1983, n'ayant pas été publiées, le seront sous la forme de notes d'ornithologie bretonne annexées aux prochains numéros.

Il ne nous reste plus qu'à attendre vos notes. A vos carnets... !

J. MAOUT

ADRESSES DES GROUPES LOCAUX

- 35 : Fanch PUSTOCH - Le Bas Berger - Miniac sous Bécherel
35190 TINTENIAC
- 22 : Jacques GAROCHE - Le Prétanné - MORIEUX
22400 LAMBALLE
- 29N et coordination régionale : Jacques MAOUT - 8, rue Villeneuve
29210 MORLAIX
- 29S : Michel COSSEC - 60, Avenue de la Marine
29115 GUILVINEC
- 56 : Guillaume GELINAUD - Le Crelin - BRECH
56400 AURAY
- 44 : GOLLA - Annexe Universitaire - La Lombarderie
rue de La Haute Forêt
44300 NANTES



ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

du 16 novembre 1983 au 15 mars 1984

par Jean-Pierre ANNEZO (groupe 3 - limicoles), Guillaume GELINAUD (groupe 4), Alain JEAN (groupe 2), Jean-Claude LINARD (groupe 3 - laridés et alcidés), Jacques MAOUT (groupe 1) et Fanch PUSTOCH (groupe 5).


Les actualités de cette période ont été rédigées à partir des notes de :

A. ABIVEN, J.P. ANNEZO, J.P. AUCHER, Y. AUTRET, R. BALES, J.N. BALLOT, R. BASQUE, M. BEAUFILS, P. BECHET, D. BELLIER, Y. BERTHAULT, P. BERTHELOT, P. BERTRAND, B. BILLON, J. BOUEDO, P. BORET, N. BOUCHET, Y. BOURGAUT, D. BREDIN, Y. BRIEN, R. CAMUS, J. CALVEZ, P. CANEVET, R. CARDIET, F. CHARTIER, J.L. CHATEIGNER, P. CISTAC, M. COSSEC, F. CROSSOUND, P. DANAIRE, R. DEHARGUES, A. DESNOS, M. DUC, J.L. DUPONT, C. EVANNO, N. FRANIATTE, D. FAURET, A. FORLOT, P. FOUILLET, A. FOUQUET, J.Y. FREMONT, LE GAEO, J. GAROCHE, P. GAUDU, G. GELINAUD, A. GERNIGON, F. GOBAILLE, LE GON (Normandie), J. GOURMELON, L. GRILLET, P. DE GRISSAC, A. GUILLAS, P. GURLIAT, J. HEDIN, G. HENRY, L. et X. HUE, B. ILIOU, O. JAN, J.P. JARNOUX, A. JEAN, C. JOANNIS, E. DE KERGARIOU, J. LE BAIL, B et M. LE BASCLE, G. LE BLAIS, LE DARD, A. LE DRU, J.P. LE FRANC, C et P. LE GUEN, J. LE LANNIC, G. LE RAY, P. LE ROUX, D et J.C. LINARD, M.C. LOZACH, F. MADEC, R. MAHEO, J. MAOUT, J.P. MEROT, N. MINEZ, P. MONNIER, O. NOEL, J.P. OHEIX, N. OLLIVIER, J. PETIT, A. PETTON, P. PHILIPON, F. PUSTOCH, B. QUIDEAU, B. RECORBET, P. ROUSSET, C. ROZE, N. SACQUIN, V. SCHRICKE, A. TEXIER, C. THEBAUD, A et C. THOMAS, Y. TREVoux, J.L. TRIMOREAU, G. VALAIS et H. WARZECHA.

Les illustrations sont d'Alain JEAN.

La période a été marquée par un certain nombre d'observations rares voire exceptionnelles. Le mauvais temps qui a sévi en janvier - février est à l'origine de l'apparition hivernale d'espèces comme la Mouette de Sabine, le Phalarope à bec large ou le Puffin Fuligineux. Autres conséquences, plus spectaculaires, de ces perturbations : l'échouage d'oiseaux comme le Macareux Moine, le Guillemot de Troil, le Mergule Nain ou, de manière massive, la Mouette Tridactyle.

Parmi les autres données on peut relever deux Grandes Aigrettes, un Ibis Falcinelle, un hivernage exceptionnel d'Aigrettes Garzettes et d'Eider à Duvet, deux Pygargues à Queue Blanche, quelques Aigles dont un Criard, de nombreuses données de Faucon Pèlerin, un Labbe à Longue Queue, une mini-invasion de Goélands à Ailes Blanches, une observation hivernale de Martinet Noir et de Huppe, deux Pipits de Richard, la présence pendant un mois et demi, au moins, de Mésanges Rémiz en Loire Atlantique, un Tichodrome Echelette, une invasion de Becs Croisés de Sapins ponctuée par les premières tentatives bretonne de nidification dans le Morbihan.



PLONGEON SP. (*Gavia sp*) 9 données

Ille-et-Vilaine

1 dans l'estuaire de la Rance le 21 janvier

Finistère

40 En Baie de Douarnenez le 29 décembre (Pointe du Bellec/Telgruc) : il s'agit probablement de Plongeurs Arctiques.
1 à Kérogan/Quimper le 3 décembre (Catmarin ou Arctique).

Morbihan

55 en 1 heure vers le sud est à Beg er Goalenec/Quiberon le 11 décembre. 2 le 4 janvier à Locmaria (Belle-Ile),
11 autour de la presqu'île quibéronaise le 15 janvier et
1 le même jour à Locmariaquer. Enfin 5 à St Pierre Quiberon,
le 11 février.

Loire Atlantique

1 au Croisic le 4 décembre.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*) 37 données

Côtes-du-Nord

1 le 25 janvier au Verdelet/Pleneuf.

Finistère

Une seule donnée pour la Penzé : 2 le 22 janvier.

En Rade de BREST : 3 le 29 décembre dans l'anse du Poulmic ;
1 les 21 et 22 janvier en Baie de Daoulas.

La Baie de Douarnenez est le site le mieux suivi : 17 observations effectuées sur toute la période. Signalons : 4 à Pentrez/St Nic le 31 décembre, 10 à Ty Marc/Plomodiern le 15 janvier et 7 le 10 mars à Pentrez.

Morbihan

En novembre : 1 à Guidel le 27. En décembre : 2 le 18 à Quiberon ; 1 le 22 à la Forest/Locoal-Mendon ; 4 le 24 à Erdeven et 5 le même jour à St Pierre-Quiberon. Enfin, 3 le 30 au Palais (Belle-Ile).

En janvier : le 15, 13 au Conguel/Quiberon, 2 à St Pierre-Quiberon et 1 à Locmariaquer ; le 29, 2 à Lorient et 1 à Locmaria (Belle-Ile).

En février : 5 à Quiberon le 9.

Loire Atlantique

Toutes les données proviennent du Croisic :

1 les 27 décembre, 15 et 28 janvier, 2 le 22 février.

La Baie de Douarnenez et la presqu'île de Quiberon sont les sites les plus fréquentés mais il manque très certainement

de nombreuses données en particulier de la côte léonarde.

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) 20 données

Finistère

En rade de Brest, 15-20 dans la baie de Daoulas le 19 novembre, 45-50 dans l'anse du Poulmic le 29 décembre et 26 lors du recensement du 21 janvier.

Dans la baie de Douarnenez, 5 entre Tréfeuntec/Plonevez-Porzay et Pentrez/St Nic le 20 novembre. Le 7 mars, 3 ensemble à Trezmalaouen/Kerlaz.

A Trévignon/Trégunc, 3 le 30 décembre.

Morbihan

Dans la rade de Lorient : 1 à Quilisoy/Larmor le 27 novembre, 1 à Kerguelen/Larmor le 24 décembre et enfin 1 le 8 février au Pont du Ter/Lorient.

Autour de la presqu'île quiberonaise : 1 à la pointe du Conguel/Quiberon le 18 décembre, 1 à Portivy/St Pierre Quiberon le 24 décembre, puis 3 le 27 décembre au même endroit.

Enfin, une donnée de Belle-Ile : 1 à Bordardoué/Le Palais le 30 décembre.

Loire Atlantique

Au port de la Turballe : 1 le 14 décembre.

Dans le port du Croisic : 2 le 26 décembre puis 1 les 30 et 31 décembre.

A la jetée du Tréhic/Le Croisic : 2 le 27 décembre, 1 le 28 janvier puis 1 le 10 février.

A l'inverse de ce que l'on peut constater, pour le Plongeon Catmarin, les sites finistériens (Brest et sans doute Douarnenez), regroupent la grande majorité des observations.

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) 18 données

Finistère

Le rôle marginal de la rade de Brest dans l'hivernage de cette espèce est illustré par l'unique observation d'un individu le 22 janvier en Baie de Daoulas.

La Baie de Douarnenez est à l'origine de données plus nombreuses réparties sur toute la période : 3 le 20 novembre, 3 le 5 décembre, 1 le 28 janvier et 4 le 10 mars.

Par ailleurs, 1 en rivière de Pont L'Abbé le 26 février.

Morbihan

Les observations d'oiseaux vivants sont concentrés sur la fin du mois de janvier et sur février. Il est certain que les tempêtes ont amené à la côte un contingent d'oiseaux : 2 à Belle-Ile le 29 janvier ; 2 à Larmor Plage les 7 et 10 février ; 1 au Ter/Lorient le 12 février ; au Fort Bloqué/Ploemeur : 1 le 15 février, 9 le 17 février et 7 le 26 février.

Signalons enfin les cadavres : 1 au Fort Bloqué le 5 décembre et 6 sur la côte entre Etel et Quiberon du 17 janvier au 3 mars.

Loire Atlantique

1 le 20 novembre à St Sébastien/Loire ce qui constitue la première donnée sur la Loire, en amont de Nantes.

Au Croisic, 1 le 15 janvier et 2 le 22 janvier.

Il est à remarquer que les côtes nord de la Bretagne n'ont pas fourni de données.

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps rufficollis*) 30 données

Peu de données concernant des rassemblements supérieurs à 10 oiseaux nous sont parvenues.

Les chiffres que nous publions sont, par conséquent, peu représentatifs de l'hivernage de cette espèce en Bretagne.

Ille et Vilaine

39 dans l'estuaire de la Rance le 21 janvier.

Finistère

39 le 22 janvier en rade de Brest.

10 le 18 février à Kerogan/Quimper et 10 le 26 février à Toulven/Quimper.

30 le 13 février en rivière de Pont-L'Abbé.

Morbihan

Seule la rivière du Ter/Lorient fait l'objet d'un suivi régulier :

12-15 le 21 novembre, 20-25 le 27 décembre et 12 le 18 février.

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) 45 données

Ille-et-Vilaine

Presque toutes les données proviennent des plans d'eau intérieurs.

- Décembre : 1 à la Tourneraie/Goven et 12 à La Chèze/
St Thurial le 11 ; 3 à la Taberge/Ste Anne En Vilaine
le 30.
- Janvier : le 14, 12 à la Chèze et 62 à Carcraon/Domalain;
le 15, 16 à Bazouges sous Hédé, 11 à la Bézardière/Hédé,
10 à l'étang de Combourg, 3 à Trémignon/Lourmais et 22 à
Marcille Le Robert ; le 18, 17 au Réservoir de La Valière/
Vitré et 52 à Paintourteau/Erbrée ; le 21 : 40 à
Paintourteau, 7 à Val d'Izé, 16 à Chatillon En Vendelais et
48 dans l'estuaire de la Rance.
- Mars : 2 le 10 au Pertre.

Côtes du nord

- Novembre : 63 le 16 à Yffiniac
- Décembre : 6 le 27 dans l'anse de Beauport/Paimpol
- Janvier : le 15, 8 en Baie de la Fresnaye et 31 à St Jacut
de la Mer,
le 18, 8 à l'étang de Loscouet, 10 à l'étang de
la Hardouinais/Merdrignac.
- Février : 5 en Baie de Lannion le 9, et 3 seulement à
Yffiniac le 24.
- Mars : 4 à l'étang de Lamballe le 6.

Finistère

- Décembre : 5 le 25 en Rivière de Morlaix ; 3 le 30 à la
Pointe de Trévignon/Trégunc.
- Janvier : 22 en Penzé le 22 ; le même jour, ils sont 39 en
Rade de Brest ; le 29, 2 en rivière de Morlaix.
- Février : en Baie de Douarnenez 1 le 10 et 3 le 27 ; 2 le
13 en rivière de Pont l'Abbé.
- Mars : 2 le 4 en rivière de Morlaix.
Signalons également l'absence de l'espèce le 29 décembre
dans le Yeun Elez, où elle niche.

Morbihan

A Belle-Ile : 11 le 30 décembre et 6-7 le 4 janvier.
En rade de Lorient : 1 le 6 décembre, 2 le 29 décembre, 1 le
15 janvier, 2 le 27 janvier (dont un en plumage nuptial), 5
le 3 février, 6 le 7 février, 8 le 10 février, 2 enfin le
8 mars.
Au Cranic/Brech : 5 le 15 janvier.

Loire Atlantique

23 à l'étang de la Blisière/Juigné le 7 novembre ; 25 à
l'étang d'Aumée/St Nicolas de Redon, 38 sur les étangs du
Vioreau/Joué-sur-Erdre le 28 janvier et enfin 21 au Grand
Vioreau le 4 mars.
Les recensements du Biroe, donnent 113 oiseaux à la mi-
janvier sur l'ensemble du département. Ces concentrations ne
semblent pas étrangères au mauvais temps qui sévit en mer.

GREBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*) 9 données

Une seule donnée sur les côtes nord de la Bretagne : 1 le 22 janvier en Baie de la Fresnaye (22).

Sur la côte quiberonaise (56) 1 en vol vers le sud est le 11 décembre ; 1 à la jetée du Tréhic/Le Croisic (44) le 28 janvier et 2 au même endroit le 19 février. Au Conguel/Quiberon : 2 le 29 janvier, 5 le 9 février et 2 le 11 février ; le 16 février 1 à Benance/Sarzeau (56) ; le 25 février 6 au Fort Bloqué/Ploemeur (56)

Les phénomènes météorologiques du coeur de l'hiver sont à l'origine du nombre élevé d'observations, cette espèce se tenant normalement au large.

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) 21 données

Côtes-du-Nord

1 le 22 janvier dans la Baie de la Fresnaye.

Finistère

Aucune donnée ne nous est parvenue de la rade de Brest où l'espèce hiverne régulièrement.
La baie de Douarnenez est à l'origine de 3 observations :
2 le 30 novembre à Ste Anne la Palud/Plonévez-Porzay ; 1 le 4 décembre à l'Aber/Crozon et 1 le 9 janvier à Kervel/Plonévez-Porzay.

Morbihan

- Novembre : 1 le 27 à la Trinité/mer
- Décembre : 2 le 30 à Belle-Ile, 1 le 31 au Fort Bloqué/Ploemeur.
- Janvier : 5-6 le 4 à Belle-Ile ; le 15, 63-66. en presque il de Quiberon et à Locmariaquer ; le 29, 15 à Belle-Ile et 1 en rade de Lorient.
- Février : 10 le 16 à Benance/Sarzeau.

Loire Atlantique

Du 3 au 6 décembre, 3 dans le port d'Oudon et la rivière Le Hâvre ; le 14 janvier : 3 au Croisic ; le 11 février 1 à la Turballe et enfin le 18 février 7 au Croisic.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) 20 données

Ille-et-Vilaine

34 dans la Rance maritime le 21 janvier.

Côtes-du-Nord

Anse d'Yffiniac : 25 le 16 novembre, 12 les 11 décembre et 26 février, 1 le 14 janvier et 2 le 14 mars.
Pointe du Bay/St Cast : 4 le 2 janvier
St Jacut de la Mer : 5 le 15 janvier
Port du Légué/St Brieuc : 7 le 26 février et 1 le 14 mars.

Finistère

Baie de Morlaix : 1 le 25 décembre et 4 le 23 janvier.
Estuaire de la Penzé : 20 le 22 janvier et 12 le 4 mars.
Rade de Brest : 120 minimum le 29 décembre dans l'anse du
Poulmic/Lanvéoc et 253 lors du recensement Biroe du
21 janvier.

Morbihan

Peu de données sur cette espèce et uniquement sur des plans
d'eau en retrait du littoral :
1 les 19 novembre et 4 décembre au Cranic/Brech
1 les 17 décembre à Lannec/Ploemeur

Loire Atlantique

Nantes : 1 le 16 décembre
Etang de la Provostière/Riaillé : 2 du 15 janvier au 28
janvier, 1 le 5 février
Traicts du Croisic : 19 le 14 janvier ; 20 le 28 janvier et
19 le 4 février

PETREL FULMAR (*Fulmarus glacialis*) 7 données

3 au Cap Fréhel (22) le 10 décembre. A Ploemeur (56) 1 cada-
vre le 24 décembre et un autre le 20 février. 5 cadavres entre
Etel et Penthièvre/St Pierre-Quiberon (56) les 17 janvier et
3 mars.

Sur les sites de nidification du Cap Sizun (29S), les oiseaux
sont notés en vol, fin février-début mars :

- 1 à la pointe du Raz/Plogoff le 28 février
- 3 minimum le 28 février et 8-10 minimum le 8 mars à
Castelmeur/Cléden Cap Sizun.

PUFFIN FULIGINEUX (*Puffinus griseus*) 1 donnée

8-10 au Guilvinec (29S) lors de la tempête du 26 janvier.

L'espèce n'avait jamais été notée en hiver dans notre région
(cf. collection AR VRAN) de 1967 à 1975. La donnée la plus tardive
à ce jour était celle du 19 novembre 1974 à la Pointe St Mathieu
(29N). Il est probable que les perturbations de la fin janvier ont
amené vers nos côtes des oiseaux attardés pouvant encore se trou-
ver dans le Golfe de Gascogne à cette époque.

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*) 4 données

12 dont 3 de la race des Baléares (*P.P. Mauretanicus*) le
10 décembre au Cap Fréhel (22) ; 1 en vol vers le sud est à Beg
er Goalenec/Quiberon (56), le 18 décembre ; 1 au Ris/Kerlaz (29S)
le 25 décembre ; 3 le 29 décembre dans l'anse du Poulmic/Lanvéoc
(29S).

Les dates de passage sont conformes à celles relevées dans le passé, il est par contre étonnant que les tempêtes de la fin janvier n'aient pas permis d'autres contacts.

FOU DE BASSAN (*Sula bassana*) 6 données

1 cadavre le 3 décembre au Collet/Bourgneuf (44)
1 en pêche à Douarnenez (29S) le 12 décembre
2 cadavres et 1 oiseau vivant, tous mazoutés, le 24 décembre entre Ploemeur et Larmor (56), 9 cadavres entre Etel et Penthievre /St Pierre Quiberon (56) les 15 janvier et 3 mars.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) 39 données

Ille-et-Vilaine

8 à Bazouges sous Hédé le 15 janvier.

Côtes-du-Nord

Retenons les données intérieures : 1 au Pont Noir/La Meaugon le 6 janvier ; 4 sur le barrage de l'Arguenon/Plédéliac le 15 janvier ; 1 sur l'étang du Corong/Glommel le 12 janvier ; 1 sur l'étang de Lamballe le 18 janvier et 2 sur l'étang des Salles/Perret le 14 mars.

Finistère

Estuaire de la Penzé : 25 à la mi-janvier
Rade de Brest : 141 le 21 janvier. A l'étang de Kerhuon, 55 le 25 février et 60 minimum le 4 mars ; sur ce site les oiseaux sont branchés sur des arbres situés en limite de terrain militaire.

Yeun Elez : 3 immatures le 29 décembre
Kerogan/Quimper : 47 le 18 février
Poulguidou/Plouhinec : 4 immatures le 3 janvier

Morbihan

Une centaine d'individus, au minimum, ont hiverné dans la rade de Lorient. Par ailleurs, un dénombrement a été effectué sur le dortoir de Méaban : 200-300 individus rentrent dans le Golfe du Morbihan le 18 février.

Loire Atlantique

L'hivernage a été bien suivi à l'Ile Perdue/Oudon : 227 le 28 novembre, 410 le 17 décembre, 214 le 11 janvier, 243 le 16 février et 85 le 14 mars.

Dans le dortoir de l'Ile Meslet/Le Fresne/Loire : 205 le 12 janvier et 185 le 14 mars.

Un dortoir de dimension plus modeste est situé sur l'étang de la Provostière/Riaillé : 38 le 28 janvier.

Les recensements de la mi-janvier donnent 40 individus dans l'estuaire de la Loire et 70 entre Mesquer et La Turballe.

CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*) 6 données

Le premier individu en plumage nuptial est observé le 31 décembre au Diben/Plougasnou (29N). Signalons également 18 en rade de Brest (29N), le 21 janvier ainsi que 2 à la Turballe (44) et 3 à la pointe du Castelli/Piriac le 28 janvier.

GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*) 6 données

Le nombre de données est très supérieur à ce qu'il était lors des hivers 1967-1974 (cf. collection AR VRAN).

Finistère

1 en vol le 30 décembre à Trenvel/Treogat.

Morbihan

1 du 27 décembre au 10 mars à La Rue des Roseaux/Larmor.

Loire-Atlantique

Le 10 décembre : 1 à Cordemais ; le 18 décembre ; 1 à Congor/Guérande ; le 9 janvier : 1 à St Philbert De Grandlieu.

Notons aussi que le chant est entendu à partir de décembre en Brière.

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) 37 données

L'hivernage de cette espèce se généralise en Bretagne.

Côtes-du-Nord

1 dans le Jaudy maritime en novembre ; 1 en baie de la Fresnaye en décembre et 1 en baie de Beaussais/St Jacut de la Mer les 22 janvier, 5 et 12 février et 11 mars.

Finistère Nord

2 oiseaux ont hiverné en rade de Brest et 4 minimum entre Goulven et Kernic/Plouescat.

1 migratrice en Penzé le 22 février.

Finistère Sud

L'estuaire de la rivière de Pont-l'Abbé a été bien suivi : 7 oiseaux les 20 novembre et 1er janvier, 11 le 8 février, 12 les 4 et 11 mars ; 1 à l'Aber/Crozon le 31 décembre.

Morbihan

A l'étang Saint Jean/Lochal-Mendon : 7 le 15 novembre et 1 le 3 janvier ; le 18 décembre, 15 et 21 janvier : 1 en baie de Plouharnel ; 1 au Ter/Ploemeur le 23 décembre ; 2 le 27 décembre à Kerispert/La Trinité-sur-Mer ; le 15 janvier, 25 à l'Ile Reno/Baden et 2 à Kerpenhir/Locmariaquer.

Loire Atlantique

Signalons simplement les 356 oiseaux en dortoir, le 26 décembre, au Bois de Penbron/La Turballe.

GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*) 2 données

Le sud de notre région a reçu, cette année encore, le passage de cette espèce :

- 1 le 1er décembre au Duer/Sarzeau (56)
- 1 du 9 au 11 décembre à l'étang du Pin (44)

La Grande Aigrette tend à devenir régulière dans le Morbihan et en Loire Atlantique. Cette tendance s'inscrit dans un phénomène ressenti au niveau national.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) 31 données

Nous ne retenons que les données concernant les groupes de plus de cinq oiseaux.

Côtes-du-Nord

16 le 1er janvier dans l'anse d'Yffiniac.

Finistère

Estuaire de la Penzé : 20 à la mi-janvier.

Pointe de Kérurus/Plounéour-Trez : 20 le 1er janvier.

Rade de Brest : 31 le 21 janvier.

Estuaire du Goyen/Pont-Croix : 12 dont 10 adultes le 12 février.

Rivière de Pont-l'Abbé : 120 les 19 novembre et 18 décembre, 30 le 31 décembre, 20 le 8 février et 70 le 11 mars.

Kerogan/Quimper : 5 le 18 février.

Morbihan

35-40 en rade de Lorient le 2 janvier, ce qui représente le maximum de la période en cette localité. Nous n'avons aucune précision sur les effectifs du Golfe du Morbihan.

Loire Atlantique

A l'étang de la Blisière/Juigné : 29 le 22 novembre et 22 le 15 décembre. A la Poitevinière/Riaillé, 20 le 18 décembre.

Les données reçues sont trop parcellaires pour que nous puissions mettre en évidence les effectifs hivernants de cette oiseau dans notre région. Les observations de la rivière de Pont-l'Abbé semblent indiquer un passage en novembre et un autre en mars.

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) 2 données

2 données tardives :

- 1 le 17 novembre à Poullan/Mer (29S), selon l'Ouest France de Quimper du 18 novembre.
- 1 posée sur une maison le 3 décembre à Borfloc'h/Le Palais (Belle-Ile -56).

IBIS FALCINELLE (*Flegadis falcinellus*) 1 donnée

Un le 1er mars dans la Rivière de Pont-l'Abbé (29S)
(Observateur P. CANEVET).

Il s'agit, à notre connaissance, de la 2ème observation bretonne. Il est impossible de déterminer l'origine de cet oiseau : échappé de captivité ou égaré au nord de sa zone d'hivernage dont le point le plus proche est l'embouchure du Guadalquivir en Espagne.

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) 12 données

C'est une espèce pour laquelle les données hivernales sont en augmentation.

Finistère

- 1 à l'étang de Kerhuon à la mi-novembre.
- 1 le 8 février dans l'estuaire de l'Elorn.

Morbihan

- 3 à St Jean/Locoal-Mendon du 10 décembre au 3 janvier (2 baguées).
- A Falguérec/Séné : 3 le 7 mars, 1 le 8 mars, 4 le 9 mars, 2 le 13 mars, 4 les 14 et 15 mars (1 baguée). Tous les oiseaux sont des adultes.

Loire Atlantique

- 12 le 4 mars aux Moutiers en Retz.

Tous les oiseaux bagués proviennent des Pays Bas. La remonte prénuptiale est sensible en mars à Falguérec et aux Moutiers.

CYGNE TUBERCULE (*Cygnus olor*) 6 données

Retenons les données d'individus manifestement en migration :

- 1 le 31 décembre dans l'anse d'Yffiniac (22).
- 2 du 7 au 25 janvier dans le Marais de Grée/Ancenis (44).

Il conviendrait que nos correspondants nous signalent systématiquement les oiseaux de passage ou en hivernage.

OIES SP (*Anser SP*) 4 données

Notée sans indication d'effectifs le 17 novembre à Oudon (44) et le 24 novembre à Basse Goulaine (44). Une autre donnée de passage post nuptial : 2 au Fort Bloqué/Ploemeur (56) le 27 novembre : il s'agit ici d'Oies des Moissons ou d'Oies Rieuses. Enfin, 1 au Marais de la Grée/Ancenis le 10 février.

OIES DES MOISSONS (*Anser fabalis*) 3 données

Une donnée du 29 novembre en Brière sans indication d'effectifs ; sinon 6 les 19 et 25 décembre à l'étang de la Blisière/Juigné.

OIE CENDREE (*Anser anser*) 12 données

Ile-et-Vilaine

9 le 21 janvier à Chatillon en Vendelais ; 10 le 4 mars à Marcille-Robert et 6 le 14 mars sur le Polder Bertrand/Baie du Mont-St-Michel.

Morbihan

1 les 6 et 9 mars au Cranic/Brech.

Loire Atlantique

18 à la mi-janvier dans l'estuaire de la Loire ; 15 le 13 février à St Philbert de Grandlieu ; 14 les 16 et 17 février, 35 le 10 mars dans les Marais de Grée/Ancenis ; 3 le 17 février à St Lumine de Coutais ; 19 le 4 mars dans les Marais de Coueron ; enfin, 70 en vol le 7 mars à St Mars La Jaille.

Nous n'avons pas d'indication précise sur l'hivernage en Baie du Mont-St-Michel, qui aurait été faible. De la même façon le site de la Basse Loire n'a accueilli que 18 oiseaux (40-50 en janvier 1982), la douceur de l'hiver étant responsable de cet état de fait.

La plupart des observations se réfère au passage pré-nuptial qui semble être marqué dans la première quinzaine de mars.

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*) 1 donnée

2 en baie de Plouharnel (56) le 18 décembre. L'espèce n'avait jamais été notée durant les hivers de la période 1967-1974 sur les côtes morbihanaises (cf. collection AR VRAN).

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*) 167 données

Cette espèce a été bien suivie grâce aux décomptes réguliers organisés pour le Bire. Nous donnons dans un tableau les effectifs de milieu de mois (sauf indication contraire) de chaque site suivi.

LOCALITES	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	OBSERVATIONS
- 35 - Baie du Mont Rance	590 50	820 135	2 710 186	2 900 100	2 945 30	
- 22 - Baie du St Jacut Yffiniac + Morieux Paimpol Trieux Jaudy	388 1 284	750 1 907 70 360 110	1 173 1 620 1 458 328 195	750 1500-1800 545 1 025 347	600 1 600 615 0 0	
- 29 N - Morlaix Penzé Goulven	256 600	340 760	380 900 250	350 850	400 920 393	
- 29 S - Douarnenez Pont l'Abbé Trévignon	30	5 450 5	550	300	104	(1) le 30 décembre
-56 - Lorient Etel Quiberon Morbihan (golfe) Vilaine (Baie) - 44 - Le Croisic Estuaire Loire Loire Fluviale Mesquer-la Turballe Bourgneuf	500 14 600 2 650 1 010 1 3 360	8 35 - 40 (2) 1 450 9 600 2 300 1 400 5 1 5 700	72 42 760 1 350 2 220 1 250 465 5 600	34 90 1 060 1 650 680 6 910	30 760 880 670 4 310	82 le 7 février (3)
TOTAL BRETAGNE (A)	25 300	26 200	21 500	19 200	14 300	
TOTAL FRANCE (B)	53 500	70 000	59 000	57 000	39 000	
A/B x 100 (%)	47 %	37 %	36 %	34 %	37 %	

- NOTES : (1) 5 en vol vers le nord le 31 décembre.
(2) en vol vers le sud est le 22 décembre. Au même endroit
3 le 1er janvier.
(3) 1 les 29 novembre et 4 décembre à St Julien de Concelles
en amont de Nantes.

Les effectifs globaux sont en retrait par rapport à ceux de l'an passé, la reproduction ayant été quasiment nulle en 1983 : 1,8 % de jeunes dans les troupeaux français. A titre d'exemple, nous relevons 3 statistiques bretonnes :

- 2,3 % de jeunes le 11 décembre à Yffiniac (n : 1907)
- 4 % " " le 12 " à Morlaix (n : 333)
- 2-3 % " " le 20 " à Penzé (n : 760)

Les différents sites n'ont pas des pics d'abondance concordants : le Golfe du Morbihan atteint son maximum en novembre, les autres sites morbihanais en novembre ou décembre, les Côtes-du-Nord, l'Ille-et-Vilaine et la Baie de Bourgneuf en janvier-février, le Nord Finistère en mars.

Il se confirme que le Golfe du Morbihan est un site d'accueil important pour les Bernaches en migration post-nuptiale : les oiseaux y arrivent beaucoup plus tôt que par le passé et épuisent rapidement le potentiel alimentaire, d'autant que l'herbier est en régression actuellement.

Il y a ensuite redistribution de l'effectif morbihanais vers d'autres secteurs (Bassin d'Arcachon - Charente Maritime - Bretagne nord), les mouvements observés fin décembre-début janvier sont probablement à inscrire dans ce schéma.

Les sites nord-finistériens connaissent leur pic en mars lors de la migration prénuptiale, les oiseaux ne stationnant que fort peu de temps.

Parallèlement à ces déplacements à grande échelle, se déroulent des mouvements à l'intérieur des sites : dans la Baie de Morlaix par exemple, le troupeau reste groupé sur l'herbier principal, à Locquenolé, jusqu'à Noël. Ensuite, il se scinde en plusieurs groupes disséminés sur l'herbier principal et les herbiers secondaires. En mars, Locquenolé est totalement abandonné au profit du centre de la Baie.

OIE D'EGYPTE (*Anas aegyptiaca*) 1 donnée

Du 25 décembre au 10 mars, 1 individu est observé régulièrement avec un couple de Tadornes dans l'estuaire de la Penzé.

Cet oiseau est présent depuis plusieurs années, après s'être échappé, semble-t-il, du zoo de Trégomeur (22).

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) 57 données

Ille-et-Vilaine

1920 en baie du Mont-St-Michel le 11 janvier et 258 dans l'estuaire de la Rance le 21 janvier.

Côtes-du-Nord

Anse d'Yffiniac : 87 le 16 novembre, 145 le 11 décembre, 172 le 18 janvier, 186 le 2 février et 114 le 14 mars.

Baie de la Fresnaye : 104 le 19 janvier.

Beaussais/St Jacut : 100 le 22 janvier.

Anse de Beauport/Paimpol : 29 le 15 janvier.

Finistère

Baie de Morlaix : 70 le 27 novembre, 88 le 12 décembre, 92 le 25 décembre, 123 le 2 janvier, 135 les 7 et 14 janvier, 151 le 28 janvier, 100 le 11 mars.

Estuaire de la Penzé : 105 à la mi-janvier.

Rade de Brest : à Landévennec, 85 le 4 décembre et en rivièrè de Faou, 180 le 14 janvier.

Rivière de Pont-l'Abbé : 130 le 20 novembre, 100 le 18 décembre, 140 le 3 février, 200 le 13 février et 100 les 4 et 11 mars.

Odet maritime : aucun le 3 décembre, 8 le 8 janvier et 85 le 26 février, dans l'anse de Kerogan/Quimper. A Toulven/Quimper : 4 oiseaux paraissent le 26 février.

Morbihan

Rade de Lorient : 10 le 29 janvier et 20 le 12 février.

Rivière d'Etel : 48 le 31 décembre, 70 le 17 janvier, 79 le 4 février et 100 le 18 février sur le site de l'Istrec/Locoal-Mendon.

2 le 18 février et 92 le 9 mars à l'étang de St Jean/Locoal-Mendon.

Golfe du Morbihan : 380 à la mi-novembre, 890 à la mi-décembre, 836 à la mi-janvier, 1020 à la mi-février en enfin 610 à la mi-mars.

Baie de Vilaine : 276 à la mi-novembre, 520 à la mi-décembre, 313 à la mi-janvier, 270 à la mi-février et 194 à la mi-mars.

Signalons également les 2 premiers individus à Falguérec/Séné le 7 mars.

Loire Atlantique

Quelques données intérieures :

- 4 au Grand Vioreau/Joué-sur-Erdre les 18 novembre et 9 décembre.

- 3 en vol au dessus de St Sébastien sur Loire le 25 décembre.

- 1 femelle le 5 février sur l'étang de la Provostière/Riaillé et 1 individu au Petit Vioreau/Joué-sur-Erdre le 19 février.

Sur le littoral :

- le 30 décembre, 600 à Penbron/La Turballe et 230 à Pont Mahé/Pénestin.
- A la mi-janvier, 2900 dans l'estuaire de la Loire et 670 dans les Traicts du Croisic.

Les effectifs de cette espèce ont considérablement augmenté depuis 1974. Que l'on juge plutôt : en janvier 1973, 1042 oiseaux étaient recensés pour la Bretagne, en janvier 1984 nous en trouvons 7708 ! Cela ne saurait surprendre les observateurs qui avaient constaté une forte expansion du nombre de couples nicheurs depuis quelques années.

Quelques sites ont été suivis régulièrement et permettent de s'apercevoir que les pics d'abondance sont tardifs (février dans la plupart des cas) à l'exception de celui de la Baie de Vilaine (décembre). Les premiers départs s'effectuent rapidement dès la fin de février et au début de mars alors que les couples se forment et que se déroulent des parades.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) 49 données

Ille-et-Vilaine

45 en Baie de Mont-St-Michel le 11 janvier ; 50 à la Chèze/St Thurial le 14 janvier ; 10 au Pertre le 18 janvier, 17 à l'étang de Chatillon en Vendelais le 21 janvier.

Côtes-du-Nord

Toutes les données proviennent de l'anse d'Yffiniac : 277 le 16 novembre, 150 le 12 janvier, 184 le 2 février et 131 le 15 mars.

Finistère

Penzé : 76 le 15 janvier, 99 le 29 janvier, 70 le 4 mars.
Goulven : 600 le 22 janvier.
La Rade de Brest a donné lieu à des recensements réguliers :
- 800 le 19 novembre et 700 le 24 février en rivière de Daoulas.
- 700-800 le 2 janvier et 800-900 le 14 janvier en rivière du Faou.
- 1500-1800 le 24 décembre et 1263 le 21 janvier sur la totalité de la zone.

Quelques oiseaux ont été notés sur les plans d'eaux des Monts d'Arrée : 4 le 4 décembre au Drennec/Sizun et 1-5 dans le Yeun Elez le 29 décembre.
Rivière de Pont l'Abbé : 500 les 19 novembre et 18 décembre, 600 le 31 décembre, 440 le 5 février, 450 le 13 février, 100 le 4 mars et 40 le 11 mars.

Morbihan

Fort Bloqué/Ploemeur : 7 le 2 décembre.

St Jean/Locoal-Mendon : 392 le 19 novembre, 400 le 4 décembre, 530 le 10 décembre, 420 le 17 décembre, 500-600 le 30 décembre, 430 le 15 janvier, 242 le 18 février et 88 le 9 mars.

Golfe du Morbihan : 3900 à la mi-novembre, 1020 à la mi-décembre, 710 à la mi-janvier, 280 à la mi-février et 200 à la mi-mars.

Baie de Vilaine : 170 à la mi-novembre, 18 à la mi-janvier et 3 à la mi-février.

Les effectifs globaux du Canard Siffleur sont devenus squelettiques en Bretagne : au début des années 1970, ils s'établissaient à 25 000-40 000 individus suivant les conditions climatiques alors que cette année le total hors Baie de Mont-St-Michel n'excède pas 4500 individus !

Cette évolution est due essentiellement à l'effondrement de populations morbihanaises qui constituaient le plus grand site français, le golfe attirant à l'époque jusqu'à 40 000 individus.

Les populations de Canards Siffleurs se sont redistribuées ces dernières années, le Morbihan étant abandonné au profit de secteurs aux potentiels alimentaires plus intéressants (Baie de l'Aiguillon, Arcachon, etc...).

En Bretagne, même l'évolution des sites est contrastée : baisse (Morlaix), maintien (Pont-l'Abbé, Brest) ou augmentation (Yffiniac, Goulven).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) 16 données

Côtes-du-Nord

Un seul site, l'Anse d'Yffiniac, pour ce département :

7 le 16 novembre, 35 le 15 janvier et 30 le 11 février.

Finistère

3 le 22 janvier en rivière de Daoulas, 1 ♂ le 8 février à l'étang de Kerhuon et 10 ♂ le 3 mars à Ty Colo/St Renan.

Morbihan

9 (5 ♂ + 4 ♀) le 18 novembre à Lannénec/Ploemeur. Dans le Golfe du Morbihan : 44 à la mi-novembre, 38 à la mi-décembre, 76 à la mi-janvier, 15 à la mi-février, 4 enfin à la mi-mars.

En Baie de Vilaine : 6 à la mi-février et 4 à la mi-mars.

Loire Atlantique

4 les 4 décembre et 25 février en Plaine de Mazerolle/Sucé-sur-Erdre. 4 (♂ + ♀) dans le Marais de Grée/Ancenis le 17 décembre. 18 à la mi-janvier sur la Basse-Loire à Massereau/Frossay.

Le Chipeau est devenu un hivernant régulier en Bretagne avec des effectifs certes réduits, mais sans commune mesure avec ceux d'il y a une quinzaine d'années. Cette modification de statut s'est opérée dans le cadre de la forte croissance des effec-

tifs hivernant en France depuis quelques années.

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) 49 données

Ille-et-Vilaine

30 le 21 janvier à l'étang de Chatillon en Vendelais.

Côtes-du-Nord

A St Jacut de la Mer, 7 le 15 janvier.

Dans l'anse d'Yffiniac : 116 le 16 novembre, 600 le 31 décembre, 400 les 14 janvier et 15 février et 21 le 14 mars.

Sur l'étang de Lamballe : 20 le 25 février, 37 le 5 mars.

Finistère

En baie de Morlaix : 7 de passage le 19 novembre sur l'étang du Band/Henvic et 83 dans les îlots de la réserve à la mi-janvier.

100 minimum à Goulven le 22 janvier.

En rade de Brest, on peut noter 1152 au recensement complet du 22 janvier. Par ailleurs, 250 en rivière de Daoulas le 24 décembre.

Des plans d'eau intérieurs, 2 observations nous sont parvenues : 12 à l'étang du Drennec/Sizun le 21 décembre et 20 au Yeun Elez le 29 décembre.

Rivière de Pont-l'Abbé : 350 le 20 novembre, 300 le 18 décembre, 250 le 5 février et 300 le 13 février.

Morbihan

20-30 le 11 décembre au Perello/Ploemeur.

Pour le golfe : 1350 à la mi-novembre, 2300 à la mi-décembre, 2600 à la mi-janvier, 1600 à la mi-février et 340 à la mi-mars.

Dans l'estuaire de la Vilaine : 220 à la mi-décembre, 120 à la mi-janvier, 180 à la mi-février, 120 à la mi-mars.

Sur l'étang de St Jean/Locoal Mendon : 150 le 19 novembre, 315 le 4 décembre, 290 le 10 décembre, 150 le 17 novembre et 30 le 3 janvier.

En rivière d'Auray : 8 le 18 janvier.

Loire Atlantique

Retenons surtout les 11 000 de l'estuaire de la Basse Loire le 4 janvier sur les 14 000 que le département doit compter.

Ailleurs : 40 sur la Loire à Thouaré le 21 décembre, 130 sur l'étang de la Blisière/Juigné le 3 janvier et 160 en Plaine de Mazerolle/Sucé sur Erdre le 2 février. Nous n'avons aucune indication sur la Brière et Grandlieu.

Deux commentaires différents peuvent être faits sur les effectifs hivernant dans notre région, d'une part, ils sont beaucoup plus élevés qu'il y a 10 ans : au moins 20 000 au lieu de 10 000 oiseaux les meilleures années, de nouvelles localités étant

apparues (Yffiniac et Pont-l'Abbé) ; d'autre part, la tendance à court terme est plutôt à la baisse.

Les retours doivent s'effectuer dès février, si bien qu'au mois de mars les sites sont en grande partie désertés.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) 73 données

Ille-et-Vilaine

En baie du Mont-St-Michel, 2310 le 11 janvier.

700 à la Tourneraie/Goven le 11 décembre.

Le 14 janvier, 145 à la Chèze/St Thuriel et 164 à l'étang de Carcraon/Domalain.

Le 15 janvier, 210 à Bazouges-sous-Hédé et enfin 110 le 21 janvier à Chatillon-en-Vendelais.

Côtes-du-Nord

A St Jacut de la Mer : 300 le 15 janvier.

Dans l'anse d'Yffiniac : 300 le 31 décembre, 284 le 14 janvier, 253 le 2 février et 50 le 15 mars.

Sur l'étang de Lamballe : 148 le 14 janvier et 12 le 5 mars.

A l'étang de La Hardouinais/Merdrignac : 130 le 18 janvier.

Finistère

En baie de Morlaix : 700 à la mi-janvier.

A Goulven, 1000-1500 le 27 décembre.

Sur l'étang de Kerhuon, 500-600 le 8 février.

Pour la rade de Brest : 482 lors du recensement complet du 22 janvier et 300 en baie de Poulmic/Lanvéoc le 29 décembre.

A l'intérieur, 205 le 4 décembre et 600 le 26 décembre à l'étang du Drennec/Sizun ; 300 le 29 décembre dans le Yeun Elez.

Morbihan

Une donnée à Belle-Ile concernant 40 individus à Bruté/Le Palais le 18 novembre.

A Fort Bloqué/Ploémur : 200 le 28 janvier.

A St Jean/Lochal Mendon : 480 le 19 novembre, 375 le 4 décembre, 420 le 10 décembre, 50 le 17 décembre, 398 le 3 janvier, 250 le 14 janvier, 237 le 18 février et 203 le 9 mars.

Dans le golfe : 2200 à la mi-novembre, 3300 à la mi-décembre 2700 à la mi-janvier, 1930 à la mi-février et 140 à la mi-mars.

En Vilaine : 460 à la mi-novembre, 550 à la mi-décembre, 640 à la mi-janvier, 214 à la mi-février, 151 à la mi-mars.

Loire Atlantique

L'estuaire de la Loire compte 3700 oiseaux à la mi-janvier.

Pour la plupart des sites, le pic d'abondance se situe entre la mi-décembre et la mi-janvier. Compte tenu du faible nombre de données, il n'est guère possible de tirer des conclusions intéressantes. Signalons simplement la forte

croissance des effectifs hivernant depuis 10 ans sur un certain nombre de sites : le Finistère avec Brest, Morlaix, Kerhuon et Goulven, étant le meilleur exemple.

CANARD PILET (*Anas acuta*) 37 données

Ille-et-Vilaine

Une seule donnée provient de la baie du Mont-St-Michel :
27 le 11 janvier.

Côtes-du-Nord

Toutes les données d'hivernage nous parviennent de l'anse d'Yffiniac : 377 le 16 novembre, 569 le 14 janvier, 608 le 2 février, moins de 200 le 4 mars.
2 individus de passage le 10 mars à l'étang de Lamballe.

Finistère

En rade de Brest : 15 le 4 décembre, 29 le 2 janvier et 50 le 14 janvier. Toutes les observations ont été faites entre Landévennec et la rivière du Faou.
5 individus au Yeun Elez le 1er janvier.
Dans la rivière de Pont-l'Abbé : 20 les 18 et 31 décembre, 30 le 13 février et 25 le 11 mars.

Morbihan

A St Jean/Locoal Mendon, 3 ♂ et 2 ♀ le 10 décembre, 3 le 15 janvier et 2 ♂ et 3 ♀ le 9 mars.
Dans le golfe : 1010 à la mi-novembre, 930 à la mi-décembre, 970 à la mi-janvier, 510 à la mi-février et 240 à la mi-mars.
En baie de Vilaine : 90 à la mi-novembre, 570 à la mi-décembre, 240 à la mi-janvier et 130 à la mi-février.

Loire Atlantique

A la mi-janvier, 100 dans la Basse Loire et 65 au Croisic.
100 à Pen Bron/La Turballe le 31 janvier.
70 le 17 février dans le Marais de Grée/Ancenis.

Le pilet a vu ses effectifs se réduire fortement en Bretagne sud depuis 1974 alors que l'espèce est en expansion en France. L'explication de cette situation paradoxale est due au fait que la Baie de l'Aiguillon concentre des effectifs de plus en plus importants, jusqu'à abriter plus de la moitié de la population de pilet dans notre pays.

Remarquons enfin, que le pic d'abondance du Golfe intervient dès la mi-novembre comme c'est le cas pour la Bernache Cravant et le Canard Siffleur.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*) 2 données

Les premiers retours sont notés à des dates habituelles :
- 1 ♂ et 1 ♀ le 10 mars à Kerguelen/Larmor (56).
- 3 ♂ le 14 mars dans les marais de Sougeal (35).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) 35 données

Ille-et-Vilaine

19 ♂ et 10 ♀ à Carcraon/Domalain le 14 janvier ; 2 le 15 janvier à Bazouges-sous-Hédé ; 8 ♂ et 4 ♀ le 18 janvier à Paintourteau / Erbrée, 8 ♂ et 3 ♀ le 21 janvier à Chatillon en Vendelais ; 1 ♀ le 22 janvier dans la ZAC de Longchamp/Rennes.

Côtes-du-Nord

12 le 16 novembre et 1 le 20 février dans l'anse d'Yffiniac.
A l'étang du Moulin Neuf/Plounérin, 1 le 26 décembre.

Finistère

1 ♂ le 12 décembre en baie de Morlaix ; 1 ♀ le 29 décembre en rade de Brest ; 8 le 10 mars en baie de Douarnenez.

Morbihan

1 ♂ et 1 ♀ à Lannénec/Ploëmeur le 19 novembre.
Dans le golfe : 550 à la mi-novembre, 610 à la mi-décembre, 770 à la mi-janvier, 380 à la mi-février, 160 à la mi-mars.
Baie de Vilaine : 30 à la mi-novembre, 90 à la mi-décembre, 77 à la mi-janvier, 55 à la mi-février.
Au Cranic/Brech : 9 dont 3 ♂ le 19 novembre, 18 le 17 décembre, 8 le 3 janvier, 1 le 14 janvier, 27 dont 17 ♂ le 18 janvier et 67 dont 40 ♂ le 9 mars.
A St Jean/Locoal Mendon : 10-15 le 17 décembre et 3 le 14 janvier.

Loire Atlantique

Retenons surtout les chiffres de l'estuaire de la Loire 2200 le 4 janvier et 3800 à la mi-janvier.
Par ailleurs : 27 le 17 novembre au Petit Vioreau/Joué-sur-Erdre ; 50 le 20 décembre dans le Marais de Grée à Ahcenis (20 le 21 janvier) ; 20 le 30 décembre à Pen Bron/La Turballe.

Le Souchet est une des espèces dont le statut s'est le plus modifié en Bretagne depuis les hivers 1967-1974. A l'époque l'hivernage était quasi-nul, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette évolution est à mettre en parallèle avec la forte croissance des effectifs hivernant de ce canard en France.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) 56 données

Nous ne retenons que les données concernant au minimum 10 individus ensemble au même moment dans un lieu donné.

Ille-et-Vilaine :

Le 11 décembre : 45 à la Tourneraie/Goven, 12 à Bélouze/Baudon et 50 à la Musse/Baudon.

Le 15 janvier : 120 à Bazouges-sous-Hédé et 110 à Combourg.

Le 18 janvier : 23 ♂ et 28 ♀ à Paintourteau/Erbrée.

Le 21 janvier : 100 (60 ♂ et 40 ♀) à Chatillon-en-Vendelais, 120 à Paintourteau.

Le 22 janvier : 26 à la ZAC de Longchamp/Rennes.

Côtes-du-Nord

20 le 11 décembre à Taden ; 18 le 12 janvier à l'étang du Corong/Glomel ; 31 le 14 janvier à l'étang de Lamballe ; 17 le 17 janvier à l'étang de la Martyre/St Gilles du Vieux Marché et enfin 21 le 18 janvier à l'étang de la Hardouinais/Merdrignac.

Finistère

Rade de Brest : 49 le 29 janvier.

Etang de Kerhuon : 170 les 8 et 25 février ; 200 le 4 mars.

Etang du Drennec/Sizun : 90 le 4 décembre.

Yeun Elez : 50 le 29 décembre.

Kérogan/Quimper : 250 le 3 décembre, 70 le 8 janvier et aucun le 18 février.

Morbihan

A l'étang au Duc/Vannes : 1400 le 20 novembre, 1450 le 10 décembre, 1005 le 14 janvier, 41 le 14 février, 17 le 10 mars.

Sur des deux étangs de Cranic et de St Jean : 557 le 19 novembre ; 535 le 17 décembre, 411 le 3 janvier, 217 le 14 janvier, 900 le 15 janvier, 291 le 18 février, 202 le 9 mars.

A St Sterlin/Kervignac : 10-20 le 20 décembre.

A Lannec/Ploémec : 27 le 10 décembre.

Baie de la Vilaine : 2 à la mi-décembre, 150 à la mi-février, 40 à la mi-mars.

A Branguily/Gueltas : 15 le 26 décembre.

Loire Atlantique

4000 à Grandlieu à la mi-janvier.

80 le 4 décembre sur la Loire à Cordemais, 47 le 21 janvier dans le Marais de Grée/Ancenis, 100 à l'étang de la Provostière/Riaillé le 28 janvier.

La mobilité de cette espèce et l'insuffisance de données constituent un obstacle sérieux à un commentaire approfondi des observations dont nous disposons.

Remarquons simplement que les effectifs n'ont pas battu les records établis dans le passé, ce qui ne constitue pas une surprise à l'issue d'un hiver aussi doux.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) 50 données

Ille-et-Vilaine

La Tourneraie/Goven : 4 le 11 décembre.
Bazouges-sous-Hédé : 2 le 15 janvier.
Le Bézardière/Hédé : 2 le 15 janvier.
Combours : 26 le 15 janvier.
La Valière/Vitré : 1 le 18 janvier et 1 ♂ et 2 ♀ le 21 janvier.
Paintourteau/Erbrée : 39 (11 ♂ et 18 ♀) le 18 janvier et 30 le 21 février.
Etang de Chatillon en Vendelais : 2 ♂ le 21 janvier.
ZAC de Longchamp/Rennes : 3 le 22 janvier.

Côtes-du-Nord

Aux Ponts Neufs/Hillion : 4 le 3 décembre et 1 le 14 mars.
A l'étang de Trévé : 3 le 19 décembre et 1 le 15 janvier.
A l'étang de la Hardouinais/Merdriagnac : 6 le 13 janvier.
A l'étang de Lamballe : 2 le 14 janvier, 4 le 21 janvier et 1 le 5 mars.
A l'étang de Gourveaux/St Gilles du Vieux Marché : 30 le 11 février.

Finistère

A l'étang de Kerhuon : 60 le 8 février et le 4 mars.
En rade de Brest : 17 le 22 janvier.
Dans le Yeun Elez : 50 le 29 décembre et 35 le 11 février.
Au Drennec/Sizun : 10 le 4 décembre.
A Lespoul/Pont Croix : 2 ♀ le 3 janvier.
A Kerogan/Quimper : 30 le 3 décembre, 120 le 8 janvier et 32 le 18 janvier.

Morbihan

Dans la région lorientaise : 1 le 18 novembre à Lannec/Ploemeur et 19-20 le 28 décembre au Ter/Lorient.
A l'étang au Duc/Vannes qui sert de remise diurne aux Morillons et aux Milouins du golfe du Morbihan : 28 le 20 novembre, 51 le 19 décembre, 64 le 14 janvier, 84 le 14 février, 47 le 10 mars.
En baie de Vilaine : 75 à la mi-janvier et 8 à la mi-février.
Sur le complexe Cranic-St Jean : 20-30 du 15 novembre au 10 décembre, 11 le 17 décembre, 15 le 22 décembre, 31 le 3 janvier, 44 le 14 janvier, 31 le 18 février et 20 le 9 mars.

Loire Atlantique

800 individus à Grandlieu à la mi-janvier.
Par ailleurs : 60 à l'étang du Pin le 10 décembre, 10 au Marais de Grée/Ancenis le 23 décembre et 1 à l'étang d'Aumée/St Nicolas de Redon le 15 janvier.

Le commentaire du Milouin peut être repris mot pour mot.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*) 22 données

Finistère

Du 16 novembre au 5 février, 2 ♀ dans l'estuaire de la Penzé et dans les bassins de la station d'épuration de Carantec.

1 immature en rade de Brest le 11 décembre.

1 ♀ en Baie de Morlaix le 12 décembre.

2 (♂ et ♀) les 25 février et 4 mars sur l'étang de Kerhuon.

Dans le Sud-Finistère, 1 ♀ à Trévignon/Trégunc le 15 décembre.

Morbihan

Cranic/Brech : 3 dont 2 ♀ le 4 décembre, 2 ♀ le 10 décembre, 1 ♀ le 14 janvier.

St Jean/Locoal Mendon : 1 ♀ du 4 au 31 décembre.

A Beg er Goalennec/Quiberon : 2 (1 ♂ et 1 ♀) en vol vers le Sud-Est le 18 décembre.

A Penthièvre/St Pierre Quiberon : 10 le 15 janvier.

A l'étang au Duc/Vannes : 1 ♀ le 18 décembre.

En Baie de Vilaine : 360 à la mi-novembre, 850 à la mi-décembre, 1320 à la mi-janvier, 780 à la mi-février et 500 à la mi-mars.

Loire Atlantique

Les effectifs de la baie de Bourgneuf sont estimés à 500 individus.

Par ailleurs : 1 ♀ à la pointe de Merquel/Mesquer le 4 décembre, 3 dans l'estuaire de la Loire le 4 janvier et 2 (1 ♂ et 1 ♀) le 14 janvier dans le petit Traict du Croisic.

Les deux grands sites bretons restent la Baie de Vilaine et la Baie de Bourgneuf. En ce qui concerne la Vilaine les effectifs ont été comparables à ceux des hivers 1967-1974.

EIDER A DUVET (*Somateria mollissima*) 58 données

Côtes-du-Nord

Le 2 décembre, 7 au Verdelet/Pléneuf, le 10 décembre, 43 dans l'anse d'Yffiniac, le 15 janvier, 9 à St Jacut de la Mer et 40 au même endroit le 4 mars, le 12 février, 33 à la Pointe Longue Roche/Morieux et le 4 mars, 7 à la pointe de Binic.

Finistère

Baie de Morlaix : 1 le 11 décembre, 9 le 12 décembre, 14 dont 1 ♂ le 25 décembre et 31 dont 2 ♂ le 31 décembre. Aucun par la suite.

Estuaire de la Penzé : 34 le 4 décembre et 7 le 20 janvier. Pointe de Kérurus/Plounéour-Trez, 5 le 2 décembre ; 7 le 1er janvier.

Goulet/Brest : 10 dont 1 ♂ rentrent en rade le 17 novembre, 14 le 6 décembre, aucun le 21 janvier.

Kerloch/Camaret : 1 ♂ immature le 4 février.

Aber/Crozon : 2 le 4 décembre.

Baie de Douarnenez : 75 individus ont hiverné en deux groupes sur le littoral est du site : 50 individus à Kervel/Plonévez-Porzay et 25 à Pentrez/St Nic. La première observation est du 20 novembre : 40 dont 1 ♂ adulte à Kervel, la dernière du 28 février avec 73 oiseaux sur les deux secteurs.

Une troupe de 70 est notée le 29 janvier à Kervel. Signalements également 18 ♂ sur 46 oiseaux le 15 février à Kervel, beaucoup d'individus ayant mué en cours d'hivernage.

Trévignon/Trégunc : 2 ♀ le 15 décembre.

Raguenès/Névez : 4 (1 ♂ immature et 3 ♀) le 30 décembre.

Morbihan

Guidel : 1 le 11 décembre.

Ploemeur : 2 le 19 novembre, 1 ♀ le 2 décembre.

Larmor : 2 (1 ♂ et 1 ♀) le 21 novembre, 4 dont 1 ♂ le 4 décembre.

Plouhinec : 4 ♀ le 26 février.

A Beg er Goalennec/Quiberon : 2 ♀ le 17 novembre.

Penthièvre/St Pierre Quiberon : 1 ♀ le 11 décembre,

9 ♀ le 18 décembre, 10 dont 2 ♂ le 27 décembre.

Baie de Quiberon : 35 à la mi-janvier.

Erdeven : 32 le 24 décembre, 130 en janvier, 30 le 6 février et 10-15 le 3 mars.

Belle-Ile : 1 ♂ immature à Herlin/Bangor le 28 décembre et

1 ♂ immature le 4 janvier aux Grands Sables/Locmaria.

Baie de Vilaine : 27 à la mi-décembre, 14 à la mi-janvier.

Loire Atlantique

A la pointe de Merquel/Mesquer : 15 le 4 décembre et 4 le 18 décembre.

A la jetée du Tréhic/Le Croisic : 1 le 14 décembre et 1 ♂ immature le 15 janvier.

Pen Bron/La Turballe : 4 dont 1 ♂ le 17 décembre.

Plage de la Turballe : 1 ♂ immature le 17 décembre.

Entre La Turballe et Mesquer : 79 à la mi-janvier.

L'Eider est maintenant devenu un hivernant beaucoup plus commun que par le passé, il est réparti par tout le long de nos côtes avec quelques concentrations dont la sédentarité est remarquable (Douarnenez, par exemple).

Le passage se fait sentir jusqu'en décembre, de nombreux sites faisant l'objet d'observations sans suite, alors qu'en mars la remontée est bien amorcée.

HARELDE DE MIQUELON (*Clangula hyemalis*) 11 données

A Trezmalaouen/Kerlaz (29S), 6 individus ont été notés du 28 janvier au 10 mars à l'endroit exact où avaient hiverné 7 Hareldes lors de l'hiver précédent.

Sur la côte Morbihanaise, 2 le 18 décembre à Portivy/St Pierre Quiberon.

Dans le golfe du Morbihan : 2 ♀ le 4 décembre à Pen Cadenic/Le Tour du Parc, 1 à Banastère/Sarzeau les 24 et 25 décembre ainsi que le 8 janvier.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) 24 données

Ille-et-Vilaine

3 dont 1 mâle dans l'estuaire de la Rance le 21 janvier.

Côtes-du-Nord

Pointe du Bay/St Cast : 150 le 2 janvier.

Pont Rouault/Planguénoual : 50 le 12 février.

Baie de St Jacut de la Mer : 200 le 15 janvier et 10 le 4 mars.

Finistère

Rade de Brest : 2 ♀ dans le goulet le 16 novembre et 20 le 21 janvier.

Baie de Douarnenez : 400-450 le 20 novembre, 700-800 le 29 décembre, 700 le 19 janvier, 500 le 27 février.

Morbihan

Ploemeur : 1 ♀ le 27 novembre, 50 le 17 décembre, 1 ♀ morte mazoutée le 24 janvier, 6 ♂ le 26 février.

Penthièvre/St Pierre Quiberon : 300-500 le 8 janvier et 200-300 le 10 mars.

Loire Atlantique

Pointe de Merquel/Mesquer : 10 dont 5 ♂ et 5 ♀ le 4 décembre.

Plage de la Turballe : 200 minimum le 17 décembre.

Préfailles-sur-Mer : 150 minimum le 11 février.

De nombreux sites manquent, ce qui rend aléatoire toute interprétation en dehors du fait que la Baie de Douarnenez, bien suivie, ne retrouve pas ses effectifs du début des années 70.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*) 10 données

Ille-et-Vilaine

4 ♂ le 21 janvier dans l'estuaire de la Rance.

Finistère

1 en baie de Morlaix le 12 février.

En baie de Douarnenez, 2 minimum le 20 novembre, 5 le 30 novembre, 7 le 29 décembre puis 5-7 le 27 février.

Morbihan

1 le 21 janvier à Penthièvre/St Pierre Quiberon et 1 le 27 janvier à Kerhillio/Erdeven.

Loire Atlantique

6 le 17 décembre sur la plage de la Turballe et 4 le 31 décembre à la jetée du Tréhic/Le Croisic.

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*) 38 données

Ille-et-Vilaine

1 le 18 janvier à Paintourteau/Erbrée.
22 dont 6 ♂ le 21 janvier dans la Rance Maritime.

Côtes-du-Nord

1 ♀ du 11 décembre au 15 janvier dans l'anse d'Yffiniac.
Une donnée intérieure : 1 le 19 janvier sur l'étang de Bétineux/Evran.

Finistère

Baie de Morlaix : 1 ♀ est observée le 12 décembre ; elle n'est pas revue par la suite.
Estuaire de la Penzé : 1 le 11 décembre, 8 dont 2 ♂ adultes du 25 décembre au 4 mars, 2 le 10 mars.
Etang de Kerhuon : 1 ♀ le 8 février et 2 ♀ le 25 février.
Rade de Brest : 9 le 21 janvier.
Yeun Elez : 4 le 29 décembre et 1 le 11 février.
Etang du Drennec/Sizun : 1 ♀ le 26 février.
Trenvel/Tréogat : 1 ♀ le 4 décembre.
Rivière de Pont-l'Abbé : 2 les 1er janvier et 13 février.

Morbihan

Fort Bloqué/Ploemeur : 3 ♀ le 24 novembre, 1 ♀ le 3 décembre, 2 ♀ le 18 décembre.
Cranic/Bréch : 1 ♀ le 19 novembre.
L'Istrec/Locoal Mendon : 14 dont 2 ♂ le 4 décembre.
St Jean/Locoal Mendon : 1 ♀ le 22 décembre.
Le Guilvin/Locmariaquer : 3 ♀ le 15 janvier.
Bassin oriental du golfe du Morbihan : 30 à la mi-décembre, 190 à la mi-janvier, 300 à la mi-février, 230 à la mi-mars. Pour la totalité du golfe : 340 à la mi-janvier.
Baie de Vilaine : 3 à la mi-janvier.

Loire Atlantique

1 ♀ ou immature, le 3 et 21 décembre sur la Loire à Ste Luce ; 1 ♀ à la jetée du Tréhic/Le Croisic, le 31 décembre ; 1 ♂ dans la plaine de Mazeroles/Sucé/Erdre le 21 janvier. Dans le Marais de Grée à Ancenis : 1 ♀ les 28 janvier et 5 février. Dans la Petit Traict du Croisic : 1 ♀ le 4 février.

Seul le site du golfe du Morbihan retient une population notable dans notre région. Il est à remarquer que le pic d'abondance est tardif (en février), alors qu'à la mi-décembre, peu d'oiseaux sont installés. Les effectifs hivernant de cette espèce sont faibles par rapport à ceux de la période de référence : 1967-1974 (plus de 50 % de diminution sur le golfe du Morbihan).

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*) 1 donnée

1 q du 13 au 17 décembre à Noyal (56) dans le golfe du Morbihan.

Les données sur cette espèce qui hiverne sur les plans d'eau continentaux restent très faibles, à fortiori lors d'un hiver doux.

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*) 26 données

Ille-et-Vilaine

21 dans l'estuaire de la Rance le 21 janvier.

Côtes-du-Nord

5 à St Jacut de la Mer le 15 janvier.

Finistère

Baie de Morlaix : 4 le 11 décembre, puis 2 (1 ♂ et 1 ♀) du 25 décembre au 28 janvier.

Estuaire de la Penzé : 80 de passage le 20 novembre, 30 à la mi-janvier.

Rade de Brest : 300-350 le 19 novembre, 600 le 3 décembre et 596 le 21 janvier.

Baie de Douarnenez : 2 ♀ le 20 novembre, 3 dont 1 ♂ le 2 décembre.

Rivière de Pont-l'Abbé : 30 le 10 novembre, 10 les 1er janvier et 13 février.

Morbihan

Bassin oriental du golfe : 30 à la mi-novembre, 140 à la mi-décembre, 310 à la mi-janvier, 330 aux mi-février et mars.

Par ailleurs, 2 au Fort Bloqué/Ploemeur, le 20 novembre.

Loire Atlantique

Traicts du Croisic : 11 dont 2 ♂ le 30 décembre, 4 dont 2 ♂ le 31 décembre.

Jetée du Tréhic/Le Croisic : 12 le 28 janvier.

Port de Piriac : 12 le 28 janvier.

Pointe de Merquel/Mesquer : 3 dont 1 ♂ le 4 février.

Côte sauvage/Le Croisic : 4 le 4 février.

Les effectifs sont assez faibles pour les quelques sites qui ont été suivis cet hiver : lors des années 1967 et 1974, la rade de Brest pouvait atteindre 1000 individus et le golfe du Morbihan 500.

HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*) 10 données

Ille-et-Vilaine

1 à Carcraon/Domalain le 14 janvier.

Finistère

1 ♂ en rivière de Pont-l'Abbé le 20 novembre.

1 dans le Yeun Elez les 11 et 13 février.

1 à Kernic/Plouescat le 4 mars.

Loire Atlantique

1 le 19 novembre à l'étang du Pin.

1 le 16 décembre dans l'estuaire de la Loire.

3 le 24 décembre sur le Petit Vioreau/Joué-sur-Erdre.

Jusqu'à 3, du 3 au 20 janvier à l'étang de la Blisière/Juigné.

Enfin 1, le 7 janvier, au Grand Vioreau/Joué-sur-Erdre.

La plupart des oiseaux sont signalés en plumage de femelles, ce qui correspond, sans doute, à des individus en plumage de premier hiver.

Le nombre d'observations est élevé pour un hiver doux si l'on se réfère à la collection AR VRAN (1967-74). Par ailleurs, l'espèce a été vue dans des secteurs maritimes qu'elle ne fréquente guère habituellement.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE (*Haliaetus albicilla*) 2 données

1 immature le 18 novembre à Loqueltas/Sauzon (Belle-Ile) (56). L'oiseau reste trois semaines, se nourrissant de lapins myxomateux.

1 immature le 4 janvier au parc animalier de Brière/St Malo-de-Guersac (44). (présence notée jusqu'au 8 mars).

Il peut s'agir du même individu, les deux points d'observation sont distants de 70 km. L'hivernage en France n'est régulier que dans l'Est, Lorraine et Champagne (Der et Forêt d'Orient). Ailleurs, l'oiseau est rare et irrégulier. Il n'avait pas été signalé en la Loire Atlantique depuis 1967.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) 36 données

Ille-et-Vilaine

4 à Gannedel/LaChapelle le 29 décembre et 1 le 19 février en Baie du Mont-St-Michel.

Finistère Nord

1 le 27 décembre à Kernic/Plouescat et 1 le 22 janvier à Goulven.

Finistère Sud

L'hivernage en Baie d'Audierne a concerné 35 individus.
En Presqu'île de Crozon : à l'Aber/Crozon, 1 le 4 décembre et 10 le 31 décembre; à Kerloch/Crozon : 3-4 le 10 décembre.

Dans le Yeun Elez : 1 ♀ le 29 décembre.

Morbihan

Lannénec/Ploemeur : 5 le 19 novembre, puis 1-3 par la suite jusqu'au 18 février.

La Rue des Roseaux/Larmor : 1 le 8 décembre et 2 le 27 décembre.

Cranic/Brech : 1-2 pendant toute la période.

St Jean/Locoal-Mendon : 3 les 4 et 10 décembre, 8 le 17 décembre, 5-6 le 22 décembre, 2 ♂ paradent le 9 mars.

Kerhillo/Erdeven : 1 ♀ ou immature le 7 janvier.

Golfe du Morbihan : 4 en divers points le 18 décembre.

Belle-Ile : 3 au moins ont hiverné.

Loire Atlantique

23 à Machécoul les 3 et 4 décembre.

3 le 29 décembre à Murin/Assérac.

La moitié des données concernent décembre, ce qui laisse supposer un mouvement à cette époque. Il n'y a aucune observation dans les Côtes-du-Nord.

BUSARD ST MARTIN (Circus cyaneus) 21 données

A Belle-Ile : 2 pendant toute la période.

9 en dortoir le 29 novembre à St Vio/Tréguennec (29S).

2 le 18 décembre en Baie du Mont-St-Michel (35).

2 dans les Landes de Lanfains (22) et 2 dans le Yeun Elez (29S) le 28 décembre.

2 à Minez-du/Glomel (22) le 26 février.

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis) 3 données

1 ♀ le 2 janvier en Forêt Pavée/Moisdon-la-Rivière (44).

1 le 9 février à Borthélo/Le Palais (Belle-Ile) (56).

1 le 10 mars en Forêt de St Mars (44).

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus) 27 données

La moitié des données concerne décembre.

Il est très peu noté en janvier (2 données). On note un hivernage d'oiseaux en dehors des sites de nidification, en zone remembrée : 1 le 9 janvier au Diffant/Loudéac (22). 6 observations à Belle-Ile pour la période.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) 33 données

La moitié environ des données concerne février. Une seule donnée envoyée pour les départements (29S) et (44) respectivement.

Premières parades notées le 18 février à Gourveaux/St Gilles-du-Vieux-Marché (22).

Signalons aussi :

7 le 8 janvier en Forêt de Vioreau/Joué-sur-Erdre (44).

1 le 9 mars à Sauzon/Belle-Ile (56).

2 nids occupés le 15 mars à Plélan (22).

AIGLE SP (*Aquila sp*) 1 donnée

1 le 4 janvier à St Philbert de Grandlieu (44).

AIGLE CRIARD/POMARIN (*Aquila clanga/pomarina*) 1 donnée

1 le 16 février au Passage/St Armel (56).

AIGLE CRIARD (*Aquila clanga*) 1 donnée

1 immature le 26 décembre au Loroux-Bottereau (44), trouvé mort.

La dernière mention de cet oiseau datait de l'hiver 1976, un individu aurait hiverné dans l'estuaire de la Loire.

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*) 16 données

Les 16 données proviennent toutes des Côtes-du-Nord et intéressent la côte comme l'intérieur. Il semble que la densité de ce rapace ait baissé dans le centre de l'Ille-et-Vilaine.

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*) 15 données

Aucune observation en Ile-et-Vilaine et dans les Côtes-du-Nord.

5 données à Belle-Ile (56) du 17 novembre au 31 décembre, à chaque fois un individu.

1 le 27 novembre à Trignac (44).

1 ♀ le 11 décembre à Port-Bara/St Pierre-Quiberon (56) ;

1 le 26 décembre à Kerlaz (29S) ; 1 ♂ le 27 décembre à

Penbron/La Turballe (44) ; 1 ♀ le 19 janvier à Kervigen/

Plomodiern (29S) ; 1 le 5 février dans l'Aber Benoît/

Plouvien (29N) ; 1 ♂ le 9 février à la Croix Cassée/

Botmeur (29S) ; 1 le 4 mars dans le Marais de Couéron (44) ;

1 le 13 mars à Port Salio/Le Palais (Belle-Ile (56)).

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) 10 données

- 2 le 20 novembre dans l'estuaire de la rivière de Pont-l'Abbé (29).
- 1 ♀ le 4 décembre dans l'Anse d'Yffiniac (22). Présence notée jusqu'au 14 mars.
- 1 ♂ le 18 décembre à Bourgneuf (44) chassant les Pluviers Dorés.
- 1 ♂ le 28 décembre à Herlin/Bangor (Belle-Ile - 56).
- 1 ♂ le 31 décembre à Kervellan/Sauzon (Belle-Ile).
- 1 le 22 janvier à Brest.
- 1 le 15 février à Portgwenn/Le Palais (Belle-Ile).
- 1 le 26 février, le Bot/Brest (29N).
- 1 immature le 28 février à Goulven (29N).

Un record de données pour cette espèce en expansion. Il est remarquable que les observations soient étalées sur toute la période.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) 2 données

- 6 à 7 du 28 décembre au 1er janvier à Belle-Ile (56).
- 4 à la Cour de l'Ile/St Herblon (44) le 5 février.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) 3 données

- 15 à 20 le 11 décembre à l'aérodrome de Rennes (35).
- 2 le 9 février à l'Ile de Bridon/La Varenne (44).
- 2 le 1er mars au Prétanné/Morieux (22).

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) 3 données

- 1 mâle noté : communes de Beg Leguer, Hénou, Plémy (22).

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) 5 données

- 4 du 17 décembre à mi-décembre en 4 points à Belle-Ile (56) ; 1 le 21 novembre à Kerguelen/Larmor (56) ; 3 au moins, de janvier à mars à St Ilan/Langueux (22) ;
- 1 le 19 décembre à Bonabri/Hillion (22) ; 1 le 14 mars à Trébeurden (22).

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) 11 données

- Signalons seulement les deux plus grosses concentrations :
 - 150 en janvier au Stangalard/Brest,
 - 40-50 le 3 décembre aux Ponts Neufs/Hillion.

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) 65 données

Ille-et-Vilaine

Marcille - Robert
 La Chèze/St Thurial
 La Taberge/Ste Anne-S/Vilaine
 Carcraon/Domalain
 Bazouges-Sous-Hédé
 La Bezardière/Hédé
 Trémignon/Lourmais
 Paintourteau/Erbrée
 La Valière/Vitré
 Rance Maritime
 Chatillon-en-Vendelais
 Le Pertre

Décembre	Janvier	Février	Mars
	157		
400	350		
7			
	33		
200			
3			
2			
140	171		
30	811		
	231		
	300		
	18		
<i>Côtes-du-Nord</i>			
25			
5			
17			
	21		
	33		
	23		
	29		
	1		
	18		
		3	
	15		
		9	
			50
<i>Finistère</i>			
1200			
150			
30			

<i>Finistère (suite)</i>	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars
Diben/Plougasnou		3	3		
Goulven			7		
Penzé			1		
Rade de Brest			235		
<i>Morbihan</i>					
Baie de Vilaine			2		
Branguily/Gueltras		10			
Golfe du Morbihan	4100	3900	4150	2850	820
Cranic/Brech	70	175	326	306	220
St Jean Loccal/ Mendon	1600/1800	1500/2000	468	0	0
Lannec/Ploemeur	50				
Roc'h-du/Crac'h		100	550		
Sarzeau		2/300			
Le Passage/St Armel		5/600			
Rade de Lorient	200	220-270	340		
<i>Loire Atlantique</i>					
Les Barançons/Couëron	450				
Blisière/Juigné	100				
Passay/La Chevrolière				100	
St Mars de Coutais				100	

Les données dont nous disposons ne nous permettent pas de tirer de conclusions sur les mouvements de l'espèce. On peut seulement essayer d'évaluer les effectifs minimum hivernant.

- Ile-et-Vilaine	2500
- Côtes-du-Nord	200
- Finistère	2000
- Morbihan	7000-8000
- Loire-Atlantique	800

TOTAL MINIMUM 12500-13500

=====

Il semble que la population bretonne de Foulques puisse être comparée avec celles des hivers 1970-71 et 1973-74 : autour de 15 000 oiseaux.

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*) 44 données

Le bon suivi des baies de Plouharnel/Quiberon permet de mettre en valeur un schéma simplifié du séjour hivernal :

NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS
220	283	338	280	32

Le pic enregistré en janvier semble être sensible dans la plupart des principaux sites permanents d'hivernage, à l'exception toutefois de l'Anse d'Yffiniac qui affiche un maximum en novembre (3262).

L'hivernage de l'Huitrier en Bretagne, bien que concernant l'ensemble de la façade Maritime, se caractérise par l'existence de 5 grands "Réservoirs" accueillant plus de 1000 individus ; les recensements de l'hiver 1983-84, réalisés à la mi-janvier, ne font qu'affiner cette connaissance.

Baie du Mont-St-Michel	: 11 100
Anse d'Yffiniac	: 2 000
Baie de Morlaix/Penzé	: 2 000
Estuaire de la Vilaine	: 1 050
Traicts du Croisic	: 1 500

A signaler 1 individu "Albinos" dans les Marais de Guérande les 1 et 28 décembre.

AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*) 20-25 données

Très petit nombre d'observations en dehors des sites traditionnels d'hivernage du Sud-Bretagne.

Le secteur fréquenté s'étend de la Baie de Quiberon à la Baie de Bourgneuf intégrant la totalité des grands estuaires et baies disponibles : Bassin Oriental du Golfe du Morbihan (englobant l'étier de Noyal et les marais annexes), Rivière de Pénérf, Estuaire de la Vilaine, Traicts du Croisic et Estuaire de la Loire. En ce qui concerne la Baie de Bourgneuf, (mi-Bretonne, mi-Vendéenne), les décomptes transmis semblent partiels et irréguliers.

MILIEUX	NOV. 2	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
		1	2	1	2	1	2	1	
Baie du Mont-St-Michel				2	7	4	4		
Baie de Goulven				3	3				
Golfe/Morbihan	13	3	5	(100) 48		25	0	123	
Baie/Vilaine	550	10	60	83	5	118	0	710	
Traicts/Croisic				11	0				
Estuaire/Loire				39	0				

Comme durant la période "1967-1974", le plafonnement des populations de la plupart des grands sites s'effectue en février.

Exemple de la Rivière de Pénerf :

1970-71 201 le 14 février
1972-73 300 le 25 février
1973-74 350 le 20 février

A cette grande stabilité, d'une année sur l'autre, du schéma hivernal s'oppose une évolution positive particulièrement spectaculaire des effectifs.

Cette dynamique démographique, constatée également chez la population nicheuse, s'est concrétisée dans l'occupation de nouveaux milieux : Baie du Mont-St-Michel, Baie de Goulven, Bassin Oriental du golfe du Morbihan, Traicts du Croisic...

A la fonte progressive, en février, de la plupart des grands stationnements se superpose l'apparition de quelques oiseaux dans des sites littoraux et continentaux : étang de la Blisière (44) : 1 le 3 février, Rivière de Pont-l'Abbé : 1 le 13 février, Etang de Lamballe : 3 le 12 mars, Etang de Loudéac : 2 le 15 mars.

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) 53 données

Les effectifs de la 2ème quinzaine de novembre restent faibles/modérés : entre 1/3 et 1/2 des valeurs maximales de l'hiver.

En décembre, augmentation sensible des effectifs dans la plupart des sites et plafonnement de la population en Baie de Vilaine.

C'est en janvier que le plus souvent sont notés les Pics hivernaux.

Février voit stagner ou d'effondrer les stationnements, peu d'observations durant la 1ère quinzaine de mars.

La forte valeur se rapportant à la Baie de Vilaine (288) serait l'indice d'un important mouvement migratoire de remontée.

DEPARTEMENTS	NOMBRE DONNEES	NOMBRE SITES	POPULATION MAXIMALE
Ille-et-Vilaine	1	1	25
Côtes-du-Nord	12	12	744
Finistère	6	6	948
Morbihan	27	10	1328
Loire-Atlantique	4	4	517
TOTAL/BRETAGNE	48-53	33	3562

GRAND GRAVELOT

MILIEUX	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
	2	1	2	1	2	1	2	1	
Baie du M ^t -St-Michel		25							
St Jacut (22)				130					
Le Guildo				30					
Baie/Fresnaye				15					
Val André				40					
Baie/Morieux						40			
Anse/Yffiniac	17								
Anse/Beauport			58						
Baie/Paimpol				35					
Anse/Lanneros			20						
Sillon/Talbert			7						
Estuaire/Jaudy				252					
Baie/St Efflam				100					
Rivière/Morlaix				200					
Estuaire/Penzé				330					
Baie/Goulven				3-400					
Camaret						30			
Plonévez-Porzay						8			

.../...

GRAND GRAVELOT (suite)

MILIEUX	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
	2	1	2	1	2	1	2	1	
Douarnenez						30			
Bas-Pouldu/Guidel		35							
Fort Bloqué/Ploemeur	30	34		10					
Larmor-Plage	1-200	100-200		100-200		100-150			
Rade/Lorient				315					
Rivière d'Etel				100					
Baie/Quiberon	110	261		328		210		63	
Conguel/Quiberon		46							
Sauzon/Belle-Ile			5						
Golfe/Morbihan	128	192		335		160		48	
Baie/Vilaine	167	260		210		202		288	
Traicts/Croisic				250					
La Baule				30					
St Brévin				230					
Etang du Pin									7

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) 20 données

Records sur tous les tableaux pour une espèce habituellement discrète durant la "mauvaise saison" : nombre inhabituel de données (20 contre 5-10), 4 départements/5 fréquentés (2-3 dans le passé), couverture complète de la période et effectifs parfois élevés (jusqu'à 18 individus).

Cette situation était prévisible puisqu'une évolution "favorable" s'esquissait depuis déjà quelques années.

Deux sites abritent, en janvier, plus de 10 individus : 12 au Sillon du Talbert et 18 en Baie de Quiberon.

MILIEUX	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
	2	1	2	1	2	1	2	1	
St Jacut (22)				4					
Sillon/Talbert				12					
Penzé						6			
Anse/Kernic				3					
Baie/Goulven					1				
Lampaul-Ploudalmézeau				4					
Rade/Lorient				4					
Baie/Quiberon	5	1		18		17			
Baie/Vilaine	6	2		6				5	
Guérande		5-6	2	3					

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*) 36 données

Ille-et-Vilaine

Polders/Baie du Mont-St-Michel : 1350 le 15 janvier.
 St Mt Mervé : 8 le 21 janvier - Marcille Robert : 100 le 4 mars
 Le Theil de Bretagne : 50 le 6 mars - Argentré : des dizaines le 10 mars.
 Le Pertre : 10 le 10 mars.

Côtes-du-Nord

Jaudy/La Roche Derrien : 5 le 5 mars.
 St Alban : 200 le 22 décembre, 11 le 4 février.
 St Barnabé : 1112 le 20 décembre, 325 le 13 janvier, 2300 le 15 janvier, 400 le 13 février, 320 le 13 mars.
 Trévé : 1528 le 26 décembre + 3000 le 26 décembre (2ème site).

Finistère

Baie de Morlaix : 1 le 22 janvier.
 Henvic : 5 le 22 janvier.
 Kermat/Guiclan : 300 le 7 janvier.
 Dirinon : 100 le 22 janvier.
 Lost Marc'h/Crozon : 2 le 4 décembre.
 Cast : 400 le 17 décembre, 50 le 23 janvier.
 Baie d'Audierne : 465 le 15 janvier.

Morbihan

Baie de Plouharnel : 1 le 15 décembre.
Estuaire de la Vilaine : 280 le 15 décembre, 260 le
15 janvier, 160 le 15 février.
Noyal-Pontivy : 900-1000 le 26 décembre.

Loire-Atlantique

Basse-Loire : 150 le 15 janvier.
Buzay + Frossay : 150 le 15 janvier.
St Etienne de Montluc : 40 le 15 février.
Gd Prée de Varades : 250 le 21 janvier, 160 le 18 mars.

L'espèce n'est pas notée durant la 2ème quinzaine de novembre et les plus importantes concentrations proviennent de la Bretagne Centrale "remembrée" : Bassins de Loudéac/Pontivy.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squatarola*) 60 données

Le remplissage des milieux traditionnels d'hivernage se poursuit activement durant la 2ème quinzaine de novembre. Le nombre réduit d'observations jusqu'à la fin-novembre, ne permet toutefois pas de mettre en évidence les subtilités des phases d'installation des hivernants.

L'observation, sans lendemains, de 2 individus les 3 et 9 décembre, à l'étang du Vioreau (44), pourrait s'inscrire dans une importante phase d'activité migratoire. C'est effectivement en décembre que les stationnements accusent les plus fortes augmentations dans le peu de sites régulièrement suivis.

C'est en janvier que la majorité des observations ont été réalisées : 28 données/60.

Les deux sites majeurs de l'hivernage de l'espèce demeurent la Baie du Mont-St-Michel (2050 en janvier), et le Golfe du Morbihan (1620 en février).

En dehors de la vingtaine de milieux importants (plus de 20 individus) mentionnés dans le tableau ci-après, l'espèce a été signalée en 6 autres points du littoral breton : principalement dans les Côtes-du-Nord.

	PRINCIPAUX MILIEUX	NOV.	DEC.	JANV.	FEV.	MARS
35	Baie du Mt-St-Michel			2050		
COTES-DU-NORD	Anse d'Yffiniac			210		250
	Baie de Paimpol			38		
	Talbert/Trieux			550		
	Estuaire du Jaudy			47		
	Baie de St Efflam			30	20	
FINISTERE	Rivière de Morlaix			50		
	Penzé			400		
	Baie de Goulven			350		
	Baie de Douarnenez	13		23		30
	Rivière de Pont-l'Abbé			50		
MORBIHAN	Rade de Lorient			350		
	Rivière d'Etel			30		
	Baie de Plouharnel	135	164	195	125	205
	Golfe du Morbihan	895	1350	1480	1620	1030
	Estuaire de la Vilaine	110	260	189	236	310
44	Traict de Mesquer			25		
	Traicts du Croisic			390		
	Estuaire de la Loire			330		

C'est en février que dans le Sud-Bretagne certaines populations plafonnent : Golfe du Morbihan : 1620, estuaire de la Vilaine : 236.

En mars, alors que dans le Golfe du Morbihan la population accuse une importante hémorragie pour atteindre le niveau de la fin-novembre (895/1030), on constate que les milieux de deuxième importance sont visités par d'importants contingents d'oiseaux, vraisemblablement en migration pré-nuptiale : Estuaire de la Vilaine (310), Baie de Plouharnel (205) et Anse d'Yffiniac (250).

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) 108 données

En l'absence de vagues de froid marquées, aucune mention n'a été faite, durant cette période, des marées de Vanneaux habituellement observables en Bretagne en début de saison hivernale.

A partir des données chiffrées transmises, le déroulement du séjour peut se schématiser ainsi :

MOIS	QUINZAINES	DONNEES	EFFECTIFS
Novembre	2	3	400
Décembre	1	6	3 025
	2	6	13 400
Janvier	1 + 2	29	54 440
Février	1	12	9 270
	2	0	0
Mars	1	5	1 725

C'est en janvier que la population comptabilisée a été la plus importante. La valeur nulle de la 2ème quinzaine de février est particulièrement étonnante, mais pourrait tout simplement s'expliquer par un concours de circonstances défavorables imputables aux observateurs.

Bien que le plus cosmopolite des Limicoles avec la Bécassine des Marais, le Vanneau fréquente néanmoins prioritairement en Bretagne des milieux bien typés : les zones humides côtières et fluviales (marais, polders, prairies alluvionnaires...) et les terres agricoles remembrées exploitées en "openfield". (Centre Bretagne, Léon littoral et intérieur...).

Pour l'hiver 1983-84, les plus représentatifs de ces sites sont les suivants (effectifs maximum) :

Milieux côtiers et fluviaux

Baie du Mont-St-Michel : 2300 (mi-janvier).
 Baie de Goulven : 300 (29 janvier).
 Baie d'Audierne : 2000 (4 février).
 Rivière de Pont-l'Abbé : 500 (janvier et février).

Rivière d'Étel : 340 (mi-janvier).
Baie de Plouharnel : 130 (mi-janvier).
Golfe du Morbihan (Bassin Oriental) : 2200 (mi-janvier).
Estuaire de la Vilaine : 2610 (mi-janvier).
Traict de Mesquer : 280 (mi-janvier).
Traicts du Croisic : 300 (mi-janvier).
Basse-Loire + Ancenis : 25 000.

Il ressort de cette sélection que la Vallée de la Loire, d'Ancenis à St Nazaire, abrite une part non négligeable de la population régionale.

Les estrans meubles (vasières...) d'un certain nombre de ces milieux, sont régulièrement fréquentés (à marée basse !) par de notables stationnements de Vanneaux "oisifs". Cet exode vers des sites maritimes est tributaire des dérangements que subissent les oiseaux dans leurs sites traditionnels de stationnement : pression cynégétique, activités agricoles... (baie de Goulven, rivière de Pont-l'Abbé, estuaire de la Vilaine, Traicts de Pen Bé et du Croisic.

Zones agricoles

Le démenbrement du bocage ainsi que l'apparition de nouvelles "pratiques" agricoles ont largement contribué à l'extension des quartiers d'hivernage : sites continentaux et sub-littoraux.

Bassins de Loudéac-Pontivy : 13-15 000 individus.
Région "Lamballe-Quintin-Moncontour" : 3 000
Haut-Léon intérieur et littoral (Morlaix) : 2500-3000
Chateaulin-Porzay : 1000

En résumé, un hivernage presque insignifiant caractérisé par l'absence de déplacements spectaculaires et l'existence toutefois de bandes bien fournies abritant souvent plus de 1000 individus.

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*) 36 données

5 départements - 11 sites dont 4 majeurs : Baie du Mont-St-Michel (4800), anse d'Yffiniac (2500), baie de St Efflam (800) et baie de Bourgneuf (2000).

Un effectif hivernal de 10 600 individus : 11 800 en janvier 1981. Pour l'ensemble du littoral français (In Birs).

Peu d'observations en dehors des sites classiques d'hivernage sinon 2 individus le 10 décembre, dans l'anse de Kerloc'h/Crozon (indice de passage).

Nouveau site de stationnement : rivière de Daoulas.

Ille-et-Vilaine

Baie du Mont-St-Michel : 4800 (mi-janvier).

Côtes-du-Nord

Anse d'Yffiniac : 1072 en novembre, 1500 à la mi-janvier, 2500 le 11 février.

Baie de St Efflam : 600 le 8 janvier, 800 vers la mi-janvier, 800 le 9 février.

Finistère

Estuaire de la Penzé : 15 à la mi-janvier, 15-20 le 4 mars.

Baie de Goulven : 1 le 1er janvier, 2 le 29 janvier.

Rivière de Daoulas : 20 le 19 novembre, 7-8 le 3 décembre, 35 le 24 décembre, 30-40 le 2 janvier, 40 le 7 janvier, 30-40 le 22 janvier.

Anse de Kerloc'h/Crozon : 2 le 10 décembre.

Morbihan

Baie/Plouharnel : 25 (mi-novembre), 20 le 30 décembre, 40 (mi-janvier), 31 (mi-février), 24 (mars).

Golfe/Morbihan : 30 (novembre), 72 (mi-décembre), 155 (mi-janvier), 160 (mi-février), 90 (mars).

Baie/Vilaine : 38 (novembre, 240 (mi-décembre), 78 (mi-janvier), 7 (mi-février), 73 (mars).

Loire Atlantique/Vendée

Baie de Bourgneuf : 2000 (17 décembre).

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) 18 données

Parmi les 12 sites qui ont fourni des observations, seule la baie de Quiberon a été régulièrement prospectée. Il est ainsi possible de situer le pic hivernal vers la mi-janvier et de constater que d'importants stationnements sont encore mentionnés en février et mars.

Ce sont au minimum 1055 oiseaux qui ont hiverné en Bretagne. Le littoral finistérien abrite à lui seul les 2/3 de la population régionale et la baie de Goulven confirme sa première place au niveau français (4-500 individus en janvier).

Répartition des observations par département

Côtes-du-Nord	22 sites	265 individus
Finistère	8 sites	665 individus
Morbihan	1 site	113 individus
Loire-Atlantique	1 site	12 individus

- BECASSEAU SANDERLING -

MILIEUX	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
	2	1	2	1	2	1	2	1	
Sillon/Talbert				115					
Baie St Efflam				40	150				
Baie /Locquirec				64					
Estuaire/Penzé				26					
Baie/Goulven				4-500					
St Pabu						50			
Camaret						5			
St Nic/Pentrez						50			
Kervijen/Plomodiern				70					
Ste Anne La Palud								26	
Baie/Quiberon	63	47		113		95		70	
St Brévin				5	12				

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) 7 données

La dernière observation se rapportant au passage automnal provient des marais de Séné (Falguérec) où 3 individus sont notés le 29 novembre.

A l'exception d'un individu observé dans l'anse d'Yffiniac le 15 janvier, toutes les données se rapportent au "complexe" géographique constitué par les traicts du Croisic et les marais adjacents, dénommés par extension "marais de Guérande".

Novembre : 12 le 27 - Décembre : 45 le 1er - Janvier : 25
Février : 6 le 4

Il s'agit du seul site régulier d'hivernage de l'espèce en Bretagne.

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*) 35 données

Côtes-du-Nord

St Jacut de la Mer : 7 à la mi-janvier, 1 le 22 janvier.
Ilot St-Michel (Sables d'Or...) : 10 le 19 décembre,
10 à la mi-janvier.
Sillon du Talbert : 5 à la mi-janvier
Jaudy : 1 à la mi-janvier.

Finistère

Penzé : 4 à la mi-janvier.
Baie de Morlaix : 6 à la mi-janvier.
Douarnenez : 1 le 27 novembre, maximum de 6 entre le
27 novembre et le 23 février.

Morbihan

Fort-Bloqué/Ploemeur : 4 le 27 novembre, 4 le 11 décembre,
10 en janvier.
Kerroc'h/Ploemeur : 8 le 5 décembre, 1 le 22 janvier,
5 le 12 février.
Anse de Kerguelen/Ploemeur : 1 le 11 décembre.
Le Port Blanc/Ploemeur : 5 le 22 janvier.
St Pierre-Portivy/Quiberon : 18 en novembre, 31 en décembre.
Quiberon (site ind.) : 18 en janvier.
Beg er Goalennec/Quiberon : 30 à la mi-janvier, 20 le
11 février, 26-30 le 10 mars.
Erdeven : 5-10 le 24 décembre.
Les Poulains-Sauzon/Belle-Ile : 5 le 31 décembre.

Loire-Atlantique

Pointe du Castelli/La Turballe : 49 le 28 janvier.
La Turballe : 12 le 29 décembre.

Quelques nouveaux sites sont découverts dans les Côtes-du-Nord.

Confirmation de l'intérêt majeur de la Presqu'île de Quiberon et du littoral "Piriac-Le-Croisic" lors de l'hivernage. Ces deux secteurs situés aux confins méridionaux de l'aire continue de répartition hivernale (en France), présentent des caractéristiques physiques très voisines : littoral rocheux bas et battu, amplitude réduite de l'estran, milieux homogènes dépourvus de plages. Leur prospection est particulièrement aisée en raison de la facilité d'accès au rivage, ainsi que par la présence des reposoirs sur les zones même de nourrissage (horizon sub-littoral).

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) 2 données

Deux observations se rapportant à 1 oiseau.

Dans les marais de Guérande/Traicts du Croisic en décembre : 1 individu le 10.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) 70 données

Avec environ 70 données, c'est de loin le limicole le plus couramment noté. A titre de comparaison figure ci-après l'effort de prospection des années 1967-1974 :

Novembre 1969 - Mars 1970 :	145 données
Novembre 1970 - Mars 1971 :	233 "
Novembre 1972 - Mars 1973 :	190 "

Malgré cette baisse sensible de la collecte des informations, il apparaît que les recensements "Birs/Biroe" du mois de janvier ont concerné la plupart des grands sites d'hivernage, à l'exception toutefois de la rade de Brest (incomplètement recensée) et de la baie de Bourgneuf. Cette bonne couverture de prospection s'est soldée par un bilan chiffré supérieur aux années précédentes puisque ce sont près de 116 600 oiseaux répartis en 32 sites qui ont été décomptés : 73 000 en 1979, 84 900 en 1981. Cette valeur correspond à la moitié de la population présente sur le littoral français en janvier 1979.

Répartition des populations

35	28 500	(1 site)
22	12 150	(12 sites)
29	24 800	(7 sites)
56	38 850	(7 sites)
44	12 220	(5 sites)
BRETAGNE	116 520	32 sites

Quelques faits marquants peuvent par ailleurs être mentionnés :

- durant la 1ère quinzaine de décembre, quelques indices de passage sont perceptibles en Loire-Atlantique : 4 le 9 décembre sur la Loire à Nantes - 17 le 9 décembre à l'Etang du Vioreau - 10 le 10 décembre à Ancenis.
- 1 cas d'hivernage en Bretagne Centrale : 1 individu à l'Etang de Loudéac du 16 novembre au début du mois de février.
- En baie de Vilaine, l'effectif maximum est atteint, en mars : 6830 individus.



- BECASSEAU VARIABLE -

MILIEUX .	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS
	2	1	2	1	2	1	2	1
Baie/Mont-St-Michel				28500				
St Jacut				1800				
Le Guildo				50				
Baie/La Fresnaye				400				
Anse d'Yffiniac				1900				
Baie/Morieux				1300				
Binic/Plouha				120				
Beauport				680				
Paimpol				400				
Sillon/Talbert			100	2400				
Estuaire/Jaudy				2000				
Etang/Loudéac	1			1				
Baie/St Efflam				1100-1200				
Rivière/Morlaix				6500				
Estuaire/Penzé				8000				
Baie/Kernic				1500				
Baie/Goulven				1644 3000				
Elorn Maritime						6-700		
Kervijen/Plomodiern				200				110
Rivière/Pont-l'Abbé	3000		4000			5000		2000
Bas Pouldu		28						
Fort Bloqué/Ploemeur	65	65						
Rade Lorient			1500	3250				
Rivière d'Etel				2800				

.../...

- BECASSEAU VARIABLE (suite) -

MILIEUX	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
	2	1	2	1	2	1	2	1	
Baie/Plouharnel	2300	3780		3700		2700		2100	
Golfe/Morbihan	19650	21900		23600		20500		16900	
Baie/Vilaine	2600	5400		5010		3600		6830	
Traicts/Mesquer				380					
Traicts/Croisic				6000					
La Baule				180					
Estuaire/Loire				5500					
St Brévin				160					
Loire/Nantes		4							
Etang/Vioreau		17							
Ancenis		10							

COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) 5 données

Seulement 5 sites se partageant moins de 10 données réparties de la mi-décembre à la mi-février.

Ille-et-Vilaine

310 individus à la mi-janvier dans les polders de la baie du Mont-St-Michel.

Finistère

14 dans l'estuaire de la Penzé le 9 février.

Loire-Atlantique

17 au lac de Grandlieu le 17 décembre.

80, en deux points, dans l'estuaire de la Loire à la mi-janvier.

BECASSINE SOURDE (*Lymnocryptes minimus*) 7 données

Les observations ne proviennent que de 3 départements (22, 29 et 44) et s'échelonnent du 1er décembre au 1er février.

Par rapport aux années antérieures, 1983-84 peut être considérée comme une saison de faible fréquentation : minimum de 5 et maximum de 25 données, avec en moyenne 10 individus chaque hiver, pour les 15 années passées.

Côtes-du-Nord

Langueux : 1 le 1er décembre.

Etang de Lamballe : 1 le 25 janvier.

Finistère

Goulven : 3 le 22 janvier.

Loire-Atlantique

Marais de Guérande : 3 le 27 décembre et 3 le 1er février.

Thouaré : 2 le 12 décembre et 1 le 15 décembre.

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) 55 données

Les seules données remarquables de l'hiver proviennent des grandes zones humides du S.E. de la Bretagne qui ont abrité des groupes d'oiseaux souvent spectaculaires : jusqu'à 750 dans l'estuaire de la Loire.

A noter aussi l'absence d'informations en provenance d'Ille-et-Vilaine ainsi que la présence de Bécassines dans le centre Bretagne "remembré" ou elles sont souvent associées au Vanneau Huppé et au Pluvier Doré.

Le détail des observations figure ci-après :

Côtes-du-Nord

Plancoët : 12 le 3 mars.
Hemonstoir : 80 le 28 décembre.
Etang de Lamballe : 21 le 9 mars.
Plouguenast : 22 le 23 février.
Etang de Loudéac : 12 le 16 février.
St Barnabé : 18 le 20 décembre.

Finistère

St Servais : 4 le 1er janvier.
Goulven : 10 le 22 janvier.

Morbihan

Loc'h/Guidel : 6 le 19 novembre, 14 le 2 janvier.
Fort-Bloqué/Ploemeur : 5 le 27 novembre, 10 le 17 décembre.
Rue des Roseaux/Larmor-Plage : 7 le 28 novembre, 10 le 27 décembre, 15 le 7 février.
Anse de Kerguelen/Larmor-Plage : 100-110 le 26 décembre.
Golfe du Morbihan : 95 à la mi-décembre, 240 à la mi-janvier.
Falguérec/Marais de Séné : 50 le 27 décembre.
Marais du Duer/Sarzeau : 15-20 le 18 décembre.
Baie de Vilaine : 110 à la mi-janvier.
Noyal-Pontivy : 15 le 26 décembre.

Loire-Atlantique

Grande Brière : 30 à la mi-janvier.
Estuaire de la Loire : 750 à la mi-janvier.
Marais de Vue/Frossay : 200 à la mi-janvier.
Grande Prée de Varades : 150 le 10 mars.
Etang de la Blisière : 40 le 19 novembre.

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) 10-15 données

Minimum d'une observation mensuelle avec un nombre plus élevé de contacts en décembre.

Seul le département des Côtes-du-Nord n'a pas livré de renseignements sur cette espèce.

Compte-tenu du petit nombre d'informations, il est difficile de vouloir tenter une analyse fine du séjour hivernal de la Bécasse. L'observation au hasard est loin d'égaliser en efficacité les méthodes de ratissage des chasseurs.

La réalisation de sondages/enquêtes auprès des bécassiers révélerait très certainement l'existence d'une importante population hivernante et permettrait de dresser un calendrier précis des mouvements.

Ille-et-Vilaine

Forêt de Fougères : 1 le 5 février.

Finistère

Land Gazel/Trémaouezan : 17 (tableau de chasse).

Brest : 1 le 22 décembre.

Sizun : 1 le 27 novembre.

Douarnenez : 1 le 31 janvier.

Quimperlé : 1 le 17 décembre.

Morbihan

Etang de St Jean/Locoal-Mendon : 1 le 9 mars.

Belle Ile en Mer - Port Jean : 4 le 12 décembre.

- Porh Gwenn : 1 le 30 décembre.

Forêt de Lanvaux : 1 le 26 février.

Loire-Atlantique

La Grille/St Julien de Concelles : 1 le 11 décembre.

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) 15 données

Malgré le petit nombre d'observations, quelques jalons peuvent être placés pour illustrer le déroulement des mouvements d'oiseaux.

Migrateurs hors des sites d'hivernage : novembre/décembre

- 1 individu le 27 novembre en rivière de Morlaix.
- 2 individus le 10 décembre à l'étang du Pin (44).

Hivernage : décembre/janvier

- Baie du Mont-St-Michel : 550 en janvier.
- Estuaire de la Penzé : 11 le 1er janvier.
- Rivière de Pont-l'Abbé : 5 les 18 et 25 janvier - 5 le 5 février.
- Baie de Vilaine : 6 à la mi-décembre.

Migration pré-nuptiale/printanière : février et mars

- Loire à Ancenis : 8 le 17 janvier puis 235 le 10 mars.
- Estuaire de la Loire (Marais de Couëron) : 32 le 25 février.
- Rivière de Pont-l'Abbé : 10 le 13 février (5 en hivernage).
- Rivière de Morlaix : 1 les 10 et 11 mars.
- Estuaire de la Penzé : 1 le 11 mars.

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) 32 données

Le bilan des observations figure dans le tableau ci-après.


Quelques remarques peuvent être formulées à partir de ce lot d'informations.

Durant l'hiver 1983-84, 16 sites répartis sur les 5 départements auront accueilli une population hivernante avoisinant 5600 individus, soit l'équivalent de la totalité de la population recensée sur le littoral français en janvier 1981 (in BIROE).

Quatre sites majeurs totalisent à eux seuls près de 5000 Barges Rousses :

- Baie du Mont-St-Michel : 1070
- Anse d'Yffiniac : 2150
- Baie de Goulven : 400
- Baie de Bourgneuf : 1500

Le remplissage de la plupart des sites semblerait se produire en janvier et la lère quinzaine de mars voit encore certains effectifs croître : baie de Vilaine...



- BARGE ROUSSE -

MILIEUX	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
	2	1	2	1	2	1	2	1	
Baie/Mont-St-Michel				1070					
Saint-Jacut				4					
Anse d'Yffiniac				2150				300	
Binic/Plouha				6					
Sillon/Talbert				85					
Baie/Ste Efflam				100		90			
Rivière/Morlaix	1								
Estuaire/Penzé				130					
Baie/Goulven				400					
Rivière/Pont-l'Abbé						30			
Baie/Quiberon	17	16		23		8		1	
Golfe/Morbihan	7	2						3	
Baie/Vilaine	6	17		32		34		43	
Marais/Guérande		1 (DN)		25					
Estuaire/Loire				1					
Baie de Bourgneuf			1500						

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*) 5-10 données


Discret et souvent à l'écart des importantes concentrations de limicoles, le Courlis Corlieu doit vraisemblablement être plus abondant en Bretagne durant l'hiver.

Il peut être considéré comme hivernant régulier, mais en petit nombre ...

Durant la présente période, il n'a été signalé qu'en rade de Brest où il a fréquenté deux sites représentatifs de ses milieux de prédilection :

- Estuaire : 1 en Rivière de Daoulas à partir du 19 novembre.
- Estrans rocheux : 1 sur le littoral nord du Goulet (Plouzané) à partir du 30 novembre.

Dans ces deux sites, l'espèce a été observée à plusieurs reprises en décembre et en janvier.



COURLIS CORLIEU (suite)

BILAN DES OBSERVATIONS REALISEES

ENTRE NOVEMBRE 1967 et MARS 1974

Données mentionnées dans les bulletins "AR VRAN"

	NOV.	DÉCEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
	1	1	2	1	2	1	2	1	
1967-68						11			Lampaul-Ploudalmézeau : 2
1968-69					19				St Philibert (56) : qq uns
1969-70		4		10					Le Conquet : 1 Baie de Plouharnel : 4
1970	21	6		10					Baie de Goulven : 3 le 21 nov. Etang/Kerhuon : 1 le 6 déc./ 1 le 10 janvier Lampaul-Ploudalmézeau... qq le 6 décembre/1 le 16 décembre Mer Blanche/Fouesnant : 1 le 26 décembre Curnic/Guissény : 1 les 9 et 30 janvier. Vougot/Guissény : 2 le 5 fév. Goulven : 1 le 25 février.
1971		6	16 26		9 30	5	25		
1971-72			24						Pen Bé/Assérac: 1
1972-73					21				Ile Dumet/Piriac : 7-10
1973-74	18		16			9			Kergleuz/Landéda : 2 le 18 nov. 3 le 16 décembre Baie/Morlaix : 1

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) 60 données

Ille-et-Vilaine

Baie du Mont-St-Michel : 1780 à la mi-janvier.

Côtes-du-Nord

St Jacut : 44 le 15 janvier.

Le Dano : 3 le 15 janvier.

Baie/Fresnaye : 95 le 15 janvier.

Sables d'Or : 5 le 15 janvier.

Baie d'Hillion : 150 le 15 février.

Anse d'Yffiniac : 395 le 15 janvier, 300 le 8 janvier, 314 le 25 janvier.

Binic-Bréhec : 27 le 15 janvier.

Beauport : 12 le 15 janvier.

Talbert : 110 le 15 janvier.

Jaudy : 55 le 15 janvier.

Finistère

Baie/Morlaix : 250 le 15 janvier.

Estuaire de la Penzé : 200 le 15 janvier.

Tréfeuntec/Plonévez-Porzay : 9 le 20 novembre.

Rivière de Pont-l'Abbé : 150 le 19 novembre, 300 le 18 décembre, 150 le 1er décembre, 300 le 5 février, 300 le 13 février, 200 le 11 mars.

Morbihan

Fort-Bloqué/Ploemeur : 12 le 7 janvier.

Les Saisies/Larmor-Plage : 30 le 27 novembre, 50 le 28 novembre, 75-100 à la mi-janvier.

Locqueltas/Lorient : 49 le 28 janvier.

Rade de Lorient : 60 à la mi-janvier.

Rivière d'Etel : 60 à la mi-janvier.

Baie/Quiberon : 45 en novembre, 53 le 15 décembre, 74 le 15 janvier, 7 le 15 février, 6 en mars.

Herlin-Bangor/Belle-Ile : 4 le 28 décembre.

Golfe/Morbihan : 280 en novembre, 355 le 15 décembre, 290 le 15 janvier, 330 le 15 février, 210 en mars.

Baie/Vilaine : 190 en novembre, 380 à la mi-décembre, 348 le 15 janvier, 192 le 15 février, 132 en mars.

Loire-Atlantique

Mesquer : 30 le 15 janvier.

Le Croisic : 180 le 15 janvier.

Loire (estuaire) : 220 le 15 janvier.

Marais de Vue/Frossay : 70 le 15 janvier.

Marais de Grée : 16 le 21 janvier.

Etang de la Blisière : 10 le 21 janvier.

Aucun fait marquant sinon un important effort de prospection sur le littoral des Côtes-du-Nord.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) 14 données

Avec 14 données (6 sites - 4 départements : 22, 29, 56 et 44), la présente période atteint la niveau de l'hiver 1971-72 (12 observations), mais se situe très en retrait de la saison 1973-74 qui avec 42 données détient le record de la fréquentation hivernale de l'espèce.

On notera aussi les effectifs particulièrement réduits.

Côtes-du-Nord

Anse d'Yffiniac : 1 le 15 janvier.

Estuaire du Jaudy : 1 le 5 mars.

Finistère

Estuaire de la Penzé : 2-3 le 4 mars.

Baie de Goulven : 1 le 30 décembre, 1 le 15 puis 2 le 22 janvier.

Morbihan

Golfe du Morbihan : 1 à la mi-janvier et 2 à la mi-février.

Loire-Atlantique

Marais de Guérande : 7 le 1er décembre, 1 le 28 décembre.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) 40 données

La population régionale présente en décembre/janvier dépasse timidement 2100 individus et seulement 6 grands sites se dégagent des 22 milieux visités.

Voir tableau

Les temps forts du séjour hivernal du Chevalier Gambette peuvent être isolés à partir des données provenant de 3 milieux bien suivis du littoral morbihannais : Baie de Plouharnel, Golfe du Morbihan et Baie de Vilaine.

Comme chez la plupart des limicoles maritimes, c'est vers la mi-janvier que se produit l'occupation optimum des sites.

- CHEVALIER GAMBETTE -

MILIEUX	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS
	2	1	2	1	2	1	2	1
Baie/Mont-St-Michel				45				
St Jacut				6				
Baie/Fresnaye				2				
Ilot St-Michel				12				
Anse d'Yffiniac	26			5				
Binic/Plouha				7				
Beauport				3				
Baie/Paimpol				12				
Sillon/Talbert				32				
Estuaire/Jaudy				20				
Rivière/Morlaix				320				
Estuaire/Penzé				200				
Baie/Goulven				215				
Rivière/Pont-l'Abbé	300		300			150		
Larmor-Plage		30-50		50-100				
Rade Lorient			47	40				
Rivière/d'Etel				65				
Baie/Plouharnel	30	45		43		25		16
Golfe/Morbihan	240	330		410		290		180
Baie/Vilaine	215	180		296		260		72
Traict/Mesquer				1				
Traicts/Le Croisic				45				

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) 1 dizaine de données

Au coeur de l'hiver, une seule observation remarquable provient du littoral du Nord-Finistère : 20 individus en baie de Goulven le 22 janvier.

Stationnement hivernal sensiblement inférieur à la moyenne habituelle : 15-20 données (années 1967-1974). Au total une dizaine de sites sont visités (22, 29, 56 et 44) avec des effectifs ne dépassant pas 3 individus.

Novembre

Séné (Mousterian) : 1 le 22

Décembre

Varades (Loire) : 1 le 3

Penzé : 2 le 25

Anse d'Yffiniac : 1 le 1er ensuite jusqu'au 26 février.

Loire-Atlantique : quelques individus jusqu'au début décembre...

Janvier

Anse d'Yffiniac : 1 le 26

Mars

3 données (44)

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) 25-30 données

Répartition des observations par département

Ille-et-Vilaine

Belouze/Baulon : 2 le 11 décembre.

Côtes-du-Nord

Langueux : 4 le 15 janvier.

Etang de Loudéac : 5 le 17 janvier.

Etang du Beffou : 1 le 12 février.

Finistère

Etang du Guic/Guerlesquin (29/22) : 1 le 21 novembre.

Lesquelen/Plabennec : 1 le 17 décembre.

Morbihan

Marais de Séné (Falguérec) : 1 le 28 février.

Loire-Atlantique

Marais de Guérande : 2 données.

Loire (en amont de Nantes) : 8 données.

Boire de la Bridonnière/La Varenne : 6 le 18 novembre.

Etang de la Blisière/Juigné : 4 le 21 janvier.

Etang du Pin : 1 observation.

Evolution des données et effectifs entre novembre 1967
et mars 1974

ANNEES	DONNEES	EFFECTIFS
1967-68	8-10	14
1968-69	5	5
1969-70	10	22
1970-71	16	38
1971-72	11	23
1972-73	?	?
1973-74	24	36

1983-84	20-25	26
---------	-------	----

Malgré des fluctuations interannuelles, il ressort de cette compilation une évolution positive sensible du stationnement hivernal du Chevalier Culblanc en Bretagne.


Cette progression porte sur le nombre de données ainsi que sur le volume d'oiseaux observés.

On notera une répartition assez homogène des observations sur les 5 mois de la période avec toutefois une fréquentation plus importante durant les mois de décembre et de janvier.

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*) 45-50 données

L'histogramme présenté ci-dessous, bien que réalisé à l'aide d'un petit nombre de données chiffrées (18 !), permet de mettre en évidence ou de confirmer :

- le profil régulier du schéma de séjour caractérisé par une poussée sensible des effectifs de janvier (7 données/57 individus),
- quelques indices de passages en fin d'hiver :
 - . Etang de Lamballe : 1 le 4 janvier puis 2 le 5 mars.
 - . Etang de Loudéac : 1 le 16 février.



- CHEVALIER GUIGNETTE -

MILIEUX	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
	2	1	2	1	2	1	2	1	
Bazouges/Hédé				2					
St Jacut de la Mer				1					
Etang/Lamballe				1				2	
Etang/Loudéac						1			
Estuaire/Jaudy	4								
Rivière/Morlaix				7					
Estuaire/Penzé				35					
Aber Benoit						5			
Kervel/Plonévez-Porzay						4			
Douarnenez	5								
Esutaire/LaIta								12	
Belle-Ile/Sauzon			1						
Golfe/Morbihan				6					
Banastère/Sarzeau			1						
Baie/Vilaine			8						
Loire Fluviale/Nantes		7		5					

TOURNEPIERRE A COLLIER (*Arenaria interpres*) 45 données

Malgré un nombre limité de données (45 : niveau de 1973-74), c'est la première fois que la population hivernante recensée atteint un niveau aussi élevé : ce sont en effet près de 2000 oiseaux qui ont été décomptés. Deux raisons expliquent ce résultat :

- Effectif particulièrement élevé en baie de Morlaix/estuaire de la Penzé (1000 individus). Cette zone littorale abrite la plus forte concentration de Tournepierres de la façade maritime française.
- Important effort de prospection sur le littoral des Côtes-du-Nord (9 sites).

Analyse des observations dans les 2 tableaux

DEPARTEMENTS	Nombre de sites	Nombre de données	Effectif hivernal
Ille-et-Vilaine	1	1	10
Côtes-du-Nord	9	12	373
Finistère	3	3	1010
Morbihan	12	23	436
Loire-Atlantique	3	3	123
Bretagne	28	42	1952

Grace à ce réel progrès dans la connaissance du statut hivernal du Tournepieuvre, on peut estimer que la population régionale doit se situer entre 5 et 6000 individus.

- TOURNEPIERRE A COLLIER -

MILIEUX	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Baie/Mont-St-Michel				10					
Ilot St-Michel/Sables d'Or			15	15					
St Jacut				16					
Val André				16					
Lermot/Hillion						40			
Anse d'Yffiniac				2		3			
Beauport		27		27					
Baie/Paimpol				42					
Sillon/Talbert				145					
Jaudy				70					
Rivière/Morlaix				300					
Estuaire/Penzé				700					
Ile Tristan/Douarnenez			10						
Fort Bloqué/Ploemeur	15		40						
Locqueltas/Lorient						10			
Erdeven				10					
Sauzon/Belle-Ile			6						
Poulains/Belle-Ile			8						

- TOURNEPIERRE A COLLIER (suite) -

MILIEUX	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
	2	1	2	1	2	1	2	1	
Porh Gwenn/Belle-Ile					5				
Conguel/Quiberon	30				30				
Baie de Quiberon	90		124		130		60		28
Rade/Lorient					17				
Locmariaquer			12						
Golfe/Morbihan			39		93				
Baie/Vilaine	4		75		57		45		50
La Turballe/Piriac					30				
Traicts/Croisic					18				
Baie/La Baule					75				

PHALAROPE SP (*Phalaropus sp*) 1 donnée

Réalisée sur les marges occidentales du Mor-Bras (Beg Er Goalennec/Quiberon : "côte sauvage"), l'observation du 11 décembre : 2 individus en déplacement vers le S.E., s'inscrit dans le phénomène d'invasion hivernale du Phalarope A Bec Large de l'Iroise à la Baie de Bourgneuf. Voir l'analyse ci-après.

PHALAROPE A BEC LARGE (*Phalaropus fulicarius*) 8 données

Finistère

Anse du Dellec/Plouzané (rive nord du goulet de la rade de Brest) : 1 le 4 janvier.

Port de Douarnenez : 1 le 12 décembre, 1 adulte le 24 janvier.

Loire-Atlantique

Port de la Turballe : 1 le 22 janvier.

Jetée du Tréhic/Le Croisic : 1 adulte le 20 janvier, 1 le 22 janvier, 1 le 10 février.

St Père en Retz : 1 à l'intérieur des terres (site précis non mentionné).

Alors que schématiquement durant les 15 dernières années les observations étaient réparties sur l'ensemble du littoral sans pour autant concerner, à chaque saison, les 5 départements bretons, ces données de la présente période s'inscrivent dans une aire limitée au "Grand Mor-Bras" et à l'Iroise (voir carte). Le regroupement des données en 5 sites répartis à l'intérieur de 2 secteurs nettement individualisés soulève la question de l'origine pélagique de ces oiseaux : important quartier d'hivernage dans le nord du Golfe de Gascogne ?

Contrairement aussi aux années passées où les observations étaient réalisées prioritairement en novembre et février, nous voyons en 1983-84 une concentration des apparitions entre le 12 décembre et le 10 février (voir tableau).

Mois	NOV.	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS
Périodes	2	1	2	1	2	1	2	1
1967-68								
1968-69								
1969-70		1						
1970-71	3							
1971-72								
1972-73	1							
1973-74						2	2	
1967-74	4	1				2	2	

1983-84		1	1	1	3	1		
---------	--	---	---	---	---	---	--	--


Cet afflux de Phalaropes limité dans le temps et l'espace n'est pas étranger aux mauvaises conditions météorologiques qui ont longuement sévi dans le nord du Golfe de Gascogne et trouvé leur point culminant les 25 et 26 janvier dans une tempête de type cyclonique : se reporter aux échouages massifs d'oiseaux pélagiques (Alcidés et Mouettes Tridactyles) durant cette période.


Phalaropes

16 Nov. 1983 – 15 Mars 1984

○ *Phalarope* sp.

● *Phalarope à bec large*





Frederic 30 juin 84 A.J.

LABBE SP (*Stercorarius sp*) 1 donnée

1 individu le 3 février à la Pointe du Croisic (44).

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*) 1 donnée

Une observation le 21 novembre de 2 individus à Plouhinec (56).

LABBE A LONGUE QUEUE (*Stercorarius longicaudus*) 1 donnée

Un individu observé le 18 décembre à Fort Bloqué/Ploemeur (56).

Cette espèce est l'observation exceptionnelle en hiver dans nos régions : elle n'avait jamais été signalée dans la collection AR VRAN (1967-1974).

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) 3 données

Le 27 décembre, 1 capturé mourant en Brière (44).

Le 7 janvier, 1 à Fort Bloqué/Ploemeur (56).

Le 24 janvier, 2 vus au Cap Fréhel (22).

MOUETTE MELANOCEPHALE (*Larus melanocephalus*) 35 données

Nombreuses observations principalement en baie de Douarnenez du 16 novembre au 15 mars (Kervel, Treizma-laouen, Port de Douarnenez et Ris) et jusqu'à 12 individus à la fois (4 adultes, 4 2ème hiver, 4 1er hiver) le 4 février.

Notons aussi les observations d'un individu le 22 novembre (adulte) à Goulven (29N), les 3 décembre et 20 janvier (adulte) au Kelenn/Carantec (29N), du 10 au 28 décembre (adulte) aux marais salants de Guérande (44), le 11 janvier à la Nouriguel/Larmor (56), du 20 janvier au 19 février (adulte) dans les Traicts du Croisic (44), le 1er février au Port de Lorient (56), le 15 février (adulte) à Portivy/St Pierre Quiberon (56), le 17 février à Larmor-Plage (56), le 10 février à Lannec/Ploemeur (56) et le 4 mars à Binic (22).

Voir l'article d'A. THOMAS et P. YESOU

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*) 53 données

Les données sont réparties tout au long du littoral :

25 au Cap Fréhel (22) et 3 à Binic (22) le 4 mars.
Du 11 au 28 décembre, 5-13 individus souvent en pêche avec des Petits Pingouins dans la Penzé (29N) ; jusqu'à 10-15 individus dans le port de Douarnenez le 27 janvier ; 4 pêchant à la côte après un coup de vent de sud à Beg Meil/Fouesnant (29S) le 24 janvier.

Dans le Morbihan, plusieurs observations en baie de Quiberon dont 20-30 individus le 15 janvier à la Pointe du Conguel et 50 du 4 février au 12 février à Suscinio/Sarzeau.

En Loire Atlantique, remarquons 3 données dans les terres au Marais de Grée à Ancenis : le 25 janvier, 1 immature (1er hiver) ; le 28 janvier, 2 immatures et 1 adulte ; et le 5 février 4 individus.

Notons aussi 30 environ à Congor (marais salants de Guérande) les 27 et 28 décembre.

MOUETTE DE SABINE (*Xema sabini*) 3 données (2 observateurs)

Signalée en février à Douarnenez (29S) ; 1 adulte observé le 4 et 5 février à La Nouriguel/Larmor (56) et 1 individu le 16 février à Penvins/Sarzeau (56).

L'hiver 1983-84 aura donc été marqué par des observations assez exceptionnelles de Mouettes de Sabine lors de la série de dépressions qui a atteint nos côtes fin janvier-début février. L'espèce qui hiverne normalement au large des côtes sud ouest de l'Afrique s'est retrouvée avec d'autres oiseaux qu'elle cotoie à cette époque : Phalarope à Bec Large et Puffin Fuligineux. Deux hypothèses peuvent être évoquées :

- ces oiseaux proviennent d'une population se trouvant plus au nord que la traditionnelle aire d'hivernage,
- les perturbations atlantiques ont fait remonter des individus depuis la côte africaine.

Cette deuxième hypothèse paraissant plus satisfaisante, compte-tenu du fait que le phénomène concerne, au moins, trois espèces.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) 8 données

Quelques grands rassemblements à noter :

le 28 novembre, 500 individus environ à La Fresnes sur Loire, Ile Malet (44),
le 2 décembre, 500-600 puis 800 le 11 janvier au Ris à Douarnenez (29S),

mi-janvier, 10 000 en baie de Morlaix et 7500 en Penzé (29N) en dortoir,
le 2 février, 20 000 en dortoir dans l'anse d'Yffiniac (22),
le 19 février, 2 à 3000 à l'étang de Carcraon/Domalain (35).

GOELAND CENDRE (*Larus canus*) 19 données

Plus de 1000 en dortoir le 2 février et 250 présents le 12 février dans l'anse d'Yffiniac (22),
150 à la mi-janvier essentiellement sur la grève du Kelenn/Baie de Morlaix (29N),
un maximum de 13 individus observés le 16 février en baie de Douarnenez à Kervel/Plonévez-Porzay (29S),
56 individus en baie de Plouharnel (56) le 24 décembre.
+ 200 individus en Marais de Couéron et Cordemais (44) le 21 décembre.

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) 16 données

De plus en plus d'observations hivernales (16 données) pour cette espèce dont certains individus deviennent sédentaires.

Au Marais de Grée à Ancenis (44), 400 adultes et subadultes environ le 28 janvier puis 600 le 7 février.
Environ 200 à Tréguenec (29S) le 18 février.

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) 5 données

Espèce régulièrement observée dont nous ne retiendrons que :

5000 individus à la mi-janvier en baie de Morlaix (29N).
2000 individus en dortoir le 2 février dans l'anse d'Yffiniac (22).
350 au Ris/Douarnenez (29S) en reposoir le 11 janvier
et 250 à 300 le 2 décembre
53 individus posés à l'étang du Losquet (22) le 18 janvier.

GOELAND LEUCOPHÉE (*Larus cachinnans/michaellis*) 2 données

2 observations au Guilvinec (29S) d'un individu le 20 novembre et un le 6 décembre.

GOELAND A AILES BLANCHES (*Larus glaucofides*) 31 données

Le Goéland à Ailes Blanches a opéré une mini "invasion" de notre région au cours de cet hiver. Ce phénomène, qui a débuté le 14 janvier et s'est poursuivi jusqu'au printemps, semble lié aux conditions météorologiques du mois de janvier. Les observations sont concentrées sur quelques secteurs bien suivis : Douarnenez et La Turballe essentiellement.

Baie de Douarnenez (29S) 21 données

Au moins 6 oiseaux d'âge différents ont séjourné à Douarnenez ou dans ses environs :

le 14 janvier apparaît un oiseau de 1er hiver,
le 27 janvier un adulte le rejoint suivi le lendemain
d'un 2ème hiver,
le 31 janvier un 2ème adulte est noté,
le 15 février 2 1er hiver sont observés simultanément,
ils sont 3 le 10 mars.

St Guénolé/Penmarch (29S) 2 données

1 2ème hiver les 12 et 18 février.

Bénodet (29S) 1 observation.

1 1er hiver le 18 février.

Bas Pouldu/Guidel (56) 1 observation

1 2ème hiver le 28 janvier.

La Turballe (44) 4 observations

1 3ème hiver le 28 janvier, 1 1er hiver le 11 février,
3 1er hiver et 1 2ème hiver le 19 février, et enfin 2
1er hiver le 26 février.

Le Croisic (44) 1 observation

1 2ème hiver le 15 janvier.

Coueron (44) 1 observation

1 1er hiver le 3 mars.

GOELAND BOURGMESTRE (*Larus hyperboreus*) 13 données

Dans le Sud Finistère, observation à St Vio/Tréguennec,
d'un 1er hiver le 4 décembre ; en janvier (19-21-26-27-31)
en baie de Douarnenez au Ris ou au port (un 1er hiver).

En Loire-Atlantique, le 1er janvier un 2ème hiver et deux
individus (1/1er hiver et 1/2ème hiver) du 15 janvier au
26 février au port de la Turballe.

GOELAND MARIN (*Larus marinus*) 5 données

Les plus gros effectifs d'hivernants observés en baie de Morlaix (29N) : 180 à la mi-janvier et en baie de Douarnenez (29S) : 30 au Ris le 24 décembre et le 11 janvier.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) 30 données

L'espèce a connu une véritable hécatombe cet hiver, des dizaines de milliers d'oiseaux sont morts, probablement victimes des conditions météorologiques qui les ont empêché de se nourrir normalement pendant quelques semaines. Un phénomène comparable avait déjà touché la Mouette Tridactyle en 1957. Il ne semble pas que le supplément de mortalité soit de nature à engendrer des conséquences néfastes à moyen terme pour l'espèce.

Les données que nous possédons ne nous permettent pas d'avoir un aperçu global de la situation car toutes les observations ne sont centralisées.

Quelques observations d'oiseaux vivants :

Côtes-du-Nord

1 individu le 21 janvier à Pordic et 4 à la côte le 27 janvier à Pléneuf.

Finistère

1 individu en ville à Morlaix le 7 janvier, 6 en baie de Morlaix le 25 janvier et 10 le 4 février ; au port de Douarnenez 20 le 17 novembre, 80 le 19 janvier et 150 lors de la tempête du 27 janvier.

Morbihan

Au port de Lorient 10 le 30 janvier, 50 le 1er février et 50 le 7 février. A Beg Ar Goalennec/Quiberon, observations de 18 en 1 heure le 11 février, 22 en 30 minutes le 18 décembre et 30-50 en 1 heure le 15 janvier.

Loire Atlantique

Au port de la Turballe : 35 le 14 janvier, plus de 30 le 22 janvier, 100 le 28 janvier. Notons 1 adulte le 28 janvier au Marais de Grée, Ancenis.

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*) 18 données

La baie de Morlaix et l'estuaire de la Penzé, bien suivis nous fournissent 11 observations dont nous retenons les maximas :

5 en Penzé, le 25 décembre,
2 en rivière de Morlaix les 7 et 14 janvier.

Trois autres observations nous proviennent de la côte nord du Finistère :

- 1 à Goulven le 27 décembre,
- 1 à Moulin-Mer/Logonna-Daoulas le 13 février,
- 2 à Lampaul-Plouarzel le 26 février.

Mais il s'agit peut être dans ces deux derniers cas, d'indices de migration pré-nuptiale.

Cinq données sont originaires du sud de notre région, ce qui est peu :

- 1 le 27 décembre au Croisic (44),
- 1 le 13 janvier au port de La Turballe (44),
- 2 le 15 janvier au Croisic et 2 au Conguel/Quiberon (56),
- 3 enfin le 28 janvier à Etel (56).

ALCIDES SP (*Alcidae* sp) 2 données

Le 11 décembre, 217 individus observés en 1 heure, en vol vers le sud-est, à Beg ar Goalenec/Quiberon (56),
le 27 décembre, 6 entre Belle-Ile et Quiberon (56).

GUILLEMOT DE TROIL (*Uria aalge*) 26 données

Cette espèce a aussi payé un lourd tribut au mauvais temps cet hiver, par exemple : 93 oiseaux échoués du 15 janvier au 3 mars entre Etel et Penthievre/Quiberon.

A noter : 7 individus en baie de Douarnenez (29S) le 17 novembre et 6 en baie des Trépassés/Plogoff (29S) le 6 février.

PINGOUIN TORDA (*Alca torda*) 32 données

Beaucoup de données concernent les oiseaux trouvés échoués vivants ou morts mazoutés ou non. Notons que toutes les données d'observations et d'échouages n'ont probablement pas été centralisées. Cette espèce a encore été lourdement touchée cet hiver 1983-84. Notons, 10 individus en baie de Morlaix le 25 décembre ; 10 en rade de Brest le 19 décembre ; 10 en baie de Douarnenez le 9 janvier et 7 individus entre Quiberon et Belle-Ile le 28 décembre.

MERGULE NAIN (*Plautus alle*) 10 données

Beaucoup de données pour cette espèce, les conditions climatiques ayant provoqué un échouage important, notons :

1 individu le 14 janvier à Beg ar Scaf/Brignogan (29N) et 2 individus vivants mais épuisés (puis morts) le 16 janvier à Ménez Ham/Kerlouan (29N).

Toutes les autres données ne concernent que des oiseaux morts :

le 24 décembre : 1 mort à l'anse de Kerguelen/Larmor (56) ; 2 cadavres à Penbé/Mesquer (44) le 15 janvier ; 2 cadavres à Plomodiern, 3 à Kervel/Plonévez-Porzay (29S) ; 1 à Guidel Plage et 1 à Suscinio/Sarzeau (56) le 22 janvier ; 1 à St Anne-La-Palud/Plonévez-Porzay (29S) le 9 février et du 24 janvier au 9 février : 9 échoués entre Etel et Penthievre (56) plus 1 écrasé sur une route ! Par ailleurs, 1 cadavre à Herlin/Belle-Ile fin janvier.

MACAREUX MOINE (*Fratercula arctica*) 8 données

Un nombre record de données qui sont surtout constituées de découvertes de cadavres (20) entre le Finistère-Nord et la presqu'île de Quiberon.

A noter : 11 cadavres entre Etel et Penthievre/Quiberon (56) du 15 janvier au 3 mars.

PIGEON COLOMBIN (*Columbia oenas*) 6 données

3 le 10 décembre à la Grande Prée/Varades (44), 33 le
8 janvier à la Prairie de la Sauterelle/Thouaré (44) et
10 en dortoir le 8 février à l'hippodrome de Lamballe (22).

Sur les sites de reproduction, on note :

20 dont 5 chanteurs le 13 février à Keroual/Guilers (29N),
1 chanteur à Kerfily/Elven (56) le 18 et 3-4 à St Julien/
Locquénoilé (29N) le 4 mars.

PIGEON RAMIER (*Columbia palumbus*) 7 données

Quelques groupes importants sont notés dans le Finistère
et les Côtes-du-Nord :

300-400 à Kerogan/Quimper (29S) le 3 décembre, 300 en
dortoir à Carcado/St Gonnery (22) le 30 décembre et 200
à Toulven/Quimper (29S) le 28 février.

Les premiers chanteurs sont signalés le 11 janvier de
Langueux (22) et de Quimperlé (29S).

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) 4 données

12 à Loudéac (22) le 20 décembre.
18 à Beaufort/Paimpol (22) le 27.
12 à Port Legui/St Briec (22) le 25 février.
Un couple construit à Morlaix (29N) le 11 mars.

CHOUETTE EFFRAIE (*Typo alba*) 14 données

1 individu de la sous espèce orientale *Guttata* le
15 décembre à Larmor (56) et 1 nid à Coatacorn (22) le
13 janvier.

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*) 2 données

1 le 5 février à Romagné (35).
1 chanteur à Les Croix/Ploufragan (22) le 15 mars.

L'espèce s'est raréfiée dans de nombreuses régions de
Bretagne ; elle est à noter systématiquement.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) 9 données

A noter, deux cas de chants diurnes :

l'un d'un individu à 15 heures le 10 janvier à St Ilan/
Langueux (22),

l'autre concerne deux individus le 10 mars à 14 heures,
en Forêt du Pertre (35).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) 1 donnée

15 en dortoir à la Plouzière/Petit Auverné (44) le
14 janvier.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) 10 données

4 observations de la fin novembre à la fin janvier :

1 le 29 novembre à Tréogat (29S).

1 le 9 décembre à Varades (44).

1 le 19 décembre à le Clévieux/Trévé (22).

1 le 28 janvier à l'aérodrome de Rennes-St-Jacques (35).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) 1 donnée

1 le 27 décembre à St Guénolé/Penmarch (29).

C'est la donnée la plus tardive enregistrée à ce jour en
Bretagne.

MARTIN PECHEUR (*Alcedo athys*) 25 données

Les données proviennent surtout du littoral où les hiver-
nantes sont plus nombreux. Quelques observations dans l'inté-
rieur :

1 le 11 décembre à la Tourneraie/Goven (35), 3 le 29 dé-
cembre au Yeun/Elez (29N), 2 le 2 janvier à Bosméléac/
Le Govéo (22), 1 le 3 à Gouarec (22), 1 le 12 à l'étang
de Corong/Glommel (22), 1 le 21 janvier à Paintourteau/
Erbrée (35) et 1 le 9 mars à Lamballe (22).

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*) 1 donnée

1 le 16 décembre à Légénèse/Carnac (56).

Cette donnée exceptionnellement tardive est à rapprocher de celle du Martinet Noir. Dans de telles conditions, les chances de survie de ces insectivores sont faibles. Il existe quelques cas similaires dans les Iles Britanniques.

PIC CENDRE (*Picus canus*) 4 données

A Kéronic/Pluvigner (56), 1 chanteur le 19 février, 3 le 4 mars, 1 couple et 1-2 chanteurs le 11 mars. En Forêt du Gâvres (44), 4 le 24 février.

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) 1 donnée

Repasse infructueuse le 19 novembre en Forêt de St Mars La Jaille (44) alors que l'espèce y était noté le 5.

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*) 15 données

Les tambourinages sont notés à partir du 27 décembre.

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) 7 données

1 le 4 février en forêt de Rennes (35) ; le 5, 1 en forêt de Fougères (35) et 1 couple plus 1 individu en forêt de Villecartier (35) ; 1 chanteur le 18 février à Kerfily/Elven (56) et à Keronic/Pluvigner (56) le 19 ; 6 individus le 24 en forêt du Gâvres (44) et 4 le 26 en forêt de Lanvaux (56).

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) 10 données

Cette espèce irrégulièrement répartie dans la région est signalée durant la période à St Gonnery (22), Landivisiau (29N), Plestin Les Grèves (22), Plérin (22), Fougères (35), Planguénoual (22), Guilers (29N), Perret (22), Douarnenez (29S) et Ploufragan (22).

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*) 12 données

Des hivernants sont signalés sur le littoral du Morbihan, dans des sites traditionnels : Lorient et Erdeven, et de la Loire-Atlantique.

Quelques données intérieures retiennent l'attention ;

3 le 20 décembre à La Cholière/St Herblain (44) ; 2-3 en janvier à Clisson (44) et 1 le 10 mars à Tréhorenteuc (56).

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) 8 données

Quelques bandes : 16 le 11 décembre à la Janetrie/Vigneux (44) ; 8 le 27 décembre au Bridon/La Varenne (44) ; 13 le 5 et 17 le 19 février à la Landette/Meslin (22) ; 20 à 25 le 5 février à Thouaré (44).

Dans le Morbihan, des chanteurs sont notés le 21 janvier à Bieuzy-Lanvaux/Pluvigner, le 18 février aux Tours d'Elven et le 5 mars à la Barrière/Pluvigner.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) 14 données

Quelques groupes importants sont notés en Loire-Atlantique et dans les Côtes-du-Nord :

80 le 29 novembre à Thouaré (44), 170 à la Villecalaire/Loudéac (22), le 9 et 130 à la Villedenio/Loudéac le 28 décembre. Plus de 300 le 25 janvier à la Grande Prée de Varades (44). Le premier chanteur est entendu le 5 janvier à Guidel (56).

PIPIT DE RICHARD (*Anthus novaeseelandiae*) 2 données

Originnaire d'Asie Centrale, cette espèce est rare mais régulière en Europe Occidentale, à des dates souvent tardives.

2 le 27 novembre au Fort-Bloqué/Ploemeur (56) et 1 le 8 janvier à Falguérec/Séné (56).

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) 1 donnée

1 donnée très précoce : 2 chanteurs à Lorient (56) le 28 février.

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) 30 données

78 le 22 novembre dans les marais de Couëron (44) ; 40 entre Ste Luce et Thouaré (44) et 30 à St Cadou/Sizun (29) le 4 décembre. 1er chanteur le 4 mars à St Jean/St Pol-de-Léon (29).

PIPIT SPIONCELLE ALPIN (*Anthus spinoletta spinoletta*) 9 données

Les données proviennent surtout de zones humides intérieures.

En novembre : 85 sur la Loire à Nantes, Ste Luce et Thouaré (44), le 20 : 2 au Drennec/Sizun (29N) le 26 ; 3-4 au Beffou/Loguivy-Plougras (22) et 1-2 au Gouic/Guerlesquin (29N) le 27.

En décembre : 50 sur la Loire à Ste Luce et Thouaré (44), le 4 ; 1 au Cranic/Brech (56), le 24 ; 1-2 au Beffou/Loguivy-Plougras (22), le 26 ; 3 au Yeun Elez (29N) le 29.

Une seule donnée pour le reste de la période : 1 le 4 février à l'Aber/Crozon (29N).

PIPIT MARITIME (*Anthus spinoletta petrosus*) 6 données

Le 1er chanteur est noté le 4 mars à la Groue/St-Pol-de-Léon (29N).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) 12 données

Sur la Loire à Nantes, Ste Luce et Thouaré (44), 25 le 22 novembre et 15 le 4 décembre.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) 12 données

2 données de dortoirs :

Plus de 3000 le 17 décembre à la gare de Rennes (35) où la sous espèce *Yarelli* est majoritaire et 850-900 à la Criée du port de Douarnenez (29S) le 14 mars avec une quasi-totalité de *Yarelli*.

13 *Yarelli* pour 47 types le 28 janvier dans les Marais de la Grée/Ancenis (44).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) 8 données

1 chanteur à Nantes-Savenay (44) le 23 novembre.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochrurus*) 17 données

Les observations proviennent principalement du littoral. 1 ♂ à Rennes. St Laurent (35) le 19 novembre, 1-2 à Chateaulin (29N) le 20 ; 1 au Perche/St Pierre Quiberon (56), le 26 ; à Tréboul/Douarnenez (29S), 1 les 27 novembre et 22 février ; au Ri/Douarnenez, 1-2 dont 1 ♂

du 29 novembre au 13 février ; 1 le 11 décembre au Conguel/Quiberon (56) ; 1 le 25 à Primel/Plougasnou (29N) ; 1 ♂ le 31 à Perello/Ploemeur (56) ; 1 dans l'anse d'Yffiniac (22) et 1 ♂ à Locquirec (29N) le 7 janvier ; 1 à Kerroch/Ploemeur (56) le 10 ; 1 à Portivy/St Pierre Quiberon (56) le 29 ; 1 ♂ à la Réserve de Goulien (29S) le 6 février ; 1 à la ZIP de Brest (29N) le 9 ; 1 à St Brieuc (22) le 19 et 1 à Ste Anne/St Pol-de-Léon (29N) le 11 mars.

TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*) 9 données

1er chanteur le 13 mars à Poullan/Mer (29S).

MERLE NOIR (*Turdus merula*) 9 données

Le 1er chanteur est noté le 1er janvier à Le Fros/
St Samson (22).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) 12 données

Pas de bande importante de la mi-novembre à la fin-décembre où les effectifs augmentent : 200-250 à la Sauterelle/Thouaré (44) le 30, 60-70 à Bortifaouen/Sauzon (56) le 31. En janvier et février, les groupes ne dépassent pas 40 individus. Puis 54 à Villeglaye/La Chèze (22) le 12 mars.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) 8 données

Le 1er chanteur est signalé le 29 novembre de Mauves (44).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) 9 données

1 chanteur à Cast (29S) le 17 décembre.
1 couple alarme à Douarnenez (29S) le 14 mars.

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) 2 données

A Pentrez/St Nic (29S), 1 chanteur les 27 février et 7 mars.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) 7 données

L'espèce est présente en zone côtière pendant toute la période, des chants sont même notés le 28 décembre à Belle-Île (56). L'observation la plus remarquable est celle d'un individu dans les landes de Lanfains (22) le 28 décembre, première donnée en ce lieu.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) 9 données

L'espèce est notée régulièrement sur toute la période, tant à l'intérieur que sur la côte. Elle a été observée le 19 novembre à la Bernardière/St Herblain (44), région où elle est rarement notée.

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) 11 données

L'hivernage est constaté à Lorient, Quimper, Morlaix et Rennes. A Quimper, où l'espèce n'est plus vue pendant plusieurs semaines, les hivernants apparaissent début décembre pour repartir plus tard dans l'hiver. Le retour de l'espèce y est noté à partir du 6 mars.

D'autre part, les premiers chanteurs sont entendus le 18 février à Elven (56) et le 10 mars à Morlaix (29N).

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*) 6 données

L'espèce n'est signalée qu'à partir de fin décembre, mais les observateurs la notent-ils systématiquement ? Le premier chant est entendu le 10 février à Meslin (22), mais la période de chants réguliers et assidus ne débute que le 8 mars.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*) 2 données

Un chant hivernal est entendu le 3 décembre à Plourin Lès Morlaix (29N). Le premier chant printanier est entendu le 1er mars à Douarnenez (29S).

ROITELET TRIPLE BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) 11 données

L'espèce est très régulièrement notée à partir du 17 décembre jusqu'en fin de période, et en tous lieux.

A Morlaix (29N), dans un site où l'espèce est notée sédentaire/nicheuse, les premiers chants apparaissent le 12 février pour devenir quasi quotidiens ensuite.

MESANGE A MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*) 4 données

L'espèce n'est notée que sur le littoral du Morbihan et de la Loire-Atlantique.

MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*) 1 donnée

1 chant à Morlaix (29N) le 29 janvier.

MESANGE NOIRE (*Parus ater*) 7 données

L'espèce est notée pendant toute la période.

De nombreux chanteurs sont entendus dans les landes de Lanvaux (56) à partir du 19 février.

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*) 2 données

Premiers chanteurs à Morlaix (29N) le 24 décembre et à Poullan-sur-Mer (29S) le 31 janvier.

MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) 1 donnée

Premier chanteur à Morlaix (29N) le 12 février.

SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europea*) 2 données

Premiers chanteurs à Morlaix le 25 décembre et à Douarnenez (29S) le 13 mars.

TICHODROME ECHELETTE (*Tichodroma muraria*) 1 donnée

Un individu est observé à Préfailles (44) le 11 février. En Loire-Atlantique, où il était d'observation régulière autrefois, il n'a pas été noté depuis 1973.

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Cettia brachydactyla*) 2 données

Premiers chants à Morlaix (29N) le 28 janvier et à Douarnenez (29S) le 22 février.

MESANGE REMIZ (*Remiz pendulinus*) 5 données .

Cette espèce accidentelle dans l'ouest de la France a été notée régulièrement pendant plus d'un mois et demi en Loire-Atlantique à partir du 11 novembre.

Toutes les données proviennent de Congor/Guérande (44) !

3 individus capturés le 15 décembre, 6 observés le 18 décembre, 7 le 22 décembre, 3-4 le 27 décembre et 1 le 28 décembre.

PIE GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*) 1 donnée

1 le 15 mars à Plélan Le Petit (22).

PIE BAVARDE (*Pica pica*) 1 donnée

300 en dortoir à Massigné/La Chapelle/Erdre le 27 février.

CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) 4 données

4 couples sont notés au début du printemps dans le Cap Sizun (29S) :

le 28 février, 2 individus à la Pointe du Raz/Plogoff et 2 au Milinou/Goulieu ; le 8 mars, 2 individus à Kerhano/Clédén Cap Sizun et 2 à Castelmur/Clédén Cap Sizun.

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) 6 données

Quatre de ces données concernent des oiseaux sédentaires observés en agglomération : Moncontour (22), Bégard (22), Guingamp (22) et Gouarec (22). L'autre donnée concerne vraisemblablement des oiseaux hivernants erratiques : 8 individus au Resto/Loudéac (22) le 28 février sur un labour.

Enfin, une grosse bande de 500 à la Haie/Vigneux (44) le 7 janvier.

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) 10 données

Des bandes d'hivernants d'importances diverses (de 4 à 400 individus) sont observés régulièrement jusqu'à fin février, même sur les Iles :

4 individus à Borthélo/Le Palais-Belle Ile (56) le 23 novembre.

En outre, une corbeautière de 30 nids notée le 10 mars à Penzé/St Thégonnec (29N), sera détruite par la suite.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*) 2 données

Deux rassemblements d'hivernants ont été notés :

60 individus à Planguenoual (22) le 5 février et 40 individus au Bois de Coët-Logon (22) le 19 mars.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) 9 données

Le 29 novembre, 2 individus à Sauzon/Belle-Île (56) ; le 3 décembre, 17 individus dans une carrière à Concarneau (29N) ; le 11 février, 11 individus à Penzornou/Carantec (29N) ; le 28 janvier, 2 individus à Languieux (22) ; le 13 février, 1 individu près d'un site à Moulin Mer/Logonna Daoulas (29N) ; le 4 mars, 1 individu à l'étang de Kerhuon (29N) ; le 7 mars, 3 ♀ couvant sont notées sur la côte orientale des Côtes-du-Nord : Erquy, Anse du Jas/Fréhel, et anse des Sévignés/Fréhel.

Sur la face nord de la presqu'île de Crozon (29N), des oiseaux ont été observés construisant.

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) 4 données

Un dortoir de plus de 500 000 individus est dispersé au fusil à la Grange/Loudéac (22) le 11 novembre.

A Rennes (35), deux dortoirs de plus de 100 000 individus notés le 21 décembre sont dispersés le 30 décembre avec succès par la méthode d'effarouchement acoustique Gramet.

Enfin, un dortoir de plus de deux millions d'individus est noté au moulin de St Caradec (22) le 29 décembre.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) 5 données

200 individus à Thouaré-sur-Loire (44) le 30 décembre et 150 à 200 dans les Praires des Mauves/Nantes le 1er janvier.

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) 11 données

Quelques fortes bandes sont observées pendant l'hiver :

200 à St Géréon (44) le 28 novembre, 200 à Trohelleuc/Loudéac (22) le 8 décembre, 210 à la Ville aux Veneurs/Trévé (22) le 15 février.

Les premiers chants sont notés le 19 janvier à Gosné (35) et le 10 février à Nantes (44).

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) 11 données

L'espèce est notée pendant toute la période. A Plouzané (29N) des déplacements vers l'Est sont observés le 16 novembre et les 1er et 2 décembre et correspondent vraisemblablement à des passages de migrants. En outre quelques bandes importantes sont notées çà et là :

50 dans les marais de la Boire de Mauves/Thouaré (44) le 17 décembre, 100 à l'étang du Blavet/Maël Pestivien (22) le 9 janvier et 40 à Kerhenriette/Colpo (56) le 3 mars.

SERIN CINI (*Serinus serinus*) 3 données

Phénomène assez rare : 20 individus sont observés au Fort Bloqué (56) le 19 novembre. D'autre part au Diben/Plougasnou (29N) et dans la région le chant est régulièrement entendu à partir du 31 décembre et ce dès que le soleil apparaît.

VERDIER (*Carduelis chloris*) 8 données

Quelques rassemblements sont observés :

100 à St Mars de Coutais (44) le 13 novembre, 60 à St Cadou/Sizun (29N) le 4 décembre et 150 à Ville aux Veneurs/Trévé (22) le 15 décembre, 50 en bord de Loire/Le Cellier le 29 février.

Le premier chant est noté le 4 mars à Morlaix (29N).

CHARDONNERET (*Carduelis carduelis*) 6 données

Quelques bandes importantes d'hivernants sont également notées chez cette espèce :

150 à Plouhinec (56) le 22 janvier et 100 à la Ville aux Veneurs/Trévé (22) le 15 février.

Les premiers chanteurs sont entendus à Plouénan (29N) le 4 mars.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) 22 données

Le Tarin est noté très régulièrement pendant toute la période. Des oiseaux se déplaçant vers l'Est sont fréquemment observés dans le Nord Finistère jusqu'à la mi-décembre :

20 à Ste Anne du Portzic/Brest le 2 décembre, 15 à Loperhet le 3 décembre, 4 à Crozon le 3 décembre et 2 à Plouzané le 16 décembre.

Deux mâles chanteurs sont entendus à Keronic/Pluvigner (56) le 11 mars.

LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*) 5 données

Cette espèce montre de gros ressembllements hivernaux :
400 à Varades (44) les 19 novembre et 3 décembre, 750
sur les herbus d'Yffiniac (22) le 25 janvier et 412 à la
Ville Cario/La Bouillie (22) le 18 février.

SIZERIN FLAMME (*Carduelis flammea*) 2 données

3 (2 ♂ et 1 ♀) sont observés le 10 janvier au Grand-
Cordel/Rennes (35) et 3 le 24 janvier à Cesson-Sévigné
(35).

BECCROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) 6 données

Le phénomène le plus marquant de cet hiver au niveau des
Passereaux est certainement l'invasion de Beccroisés observée
dans le Morbihan et en Loire-Atlantique.

En Morbihan, l'espèce est entendue au Rond Point de
l'Etoile/Camors le 19 février, puis 1 ♂ et 2 ♀ sont observés à
Botségalo/Granchamp le 3 mars ; le 4 mars 3 ♂ et 1 ♀ parquent à
Keronic/Pluvigner ; 11 individus dont un couple transportant du
lichen sont vus à Lambel/Camors ainsi que 8 oiseaux à Floranges/
Camors.

Enfin, le 11 mars des cris sont entendus à Keronic/
Pluvigner et un couple est revu construisant à Lambel/Camors.

En forêt du Gâvres (44), 10 + 6 individus sont notés le
24 février, puis des bandes de 2 à 10 individus sont observés
régulièrement jusqu'en fin de période. L'effectif total de ce
site est évalué à 100 individus.

GROS BEC CASSENOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) 5 données

Toutes proviennent d'Ille-et-Vilaine et de Loire-
Atlantique. Une observation est à remarquer :

11 individus à la Gournerie/St Herblain (44) le 19
février.

BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*) 3 données

Un individu est observé parmi des Bruants des roseaux à
St Armel (56) le 16 février. En Baie du Mont-St-Michel (35), 8
individus sont observés le 18 février et 3 le lendemain.

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivialis*) 6 données

L'espèce est notée en faible nombre (1 à 2 individus) sur tout le littoral et pendant toute la période.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) 4 données

Un chanteur est entendu le 17 février à Meslin (22) ; puis chants réguliers à partir du 10 mars.

BRUANT ZIZI (*Emberiza circlus*) 5 données

A Douarnenez (29S), le chant est entendu par intermittence pendant toute la période, ainsi qu'à Poullan-sur-Mer (29S) à part du 27 décembre.

Des rassemblements hivernaux d'une dizaine d'oiseaux sont notés en Loire-Atlantique.

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) 5 données

Au Ris/Kerlaz (29S), un dortoir de quelques centaines d'individus est occupé pendant l'hiver, essentiellement en novembre et décembre. Un autre dortoir de 150 à 500 individus est suivi dans l'anse d'Yffiniac (22) jusqu'à la fin de février, date à laquelle il est abandonné. Dans ce même lieu, 87 oiseaux sont bagués le 17 décembre.

En Loire-Atlantique ; deux dortoirs :


60 dans le Marais de la Boire de Mauves/Thouaré et 150 à Massigné/La Chapelle/Erdre.

BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*) 6 données

Toutes sont littorales et montrent bien le gréganisme de l'espèce pendant la période hivernale.

Au Riz/Kerlaz (29S) un dortoir de 50 à 100 individus est suivi pendant tout l'hiver.

Dans l'anse d'Yffiniac (22) 12 individus sont notés le 17 décembre, 30 à Bordardoué/Le Palais-Belle Ile (56), le 28 décembre et 20 en Baie du Mont-St-Michel (35) le 18 février.



ACTUALISATION DU STATUT DE LA MOUETTE MELANOCEPHALE (*Larus melanocephalus*) EN BRETAGNE

par Pierre YESOU et Alain THOMAS

Considérée comme accidentelle en Bretagne voici seulement quelques années, la Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) y a fait l'objet de nombreuses observations depuis décembre 1978. Nous émettions alors l'hypothèse d'une évolution du statut régional de l'espèce (Thomas & Yésou 1980). Les données obtenues depuis cette synthèse permettent maintenant de mieux cerner ce statut, et de le discuter.

LES OBSERVATIONS

Pour ce qui est des données antérieures à 1979, le lecteur se reportera utilement à notre précédent travail (Thomas & Yesou 1980). Signalons cependant la publication récente (Ar Vran 10, 1983 : 20) d'observations alors inédites : le nombre d'individus reportés en 1974 s'élève donc à dix.

De janvier 1979 à avril 1984

Pour cette période, 207 données sont disponibles. Ces données correspondent à quelque 700 "jours-individus", l'âge précis des oiseaux (selon les catégories proposées par Grant 1982) étant mentionné dans 83,5 % des cas. On a 60 observations en 1979, 39 en 1980, 18 en 1981, 37 en 1982, 33 en 1983, 20 de janvier à avril 1984 ; soit une assez remarquable stabilité du nombre annuel d'observations (de l'ordre de 35 à 40 par an), si l'on considère que :

- la fréquence d'observation nettement supérieure à la moyenne en 1979 tient à l'intensité des recherches entreprises alors (Thomas & Yésou 1980), intensité qui s'est émoussée depuis. Elle s'explique de plus par un phénomène d'estivage qui ne semble pas s'être reproduit (cf. infra),
- la collecte des données s'est faite de façon bien moins systématique à partir de fin 1980, et n'a été relancée qu'en 1983 (Ar Vran, Bull. liaison n° 28). De ce fait, nous sommes certains que bien des observations ne nous ont pas été transmises pour l'année 1981,

- de 1980 à 1983, les observations réalisées de janvier à avril représentent une proportion extrêmement constante (50 à 56 %, moyenne : 53 %) du total annuel. Les 20 données obtenues de janvier à avril 1984 correspondraient donc à un total annuel théorique de 35 à 40 observations.

Cycle annuel de présence

L'espèce est observée tous les mois de l'année (figure 1). Elle est cependant très rare dans notre région entre mai et juillet : à quelques exceptions près (1 individu à Belle-Ile le 01.05.83, 2 à Trégunc vers le 15 mai 1981, 1 en Loire-Atlantique le 10 Juin 1983, 2 à Douarnenez le 22 juillet 1982), les données de ces trois mois se rapportent toutes à l'estivage noté en Cornouaille en 1979.

Le passage printanier est le plus marqué. Il concerne surtout des oiseaux de première année : 66 % des individus signalés en mars et avril. Le passage de ces jeunes immatures (10 mars au 4 mai, date moyenne : 15 avril) est plus étalé et significativement plus tardif que celui des adultes (7 mars au 13 avril, date moyenne : 4 avril). Un décalage dans les dates de passage d'oiseaux d'âges différents a déjà été signalé en Angleterre (Hume 1976), dans le Nord de la France (Milbled & Apchain 1978), ainsi qu'en Vendée (Yésou 1984).

En fin d'été, quelques adultes et sub-adultes apparaissent dès le début d'août, mais le passage qui semble se dessiner jusqu'en septembre est relativement faible. Malgré quelques observations précoces d'oiseaux en plumage juvénile (1 le 26 août 1982 et 1 le 4 septembre 1980 à Douarnenez), les individus de première année apparaissent généralement bien tardivement, surtout à partir de novembre.

La présence hivernale est faible, et n'est régulièrement notée qu'en une seule localité : sur 35 données de décembre et janvier provenant de 13 sites, 21 (60 %) concernent la seule baie de Douarnenez.

Distribution géographique

Malgré un nombre bien supérieur de données, la répartition des observations dans l'espace (carte 1) ne diffère guère de celle obtenue en 1980 : seulement 9 localités nouvelles sont signalées. Soulignons particulièrement deux données du Trégor, brisant le hiatus qui existait entre les observations du nord-est de la Bretagne et celle du Léon, et surtout l'obtention de quelques contacts dans le sud de la région :

Belle-Ile, estuaire de la Vilaine, cours de la Loire. Avec une observation en 1974 au réservoir du Vioreau, celles de 1983

sur la Loire (Recorbet & Le Bail 1984) fournissent les seules mentions réellement intérieures.

Observations dans les colonies de Laridés

La présence d'immatures dans la colonie de mouettes tridactyle (*Rissa tridactyla*) du Cap Sizun, déjà signalée en 1979 et 1980, a de nouveau été constatée, le 20 mars 1981, le 5 avril 1982 et les 7 et 12 avril 1984. Les 8 avril 1982 et 1er mai 1983, un oiseau de première année était posé avec les mouettes tridactyles nichant à Belle-Ile.

DISCUSSION

Les données bretonnes dans le statut européen de l'espèce

La Mouette mélanocéphale se reproduit avant tout en Mer Noire, et la Méditerranée constitue le principal centre d'hivernage de l'espèce (pour la synthèse chiffrée la plus récente, voir Isenmann *in* Glutz & Bauer 1982). Certains oiseaux se dirigent toutefois vers le nord-ouest à l'automne : ils rejoignent la Baltique et la Mer du Nord *via* le cours des fleuves (carte 2). Un axe de transit important semble être constitué par le Danube puis le Rhin, si l'on en juge par la relative fréquence des cas de nidification sur le bassin de ces fleuves, et par celle des observations automnales (exemple du lac de Neuchâtel : Sermet & Muriset 1982). Une partie au moins des mouettes atteignant la Mer du Nord redescend ensuite vers la zone secondaire d'hivernage de l'espèce que représente le golfe de Gascogne (Mayaud 1954, Tekke 1976, Milbled & Apchain 1978). Les données bretonnes s'inscrivent parfaitement dans ce schéma. Elles confirment de plus le retour printanier des oiseaux du golfe de Gascogne vers la Mer du Nord : ceci avait déjà été avancé par Milbled & Apchain (1978) et Thomas & Yésou (1980), mais nous manquions jusqu'à présent d'éléments illustrant la régularité de ce mouvement de retour.

Il faut ici préciser que le retour printanier vers les sites de reproduction de la Mer Noire n'est pas prouvé pour les oiseaux rejoignant la Mer du Nord. Au contraire, nombre de Mouettes mélanocéphales restent nicher au nord de leur aire de répartition (carte 2). A ce sujet, rappelons la nidification de trois couples en 1984 en Vendée, dans une colonie de Mouettes Rieuses (*Larus ridibundus*) (Yésou 1984). L'installation de nicheurs en Bretagne n'est donc pas une hypothèse à exclure, et nous ne pouvons qu'inciter les observateurs à rechercher attentivement l'espèce au sein des colonies de Mouettes Rieuses, mais éventuellement au sein des colonies de sternes caugek (*Sterna sandvicensis*) avec lesquelles l'association est parfois notée (Taverner 1970).

Les observations ne sont qu'un reflet infidèle du statut réel de l'espèce

Les données sont pour l'essentiel obtenues lors du passage prénuptial. A cette époque les adultes migrent rapidement et sans escale prolongée vers les lieux de nidification (Milbled & Apchain 1978). De ce fait, l'importance du flux d'adultes transitant par nos côtes a toute chance d'être sous-estimée. Quelques contacts obtenus lors d'observations des mouvements en mer vont dans ce sens : 1 adulte en vol vers l'est le 5 avril 1981 au Cap Fréhel, 7 adultes en déplacement migratoire vers le nord en une heure d'observation près de la Pointe du Raz le 8 avril 1982. Seule une intensification du "sea-watching" permettrait de mieux cerner le déroulement et l'intensité du passage printanier des adultes.

Par ailleurs, il est certain que la répartition géographique des observations est fortement biaisée par un manque d'homogénéité dans l'effort de prospection. On se souviendra par exemple que les seules reprises de bagues obtenues en Bretagne proviennent du Morbihan (1 donnée) et de Loire-Atlantique (2 données ; voir Thomas & Yésou (1980)). Il faut admettre que ces reprises reflètent la présence d'un certain contingent de Mouettes mélanocéphales : la rareté des données dans ces deux départements ne peut donc objectivement pas correspondre à une réelle absence d'oiseaux (1).

Il est également possible qu'une prospection plus étoffée dans le sud de la Bretagne, c'est-à-dire en bordure de l'aire d'hivernage atlantique de l'espèce, accroisse le poids relatif des données hivernales. Rappelons ce que disaient déjà Jonin & Le Démezet en 1972 : "si la Mouette mélanocéphale est peu observée en Bretagne, c'est sans doute plus un défaut d'identification qu'une réelle absence, car nous sommes tout de même à la limite de l'aire d'hivernage de cette espèce". Nous partageons cette opinion, que nous allons maintenant développer.

Il y a-t-il une réelle évolution du statut de l'espèce en Bretagne ?

L'accroissement spectaculaire des observations de Mouettes mélanocéphales dans notre région à partir de 1979 nous semblait pouvoir s'expliquer par la conjugaison de deux facteurs : un éventuel accroissement du passage de l'espèce, lié à son évolution générale à l'échelle de l'Europe (voir Milbled & Apchain (1978), Glutz & Bauer (1982), et surtout un désintérêt des ob-

(1) Quelques observations récentes en Loire-Atlantique (annoncées dans le bulletin du G.O.L.A., n° 3/1984) confirment cette analyse. Ces données n'ont malheureusement pas été transmises pour l'élaboration de la présente synthèse.

servateurs pour les laridés de taille moyenne (Thomas & Yésou (1980)). Il faut ici rappeler que les oiseaux de première année fournissent actuellement les deux-tiers des observations bretonnes. Or, c'est à cet âge que l'identification de la Mouette mélanocéphale est la plus délicate. Ajoutée au peu d'intérêt manifesté par les observateurs, cette fréquence des cas difficiles permet de mieux comprendre la rareté antérieure des mentions de l'espèce.

Par ailleurs, le nombre annuel moyen d'observations semble stable depuis 1980 : une telle situation est peu vraisemblable dans le cas d'une espèce dont le statut serait en plein changement. Pour tenter de voir ce qu'il serait d'une réelle évolution, essayons de supprimer le biais occasionné par nos propres recherches de l'espèce et par la stimulation que ces recherches ont suscitée chez d'autres observateurs, particulièrement en Finistère. En dehors du Finistère, et en dehors de nos observations personnelles en d'autres départements, seulement 1 à 4 données nous ont été communiquées chaque année : soit une situation analogue à celle enregistrée de 1968 à 1978 (Thomas & Yésou - 1980). On objectera bien sûr avec raison que, même sans la "découverte" de l'espèce en 1979, quelques contacts supplémentaires auraient été obtenus en Finistère : aurait-on pour autant largement dépassé les 9 données de 1974 ?

Comme par ailleurs, les seules mentions de groupes importants continuent à provenir des sites cornouillais sur lesquels nous avons attiré l'attention, force est à présent de penser que l'évolution apparente du statut de la Mouette mélanocéphale en Bretagne est essentiellement un artéfact dû à une amélioration de la quantité et de la qualité d'observation.

CONCLUSION

La "découverte" de la Mouette mélanocéphale en Bretagne est peut-être en partie le reflet de l'évolution du statut de cette mouette à l'échelle de l'Europe (Thomas & Yésou - 1980). L'analyse des données obtenues de 1979 à 1984 ne montre toutefois aucun changement dans le statut régional de l'espèce. Au contraire, plusieurs éléments paraissent illustrer une stabilité de la situation : l'évolution apparente s'explique avant tout par une amélioration de la densité et de la qualité des prospections.

Malgré une nette progression dans notre connaissance du statut régional de l'espèce, une forte hétérogénéité subsiste dans la répartition géographique de l'effort de prospection. De ce fait, si l'on peut considérer connaître maintenant de façon satisfaisante le statut de la Mouette mélanocéphale à la pointe de la Bretagne, bien des inconnues demeurent à l'échelle de la

région. Il y a-t-il d'autres sites de stationnement que la baie de Douarnenez ? La zone d'hivernage du golfe de Gascogne s'étend-elle jusqu'au sud de la Bretagne ? Cette mouette ne fréquenterait-elle pas d'autres colonies de laridés que celles de mouettes tridactyles ? Quel est le déroulement réel de la migration pré-nuptiale des adultes ?

Un acquis important est la mise en évidence de la jonction régulière Mer du Nord - golfe de Gascogne, et retour, via la pointe de la Bretagne. Une pression d'observation accrue est nécessaire pour parfaire notre connaissance du statut de la Mouette mélanocéphale dans notre région.

=====

Remerciements

J.P. ANNEZO, J.N. BALLOT, P. BECHET, J.P. BEON, Y. BERTAULT, M. COSSEC, J.P. CUILLANDRE, E. DANCHIN, J. DAVID, D. FLOTE, J.Y. FREMONT, G. GELINAUD, Y. GUERMEUR, J. HAMON, E. DE KERGARIOU, L. LAMBERT, J.P. et P. LE MAO, G. LESAFFRE, G. LORCY, J. MAOUT, B. QUIDEAU et H. YESOU, ainsi que de jeunes Helvètes anonymes, ont bien voulu nous faire part de leurs observations. Qu'ils en soient sincèrement remerciés, tout comme ceux dont les observations ont permis la compilation des synthèses également utilisées dans le cadre de cette étude : actualités ornithologiques d'Ar Vran, bulletins de liaisons régionaux d'Ar Vran, bulletins de la section cornouaillaise d'Ar Vran.

Références

- GLUTZ, V.N. et K. BAUER (1982) - Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 8. Frankfurt-am-Main
- GRANT, P.J. (1982) - Gulls : a guide to identification. Calton : Poyser
- HUME, R.A. (1976) - The pattern of Mediterranean Gull records at Blackpill, West Glamorgan. Brit. Birds 69, 503-505
- JONIN, M. et M. LE DMEZET (1972) - Mouettes et Goélands. Penn-ar-Bed 8 (70), 313-320
- MAYAUD, N. (1954) - Sur les migrations et l'hivernage de *Larus melanocephalus*. Alauda 22, 225-245.

- MILBLED, T. et C. APCHAIN (1978) - Nidification et migrations de la Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* sur le littoral du Nord de la France. Alauda 46, 235-256
- RECORBET, B. et J. LE BAIL (1984) † Avifaune de la vallée de la Loire à l'amont de Nantes, ou le chaînon manquant : premier résultats. Bull. G.O.L.A. 2, 38-70
- SERMET, E. et J.C. MURISSET (1982) - Le passage et l'hivernage des Laridés sur le Haut-Lac de Neuchâtel. Nos Oiseaux 36, 197-232
- TAVERNER, J.H. (1970) - Mediterranean Gulls nesting in Hampshire. Brit. Birds 63, 67-79
- TEKKE, M.J. (1976) - (Ringed Mediterranean Gulls *Larus melanocephalus* from the Black Sea area, recovered in the Netherlands). Limosa 49, 217
- THOMAS, A. et P. YESOU (1980) - La Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) en Bretagne. Ar Vran 9, 11-20
- YESOU, P. (1984) - La Mouette mélanocéphale a niché en Vendée. Gorgebleue, sous presse.

Pierre YESOU

101, rue du 8 mai

85340 OLONNE-SUR-MER

Alain THOMAS

Kernelbet, Kerlaz

29100 DOUARNENEZ

LEGENDE DES ILLUSTRATIONS





Figure 1 - Effectif minimal des Mouettes mélanocéphales observées en Bretagne par périodes de cinq jours, janvier 1979 à avril 1984.


Remarques :

1. L'âge des oiseaux est connu avec précision pour près de 85 % des données.
2. Le 1er juillet est arbitrairement retenu comme date de passage à la classe d'âge supérieure.
3. Afin d'éviter les doubles décomptes, les données obtenues en un même site sur une même période de cinq jours ne sont pas additionnées : seuls les effectifs maximaux de chaque tranche d'âge sont pris en considération.


Carte 1 - Répartition géographique des observations de Mouettes mélanocéphales en Bretagne, janvier 1979 à avril 1984. Les cercles évidés localisent les observations antérieures à la période d'étude.

Carte 2 - Répartition générale de la Mouette mélanocéphale en Europe. Les cercles évidés localisent les principales colonies, pour lesquelles le nombre de couples est précisé. Les sites de reproduction occasionnelle ou régulière en dehors de l'aire principale sont symbolisés par des points. Le cours des principaux fleuves permettant la jonction "Mer Noire/Mer Baltique - Mer du Nord" est schématisé. (D'après YESOU - 1984).





Carte 1 - Répartition géographique des observations de Mouettes mélanocéphales *Larus melanocephalus* en Bretagne, janvier 1979 - avril 1984. Les cercles évidés localisent les données antérieures à la période d'étude.



ATELIER OFFSET DE LA FACULTE DES SCIENCES DE BREST - 3ème TRI-
MESTRE 1984 - Directeur de la publication : J.Y. MONNAT. Dépôt
légal 4ème trimestre 1984.
