

PRESENCE DE L' ECHASSE BLANCHE (Himantopus Himantopus)
SUR LES MARAIS DE FALGUEREC ET DU GOLFE DU MORBIHAN

par André FORLOT

1 - MIGRATION ET REPARTITION EUROPEENNE

L'hivernage de l'espèce est localisé en Afrique, du Sud-Saharien à l' Equateur.

En mars, s'effectue la remontée vers l'Europe. Les premières arrivées sont régulièrement enregistrées autour du 20 mars. Sur la réserve de Falguérec, l'observation la plus précoce se situe un 21 mars. Les adultes non nicheurs quittent la Bretagne dès la fin juillet. Les nicheurs et les jeunes partent de la mi-août au début septembre.

L'espèce est essentiellement méridionale. Depuis un demi-siècle, l'aire de répartition évolue vers le nord. Les pays d'accueil sont l'Espagne (Baléares comprises), le Portugal, la France, l'Italie, la Grèce, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et plus ou moins occasionnellement la Belgique, la Hollande, l' Angleterre (1945 et 1983), l'Allemagne, l' Autriche et la Tchécoslovaquie.

En France, l'Echasse niche en Camargue et en quelques autres points du littoral méditerranéen, le long de la façade atlantique de la Gironde au golfe du Morbihan et plus ou moins régulièrement sur le littoral nord-est de la Manche et à l'intérieur en Brenne, Sologne, Dombes et Forez.

2 - STATIONNEMENT DE L' ECHASSE EN FRANCE

La nette augmentation du nombre d'individus en 83 ne surprend pas l'ornithologue averti. La fluctuation de l'effectif d'une année sur l'autre est un phénomène bien connu pour cette espèce.

Elle s'explique par ses exigences quant aux sites de reproduction et en particulier , son extrême sensibilité aux niveaux des eaux.

Il suffit, lors de sa migration de printemps, que les conditions météorologiques soient défavorables dans les pays les plus au sud pour qu'il y ait une "invasion" spectaculaire aux limites nord de sa zone habituelle de répartition.




I. ZONE D'HIVERNAGE DE
LA POPULATION OUEST
EUROPEENNE.

II. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE
DE L'ECHASSE NICHEUSE EN
FRANCE. D'après enquête
B.I.R.O.E. / L.P.O.

-PH. DUBOIS & R. MAHEO (oct.82)

ESTIMATION DES COUPLES
NICHEURS : 800 à 900



Par exemple, pluies abondantes ou sécheresses dans les lagunes marocaines obligeront des milliers d' Echasses à poursuivre leur voyage vers l'Europe à la recherche de lieux propices pour nidifier.

La nidification s'effectue à même le sol, sur la vase sèche ou de petits monticules de terre. Quelques brindilles délimitent le nid. Ce frêle édifice est à la merci d'une montée des eaux un tant soit peu importante. Inversement, l'absence d'eau est préjudiciable à l'existence même des jeunes.

L'on comprend mieux ainsi, pourquoi certaines années, l'Echasse est abondante sur un site, mais absente d'autres années. L'espèce vit un nomadisme latent dû aux conditions très difficiles qu'exige leur reproduction.

Les résultats des recensements de limicoles du B.I.R.O.E (Bureau international de recherche sur les oiseaux d'eau communiqués par Roger Mahéo et concernant le mois d'avril 1983 donne une assez bonne idée de la répartition de l'espèce en France :


- Estuaire de la Seine : 16
- Golfe du Morbihan : 15
- Baie de Bourgneuf : 16
- Marais d'Olonne : 22
- Ile de Ré : 49
- Ile d'Oléron-Seudre : 85
- Baie d'Yves : 40
- Littoral Languedoc-Roussillon : 372
- Littoral Camargue + Salines : 4 (recensement incomplet)
- Salins des Pesquiers : 12
- Littoral Méditerranée (reste): 10

A titre de comparaison, les dénombrements d'avril sur la réserve de Falguérec/Sené donnaient un effectif maximum de 65 individus et faisaient de ce site un lieu majeur de stationnement pour l'espèce en France en 1983.

3 - BILAN DE LA NIDIFICATION SUR LA RESERVE BIOLOGIQUE DE FALGUEREC ET LES MARAIS DU GOLFE DU MORBIHAN. - 1983 -

Dès le 21 mars, 3 échasses sont présentes à Falguérec. Elles fréquentent indifféremment le plus vaste bassin du Grand Falguérec et ceux de la réserve. La première quinzaine d'avril est déterminante pour le choix des sites de nourrissage et de nidification. Le bassin n°3 de la réserve où la circulation des eaux est mise en continue depuis peu accueille le plus grand nombre d'oiseaux.

La colonie s'installe du 15 avril au 31 mai.




Le 15 avril, les deux premiers nids sont construits sur ce même bassin. Des déplacements de quelques individus sont observés vers d'autres anciens marais-salants de la presqu'île de Séné comme ceux de Bindre et de Michotte-Kerarden.

La première semaine de mai, la moitié de la population nicheuse est en place.

Le tableau ci-dessous montre l'évolution et la répartition de la population au cours du mois d'avril sur l'ensemble du marais de Falguérec :

Dates	Réserve			Grand Falguérec	Total général
	Bassin 1	Bassin 2	Total		
4			0	6	6
9			17	0	17
11	4	4	8	X	8+
15	6	28	34	18	52
18	8	30	38	23	61
19	13	21	34	20	54
24	19	21	40	10	50
27	31	20	51	14	65




1. Sur la réserve, 40 nids sont construits et occupés. Mais de fortes pluies en avril et l'intrusion de chiens au début de juin vont provoquer l'abandon de quelques nids. 37 couples nicheurs sont recensés. Le premier poussin est observé le 13 Mai.

2. D'autres sites sont utilisés autour du Golfe du Morbihan. Il n'existe pas de recensement précis, mais il est possible à partir des données de quelques observateurs d'estimer le nombre de couples nicheurs en 1983.

Réserve de Falguérec	Grand Falguérec	Bindre	Brouël	Michotte Kerarden	Noyalo	Penn an Toul Larmor Baden	Etier de Caden	Total Golfe
Sené								
37	10	2-3	5-10	QQ Cpls	1	3-5	1	59-70 min.

C'est un effectif record qui s'est reproduit en 1983 dans le golfe du Morbihan plus de la moitié de celui-ci s'est installé dans la réserve de Falguérec. La faible surface utilisable par les oiseaux s'est trouvée compensée par la maîtrise totale du niveau d'eau et l'aménagement approprié des bassins.



Le nombre élevé d'échasses enregistré sur la réserve et le golfe est à placer de toute évidence dans le cadre d'un phénomène invasionnel. La tentative de reproduction d'au moins 3 couples en baie d'Audierne (29) (B. BARGAIN/SEPNB 29-S) 16. années après la précédente et première nidification sur ce secteur en est une preuve supplémentaire.

Années	1965	1966	1967	1968	1969	1971	1972	1973	1979	1980	1981	1982	1983
Réserve de Falguérec	21	12/15	8	2/3	0		0		4/5	8	15	4	37
Narais de Séné Golfe du Morbihan					0	1	0	1				25	25-30

Evolution de l'effectif nicheur d'échasse dans le golfe du Morbihan et dans la réserve de Falguérec.

L'échasse, limicole spectaculaire et original, n'a guère fait l'objet jusqu'à présent de recherche sur sa biologie de reproduction à la différence de l'avocette par exemple. Malgré la fluctuation des effectifs, sa présence régulière dans la réserve de Falguérec et la mise en place de conditions d'observation favorable devrait permettre à l'avenir de se pencher avec plus d'attention et de précision sur ce sujet

André FORLOT
Route de Mériadec
56000 PLESCOP

BIBLIOGRAPHIE

- Références : HISTOIRE ET GEOGRAPHIE DES OISEAUX NICHEURS DE BRETAGNE
Y. GUERMEUR - J.Y. MONNAT (1980)
- 1968 - AILES ET NATURE (M.C - D.L.° p. 21 - 1969
- 1980 - J. DAVID - C. CHARLES
- 1982 - GEROUDET - Limicoles, gangas et pigeons d'Europe
Volume 1 - Delachaux et Niestlé 1982.