

ANNALES ORNITHOLOGIQUES DE LA RESERVE DE TRUNVEL

16 novembre 1988 au 15 novembre 1989

Bruno BARGAIN - Berthie DREZEN - Jacques HENRY - Alain THOMAS

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) 10 données
Guère d'éléments nouveaux pour la présente période.
Effectif nicheur apparemment stable.

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*) 3 données
Le fait marquant est la diminution très importante de l'effectif reproducteur. Pour 1987, celui-ci était estimé à 10-15 couples, alors qu'en 1989, le Castagneux n'est observé qu'une seule fois pendant la période de nidification (2 le 20 mai) et son chant n'a jamais été noté !
Par ailleurs, 1 le 9 décembre et 7 le 7 octobre.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) 1 donnée
1 le 11 mars : sans doute le reflet du passage prénuptial de l'espèce.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) 16 données
En hiver, maximum de 11 en janvier, 15 en février, 6 en mars.
Encore 10 en avril et 8 en juin. Comme l'année précédente, aucune observation pendant le mois de juillet. Le passage postnuptial culmine en septembre : 50 le 25.

BUTOR ETOILE (*Botaurus stellaris*) 34 données
L'espèce est présente en toute saison, mais il n'est jamais observé plus de 3 individus à la fois. Le chant n'est entendu qu'à trois reprises du 5 mai au premier juin. le mois d'août apporte la première preuve de la reproduction du Butor en baie d'Audierne : un jeune non volant est découvert mort le 6 dans la roselière de Trunvel. Par ailleurs, signalons l'utilisation de la réserve comme zone de gagnage par au moins un adulte cantonné à Loc'h-ar-Stang.

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minimus*) 1 donnée
2 oiseaux dont un chanteur le 28 mai.

HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*) 2 données
Apparition éphémère: 1 immature le 25 mai.

HERON CRABIER (*Ardeola ralloides*) 3 données
Deuxième apparition de ce héron méditerranéen en baie d'Audierne : 2 à 3 individus séjournent du 21 au 28 mai.

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) 8 données

Aucune donnée printanière bien que l'espèce soit désormais très commune toute l'année en rivière de Pont-l'Abbé, distante d'une douzaine de kilomètres.

En revanche, l'Aigrette est très régulière lors de la dispersion postnuptiale : 1 le 31 juillet et le 2 août, puis 18 le 3, 40 le 7, 18 le 12, 15 le 23, 11 le 24. Peu d'oiseaux à l'automne : 3 le 26 septembre, 3 le 6 octobre et 1 le 11 novembre.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) 10 données

Présence quotidienne. Aucun fait marquant à signaler.

HERON POURPRE (*Ardea purpurea*) 6 données

Première observation d'un adulte le 14 avril.

Un contact obtenu avec un juvénile le 8 août repose la question de la reproduction de l'espèce en baie d'Audierne.

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) 1 donnée

1 le 26 mai.

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) 7 données

3 en vol le 9 juin.

Passage postnuptial noté à partir du 22 août. Par la suite, 8 individus stationnent du 25 au 28 septembre.

CYGNE TUBERCULE (*Cygnus olor*) 7 données

5 oiseaux le 23 novembre, 7 le 10 janvier.

La première preuve de reproduction pour l'espèce à Trunvel est apportée le 28 mai lorsque un poussin est observé en compagnie d'un couple. La famille est retrouvée les 3 et 4 juin. le poussin mourra par la suite.

Fin juin, 7 individus et 10 le 24 septembre.

CYGNE NOIR (*Cygnus atratus*) 3 données

Suite et fin de l'histoire : dernier contact le 24 septembre avec l'individu observé depuis plusieurs années sur l'étang.

OIE CENDREE (*Anser anser*) 5 données

Un individu de la race rubirostris séjourne du 23 novembre au 28 janvier.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) 10 données

Un couple se cantonne de la fin mars à la fin avril et disparaît par la suite.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) 6 données

4 observations en mai : 2 individus du 19 au 26 mai.

Passage postnuptial classique en septembre : 1 le 2 et 8 le 25.

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) 17 données

L'espèce est présente toute l'année. Les effectifs les plus importants sont observés l'hiver : 30 le 9 décembre, 35 le 13 janvier. Au printemps, on note régulièrement la présence de 4/6 individus avec un petit passage en mai : 12 le 26. Le 8 août, un couple est observé accompagné de 3 poussins.

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) 8 données
Maximum hivernal de 80 individus à la mi-janvier.
Espèce absente de mai à fin juillet.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) 14 données
50 individus le 12 décembre.
La première famille est notée le 26 mai. Les regroupements habituels sont observés au cours de l'été: 300 le 7 août par exemple. Comme les années précédentes, peu d'oiseaux après l'ouverture de la chasse : le 6 novembre, il n'en reste que 25.

CANARD PILET (*Anas acuta*) 11 données
Au printemps, un mâle du 22 avril au 2 mai.
7 observations concernant le passage postnuptial qui s'étale du 2 septembre (1 individu) au 14 octobre (1 individu), avec un maximum de 18 le 12 septembre.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*) 12 données
Premiers retours le 19 février avec 2 individus.
Bien que régulièrement notées au cours du printemps, les "bandes" restent maigres, ne dépassant pas ... 4 individus.
Derniers contacts avec 2 couples le 3 juin et absence d'indice pertinent de reproduction.

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) 16 données
Le maximum d'oiseaux est observé au cours du mois de décembre: 60/70 le 9.
Baisse d'effectif en janvier: 8 le 4 et 24 le 13. Aucune donnée en février.
Passage pré-nuptial classique en mars-avril (voir graphique).
Un mâle le 19 juin. La reproduction de l'espèce n'a pas été prouvée en 1989.
En novembre, 10 le 6.

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) 1 donnée
Un mâle le 19 novembre.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) 22 données
Faible hivernage. En novembre, maximum de 4 individus le 19 ; en décembre, 11 le 12 ; en janvier, 75 le 13 et 5 le 5 février.
Aucune donnée pour les mois de mars et avril.
Une femelle est observée à trois reprises en mai et juin ainsi que 2 individus en août.
Passage postnuptial en octobre-novembre : 18 le 5 octobre, 32 le 17, 70 le 6 novembre.

FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*) 3 données
Un les 6 août, 20 septembre et 19 octobre.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) 17 données

Très faible hivernage. Aucune donnée pour le mois de novembre; l'espèce est absente en décembre ; maximum de 15 oiseaux le 13 janvier et aucun contact en février.

4 le 17 mars ; les 8 individus observés le 26 avril doivent être le reflet d'un passage. Le mois de juin totalise 7 observations : encore 5 le 2, un couple les 3 et 7 et 2 mâles les 4 et 11. Pas de preuve de reproduction.

Passage postnuptial en octobre-novembre : 12 le 19 octobre et 20 le 6 novembre.

FULIGULE A BEC CERCLE (*Aythya collaris*) 2 données

Une femelle les 5 et 11 novembre.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*) 3 données

2 le 9 décembre, 5 le 18; 12 le 13 janvier.

HARELDE DE MIQUELON (*Clangula hyemalis*) 1 donnée

Un mâle le 18 décembre.

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*) 4 données

Hiver doux : seulement une femelle du 26 novembre au 13 janvier.

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*) 1 donnée

Un migrateur le 2 septembre.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) 4 données

Ce rapace est observé toute l'année. On note jusqu'à 8 individus à la fois. Effectif reproducteur: 4/5 couples. Les premiers envols de juvéniles sont notés le 19 juin.

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) 8 données

Observé régulièrement d'août à mars chassant autour de l'étang (à chaque fois un individu).

Encore une femelle le 2 mai.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) 1 donnée

Un oiseau le 16 septembre. Pour la deuxième année consécutive, l'espèce est observée à la mi-septembre.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) 4 données

Espèce présente toute l'année.

Un couple mène 4 jeunes à l'envol.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) 2 données

2 le 17 décembre.

2 migrants le 8 avril.

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*) 4 données

Le 3 juillet, une famille avec 3 juvéniles volants.

FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*) 1 donnée
Un subadulte le 28 mai.

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*) 5 données
Une femelle le 18 novembre, 1 le 26 puis 1 femelle le 17 mars.
Un immature le 25 septembre et 1 femelle le 6 octobre.

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*) 18 données
L'espèce est à nouveau régulièrement observée pendant les mois de mai et de juin (17 des 18 données). Aucune preuve de reproduction, mais celle-ci est néanmoins à considérer comme possible lorsque l'on connaît la discrétion de l'espèce pendant la période d'incubation et les premières semaines de l'élevage des poussins à l'aire.
Le premier individu est contacté le 19 mai ; ils sont au moins 2 du 20 au premier juin, 3 le 6. Dernière observation du mois de juin : 1 le 17.
Par la suite, 1 le 16 octobre.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) 5 données
Un le 20 janvier.
Une femelle les 6 et 7 octobre. 1 mâle le 5 novembre.

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*) 1 donnée
Une le 11 octobre.

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) 9 données
En hivernage, 375 le 4 janvier, 210 le 13 et 600 le 26.
36 individus seulement sont notés le 17 mars, époque à laquelle de nombreux reproducteurs sont déjà cantonnés dans la roselière et donc difficiles à observer.
90 le 25 mai, 120 le 3 juin, 210 le 9. Comme signalé précédemment, l'augmentation du nombre de foulques observées sur l'eau libre en fin de printemps est à relier au fait qu'à cette époque les oiseaux quittent le couvert des roseaux.

HUITRIER-PIE (*Haematopus ostralegus*) 11 données
Effectifs du même ordre de grandeur que ceux rencontrés en 1987-1988. Le pic printanier porte sur 101 individus le 19 avril. Début juin, 60 individus sont notés et 10/20 individus ont estivé.

ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) 3 données
7 les 20 et 21 mai; 1 le 2 juin.

AVOCETTE ELEGANTE (*Recurvirostra avosetta*) 1 donnée
Un oiseau le 28 mai.

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) 16 données
Courant avril, un couple se cantonne à la brèche. Les 4 individus observés le 10 juin constituent sans doute le groupe familial.

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) 7 données

Passage prénuptial : 4 le 6 avril, 29 le 23 et 30 le 25 ; encore 10 le 19 mai, 2 le 26.

Deux observations en juin : 3 le 6 et 5 le 7.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) 12 données

Le retour de l'espèce est observé à partir du 6 avril et un couple est cantonné le 25. Un maximum de 14 individus est observé le 19 mai. On peut regretter le manque de données concernant les regroupements postnuptiaux très importants dans le secteur de la brèche.

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*) 5 données

25 le 18 janvier, 70 le 10 février.

Passage vers le sud le 10 novembre.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squatarola*) 4 données

Passage prénuptial : 5 le 19 avril, 1 le 25, 2 le 28 mai.

1 le 11 novembre.

TOURNEPIERRE A COLLIER (*Arenaria interpres*) 1 donnée

2 le 19 mai.

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) 15 données

400 en décembre, 550 en janvier, 450 en février.

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*) 8 données

Passage prénuptial du 5 mai au 4 juin : 34 le 5 mai, 2 le 19, 5 les 26 et 28; 1 les 3 et 4 juin.

Passage postnuptial : 1 le 27 août.

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) 12 données

L'hivernage se situe à un niveau très moyen : 48 le 13 janvier, 18 le 5 février.

Le passage prénuptial est bien net : 40 le 6 avril, 270 le 19, 400 le 23, 330 le 25, 81 le 26 ; 120 le 19 mai, 130 le 26 ; il reste encore 20 oiseaux le 3 juin et 57 le 9.

Aucune donnée pour le reste de l'année.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) 1 donnée

Un le 5 août à la brèche.

BECASSEAU TACHETÉ (*Calidris melanotos*) 1 donnée

Une donnée printanière : 1 le 13 mai.

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) 6 données

Observations particulièrement abondantes au printemps et ... aucune à l'automne : 3 le premier avril, 27 le 5 mai, 1 le 19, 11 le 21, 1 le 28 et 2 le 3 juin.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) 10 données

Passage prénuptial : 60 le 25 avril ; 8 le 19 mai, 17 le 26 ; 12 les 3 et 7 juin, 8 le 19.

Aucune donnée pour le reste de l'année.

BECASSEAU COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) 5 données

9 le 9 décembre. Rappelons que la baie d'Audierne constitue l'un des rares sites d'hivernage de l'espèce dans le Finistère.

Passage prénuptial : 2 le 27 mars et 2 le 19 mai.

2 individus le 3 juin.

Passage postnuptial : 1 mâle le 17 juillet.

BECASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*) 1 donnée

2 le 25 novembre.

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) 7 données

Au printemps, 1 le 16 avril.

Passage postnuptial : 1 le 17 juillet ; 5 le 3 août, 9 le 5 ; 7 le 2 septembre et 6 le 7 octobre.

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) 16 données

Première observation de 6 individus le 25 mars, puis 15 le 28 et encore 16 le 6 avril.

Des comportements de défense de territoire notés en avril permettent d'envisager la réinstallation de l'espèce à Trunvel.

Seulement une observation lors de la migration postnuptiale : 1, le 2 septembre.

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) 12 données

Toutes les observations concernent le passage prénuptial : 3 le 6 avril, 120 le 19, 16 le 23, 25 le 24, 28 le 26 ; encore 10 le 19 mai, 1 le 26, puis 1 le 19 juin.

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) 3 données

Passage prénuptial : 7 le 25 avril.

1 le 3 juin et 4 le 11 novembre.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) 2 données

Passage prénuptial : 4 le 5 mai.

Passage postnuptial : 1 le 8 août.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) 3 données

Seule une observation concerne avec certitude le passage prénuptial : 7 le 24 mai.

Par ailleurs, 1 le 9 juin.

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) 9 données

Passage prénuptial du 23 mai au 4 juin avec un maximum de 5 individus.

Passage postnuptial du 5 août au 7 septembre avec un maximum de 4 individus.

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) 6 données

Le passage postnuptial débute le 5 juillet: 1 individu ; puis 2 le 29 juillet. Par la suite, des isolés jusqu'au 11 novembre.

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) 6 données

Les 2 individus notés le 5 juin sont vraisemblablement le reflet de la fin du passage prénuptial. Plus délicate est l'interprétation de l'observation réalisée le 19 juin et concernant 2 individus. En revanche, l'oiseau du 5 juillet est à considérer comme un migrateur postnuptial, le passage se poursuivant jusqu'au 2 septembre ; il n'est jamais observé plus de 2 individus à la fois.

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*) 18 données

La remontée prénuptiale s'esquisse durant la première décade de mars avec 10 individus le 4, puis 155 le 27. Le passage culmine vers le 18 avril avec 1000/1500 individus. Les variations journalières sont à cette époque liées aux déplacements des oiseaux qui se nourrissent alternativement soit au large en baie sur le haut de marée soit en chassant des insectes au dessus des étangs de la baie ! Les effectifs chutent rapidement courant mai et seuls quelques immatures séjournent jusqu'au 6 juin.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) 3 données

1100 le 26 janvier ; 750 le 10 février et le 8 mars.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) 1 donnée

2 le 5 février.

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) 2 données

300 le 26 janvier, 500 le 5 février. Ces deux observations pourraient concerner le début du passage prénuptial.

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) 1 donnée

200 le 26 janvier.

GOELAND MARIN (*Larus marinus*) 1 donnée

10 le 26 janvier.

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*) 3 données

Premier retour le 27 mars.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) 13 données

Premier retour le premier avril et pic de passage pendant la deuxième décade de mai avec 17 individus.

Un couple se reproduit sur le nichoir où un poussin est observé le 5 juillet.

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*) 3 données

Maigre passage du 26 avril au 8 mai avec un maximum de 6 individus.

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) 11 données

Passage prénuptial du 23 avril (4 individus) au 27 mai (8 individus), le maximum d'oiseaux étant observé durant la première décade de mai, avec 13 le 5 et 53 le 8.

Passage postnuptial: 3 le 2 septembre et 6 le 9.

Comme les années précédentes, le nombre d'oiseaux observés est sensiblement plus faible en fin d'été qu'au printemps.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) 1 donnée

8 le 24 avril.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) 6 données

L'espèce n'est pas notée avant le 28 mai ! Et le dernier contact est obtenu le 6 octobre. Entre ces deux dates, peu de choses à retenir ; signalons simplement une phase rousse le 3 juin.

MARTINET NOIR (*Apus apus*) 5 données

Première apparition de migrants le 15 avril avec 4 individus.

Concentration record de 7500 (!) le 27 mai. Derniers contacts postnuptiaux les 5 et 7 août (1 individu).

GUEPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*) 2 données

Une seule donnée printanière: 1 le 8 mai. Lors de la période d'émancipation des jeunes, des bandes relativement importantes peuvent être observées sur la réserve : 22 le 8 août.

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*) 2 données

Un le 3 juin et le 4 août.

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*) 1 donnée

1 juvénile le 19 juin.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) 3 données

Espèce présente toute l'année ; elle niche sur les dunes tant au nord qu'au sud de la réserve.

Le premier chanteur est noté le 26 janvier.

Début du passage postnuptial le 4 octobre ; le 25, 750 en début de matinée vers le sud.

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) 2 données

Arrivée classique durant la deuxième quinzaine de mars : 75 le 20 et 150 le 27.

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*) 1 donnée

1 le 10 octobre.

Au printemps, l'espèce n'est observée qu'à la fin avril-début mai, à l'époque du plus fort du passage prénuptial. Elle disparaît totalement pendant la période de reproduction et le passage postnuptial concerne seulement quelques oiseaux.

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*) 2 données
Deux contacts. Un classique le 9 septembre (1 individu) et un moins banal le 11 juin, sans doute un migrateur tardif.

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) 5 données
Net passage entre le 24 août (15 individus) et le 4 octobre avec 2 en vol vers le sud.

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) 3 données
10 le 10 janvier.
Passage postnuptial: 20 le 2 octobre et 200 le 25.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*) 9 données
Motacilla flava flavissima
Les 2 premiers oiseaux sont vus le 27 mars.
Un petit passage postnuptial est décelable à l'automne: 15 le 24 septembre.
Motacilla flava flava * *Motacilla flava flavissima*
Un couple mixte le premier avril.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) 1 donnée
Passage prénuptial: 30 le 24 avril.

GORGEBLEUE A MIROIR (*Luscinia svecica*) 9 données
Passage postnuptial: 8 captures entre le 3 août et le premier septembre et 2 le 7.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochrurus*) 3 données
Quelques indices de passage du 23 octobre au 11 novembre.

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*) 3 données
Passage postnuptial du 2 au 7 septembre ; le 7, 27 individus sont notés.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) 1 donnée
Passage postnuptial : 40 le 4 octobre.

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia Cetti*)
Cette espèce niche communément autour de l'étang.
35 captures au cours de l'année 1989.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) 2 données
Un chanteur le 3 décembre.
La reconquête de la baie d'Audierne se poursuit en 1989.

LOCUSTELLE TACHETEE (*Locustella naevia*) 2 données
Premier chanteur le 23 avril.

LOCUSTELLA LUSCINIOIDE (*Locustella luscinioides*) 2 données
Premier chanteur le 12 avril.

PHRAGMITE AQUATIQUE (*Acrocephalus paludicola*)
122 captures du 4 août au 2 octobre.

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*)
Premier chanteur assez précoce, le 25 mars.
1653 captures.
Dernière observation le 3 octobre.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*)
L'espèce est présente du 8 avril (1 chanteur) au 29 octobre.
958 captures.

ROUSSEROLLE TURDOIDE (*Acrocephalus arundinaceus*) 4 données
Un chanteur cantonné du 28 mai au 10 juin.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) 1 donnée
Une le 3 août.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) 7 données
Premier contact printanier le 23 avril : 1 chanteur.
Des indices de reproduction sont obtenus pour trois sites.
Passage postnuptial en septembre : 1 les 7 et 15 septembre.

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) 3 données
Un chanteur le 23 avril.
Passage postnuptial : 1 capture les 29 août et 11 octobre.

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) 2 données
Début du passage postnuptial le 8 août : 1 individu. Un maximum de 10 est
noté le 2 septembre.

GOBEMOUCHE NOIR (*Muscicapa striata*) 1 donnée
Passage postnuptial : 1 le 8 septembre.

MESANGE A MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*)
102 captures de juillet à octobre.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*) 1 donnée
Une femelle, migrateur précoce, le 2 août.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*) 1 donnée
Un juvénile à Kermenguy le 25 septembre.

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) 3 données
Dès le 23 mai, 30 en dortoir.
Le 25 octobre, 400 en vol migratoire vers le sud et, le lendemain, 30 000
en dortoir.

MARTIN ROSELIN (*Pastor roseus*) 1 donnée
Un juvénile à Stang-wen le 10 octobre.

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) 4 données
Les quatre données concernent le passage postnuptial et sont comprises entre les 4 et 25 octobre ; 250 individus à l'heure en vol vers le sud le 17 et 500 vers le sud le 25.

VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*) 2 données
Passage postnuptial : les premiers migrateurs sont observés à partir du 4 octobre (oiseaux en vol vers le sud); 75 en vol vers le sud le 25 octobre.

CHARDONNET ELEGANT (*Carduelis carduelis*) 1 donnée
Des oiseaux en migration vers le sud le 25 octobre.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) 2 données
Passage postnuptial : 15 vers le sud le 25 octobre et à nouveau des oiseaux en migration vers le sud le 6 novembre.

LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*) 1 donnée
Espèce négligée. Rassemblement postnuptial de 350 individus le 5 août à Kerbinigou.

BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*) 2 données
Un le 7 octobre. L'espèce est contactée annuellement à l'automne en baie d'Audierne.

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) 3 données
Peu d'observations concernant une espèce commune toute l'année à Trunvel. Retenons 10 le 10 janvier et le 2 octobre.

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) 1 donnée
Espèce présente toute l'année et également négligée.
Les oiseaux se regroupent en fin de saison de reproduction : 175 le 4 août.

Liste des observateurs:

Bruno BARGAIN, Berthie DREZEN, Jacques HENRY, Gaël RAULT, Alain THOMAS.