

ANNALES ORNITHOLOGIQUES DE LA RESERVE BIOLOGIQUE DE SENE-FALGUEREC - 1990 -

Rémy BASQUE, Jean DAVID, André FORLOT et Guillaume GELINAUD

L'année 1989 a été celle de l'agrandissement de la réserve. L'hiver 89-90 a été consacré à la restauration de l'hydraulique de ces nouveaux bassins, à la pose d'une première série de clôtures permettant le pâturage sur les bassins B5, B6 et L3. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan de cette extension et de la nouvelle gestion de ces marais, mais d'ores et déjà, deux espèces nicheuses semblent en avoir particulièrement bénéficié : le Vanneau huppé et le Chevalier gambette.

Avant d'aller plus loin dans ce bilan, il semble utile de rappeler un autre point susceptible d'avoir influencé la fréquentation de la réserve par les oiseaux : la chasse au gibier d'eau. Elle a pris fin cette année le 11 février pour reprendre le 26 août.



GREBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis*

1 le 28, 2 le 29 juillet et 1 le 31 juillet. Egalement 1 les 2 et 5 août.


GRAND CORMORAN *Phalacrocorax phalacrocorax*

2 le 1^{er} et 1 le 12 février. 1 à 2 réguliers du 14 au 29 juillet. 1 le 28 novembre et 1 le 27 décembre.

HERON CENDRE *Ardea cinerea*

Durant la majeure partie de l'année quelques individus territoriaux se partagent la réserve. Des rassemblements se produisent lorsqu'une importante quantité de nourriture devient accessible notamment quand le niveau d'eau d'un bassin baisse et piège les poissons. Ces rassemblements sont particulièrement spectaculaires en été, au moment de la dispersion des jeunes, mais peuvent également survenir au printemps comme fin-mai sur le B4. C'est peut-être alors le fait de non-reproducteurs.


HERON CENDRE 1990



AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*

L'Aigrette garzette réagit de façon assez semblable au Héron cendré aux variations de niveau d'eau, au moins au printemps et en été. Des regroupements d'aigrettes se sont également produits en septembre et en novembre. Sensibilité à la chasse différente des deux espèces ? Ou bien, les proies disponibles à ce moment n'intéressaient-elles pas les hérons ?

AIGRETTE GARZETTE 1990



GRANDE AIGRETTE *Egretta alba*

1 du 17 mai au 14 août.


IBIS SACRE *Threskiornis aethiopicus*

1 le 20 mai, 3 le 21, 1 le 23, 1 le 9 juin, 6 le 10 et 3 le 27 juin.


SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*

Année faste pour la Spatule. L'espèce est présente sans interruption de début-février à fin-août et 23 individus sont observés simultanément le 5 mars, un record illustré également par l'évolution de la fréquentation des marais de Séné depuis 1979.

SPATULE BLANCHE 1990



SPATULE BLANCHE
SOMME DES MARS PAR DÉCADE




TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

Les stationnements sur la réserve sont toujours circonscrits à la période février-août. Les plus forts effectifs sont notés à la fin de février.

Cette année, 29 à 36 couples semblent cantonnés sur la réserve. Les premières familles arrivent le 25 mai : 1 couple avec 7 poussins et 1 couple avec 11 poussins sur le B3. Par la suite les déplacements et les mélanges de poussins entre familles ne permettent pas de déterminer le nombre de jeunes fréquentant la réserve, mais les effectifs maxima sont observés peu après la mi-juin avec 53 poussins en 7 groupes.


TADORNE DE BELON 1990



SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

La présence de 4 à 22 individus en janvier fait suite aux stationnements de novembre et décembre 89. Les effectifs augmentent notablement à la mi-février et diminuent ensuite jusqu'à la fin d'avril. L'espèce est observée irrégulièrement pendant l'été, en nombre restreint.

SARCELLE D'HIVER 1990



CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*


Les couples se cantonnent sur le marais à partir de la mi-janvier. L'effectif nicheur atteint probablement 15 couples. Les 2 premières familles sont notées le 25 avril. Au total un minimum de 9 familles est observé ; elles fréquentent principalement les B6 et B9.

Le maximum de l'année est atteint fin-mai, avec une soixantaine d'individus, surtout des mâles, sur le B5.

CANARD PILET *Anas acuta*

Les stationnements diurnes de pilets sur le marais sont limités à deux mois : février et mars !

CANARD PILET 1990



SARCELLE D'ETE *Anas querquedula*


1 couple le 16 mars, 7 le 21 mars. 1 couple et 1 mâle sont ensuite régulièrement observés jusqu'au 26 mai. La discrétion de la femelle entre la mi-avril et la mi-mai permet d'envisager la nidification de l'espèce dans les environs de la réserve, mais probablement sans succès.

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

Les souchets fréquentent la réserve après la fermeture de la chasse et jusqu'à la fin-mars, époque où les effectifs maximums sont enregistrés.

1 mâle fin-mai, 5 mâles à la mi-juin : regroupement de nicheurs locaux ?

CANARD SOUCHET 1990



HARLE HUPPE *Mergus serrator*

1 mâle du 1^{er} au 13 février.

BONDREE APIVORE *Pernis apivorus*

1 les 12 et 16 juillet, 28 et 30 août.

MILAN NOIR *milvus migrans*

1 le 29 avril, 1 régulièrement noté du 9 au 30 juillet, enfin 1 le 20 août.

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus*

Observé toute l'année. 1 femelle capture une Avocette adulte le 24 juin.

BUSARD ST MARTIN *Circus cyaneus*

1 femelle et 1 mâle fréquentent assiduellement les marais jusqu'au début de février. Par la suite 1 mâle les 13 mars et 11 avril, 1 femelle le 25 avril. L'espèce réapparaît à la fin de l'été (1 les 20 août et 3 septembre), mais ne devient régulière qu'à partir de novembre avec de nouveau 1 mâle et 1 femelle.

BUSARD CENDRE *Circus pygargus*

1 mâle immature le 13 mai, 1 mâle le 6 juin et 1 juvénile le 14 septembre.

EPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus*

Observé toute l'année. 1 femelle capture un poussin d'Avocette le 20 mai.

BALBUZARD PECHEUR *Pandion haliaetus*

1 le 29 avril.

CIRCAETE JEAN LE BLANC *Circeatus gallicus*

1 le 12 juillet.

FAUCON EMERILLON *Falco colombarius*

1 le 7 février.

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo*

Observé régulièrement entre le 10 mai et le 24 août. Des transports de nourriture sont notés les 15 juin et 16 juillet en direction du Nord-Ouest de la réserve ; la reproduction est probable sur Séné.

FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

1 le 31 mars, 1 mâle adulte le 1^{er} avril, 1 femelle immature le 20 et 1 le 21 avril. La principale concentration d'oiseaux d'eau du golfe à ce moment de l'année, semble attirer les faucons pèlerins lors de leur migration pré-nuptiale !

De nouveau signalé à l'automne : 1 le 6 octobre.

PERDRIX GRISE *Perdix perdix*

2 couples sur la réserve cette année.

RALE D'EAU *Rallus aquaticus*

1 couple niche dans le B1 : 1 poussin le 16 mai.

MARQUETTE SP *Porzana* sp


1 le 9 novembre.

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus*

3 en vol le 4 juillet, 1 le 15 août et 2 le 26 août.


ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus*

1 le 30 et 2 le 31 mars...15 couples nichent cette année sur la réserve. La diminution d'effectif enregistrée à partir de la mi-juin correspond à l'exode de couples avec de jeunes poussins vers des zones d'alimentation hors réserve. Il peut également s'agir, en partie, d'oiseaux quittant les marais de Séné après un échec de leur reproduction.



Le maximum de l'année est atteint en août à l'occasion de regroupements de familles.

ECHASSE BLANCHE 1990




AVOCETTE *Recurvirostra avocetta*

Les avocettes fréquentent régulièrement la réserve de nuit en février ; que font-elles ? Beaucoup de bruit, mais pour le reste on l'ignore. Toujours est-il que les stationnements diurnes augmentent rapidement en mars, époque où les constructions de nid et les accouplements vont bon train. Faute de pouvoir suivre individuellement les avocettes il apparaît difficile d'estimer précisément le nombre de reproducteurs. Avec les premières éclosions début-mai, le nombre d'adultes fréquentant le marais chute brusquement.


Il ne reste ensuite pratiquement plus que les adultes couveurs ou accompagnés de poussins. Le 16 mai, on dénombre 48 couveurs et 13 familles sur l'ensemble

du marais de Falguérec, dont 21 couveurs et 12 familles sur la réserve. C'est le maximum de reproducteurs observés

simultanément, mais compte tenu des nids abandonnés auparavant (au moins 10 sur la réserve) l'effectif nicheur doit plutôt approcher 90 couples, ce qui indique une nouvelle augmentation de la colonie.



AVOCETTE 1990




PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

2 le 3 avril puis 1 jusqu'au 25 avril. La migration post-nuptiale s'étend du 15 juin au 15 septembre, mais ne concerne que des effectifs réduits (maximum : 3 les 28 juillet et 4 septembre).

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

Présence bien marquée à l'occasion des deux passages.

GRAND GRAVELOT 1990




GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*

1 le 1er avril.

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*

En octobre, des pluviers viennent en nombre inhabituel en reposoir de pleine mer sur la réserve mais faute de tranquillité cette fréquentation demeure éphémère.

PLUVIER ARGENTE 1990





VANNEAU HUPPE *Vanellus vanellus*

Les stationnements hivernaux amorcés fin-décembre 1989 (125 individus) se maintiennent à un niveau semblable en janvier. Une forte augmentation qui porte les effectifs à plus de 400, se manifeste début-février. Ce passage s'achève à la mi-mars et ne laisse plus que les nicheurs sur le site.

15 à 16 couples nichent sur la réserve ce printemps. Cette nouvelle augmentation est probablement à mettre en relation avec l'agrandissement de la réserve puisque l'effectif nicheur du reste des marais de Séné reste stable.

La présence de l'espèce est faible à nulle pendant l'automne et le début de l'hiver cette année.

VANNEAU HUPPE 1990



BECASSEAU MAUBECHÉ *Calidris canutus*

Présent en nombre très restreint lors de la migration de printemps et en été : 1 les 21 avril et 5 mai, 4 le 12 mai, 1 les 10, 12 et 17 juillet ainsi que les 5 et 7 août. Fin-octobre quelques maubèches se mêlent aux autres limicoles en reposoir sur la réserve : 1 le 10, 3 le 16, 6 le 17, 16 le 21, 21 le 25 et 5 le 12 novembre. Cette habitude s'est bien vite perdue !

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

2 le 6 mai.


BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta*

Pour la première fois l'espèce est signalée en hiver sur la réserve : 1 individu fin-janvier et début-février.

Le passage de printemps demeure faible (1 à 4 individus) mais s'étale de début-mars à la mi-mai.

Le passage d'automne donne lieu à un record pour la réserve : 70 fin-septembre !

BECASSEAU MINUTE 1990




BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

1 juvénile le 17 septembre.

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*

Le passage post-nuptial du Bécasseau cocorli est également remarquable cette année, d'abord par l'effectif d'adultes noté fin-juillet (19), ensuite par l'importance des stationnements de juvéniles en septembre.


BECASSEAU COCORLI 1990



BECASSEAU VARIABLE *Calidris alpina*

Les stationnements sur la réserve apparaissent très irréguliers et difficilement interprétables. Ils sont probablement influencés par plusieurs paramètres comme le coefficient de marée, le dérangement, l'existence d'autres reposoirs de marée haute...


BECASSEAU VARIABLE 1990



COMBATTANT *Philomachus pugnax*

Le passage pré-nuptial se déroule de la mi-février à la mi-mai, et culmine fin-mars début-avril avec 60 individus. Le passage post-nuptial s'amorce à la mi-juin lors des premiers retours d'adultes. Le passage des juvéniles débute à la mi-août mais s'interrompt début-septembre avec l'ouverture de la chasse.

COMBATTANT 1990




BECASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago*

Compte tenu du nombre réduit d'hivernants en décembre 1989 et janvier 1990 (maximum : 15), la forte augmentation enregistrée à partir de début-février peut être attribuée sans risque au passage pré-nuptial. Il culmine à la fin de ce mois avec une centaine de bécassines et s'achève fin-avril.

Une première observation le 4 juillet marque le début du passage post-nuptial, sensible uniquement en juillet et août. Il faut ensuite attendre la fin de décembre pour voir de nouveau les bécassines fréquenter en nombre la réserve.

BECASSINE DES MARAIS 1990




BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

Le passage pré-nuptial est sensible du 10 février au 20 avril.

Un seul couple dont le mâle porte une bague jaune à la patte gauche se cantonne sur le B2 à partir du 27 mars. L'incubation commence le 7 mai. Le 26 mai, l'abandon du nid est constaté. Un autre couple parade régulièrement en avril et mai sur le Grand Falguérec sans que l'on ait d'autres indices de reproduction. Il faut également souligner la présence d'une dizaine d'adultes sur le marais à cette époque.

Le passage post-nuptial semble commencer avec le début de juin et culmine de la mi-juillet à la mi-août. Il concerne essentiellement des adultes, sauf en fin de période.

BARGE A QUEUE NOIRE 1990



BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

La Barge rousse fréquente la réserve en nombre supérieur aux années passées, tant au printemps (2 le 21 avril, 21 le 24, 6 le 1er mai, 7 le 24 mai) qu'à l'automne (60 en vol le 13 août, 31 le 4 septembre, 7 le 15 et 2 le 21 septembre).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

La réserve ne joue qu'un rôle secondaire pour cette espèce : 3 le 14 avril, 3 le 25, 8 le 5 mai, 1 les 24 et 26 mai, 1 les 2, 14 et 17 juillet.

COURLIS CENDRE *Numenius arquata*

Hormis 30 en reposoir le 25 janvier sur le B7, le Courlis cendré apparaît marginal à Falguérec : 1 le 21 avril, 1 les 15, 16 et 20 juillet, 2 le 12 août, 1 le 22, 13 le 25 et 1 le 26 août.


CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

La migration de printemps semble se dérouler en deux temps. Un premier pic, noté en février, fait suite à un maximum hivernal de 14 individus en décembre. Un deuxième passage est observé de la mi-mars à la mi-mai.

Le passage d'automne intervient de la mi-juin à la fin-août.

L'hivernage s'annonce réduit cette année : 2 individus en décembre.

CHEVALER ARLOUN 1990


CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

La fréquentation de la réserve ne commence réellement qu'à partir de la mi-mars. Aucun passage pré-nuptial n'est perceptible cette année.


L'effectif nicheur est estimé entre 12 et 14 couples contre 5 l'an passé. Comme pour le vanneau, cette augmentation est principalement à mettre au crédit de l'agrandissement de la réserve.

Le passage post-nuptial est sensible de la mi-juin à la fin-août mais les plus importants effectifs sont notés jusqu'à la fin-juillet.

CHEVALIER GAMBLING EFFECTIVE RICHES



CHEVALIER GAMBETTE 1990




CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia*

Le transit des migrateurs sur la réserve au printemps apparaît bref : il concerne essentiellement le début de mai.

A l'automne, hormis un pic fin-juillet le passage semble plus diffus, de début-juillet à mi-novembre.

CHEVALIER ABOYEUR 1990




CHEVALIER CUL-BLANC *Tringa ochropus*

Le dernier hivernant est noté fin-février. Le passage pré-nuptial s'avère comme d'habitude restreint (1 à 2 individus fin-mars début-avril).

Le passage post-nuptial est bien délimité, de la mi-juin à début-septembre. Les forts effectifs de novembre et décembre sont plus surprenants : dernière vague de migrateurs tardifs ou regroupement d'hivernants?

CHEVALIER CUL-BLANC 1990




CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*

Seulement deux individus isolés au printemps.

La migration d'automne est concentrée de début-juillet à début-septembre.


CHEVALIER SYLVAIN 1990



CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos*

Le passage, noté de fin-juin à fin-septembre, est maximum début-août.

CHEVALIER GUIGNETTE 1990



TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres*

1 les 8, 9, 13 et 14 mai.

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus*

2 le 11 février, 10 le 1er mars, 9 le 1er avril, bon passage du 11 au 18 avril (maximum : 80 le 13). On n'observe ensuite plus qu'un individu le 28 mai et 1 à 2 individus du 17 juillet au 22 août.

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*

1 adulte le 28 juin à Brouël.

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*

1 adulte le 4 juillet.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

1^{ère} le 31 mars... 26 le 13 mai. Les 13 couveurs notés le 24 mai abandonnent leurs pontes dans la nuit du 30 au 31. 2 couples mèneront néanmoins 3 jeunes à l'envol fin-juillet, après une ponte de remplacement.

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*

1 le 12 mai. 1 les 9 et 10 août, 2 le 12 et 1 le 17 août.

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*

1^{er} le 28 mars.

CHOUETTE HULOTTE *Strix aluco*

2 juvéniles le 9 juin.

CHOUETTE CHEVECHE *Athene noctua*

1 chanteur le 16 mars.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*

1 les 2 et 28 décembre.

HUPPE FASCIEE *Upapa epops*

1 les 1^{er} avril et 10 juin puis 1 du 25 au 31 août.

MARTIN PECHEUR *Alcedo atthis*

1 à 2 individus fréquentent la réserve à partir de juillet.

MARTINET NOIR *Apus apus*

1^{er} le 15 avril.

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*

6 le 21 février, 2 le 13 mars, 300 le 25 mars...

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*

Plusieurs dizaines le 4 avril...

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*

Des migrateurs sont notés les 4 et 5 septembre.

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*

35 le 21 février, encore 24 le 2 avril et 1 le 10 avril, dernier de la saison.

De nouveau observé à partir du 23 octobre.

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

10 dont 3 flavéoles le 10 avril.

1-2 couples dans le B8 et 1 couple dans le L3-4.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica*

3 chanteurs dès le 25 mars. La réserve accueille cette année 3 à 4 couples.

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarynchos*

1 chanteur le 18 avril.

TRAQUET TARIER *Saxicola rubetra*

3 les 4, 15 et 26 septembre.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

1 le 10 avril, 2 le 15 septembre et 1 le 1^{er} octobre.

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hypolaïs polyglotta*

1 le 22 juillet.

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata*

Régulièrement observée en hiver, mais l'espèce ne niche pas sur la réserve. Dernière : 1 chanteur le 14 mars.

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*

1^{er} chanteur le 13 avril.

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*

1^{ère} le 19 avril.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*

2 chanteurs le 22 mars, 4 le 26...

BEC CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*

6 en vol le 10 août.

OBSERVATEURS

Ce bilan a pu être établi grâce aux observations de : R. Basque, J. David, D. Ducoin, L. & O. Flahaut, A. Forlot, P. Fortune, J.-P. Fourcade, G. Gélinaud, A. Le Chenadec, A. Le Nevé, F. Le Moenner, F. Mahé, J. Pensu, JF. Robic.