

PARTIE II

BILAN ORNITHOLOGIQUE DES RESERVES DE LA S.E.P.N.B. EN 1980

REDIGE PAR Jacques HENRY.

Les rapports confirment un certain nombre de phénomènes observés depuis déjà plusieurs années comme l'augmentation de Pétel fulmar et des laridés en général.

La pression des Goélants sur les lieux de nidification des sternes contraint celles-ci à quitter certains flots marins pour se rabattre sur des milieux plus intérieurs : phénomène noté pour les Sternes pierregarin et Caugek en rivièrre d'Etel et dans le marais guérandais.

L'utilité des opérations ponctuelles de limitation des laridés est prouvée par quelques exemples :

- maintien de l'effectif nicheur du Macareux moine en Baie de Morlaix ; à noter aussi qu'une prospection sans précédent de Macareux non nicheurs a été relevée cette année,
- élimination de quelques Goélants argentés nichant au milieu de la colonie de Guillemots du Cap-Sizun. Ils occupaient des sites favorables aux alcidés et risquaient de porter préjudice aux poussins de Guillemots
- maintien des colonies de sterne de Trévorc'h, archipel des Moutons, Er Lannig.

En ce qui concerne les alcidés, la tendance à la reprise notée en 1979 pour le Guillemot de Troïl, est confirmée cette année. Pour cette espèce, le nombre des nicheurs croit au Cap-Fréhel et au Cap-Sizun.

Le Pingouin Torda est également en augmentation au Cap-Fréhel. Enfin, des alcidés non nicheurs ont prospecté assidûment des sites de nidification en fin de période de reproduction :

- pour le Guillemot : au Cap-Fréhel, aux Tas de Pois et au Cap-Sizun.
- pour le Pingouin : au Cap-Fréhel et au Cap-Sizun.
- pour le Macareux : en Baie de Morlaix.

Ce phénomène n'avait encore jamais été noté sur les colonies bretonnes d'alcidés.

Plusieurs conservateurs se plaignent des dérangements occasionnés par les naturalistes (observateurs et photographes) qui pénètrent dans les réserves sans autorisation préalable.

MANCHE

Saint-Marcouf

Conservateur : B. BRAILLON, recensement les 17 mai et 7 juin par deux équipes sous la responsabilité de G. DEBOUT et B. BRAILLON.

Grand Cormoran	205 nids
Cormoran huppé	1 nid
Goéland marin	25 couples
Goéland brun	95 couples
Goéland argenté	2500 couples

+ 50 Eiders à duvet le 17.05.

La réserve de Saint-Marcouf, abrite la colonie de Grands Cormorans la plus importante de France, avec celle des Iles Chausey. La baisse d'effectif en 1980 par rapport à 1979 est peu importante (205 contre 217 couples).

Le Cormoran huppé maintient sa nidification dans ce site qui est le plus oriental dans la Manche.

Goélands marins et argentés sont stables par rapport à 1979, mais le Goéland brun voit ses effectifs baisser de façon importante.

ILLE ET VILAINE

Ile des Landes

Conservateur : M.T. OLLIVIER, recensement le 28 mai par A. CANARD, B. LE GARFF, JO LE LANNIC, F. PUSTOC'H, BEAUCOURNU, GUEGUEN.

Grand Cormoran	140/160 couples	
Cormoran huppé	193/200	"
Tadorne de Belon	40/45	"
Goéland marin	25	"
Goéland brun	50	"
Goéland argenté	1160/1300	"
Huitrier pie	1/2	"

Augmentation du Grand Cormoran, du Tadorne de Belon et du Goéland argenté, installation de l'Huitrier pie et stabilité pour les autres espèces par rapport à 1979.

COTES DU NORD

Cap-Fréhel

Conservateur : M. DANAIS, recensement : Y. BOUGAUT, L. LAMBERT.

	Couples présents Kids occupés	Nombre de pontes	Nombre de poussins
FULMAR	> 30	9	4 dont 1 envol
CORMORAN HUPPE	> 400		
GOELAND MARIN	6		
GOELAND BRUN	2		
GOELAND ARGENTE	> 800		
MOUETTE TRIDACTYLE	> 300 245		
PETIT PINGOUIN	12		8/11
GUILLEMOT DE TROIL	75 70		60/70
GRAND CORBEAU	2	0	

En dehors du Goéland marin dont les effectifs sont stables par rapport à 1979, toutes les espèces recensées en 1980 sont en augmentation.
Fulmar : 9 pontes en 1980 comme en 1979.

4 éclosions et le premier envol d'un oiseau né au Cap-Fréhel.
Mouette tridactyle : installation d'une nouvelle colonie de 12 couples.
Alcidés : augmentation du nombre de nicheurs des 2 espèces du Cap-Fréhel
prospection de nouveaux sites par les Pingouins non reproducteurs.

Les chiffres ci-dessus correspondent à l'effectif de l'ensemble du CAP FREHEL et ont été donnés par souci d'homogénéité avec les résultats publiés dans l'annuaire 1979.

En fait, la réserve S.E.P.N.B. de Fréhel, comprend l'Amas du Cap, la petite Fauconnière et la Grande Fauconnière. Sur les trois îlots ont été recensés en 1980 :

- 47-48 couples de Cormorans huppés (recensement partiel pour cette espèce).
- 0-1 couple de Goéland brun.
- 5-6 couples de Goéland marin.
- 57-62 couples de Mouette tridactyle.
- 9-10 couples de Guillemot de Troil.
- 0-2 couples de Pingouin torda.

FINISTERE

Ilots de la Baie de Morlaix

Conservateur - Recensement, E. DE KERGARIOU.

- Cormoran huppé : 53 couples
- Huitrier pie : 13 couples minimum
- Goéland marin : 55/60 couples
- Goéland brun : 22/33 couples
- Goéland argenté : 1023/1100 couples
- Macareux moine : 16/20 couples

Les Cormorans huppés sont en diminution en 1980 par rapport à 1979.

E. DE KERGARIOU estime que la marée noire du Tanio a causé la disparition de 25 % des nicheurs.

Diminution des Goélands par rapport à 1979 en relation avec les campagnes d'éradication. 700 Goélands ont été éliminés.

Huitrier pie et Macareux moine : effectif stable, très vraisemblablement en relation avec l'élimination des Goélands.

En ce qui concerne le Macareux moine, 10/12 oiseaux non nicheurs sont notés le 8/8, visitant des terriers ou des sites inoccupés.

Tréport'h

Conservateur : M. JONIN. Recensement : Max JONIN et Jean Yves MONNAT.

- Huitrier pie : 17/20 couples
- Gravelot à collier interrompu : 3 couples minimum
- Goéland marin : 1 couple

Goéland brun : 1 couple
 Goéland argenté : 20/25 couples
 Sterne pierregarin : 160/170 couples
 Sterne de Dougall : 102/120 couples
 Sterne naine : 54 couples
 Sterne Caugek : 861/900 couples

S'il fallait désigner une île aux Sternes en Bretagne, c'est certainement Trévorc'h qui mériterait cette appellation. C'est en effet, la principale station bretonne de reproduction pour les 4 espèces de Sternes qu'elle abrite. De plus, Trévorc'h accueille bon an mal an, plus de 80 % de l'effectif français des Sternes de Dougall. Ce résultat a pu être atteint grâce à un contrôle régulier de la population de Goélands.

Ile d'Yock

Recenserent : G. CAMBERLEIN, P. LANNUZEL, M. LE FRANC, F. LE HIR,
 S. QUERE.

Goéland marin : 1 couple
 Goéland argenté : 73 couples

L'Ile d'Yock est infestée de rats. Une amélioration de la faune d'oiseaux marins nicheurs passera par une dératisation et par la mise en place d'un gardiennage pour limiter les débarquements des visiteurs.

Archipel de Molène

Conservateur : D. PRIEUR.

partiel : G. CAMBERLEIN, H. CORRE, J.P. CUILLANDRE, D. FLOTE,
 Y. GUERMEUR, J. HAMON, J. HENRY, Y. LE GARS, D. PRIEUR.

Pétrel tempête, 110 sites de nidification recensés en 1980 sur Banneg. Ce chiffre est une sous-estimation par rapport à l'effectif nicheur de l'île. Par ailleurs, 33 cadavres de Pétrel tempête trouvés sur Banneg dans des pelotes de régurgitation de Goélands. Le prélèvement des Goélands sur la population de Pétrels doit en fait être bien plus importante que ce chiffre pourrait le laisser croire.

Puffin des Anglais : 1 poussin au terrier sur Banneg. Un des parents, est un oiseau qui a été bagué poussin à Skokholm (Pays de Galles). A

noter que cet adulte nichait en 1979 dans le même terrier.
En outre, 1 chanteur au terrier et un autre adulte sortant de terre sous une dalle rocheuse.

Cormoran huppé	: la reproduction est constatée pour la première fois sur Banneg même (1 couple).
Huitrier pie	: 3-4 couples sur Banneg et 20 sur Balaneg
Grand Gravelot	: 1 couple sur Banneg et 8-9 sur Balaneg
Sterne pierregarin	: 9 couples sur Balaneg
Sterne caugék	: 38 couples sur Balaneg
Macareux moine	: non observé en 1980. L'espèce à <u>peut-être</u> disparu de l'Archipel de Molène.

Les roches de Camaret

Conservateur : J.Y. MONNAT.

Recensement partiel les 7 et 8 juin : J.Y. MONNAT et J.P. CUIILLANDRE.

Cormoran huppé	: en augmentation semble-t-il
Mouette tridactyle	: 64 couples
Petit Pingouin	: 4-5 couples
Guillemot de Troïl	: 40-42 couples
Cormoran huppé	: l'augmentation semble assez forte. Le mauvais temps a contrarié la réalisation de comptages complets en 1980.
Guillemot de Troïl	: d'anciens sites de nidification ont été prospectés par des oiseaux non nicheurs.

Réserve Michel Hervé Julien - Cap-Sizun

Conservateur : L. LE PAPE

Recensements : A. THOMAS

Pétrel tempête	: aucun contact
Pétrel fulmar	: 76-81 individus au maximum 23-24 couples au maximum 3 "couples couveurs" 3 pontes 0 éclosion.
Cormoran huppé	: 150 couples environ
Goéland marin	: 8 couples
Goéland brun	: 16-17 couples
Goéland argenté	: 555-600 couples
Mouette tridactyle	: 1281 nids construits

- Petit Pingouin : 1 couple
 Guillemot de Troil : 73-80 couples
 Macareux moine : 1 individu isolé non nicheur
 Grand Corbeau : 1 couple
- Cormoran huppé : Comme pour les roches de Camaret, les tempêtes successives du mois de juin ont contrarié les recensements. L'effectif semblait toutefois, en baisse par rapport à 1979.
- Goéland argenté : Le chiffre de 1980 est deux fois moins important que celui de 1979, forte diminution liée en grande partie à une baisse importante du nombre des nicheurs du Milin ou où les rats abondent.
- Mouette tridactyle : Toujours en progression. Mais le taux annuel d'accroissement de la colonie n'est plus que de 10 % entre 1979 et 1980.
- Petit Pingouin : 1 seul couple nicheur, mais 5 individus non nicheurs sont notés ensemble, prospectant les falaises en fin de période de reproduction.
- Guillemot de Troil : Augmentation de 33 % du nombre des reproducteurs par rapport à 1979. De plus, 25 individus au moins sont notés fin juin prospectant les falaises.
- Macareux moine : 1 seul individu non nicheur.

Les Glénan

Conservateur : R. PERON

Recensement partiel : A. BERNICARD, G. CAMBERLEIN, J.C. LE CALVEZ,
 D. FLOTE, R. PERON.

Le recensement de tous les îlots en réserve n'a pu être effectué en 1980. A signaler toutefois :

Les 32/33 couples de Cormorans huppés de l'Ile Brilimeg.

La colonie est en légère augmentation. Un autre point de reproduction de l'espèce avec 14 couples en 1980 a récemment été découvert dans l'archipel.

Deux couples d'Huitriers pies et trois pontes de Sternes pierregarin sur Enez-ar-Razed (Archipel des Moutons). Des Sternes n'avaient pas été notées sur cet îlot depuis 1969. C'est très certainement le travail d'éradication des Goélands effectué depuis plusieurs années dans l'ensemble de l'Archipel des Moutons qui a permis le maintien de la colonie de Sternes de Moelez et le retour des nicheurs sur Enez-ar-Razed.

MORBIHAN

Groix

Conservateur : BENOIT

Recensement : J.P. FERRAND

- Fulmar : 2 individus prospectant la falaise, l'un deux se pose pendant quelques secondes.
- Cormoran huppé : 24 nids occupés - Forte progression.
- Goéland brun : 12 nichées découvertes - Estimation de l'effectif total à 20 couples.
- Goéland argenté : 149 nichées - Estimation de l'effectif total à 200 couples.
- Mouette tridactyle : 44 oiseaux observés ensemble au maximum. 18 nids, mais la reproduction n'est toujours pas prouvée.
- Grand Corbeau : 3 juvéniles accompagnant les adultes le 5 juin.

Iniz En Mour / Rivière d'Etel

Conservateur : FERRAND

Recensement : J.P. FERRAND et E. THOUMELIN.

Sterne pierregarin : 127 nichées

Sterne caugék : 104 pontes

Réserve créée en 1980.

La Caugek y niche pour la première fois cette année et elle s'est installée sur l'aire débroussaillée l'hiver précédent.

La Pierregarin, découverte en 1977, est depuis lors en progression constante : 38 nichées en 1977, 60 en 1978, 77 en 1979.

Rohellan / Erdeven

Conservateur : PRIGENT

Recensement : G. CAMBERLEIN, D. FLOTE.

Pétrel tempête : 7 sites recensés. C'est un minimum pour l'île

Cormoran huppé : 3 couples

Goéland brun : 19-22 couples

Goéland argenté : 303-346 couples

Rohellan est en réserve S.E.P.N.B. depuis 1980.

Plus de 300 Goélands ont été éliminés cette année.

Koh Kastell / Belle-Ile

Conservateur : Y. BRIEN

Recensement : L. GAGER, A. LE DREFF.

Fulmar	: Le 19/04, 3 individus près dans la colonie de Mouettes tridactyles et 2 autres en vol.
Cormoran huppé	: 50 couples
Goéland marin	: 2 couples
Goéland brun	: 500 couples
Goéland argenté	: 400 couples
Mouette tridactyle	: 325 couples

Le Fulmar est de nouveau observé dans les falaises, mais sans preuve de reproduction.

Toutes les espèces nicheuses sont en progression.

Méaban / entrée du Golfe du Morbihan

Conservateur : J.P. COUTUREAU

Recensement : G. CAMBERLEIN, J.P. COUTUREAU, D. FLOTE.

Cormoran huppé	: 23 couples
Goéland marin	: 13 couples
Goéland brun	: 247-258 couples
Goéland argenté	: 891-930 couples

Plus de 500 Goélands ont été à nouveau éliminés cette année dans l'espoir d'un retour des Sternes. Suite à l'élimination des laridés en 1979, le taux d'installation du Goéland argenté en 1980 est de 33 % inférieur à celui de 1979.

Er Lannig / Golfe du Morbihan

Conservateur : J.P. COUTUREAU

Recensement : G. CAMBERLEIN, J.P. COUTUREAU, D. FLOTE.

Goéland brun	: 6 couples
Goéland argenté	: 40 couples
Sterne pierregarin	: 75 couples
Sterne caugek	: 302 couples

1980 voit l'augmentation des Goélands et la diminution des Sternes par rapport à 1979. Comme sur Inizi Ez Mour, les Sternes se sont préférentiellement installées sur l'aire défrichée en hiver.

Falguérec / Séné

Conservateur : C. CHARLES

Recensement : C. CHARLES, J. DAVID.

Tadorne de Belon	:	10 couples nicheurs
Canard colvert	:	2 couples
Canard pilet	:	1 couple est observé au printemps sur le site, mais il disparaît sans s'être reproduit.
Vanneau huppé	:	10 couples
Petit gravelot	:	Peut-être 1 couple nicheur
Chevalier gambette	:	10 couples
Echasse	:	8 couples
Mouette rieuse	:	1 couple

Le Falguérec est un ancien marais salant acheté en 1979 par la S.E.P.N.E. grâce aux dons recueillis lors de la marée noire de l'Amoco-Cadiz. A peine créée, la réserve du Falguérec peut afficher des résultats ornithologiques remarquables : reproduction d'espèces nichant en petit nombre en Bretagne (Chevalier gambette, Echasse) et fréquentation du site par le Canard pilet, nicheur exceptionnel en Bretagne et en France.

Malgré ce bilan ornithologique positif, un regret toutefois du conservateur : un nombre important de visites sont réalisées par des ornithologues et des photographes, sans l'accord préalable des responsables de la réserve.

LOIRE ATLANTIQUE

Pierre Percée

Conservateur - Recensement : R. GAUTRON.

Goéland argenté : 2 couples

Sterne pierregarin : 9 couples

Les Eiders à duvet estivent toujours en nombre dans le secteur de la Pierre Percée : 100 individus le 29/6, mais toujours pas de preuves de reproduction.

Les Evens

Conservateur - Recensement : R. GAUTRON.

Goéland argenté : 3 nids.

Haut Villeneuve / Guérande

Conservateur - Recensement : R. GAUTRON.

196 nids de Hérons cendrés en 1980.

La colonie est en augmentation comme sans doute l'ensemble des colonies bretonnes de l'espèce actuellement.

Marais salants du Grand Bal / Guérande

Conservateur : R. GAUTRON

Recensement : Y. CHEPEAU, R. GAUTRON.

Tadorne de Belon : Garderie de 56 poussins sur la réserve

Echasse : 14 couples nicheurs

Avocette : 5 couples nicheurs

Chevalier gambette : 2 couples nicheurs

Sterne pierregarin : 31 couples nicheurs (202 couples pour l'ensemble du marais guérandais en 1980).

Réserve S.E.P.N.B. depuis 1980.

Les 23 hectares de cette réserve constituent le site ornithologique le plus riche du marais guérandais.

Les premières pontes ont été noyées suite à la montée des eaux occasionnée par les techniciens de la démoustication. Avocettes, Echasses et Chevaliers gambettes ont effectué des pontes de remplacement et mené à bien leurs couvées. Par contre, la production de la colonie de Sterne pierregarin a été nulle pour 1980.

Il serait souhaitable d'instaurer un gardiennage pour limiter la pénétration touristique et l'activité des photographes.

La Saline neuve / Assérac

Conservateur : R. GAUTRON

Recensement : X. CHEPEAU, R. GAUTRON.

Vanneaux et Chevaliers gambettes : nicheurs

Echasses : après destruction par la montée des eaux des 9 premiers nids, découverte de deux séries de 7 nids dans la réserve.

Deux autres couples d'Echasse et un couple d'Avocette, nichent à proximité de l'actuelle réserve et une extension de celle-ci à l'ensemble du site est à envisager.

	F	PA	PT	GC	CH	TB	HP	QQ	QI	QB	QA	GM	MT	SC	SD	SP	SN	Q	P	M	GC
50 SAINT MARCOUT				215	1					95	2500	25									
35 ILE DES LANDES				140 140	193 200	40 45	4 5			50	1180 1300	25									
22 FREHEL					49 48					6 7		5 6	67 68					8 10	0 2		
29 BAIE DE MOULAIX					55		15			28 38	1025 1400	55 60								16 26	
TRINOC'H							17 20		9	1 25		1	261 300	402 480	160 170		5				
ILE D'YCK										73		1									
ARCHIPEL DE MOLENE		1 3	110		1			9 10						28		5					
ROCHE DE CAPARET	5 20				132								64					40 42	4 5		
CAP SIZUN	76-84 2				150					16 17	555 600		1281					73 80	1	(1)	1
OLEKAN					32 33		2									3					
56 GROIX					24					32 20	349 305		18								1
INIZ ER MOUR														104		127					
KORILLAN			7		3					19 22	303 345										
KOR KASTELL	(13)				50					500	400	2	325								
KOABAN					23					247 258	285 320	13									
ER LAMIG										6	40		302		75						
44 PIERRE PERCEE										2						9					
LES EVENS										3											
	8 73	1 3	117	345 365	709 718	40 45	23 27	9 10	1	988 1005	7119 7519	127 133	1745 1750	1305 1344	102 120	387 393	54	122 132	5 8	16 20	2 (1)

F = Fulmar
 PA = Puffin des Anglais
 PT = Petrel tempête
 GC = Grand Cormoran
 CH = Cormoran huppé
 TB = Tadorne de Belon
 HP = Halibut-pie
 QQ = Grand Gravelot
 QI = Gravelot à collier interrompu
 QB = Goéland brun
 QA = Goéland argenté
 GM = Goéland marin
 MT = Mousse tridactyle
 SC = Sterne caugh
 SD = Sterne de Dougall
 SP = Sterne pierregarin
 SN = Sterne naine
 Q = Guillemot de Trofi
 P = Pingvin lard
 M = Macaux mune
 GC = Grand corbeau

Effectif des îles et îlots marins et des falaises maritimes en réserve S.E.P.N.B. 1980 en couples et () = individus.

Les totaux par espèces ne représentent pas toujours le total de l'effectif en réserve S.E.P.N.B. Certaines réserves n'ont pas été recensées en 1980 et d'autres l'ont été mais de façon partielle. Ex : Les Goélands de l'Archipel de Molène non recensés en 1980.

	HC	TB	CC	CP	VB	PG	CG	E	A	MR	SP
56 PALMADOC		10	2	(2)	10	0 1	10	8		1	
44 HAUT VILLENEUVE	136										
GRAND BAL							2	14	1		31
SALENE RUYE								14			
	136	10	2	(2)	10+	0 1	10+	36	5	1	31

Bois et marais en réserve S.E.P.N.B. 1980 en couples et () = individus

HC = Héron cendré - TB = Tadorne de Belon - CC = Canard cul blanc - CP = Canard pilet -
 VB = Vanneau huppé - PG = Petit gravelot - CG = Chevalier gambette - E = Ecluse -
 A = Arnette - MR = Mousse rieuse - SP = Sterne pierregarin

APPENDICE.

ILOT DE LA COLOMBIERE.

en Saint Jacut de la Mer (Côte du Nord).

Cet îlot fait l'objet d'un projet d'acquisition par le Conseil Général des Côtes du Nord pour y créer une réserve ornithologique.

Son intérêt principal réside dans le fait qu'il représente un des îlots à Sternes de Bretagne. Un problème de colonisation par les Goélands s'est posé et fut suivi par les scientifiques de la S.E.P.N.B.

Au cours de la saison de nidification 1980, les Sternes sont revenues et l'on a pu recenser :

31 nids de Sterne Pierregarin

1 nid de Sterne Caugek

sur le piton rocheux au Nord de l'île.