

GOELAND CENDRE (*Larus canus*). 71 données

Les données, relativement peu nombreuses, sont régulièrement réparties dans le temps et concernent des effectifs très faibles ; il est impossible de dégager quelque schéma de mouvement que ce soit.

Notons seulement qu'en baie de la Fresnaye (22), localité bien suivie du 1 juillet au 18 août, les effectifs augmentent assez régulièrement à cette époque : de 1 à 3 ind. entre les 2 et 14 juillet (AR VRAN, 3(3) : 139), les effectifs passent à 7 le 16 juillet, 10 le 17, 23 le 22, 10 le 24, 2 le 28, 33 les 29 et 30 juillet, 22 le 1 août, 44 le 8 et 35 le 18 août.

Ailleurs, c'est à cette même époque que les plus "fortes" bandes sont observées : 20 à Trenvel/Tréogat (29S) le 18 juillet ; 17 à Gouleven (29N) le 10 août ; 18 dans l'anse du Po/Plouharnel (56) le 11 août ; 20 au Curnic/Guissény (29N) le 17 août.

Pendant tout le reste de la période, les observations ne concernent le plus souvent que des isolés ou des groupes ne dépassant pas 10 oiseaux sauf : 18 à Kerizan/Crac'h (56) le 28 octobre ; 19 à Etel (56) le 31 octobre ; 13 à Locmariaquer (56) le 13 novembre.

MOUETTE MELANOCEPHALE (*Larus melanocephalus*). 1 imm. à la pointe du Conguel/Quiberon (56) le 24 septembre.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*). 112 données

En baie de la Fresnaye (22), de 4-500 ind. jusqu'à la fin-juillet, les effectifs montent à 665 le 1er août, 584 le 8 août et 1135 le 12 août... 1500 en baie de Morlaix (29N) le 5 août, contre quelques isolés le reste de la période.

Les comptages précis en baie de la Fresnaye font apparaître la très faible représentation des juvéniles à cette époque : elle varie entre 0,2 et 1,3 % sauf le 26 juillet ou, avec 70 ind., elle atteint 12,4 %.

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*). 8 données

3 à Yffignac (22) les 6 et 16 août ; 1 à St-Marc/Brest (29N) le 19 août ; 6 dans l'anse du Po/Plouharnel (56) le 1 septembre ; 3 à St-Nazaire (44) le 11 septembre ; 2 à Penvins/ (56) le 21 septembre ; 15 dans le Golfe (56) le 13 octobre ; 12 juv. à Le Tour-du-Parc (56) le 17 octobre.


MOUETTE DE SABINE (*Larus sabini*). 5 données

1 au cap Fréhel (22) le 23 août ; 40 dans les parages de l'île Molène (29N) le 8 septembre ; 3 à Susicinio/Sarzeau (56) le 17 octobre et 1 à Landunvez (29N) le 22 octobre.


MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*). 30 données

Observée en petit nombre au large

BECASSEAU COCORLI



GUIFETTE NOIRE



du cap Fréhel (22) du 16 juillet au 24 août (18 données). En dehors de quelques isolés, adultes ou immatures, observés en divers points des côtes bretonnes, notons : 2 à 300 en vol vers le sud-ouest dans l'Iroise (29N) le 31 octobre et 2500 à 3000 oiseaux par heure le 12 novembre à Landunvez (29N).

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*). 153 données

Le passage est bien localisé du 25

juillet au 17 octobre.

Quelques isolés en juillet : 1 au Curnic/Guissény (29N) les 25, 27 et 28 juillet ; 3 en baie de la Fresnaye (22) le 26.

L'essentiel du passage a lieu en août et en septembre (145 données), avec deux vagues sensibles :

1°) la plus importante a lieu du 2 au 27 août et est particulièrement nette en trois localités : au Yeun-Elez (29N), 500 le 2, 12 le 4, 60 le 8, 80 le 13, 90 le 21, 60 le 22, 100 le 25, 50 le 27 et 20 le 28 ; au Curnic, 1 le 28 juillet, 6 le 8 août, 5 le 9... 3 les 11, 12 et 13, 7 le 20... 9 le 25... 3 le 29 et 2 par la suite ; à St-Nazaire (44), 35 le 11 août, 36 le 12, 73 le 13, 31 le 14, 30 le 23 et 7 le 5 septembre. Par ailleurs, 30 aux Berniou-Pez/Camaret (29S) et 10 à Concarneau (29S) le 2 août ; 50 aux Berniou-Pez et 11 en baie de Morlaix (29N) le 4... 20 à St-Efflam le 10... 12 au Vioreau (44) le 14... 15 à la pointe du Grouin/Cancale (35)... 15 à Concarneau le 18... 10 au Vioreau et 10 à Goulven (29N) le 19... 10 au Vioreau le 20... 9 à St-Marc/Brest (29N) le 23... 15 à Le Tour-du-Parc (56) le 26...

2°) deuxième vague plus localisée du 8 au 17 septembre environ alors que le passage se poursuit faiblement jusqu'au 28 septembre : 115 à St-Renan (29N) et 60 à Goulven le 8... 17 au Yeun-Elez le 9... 8 à l'étang du Boulet/Feins (35) le 11... 5 au Croisic (44) le 13... 6 au Yeun-Elez le 14... 17 dans l'estuaire de la Loire (44) le 17...

Quelques isolés en octobre : 1 en baie de Morlaix le 1 ; 2 à Brignogan le 11 et 1 à Le Tour-du-Parc le 17.

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*). 2 données

1 à Hoëdic (56) le 12 septembre et

2 dans l'anse du Po/Plouharnel (56) le 24 septembre.

STERNE CASPIENNE (*Hydroprogne caspia*). 2 données

1 dans un groupe de Sternes caugé

à Erdeven (56) le 7 septembre, et 4 au Ter/Ploemeur (56) le 9 septembre.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*). 60 données

Moins nombreuses qu'en 1969, les données ne permettent ni de démêler dispersion et passage ni de dégager les principaux mouvements de cette période.

Tout au plus pouvons-nous noter que l'essentiel du passage se termine le 17 septembre, des groupes assez importants étant encore observés au cours de la première quinzaine de ce mois : 100 à Tharon (44) le 4... 30 entre Brest et Ouessant (29N) le 8... 10 à Landevennec (29S) le 17. En outre, le passage est souligné par cinq observations sur étangs, dont quatre sur des plans d'eau du centre Bretagne : 6 au Coroncq/Glommel (22) le 20 août ; 2 au Yeun-Elez (29N) le 22 août ; 1 à Guerledan (22) le 9 septembre ; 2 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 10 septembre et 5 à l'étang des Salles/Perret (22) le 16 septembre.

Seulement quatre données fin-septembre et début-octobre, toutes sur eaux douces : 2 à Trenvel/Treogat (29S) le 24 septembre ; 6 au Ter/Ploemeur (56) le 27 septembre ; 2 à l'étang du Pont le 4 octobre et 1 au Coroncq le 7 octobre.

STERNE "COMIQUE" (*Sterna hirundo/paradisaea*). 45 données

Encore trois observations en novembre : 1 en baie de Morlaix (29N) le 3 ; 1 au Croisic (44) le 7 ; 1 à Locmariaquer (56) le 14.

STERNE DE DOUGALL (*Sterna dougalli*). 22 données

1 au cap Frehel (22) le 20 juillet ; 3 le 21 juillet, 5 le 4 août et 2 le 9 août en baie de Morlaix (29N) ; 3 à St-Marc/Brest le 10 août ; 1 à St-Nazaire (44) le 12 ; 2 à Landevennec (29S) le 16 ; 6 le 19, 10 le 24 et 3 le 25 août à St-Marc ; 1 à Goulven (29N) le 25 ; 2 le 28 et 10 le 31 août à St-Marc ; 12 à Quiberon (56) le 31 août ; 4 à St-Marc le 2 septembre ; 100 à Tharon (44) le 4 septembre ; 9 à Goulven le 5 ; 1 au Creach/Ouessant (29N) le 9 ; 1 à Molène (29N) le 12 ; 1 à La Trinité (56) et 1 à Locmariaquer (56) le 14 ; 5 au Croisic (44) le 20 septembre.

STERNE NAIN (*Sterna albifrons*). 66 données

Les données sont assez régulièrement échelonnées du 18 juillet au 27 septembre sans que l'on puisse vraiment discerner celles qui se rapportent à la dispersion et celles qui correspondent au passage. Signalons cependant que les plus fortes bandes ont été notées du 27 août au 20 septembre environ. Retenons : 6 au Curnic/Guissény (29N) le 22 juillet... 8 en baie de Morlaix (29N) le 30 juillet... 7 en baie de Morlaix le 31 juillet... 7 à Yffignac (22) le 10 août... 8 dans l'Arguenon (22) le 27 août... 18 à Goulven (29N)... 12 à St-Jacut (22) le 1 septembre... 9 à Tenvel/Treogat (29S) le 2... 20 à Pont-l'Abbé (29S) le 10... 3 au Vioreau (44) (plan d'eau intérieur) le 11... 2 au Vioreau le 13... 16 en baie de Morlaix le 19... et les dernières observations : à Lampaul-Ploudal-mézeau (29N), 1 le 24 et 2 le 26 ; à Erdeven (56), 5 le 22 et 2 le 27 septembre.

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*). 130 données

Le nombre de données fait illusion sur les possibilités d'interprétation. En fait, seule une localité est correctement

suivie, et jusqu'au 23 août seulement : le cap Fréhel (22) qui fournit le quart des observations de cette période.

Le passage, auquel se superpose la dispersion en juillet, est important jusqu'à la mi-septembre, après quoi il se dilue pour s'arrêter précocement le 1 octobre (AR VRAN, I(1) : 43 ; II(1) : 56 ; III(1) : 27). En septembre, retenons : 33 au cap Fréhel et 150 à Tharon (44) le 4... 55 en une heure à Erdeven (56) le 7... 200 en une demie-heure à Lampaul-Ploudal-mézeau (29N) le 13... 20 dans l'Arguenon (22) le 15... 10 à Goulven (29N) le 19... 12 à 15 entre Ouessant et Molène (29N) le 30 ; enfin 1 à St-Mathieu (29N) le 1 octobre. 2 au Croisic (44) le 15 novembre.

PINGOUIN TORDA (*Alca torda*). 18 données

Une seule observation de juillet au voisinage d'un site de nidification (2 le 18 à la pointe du Van/Cléden (29S). A trois exceptions près, toutes les autres données proviennent du Golfe (56) et du Mor Bras (56-44) : Golfe, Locmariaquer, Quiberon, Belle-Ile, Suscinio/Sarzeau, Le Croisic.

GUILLEMOT DE TROIL (*Uria aalge*). 26 données

La plupart des observations se rapportent à des oiseaux au voisinage des sites de reproduction : cap Fréhel (22), presque-île de Crozon (29S) et cap Sizun (29S) (10 données). Par ailleurs l'espèce est observée près des côtes sud de la Bretagne, d'août à novembre : 2 de Concarneau aux Glénan (29S) le 2 août... 6 au Croisic (44) le 30 août... 100 au Croisic le 6 septembre... 75 à Penvins/Sarzeau (56) le 17 octobre... 5 dans le raz de Sein (29S) le 9 novembre et 2 à Penmarch (29S) le 10 novembre, dernière observation.

PIGEON BISET (*Columba livia*). 12 à Belle-Ile (56) le 27 septembre

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*). 6 données

Noté à Groix (56) dans la deuxième quinzaine de juillet ; 1 à Plouray (56) le 31 août ; 1 au réservoir du Vioreau (44) le 13 septembre ; 6 à Les Salles/Perret (22) le 16 septembre ; 4 à Trévignon/Trégunc (29S) le 8 octobre, 2 à Les Salles le 11 novembre.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*). Notons seulement la présence d'1 ind. à Ouessant du 8 au 11 septembre.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*). 95 données

Le 28 août, un nid contient encore des juvéniles prêts à l'envol à Kerbois/Crac'h (56).

Dans la région de Messac (35), les nicheurs partent pour la plupart avant le 7 août.

Le passage est surtout sensible de la mi-août à la fin-septembre, sans qu'il soit possible de dégager un maximum net.

Encore quelques oiseaux dans la première quinzaine d'octobre : à Noyal-Pontivy (56), 10 le 1er, 11 le 2, 6 le 3 et le 4, 2 le 5, 3 le 6, 1 le 7 et le 8, 7 le 12, 3 le 13 ; à Plouzané (29N), 3 le 3 ; à Belle-Ile (56), 4 le 11 ; à St Renan (29N), 1 le 15. Enfin, 2 à Plougonvelin (29N) le 22 octobre.

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*). Trop peu notée. La répartition de cette espèce peut changer rapidement, et il serait intéressant d'en avoir une idée précise. Signalée de St-Nazaire (44), Groix, St-Gildas de Rhuys, Vannes, Arzon, Port-Navalo, Lorient, le Bas-Pouldu/Guidel (56), Brest (29N), Rothéneuf (35), Perros-Guirec, St-Brieuc et Loudéac (22). C'est peu !

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*). 14 données

La plupart des coucous ont disparu dans la première semaine de juillet (ce départ a été enregistré à Ouessant notamment).

Rares attardés en juillet et août : 1 juv. à Plouharnel (56) le 18 juillet ; 1 à Kervoyal (56) le 19 ; 1 à Ouessant le 22 (dernier local semble-t-il) ; 1 juv. à Groix (56) le 23 ; 1 juv. sur l'îlot de Keller / Ouessant du 25 juillet au 5 août ; 2 à Quiberon (56) le 5 août ; 1 à St-Marc/Brest (29N) les 20 et 24 août ; 1 au réservoir de Vioreau (44) et 1 à Crac'h (56) le 23 ; 1 à Ouessant du 29 au 31 août ; 1 à Quessoy (22) le 2 septembre.

▲ Parasitisme noté à Groix (56) aux dépens du Pipit maritime.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*). A l'île de Groix (56), des observations en juillet font penser à une nidification.

Quelques migrateurs : 1 à Ouessant le 30 août, 1 à l'île Blanche (estuaire de la Penzé (29N) et 1 à Bordelaire/Belle-Ile (56) le 18 octobre.

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*). 16 données

Chants du 1er au 9 août à St-Gildas-de-Rhuys (56). Chants le 15 août dans la banlieue de Nantes (44). Notée à Goulien (29S), Messac (35), Tréflez (29N), Daoulas (29N), réserve Michel-Hervé Julien/Cap Sizun (29S), St-Jacut (22), Noyal-Pontivy (56), Plogastel-St-Germain (29S) Auray (3 chanteurs le 15 octobre dans le marais du Kerzo), Billiers (56).

Les observations les plus intéressantes proviennent d'Ouessant : 1 ind. à Pont-Salaun le 13 septembre, 1 chant à Penn-al-Lann le 15. Rappelons que l'espèce est inconnue comme nicheuse sur l'île et n'y est jamais observée.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*). 3 données

1 chanteur au bois de la Roche/Communa (29N) le 6 août. Notée à Auray (56) le 22 septembre et à Messac (35) le 12 novembre.

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*). 8 données

Notée à Groix (56), Plevenon (22), Communa (29N), Plouneour-Menez (29N), Bain-de-Bretagne (35), Pont l'Abbé (29S), St-Renan (29N), Auray (56).

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*). Dans la région Vannetaise (56), 3 couples localisés à 1,0, 0,5 et 1,3 km l'un de l'autre : chant le 18 et le 19 juillet, restes de coquilles le 19, 1 ind. en vol le 3 septembre au premier site ; 2 ind. en chasse le 18 et le 19 juillet au second point ; 1 chanteur le 20 août au troisième.

MARTINET NOIR (*Apus apus*) . 61 données

Départ des nicheurs bien suivi à St-Nazaire : de 23 le 27 juillet à 12 les 28, 29 et 31 ; les derniers ont disparu le 1er août. Départ noté à la même date dans le bassin de Rennes ; dernier à Messac (35) le 2 août ; départ des derniers le 5 août dans le secteur de Lannion-Loquirec (22). Quelques isolés demeurent ici et là en août.

Le passage est noté surtout en fin juillet et dans la première quinzaine d'août : au Cap Fréhel (22), 16 vers le sud en 1 heure le 23 juillet, 32 en 3 heures le 24 ; à St-Nazaire, 75 vers le sud en un quart d'heure le 27 juillet en soirée, 50 le 30 en soirée, 5 le 31, 5 + 9 le 1er août, 3 + 5 le 2 août, 2 + 8 + 2 le 3, 7 + 1 + 3 le 4, 8 le 5 ; à Bailleron (56), 50 le 29 juillet en soirée ; en baie de St-Brieuc (22), 4 vers le sud le 8 août ; à Plougourvest (29N), 60 vers le sud le 12 août. Notons encore 60 au bois de Caron (22) le 22 juillet, 10 au Carnic/Guisseny (29N) le 30, 10 à Erdeven (56) le 3 août, 10 à Quiberon (56) le 8, 5 à Landivisiau (29N) le 15, 4 à Goulven (29N) le 17, 10 au Carnic le 19, 30 à Kerizan/Crac'h (56) le 21, 12 à l'île Hoëdic (56) le 24, 45 à Quiberon le 25, 53 vers le sud à St-Nazaire le 26 en soirée. Après ces derniers passages en fin août, quelques isolés : 1 vers le sud le 31 août à Pontivy (56), 2 à St-Enogat/Dinard (35) le 1er septembre, 1 à Trenvel/Treogat (29S) le 2, 1 à La Roche-Bernard (56) le 7, 1 à Hoëdic (56) le 11 ; derniers observés à Ouessant : 1 le 21, 1 le 24, 1 le 25, 1 cadavre frais le 26 septembre.

MARTIN-PECHEUR (*Alcedo atthis*). 210 données

Arrivées d'oiseaux sur les côtes dès la mi-juillet (le 13 à Ouessant, le 16 en baie de la Fresnaye (22), le 20 à Groix (56), le 21 à Pont-Croix (29S) etc...). On peut noter que tous les oiseaux capturés à Ouessant en juillet et début août sont des juvéniles.

Augmentation notable en août, avec forte arrivée dans la dernière décade. Le passage est surtout sensible jusqu'à fin-septembre.

Ensuite, il semble que la plupart des oiseaux soient de futurs hivernants qui continuent à arriver en octobre et début-novembre.

Plusieurs séries d'observations en des points bien étudiés du littoral, suggèrent qu'au passage d'août-septembre, s'ajoute un mouvement "vers la mer" qui pourrait amener dès la fin de la saison de reproduction, un certain nombre d'oiseaux de l'intérieur, qui demeureraient sur les côtes jusqu'au printemps suivant. Cette hypothèse demande, bien sûr, à être vérifiée.

HUPPE D'EUROPE (*Upupa epops*). 10 données

La plupart des données concernent très probablement des nicheurs : à Plevenon (22), 2 le 17 juillet, 5 le 17 août ; à Plouharnel (56), 1 le 18 juillet ; à Suscinio/Sarzeau (56), 1 le 1er août ; à la pointe du Petit Mont/St-Gildas-de-Rhuys (56) le 1er août ; à Erdeven (56), 5 le 3 août ; à Plédéliac (22), 1 le 5 août ; au Vioreau (44), 1 ad. le 20 août ; à Kerizan/Crac'h (56), 1 le 2 septembre.

La seule donnée concernant à coup sur un migrateur provient du Nord-Finistère : 1 à Paluden/Lannilis le 29 juillet.

PIC CENDRE (*Picus canus*). 1 en forêt de la Hardouinais (22) le 30 juillet.

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*). Notons 1 ind. à Ouessant le 12 septembre. Egalement noté à Belle-Ile (56) le 9 octobre.

PIC MAR (*Dendrocopos medius*). 1 mâle le 1er octobre à Les Gayeules/Rennes (35).

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*). 30 données

Côtes-du-Nord : 1 chanteur à Plévenon les 20 juillet et 23 août.

Morbihan : - Sarzeau : 1 chanteur le 26 août et 1 chanteur à Truskat le 3 août.
- Noyalon : 1 le 23 octobre
- Quiberon : 1 capturé le 24 août
- La Trinité-sur-mer : 1 le 25 août
- Crac'h : 1 le 27 août, 1 juv. le 31 août, 1 chanteur le 3 novembre
- Auray : 1 chanteur à Kerleano les 27 et 28 août, 1 à la gare le 28 août, noté régulièrement en septembre.
- Rivière d'Étel : 1 le 29 août

Loire-Atlantique : - Vioreau : 1 chanteur les 13 et 27 septembre et le 2 octobre

- Joué-sur-Erdre : 1 chanteur le 3 novembre
- Nantes : chant noté régulièrement en septembre
- St-Sébastien-sur-Loire : idem

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*). Noté seulement en deux points du Morbihan : à Elven, 1 chanteur les 17 juillet, 5 août, 2 septembre et 27 septembre ; à Erdeven, 1 le 7 septembre.

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*). Observée sur ses lieux de reproduction morbihannais : 2 le 25 août, 20 le 27 août et 21 le 7 septembre dans les dunes de Kerouriec/Erdeven.

ALOUETTE CALANDRE (*Melanocorypha calandra*). Le 24 septembre, 2 ind. en plumage neuf sont observés de très près dans les dunes de St-Vio/Tréguennec (baie d'Audierne - 29S) . Il s'agit de la première observation en Bretagne.

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*). 17 données.
Noté dans quelques villes : St-Nazaire (44), Lorient (56), Auray (56) et en de rares points du littoral : dans le Léon (29N), isolés notés en deux points du littoral de Cléder en juillet, à Kerfissien le 31 août ; 2 au Curnic/Guissény le 6 octobre ; dans le Morbihan, noté à Groix en juillet, 3 au Bas-Pouldu le 3 septembre.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*). 22 données
En fin-juillet, notée en forêt de la Hunaudaie (22) (4 le 22), en forêt de la Hardouinais (22) (1 chanteur le 30) et sur l'île de Groix (56).

La plupart des observations ont été faites en octobre-novembre, avec la reprise des chants : à Erdeven (56), 2 chanteurs le 22 septembre, 3 chanteurs le 18 octobre ; au Cranic/Brec'h (56), 1 chanteur régulièrement en octobre-novembre ; à Ploermel (56), 1 chanteur le 9 octobre ; à Crac'h (56), 1 en vol vers le sud le 16 octobre, 2 à Kerbois le 2 novembre, 1 à Kerizan et 1 au bourg le 6 novembre ; à Sarzeau (56) 2 en vol vers le sud le 17 octobre au Duer ; à Billiers (56), 2 en vol vers le sud le 17 octobre au Moustoir ; à Le-Tour-du-Parc (56), 1 le 17 octobre à Banastère ; à Baden (56), 2 le 7 novembre ; au Vioreau (44), 2-3 chanteurs du 16 octobre au 2 novembre.

La plupart des données semblent concerner des oiseaux locaux.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*). 1 nid/3 oeufs le 14 juillet à Trenvel/Treogat (29S) 1 ad. nourrit au cap Fréhel (22) les 28 juillet et 13 août.

Le début du passage se situe à la mi-septembre à Ouessant, une nette augmentation étant notée le 16 et surtout à partir du 18.

Sur le continent, l'espèce est peu notée et le passage n'est senti qu'à partir de début-octobre. Outre des augmentations locales, tant sur le littoral que dans l'intérieur, on note en divers points des oiseaux en migration visible ; ces passages sont surtout spectaculaires sur le littoral. Dans l'intérieur, ils commencent début-octobre à Noyal-Pontivy (56), puis à Plougourvest (29N).

Intensification du passage à mi-octobre, maximum fin-octobre et début-novembre. On note en particulier 558 vers le sud en 3 heures à

Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 16, plusieurs bandes de 200-300 à Belle-Ile (56) le 19, maximum au Vioreau (44) du 25 octobre au début-novembre, 500-1000 vers le sud en 1 heure à la pointe de Lan-dunvez (29N) le 29, grosse abondance à Ouessant en fin-octobre et début-novembre, petits groupes en migration entre Ouessant et la Côte léonarde le 31 octobre.

Le passage reste fort dans la première quinzaine de novembre, bien que les stationnements diminuent localement (Goulven (29N) le 7).

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*). 78 données

Le passage est noté à partir des derniers jours de juillet : 700 au dortoir de Meneham/Kerlouan (29N) le 29, 6-7 en migration vers le sud-est à Kerfissien/Cléder (29N) le 30, migration importante à Bailleron (56) du 31 juillet au 4 août. Passage fortement ressenti en août : 800-1000 le 14, 1000-2000 le 19, 400 le 20, 700 le 21 au Vioreau (44), plusieurs centaines au Yeun-Elez (29N) le 22 ; des oiseaux en migration sont notés fréquemment jusqu'au 15 septembre, mais les grands rassemblements ont disparu : 150 au Curnic/Guissény (29N) le 1er, 250 à Kerizian/Crac'h (56) le 12, 100 au Vioreau (44) le 13. Isolées et petits groupes ensuite, avec cependant 15 à St-Renan (29N) le 20, 10 à Ouessant le 25. Deux données tardives : 1 au Faouët (56) le 10 octobre, 1 à Trenvel/Treogat (29S) le 11 octobre.

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*). 121 données

Nidification : 1 nid/3 juv. à

l'envol le 10 septembre à Ouessant.

Début du passage le 31 juillet à Bailleron (56), le 5 août au cap Fréhel (22), le 7 août à Noyal-Pontivy (56 intérieur). Mais dans l'ensemble le passage n'est noté qu'à partir de la fin-août (le 27 à St-Nazaire) et reste fort pendant les 3 premières semaines de septembre ; en octobre, on note encore de petits groupes en migration (moins de 10 ind. en général) (26 observations pour la première quinzaine d'octobre). Très peu après le 15 octobre, avec cependant 11 ind. à Muzillac (56) le 22. Dernières le 25 octobre à Muzillac (3 ind.), le 27 à Perros-Guirec (22) ; enfin 1 imm. capturé à Vannes (56) le 15 novembre.

Localement, une partie des nicheurs demeure jusqu'au début octobre : le 5 à Messac (35) et dans la région de Baud-Pontivy (56).

HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*). 51 données

Des nids contiennent des poussins le 17 août au Faouët (56), le 26 août à Plounéour-Trez (29N), le 3 septembre à Landivisiau et Brest, le 24 septembre à Ouessant. Le 10 octobre, 1 couple construit encore à Irvillac (29N), le nid étant abandonné quelques jours plus tard.

Le passage n'est noté qu'à partir de fin-août (le 27 à St-Nazaire) (44), le 31 à Kerhuon (29N). Ensuite, les données restent nombreuses jusqu'au 27 septembre (dernière à Messac) (35) mais aucune ne concerne des oiseaux en migration visible. Très peu ensuite : quelques au Vougo/Guissény (29N) le 4 octobre, dernière au réservoir de Vioreau (44) le

13 octobre, 2 à Muzillac (56) le 22, 1 à Rennes (35) le 24 et enfin dernière à Perros-Guirec (22) le 27 octobre.

PIPIT DE RICHARD (*Anthus novaeseelandiae*). En nombre inhabituel à Ouessant en fin-septembre : 1 le 24, 6 le 25, 10 le 26 au terrain d'aviation, 3 en migration nocturne au phare le 27. (Plusieurs ont été capturés, notamment 1 au phare le 27).

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*). 21 données

Le passage a été noté cet automne à des dates normales, c'est-à-dire un à deux mois plus tôt que les années précédentes. De plus, les côtes du Nord-Finistère qui fournissaient d'habitude toutes les données tardives n'ont pas été touchées. La plupart des oiseaux ont été observés sur les côtes sud, en particulier dans le Morbihan, où le passage peut être qualifié d'exceptionnel. Première observation le 26 août : 3 en vol vers le SE à Suscinio/Sarzeau (56) ; 1 à Erdeven (56) le 27 août ; 1 à La Trinité-Sur-Mer (56) le 28 août ; 1 à Penthièvre/Quiberon (56) le 1er septembre ; 1 à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 2 septembre ; 12 à Erdeven le 7 septembre ; 1 à Ouessant (29N) les 11 et 12 septembre ; 1 à Hoëdic (56) le 18 septembre, 1 capture sur cette même île le 20 septembre, 15 à Erdeven le 22 septembre ; 1 imm. à St-Vio/Tréguennec (29S) et 1 ad. à Trenvel/Tréogat (29S) le 24 septembre ; 1 au Pont-Vert/Vannes (56) le 25 septembre ; 2 à Séné (56) le 2 octobre, 1 en ce lieu le 9 octobre ; 2 à Trenvel le 11 octobre ; 1 en vol vers le sud à Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 14 octobre, idem le 16 ; enfin 1 à Séné le 6 novembre.

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*). 19 données

Noté le 22 juillet en forêt de la Hunaudaie (22).

Le passage est surtout noté à Ouessant où quelques oiseaux sont observés presque journalièrement du 8 au 26 septembre. Par ailleurs on note 1 capture à Sarzeau (56) le 4 septembre, 1 le 6 septembre au Vioreau (44), 1 le 7 à St-Aignan-de-Grand-Lieu (44), 1 à la pointe St-Mathieu (29N) le 11 septembre, 1 au Vioreau le 4 octobre et 1 attardé à Brest (29N) le 28 octobre.

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*). 75 données

Le 30 juillet, des couples nourrissent à Bel-Air/Moncontour (22) et à Kerfissien/Cléder (29N).

Le début du passage est, comme toujours, assez difficile à situer exactement. A Ouessant, malgré l'abondance des oiseaux dès le début-septembre, le passage ne commence que vers le 17. De même, les premiers ne sont notés que le 20 à la pointe du Croisic (44) ; le 20 également, on note une augmentation sur l'île Hoëdic (56).

Ensuite le passage est partout évident : au Vioreau (44) 165 ind. sont dénombrés sur 5 km le 27 septembre. A Ouessant des mi-grateurs diurnes sont observés le 25 et une forte migration nocturne enregistrée le 27 ; dans le Léon (29N), mouvements diffus notés au long des routes dans la matinée du 1er octobre. Tout au long du mois d'octobre, le passage est fort : le 4, 80 sur 2 km au Vioreau ; le 6, 32 sur un champ à Noyal-Pontivy (56) ; le 8, 42 au Stang/Plou-gourvest (29N) ; le 10, 100 en dortoir à Noyal-Pontivy ; le 12 et le 14, 300 en dortoir à St-Renan ; le 18, plusieurs centaines au bois de Santec (29N) etc... En ville de Brest, les premiers sont notés le 6 octobre, mais c'est surtout dans la dernière décade que les oiseaux affluent. Le 29, grosse migration dans le Léon (500-1000 vers le sud en 1 heure à la pointe de Landunvez).

Dès les premiers jours de novembre on ne note plus que 60 sur 10 km au Vioreau, alors que vers le 7, la plupart des Farlouses ont disparu de Goulven et Guissény (29N).

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta spinoletta*). Premiers observés le 4 octobre au réservoir du Vioreau (44) (3 ind.). Il faut attendre le 22 octobre pour observer les premiers dans le Nord-Finistère : 2 à Lampaul-Ploudal-mézeau. Ensuite, 1 à l'étang du Coroncq/Glommel (22) le 24 octobre, 30 sur 25 km au Vioreau le 25, 12 en ce lieu le 31, 5 le 1er novembre et 8 le 2, 2 à St-Renan (29N) le 5 novembre, 2 à St-Aignan-de-Grand-Lieu (44) le 12 novembre.

PIPIT MARITIME (*Anthus spinoletta petrosus*). Comme chaque automne, afflux noté dans la deuxième quinzaine de septembre et surtout en octobre-novembre. Le manque de données suivies et précises empêche de tracer un schéma plus précis.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*). 95 données
La plupart des données concernent des oiseaux non déterminés subsécifiquement.

Notons 200 le 18 juillet à Trenvel/Treogat (29S). Le passage n'est noté qu'à partir du 14 août : 1 flavéole au réservoir du Vioreau (44), puis 2 flavéoles en ce lieu le 20 août. Il ne devient important que dans la dernière semaine d'août (40-50 sur l'île Hoëdic (56) le 24) et dans la première quinzaine de septembre (fort passage à Ouessant du 8 au 14, puis diminution). Jusqu'au 27 septembre (quelques migrateurs nocturnes à Ouessant), des bandes assez fortes sont encore notées : 15-20 à l'étang de Goulven (29N) le 19, 39 à Erdeven (56) le 22, abondante à St Vio/Tréguennec et Kergwenn/Plovan (29S) le 24.

Ensuite, 4 observations seulement : 1 à Trenvel/Treogat (29S) le 11 octobre, 1 à St-Marc/Brest le 15 octobre, 1 à Erdeven (56) et 2 flavéoles à Rennes (35) le 18 octobre.

Relevons que des flavéoles ont été observées au Vioreau (44), à

St-Philibert (56), et à Rennes (35), en dehors de l'aire de reproduction. La race type n'a été notée que dans le Morbihan.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*). 53 données

Il est souvent impossible de faire la part des oiseaux locaux et des migrants toujours isolés ou en petits groupes.

Les données de juillet et août ne concernent vraisemblablement que des oiseaux locaux, mais à Ouessant (29N), la première capture a lieu le 1er septembre et prouve que le passage a commencé. A Ouessant, comme dans le Léon, on note une augmentation dans la 2ème quinzaine de septembre (3 le 22 et 5 le 26 à St Marc/Brest, 4 à Ouessant le 24, 3 à Kerhuon le 28).

L'arrivée des premières hivernantes à Brest est notée à mi-octobre ; puis les arrivées se succèdent un peu partout (côtes du Léon et du Morbihan). Afflux en fin-octobre dans la région brestoïse. Première notée au Vioreau (44) le 1er novembre ; 12 au barrage d'Arzal (56) le 15 novembre.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*). 160 données

En juillet et août, on observe surtout des familles et des regroupements d'oiseaux locaux : 8 ad. et 26 juv. en baie de la Fresnaye (22) le 21 juillet, nourrissage à Henanbihen (22) le 29 juillet, 20 le 17 août à l'étang de Priziac (56) etc...

Le passage commence fin-août : petit passage visible à Kerfissien/Cléder (29N) le 30, première observation à Ouessant le 31. On constate une première vague nettement distincte en septembre avec un net maximum du 10 au 20 et une forte diminution ensuite : à Ouessant, fort passage du 10 au 20 avec maximum les 17 et 18, puis chute ; à Trenvel/Treogat (29S), 60 le 19 ; à Hoëdic (56), maximum vers le 16 ; au Vioreau (44) maximum de 30 le 13 ; à An Dorchen/Penmarc'h (29S), 30 le 18 etc...

Reprise du passage dans les derniers jours de septembre à Ouessant ; 30 à Moustierlin/Fouesnant le 28 septembre.

En octobre, le passage reprend fortement avec un maximum du 10 au 16 (115 en dortoir à St-Renan le 12, migration visible à Kerpenhir/Locmariaquer les 15 et 16). A ce passage nettement distinct du précédent correspond l'arrivée des hivernants dans les agglomérations et sur le littoral, cette arrivée s'intensifiant vers la fin du mois et en novembre.

Motacilla alba yarrellii : Les premières apparaissent début-octobre :

1 au Vioreau (44) le 4, 1 à Rennes (35) le 9, 3 à St-Renan (29N) le 12, 2 à St-Nazaire (44) le 13, première à Brest le 14. L'installation des hivernantes s'accélère en novembre : 1 à Porspoder (29N) le 8, 1 à Daoulas (29N) le 10, 3 à St-Nazaire le 11, 1 à St-Aignan-de-Grandlieu (44) le 12, 1 à Nantes (44) le 15.

PIE-GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*) 1 ad. *L. e. excubitor* capturé dans un treillage de basse-cour, le 24 octobre à Plounevez-Moëdec (22)

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*). 5 données

En presqu'île de Rhuys (56), deux observations : 1 à la pointe du Mont/Port Navalo le 31 juillet, 2 ♂♂ à Suscinio/Sarzeau le 2 août.

Trois observations de migrateurs : 1 ad. le 28 août et 1 juv. le 16 septembre capturés à Ouessant, 1 capture à Hoëdic (56) le 20 septembre.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*). 1 juv. le 24 août à Hoëdic (56) ; 3 le 1er septembre à Plouharnel (56).

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*). 74 données

Premières observations espacées à partir du 7 août : 1 à Quiberon (56), puis 3 au Conguel/Quiberon le 8, 4 dans le Yeun-Ellez (29N) le 13 (*peut-être* locaux), 1 au Vioreau (44) le 15 ...

(Le passage est fort du 23 août à fin-septembre et présente plusieurs maxima. Ces augmentations *sont facilement décelées à Ouessant* et confirmées localement sur le continent : premier maximum à Ouessant les 27, 28 et 29 août, noté aussi dans le Morbihan : Golfe, Séné, Quiberon ; second maximum à Ouessant les 11 et 12 septembre, noté également à Noyal-Pontivy (56), Trenvel (29S) ; troisième maximum plus fort à Ouessant dans la dernière décade de septembre ; on note 1 ind. à la Fac. de Brest le 29. Quelques observations début-octobre : 1 au Parco/Quiberon le 1er, 1 au Loc'h/Guidel (56) le 1er, 2 à Penmarc'h (29S) le 11. Enfin, 3 dans les salines près du Croisic (44) le 1er novembre.

TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*). Comme d'habitude, peu de données traduisent l'existence d'un passage pourtant senti par plusieurs observateurs : on peut relever qu'à l'île Hoëdic (56), 8 captures ont été effectuées du 17 au 21 septembre, contre 3 pour le reste du stage (7 au 22 septembre) ; toujours sur Hoëdic, une augmentation a été également notée pendant cette période sur l'itinéraire échantillon. Par ailleurs, on note 14 dans les dunes de Kerouriec/Erdeven (56) le 22 septembre.

A St-Renan (29N), 7 dans un marais le 5 novembre (seul le couple nicheur du secteur y est noté avant et après cette date).

Ces quelques notes ne font que souligner une lacune qu'il serait aisé de combler par des comptages répétés sur des secteurs définis du littoral (dunes, falaises etc...) en notant si possible le sexe des oiseaux observés.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*). 120 données utilisées

(Départ des nicheurs avant le 26 juillet à Goulven (29N).

Première observation de migrateurs le 31 juillet (Kerfissien/

Cléder 29N).

(Le passage est fort de la dernière semaine d'août à fin-septembre, mais les maxima se dégagent mal faute de données quantitatives sur des secteurs définis. On note cependant un maximum fin-août en quelques points du littoral morbihannais : 50 à Hoëdic le 24, 30 au Conguel/Quiberon le 29, nombreux dans les marais de Séné le 27. Noté dans l'intérieur le 20 (2 au Roc'h Trévél -29N), le 28 (1 à Brest), le 29 (1 au Fauët -56).

En septembre, on note une légère augmentation à Ouessant dans la troisième semaine, un maximum de 30 à Trenvel/Treogat (29S) le 19, un fort "pic" de 50 au Croisic (44) le 20, et quelques apparitions dans l'intérieur : 1 à Grandlieu (44) le 7, 4 au Vioreau (44) le 13, 1 à Noyal-Pontivy (56) le 18.

Notons encore une légère augmentation les 29 et 30 septembre dans le Léon (Ouessant et Landunvez).

En octobre, le passage est faible (20 données du 1er au 20). On relève deux apparitions à Brest (3 le 10 à St-Marc, 1 le 14 à la Fac) et une à Guilers (29N) (1 le 17).

Très peu après le 20 octobre : 2 à Keremma/Tréflez (29N) le 25, 1 à Trenvel et 1 à Ouessant le 31, 1 au Croisic le 1er novembre, 4 à Trévignon/Trégunc (29S) le 2 et 1 à Plounéour-Trez (29N) le 3.

TRAQUET ISABELLE (*Oenanthe isabellina*). 1 ind. a été observé sur le terrain d'aviation d'Ouessant du 13 au 29 septembre, date de sa capture.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*). 31 données

En juillet et août, nicheurs notés au cap Fréhel (22) (1 nourissant 3 juv. le 30 juillet sur une corniche de la Petite Fauconnière).

Petit passage noté sur les îles d'Ouessant (29N) et Hoëdic (56) du 7 au 12 septembre : à Hoëdic, 1 le 7 ; à Ouessant : 1 le 8, 1 ♂ le 12.

Il faut peut-être rattacher à ce passage les deux observations de Belle-Ile (56) (4 et 11 septembre) et une observation à St-Nazaire le 5.

Seulement deux observations dans la deuxième quinzaine de septembre : 1 chanteur à St-Nazaire le 19, 1 à Kerdonis/Belle-Ile (56) le 26.

En octobre, les observations de St-Nazaire (1 chanteur régulièrement), de Ploermel (56) (1 chanteur le 9), peut-être de Belle-Ile (1 le 19) et de Noyal-Pontivy (1 le 25), semblent concerner des oiseaux locaux.

Par contre, des oiseaux apparaissent sur le littoral : 1 à Guissény (29N) le 10, 1 à Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 16, 1 à Penvins/Sarzeau (56) le 17, 2 à La Trinité-sur-Mer (56) le 22.

En novembre, il semble que les quelques oiseaux notés soient de futurs hivernants (1 ♂ à St-Nazaire le 1er et le 8, 1 ♂ à Nantes les 8, 10, 13 et 15).

On note également deux observations le 15 sur la côte léonarde (29N) : 1 à la pointe St-Mathieu, 1 à Kerurus/Plouneour-Trez.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*). 21 données

Toutes les observations se rapportent à des migrateurs.

Premières observations le 23 août au cap-Fréhel (22), le 24 à Hoëdic (56), le 27 à Séné (56) (abondant), le 30 août à Ouessant (29N).

En fait le passage n'est noté régulièrement que dans les 2 îles (Ouessant et Hoëdic) où un maximum est noté le 21 septembre. Ces deux stations n'étant occupées que jusqu'à fin-septembre, nous ne pouvons situer la fin du passage ; sur le continent, 1 à Quiberon (56) le 28 septembre et à Noyal-Pontivy (56), 1 ♀ le 2 octobre.

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*). 1 nid/4 pulli le 5 août à

Rennes. 6 captures à Ouessant : 23 et 30 août, 10, 15, 16 et 20 septembre.

GORGEBLEUE (*Luscinia svecica*). 35 données

(Passage observé du 24 août au 26 septembre, surtout dans les deux îles occupées en septembre (Ouessant et Hoëdic).

A Ouessant, 2 captures fin août, les 24 et 28, 5 captures et quelques observations du 9 au 26 septembre ; à Hoëdic, 20 captures et quelques observations du 7 au 21 septembre. Sur le continent, 1 à Loperhet/Erdeven (56) le 25 août, 1 ♀ au Curnic/Guissény (29N) et 1 à St-Renan (29N) le 26, 1 à St-Renan le 3 septembre, 2 à Calzac/Sarzeau (56) et 1 à Méneham/Kerlouan (29N) le 4, 1 à Méneham le 5, 1 ♂ à St-Renan le 6, 1 à Méneham le 18, 2 le 19, 4 le 20 et 2 le 22 à St-Marc/Brest, 1 à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 26 septembre.

ROUGEGORGE (*Erithacus rubecula*). A Ouessant, début du passage le 31 août, augmentation le 11 septembre, gros

afflux les 15, 16 et 17 septembre, grosse migration matinale les 18, 19 et 20 septembre, passage intense les 21 et 22, puis forte diminution.

A Hoëdic (56), maximum de captures le 19 septembre.

Sur le continent, peu de données sont utilisables : passage noté fin-septembre sur les falaises de Landunvez (29N), à St-Renan dans la première quinzaine d'octobre.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*). 28 données

Premières observations le 18 octobre à Belle-Ile (56) (3 ind.) le 20 à St Jean/Mendon (56) (10 ind.) et Kerizan/Crac'h (56) (1 ind.), le 22 à Plougonvelin (29N) (60-80), St-Mathieu/Plougonvelin (15 ind.) et Noyal-Pontivy (56) (1 ind.). Ensuite, les plus fortes bandes sont notées à Brengall/Pont-l'Abbé (29S) le 29 octobre, avec

40 ind., à St-Etienne de Montluc (44) le 30 avec 200 ind. et le 6 novembre avec 400 ind., à Ouessant (29N) le 31 octobre avec 25 ind., à Belle-Ile le 8 novembre, à Plougourvest (29N) le 8 (30 en vol vers le sud-est), à Perret (22) le 11 avec 100 ind., à Lanvéoc (29S) le 12 avec 50 ind.

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*). Isolés à Ouessant (29N) les 7, 11, 15, 16 et 27 septembre ; 1 ♀ capturée à l'étang du Moulin-Neuf/Baden (56) le 27 octobre.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*). 23 données

(Les premières sont notées le 9 octobre : 1 à Branguily/Gueltas (56), et cris nocturnes à Brest (29N). Ensuite, 5 le 12 et 22 le 13 octobre à Noyal-Pontivy (56) ; quelques-unes vers le sud à Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 14 ; 2 à Ambon (56) le 17 ...

En fin-octobre et novembre, les observations se multiplient et les bandes se font plus nombreuses : 36 à Noyal-Pontivy le 22 ; abondante à Ouessant le 31 ; 12 à Plougourvest (29N) le 31 ; 20 à St-Etienne de Montluc (44) le 6 novembre ; assez nombreuses à Belle-Ile (56) le 8 ; 40 le 11 et 42 le 14 à Plougourvest ; 67 à Noyal-Pontivy le 15.

Passage spectaculaire vers le sud-est, le 9 novembre à Plougourvest : 2700 entre 9 h 30 et 11 h 30.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*). Les premiers passages sont notés de façon concordante à Noyal-Pontivy (56) et Ouessant (29N), le 18 septembre. Ensuite, seul Ouessant fournit des données en septembre, des chutes matinales et des passages nocturnes étant notés quotidiennement du 19 au 29.

Sur le continent, le passage n'est sensible qu'à partir du 10 octobre : abondante à Belle-Ile (56) le 11 ; passages diurnes à St-Nazaire (44) les 13 et 14 (300 en 1 heure le 13 et 150 le 14, d'ouest en est) ; passage nocturne à Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 14 ; maximum à Noyal-Pontivy les 19 et 22 ; passages diurnes à St-Renan (29N) le 25, à Locmariaquer le 28.

On peut situer le maximum de passage entre le 10 et le 25 octobre, les données faisant défaut pour novembre.

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*). 35 données

Deux observations témoignent d'un passage à Noyal-Pontivy (56) les 18 et 19 septembre : 20 et 10 ind. en mouvement.

Par ailleurs, l'espèce est notée à Goulien, Pont-Croix et Brengall/Pont-l'Abbé (29S), Hanvec, Ploudiry, Logonna-Daoulas et Plougourvest (29N), en baie de la Fresnaye et en forêt de la Hunaudaie (22),

à Erdeven, Locmariaquer, Billiers et Noyal-Pontivy (56), au Vioreau et à St-Nazaire (44).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*). 52 données

Si la plupart des données concernent en toute évidence des oiseaux locaux, d'autres mettent en lumière l'existence d'un passage automnal non négligeable (déjà soupçonné depuis quelques années).

Localités d'observation dans la zone de reproduction :

Loire-Atlantique : Vioreau : 1 chanteur les 15 et 19 août ; pas observé ensuite jusqu'au 1 novembre : 1 chanteur. St-Aignan-Grand-Lieu : 6 chanteurs le 7 septembre ; 5 chanteurs le 12 novembre.
St-Etienne-de-Montluc : 3 chanteurs le 30 octobre, 1 chanteur le 6 novembre. St-Marc/St-Nazaire : 1 chanteur le 28 septembre.

Morbihan : Sarzeau : 1 chanteur à Kerpont le 31 juillet ; 4 chanteurs le 26 août et 2 le 1 septembre à Suscinio ; 6 chanteurs à Calzac du 3 au 5 septembre et 1 le 23 septembre ; 1 à Truskat le 17 octobre. Kerpenhir/Locmariaquer : 1 chanteur le 19 août ; 1 chanteur le 2 septembre ; 1 chanteur le 19 septembre ; 1 les 14 et 16 octobre ; 3 le 28 octobre et 1 le 13 novembre. Kerizan/Crac'h : 2 chanteurs le 12 septembre ; 1 le 21 septembre ; 1 le 2 octobre ; 4 le 20 octobre ; 1 le 28 octobre ; 1 les 6 et 13 novembre. St-Philibert : 1 chanteur le 2 septembre. Noyal : 1 chanteur le 23 septembre. Lannec/Ploemeur : 1 chanteur les 15 et 30 octobre. Le Kezo/Auray : 4 le 15 octobre. Caden/Le-Tour-du-Parc : 1 le 16 octobre. Ambon : 1 le 17 octobre.

Bien que ces données amènent déjà à envisager un mouvement en octobre, elles ne permettent aucune conclusion. Par contre, le passage a été mis en évidence dans le Morbihan par les captures effectuées au Moulin-Neuf/Baden du 20 septembre au 31 octobre : 19 captures sur un hectare, alors que les locales sont déjà baguées en presque totalité et constamment contrôlées. Dans le Nord-Finistère, quelques oiseaux apparaissent à partir du 19 septembre : 1 à Ménéham/Kerlouan ; 1 chanteur à St-Renan le 12 octobre ; 3 en ce lieu le 14 octobre et une capture le 7 novembre ; 1 à Kerhuon le 14 octobre. Ces oiseaux sont sans doute de futurs hivernants, maintenant réguliers dans le Léon.

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE (*Locustella luscinioides*). 3 données
1 chanteur au Loc'h/
Plogoff (29S) le 21 juillet ; une capture sur En Eidig (56) le 8 sep-
tembre ; 1 à Lannec/Ploemur (56) le 27 septembre.

LOCUSTELLE TACHETEE (*Locustella naevia*). 9 données
Nicheurs localisés au chant
dans la deuxième quinzaine de juillet au Roc'h Trevezel/Monts d'Arrée
(29N), sur les bandes de la côte nord du cap Sizun (29S), à La Poterie
(22), à Bel/Moncontour (22) et Collinée (22).

Très peu notée au passage : 1 tuée au phare de Creac'h/Ouessant
(29N) le 29 août ; 1 à Quiberon (56) le 31 août ; 1 capture sur En
Eidig (56) le 16 septembre.

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*). 71 données
Chants et captures
de juvéniles en fin-juillet à Ouessant (29N). Alarmes et becquées
à Noyal-Pontivy (56) le 7 août.

Départ des nicheurs commençant dans la deuxième quinzaine de
juillet (Curnic/Guissény et St-Renan -29N) ; oiseaux demeurant loca-
lement nombreux, et attardés jusqu'au début-septembre (Noyal-Pontivy
le 3 septembre).

Passage surtout sensible dans la deuxième quinzaine d'août et
la première quinzaine de septembre : maximum au Curnic vers les 22-
23 août ; arrivée importante à Ouessant le 31 août ; passage encore
sensible à St-Renan le 17 septembre ; mais dans les îles (En Eidig
et Ouessant), le nombre des migrants diminue fortement à partir du
15 septembre. Le 24 septembre, le passage est pratiquement terminé à
Ouessant.

Quelques attardés au début d'octobre dans le Finistère : 1 juv.
trouvé blessé le 3 au matin dans une rue de Brest ; quelques-uns à
l'étang du Pont/Kerlouan le 4 ; 1 ou 2 à Ménéham/Kerlouan le 6 ; 2 à
Trenvel/Treogat (29S) le 11.

1 juv. commence à chanter le 6 septembre au Curnic.

PHRAGMITE AQUATIQUE (*Acrocephalus paludicola*). 19 données
Passage plus fortement
ressenti que les automnes précédents.

Après une donnée précoce du 5 août à Kerizan/Crac'h (56), trois
observations à la mi-août sur le littoral nord de la Bretagne : 2 le
17 sur la lande de Fréhel/Plévenon (22) ; 1 le 19 sur la palud de
Goulven (29N) et 4 le 22 au Curnic/Guissény (29N). Ensuite, la plupart
des observations proviennent des côtes sud : à Suscinio/Sarzeau (56),
2 le 27 août, 1 le 1er septembre, 2 les 4 et 5 septembre ; à Trenvel/
Treogat (29S), 4 le 2 septembre, 1 le 3 septembre ; à Ménéham/Kerlouan
(29N), 1 le 4 septembre ; à Vannes (56), une capture le 5 septembre ;

à En Eidig (56), captures d'isolés les 8, 15, 18, 19 et 20 septembre ; à St-Marc/Brest (29N), 1 le 20 septembre ; 1 juv. capturé à Ouessant (29N) ; enfin, 2 au Loc'h/Guidel (56) le 27 septembre.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE (*Acrocephalus palustris*). Une capture le 3 septembre au marais de Calzac/Sarzeau (56).

ROUSSEROLLE EFFARVATE (*Acrocephalus scirpaceus*). 34 données
En juillet et début-août, nicheurs observés à Plévenon (22) (chants et nourrissages le 17), à Ménéham/Kerlouan (29N), en baie d'Audierne (29S), à Kerpont/Sarzeau (56), au Loc'h/Plogoff (29S) (nourrissages le 21 juillet).

En fin-août et septembre, quelques oiseaux sont encore notés sur les lieux de reproduction : à Goulven (29N), 2 jusqu'au 19 septembre ; à Ménéham, 1 chanteur les 4 et 18 septembre ; à Trenvel/Treogat (29S), 5 le 2 septembre ; à St-Aignan-Grand-Lieu (44), 1 chanteur le 7 septembre ...

Le passage n'est décelé que dans les îles En Eidig (56) et Ouessant (29N), entre le 8 et le 23 septembre.

HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*). 17 données

REPARTITION : dans les Côtes-du-Nord : 1 couple est observé jusqu'au 18 août dans la lande de Fréhel/Plévenon ; 1 couple défend un territoire les 22 et 23 juillet dans l'anse des Sables-d'Or/Plurien ; 1 couple en lisière de la forêt de la Hardouinais, entre St-Launeuc et St-Vran, le 30 juillet. Dans le Morbihan : les oiseaux observés les 15 et 18 août à Quiberon, le 29 août à St-Jean/Mendon et le 1er septembre à Suscinio/Sarzeau, sont vraisemblablement des locaux. Dans le Finistère-Sud, observation très intéressante de 2 ind. le 17 juillet à Goulien (cap Sizun).

Passage noté à En Eidig (56) et Ouessant (29N) : à En Eidig, 2 captures (10 et 15 septembre) ; à Ouessant, 4 captures (26 et 28 août, 11 et 16 septembre).

FAUVETTE EPERVIÈRE (*Sylvia nisoria*). 1 juv. capturé à Ouessant le 25 août.

FAUVETTE ORPHEE (*Sylvia hortensis*). 1 capture à Ouessant le 24 septembre.

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*). 29 données
Nicheurs observés localement en juillet-août : le 17 juillet à Plévenon (22), le 22 au bois de Caron

(22), le 6 août à Hanvec (29S) (juv. nourris), le 19 août au réservoir du Vioreau (44) (1 couple), le 1 septembre à Sarzeau (56) (1 couple).

Quelques observations en fin-août et début-septembre sur la côte morbihannaise, peuvent concerner des migrateurs : à Quiberon le 28 août et le 1 septembre, à Belle-Ile le 3 septembre.

Le passage n'est vraiment noté que dans les îles (Ouessant (29N) et En Eïdig (56)), les dates limites (9 au 27 septembre) étant en fait celles du début et de la fin des stages. Une augmentation est notée dans les 2 îles à partir du 17 septembre. A Ouessant le passage devient plus fort les 25 et 26 septembre et des migrateurs nocturnes sont notés le 27 au phare.

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*). 21 données

En juillet et début-août, notée en quelques lieux de reproduction : bois de Château-serein/Plévenon (22), forêt de la Hunaudaie (22), Messac (35), étang du Rouvre (35). L'espèce est encore notée à Messac le 3 septembre.

En septembre, le passage n'est noté qu'à Ouessant : première capture (1 ♂) le 11, augmentation à la fin du mois. Nous manquons malheureusement de données pour l'île en octobre-novembre.

Quelques observations en fin-octobre et novembre sur le continent : 1 ♂ à Perros-Guirec (22) et 1 ♀ à Belle-Ile (56) le 20 octobre, 1 ♂ à Keraudren/Brest (29N) le 5 novembre ; notée à Messac les 11 et 13 novembre.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*). 30 données

Signalée en juillet-août de quelques lieux de reproduction : Terenez/Rosnoën (29S), Plouvorn (29N), Goulven (29N), forêt de la Hunaudaie et bois du Caron (22), La Martyre (29N), Hanvec (29N), Yeun-Elez et rochers du Cragou/Lanéanou dans les monts d'Arrée, Vioreau (44), bois de Santec (29N).

Le passage est noté du 23 août au 28 septembre. A Ouessant, très peu de migrateurs ; même remarque pour En Eïdig (56).

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*). 50 données

En juillet, quelques couples repérés et 1 juv. capturé à Ouessant ; 1 ad. nourrissant des pulli au cap Fréhel le 31 etc...

Côtes-du-Nord : Moncontour : 1 sur la lande de Bel Air le 30 juillet ; cap Fréhel : plusieurs couples et juv. en juillet-août et 1 couple le 7 novembre ; Lamballe : 1 à La Poterie le 21 août.

- Morbihan : En Eidig : quelques-unes du 9 au 19 septembre (1 capture);
Le Tour-du-Parc : 1 le 2 octobre ; St-Gildas-de-Rhuys :
3 juv. à la pointe du Grand Mont le 7 août et 1 chanteur
le 6 août ; Sarzeau : 1 à Truskat le 17 octobre, 2 le 23
octobre ; Séné : 1 chanteur le 27 juillet ; Ilur : nom-
breuses le 28 août ; Crac'h : 2 à Kerizan le 2 septembre,
1 le 5 novembre ; Locmariaquer : 3 le 16 octobre et 3 le
28 octobre à Kerpenhir ; Carnac : 1 à Kerwinio le 19
octobre ; Quiberon : 1 au Conguel le 7 novembre ; Belle-
Ile : 1 à Kerdonis le 26 septembre, 4 à Bordelaine le 18
octobre, 4 au terrain d'aviation le 25 octobre.
- Finistère : Treogat : 2 le 11 octobre à Trenvel ; Cleden-Cap-Sizun :
2 le 1 septembre à Beg ar Van ; Monts d'Arrée : commune
en juillet-août, surtout dans les jeunes plantations de
conifères envahies par l'ajonc (St-Cadou, St-Rivoal,
Hanvec, Yeun-Elez...) ; St-Renan : 1 le 17 septembre, 2
les 14 et 15 octobre, 1 les 18 et 25 octobre, 2, dont une
capture, le 5 novembre ; Ouessant : en divers points de
l'île en juillet, août et septembre.

Nous nous heurtons au même problème que pour la Bouscarle, un mouvement se produisant en septembre-octobre, sans qu'il soit possible de le cerner, ou même de le prouver dans la plupart des cas. A St-Renan, les oiseaux ne nichent pas et apparaissent chaque automne. L'oiseau capturé le 5 novembre présentait un état adipeux suggérant qu'il devait s'agir d'un migrateur. Y-a-t-il réellement un passage automnal ou simplement une dispersion à petite échelle ?

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*). Observée régulièrement à
Trenvel/Treogat (29S) de
mi-juillet à fin-octobre : 2 le 18 juillet ; chant en trois points
le 2 septembre ; au moins 1 le 3 septembre ; 1 le 12 septembre ; 2
le 24 septembre (chants) ; 2 les 11, 30 et 31 octobre.

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*). 36 données
Chants notés fin juillet à
l'étang du Rouvre (22), en forêt de la Hunaudaie (22), à La Poterie
(22), à Bel Air/Moncontour (22). Au Vioreau (44), 3 chanteurs le 15
août, 1 chanteur les 19 août, 6 et 27 septembre et le 4 octobre ; à
l'étang de la Brousse/Sarzeau (56), 1 chanteur le 26 août ; Au Yeun-
Elez (29N), 3 chanteurs le 28 août.

(Le passage débute le 30 juillet à l'île Bailleron/Séné (56). Il n'est noté ensuite qu'à Ouessant et En Eidig : à Ouessant, très abondant les 23 et 24 août, arrivées importantes le 28 août, diminution sensible après la mi-septembre et légère reprise à partir du 26 (plusieurs chanteurs les 10 et 12 septembre) ; à En Eidig, 13 captures du 7 au 21 septembre.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*). 75 données
9 chanteurs sur 1 km au
bois du Caron (22) et 6 chanteurs sur 1 km en forêt de la Hunaudaie
(22) le 22 juillet. Chant à Penn al Lann/Ouessant (29N) du 15 au 22
juillet. Le 12 août, un couple alarme à Plougourvest (29N) ; le 17,
un adulte nourrit des juv. sur la lande de Fréhel/Plévenon (22) ; le
20, un couple nourrit 3 juv. à Plougourvest.

(Le passage est noté à partir du 28 août à Ouessant (10 captu-
res du 28 août au 2 septembre, 1 cadavre au phare le 31), du 4 sep-
tembre à St-Nazaire (44). Il n'est guère décelable que sur les îles
d'Ouessant (captures régulières en petit nombre) et d'En Eidig (56)
(5 captures du 8 au 19 septembre). Sur le continent, les observations
sont nombreuses jusqu'à fin-septembre, le chant étant noté réguliè-
rement un peu partout.

Nette diminution après le 29 septembre : six observations seule-
ment pour la première quinzaine d'octobre, dont 5 à St-Renan (29N) le
12, plusieurs chanteurs à Noyal-Pontivy (56) le 14. A Messac (35),
dernière observation le 6.

Aucune observation du 15 au 24 octobre, puis petit afflux dans
la dernière semaine du mois : 9 dont 2 chanteurs le 24 à St-Nazaire ;
2 dont 1 chanteur le 25 à St-Renan ; 1 chanteur le 26 à Brest (29N) ;
15 ensemble le 30 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) ; 1 le 31 à Ouessant.

Cinq observations en trois localités dans la première quinzaine
de novembre : à St-Renan, 1 ind. de la sous-espèce *P. collybita tristis*
le 5 et deux captures le 7 ; à Plougourvest, 1 chanteur le 8 et 1 ind.
le 11 ; à Noyal-Pontivy, 1 le 15.

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*). 1 en forêt du Cranou/Han-
vec (29N) le 27 août ;
dernier à Messac (35) le 15 septembre ; aucune capture cet automne à
Ouessant.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*). Noté à Messac (35) de juillet à no-
vembre, à La Poterie (22) le 21
août, en forêt de Huelgoat (29N) le 30 août, à Bohars (29N) le 16 sep-
tembre, en rivière d'Auray (56) le 28 septembre, à Pont-Croix (29S)
le 9 octobre, à Plougourvest (29N) le 15 novembre.

Dans la région de Vannes (56), seulement 3 captures de mi-octob-
re à mi-novembre (contre 22 captures de *R. ignicapillus*).

ROITELET TRIPLE BANDEAU (*Regulus ignicapillus*). 35 données
Premières observations
le 25 septembre à Noyal-Pontivy (56), puis les 2,3 et 7 octobre à
Brest (29N), le 8 au Bendi/Logonna-Daoulas (29N), le 10 à Vannes (56) ;

le 15 à St-Renan (29N), le 16 à Kerpenhir/Locmariaquer (56), le 17 à St-Nazaire (44) ... Dans la dernière décade d'octobre, le nombre des observations augmente, les oiseaux sont plus nombreux : 4 à St-Renan le 25, 3 à Plougourvest (29N) et (très nombreux à Ouessant (29N) le 31 ; 10-12 à St-Renan le 5 novembre.

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*). 67 données

Comme d'habitude, le passage est surtout noté dans le sud et l'est de la Bretagne, le Finistère ne fournissant que peu d'observations en dehors d'Ouessant.

A part une donnée précoce le 8 août à la pointe du Haliguen/Quiberon (56), le passage est noté du 24 août (1 à Kerizan/Crac'h (56)) au 25 septembre (2 à Kersaliou/St-Pol-de-Léon (29N)). Les données du sud-est font apparaître (un maximum fin-août et dans la première décade de septembre. Après le 15 septembre, toutes les données proviennent des îles En Eidig (56) et surtout Ouessant. L'absence d'observations en ces deux localités après le 25 septembre nous prive de données précieuses sur la fin du passage.

Une observation tardive : 1 à la Faculté de Brest le 23 octobre.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*). 81 données

En juillet, août et localement en septembre, nicheurs observés à Rothéneuf, Cancale, Messac, Trémignon (35), St-Brieuc, La Fresnaye, Perros-Guirec (22), Hanvec, Kerhuon, forêt du Cranou (29N), Le Ter/Ploemeur, Sarzeau, Brec'h, Rohan, Crac'h, Auray, Guidel, St-Avé, Noyal-Pontivy et Quiberon (56). Derniers observés à Messac le 13 septembre, à Noyal-Pontivy le 17, à Auray le 18.

Passage noté de fin-août à fin septembre : premiers notés sur la côte léonarde (29N) le 27 août (1 à Brignogan) et le 29 août (3 à Goulven). A St-Nazaire (44), passage du 28 août au 19 septembre. A Ouessant, après 12 captures les 29 et 30 août, passage jusqu'à fin-septembre. Dernier migrateur à Brest le 24 septembre. Encore 1 au Vioreau (44) le 27 septembre.

GOBEMOUCHE NAIN (*Ficedula parva*). 3 captures de juvéniles à Ouessant, les 26, 28 et 29 septembre.

MESANGE A MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*). Observée sur ses lieux de reproduction : à Sarzeau (56), 1 couple nourrit durant la 2ème quinzaine de juillet à Calzac, 6 ind. sont observés le 1 août à Suscinio et l'espèce y est encore notée le 26 août et le 1 septembre. En baie d'Audierne (29S), 2 ind. à Trenvel et 2 à Loc'h Kergaran le 30 octobre, 4 à Trenvel le 31 octobre.

MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*). 45 données

Groupes de 2 à 12 signalés pendant toute la période, avec (mouvements très perceptibles en octobre-novembre à St-Renan (29N), par exemple, les captures montrant que les bandes se succèdent ; à Ouessant (où l'espèce ne niche pas), de nombreuses bandes sont observées en fin-octobre, début-novembre.

MESANGE REMIZ (*Remiz pendulinus*). 1 imm. capturé le 17 octobre en bordure de l'étang du Moulin-Neuf/Baden (56).

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*). 22 données

Signalée de la forêt de la Hunaudaie, de Bel-Air/Moncontour, de la Poterie (22), de Keremma/Tréfleuz, de la forêt du Huelgoat, de Plougourvest (29N), de Plo-neis, Pont-Croix, Pont-l'Abbé (29S), de Port-Navalo, St-Jean/Mendon, Truskat/Sarzeau (56), de St-Nazaire (44).

MESANGE NOIRE (*Parus ater*). 3 données

1 le 30 août en forêt du Huelgoat (29N) ; 1 le 3 octobre à Pipriac (35), 1 le 15 novembre à Pen-Mur/Muzillac (56).

MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*). (Passage sensible à St-Renan (29N), le 17 septembre. Le 25 septembre, première à Ouessant où l'espèce est à nouveau notée en fin-octobre.

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*). 28 données

En fin-juillet, des couples nicheurs sont notés à Ouessant (29N), Goulien (29S). La présence d'1 chanteur le 28 à l'étang de Poulguidou/Plozevet (29S) confirme l'élargissement de l'aire de répartition en baie d'Audierne.

A nouveau noté sur ses lieux de reproduction à partir du 9 septembre.

Quelques oiseaux apparemment en migration ont été notés à mi-octobre dans le Morbihan : 1 le 14 et 2 le 16 à la pointe de Kerpenhir/Locmariaquer, 6 le 18 dans l'anse du Po/Plouharnel.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*). 15 données

Des couples nourrissent encore le 27 juillet en forêt de la Hunaudaie (22), le 26 août à Banastère/Le-Tour-du-Parc (56), le 27 août à Séné (56). Notons 12 sur 1 km de voie ferrée en forêt de la Hunaudaie contre 6 dans le bois de Caron (22) le 22 juillet.

4 captures sur l'île En Eidig (56) du 9 au 13 septembre. Près de Vannes (56), 55 captures en un point du 11 octobre au 11 novembre semblent indiquer un passage. Deux bandes seulement sont signalées : 55-60 à Lampaul-Ploudalmezeau (29N) le 23 octobre, 35 à Brengall (29S) le 3 novembre.

BRUANT ZIZI (*Emberiza circlus*). 54 données

Un couple nourrit encore le 1 août à Plévenon (22).

Il faut noter la fréquence accrue des observations dans le Finistère-nord, où l'espèce était très peu représentée il y a seulement quelques années : à l'étang du Pont/Kerlouan, 1 ♂ nourrit le 16 juillet ; à Paluden/Lannilis, 1 ♂ le 29 juillet ; à La Roche-Maurice, 1 ♂ le 1 août ; au Faou, 1 le 19 août à Lanvoy ; à Goulven, 1 chanteur le 19 août ; au Curnic/Guissény, 1 chanteur le 20 août ; à Plougourvest, 1 chanteur les 23 août, 21 septembre et 2 octobre ; à Hanvec, 8 le 27 août et une famille le 29 août ; à Botmeur, 1 le 13 septembre.

En faveur d'un passage en octobre-novembre, on note 43 captures en un point de la région vannetaise (56) du 11 octobre au 11 novembre.

Notons encore dans le Finistère-nord : 4-5 à Lampaul-Ploudalmezeau le 22 octobre ; 1 ♂ à la pointe St-Mathieu/Plougonvelin le 15 novembre. Ailleurs, des chanteurs sont notés pendant toute la période considérée. Une seule observation à En Eidig pendant le stage de septembre : 1 le 9.

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*). 4 au champ d'aviation d'Ouessant (29N) le 26 septembre.

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*). 80 données

Peu de données sont utilisables.

Passage très sensible en octobre se poursuivant faiblement début-novembre : près de Vannes (56), 180 captures sur un hectare (en dehors d'un dortoir) du 11 octobre au 11 novembre. A St-Renan (29N), maximum du 12 au 26 octobre : la rareté des contrôles d'oiseaux bagués montre un renouvellement constant des oiseaux. A Plougourvest (29N), très net maximum le 17 octobre. A Lampaul-Ploudalmezeau (29N), maximum le 22 octobre avec 27 ind. dans les dunes. Sur le littoral morbihannais, passages visibles les 14 et 17 octobre à Kerpenhir/Locmariaquer, le 17 à Billiers et le 19 à Kerouriec/Erdeven. A Ouessant (29N), plusieurs dizaines les 31 octobre et 1 novembre.

Très peu d'oiseaux dans la première quinzaine de novembre.

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*). 11 données

Peu abondant cet automne :
1 ♂ à Ouessant du 10 au 24 septembre ; 1 au Collet (44) le 11 octobre ;
6 à la pointe de Landunvez (29N) le 22 octobre ; 4 le 29 et 8 le 30
octobre à Lividic/Brignogan (29N).

BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*). 5 données

A Ouessant (29N) : 2 les 11 et
12 septembre, 4 le 14 septembre, 5 le 26 septembre ; par ailleurs,
1 le 26 septembre à Lampaul-Ploudalmézeau (29N).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*). Reprise du chant à St-Nazaire
(44) le 28 septembre.

(Passage noté du 10 octobre à la fin du mois. Les passages visibles sont faibles dans le Morbihan (pointe de Kerpenhir, Billiers, Erdeven). Ils revêtent par contre un caractère spectaculaire sur la côte léonarde : à la pointe de Landunvez, 1600-2100 vers le sud de 10 h à 11 h 15 le 29 octobre ; des bandes passent aussi dans l'intérieur (St-Renan le 25). Notons enfin la présence de l'espèce en petit nombre à Ouessant les 31 octobre et 1 novembre.

VERDIER (*Carduelis chloris*). 41 données

Un nid contient 5 pulli prêts à l'envol le 8 août au Faouët (56) ; nourrissages le 12 août à Plougourvest (29N), le 31 à St-Nazaire (44).

Sur Ouessant (29N), observations journalières du 23 août au 21 septembre à Penn al Lann, notamment 12 ind. le 12 septembre. Sur En Eidig (56), par contre, l'espèce est bien implantée : 20 captures du 9 au 21 septembre.

Quelques bandes notées en octobre-novembre : 100-150 à Goulven (29N) le 1 octobre, 30 à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) et 20 à Porspoder (29N) le 22 octobre, 40 à Locmariaquer (56) le 28, 20 à Argenton (29N) et 25 à Noyal-Pontivy (56) le 15 novembre.

Passages visibles à la mi-octobre : le 11 au-dessus de Brest ; le 14 (61 en deux heures) et le 16 (86 en 2 h 45) à Kerpenhir/Locmariaquer (56) ; le 17 à Billiers (56).

CHARDONNERET (*Carduelis carduelis*). 90 données

Nid en construction le 17 juillet, juvéniles à l'envol le 18 août à Plévenon (22).

La "jeune" population ouessantine (29N) prospère, comme en témoignent les nombreuses captures de juillet et fin-août-septembre. De belles bandes sont notées en différents points de l'île : 30 à Pont-Salaün le 11 septembre et 45 au barrage le 12.

De nombreux rassemblements sont observés dès la mi-août :

50 à Ste-Anne-du-Porzic/Plouzané (29N) et 30 à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 24 ; 25 à St-Marc/Brest (29N) le 28 ; 50-100 à Goulven (29N) et 40-50 à Ménéham/Kerlouan (29N) le 29 ; 50 à St-Marc et 25 à Kerbois/Crac'h (56) le 31 ; etc...

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*). Le passage a été noté dans trois secteurs principalement : la région du golfe du Morbihan, le Léon et la vallée de la Vilaine (35).

Début du passage à Vannes (56) le 7 octobre ; augmentation à partir du 11 ; maximum le 25 (60 captures à l'étang du Moulin-Neuf/Baden. Le passage demeure fort jusqu'au 15 novembre (483 captures à Baden du 11 octobre au 11 novembre). A l'île Bailleron/Séné, on estime à 1500 le nombre de Tarins ayant passé le 20 octobre et le 15 novembre. Toujours dans la région du golfe, des oiseaux ont été observés à Erdeven le 17, Crac'h les 21 et 28 octobre et le 6 novembre, à Brec'h les 31 octobre et 6 novembre, à Mendon le 6 novembre, à Kerpenhir/Locmariaquer les 28 octobre et 13 novembre, toujours en petits groupes de moins de 10 ind.

Dans l'intérieur de la Bretagne, des bandes en migration ont été observées à Messac (35) du 26 octobre au 2 novembre ; à Noyal-Pontivy, dans le nord du Morbihan, 13 en vol vers le sud le 25 octobre.

Dans le Léon (29N), les premiers sont vus le 22 octobre dans la région de Plougonvelin-pointe St-Mathieu, en compagnie de Grives litornes. Le 29, 120 vers le sud en une heure à la pointe de Landunvez. A Plougourvest, dans l'intérieur, 9 le 31 octobre, 2 le 1 et 10 le 2 novembre.

LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*). 70 données

En fin-août, quelques grandes bandes : 600 à Erdeven (56) le 25 et 200 à St-Marc/Brest (29N) le 29.

Dans la première quinzaine de septembre, rien de notable si ce n'est l'abondance sur l'île d'Ouessant (29N) : 5-600 le 8, 1000 le 10 en un seul point.

Cependant, rien n'indique le passage avant la mi-septembre : le 19, 500 à St-Marc (disparaissent aussitôt) et augmentation sur En Eidig (56) ; le 25, fort passage à Erdeven (56) ; le 29, net maximum à Plougourvest (29N). En octobre, migration visible à Kerpenhir/Locmariaquer (56) (510 en deux heures le 14 et 315 en 2 h 45 le 16), à Billiers (56) et St-Nazaire (44) le 17.

Encore quelques bandes en fin-octobre : 600 sur la palud de Goulven (29N) le 29, mais le passage a nettement faibli ; petit passage le 29 à la pointe de Landunvez (29N).

Très peu en novembre.

SIZERIN FLAMME (*Carduelis flammea*). 1 ♂ et 1 ♀ le 13 novembre à l'étang du Rouvre (35).

SERIN CINI (*Serinus serinus*). 61 données

En juillet et début-août, nicheurs notés à Rotheneuf, Cancale, Messac, étang de Trémignon (35), Plévenon, Sables-d'or, forêt de la Hunaudaie (22), Santec et Carantec (29N), Auray, Lorient, Séné, Sarzeau (56), St-Nazaire (44). Un accouplement est observé le 17 juillet à Rothéneuf et 1 juvénile non-volant le 6 août à Kergilet/Sarzeau.

Mais le passage ne semble commencer qu'à la mi-septembre, jusqu'en novembre ; de fortes bandes sont notées partout de mi-septembre à mi-octobre : par exemple, 100 à Belle-Ile (56) le 26, 100 à Pont-Salaün/Ouessant le 27, plusieurs bandes de 40-50 au Coroncq/Glommel (22) le 3 octobre, 80 à Séné (56) le 9, 80 à Trenvel/Tréogat (29S) le 11 ... Dans la nuit du 25 au 26 septembre, 1 oiseau est noté au phare de Creac'h/Ouessant alors que le 26, un fort passage a lieu à Erdeven (56). Passages visibles : à Kerpenhir/Locmariaquer (56), 355 en deux heures le 14 octobre, 524 en 2 h 45 le 16 ; à Billiers (56), 33 en 0 h 45 le 17 ; à la pointe de Landunvez (29N), quelques petits groupes le 29. Mais, dès la dernière décade d'octobre, les stationnements ont très nettement diminué ; on note encore 50 à Goulven le 24, plusieurs bandes de 40-50 à Trévignon/Trégunc (29S) le 2 novembre, 21 à Kerpenhir le 13, et 30 à Guisriff (56) le 14 novembre.

BOUVREUIL PIVOINE (*P. Pyrrhula*).

Passage dans la région vannetaise (56) du 25 septembre au 30 octobre : 150 captures en un point.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*). 12 données

La plupart des données concernent vraisemblablement des nicheurs locaux : Ploubalay (22), Pont-Callek/Kernascleden (56), Vioreau (44), Noyal-Pontivy (56), Auray (56), Damgan (56), Rennes (35). La seule bande excédant la dizaine est notée à St-Guenolay/Noyal-Pontivy le 25 septembre (100 à 200).

En dehors des lieux de reproduction : 20 le 17 et 25 le 27 septembre à St-Marc/Brest ; 1 à Goulven (29N) le 28 août.

ETOURNEAU

A la pointe de Landunvez (29N), 3-400 en 1 h 15 le 29 octobre ; quelques bandes en migration à la pointe St-Mathieu (29N) le 15 novembre.

CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*). La population ouessantine (29N) peut être estimée entre 25 et 35 ind. en septembre, la plus forte bande

notée étant de 22 oiseaux.

A Belle-Ile (56), 9 le 9 septembre à Bordelaine et 22 le 19 octobre à Ti Sévéno.

X Au cap Sizun (29S), noté en groupes de 2 à 8 sur toute la côte nord en juillet-août.

Notons aussi la présence de l'espèce sur l'île de Groix (56) en juillet.

Sur la côte du Léon enfin, 2 le 15 novembre à la pointe St-Mathieu ; 2 les 22 octobre et 8 novembre sur la presqu'île St-Laurent/Porspoder.

CORNEILLE MANTELEE (*Corvus corone cornix*). 1 en baie de la Fresnaye (22) jusqu'au 20 août (départ des observateurs).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*). Nous n'avons jusqu'à présent rien publié sur la répartition du Grand Corbeau en dehors de la saison de reproduction. Les nombreuses données reçues cet automne ne sont sans doute qu'un reflet très imparfait de la dispersion des oiseaux à cette époque de l'année.

du 16 au 31 juillet : groupes de 2 à 6 à la réserve M.H. JULIEN/cap Sizun (29S) et en d'autres points de la côte nord du cap (Milinou, château de Beuzec...).

du 1er au 15 août : 1 le 2 août dans le Yeun-Elez, en plein centre des Monts d'Arrée (29N) ; 1 couple prospecte la portion de côte comprise entre l'embouchure du Yaudet et celle du Douron (22), soit 8 km.

du 16 au 31 août : 1 le 17 à la pointe du Grouin/Cancale (35) ; 4 le 17 et 2 le 18 au cap Fréhel/Plévenon (22) ; toujours le couple en baie de Lannion (22) ; 1 le 19 en baie de Morlaix (29N) ; 1 les 19 et 20 en baie de Goulven (29N) ; 6 le 20 dans l'Aber Wrac'h (29N) ; 3 le 29 à Ouessant (29N) ; 3 le 18 sur la côte de Ploumoguer (29N) ; 2 le 21 à la pointe St-Mathieu /Plougonvelin (29N).

du 1er au 15 septembre : 1 le 14 en baie de l'Arguenon (35) ; 1 couple le 2 à Plévenon (22) ; 1 le 18 à St-Laurent/Porspoder (29N) ; 1 ou 2 journellement à Ouessant ; 1 le 11 sur la côte du Conquet (29N) ; 1 le 9 à St-Mathieu ; 2 le 2 à la réserve M.H. JULIEN.

du 16 au 30 septembre : 1 le 22 à la pointe de Trémazan/Kersaint-Portsall (29N) ; 2 le 19 à St-Renan (29N) ; 1 le 27 au Conquet ; 1 à 2 journellement à Ouessant.

du 1er au 15 octobre : 2 le 3 dans l'anse d'Yffignac (22) ; 1 couple le 1er à Porz Liogan/Le Conquet (29N) ;

1 couple le 1er à Ilien/Ploumoguier ; 2 à St-Renan les 6 et 7.
du 16 au 31 octobre : 2 le 18 à l'embouchure de l'aber Benoît (29N).
du 1er au 15 novembre : 3 à Pospoder le 8 ; 1 au Gern/Crozon (29S)
le 8.

Il semble que les groupes familiaux subsistent jusqu'à fin-
août, les couples nicheurs prospectant seuls ensuite les alentours
des secteurs de reproduction. Que deviennent les juvéniles ?