

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU 16 MARS AU 15 JUILLET 1971

par Yvon GUERMEUR, Maurice LE DEMEZET, Jean-Yves MONNAT, Daniel PRIEUR
et Alain THOMAS

88 observateurs ont participé aux présentes actualités :

MM. Yves ALLEGRE, Jean-Pierre ANNEZO, Bernard ANTOINE, Loïc ANTOINE, Pierre ARZEL, Mlle Annie BARRE, MM. P. BECHET, Y. BELBEOC'H, Yves BOURGAUT, Didier BOUROM, Yves BRIEN, Noël BRIGANT, J.L. BRIOT, Paul CANEVET, Henry CAPP, Gérard CAPP, Alain CHARRIER, CHASSAT, Nello CHAUVETIERE, Pierre CRENN, P. DANAIRE, Gérard DECROIX, Jean DELAUNAY, DESMARS, Fañch DORVAL, Marc DORVAL, Patrick DORVAL, Jean-Louis DUPONT, J.P. FERRAND, Yves FERRAND, FLOTE, Pierre de FONQUERNIE, A. GERARD, Yvon GUERMEUR, J.F. GUILLOUX, Jean-Paul GUYOMARC'H, Patrick HAMON, Christian HAYS, J.P. HENRY, Jean-Louis HERAUD, Tugdual HUON, Lucien KERAUTRET, Ewenn de KERGARIOU, B. KEREZEON, KERSAUDY, Maurice LE DEMEZET, Arnaud LE DRU, François LE DRU, Jean-Claude LEFEUVRE, Bernard LE GARFF, Joseph LE LANNIC, LELIEVRE, Michel LE PAPE, Raymond LE PENUIZIC, Marcel LE PENNEC, Alain LE TOQUIN, Maurice L'HER, René de LIEDE-? KERKE, Albert LUCAS, Roger MAHEO, Jean MANAC'H, Jean-Yves MONNAT, Guy MOREL, Gérard MOYSAN, Dominique MASSE, Pierre NICOLAU-GUILLAUMET, MM. NOTTEGHEM, Roger ONNO, Hubert PAUGAM, Gérard PAULMIER, R. PENNEC, Joseph PERESSE, René PERON, Jacques PETIT, Patrice PETIT, Joseph PILLET, Gilles FOULLAQUE, Jean-Louis PRATZ, Daniel PRIEUR, P. QUANTENNE, Dominique QUILLIEN, M. RENAULT, RIVALLAIN, Guy ROLLANDO, Alain THOMAS, Denis THOMAS, Jean-Pierre TURPIN.

Ont été également utilisées les notes aimablement communiquées par la S.S.N.O.F. (Société de Sciences naturelles de l'Ouest de la France, Muséum de Nantes).

Deux séjours de longue durée ont commencé à la fin de la période considérée : le gardiennage de la réserve du cap Fréhel par ANNEZO, LE PENUIZIC & al. à partir du 7 juillet, et un stage de "Sea-watching" à la pointe du Croisic (44) du 11 au 16 juillet par MM. CHARRIER, DELAUNAY, DUPONT et MULLER. Enfin, M. CHAUVETIERE a séjourné à Ouessant du 31 mai au 14 juin.



Pour certaines espèces, nous avons intercalé dans le texte de petits histogrammes qui donnent le nombre de données parvenues à la Centrale pour chacune des 8 quin-
zaines de la période considérée : 1) 16-31
mars, 2) 1er-15 avril, 3) 16-30 avril...
8) 1er-15 juillet .

Dans le texte, lorsque deux observations sont séparées par des points de suspension (...) cela signifie que toutes les données n'ont pas été utilisées, que certaines ont été sautées entre les deux observations que sépare cette ponctuation. Si toutes les données sont utilisées, chacune est séparée de la précédente et de la suivante par un point-virgule (;).



Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

clické Dr J. MANACH

PLONGEONS SP. (*Gavia sp.*). 8 données

1 le 27 et 2 le 28 mars en baie de Morlaix (29N) ; 2 dans le goulet de la rade de Brest (29N) le 4 avril ; 2 à Pentrez/baie de Douarnenez (29S) et 2 au Ri/Douarnenez le 5 avril ; 2 en vol vers le nord à la pointe de Feunteun Aod/Plogoff (29S) le 7 avril ; 2 entre Saint-Pabu et l'île Trevoc'h (29N) le 15 mai.

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*). 7 données

1 à Penthièvre et 3 entre la baie de Quiberon et Carnac (56) le 24 mars ; 1 devant Meneham/Kerlouan (29N) le 28 ; 3 à Plouhinec (56) le 30 mars ; 4 à Pentrez/baie de Douarnenez (29S) le 5 avril ; 1 au Curmic/Guisseny (29N) le 9 avril.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*). 4 données

5 à l'Îlot de Tivieg/St-Pierre (56) le 24 mars, 2 à Plouhinec (56) le 30, 1 au Vougou/Guisseny (29N) le 22 avril, 2 en vol vers le nord à la pointe Saint-Mathieu (29N) le 27 mai.

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*). 1 à Keremma/Treflez (29N) le 29 mars.

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*). 97 données

Le départ des hivernants du golfe se fait surtout dans la deuxième quinzaine de mars : 20 les 19 et 24, puis 9 le 31 et jusqu'au 20 avril, 3 à 5 ensuite en avril-mai, 10 le 31 mai, 4 le 15 juin ; l'estivage est donc prouvé en milieu marin. Par ailleurs, on peut noter que des groupes importants demeurent sur les côtes sud de la Bretagne jusqu'au 20 avril : à Penvins (56), 10 le 28 mars ; à Suscínio/Sarzeau (56), 12 le 4 avril ; en baie de la Forêt/Fouesnant (29S), 5 le 12 avril ; à Suscínio, 25 le 16 avril et à Penerf (56), 15 le 18 avril. Sur les côtes nord, on note 3 le 23 mars, 1 le 27, 10 le 29 mars, 2 le 14 avril en Penzé (29N), 1 le 5 avril en baie de Douarnenez (29S), 1 en baie d'Yffignac (22) le 11 avril.

Quelques indices de passage en fin-mars et jusqu'à fin-avril : Penzé le 29 mars, 2 à Priziac (56) le 2 avril, baie de Douarnenez le 5, 1 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 14, 1 au marais de la Briandais/Missillac (56) le 25 avril.

Nidification (et estivage)

Loire-Atlantique : au lac de Grandlieu : 30 couples le 9 mai ; à l'étang de la Hunaudière : 1 ad. et 1 juv. le 23 mai ; au réservoir du Vioreau : 5 ind. le 29 mai, 2 le 15 juin.

Morbihan : A Noyal : 2 couples le 14 avril, 1 ad. et 2 juv. le 15 juin ; à l'étang du Cranic/Brec'h : 8 ad. et 8 juv. (3 familles) ; à l'étang du Rocher/Tehillac : 1 couple et 2 ind. le 24 avril.

Finistère : au Yeun-Elez : 9 le 9 avril ; parades le 23 mai, 1 ad. et 1 juv. le même jour ; 6 couples dont 1 avec 2 pulli le 2 juin ; 6 couples avec pulli + 5 ind. le 6 juin ; 3 familles + 1 nid/1 oeuf le 16 juin ...

Ille-et-Vilaine : au lac de Murin (35/44) : 1 ad. le 13 juin ; aux Gravières de Bruz : 1 couple le 20 juin ; à l'étang du Boulet/Feins : 1 couple le 19 avril, 3 nids le 4 mai, couvaïson le 6 juin ; à l'étang de Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen : 3 nids le 1er mai ; à l'étang de la Taberge/St-Anne-sur-Vilaine : 2 couples le 17 avril et le 16 mai (pulli) ; à l'étang de la Lande d'Ouée : 18 ad. (parades, a-larmes, chants) le 15 avril (1 nid/2 oeufs) ; à l'étang de Chevré/La Bouexière : 1 couple le 16 avril ; à l'étang de Val-d'Isé : 1 couple + 1 ind. le 16 avril ; à l'étang de la Musse/Baulon : 16 le 16 avril, 15 le 2 mai (ne semblent pas pouvoir nicher) ; à l'étang de Belouze/Beaulon : 9 adultes (2 nids/oeufs) le 16 avril ; à l'étang de Bazouges-sous-Hédé : 1 couple + 1 ind. le 18 avril ; à l'étang de Carcraon/La Guerche : noté le 1er mai (nidification prouvée en juillet).

Dispersion notée à partir du 9 juillet : 1 en baie de la Fresnaye (22) (12 en ce lieu le 15) ; 1 en vol vers le sud à la pointe du Croisic (44) le 13.

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*). 3 à Saint-Gildas-de-Rhuys (56) le 31 mars, 1 au Pouliguen (44) le 12 juillet.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*). 13 données
2 au Croisic (44) le 20 mars,
3 à Tivieg/St-Pierre (56) et 21 entre Carnac et Quiberon (56) le 24 mars, 2 en baie de Morlaix (29N) les 26 et 27 mars, 4 à la pointe de Pen-vins (56) le 28 mars, 2 en baie de Goulven (29N) le 29, 1 à Locmariaquer (56) le 30, 2 dans le golfe du Morbihan le 2 avril. Enfin 1 dans le Yeun-Elez (29N) le 9 avril.

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*). 130 données
Les derniers hivernants sont notés en mer jusqu'à mi-avril : 1 à Louannec (22) jusqu'au 18 avril, 12 à Conleau/Vannes (56) le 19, 8 en rivière d'Etel (56), 10 en Penzé (29N), 1 en baie de Goulven (29N) le 22 ...

Notons cependant 2 observations tardives : 2 en Penzé le 14 mai, 1 dans l'embouchure de la Vilaine (56) le 29 mai (estivants ou dispersion ?).

Sur les plans d'eau intérieurs, où les nicheurs sont cantonnés en mars, le départ des hivernants, s'il en reste, est impossible à situer.

Nidification

Ille-et-Vilaine : à l'étang du Boulet/Feins, 2 nids le 26 avril, 5 nids le 6 mai ; aux Gravières de Bruz, 2 couples au moins le 20 juin (1 nid/oeufs) ; à la Tournerais/Goven, 1 chanteur le 7 avril et le 2 mai ; à l'étang de la Lande d'Ouée, 1 chanteur le 15 avril ; à l'étang de Bélouze/Baulon, 1 chanteur le 16 avril et le 2 mai ; à l'étang de Bazouges-sous-Hédé, 1 chanteur le 18 avril ; à Lampâtre/Goven, 1 le 2 mai.

Côtes-du-Nord : pas de données !

Finistère : à Meneham/Kerlouan, pas de dénombrement cette année ; à Kerhuon 4 ind. plus chants le 4 avril ; à Ouessant, 2 (chant) au barrage le 5 avril, 1 au barrage début-juin ; à Saint-Renan, 2 couples ont niché : 3 pulli le 11 mai (construction d'un deuxième nid le 18 mai) ; au Yeun-Elaz, 2 le 28 mars, 2 le 2 mai, 3 le 16 juin (chant) ; à Trenvel/Treogat, pas de dénombrement (1 couple avec 2 pulli le 30 juin construit un nouveau nid) ; à Kergaran/Plovan, 8 ad. et juv. le 30 juin ; à Trevignon/Tregunc, 3 chanteurs le 8 avril et le 25 mai, nombreux ad. et pulli le 12 juillet ; à l'étang du Pont/Kerlouan, l'espèce a peut-être niché (1 couple début-avril) ; à St-Vio/Treguennec, chant le 4 avril.

Morbihan : à l'étang de Priziac, 1 couple avec 3 pulli et 1 nid/5 oeufs le 5 juillet ; à l'étang du Grand Mez/Silfiac, noté le 10 avril ; au marais de Saint-Julien/Quiberon, 1 chanteur le 10 avril ; au marais d'Ambron, 3 chanteurs les 13 et 14 avril ; à Ederven, noté sur les étangs de Kerouriec et Loperhet en avril ; à l'étang de Kerzine/Plouhinec, 1 couple a niché ; à Ster Vras/Belle-Ile, 1 chanteur le 20 mai ; à l'étang de Saint-Philibert, 1 chanteur le 8 mai ; au Ter/Lorient, 1 couple (1 nid/3 oeufs le 27 juin) ; au marais de Suscinio/Sarzeau, nidification prouvée ; à Keravéon/Ederven, 1 couple a niché ; à l'étang de Noyalo, 1 couple a niché ; à Kerizan/Crac'h, 9 le 14 juillet ; au Cranic/Brec'h, 1 le 14 juillet ; à Saint-Jean/Mendon, 8 le 14 juillet.

Loire-Atlantique : à Grandlieu, 2 chanteurs le 18 avril ; à l'étang de la Poitevineière, 1 chanteur le 29 mai ; au réservoir du Vioreau, 1 chanteur le 31 mai, 6 ind. le 15 juin.

PETREL TEMPETE (*Hydrobates pelagicus*). 6 données

Sur l'îlot de Rohellan/Erdeven

(56), 6 sites ont été découverts le 23 mai.

Quelques observations en mer : 1 le 26 mai au sud de Pennarc'h (29S), 4 le 8 et 2 le 9 juin (au large de Brignogan (29N), noté devant la pointe du Croisic (44) à mi-juillet.

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*). 45 données

Petits nouvenents du 20 mars au

10 avril, peu ensuite en avril (2 observations seulement du 6 au 17 avril sur la Grande Sole : 48°50N et 10°W environ). La plupart des oiseaux passent vers le nord.

Nouvelle série d'observations dans la dernière semaine de mai, les oiseaux, peu nombreux, passant tous vers le sud.

Quelques observations en fin-juin et début-juillet, puis d'importants mouvements sont notés à partir du 10 juillet sur la côte sud : au Croisic (44), on note en particulier 480 vers le sud et 30 vers le nord le 13 ; entre les Glénan et Enez Geot (29S), 147 le 15.

La race des Baléares (*Puffinus p. mauretanicus*) a été observée le 23 juin à l'est de Belle-Ile (56) (nombreux), le 13 juillet (1 ind.) et le 15 (15 ind.) devant le Croisic.

FULMAR (*Fulmarus glacialis*). 36 données

Au cap Fréhel (22), 3 le 7 avril, 1 le 8, 2 couples le 22, 13 les 22 et 23 mai et le 3 juin, mais pas trace de nidification.

→ Au cap Sizun (Réserve de M.H. Julien) (29S), une vingtaine d'oiseaux en mai, mais les 3 pontes découvertes ont échoué. Notons que des Fulmars ont été observés à l'ouest de la réserve, vers la pointe du Van.

La plupart des observations ont été réalisées à proximité des côtes finistériennes : sur la Grande Sole, 10 à 20 les 7 et 8 avril, puis des isolés les 11, 13 et 15 avril ; à Ouessant, 2 le 6 avril, 1 les 6 et 7 juin ; dans l'Iroise, 1 le 22 avril, 1 le 15 juin, 1 le 22 juin ; à Porspoder, 1 le 22 mai près des Liniou ; à la pointe de Landunvez, 1 vers le sud le 1er avril ; à la pointe Saint-Mathieu, 4 vers le nord le 27 mai ; à Feunteun-Aod/Plogoff, 1 vers le nord et 1 vers le sud le 7 avril ; en baie d'Audierne, 1 le 28 mai ; devant Penmarc'h, 1 le 26 mai, 1 le 29 juin et 1 le 7 juillet ; aux Glénan, 1 le 28 mai.

Dans le sud de la Bretagne, 1 devant Tharon (44) le 2 mai, 1 sur Iniz en Oulin/Belle-Ile (56) le 6 mai.

POU DE BASSAN (*Sula bassana*). 70 données

Notons seulement un rassemblement de 300 autour d'un chalutier sur la Grande Sole le 13 avril et 1 ad. avec des matériaux au bec le 2 juillet sur les Grands Cardinaux (56).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*). 105 données

Des groupes importants sont encore observés jusqu'à début-avril : 29 au port de Brest le 31 mars, 18 le 2 et 22 le 5 avril dans le golfe du Morbihan, 7 le 4 à Kerhuon (29N), 6 à Trenvel/Tréogat (29S) et 9 à Beg Lann/Sarzeau (56) le 6, 10 au port de Brest le 8...

Passage noté les 2 et 6 avril à Suscinio/Sarzeau (4 et 12 ind. en vol vers le nord), le 9 mai au Croisic (44) (4 vers le nord), le 20 mai au-dessus d'Auray (56) (9 vers le nord).

Des estivants, la plupart immatures, sont notés dans le golfe du Morbihan, l'estuaire de la Vilaine, l'île Meaban (56), la Penzé, l'Elorn, l'archipel de Molène (29N).

Retour peu avant la mi-juillet au Croisic (44), où des isolés passent vers le sud le 12, le 13 et le 15.

Nidification : augmentation de l'effectif à l'île des Landes (35) : 4 nids le 3 mai, 6 nids le 21 juin.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*). 148 données

Derniers hivernants en zone maritime jusqu'à fin-mars, localement jusqu'au 20 avril (mais les oiseaux d'avril ne sont sûrement pas tous des hivernants) : 4 à St-Jean/Mendon (56) le 16 mars, 11 en rivière d'Etel (56) le 22, 3 en baie de Morlaix (29N) le 23, 4 à Goulven (29N) le 29, 2 en rivière de Pont l'Abbé (29S) le 11 avril, 14 (dont 4 en vol vers le nord) au marais d'Ambon (56) le 13, 4 à Caden et 2 à Banastère (56) le 14, 1 à Penerf (56) le 18, 1 dans l'Elorn (29N) le 21.

Durant le mois d'avril et la première quinzaine de mai, un passage est sensible. Des isolés et quelques petits groupes séjournent sur la plupart des étangs, tant dans l'intérieur que sur le littoral ; St-Renan, Vioreau, Curnic, Menéham, étang du Boulet, étang de la Tournerais, Priziac, Plouray, Pont-Kallec, Yeun-Elez... 1 à Quessant le 4 avril.

La plupart des données de mai proviennent des lieux de reproduction du sud-Bretagne : marais de Suscinio/Sarzeau (56), marais de Guérande (44), lac de Grandlieu (44), région de Mauves-sur-Loire et marais de Vue (44). En fait, la nidification n'a été suivie qu'à Suscinio : transport de matériaux le 31 mars ; 2 nids le 16 avril, deux autres couples alarmant ; un nouveau nid contenant 5 œufs le 21 avril. À Grandlieu, 40 oiseaux sont notés le 9 mai ; 25 dans le bois de Saint-Mars-de-Coutais et 28 dans celui de l'Arsangle, en bordure du lac, à mi-mai. La nidification près de Guérande semble connue, mais des précisions ne seraient pas superflues. L'existence d'une colonie est envisagée à proximité des marais de Redon (entre Massérac et Guéméné-Penfao ?) et expliquerait la présence de petits groupes dans les marais voisins pendant toute la période. En ce qui concerne la Grande-Brière, une colonie a été repérée en juillet près de Saint-Lyphard, mais sans possibilité de comptage. Notons enfin 2 couples alarmant dans le marais de Quintin-Bodaval (56) le 14 mai, mais pas de preuves de nidification.

Dans les derniers jours de mai et la première semaine de juin, quelques oiseaux apparaissent sur plusieurs étangs : Yeun-Elez (29N), étang du Boulet/Feins (35), réservoir du Vioreau (44), étang de Saint-Jean (56), étang de la Poitevinnière (44), Nostang (56).

Notons en juin : 1 à Molène (29N) le 16, 3 à Pont d'Arnes/Assérac (44) le 18.

Arrivées importantes à partir de la dernière semaine de juin et surtout à mi-juillet : 2 le 23 juin, 10 le 13 et 13 le 15 juillet dans le golfe du Morbihan ; 3 le 27 juin et 5 le 2 juillet dans le Yeun-Elez ; 8 le 2 juillet en rivière de Pont l'Abbé (29S) ; 5 en rivière d'Auray (56) le 30 juin ; 5 à Trenvel/Treogat (29S) le 30 juin ; 3 à Pléboulle (22) le 8 juillet ; 3 en baie de la Fresnaye (22) le 9 juillet ; 4 au Croisic (44) le 13 ; 18 à Kerizan/Crac'h (56) le 14 ; 46 à Saint-Jean/Mendon le 14 ; 10 à Penestin (56) le 15. On peut remarquer que la plupart des oiseaux sont observés sur les côtes sud, tous sur le littoral.

HERON POURPRE (*Ardea purpurea*). 8 données

1 le 31 mars à l'étang de Kerpont/Saint-Gildas-de-Rhuys (56) ; 2 le 18 avril et 15 le 9 mai au lac de Grandlieu ; 1 le 17 avril au lac de Murin/Massérac (44) ; 2 à Saint-Aignan - Grandlieu les 15 et 16 mai ; 1 à Passay/Grandlieu le 12 juillet. Enfin, une observation loin de la zone de reproduction : 1 immature à Trébeurden (22) le 6 juin.

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*). 5 données

Comme chaque printemps, des oiseaux apparaissent au nord de l'aire de nidification : 6 le 20 mars à la Motte-du-Po (56), 1 le 15 avril en rivière de Pont-l'Abbé (29S), 2 le 22 mai aux salines de La Baule (44), 1 ad. le 4 juin à Saint-Etienne-de-Montluc (44).

Enfin à Grandlieu, où la nidification demanderait à être vérifiée, 3 le 9 mai à Saint-Lumine.

HERON BIROREAU (*Nycticorax nycticorax*). 1 à la Grande Vallée/Saint-Etienne-de-Montluc (44) le 7 mai ; 5 le 9 mai, 2 le 15 et le 16 à Grandlieu.

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*). Noté sur les bords de l'Erdre (44) durant toute la saison ; 1 mâle début-mai à l'étang de Marcillé-Robert (35), 1 à Mauves (44) le 26 juin, 2 à Grandlieu le 8 mai.

GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*). 1 entendu à Hostras/La Chapelle-des-

Marais (44) le 12 juillet.

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*). 2 en vol vers le nord le 10 avril à Argenton/Porspoder (29N) ; 2 du 6 au 8 mai à Saint-Méloir-des-Ôndes (35).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*). Trois observations en avril dans le Morbihan : 3 le 14 dans l'é-tier de Caden, 1 immature le 19 à Kerizan/Crac'h, 1 ad. le 26 à Saint-Jean/Mendon.

FLAMANT ROSE (*Phoenicopterus ruber*). 1 le 15 juillet à la pointe du Con-guel/Quiberon (56). La teinte du plumage et l'aisance du vol ne suffisent pas à exclure l'hypothèse d'un échappé de captivité.

CYGNE TUBERCULE (*Cygnus olor*). 1 immature à Sainte-Anne-du-Portzic (29N) le 21 avril, 1 en Penzé (29N) à partir du 18 juin. Provenance ?

OIE CENDREE (*Anser anser*). 1 dans l'étier de Caden (56) du 30 avril au 15 juin.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*). 17 données
 Dans le golfe du Morbihan, les der-niers hivernants sont observés jusqu'à début-avril : 900 le 19 mars, 512 le 22, 300 le 24, 250 le 26, 150 le 28, 100 le 29, 50 le 31, 7 le 2 a-vril, 21 le 5.

Par ailleurs, 7 en Penzé (29N) le 21 mars, 300 au Croisic (44) le 20, 60 à Penvis (56) le 25, 100 à la Bernerie-en-Retz (44) le 9 avril, 6 dans l'anse d'Yffignac (22) le 11 avril, 25 devant Banastère/Le Tour-du-Parc (56) le 14, 3 à Pénérif (56) le 18 avril.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*). 86 données
 Départ des hivernants jusqu'au 20 a-vril environ : 20 le 19 mars, 12 le 26, 1 le 27 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) ; 103 le 19, 92 le 26 dans le golfe du Morbihan ; 30 le 2 avril au Duer/St-Colombier (golfe), 20 le 2 avril, 37 au Duer le 10 avril, 30-50 dans l'anse d'Yffignac (22) le 11, 20 à Séné (56) le 17 et le 23 avril.

Un passage semble se produire en avril (par exemple 11 à Goulven -29N- le 11).

A partir de la première décade d'avril, les couples sont cantonnés : rivière du Faou et Kerouillé (29N), Louannec (22), étier de Caden et Banastère (56), baie de la Fresnaye (22), aber Wrac'h (29N), Séné (56), Méaban (56), Ambon (56), étier de l'Epinau/Surzur (56), Elorn (29N), marais de Noyal (56), Saint-Jean/Mendon (56), marais de Bétahon (56), Beg Lann/Sarzeau (56), Ile des Landes (35), aber Benoit (29N), golfe du Morbihan, estuaire de la Loire, marais de Guérande (44), Saint-Suliac (embouchure de la Rance) (35), Saint-Jacut (35), îles Beniget, Ban-neg et Trielen (archipel de Molène) (29N), embouchure de la Vilaine.

Par ailleurs des oiseaux sont notés au Collet (44) le 1er mai (2 ind.), en baie de Guisseny (29N) (1 le 2 mai, 1 couple le 21 mai), au barrage d'Arzal (56) (6 le 9 mai, à la pointe du Castelli (44) le 13 juin (2 en vol), en Penné (29N) le 27 juin (1 ind.).

Nidification : 2 nids (27 oiseaux) le 13 mai à l'île des Landes, 6 ad. et 13 pulli le 6 juin à Saint-Suliac, 2 nids le 9 juin à Saint-Jacut, 3 ad. et 39 pulli le 16 juin sur Trielen, 1 couple et 10 pulli le 15 mai dans le golfe du Morbihan, pulli le 6 juin dans l'Elorn, 1 couple et 7 juv. le 11 juin à Séné, 5 ad. et 18 juv. le 29 juin à l'embouchure de la Vilaine, 7 ad. et 9 juv au même endroit le 2 juillet, 1 ad. et 5 pulli le 3 juillet (3 groupes différents).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*). 235 données

Quelques observations en mer jusqu'à fin-mars (golfe du Morbihan, baie de Morlaix, estuaire de la Vilaine). Aucun mouvement n'est ensuite perceptible. Les nicheurs sont cantonnés et les bandes de mâles se forment.

Nidification : 13 oeufs le 9 avril au Yeun-Elez (29N), 14 oeufs le 14 avril à Ambon (56). Les premiers poussins sont notés le 15 avril à l'étang de la Lande d'Ouée (35), le 16 aux étangs de la Musse et de Belouze/Baulon (35), le 20 à Saint-Marc-Brest, le 21 à Priziac (56)... Par la suite la nidification est prouvée à l'étang du Boulet/Feins (35), à Kerjean/Trébabu (29N), au Vioreau (44), à l'étang Noir/Landerneau (29N), à Menahan/Kerlouan (29N), à l'étang du Pont/Kerlouan (29N), à Glomel (22), à Pont Kallec/Kernascléden (56), à Trebeurden (22), à Saint-Jean/Mendon (56), au lac de Murin/Massérac (44), à Pont-d'Armes/Assérac (44), à Lannec/Ploemeur (56), à Trenvel/Tréogat (29N), à Noyal (56), à l'étang de la Poitevinère (44), à Saint-Renan (29N). A ces localités il faut en ajouter 45 autres où des nicheurs ont été observés, sans preuves, et parmi celles-ci les îles d'Ouessant, de l'archipel de Molène, de l'embouchure de l'aber Benoit, d'Houat.

Quelques bandes assez fortes sont observées en mai : 60 à l'étang de la Musse/Baulon le 2 (non compris les poussins), 43 à Saint-Jean/Mendon le 14, 27 à Noyal le 15, 24 ad et 5 pp à Saint-Renan le 13. On peut envisager dès cette époque des regroupements de ad essentiellement, ou même des passages, les oiseaux de Saint-Renan disparaissant aussitôt.

C'est surtout dans la première quinzaine de juillet que les colverts commencent à se rassembler : à Trenvel, 42 le 30 juin ; à Trevignon/Trégunc (29S), 120 à partir du 8 juillet : à Kerizan/Crac'h (56), 180 le 14. Des groupes apparaissent en zone maritime : 12 dans l'estuaire de la Vilaine le 2 ; 16 le 4, 20 le 9, 130 le 15 dans le golfe du Morbihan ; 25 en vol devant le Croisic (44) le 15 ...

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*). 65 données

A fin-mars, la plupart des hivernants sont partis : encore 63 à Kerizan/Crac'h (56) les 23 et 30 mars, 20 à Ménéham/Kerlouan (29N) le 29, 28 à Saint-Renan (29N) le 29, 40 à Priziac (56) le 1er avril (20 le 7), 15-20 à Saint-Renan le 11, 8 au Curnic/Guisseny (29N) le 14... Derniers en Penzé (29N) le 16 avril, à Séné (56) le 17, à Saint-Renan le 21, à Saint-Jean/Mendon (56) le 29, à Spézet (29S) le 28.

Ensuite, toutes les observations sont faites sur les lieux de reproduction : au Yeun-Elez (29N), 1 couple avec 6 pulli le 23 mai, un autre avec 7 pulli le 16 juin ; l'effectif est certainement supérieur à 2 couples. La nidification est prouvée dans le nord-ouest du Morbihan, à l'étang de Pont-Kallec/Kernascléden : 1 famille le 9 juin, 4 ♀♀ dont 2 alarment, le 16 juin, 2 ♀♀ avec leurs poussins le 19, plus trace des sarcelles le 30 juin.

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*). 14 données

La plupart des données concernent des oiseaux en migration pré-nuptiale : au Cranic/Brec'h (56), 1 couple les 16 et 22 mars ; à Saint-Renan (29N), 2 couples le 23 mars, 1 couple le 26, 1 ♂ et 3 ♀♀ le 29 ; à l'étang du Pont/Kerlouan (29N), 1 ♂ et 2 ♀♀ le 28 mars, 1 couple le 14 avril ; à Ménéham/Kerlouan, 1 couple le 9 avril ; à Suscinio/Sarzeau (56), 1 couple les 6, 10 et 21 avril ; dans l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56), 1 ♂ le 27 avril ; enfin, au lac de Grandlieu (44), 2 couples le 9 mai. Bien que modeste, ce passage peut être considéré comme exceptionnel en Bretagne (à noter que les observations automnales et hivernales se sont récemment multipliées).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*). 24 données

Derniers hivernants fin-mars : 17 le 24, 1 le 26 dans le golfe du Morbihan ; 33 le 16, 20 le 22, 21 le 28 à l'étang de Saint-Jean/Mendon (56).

Petits passages en fin-mars et avril, quelques oiseaux s'arrêtant sur les étangs du littoral essentiellement : 4 le 25, 2 le 28 et 5 le 29 mars à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) ; 1 le 28 mars, 4 le 9 avril au Curnic/Guisseny (29N) ; 1 le 28 mars à l'étang du Boulet/Feins (35) ; 2 le 2 avril au Duer/Saint-Colombier (56) ; 1 le 4 avril au Vioreau (44).

Ensuite, la plupart des observations proviennent du Morbihan : 5 à Séné et 1 couple au lac de Murin le 17, 1 couple à Suscinio/Sarzeau le 21, 1 à Noyal et 34 à le Tour-du-Parc le 27, 1 à Caden/Le Tour-du-Parc le 30, 1 ♂ au lac de Grandlieu le 9 mai, 1 à Séné le 14 mai.

Enfin, une observation léonarde en juin : 1 ♂ à l'étang du Pont le 7.

CANARD PILET (*Anas acuta*). 18 données

Derniers hivernants : 350 le 22 mars, 64 le 26 dans le golfe du Morbihan, 12 le 5 avril en baie d'Yffignac (22).

Passage dans les derniers jours de mars et la première quinzaine d'avril : 6 le 25, 5 le 28 et 1 couple le 29 mars à Meneham/Kerlouan (29N); 1 couple le 28 mars, 3 le 2 avril à Saint-Vio/Tréguennec (29S); 1 couple le 2 avril au Duer/Saint-Colombier (56); 1 ♂ le 11 avril à Saint-Renan (29N); 1 ♂ le 13 à Brouël/Ambon (56); 3 couples le 14 à Caden/Le Tour-du-Parc (56).

Trois observations fin-avril début-mai : 1 couple à Kerizan/Crac'h (56) le 26 avril, 1 couple à Caden le 27, 1 couple à Meneham le 2 mai.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*). 80 données

Passage jusqu'au début-mai, des oiseaux séjournant localement jusqu'au 23. Le plus gros du passage a cependant lieu avant le 20 avril : à Meneham/Kerlouan, 22 le 25 mars, 32 le 28, 24 le 9 avril, 20 le 11, 9 le 22 ; à Saint-Renan (29N), 4 le 18 mars, 12 le 22, 14 les 23 et 26, 10 le 29, 4 le 1er avril, 15-20 le 11, 13 le 19, 10 le 21 ; à Goulven (29N), 8 le 21 mars, 6 le 28, 4 le 11 avril ; à Trenvel/Treogat (29S), 20-25 le 28 mars, 10 le 2 avril, 7 le 5, 18 le 12. Notons encore 6 au Curnic/Guisseny (29N) le 21 mars, 6 les 28 mars et 9 avril à Kervran/Plouhinec (56), 20 le 2 avril, 13 le 6 et 7 le 12 à Saint-Vio/Tréguennec (29S), 5 couples le 5 avril à Kergaran/Plovan (29S), 4 ♂ et 1 ♀ à Poulguidou/Plouhinec (29S) le 6 avril, 3 couples à Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 14. Notons que 2 localités bien suivies montrent un double maximum : fin-mars et 11-12 avril (Trenvel, Saint-Renan).

Ensuite, des oiseaux semblent s'attarder jusqu'au 23 mai : encore 10 le 2 mai, 8 le 13, 6 ♂ les 16, 21 et 23 mai à Meneham ; 2 ♂ au Curnic/Guisseny (29N) le 13 mai, 5 à Saint-Renan le 2 mai, 1 à Arzal (56) le 9 mai, 1 ♂ à Kervran le 22, 1 ♂ à Grandlieu (44) le 9 mai, encore 7 le 9 et 4 le 21 mai à Trenvel. Enfin, 1 ♀ à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 7 juin.

Nidification : Il n'est pas exclu que certains des oiseaux de mai soient des nicheurs. La nidification n'est prouvée qu'à Meneham par la découverte d'un nid le 3 mai ; un seul couple y est noté en juin.

Un couple semble également avoir niché au marais de Bodaval/Le Tour-du-Parc (56) où 1 ♀ alarme le 14 juin. On peut également envisager la nidification au lac de Murin (44) où 8 ind. sont observés le 13 juin, à Hescas/Saint-Lyphard (44) (5-10 le 13 juillet), à Trenvel (20 le 9 juillet) et à Saint-Renan (29N) où 1 ♀ alarme le 18 mai (2 ♂♂ le 2 juin). Notons enfin 2 ind. à Kerizan/Crac'h (56) le 14 juillet.

On peut remarquer que le passage ne touche que le littoral (ou des localités très proches) et que d'autre part, nous ne savons rien, ou peu s'en faut, de la répartition de cette espèce en tant que nicheuse.

CANARD SOUCHEY (*Anas olypeata*). 62 données

Passage bien marqué du 21 mars au 23 avril. Les plus gros effectifs sont notés fin-mars et début-avril : 11 le 21 mars, 5 couples le 28 et le 29 mars, 7 le 11 avril, 6 le 14 au Curnic/Guisseny (29N) ; 2 à 5 entre le 22 mars et le 11 avril à Saint-Renan (29N) (la composition des groupes varie et montre un renouvellement continu) ; 27 le 25 mars, 14-22 le 28, 5 le 11 avril, 6 le 16 et 1 couple le 22 à Heneham/Kerlouan (29N) ; 30 le 28 mars au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44) ; 90-100 le 28 mars, 150 le 5 avril, 30 le 12 avril à Trenvel/Tréogat (29S) ; 3 le 9 avril, 5 le 14, 12 le 17, 9 le 22 et 11 le 23 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N). Le passage est d'ailleurs beaucoup plus marqué dans le Finistère que dans le reste de la Bretagne : le Morbihan ne voit passer que des groupes réduits (de 1 à 12 oiseaux) entre le 26 mars et le 16 avril. A la différence du pillet et de la Sarcelle d'été, quelques oiseaux s'arrêtent sur les plans d'eau de Bretagne intérieure : 1 ♂ et 1 ♀ à l'étang du Boulet/Feins (35) le 1er avril, 1 couple à Loudéac (22) le 10, 5 à Priziac (56) le 14, 1 couple à l'étang de la Musse/Baulon (35) le 16.

Après ces passages, les données ne proviennent que de la baie d'Audierne (29S), lieu de nidification classique. Cette année, l'effectif nicheur a été particulièrement bas : 1 nid/3 oeufs à St-Vio et 5 ♂♂ à Trenvel le 1er mai, 5 ♂♂ le 9 mai et 12 le 21 à Trenvel.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*). 87 données

Derniers hivernants : 27 le 16 mars, 26 le 22, 22 le 26, 12 le 1er avril, 6 le 8, 5 le 11 au Cranic/Brec'h (56) ; encore 27 le 23 mars, 18 le 1er avril à Saint-Renan (29N) ; 60-70 le 28 mars, 30 le 2 avril, 11 le 12 à Trenvel/Tréogat (29S) ; derniers (3 ind.) à Kerhuon (29N) le 4 avril, à Kerjean/Trébabu (29N) le 5 (2 ind.) ; 18 le 28 mars et 21 le 9 avril au Yeun-Elex (29N).

Passage sensible en fin-mars et début-avril : à Saint-Renan, 67 le 29 mars ; quelques oiseaux apparaissent à Priziac (56) le 1er avril, à Guisriff (56) le 4, à Bodaval/Le Tour-du-Parc (56) le 6, à Goulven (29N) le 10, au Curnic/Guisseny (29N) le 21 mars et le 11 avril.

Des oiseaux s'attardent en avril et jusqu'à début-mai : 6 à l'étang de la Lande d'Ouée (35) le 15 avril, 1 couple à l'étang de la Musse/Baulon (35) le 16, 1 couple au Cranic/Brec'h (56) le 24, 1 à Trévignon/Trégunc (29S) le 25, 1 ♂ à Kerjean/Trébabu (29N) le 26, 1 ♂ à Saint-Vio/Tréguennec (29S) le 1er mai. A Saint-Renan, 1 couple les 19 et 26 avril, 1 couple plus 1 ind. le 2 mai, 1 couple le 3 mai ; le couple a cherché à s'installer, se montrant très discret et visitant fréquemment les zones de végétation dense.

En mai et juin, il ne reste que les nicheurs et quelques estivants, tentant pour la plupart de s'installer : à l'étang du Boulet (35), la nidification est à nouveau prouvée : 1 nid/8 oeufs le 14 mai, 1 nid/7 oeufs et 2 familles (5 et 7 pulli) le 19 juin, 2 familles (5 pulli chacune) le 25. Au lac de Grandlieu, la reproduction n'est pas établie, mais on note 3 couples le 9 mai, 1 couple à Saint-Aignan le 15 mai, 1 couple à l'embouchure de l'Ognon le 16. En Grande-Brière, 1 ♂ à Roscas le 14 juillet ne constitue qu'un indice bien mince. Dans le Yeun-Elez (29N), 4 ♂ et 2 ♀ le 2 mai, 3 ♂ et 2 ♀ le 6 juin, 4 ind. le 16 juin, 2 le 20, mais toujours pas de reproduction semble-t-il. A Trenvel (29S), dernière observation le 21 mai (3 ind.). A l'étang de Kerzine/Plouhinec (56), le milouin a aussi tenté de s'installer : 1 ♂ le 15 avril, 1 ♂ le 30 avril, 1 couple et 1 ♂ le 22 mai, 2 ♂ le 20 juin. De toute évidence, le milouin montre une tendance à séjourner tardivement jusque dans l'extrême ouest breton, sans doute à la recherche de nouveaux sites de reproduction.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*). 87 données

Le départ des hivernants est suivi à Saint-Jean/Mendon (56) : 128 le 16 mars, 103 le 22, 80 le 28, plus noté ensuite.

Passage du 18 mars au début-mai essentiellement : à Saint-Renan (29N), 11 le 18 mars, 15 le 22 et le 23, 8 le 26, 4 couples et 1 ♂ le 29, 5 couples le 1er avril, 2 couples le 11, 1 couple et 1 ♂ le 19, le 20 et le 26 avril, 3 ind. le 2 mai ; à Trenvel/Tréogat (29S), 30 le 2 avril, 25 le 5, 12 le 12 ; à l'étang du Pont/Kerlouan (29N), 7 les 21 et 25 mars, 5 le 28, 4 le 9 avril, 3 le 16, 1 couple le 22 et le 23 ; au Yeun-Elez (29N), 15 le 28 mars, 13 le 9 avril, 1 couple le 13, 3 couples le 2 mai ; à Priziac (56), 12 le 1er avril, 1 le 21 ; au Boulet/Feins (35), 2 ♀ le 28 mars, 1 ♂ et 3 ♀ le 1er avril, 2 ♀ le 11, 1 ♀ le 18, 1 couple le 25, 1 ♂ et 3 ♀ le 1er mai. Notons encore 12 à Trévignon/Trégunc (29S) le 7 avril, les autres données ne concernant que des isolés.

On remarque que certains oiseaux séjournent longuement (plusieurs semaines dans certains cas).

En mai et dans la première quinzaine de juin, quelques oiseaux passent encore : à Grandlieu (44), 6 couples les 8 et 9 mai, 4 ♂ et 3 ♀ le 18 ; à l'étang du Pont, 1 couple le 13 mai ; à Saint-Jean/Mendon,

1 couple le 14 mai, 1 ♀ les 3, 6 et 9 juin (cette ♀ alarmait le 6) ; à Trenvel, 3 le 21 mai ; au Yeun-Elez, 1 couple le 23 mai ; enfin à Goulven (29N), 2 ♂ le 14 juin.

Quelques observations à partir du 10 juillet : 1 couple à Trévignon/Trégunc (29S) les 10, 11 et 12, 1 ♀ à Passay/lac de Grandlieu le 12.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*). 1 ♂ à l'étang du Cranic/Brec'h (56) du 16 mars au 11 avril, 1 ♀ à Goulven (29N) les 17 et 18 avril.

EIDER A DUVET (*Scoteria mollissima*). 5 données

Les observations proviennent des parages de l'estuaire de la Loire : à la pointe du Castelli, 2 ♂ et 1 ♀ le 28 mars, 3 ind. le 13 juin et 1 le 27 ; à la pointe du Croisic, 3 ♂ et 1 ♀ en vol vers le nord le 30 mai, 1 ♀ en vol vers le sud le 14 juillet.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*). 47 données

Sur les lieux d'hivernage, de fortes bandes demeurent jusqu'à début-avril : 40 le 19 mars dans le golfe du Morbihan, 1 000 à Penthievre-Erdeven (56) et 55 en baie de Quiberon (56) le 24, 230 le 27 et 300 le 3 avril en baie de Suscinio/Sarzeau (56), 50 à Saint-Gildas-de-Rhuys (56) le 31 mars, 150 au Ri/Douarnenez (29S) le 5 avril.

Passages notés vers le nord devant Feunteun-Aod/Plogoff (29S) et dans les parages de Belle-Ile-Quiberon (56) entre le 6 et le 8 avril : 165 en 55 mn à Feunteun-Aod le 7.

Peu ensuite en avril et début-mai : 1 en Penzé (29N) le 14 et le 19, 1 ♂ en rivière de Daoulas (29N) le 17 ; 200 le 18, 18 le 27 et 5 le 9 mai à la pointe de la Torche (29S). 6 en vol vers le nord au Croisic (44) le 9 mai.

Aucune observation ensuite jusqu'au 11 juin : 70 à Kerhilio/Erdeven (56) le 11 juin, 1 devant Brignogan (29N) le 19, 14 en baie de Quiberon (56) le 28, 3 dans l'embouchure de la Vilaine (56) le 2 juillet.

Mouvements observés à partir du 12 juillet devant le Croisic, essentiellement vers le sud : 123 vers le nord, 40 vers le nord notés entre le 12 et le 15.

GARROT A OEIL D'OR (*Eucephala alangula*). 11 données

Derniers hivernants : 7 ♀ le 22 mars en rivière d'Etel (56) ; 1 à Kerhuon (29N) le 4 avril ; dans le

golfe du Morbihan, 100 le 19 mars, 66 le 24, 12 le 31, 6 le 5 avril ; encore 2 œufs en baie de Daoulas (29N) le 17 avril.

Petit passage dans la première quinzaine d'avril : 19 à Trenvel/Tréogat (29S) les 5 et 12, 3 œufs dans l'étier de Banastère (56) le 6, 5 œufs au Yeun-Elaz (29N) le 9.

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*). 40 données

Dans le golfe du Morbihan, 80 le 19 mars, 105 le 24, 73 le 31, 80 le 2 avril, 100 le 5. Les comptages en baie de Morlaix + Penzé (29N) font apparaître une augmentation en fin-mars (passage pré-nuptial) : 10 le 23 mars, 5 en Penzé les 26 et 27 mars et 32 en baie de Morlaix les 28 et 29.

Dernières observations : 5 à Saint-Philibert (56) le 9 avril, 2 en Penzé le 14, 18 devant Suscinio/Sarzeau (56) le 16, 4 en rivière de Daoulas (29N) le 17, 1 dans le golfe du Morbihan le 20, 4 à la Trinité-sur-Mer (56) le 21 ; enfin 1 en Penzé jusqu'au 31 mai.

L'observation de 5 œufs en vol vers le nord à la pointe du Croisic (44) le 15 juillet, constitue notre première donnée estivale (nous ne pouvons, bien sûr, l'interpréter).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*). 100 données

Nidification : Vol nuptial en forêt de Rennes (35) le 27 mars ; ballet et construction de nid au Faouët (56) le 1er avril ; parades au Vioreau (44) le 4 avril ; 3 œufs à Cheffontaines/Pleuven (29S) et nid frais à la Tourneiraie/Goven (35) le 7 avril ; 3 œufs dont 1 à l'éclosion et ponte détruite à Plouray (56) le 30 avril ; nids dénichés en forêt de Rennes et de Lannuzouarn/Plouenan (29N), 2 œufs à Lescoat/Plouigneau (29N) le 1er mai ; 4 œufs au nid en forêt de Molac (56) le 2 mai ; 3 poussins au nid à Plouray le 18 mai ; poussins au nid à Pluvigner le 23 mai ; baguage de 3 poussins à Pluvigner et de 6 poussins pour 3 nids en forêt de Molac le 29 mai ; 4 poussins bagués à Lanvenegen et 3 à Meslan (56) le 1er juin ; baguage de 3 poussins à Surzur (56) et de 3 autres au camp de Meucon (56) ; 1 poussin et 1 œuf dans une aire en forêt de Toullfoenn/Clohars-Carnoët (29S) et 3 poussins emplumés à Cheffontaines le 7 juin ; alarme et nid au bois de Kerliver/Hanvec (29) le 7 juillet.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*). 27 données

Nidification : à Lanvenegen (56), 2 œufs le 30 avril, nid vide le 22 mai ; au Vioreau (44), construction du nid les 30 et 31 mai ; à Surzur (56), 3 œufs et 2 poussins le 6 juin, 3 poussins bagués le 19 juin ; à Cheffontaines/Pleuven (29S), 4 poussins en duvet et 1 œuf clair le 7 juin ; à Gouesnac'h (29S), 6 œufs le 24 juin.

Par ailleurs : 1 à Terenez/Rosnoën (29S) le 26 mars ; 1 sur la Vilaine (56) le 30 mars ; 1 ♀ dans les marais de Suscinio/Sarzeau (56) le 2 avril ; 1 en forêt du Cranou (29) le 5 avril ; 1 ♀ à Billion/Ambon (56) le 13 avril ; 1 ♂ à Lambre/Le Tour-du-Parc (56) le 14 avril ; 1 à l'étang de Loperhet/Erdeven (56) le 15 avril ; 1 à l'étang du Roc'h Du/Crac'h (56) les 19 avril et 28 juin ; 1 à l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc le 27 avril ; 1 à l'étang de Noyal (56) le 7 mai ; 1 à l'étang de St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 14 mai ; 1 en forêt de Rennes (35) le 17 mai ; 1 couple au château de Kervihan/Carnac (56) le 19 mai ; 1 à Kerguedal/Plouvorn (29N) le 20 mai ; 1 entre Vannes et Ploeren (56) le 30 juin ; 1 à Kerguen/St-Ave (56) le 3 juillet : 1 à Rundrez/Hanvec le 6 juillet.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*). 4 données

Nidification : en forêt de Floranges (56), 1 ♀ au nid le 28 mars, poussins le 22 mai, 1 poussin bagué le 29 mai ; en forêt de Pluvigner (56), 1 oeuf cassé au pied de l'arbre portant le nid le 29 mai.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*). 13 données

1 le 16 mars à Grand-Lieu (44) ; 1 le 28 mars à Messac (35) ; présent fin-mars à Bouguenais (44) ; 1 le 2 avril à St-Etienne-de-Montluc (44) ; 1 au Vioreau (44) le 7 avril ; 1 aux marais de Suscinio/Sarzeau (56) le 10 avril ; observé plusieurs fois du 15 au 22 mai au lac de Murin/Massérac (44) ; présent début-juin à La Chapelle-des-Marais (44) ; 2 à Camerun/La Chapelle-de-Marais (44) le 9 juillet.

Nidification : prouvée à Grand-Lieu : 1 le 16 mars ; 10 dont 1 parade le 18 avril à l'Halbrandière/St-Aignan-Grand-Lieu ; 30 à Grand-Lieu le 9 mai ; 1 couple nourrit des poussins au nid à l'Arsangle le 16 mai ; 1 à Passay/La Chevrolière le 12 juillet ; nidification probable au Vioreau où l'espèce a été notée à toutes les visites à compter du 7 avril.

BONDREE APIVORE (*Perisoreus inornatus*). 13 données

1 couple en forêt de Hanvaux (56) le 2 mai ; vol en feston au sud de la forêt de Rennes (35) le 17 mai ; autre vol en feston en forêt de Rennes le 20 mai (2 couples pour cette forêt) ; 1 entre Surzur et le Hezo (56) le 24 mai ; 1 sur l'Odet/Plonelin (29S) le 5 juin ; 1 au bois de Sarzeau (56) le 15 juin ; 1 à Pleuven (29S) le 18 juin ; 1 entre Noyal et Surzur le 22 juin ; 1 au Plessis-Kaer/Crac'h (56) le 27 juin ; 1 au cap Frehel (22) le 10 juillet ; 3 en trois points des environs de Bourgneuf-en-Retz (44) le 12 juillet ; 2 en vallée du Rivoal (29N) et 1 à St-Cadou (29N) le 14 juillet.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*). 25 données

Quatre données se rapportent sans doute à des oiseaux de passage : 1 ♀ capture des insectes au vol à Lampaul-Ploudalmezeau (29N) le 22 avril ; 1 ♀ au Vioreau (44) le 1er mai ; 1 ♂ à Goulven (29N) le 15 mai ; 1 ♂ à Loc'h Kergaran/Plovan (29S) le 7 juillet.

Nidification : toutes les autres observations ont été faites dans le voisinage de localités où la nidification est probable ou certaine. A Plouhinec (56), 1 ♀ en nœc le 30 avril ; en rivière de Noyalo (56) : 1 ♀ dans les marais de Séné le 26 mars, 1 ♂ à l'étang de Noyalo le 15 juin ; en presqu'île de Rhuys (56) : 1 couple et 1 ♀ dans les marais de Suscinio/Sarzeau le 27 mars, 1 ♂ et 3 ♀♀ en cet endroit le 31 mars et 1 ♀ à l'étang de Kerpont/Sarzeau le même jour, 1 ♀ au marais de Duer/Sarzeau ainsi qu'1 ♂ et 2 ♀♀ avec transport de matériaux dans les marais de Suscinio le 2 avril, 1 ♀ aux marais d'Ambon le 14 avril, 1 ♂ et 2 ♀♀ à Suscinio le 16 avril, 1 ♀ à l'étier de Caden/Le Tour du Parc le 21 avril, 1 ♂ et 3 ♀♀ à Suscinio le 27 avril, 1 ♂ à l'étier de Caden le 7 mai, 1 ♀ dans les marais de Bodaval/Sarzeau le 14 mai, 1 ♀ à Penvis/Sarzeau le 24 mai, 1 ♀ et 1 ♂ immature aux marais de Bodaval le 15 juin ; au lac de Murin/Massérac (44) : 1 le 17 avril ; en Grande Brière (44) : 1 à St-Lyphard le 12 avril ; au lac de Grand-Lieu (44) : 2 le 18 avril, 1 couple le 9 mai, 1 ♂ le 15 mai, 2 le 16 mai.

BUSARDS "CUL BLANC" (*Circus cyaneus/pygargus*). 4 données

1 ♀ à Porh Gwenn/Belle-Ile (56) le 3 avril ; 1 à Bordelann/Belle-Ile le 4 avril ; 1 à Hanvec (29) le 31 avril ; 1 à Kervegant/Plouhinec (56) le 22 mai.

BUSARD ST-MARTIN (*Circus cyaneus*). 5 données

1 ♂ à Menez Neur/Hanvec (29N) le 6 avril ; 1 ♂ au Tuchenn Kador/Botmeur (29N) le 26 juin ; 1 ♂ à St-Rivoal (29N) le 26 juin ; 1 ♂ à St-Eloy (29N) le 27 juin ; 1 couple à Locmaria/Belle-Ile (56) le 9 juillet.

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*). 37 données

Prenières observations : 1 ♀ à Lampaul-Ploudalmezeau (29N) le 22 avril ; 1 couple à Moustoirac (56) le 24 avril ; 1 ♂ dans les marais de St-Etienne-de-Montluc (44) le 28 avril. Notons en outre 1 ♀ morte dans les marais de Massérac (44) le 28 mai.

Nidification : en dehors des lieux traditionnels de nidification (Monts d'Arrée, baie d'Audierne, landes de Lanvaux, golfe du Morbihan, Belle-Ile, etc...) signalons : 1 couple le 8 mai sur la lande de Lanfains (22) où 1 ♀ alarme fortement le 11 juillet ; plusieurs observations sur la côte nord du cap Sizun aux alentours de la réserve M.H. JULIEN/Goulven (29S) : 1 ♂ sur la réserve le 28 mai, 1 ♂ à Kergulan le 30 mai, 1 ♂ à la réserve le 10 juin ; 1 ♀ à Coëquidan/Beignon (56) le 31

mai ; 1 à la Grande Vallée/St-Etienne de Montluc le 4 juin ; 1 au Croisic (44) le 11 juillet.

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*). 2 données

1 à l'étang de Bazouges-sous-Hédé (35) le 18 avril ; 1 à ~~X~~Trenvel/Treogat (29S) le 21 mai.

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*). 5 données

1 à Ste-Lumine-de-Clisson (44) le 8 avril ; deux observations autour du lac de Grand-Lieu (44) le 16 mai ; 1 au bois de l'Arsangle et 1 à l'Halbrandière ; 1 couple en forêt de Rennes (35) le 17 mai ; 1 près de Chanteloup (35) le 31 mai.

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*). 1 donnée

1 ♀ au Collet (44) le 28 mars.

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*). 144 données

Parades le 2 avril à Kervet/St-Gildas de Rhuy (56) et le 12 avril à Tremazan/Landunvez (29N). 5 oeufs à Roudouallec (56) le 28 avril ; 2 pontes de 5 oeufs au Yeun-Elez (monts d'Arrée) (29N) le 2 mai ; 5 poussins et 1 oeuf pourri au Faouët (56) le 15 mai ; 3 oeufs dans un autre nid au Faouët le 21 mai ; 5 poussins à Roudouallec le 26 mai (dénichés enduite) ; 5 oeufs dans la falaise de Baludenn/Belle-Ile (56) le 29 mai ; 3 oeufs à Theix (56), 4 poussins à Penvins/Sarzeau (56), 4 poussins bagués à Meucon (56) et 5 poussins dans le Yeun-Elez le 6 juin ; juvéniles à peine volants à Le Tour-du-Parc (56) le 12 juin ; 3 poussins à Meslan (56) le 16 juin ; 5 oeufs à Roudouallec et 4 poussins à Surzur (56) le 19 juin ; 2 nichées de 3 poussins dans les monts d'Arrée le 20 juin ; poussins dans la falaise de Binic (22) le 1er juillet ; 5 poussins à Roudouallec le 10 juillet.

PERDRIX ROUGE (*Alcotoris rufa*). 6 données

Trois observations de 2 ind. en trois points de Belle-Ile (56), le 5 et 6 avril ; 2 aux marais de Vue (44) le 2 mai ; 1 à Beslé-sur-Vilaine (35) à la mi-mars ; 2 couples aux gravières de Bruz (35) le 20 juin.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*). 12 données

15 oeufs à Lanvenegen (56) le 28 mai ; 60 poussins pour 3 couples à Plouvorn (29N).

CAILLE (*Coturnix coturnix*). 7 données

Chants : les 16 avril et 14 mai à St-Etienne-

de-Montluc (44) où seront comptés 3 couples pour 100 hectares ; le 18 avril au Kernic/Plouescat (29N) et le 16 mai à Grand-Lieu (44). 1 couple au moulin de Plouhars/Sarzeau le 2 mai. 7 oeufs à Kervoanec/Plougourvest (29N) le 5 mai.

FAISAN (*Phasianus colchicus*). 4 données

Chants les 18 avril et 16 mai à Grand-Lieu (44), le 30 mai au Vioreau (44) ; poussins au Loc'h/Glenan le 30 juin.

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*). 32 données

Les données sur la reproduction de cette espèce étant très peu nombreuses, nous retiendrons ici les observations faites du 10 mai au 15 juillet comme critères de nidification possible :

4 oeufs à l'étang du Rocher/Théhillac (56) le 24 avril... 3 poussins sur les prés salés de l'Elorn/Dirinon (29N) et cris à Kervégant/Plouhinec (56) le 22 mai ; 1 dans les marais de Guérande (44) le 30 mai ; 1 à St-Renan (29N) le 2 juin ; 1 à l'étang de St-Jean et cris à l'étang de Mostang (56) le 5 juin ; 1 à l'étang du Moustoir/Baden (56) le 11 juin ; 1 au Moulin-Neuf/Plouvorn (29N) et 1 aux marais de Bodaval/Sarzeau (56) le 15 juin ; 2 couples à Kerzine/Plouhinec (56) le 21 juin ; cris à Lannenc/Ploemeur (56) le 24 juin ; 1 à Kerrouze/La Trinité-sur-Mer (56) le 1er juillet ; 2 sur l'île En Eidig (56) du 2 au 4 juillet ; 1 au marais de Pleboulle (22) le 8 juillet ; noté en Brière (44) du 9 au 14 juillet ; 1 au marais de Kerhellen/Trebeurden (22) le 15 juillet.

MARQUETTE PONCTUÉE (*Porsana porsana*). 1 donnée

1 chanteur à Kerouriec/Erdeven (56) le 8 mai.

RALE DE GENET (*Crex crex*). 8 données


12 chanteurs le 16 avril à St-Etienne-de-Montluc (44) où, pour une centaine d'hectares, il y a en moyenne 1 couple par 10 hectares ; 1 chant à Tharon (44) le 1er mai ; 2 chants à l'île Héron/St-Sébastien-sur-Loire (44) le 15 mai ; 3 chanteurs aux marais de Vue (44) le 22 mai ; nombreux chanteurs dans les marais de Massérac (44) les 30 mai et 13 juin ; 3 chanteurs à la prairie de Mauves (44) le 26 juin.

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*). 96 données

Nidification : Poussins au Ter/Ploemeur (56) et nid vide à l'étang de la Musse/Baulon (35) le 16 avril ; 6 oeufs à St-Renan (29N) le 19 avril ; 3 poussins au Bois d'Amour/Quiberon (56) le 1er mai ; 3 juvéniles à St-Laurent/Ploemel (56) le 8 mai ; 3 poussins à Kergueno/Carnac (56) le 19 mai ; construction de nids à Branhère/Le Guerno (56) le 15 juin ;

5 poussins aux Gayeulles/Rennes (35) le 18 juin ; 8 poussins aux gravières de Bruz (35) le 20 juin ; juvéniles volants à St-Philibert (56) ; 4 poussins à Brengall/Pont-l'Abbé (29S) ; 5 poussins à Remouillé (44) le 12 juillet ; oeufs et poussins sur l'Ellée au Faouët, à Priziac, Pont-Kallec, Begasse, Beg-Nenez/Guidel (56) et sur l'Aulne à Spezët...

FOULQUE (*Fulica atra*). 172 données



Amorcé à la fin de la période précédente, le départ des hivernants se poursuit dans la seconde quinzaine de mars et les premiers jours d'avril, et est pratiquement terminé pour la mi-avril, le gros du départ ayant lieu dans la troisième décennie de mars. Le graphique ci-dessus illustre ce mouvement dans les localités les mieux suivies (noter particulièrement l'évolution des effectifs au Len), et les chiffres en plusieurs autres points viennent confirmer ce schéma : dans le Golfe (56), 800 le 19 mars, 1 000 le 22 mars, 990 le 26 mars, 340 le 2 avril, encore 100 sur la vasière de St-Armel le 4 avril et 45 en baie du Duer/Sarzeau le 10 avril ; à St-Renan (29N), 215 le 22 mars, 110 le 26 mars, 75 le 1er avril, 5 le 19 avril ; dans l'estuaire de la Penze (29N), 33 le 23 mars, 2 le 29 mars, disparition ensuite ; à l'étang de Priziac (56), 46 le 1er avril, 10 le 14 avril ; en baie de Kerogan/Quimper (29S), 150 le 27 mars, 14 le 2 avril. Encore 200 à Trenvel/Treogat (29S) le 5 avril. 1 ind. à Ouessant (29N) le 5 avril constitue peut-être l'indice d'un passage auquel correspondrait la remontée des effectifs au Len (très bien suivi) au même moment. En cette localité maritime on observe des attardés jusqu'à la mi-mai : 10 le 1er mai, 7 le 2, 1 le 16, 0 le 20 mai.

Nidification :

Ille-et-Vilaine : Au Grand étang d'Ouée/Gosné, 7 oeufs le 15 avril ; à l'étang de Belouze/Baulon, 10 couples et 2 oeufs le 16 avril ; à l'étang de Bazouges-sous-Hédé, 5 couples le 18 avril ; à l'étang du Boulet/Feins, 2 nids le 18 avril ; à l'étang de la Tournerais/Goven, 8 ad. et 2 juvéniles volants le 20 juin. En outre l'espèce a été notée sans preuves de nidification sur les étangs de Chevré/La Bouexière, de Liffre, de Val d'Izé et de la Musse/Baulon le 16 avril, sur l'étang de la Taberge/Ste-Anne-sur-Vilaine le 17 avril.

Côtes-du-Nord : à l'étang du Moulin-Neuf/Plounerin, 2 couples le 10 mai ; au marais de Kerhellen/Trebeurden, 11 ad., 12 poussins et 8 juvéniles le 23 mai ; au Coroncq/Glomeil, 1 nid vide et 1 adulte le 30 mai.

Finistère : à Meneham/Kerlouan, parades le 25 mars, 1 couple et 5 poussins le 3 mai ; à St-Renan, accouplement le 29 mars, 4 et 5 poussins le 15 mai, 5 couples nicheurs minimum ; à St-Vio/Treguennec, 7 oeufs le 4 avril ; au Curnic/Guisseny, 1 ad. couve le 22 avril ; nicheur à l'étang du Pont le 22 avril ; à Trévignon, 31 ad. et 1 couple cantonné le 25 avril ; nid vide à Kerjean/Trehabu le 30 avril ; au Yeun-Elez (29N), 1 ad. et 2 poussins le 5 juillet.

Morbihan : à Roc'h/Crac'h, 3 oeufs le 19 avril, 7 oeufs le 3 mai, 7 oeufs, 7 poussins et 2 juv. le 15 mai ; à l'étang de St-Philibert, 1 ad. et 2 poussins le 8 mai ; à Kerouriec/Erdeven, 2 couples le 8 mai ; à l'étang de St-Jean/Locoal-Mendon, 2 juv. le 14 mai, 5 oeufs, 1 couple nourrissant 1 juv. et 1 autre couple le 5 juin ; à l'étang de Priziac, 2 couples et 7 oeufs le 20 mai, 3 et 2 poussins le 12 juillet (il s'agit du premier cas de nidification en cette localité) ; 1, 2 et 5 juvéniles aux marais de Bodaval/Sarzeau le 15 juin ; adultes et juvéniles à Lannec/

Ploemeur le 24 juin. Foulques présentes, sans preuves de nidification sur : le Cranic/Brec'h, l'étang de Noyal, Kerpont/St Gildal-de-Rhuys, l'étang du Rocher/Théhillac, les étangs de Kerzine et Kervran/Plouhinec, le marais de Kerjouanno/Arzon.

Loire-Atlantique : plusieurs chants à Murin/Massérac le 17 avril ; 1 ad. et 2 poussins à Passay/La Chevrolière le 12 juillet. Observé sans preuves de nidification au Vioresu et St-Aignan.

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*). 137 données

Les observations, moins nombreuses que l'an passé à la même période, sont en général peu suivies sauf en baie de Morlaix (29N) pour laquelle les recensements les plus complets donnent 367 ind. le 9 mai et 250 le 6 juin. Signalons par ailleurs : 105 à Tivieg/St-Pierre (56) le 24 mars... 2 000 en baie d'Yffignac (22) le 11 avril... 70 à Betahon/Anbon (56) et 500 au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44) le 1er mai... 71 en baie de Goulven (29N) le 17 mai... 40 au Bignon de Talbert/Ploubihan (22) le 30 mai... 60 à Trielen/Molène (29N) le 16 juin... 300 à l'île d'Er/Plougrescant (22) le 22 juin. Les données de la mi-juillet doivent concerner la dispersion post-nuptiale : 450 à Yffignac (22) le 13 juillet... 65 au Croisic (44) le 14 juillet... 50 à Penestin (56) le 15 juillet...

Nidification : 28 données s'y rapportent : parades en divers points d'Ouessant (29N) le 5 avril ; premières pontes notées le 15 mai sur Trevoc'h/St-Pabu (29N) ou un nid contient 1 oeuf, trois nids, 2 oeufs et deux nids 3 oeufs ; pontes complètes le 20 mai à Boulardo/Belle-Ile (56) et le 23 mai à Tivieg... ; il y a déjà deux poussins à Trevoc'h le 15 mai !

Quelques données nouvelles : un couple sur Enez Kerlouan (29N) les 23 mai et 13 juin ; deux couples sur les îlots situés à la pointe du sillon Talbert le 30 mai ; deux couples avec oeufs et poussins sur l'île d'Er le 22 juin ; un couple sur Enez ar Morbig/Brehat le 25 juin. Enfin, 61 couples ont été dénombrés sur l'archipel de Molène, moins les îles de Kemenez et Beniget.

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*). 167 données

Jusque dans les premiers jours d'avril, quelques observations se rapportent sans doute à la fin de l'hivernage et au passage. Ainsi : 80 en vol à Daoulas (29N) le 21 mars... 350 à St-Etienne-de-Montluc (44) le 2 avril... 100 à Androstol/Belle-Ile (56) le 3 avril ; 60 venant du sud et des petites bandes de 10 à 20 sur Belle-Ile le 4 avril ; 220 au Vioresu (44) le même jour... 10 à Yuzin/Ouessant (29N) et 40 à Kervellan/Belle-Ile le 5 avril... 150 à Kalastrenn/Belle-Ile le 7 avril.

Nidification :

Ille-et-Vilaine :

polders du Mont-St-Michel + de 20

Côtes-du-Nord :

Flouer-sur-Rance	4
Evran	1

Finistère :

Anse du Kernic/Plouescat	3
dunes de Keremma/Treflez	1
baie de Goulven	7
Pontusval/Brigognan	3
Meneham/Kerlouan	4
Curnic + Vougo/Guisseny	3
Trévignon/Tregunc	6
étang de Poulguidou	1 ou 2

Loire-Atlantique :

marais de Massérac	5
Pont-d'Armes	7
réserve de la Grande Paroisse	5
marais de Vue	5 ou 6

Morbihan :

Le Loc'h/Guidel	5
-----------------	---

Fort-Bloqué/Guidel	1
dunes de Plouhinec	15
dunes d'Étel à Erdeven	10 à 12
dunes d'Erdeven à Plouharnel	16
Pierres-Plates/Locmariaquer	2
marais de Noyal	4
Salines de Lasne/St-Armel	1
marais du Ludre/St-Armel	10
marais de Calzac/Sarzeau	3
marais de Bucodo	3
marais de Le Tour-du-Parc	21
marais d'Amboin-Surzur	33
Kerhuél/Belle-Ile	7
Vazen/Belle-Ile	2
Aérodrome de Belle-Ile	0
marais de Plouray-La Garenne	5
étang de pPriziac	3
Guiscriff	3
marais de Rieux	2

De vastes ensembles comme les marais de la baie d'Audierne et les marais de Séné n'ont pas été recensés et nous manquons toujours cruellement de chiffres pour la Grande-Brière, les marais de Montoir-Donges et ceux de Bourgneuf-Macheocoul en Loire-Atlantique, ces divers secteurs totalisant certainement plus de Vanneaux nicheurs que tout le reste de la Bretagne... De nouvelles colonies nous ont été signalées : Evran, Plouhinec (56), les Pierres-Plates, Lasné, Calzac, Priziac, Rieux, Pont-d'Armes, Vue ; deux d'entre elles au moins -Priziac et les Pierres-Plates- n'existaient pas en 1970 ; quant aux 2 couples de Rieux, ils ne représentent sans doute pas tout l'effectif nicheur des vastes marais de Redon et de la Vilaine. Notons enfin la forte augmentation des colonies installées autour de la rade de Pénérif -57 couples contre une quinzaine en 1970- : s'agit-il vraiment d'une augmentation, ou d'un transfert d'oiseaux depuis les marais de Séné non recensés cette année ?

Ebauches de nids à Roudouallec (56) le 25 mars ; trois pontes complètes à Trenvel/Treogat (29S) le 4 avril... 3 et 4 oeufs à Vazen/Belle-Ile le 6 avril... pontes complètes à Plouray et à Erdeven le 12 avril ; premiers poussins notés le 25 avril à Trévignon et à Erdeven ; encore deux pontes complètes, non écloses, le 20 juin à la Grande-Paroisse ; des Vanneaux alarmés toujours sur leur site de reproduction, à Meneham le 11 juillet et à Priziac le 12 juillet.

Les premiers mouvements et rassemblements d'oiseaux sur les lieux de reproduction et dans leur voisinage sont enregistrés fin-mai : une vingtaine en vol à Massérac le 31 mai... 17 à Meneham le 4 juin... rassemblement dans les dunes d'Erdeven-Plouharnel le 11 juin... 11 ind. en plus des nicheurs le 13 juin à Massérac... Les observations de groupes de Vanneaux se multiplient à partir des derniers jours de juin : 9 en vol vers

l'ouest à Goulven le 28 juin... 35 en rivière de Pont-l'Aabbé (29S) le 2 juillet ; 8 à Penn ar Prad/Plouvorn et 16 à Tredubal (estuaire de la Vilaine) le 3 juillet... 60 à Trevignon le 11 juillet... nombreux cris à St-Etienne-de-Montluc dans la nuit du 13 juillet... 20 au dessus de la lande de Lanfains (22) le 13 juillet... 19 au Moulin-Neuf/Plouvorn, 1 à Plevenon (22), 2 à Lamballe (22), 13 à Merizan/Crac'h (56), 19 à St-Jean/Mendon (56) le 14 juillet et 10 à Milizac (29N) le 15 juillet.

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*). 16 données

Les observations sont surtout concentrées de fin-mars à la mi-avril (neuf données) : 80 vers le nord à St-Vio/Treguennec (29S) le 28 mars ; 5 dans les marais de Suscinio/Sarzeau (56) le 2 avril ; 3 à Ker Pol Ico/Belle-Ile (56) le 3 avril ; 1 vers le nord à Quessant (29N) le 4 avril ; 2 à Keruhel/Belle-Ile le 5 avril ; 50-60 à St-Vio le 6 avril ; 1 à Enter/Belle-Ile et 1 à Ambon (56) le 13 avril ; 1 au Curnic/Guisseny (29N) le 14 avril.

Les sept autres données sont dispersées sur tout le reste de la période : 4 au Loc'h/Guidel (56) les 2 et 20 mai ; 3 au Boulet/Feins (35) le 30 mai ; 1 en plumage nuptial à Plovan (29S) le 30 juin ; 1 en plumage nuptial à Trevignon/Tregunc (29S) le 11 juillet.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis aquaratoria*). 54 données

La quasi-totalité des données (51) est assez régulièrement répartie jusqu'à la première décade de juin.

Le passage amorcé à la fin de la période précédente (cf. AR VRAN, 1971, 4 (2), p.) semble culminer dans la seconde quinzaine de mars dans le golfe du Morbihan, avec 200 ind. le 26. Ailleurs, on ne note guère que de petits groupes : 20 au Collet (44) le 28 mars... 14 en baie de Goulven (29N) le 29 mars... 14 à St-Pierre/Loznariaquer (56) le 30 mars... 15 dans l'anse du Po/Plouharnel (56) le 5 avril.

Un petit passage est noté dans la seconde décade d'avril en deux localités léonardes avec maxima de 50 à Goulven le 12, et de 30 en Penzé le 18. Encore quelques beaux groupes jusqu'au 10 mai ; 28 en baie de Gervres (56) le 30 avril... 50 au Collet le 1er mai... 30 dans l'étier de Caden/Ambon (56) le 7 mai... 22 en Penzé le 9 mai... 30 sur la vasière de l'île Bailleron (golfe) le 10 mai.

De cette date à la fin du mois, on n'enregistre que neuf observations de 1 à 6 ind., puis : 15 en Penzé et 15 auxillon de Talbert/Pleubian (22) le 31 mai ; 10 à la Grande Paroisse/La Turballe (44) et 18 en Penzé le 6 juin.

L'espèce n'est alors plus observée qu'à Goulven - de 1 à 3 ind. les 7, 8, 28 juin et 13 juillet - et en Penzé - 20 ind. le 15 juillet -.

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*). 87 données

Commencé à la fin de la période précédente, le passage se poursuit faiblement en mars-avril ; passages nocturnes à Vannes (56) le 25 mars... 2 à Guiscriff (Morbihan intérieur) le 4 avril... 7 au lac de Murin/Massérac (44) le 17 avril. Mais c'est en mai surtout qu'il prend de l'ampleur : 50 au Collet (44) le 1er mai... 160 en baie de Guisseny (29N) le 2 mai... 30 sur la plage du Curnic/Guisseny les 13 et 16 mai... 50 à Goulven (29N) le 17 mai... 50 au Fort-Bloqué/Ploemeur (56) le 20 mai... 100 en baie de la Fresnaye (22) les 22 et 23 mai. Une dernière vague est enregistrée dans la première semaine de juin avec : 13 dans les marais de Séné (56) le 4... 110 à St-Jacut (22) le 5... 20 en baie de Goulven et 15 au Curnic le 7..., après quoi le passage est pratiquement terminé. Encore 10 à Quilliec/Sibiril (29N) le 14 juin, les huit dernières données, dispersées sur la fin de la période, ne concernant que des groupes de 1 à 5 oiseaux.

Nidification : Dans l'archipel de Molène (29N), 18 couples ont été recensés sur l'ensemble des îles, moins Kenezex et Beniget, du 15 au 17 juin. Le fait marquant de ce printemps est l'installation de Grands Gravelots sur le littoral trégorrois (22) : 1 ind. alarme sur le sillon de Talbert/Pleubian le 30 mai ; 1 couple à comportement nicheur (*injury feigning*) à l'île d'Er/Plougrescant le 22 juin ; 2 couples - 1 poussin découvert - à Landrellec/Pleumeur-Bodou le 16 juin ; enfin, la découverte de juvéniles volants, de poussins et d'un nid contenant 4 oeufs permet de localiser 4 couples sur l'île à Canton/Pleumeur-Bodou le 26 juin.

PETIT GRAVELOTT (*Charadrius dubius*). 73 données

En début de saison, cinq données se rapportent à des localités où le Petit Gravelot ne semble pas avoir niché : 1 à Ambon (56) le 13 avril ; 2 à l'étang Noir/La Forest-Landerneau (29N) le 15 avril ; 1 dans l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 21 avril ; 4 à l'étang du Boulet/Feins (35) et 2 au Vioreau (44) le 1er mai. Dans les trois premiers cas, il s'agit peut-être d'individus en quête d'un lieu de nidification, la reproduction de l'espèce ayant été prouvée dans des localités voisines ; les deux dernières observations concernent plus probablement des oiseaux de passage.

Nidification : premières arrivées fin-mars-début-avril ; 1 à Trenvel/Treogat (29S) le 28 mars ; 1 couple à Guiscriff (56) le 4 avril ; 2 couples au Fort-Bloqué/Ploemeur (56) le 5 avril, etc... Alarmes et parades le 12 avril à Trenvel, le 18 avril à Loudéac (22), le 19 avril à St-Renan (29N)... ébauches de nids le 16 avril au Fort-Bloqué... 2 oeufs le 22 avril au Fort-Bloqué ; 4 oeufs le 2 mai à Guiscriff...

Ille-et-Vilaine :

gravières de Bruz	1 ou 2
Fac. des Sciences/Rennes	1
plaine de Baud/Rennes	2

Côtes-du-Nord :

étang de Loudéac	2
------------------	---

Finistère :

Le Vougo/Guisseny	0 ou 1
St-Renan	2
St-Marc/Brest	1 ou 2
Loc'h Kergaren/Plovan	2
Loc'h Trenvel/Treogat	4

Morbihan :

kaolins de Guisriff	1
Loc'h/Guidel	1
Fort-Bloqué/Guidel	≥ 4

Salines de la Trinité	≥ 13
étang de Roc'h Du/Crac'h	2
Le Breneguy/Locmariaquer	0 ou 1
étang de Toulvern/Baden	1
marais de Séné	> 1
Petit-Mont/Arzon	1

Loire-Atlantique :

Salines du Rostu/Mesquer	≥ 6
Mauves	2
Pont de Mauves	1

Total Bretagne : 52 couples

La forte augmentation par rapport au total de l'an passé est essentiellement due à la prospection des salines de Beumer - Kervinio - Kerdro - Mervillen/La Trinité. Il faut cependant remarquer que ce total est certainement bien inférieur à la réalité, plusieurs localités connues n'ayant pas été visitées (bancs de sable de la Loire à Nantes ; baie du Mont-St-Michel et Cancale ; marais de Séné et environs immédiats de Vannes...).

Une donnée de juillet concerne sans doute la dispersion : 1 ad. à Arzal (56) le 3.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*). 88 données

Trois observations en début de saison dans des localités où l'espèce n'est pas connue comme nicheuse sont peut-être l'indication d'un passage : 1 au Collet (44) le 28 mars ; 2 à Font-Lorais/Belz (56) le 30 avril (nicheurs des dunes d'Etel ?) ; 2 à St-Renan (29N) le 5 mai.

Nidification : Premiers oiseaux : 3 le 23 mars en baie de St-Philibert (56) ; 1 ♀ au Curnic/Guisseny (29N) et 2 au Vougo/Guisseny le 28 mars ; 6 à St-Pierre/Locmariaquer (56) le 30 mars... Ponte complète le 11 avril au Kernic/Plouescat (29N) ; 5 oeufs dans le même nid au Fort-Bloqué/Guidel (56) le 16 avril ; deux pontes de 2 oeufs et une de 3 oeufs le 22 avril au Fort-Bloqué ; ponte complète le 25 avril à Trevignon/Tregune (29S)... Cinq couples sur douze ont des poussins au Fort-Bloqué le 20 mai ; sur six nids contrôlés le 30 mai au guillon de Talbert/Pleubian (22), trois contiennent 3 oeufs, un est à l'éclosion, les deux autres ont des poussins... Cinq pontes complètes (deuxième ponte) dont une à l'éclosion le 29 juin au Fort-Bloqué ; encore une éclosion le 15 juillet à Groix (56).

Ille-et-Vilaine : présent partout le 31 mai dans la région de St-Benoit-des-Ordes et Le Vivier-sur-Mer, mais aucune preuve de nidification, aucun recensement...



poussin de Gravelot à collier interrompu

cliché Bernard LE GARFF

Côtes-du-Nord : au sillon de Talbert, 8 ou 9 couples minimum le 30 mai ; à l'île d'Er/Plougrescant, 2 ind. le 22 juin.

Finistère : au Dossen/Santec, 4 ad. sur la plage le 4 juin ; à Poulfoenn/Plouescat, 1 sur la plage le 13 juillet ; au Kernic/Plouescat, aucun recensement, 7 ind. le 10 avril et 2 nids trouvés ; à Goulven, aucun recensement, 2 le 12 avril ; à Lidiwic/Brignogan, 3 le 1er mai ; à La Digue/Kerlouan, 3 couples le 9 avril ; à Menehan/Kerlouan, 1 couple le 31 mai ; au Curnic, 1 couple le 9 juillet ; au Vougo, 6 couples le 14 avril ; à Enez Du/Guisseny, 5 couples le 1er juin ; à Trevoc'h/Lampaul-Ploudalmezeau, 2 couples le 15 mai ; à Lampaul-Ploudalmezeau, aucun recensement, 9 le 22 avril ; à Loc'h Kergaran/Plovan, 3 couples le 30 juin ; à Loc'h Trenvel, pas de recensement, 30 ind. le 10 juillet ; à St-Nikolaz/Enezennou Glenen, 1 couple le 29 juin ; au Loc'h/Enezennou Glenen, plus de 4 couples le 30 juin ; à Trevignon, 3 couples minimum le 25 avril.

Morbihan : au Bas-Pouldu/Guidel, 1 couple le 20 mai ; au Loc'h/Guidel, 1 couple le 20 mai ; au Fort-Bloqué/Guidel, 12 couples minimum le 20 mai ; en baie de Gâvres, 2 couples le 7 juin ; à Groix, 1 couple le 15 juillet ; à Kerouriec/Erdeven, 4 ind. le 11 juin ; au Kongell/Quiberon, 1 ind. le 23 mai ; sur En Eidig, 2 couples le 2 juillet ; dans l'anse du Po/Plouharnel, 7 ind. le 5 avril ; dans les Salines de Kervil-len/La Trinité-sur-Mer, 6 couples le 30 juin ; en baie de Kerdro/La Trinité-sur-Mer, 1 couple le 19 mai ; en baie de St-Philibert, 3 le 23 mars ; en baie de St-Pierre/Locmariaquer, 3 couples le 8 mai ; en baie de Pen-vins/Sarzeau, 2 ind. le 7 mai ; à Betahon/Ambon, 18 ind. le 1er mai, 3 le 23 mai ; à Penestin, aucun recensement, 5 ind. le 15 juillet.

TOURNEPIERRE (*Arenaria interpres*). 93 données

Le passage a surtout lieu en mai. Mais certains indices, peu nombreux il est vrai, permettent de penser qu'il commence au mois d'avril : 30 à Molène (29N) et 65 à Ouessant (29N) les 4 et 5 avril ; 34 à Melon/Porspoder (29N) et 40 à Porspoder le 12 avril ; 189 en Penzé (29N) le 18 avril (contre une cinquantaine au maximum au cours de l'hiver...).

Le mois de mai monopolise un peu plus de la moitié des observations de la période (49/53), avec des bandes assez importantes : 70 au Kongell/Quiberon (56) le 1er ; 33 à Lidiwic/Brignogan le 2 ; 25 à Banastère/Le Tour-du-Parc (56) et 17 à Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 6 ; 32 à St-Pierre/Locmariaquer et 108 à Breneguy/Locmariaquer le 8 ; 60 au Kongell et 100 en Penzé le 9 ; 4 à St-Aignan-Grand-Lieu (44) et 3 à Passay/La Chevalière (44), au bord du lac de Grand-Lieu également, le 16 ; 32 à Lampaul/Ouessant le 17 ; 140 au Kongell le 23 ; 40 au sillon de Talbert/Pleubian (22) le 30 et enfin 25 en Penzé le 31, dernière belle bande dans cette localité.

Les mois de juin et juillet ne donne lieu qu'à une quinzaine d'observations d'isolés ou de petites bandes ne dépassant en général pas 5 individus, sauf : 30 à l'île d'Er/Plougrescant (22) le 22 juin, 9 en

Penzé le 27 juin et 11 en Penzé le 15 juillet.

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*). 97 données

Passage important jusqu'à la troisième décade d'avril : 15 à Goulven (29N) le 21 mars... 35 à Lampaul-Ploudalmezeau (29N) le 25 mars... 41 au Stang/Plougourvest (29N) le 27... une centaine à St-Vio/Treguennec (29S), 10 à Trenvel/Treogat (29S) et 15 à Goulven le 28... 14 à l'étang de Kervran/Picuhinec (56) et 13 à Len-Vras (56) le 29... 20 à Plouray-La-Garenne (56) le 1er avril... 15-20 à Trenvel le 5 avril... 11 à Besmen/Plougourvest et 14 à Bucudo/Sarzeau (56) le 6... 20 à Kervran le 9... 13 à Plouray le 10... 11 dans les marais d'Ambon-Surzur (56) le 13... 50 dans les marais de Séné (56) le 16... enfin 10 dans les marais de Rieux (56) le 25. Quelques cizeaux attardés jusqu'en début-mai : 5 à Séné le 30 avril ; 1 à Trenvel le 1er mai ; 1 à Kernouës (29N), 1 à Pennarc'h (29S) et 1 à St-Brandan (22) le 2 mai ; 1 à St-Renan le 6 mai. Toutes les observations suivantes ont été faites en des localités où la nidification a été prouvée, ou non loin, sauf peut-être : 1 aux marais de Massérac (44) le 30 mai et 3 au Coroncq/Glomal (22) le 30 juin.

Nidification : premiers chevrottements à Meneham/Kerlouan (29N) le 25 mars, au Stang le 27 mars, à Besmen/Plougourvest le 6 avril, à Poullou/Silfiac (56) le 9 avril... Notons 1 chanteur perché sur une branche de pin à Langueguer/Plougourvest le 17 avril. Trois oeufs à l'éclosion dans le Yeun-Elez le 27 avril. Un couple accompagné de 3 juvéniles à Meneham le 12 juin.

Toutes les observations de nicheurs sont localisées au Leon et au nord-ouest du Morbihan :

Finistère : à Goulven, 1 couple (chevrottement le 17 mai) ; à Pontusval/Brignogan, 1 couple (chevrottement le 15 avril) ; à Meneham, 2 couples (chevrottements, juvéniles) ; au Curnic/Guisseny, 1 couple (chevrottement le 12 juin) ; à Kerguedal/Plouvorn, 1 ind. le 19 mai ; à Troerlin/Plouvorn, 2 le 2 juin ; au Stang/Plougourvest, 2 couples (chevrottements, alarme le 31 mai) ; à Besmen/Plougourvest, 1 couple (chevrottement le 6 avril) ; à Langueguer/Plougourvest, 1 couple (chant le 17 avril) ; au Yeun-Elez, 1 (?) couple (chevrottements le 6 juin ; 3 oeufs le 27 juin).

Morbihan : à La Garenne/Plouray, 1 couple (parades les 10 et 12 avril) ; au Poullou/Silfiac, 2 couples (chevrottements le 9 avril).

BECASSINE SOURDE (*Limnocryptes minimus*). 4 données.

2 au Curnic/Guisseny (29N) le 25 mars ; 1 à St-Renan (29N) le 29 mars ; 1 au Loc'h/Guidel (56) le 16 avril ; 1 à Grand-Lieu (44) le 17 avril.

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*). 2 données

Il s'agit là de nos premières données de printemps pour cet oiseau : 2 à Besmen/Plougourvest (29N) le 6 avril et 1 à Porh-Pouldon/Belle-Ile (56) le 7 avril.

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*). 121 données


L'essentiel du passage -peu abondant cette année- est terminé début-mai : 115 dans l'étier de Noyal (56) le 19 mars... 100 en rivière d'Étel (56) le 22 mars... 45 à Tivieg/St-Pierre (56) le 24... 80 en rade de Penerf/Dangan (56) le 27... 500 en baie d'Yffignac (22) le 11 avril... 150 dans les marais de Séné (56) le 17 avril... passages à Bailleron/Séné (56) du 30 avril au 4 mai... passage nocturne vers le nord à Auray (56) le 9 mai...

Les observations s'espacent considérablement ensuite ; notons seulement : 70 dans les marais de Séné le 21 mai... 45 à Séné le 11 juin... 30 en Penzé le 15 juin.

Les données redeviennent nombreuses à partir des derniers jours de juin et concernent sans doute pour un bon nombre la dispersion et les premiers retours : 14 à Goulven (29N) le 28 juin... 15 à St-Nikolaz/Glenen (29S) le 29 juin... 15 en baie d'Yffignac et 15 en baie de la Fresnaye (22) le 13 juillet... 108 en Penzé et 15 à Bailleron le 15 juillet.

Nidification : nous n'avons reçu que 18 données dont 3 seulement sont originales. Le recensement des Courlis nicheurs en Bretagne reste à faire... 1 chanteur à Lanneannou (29N) le 1er mai ; 1 chanteur dans la lande de Lanfains (22) le 8 mai ; 1 chanteur à Lescoat/Plouigneau (29N) le 30 mai.

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*). 146 données



Identique dans ses grandes lignes à celui de l'an passé, le passage du printemps 1972 s'étale du 2 avril (2 à St-Gildas de Rhys) au 11 juin (5 dans les marais de Séné et 1 à Kerouriec/Erdeven). Mais l'essentiel a lieu entre le 14 avril et le 17 mai environ.

Les quatre données de début-avril ne concernent que des isolés.

Le 14 avril, 10 en deux points de la rade de Penerf (56) ; le 15 avril, 10 à Erdeven (56)... le 21 avril, 79 à St-Jacut (22) et 33 à Beg Lann/Sarzeau (56)... le 25 avril, 40 à Erdeven, 15 à Plouharnel (56), 15 à Porh-Lineheu/Erdeven, 60 à Trevignon/Tregunc (29S), passage nocturne vers le nord à Auray (56) et 2 dans la vallée de

la Vilaine à Rieux (56) ; le 26 avril, 16 au Kernic/Plouescat (29N)... le 27, 45 au Ludre/St-Armel (56), 77 en rade de Penerf... le 29, 30 à Trenvel/Treogat (29S)... le 30, 20 à Erdeven, 10 à Séné (56), 10 dans l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56), 10 en baie de Gâvres (56)... le 1er mai, 15 à la pointe St-Gildas (44), 15 à Trenvel, 30 en Penzé (29N)... le 2, 35 au Voogo/Guisseny (29N) 10 à Brignogan (29N); le 3, 10 à Erdeven et passage nocturne à Auray... le 7, 25 à Séné, 11 à Penvins/Sarzeau, 10 à Kerbouleo/Sarzeau... le 8, 19 à St-Pierre/Locmariaquer, 16 à Breneguy/Locmariaquer, 11 dans l'Elorn (29N)... le 11, 1 à St-Renan... le 12, 30 à Séné... le 13, 15 en baie de Guisseny... le 14, 10 dans les marais d'Ambon et 35 dans les marais de Caden... le 15, 15 à Erdeven... le 17, 20 à Goulven...

Ensuite, les observations s'espacent et les groupes fondent : du 18 mai au 11 juin, 23 observations de 1 à 5 ind. sauf 11 dans l'Elorn le 22 mai et 25 au Croisic (44) le 2 juin.

Les observations ne reprennent que dans les tous derniers jours de juin : 6 à Goulven le 28 ; 6 à St-Nikolaz/Glenen (29S) le 29 ; 20 dans le Golfe (56) les 1er et 4 juillet... puis 6 en baie de la Fresnaye (22) le 11 juillet... 5 en Penzé le 13 juillet... 10 à Penestin (56), 5-10 en Penzé et 78 dans le Golfe le 15 juillet.

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*). 45 données

Passage faible, mais bien marqué, du 26 mars au 2 mai, culminant dans la première quinzaine d'avril.

5 dans le Golfe (56) le 26 mars ; 2 en rade de Penerf (56) le 27 ; 40 sur un champ inondé à Haute-Indre (44) le 28 ; 1 à Len-Vras/Plouhinec (56) le 29... puis 17 au Vioreau (44) et 4 à St-Etienne-de-Montluc (44) le 4 avril... 9 à St-Vio/Treguennec (29S) et 1 à Poulguidou/Plozevet (29S) le 6 avril... 20 au Vioreau le 11... 1 à Enter/Belle-Ile (56) le 13... 1 à Priziac (56) et 14 à Pontusval/Brignogan (29N) le 14... 2 à Grand-Lieu (44) et 40 au lac de Murin/Massérac (44) le 17. Par la suite, les observations se raréfient et les groupes ne dépassent plus six oiseaux : 2 à St-Renan (29N) et 4 en Penzé (29N) le 19 avril ; 1 à St-Jacut (22) le 21 ; 2 à Trevignon/Tregunc (29S) le 19 avril ; 1 à St-Jacut (22) le 21 ; 2 à Trevignon/Tregunc (29S) le 25 ; 6 dans les marais d'Ambon (56) le 27... 3 dans l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 30... 1 au Loc'h/Guidel (56) le 1er mai et 2 en plumage nuptial au Curnic le 2 mai.

1 immature attardé au Curnic/Guisseny (29N) du 13 au 21 mai.

Nidification : peu de données cette année ; 5 couples maximum semblent avoir niché en baie d'Audierne (29S).

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*). 41 données

Les passages se poursuivent jusqu'en

juin avec maximum d'observations dans la seconde quinzaine de mars (8 données) et dans la première décade de mai (15 données).

En mars : dans le golfe (56), 130 le 19, 74 le 26, 0 le 28 ; en Penzé (29N), 6 le 21 ; en baie de Guisseny (29N), 11 le 29. Passage très dilué par la suite et jusqu'à la fin du mois d'avril notons seulement : 1 ind. à Port-Don/Ouessant (29N) le 6 avril, 50 en baie d'Yffignac (22) le 11, 40 en Penzé le 18 (contre 1 seulement le 14).

Passage bien caractérisé du 30 avril au 9 mai avec : 34 en baie de Gâvres (56) le 30 avril ; 9 à Port-Fetan/Quiberon (56) le 1er mai... 80 en réserve de la Grande-Paroisse/La Turballe (44), 3 au Carnic/Guisseny et 3 au Loc'h/Guidel (56) le 2 mai... 15 en Penzé le 5 ; 31 en baie de Banastère/Sarzeau (56) et 6 dans les marais de Séné (56) le 7 ; 16 à Kerouriec/Erdeven (56) le 8... 5 en Penzé et 4 en baie de Morlaix (29N) le 9.

Puis seulement 10 données dispersées de cette date à la fin juin : 7 à Gâvres le 22 mai... 20 à la Grande-Paroisse le 6 juin ; 8 à Kerurus/Plouneour/Trez (29N) le 7 ; 4 en baie de Goulven (29N) le 8 ; 30 à la Grande-Paroisse le 20 juin ; 100 à l'île d'Er/Plougrescant (22) le 22 et 6 en baie de Goulven le 28. Enfin 8 en baie d'Yffignac le 13 juillet.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*). 31 données

Cette année, le passage pré-nuptial se termine brutalement fin-avril (22 données jusqu'à cette date), le maximum ayant eu lieu du 13 au 27 avril ; 9 dans les marais d'Ambon (56) le 13 avril ; 9 dans les marais de Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 14... 5 dans les marais de Séné (56) et 2 au lac de Murin (44) le 17... 16 aux marais d'Ambon le 27... 1 dans l'étier de Caden et 3 dans les marais de Séné (56) le 30.

A part 1 ind. à Ambon le 24 mai, aucune observation du 30 avril à la dernière décade de juin. Isolés à l'île d'Er/Plougrescant (22), au Roc'h Du/Crac'h (56), en Penzé (29N), en baie de la Fresnaye (22) du 22 juin au 7 juillet et 6 dans les marais de Séné le 25 juin.

Retours certains à mi-juillet : 5 au Roc'h Du et 28 à St-Jean/Lo-coal-Mendon (56) le 14 et 5 dans la Penzé le 15.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*). 112 données

Les données de la seconde quinzaine de mars et de la première moitié d'avril concernent sans doute des hivernants pour l'essentiel. On note encore de belles bandes : 15 dans les marais de Séné (56) le 19 mars... 20 au sillon du Len/Louannec (22) le 21... 20 à Morlaix (29N) et 62 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 23... 21 à Plouharnel (56) le 24... 32 à Penderf (56) le 27... 20 au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44) le 28... 60 à St-Armel (56) le 4 avril... Une observation sur un plan d'eau de l'intérieur à cette époque : 1 à l'étang de Loudéac (22) le 21 mars.

Le passage aussi faible et irrégulier que les années précédentes est surtout senti grâce aux observations sur les plans d'eaux intérieurs du 18 avril au 6 juin : 1 au lac de Grand-Lieu (44) et 25 à l'étang du Boulet/Feins (35) le 18 avril... 2 à Priziac (56) et 1 à St-Renan (29N) le 21... 1 à St-Renan le 22... 2 au lac de Murin/Massérac (44) et 1 au Boulet le 1er mai... 1 à Passay/La Chevrolière (44) le 16 mai... 1 au Boulet le 20... 1 au Vioreau (44) le 31 et 1 au Boulet le 6 juin... Au cours de cette période, une seule observation maritime dépasse 10 ind. : 10-15 au Collet le 1er mai.

Dès la fin-juin on note à nouveau des groupes importants et le retour devient évident dans la première quinzaine de juillet : 50 en baie de Goulven (29N) et 13 au Roc'h Du le 28 juin... 37 en rivière d'Auray (56) le 3 juillet... 30 en Penzé et 23 en baie de Morlaix (29N) le 4... 30 en rivière de Pont l'Abbé (29N) le 9... 200 en Penzé le 11... 32 au Roc'h Du le 14... 20 à l'île Grande/Treburden (22), 10 à Penestin (56), 254 en Penzé et 15 à Bailleron/Séné (56) le 15.

Nidification : 10 à 12 couples le 17 avril dans les marais de Séné ; 1 couple le 27 avril dans les salines de Noyal (56) ; 1 couple, nicheur possible aux marais du Rostu/Assérac (44) le 19 juin.

CHEVALIER STAGNATILE (*Tringa stagnatilis*). 1 donnée

1 dans les marais de Séné le 30 avril.

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*). 49 données

Aucune observation du 16 mars au 7 avril. L'essentiel du passage s'étend de cette date à la troisième semaine de mai : 7 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 7 avril... 3 à Grand-Lieu et 9 dans les marais de Séné (56) le 19 avril... 4 à Penn en Toull/Larmor-Baden (56) le 23 mai... 6 au Roc'h Du et 7 à l'étang de St-Jean/Loccal-Mendon (56) le 26 ; 7 dans les salines de Noyal (56) le 27... 7 à l'étang St-Jean le 29 ; 25 dans les marais de Séné le 30 ; 4 au Vioreau (44) le 1er mai... 8 au Roc'h Du le 3... 7 à Séné le 7... après quoi le passage se dilue jusqu'au 21 mai (3 à Séné).

Seulement huit observations du 21 mai au 10 juillet, aucune ne concernant plus de 2 oiseaux.

Retours évidents à partir du 11 juillet avec 12 dans la Penzé (29N), puis 8 à Roc'h Du, 3 à St-Jean et 1 au Kernic/Plouescat (29N) le 14 et 13 en Penzé le 15.

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*). 16 données

Le 9 avril, 1 au Vioreau (44) ; le 13 avril, 3 aux marais d'Anbon (56) ; le 15 avril, 1 à l'étang de Loper-

het/Erdeven (56) ; le 17 avril, 2 aux marais de Séné (56) ; le 21 avril, 1 à St-Renan (29N) ; le 22 avril, 1 au Curnic/Guisseny (29N). Une seule observation en mai ; 1 à St-Renan le 11. Le 2 juin, 1 aux marais de Suscinio/Sarzeau (56) ; le 11 juin, 1 aux marais de Séné ; le 15 juin, 4 aux marais de Moyalo et 2 aux marais de Caden/Le Tour-du-Parc (56) ; le 20 juin, 1 aux gravières de Bruz (35) ; le 25 juin, 1 à Séné ; le 7 juillet, 2 à Brengall/Pont-l'Abbé (29S) ; le 8 juillet, 1 aux marais de Pleboulle (22) ; le 14 juillet, 2 au Roc'h Du/Crac'h (56).

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*). 1 donnée.

Aucune donnée sur le passage pré-nuptial. 2 le 14 juillet au Roc'h Du/Crac'h (56).

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*). 103 données

Quatre observations de fin-mars et début-avril concernent sans doute des hivernants : 1 au Roc'h Du/Crac'h (56) les 23 et 30 mars ; 1 au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44) le 28 mars ; 1 à Kerhuon (29N) le 4 avril.

Passage pré-nuptial nettement caractérisé du 10 avril (1 à l'étang de Berringue/Plouhinec -56-) au 25 mai (1 dans l'estuaire de la Penzé -29N-), avec deux maxima, aux environs du 20 juin et début-mai. Sur les 70 données de cette période, retenons : 3 à l'île-aux-Moines (56) le 12 avril... 4 au Vioreau (44) le 17 avril... 12 au Conquet (29N), 28 en Penzé et 17 à St-Renan le 19... 4 à l'étang du Moulin/La Forest-Landerneau (29N) et 12 à St-Renan le 21... 4 au Kernic/Plouescat (29N), 5 en Penzé le 27... puis 4 au Vioreau, 8 à Betahon/Ambon (56) et 6 au Boulet/Feins (35) le 1er mai... 3 à la pointe St-Gildas (44) le 2 mai... 15 en Penzé et 4 à St-Renan le 3... 5 à St-Renan le 6... 7 à St-Renan le 11... 3 au Boulet le 20 mai... Au cours de ce passage, quelques Guignettes manifestent des comportements de reproduction : 2 oiseaux chantent et parquent au Vioreau le 17 avril ; 1 chant à St-Renan le 19 avril ; chant et parade à St-Renan le 21 avril.

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*). 16 données

Les 9 observations très dispersées des deux premiers mois de cette période ne permettent pas de savoir ce qui appartient à l'hivernage ou au passage : 3 au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44) le 20 mars ; 30 en Penzé (29N) le 23 mars ; 580 dans le golfe

(56) le 26 mars ; 1 à Beg Lann/Sarzeau (56) le 6 avril ; 100 en baie d'Yffignac (22) le 11 avril ; 3 en Penzé le 14 avril ; 3 à Beg Lann le 21 avril ; 3 en baie de Gâvres (56) le 30 avril.

Il semble cependant qu'un petit passage se produise autour du 20 mai (8 observations concentrées du 14 au 24) ; 8 aux marais de Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 14 ; 2 au Curnic/Guisseny (29N) du 18 au 20 ; 20 en baie de Gâvres le 22 (voir le chiffre du 30 avril) ; 4 en baie de la Fresnaye (22) les 22 et 23 ; 31 dans les marais de Guérande le 24.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*), 10 données

Passage pré-nuptial du 21 avril au 23 mai : les 21 et 27 avril, 1 dans l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56) ; le 30 avril, 1 aux marais de Séné (56) ; le 2 mai, 1 au Loc'h/Guidel (56) ; les 7 et 14 mai, 1 dans l'étier de Caden ; le 16 mai, 1 au Curnic/Guisseny (29N) ; le 18 mai 1 à St-Renan (29N) ; le 23 mai, 3 dans les marais de Guérande (44).

1 à Trenvel/Treogat le 10 juillet.

BECASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*). 1 donnée

1 dans les salines de Kervillen/La Trinité-sur-Mer (56) le 21 avril.

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*). 9 données

A la pointe de Tremazan/Landunvez (29N), 4 le 18 mars, 6 le 1er avril, 1 le 22 avril ; à Quessant (29N), 1 à Porz Doun et 1 à Penn Ar Lann le 5 avril ; en baie de Morlaix (29N), 1 le 18 avril, 4 le 4 mai, 1 le 23 mai (dernière observation de la période) ; à Camaret (29S), 2 le 5 mai.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*). 169 données

Malgré l'abondance des données, et pour les mêmes raisons que les années précédentes, il y a peu à dire sur les mouvements du Bécasseau variable ce printemps :

L'essentiel du passage est terminé peu après le 20 mai. En mars, on assiste au départ des hivernants, notamment dans le golfe du Morbihan : 20 000 le 19 mars, 12 000 le 26 mars, 3 500 sur la vasière de St-Armel le 28 mars et 2 000 au même endroit le 4 avril... En rivièrre d'Étel (56), 2 800 le 22 mars, 600 le 28 mars. Pour ce qui est du passage proprement dit, nous nous bornerons à signaler quelques maxima en différentes localités : 1 000 en baie d'Yffignac (22) le 11 avril... 600 à Goulven (29N) le 12 avril... encore 1 100 en trois localités du golfe du Morbihan le 27 avril... 850 en baie de Gâvres (56) le 30 avril... 1 000 au Collet/Bourgneuf-en-Retz (29N) le 1er mai... 475 en Penzé (29N) le 2... puis

29N

4-500 au Curnic/Guisseny (29N) le 16 mai... 600 en baie de Goulven et 70 à St-Marc/Brest (29N) le 17... 100 au Fort-Bloqué/Ploemeur (56) et 400 en baie de Gâvres le 22... 460 dans l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56) et 110 au Kongell/Quiberon (56) le 23... Quelques observations intérieures au cours de cette période : à Guiscriff (56), 1 le 4 avril ; au Vioreau (44), 1 le 6 avril ; à St-Renan (29N), 8 le 22 avril, 4 le 2 mai, 6 le 11 mai.

Encore une petite vague dans la première quinzaine de juin avec notamment 70 à Erdeven (56) le 6... 140 à Goulven et 150 au Kernic/Plouescat (29N) le 7... après quoi ne subsistent plus guère que des attardés, la seconde quinzaine de juin ne donnant lieu qu'à trois observations seulement.


Sur les 11 observations de la première quinzaine de juillet, seules celles de l'estuaire de la Penzé concernent certainement un retour : 150 le 11, 106 le 15...

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*). 6 données

2 à l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 30 avril ; 1 au Loc'h/Guidel (56) le 2 mai ; 1 aux marais de Séné le 14 mai ; 2 en plumage nuptial au Curnic/Guisseny (29N) les 18 et 19 mai ; 2 au Loc'h/Guidel le 20 mai.

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*). 40 données

Aucune donnée jusqu'au 5 avril. Par la suite, le passage, très irrégulier, ne donne lieu qu'à huit observations jusqu'à la mi-mai : 8 dans l'anse du Po/Plouharnel (56) et 2 au Kongell/Quiberon (56) le 5 avril ; 100 minimum au Vougo/Guisseny (29N) le 9 avril (contre 30 à la fin de la période précédente) ; quelques-uns en baie d'Yffignac (22) le 11 avril ; 35 à la pointe du Curnic/Guisseny le 16 avril. Puis 6 en deux points de Quiberon et 2 à Betahon/Ambon (56) le 1er mai ; 15-20 à St-Vio/Treguennec (29S) et 25 au Vougo le 2 mai.




Mais l'essentiel du passage se produit de mi-mai à mi-juin : 32 sur la plage du Curnic le 13 mai ; 40 à Goulven (29N) le 15 ; 35 à Kerurus/Plouneour-Trez (29N) le 17... 21 au Vougo le 19... 25 à Portivy/Quiberon, 100 au Kongell, 150 au Fort-Bloqué/Ploemeur (56) et 1 dans les marais de Guérande (44) le 23 mai... plusieurs à la pointe du Bile/Penestin (56) le 24... 25 au Sillon de Talbert/Pleubian (22) le 30 mai... 32 en baie de Tuniac/Arzon (56) et 70 en baie de Penvis/Sarzeau (56) le 2 juin ; 100 au Dossen/Santac (29N) le 4 juin ; 10 au Koz/Quessant le 5 ; 12 à La Digue/Kerlouan (29N) et 25 à Kerurus le 6 ; 5 à Erdeven (56) le 11 ; 30 à La Digue et 13 au Vivier/Kerlouan le 12... 10 sur la plage de Santac le 14 ;

7 à Trielen/Molène (29N) le 16.

Seulement trois observations de cette date à la fin de la période : 1 au Kongell le 22 juin ; 10 à Trenvel/Treogat (29S) le 30 juin ; 6 au Kernic/Plouescat (29N) le 13 juillet.

COMBATTANT (*Philomachus pugnax*). 35 données



Commencé dans les derniers jours de février (AR VRAN, IV (2), p. 134) le passage se poursuit faiblement, en avril essentiellement. Trois données seulement fin-mars : 1 au Curnic/Guisseny (29N) les 25 et 28 ; 2 à St-Vio/Treguennec (29S) le 28.

Près des trois-quarts des données (26 sur 35) sont concentrées du 4 avril au 3 mai : 3 ♂♂ à Trenvel/Treogat (29S) le 5 avril ; 3 ♂♂ et 1 ♀ au Vioreau (44) le 7 ; 7 à Goulven (29N) le 12... 2 ♀♀ et 3 ♂♂ dont 1 ♂ en plumage nuptial et 1 ♀ à comportement nicheur dans les marais de Brouel/Ambon (56) ; 15 à Meneham/Kerlouan (29N), 9 au Curnic/Guisseny (29N), 20 à St-Vio et 7 à Priziac (56) le 14 avril... 4 ♂♂ et 3 ♀♀ au Vioreau et 90 au lac de Murin/Massérac (44) le 17. Le mi-avril ayant marqué le point culminant du passage, celui-ci se réduit considérablement par la suite : 5 au Curnic le 22... 8 à l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 30... 6 à St-Renan le 2 mai et 5 ♂♂ à St-Renan le 3 mai.

Quatre données seulement de cette date au 9 juillet : 1-2 au Curnic du 18 au 20 mai et 1 dans les marais de Séné (56) le 4 juin.

Enfin, 1 au Curnic le 9 juillet et 1 dans les marais d'Assérac (44) le 10 juillet.

ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*). 6 données

Nidification : nouveaux cas de reproduction de l'espèce dans le Vannetais : aux marais de Séné, 2 le 30 avril, 1 couple alarmant les 4 et 11 juin ; aux marais d'Ambon, 1 couple alarme le 14 mai, un nid contient 2 oeufs le 24 mai, le couple est encore noté le 15 juin.

AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*). 5 données

Il ne reste plus que 27 hivernants dans l'étier de Penerf (56) le 27 mars ; 75 au vol dont 32 se posent à Trenvel/Treogat (29S) le 12 avril : le reste poursuit son vol vers le nord ; 8 dans l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 24 mai ; 3 dans l'estuaire de la Vilaine (56) le 29 juin.

OEDICNEHE CRIARD (*Burhinus oedicnemus*). 18 données

Nidification : toutes les observations proviennent du lieu traditionnel de reproduction de l'espèce en Bretagne, à savoir l'ensemble des dunes qui s'étend de Gâvres à Quiberon (56). Mais, alors que les années précédentes, les couples semblaient cantonnés aux dunes situées à l'est de la rivière d'Étel (communes d'Erdeven et Plouharnel), 1 ou 2 couples ont été localisés à l'ouest de cette rivière, sur la commune de Plouhinec. Premières observations : 1 le 29 mars dans les dunes de Plouhinec et 2 couples le 9 avril sur les dunes d'Erdeven-Plouharnel. Sur les dunes de Plouharnel-Erdeven, 4 couples ont été comptés le 3 mai, un nid contenant 2 oeufs le 30 avril était vide le 15 mai et une seconde ponte de 2 oeufs était découverte le 19 mai. A Plouhinec 1 adulte alarmait le 5 juin et 4 adultes étaient présents le 7 juin. Dernière observation : 1 à Ste-Barbe/Plouharnel le 24 juin.

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*). 2 données

2 le 5 avril entre Quiberon et Belle-Ile (56) ; 2 le 11 juillet au Croisic (44).

LABBE SP. (*Stercorarius sp.*). 1 donnée

1 immature à Neaban/Locmariaquer (56) le 22 mai.

LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*). 1 donnée

1 ind. phase claire au Croisic (44) le 11 juillet.

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*). 2 données

2 le 24 juin entre les Glenan et l'île Verte/Nevez (295) ; 1 ind. phase sombre le 13 juillet au Croisic (44).

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*). 55 données

Le passage se déroule en gros de la mi-mars à la fin-avril, avec un net maximum d'intensité dans la première quinzaine d'avril : 7 adultes à l'étang de Loudéac (22) le 21 mars ; 50 ad. à St-Renan (29N) le 22 mars (contre 2 le 4 mars) ; 8 en vol vers le nord le 3 avril à Noyal-Pontivy (56) ; le 6 avril, 150 oiseaux arrivent du sud par petits groupes, se posent et se rassemblent sur la plage de Donnant/Belle-Ile (56), puis reprennent leur vol vers le nord en grosses bandes ; 8 vers le nord à Plouray (56) le 10 avril ; 2 vers le nord à Pontivy (56) le 11 avril ; 7 à Plouray le 12 avril ; 2 ad. à l'étang de Broons (35) et 6 vers le nord à Ambon le 13 avril ; 1 à Priziac (56) le 14 avril ; 3 vers le nord

à Suncinio/Sarzeau (56) le 16 avril ; 50 ad. à St-Renan les 19 et 21 avril (contre 40 le 26 avril, 30 le 11 mai, 10 le 18 mai...)... 6 immatures à l'étang de la Musse/Baulon (35) le 2 mai...

Quelques oiseaux séjournent ça et là (17 imm. dans le Golfe (56) le 15 juin) et les observations reprennent fin-juin, mais surtout en juillet : 4 dans les gravières de Bruz (35) le 20 juin... 1 en plaine de Baud/Rennes (35) le 24 juin... 10 en baie de la Fresnaye (22) le 7 juillet... 15 au Croisic (44) le 11 juillet ; 1 sur le Blavet à Pontivy et 3 à l'étang de St-Jean/Loceol-Mendon (56) le 14 juillet... 35 dans le Golfe (56) le 15 juillet.


Modification : l'expansion de cette espèce est attestée cette année par une augmentation des effectifs dans l'archipel de Molène, sur l'île des Landes/Canaule avec 22-25 couples contre 10-15 en 1970, à Tiviag/St-Pierre (56) avec 208 couples contre 5 en 1964... et par l'installation à Meaban de 4-5 couples.

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*), 80 données

L'expansion du Goéland argenté se traduit par la consolidation des colonies nouvelles et par la colonisation de nouveaux îlots et points du littoral : installation d'1 couple à la pointe de Bihit/Trebeurden (22) ; installation d'1 couple à Enez Kerlouan (29N) ; 3 couples à Treyc'h/St-Pabu (29K) (1 en 1970) ; installation d'1 couple à Melgorn Bras/Porspoder (29N) ; 6 couples à St-Nikolaz/Glenen (29S) (3 en 1969) ; colonie dense sur Enez Geot/Nevez (29S) ; installation en trois points de l'île de Groix (56) ; 200 à 250 couples sur Meaban/Loznariaquer (56) (52 en 1970) ; installation d'1 couple au Gros Rocher/Belle-Ile (56)...

GOELAND CENDRE (*Larus cernus*). 45 données

Le fait marquant de cette période est l'absence totale d'observations pendant plus de deux mois, du 30 avril au 7 juillet.



Sur les 35 données du 16 mars au 30 avril, 33 proviennent du principal lieu d'hivernage en Bretagne : la région vannetaise. Elles concernent pour l'essentiel le départ des hivernants sur lequel vient sans doute se greffer un passage dans la dernière décade de mars : 160 en deux points du Golfe (56) le 19 mars ; 1 à l'Étang de Loudeac (22) le 21 mars... 100 de Locmariaquer à Carnac (56) et 31 au Roc'h/Du/Crac'h (56) le 23... 90 au Roc'h Du le 25... 200 dans la partie orientale du Golfe le 26 ; 162 en trois points de la presqu'île de Rhuys (56) le 27... 6 à Ke-

renna (29N) le 29... 160 autour de l'île de Bailleron (Golfe) le 31... 105

en deux points de la presqu'île de Rhuys et 169 dans la partie orientale du Golfe le 2 avril. A noter que jusqu'à cette date, les données concernent presque exclusivement des adultes, les observateurs précisant lorsqu'il s'agit d'immatures : 1 imm. pour 130 oiseaux le 19 mars... 5 imm. pour 31 le 23... 1 imm. pour 10 oiseaux le 27... 1 imm. pour 17 oiseaux le 28...

Après le 2 avril, mais surtout à partir de la mi-avril, la grande majorité des hivernants est partie ; on n'observe plus guère que de petites bandes composées en majorité d'immatures : 1 imm. au Cranic/Brec'h (56) le 4 avril ; 15 en baie du Duer/Sarzeau le 10 ; 20 à Ambon (56) et 27 (dont 24 imm.) à Brouel/Ambon le 13 ; 6 (dont 5 imm.) à Banastère/Sarzeau le 14 ; 3 en baie de Kerouarc'h/Lochmariaquer le 19 ; 4 à la Trinité-sur-Mer (56) et 4 imm. à Penvis/Sarzeau le 21 ; 4 imm. dans les marais de Séné (56) et 6 (dont 5 imm.) à Penn-en-Toull/Larmor-Baden (56) le 23 ; enfin 1 imm. à l'Étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 30 avril.

Après un "trou" de 68 jours, les Goélands cendrés réapparaissent à partir du 7 juillet : en baie de la Fresnaye (22), 1 le 7, 5 les 8 et 9 juillet, 23 le 10, 5 le 11, 16 le 13 ; 1 ad. et 1 juvénile au Croisic (44) le 11 ; 50 dans le Golfe le 14.

MOUETTE MELANOCEPHALE (*Larus melanocephalus*). 1 donnée
1 ad. en mue dans les salines
du Croisic (44) le 11 juillet.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*). 90 données
Des groupes importants stationnent encore jusqu'au 21 mai, mais depuis début-mai la proportion des immatures l'emporte largement : 600 en rivière d'Étel (56) le 22 mars... 1 500 dans les marais de Bodaval/Sarzeau (56) le 27... 1 200 en cet endroit le 6 avril... 655 à Ambon (56) le 13... 200 à Lampaul-Ploudalmezeau (29N) le 22... 1 200 en baie de la Fresnaye (22) le 27... 160 dans les marais de Séné (56) le 7 mai... 60 imm. à St-Renan (29N) le 11 mai... 50 (dont 49 imm.) au Curnic/Guisseny (29N) le 13... 100 dans les marais de Séné le 21...


De cette date au 23 juin, seulement 6 observations, d'immatures surtout, isolées pour la plupart sauf dans les marais de Guérande (44) où l'on note un estivage important d'oiseaux d'un an avec quelques adultes.

Les retours ont lieu dès la dernière décade de juin : 10 ad. à Baillevon (Golfe du Morbihan) le 23... 16 à St-Marc/Brest (29N) le 29... 115 à Kervillen/La Trinité-sur-Mer (56) le 1er juillet... 4 vers le sud à Noyal-Pontivy (56) le 4 juillet... 40 à Trenvel/Treogat (29S) et 800 (dont seulement 4 juvéniles) en cet endroit le 8... 1 400-1 500 en baie de la Fresnaye (20 juv.) le 10... 200 à Poullifoen/Cleder (29N) le 13... 130 (dont 1 juvénile) à Poullifoen le 14... 300 dans le Golfe le 15...

Nidification : au lac de Murin/Massérac (44) plusieurs dizaines de couples sont présents le 17 avril (260 ind.), mais une cinquantaine de couples seulement semblent avoir niché ; 90 nids au lac de Grand-Lieu (44) le 8 mai ; 3 couples nicheurs à la réserve de la Grande Paroisse/La Turballe (44) le 13 juin ; 1 couple a essayé de nicher en baie de Morlaix cette année encore, une ponte ayant été déposée, sans succès semble-t-il.

Deux pontes de 3 oeufs à la Grande Paroisse le 6 juin ; 2 oeufs en baie de Morlaix le 7 juin ; déjà 2 juvéniles volants au lac de Murin le 13 juin.

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*). 25 données



Le passage a surtout lieu de la mi-avril à la mi-mai et concerne une majorité d'immatures : 1 adulte en plumage d'hiver dans les marais de Bodaval/Sarzeau (56) le 6 avril ; 2 à Banastère/Sarzeau le 14 avril ; 5 à Pen-druc/Tregunc (29S) le 18 avril ; 3 imm. dans les marais de Bodaval et 4 imm. en baie de Suscinio/Sarzeau le 21 ; 1 ad. à Meneham/Kerlouan (29N) le 22 ; 2 imm. à Penn en Toull/Larmor-Baden (56) le 23 ; 2 observations de

2 imm. à Trevignon/Tregunc le 25 ; 7 dans les marais de Bodaval et 2 imm. dans l'étier de Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 27 ; 7 à l'étier de Caden et 4 dans les marais de Bodaval le 30 ; 7 imm. dans les marais de Guérande (44) le 1er mai ; 1 imm. à Belle-Ile (56) le 2 mai ; 1 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 6 ; 10 à l'étier de Caden le 7 ; 7 imm. à l'étier de Caden, 2 ind. dans les marais d'Ambon, 1 imm. à St-Jean/Locoal-Mendon (56) et 1 imm. dans les marais de Séné (56) le 14.

Encore 3 imm. à l'étier de Caden le 24 ; 1 imm. au même endroit le 15 juin ; 1 imm. aux marais du Rostu/Assérac (44) le 19 juin ; 2 à Concarneau (29S) le 1er juillet ; 1 au barrage d'Arzal (56) le 3 juillet.

MOUETTE DE SABINE (*Larus sabini*). 1 donnée

1 près de Keller/Cuessant (29N) le 18 mai.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*). 22 données

Presque toutes les observations dans le voisinage immédiat des sites de reproduction sauf : 1 en rivière d'Auray (56) le 30 mars et 1 entre les Glenen et Enez Geot/Nevez (29S) le 15 juillet. En outre, 1 imm. entre Quiberon et Belle-Ile le 20 mai ; 70 dont 2 imm. en vol vers le nord en 1 heure 30 le 27 mai à St-Mathieu/Plougonvelin (29N).

Nidification : Tous les sites sont occupés au cap Fréhel/Plévenon (22) le

20 mars ; augmentation à la réserve Michel-Hervé JULIEN/Goulien (29S) avec 330 couples ; colonie stationnaire au cap Fréhel où 80 à 90 poussins seulement ont été élevés pour 175 nids occupés ! A près une éclipse de six ans et une tentative de nidification en 1969 à Boulardo, la Mouette tridactyle s'est réinstallée dans les falaises de Belle-Ile : à Koh Kastell, 2 colonies de 26 et 17 ind. le 20 juin, 25 ind. seulement et une ponte de 2 oeufs le 4 juillet, plus qu'une seule colonie de 3 couples dont un couvant le 10 juillet. Enfin, 1 ind. posé dans les falaises de l'île Keller/Quessant (29N) le 15 juillet est peut-être l'indice d'une implantation future dans ce site particulièrement favorable en raison de sa tranquillité (les falaises de cette île sont certainement les moins visitées de Bretagne !).

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*). 34 données

La migration pré-nuptiale est très peu abondante, et la plupart des données proviennent des lieux de nidification ou de leurs alentours (estuaire de la Loire essentiellement). 3 au Grand Etang d'Ouée/Gosné (35) le 15 avril ; 2 au lac de Murin/Massérac (44) le 17 avril ; 5 à l'étang du Soulet/Feins (35) le 18 ; 2 à St-Renan (29N) le 22 ; 3 aux marais de Séné (56) le 23 ; 2 aux marais de Caden/Le Tour-du-Parc (56) le 27 ; 2 ad. en plumage nuptial au Vioreau (44) et 2 ind. à l'étang de Carcraon/ La Guerche (35) le 1er mai. Puis les observations s'espacent : 2 aux marais d'Ambon (56) et 5 au marais de Caden le 14 mai ; 1 ad. au Vioreau le 31 mai ; 1 à Trenvel/Treogat (29S) le 14 juin.

Nidification : Les lieux traditionnels de reproduction n'ont toujours pas été recensés. A Grand-Lieu (44), 50 ind. le 8 mai ; en Brière (56) 1 adulte et 3 juvéniles le 13 juillet ; au lac de Murin, quelques (?) couples le 1er mai, 1 couple transporte de la nourriture le 13 juin.

Une seule donnée de dispersion certaine : 1 à Er Hardenn Vras/En Eidig (56) le 3 juillet.

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*). 3 données

A Grand-Lieu (44), 50 ind. le 8 mai, 25 le 9 mai ; 1 dans les marais de Bodaval/Sarzeau (56) le 24 mai.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirsundo*). 163 données

Premières arrivées : à Dunet (44) le 2 avril ; puis 6 au Curnic/Guisseny (29N), 4 en rivière de Crac'h (56), 10 à St-Philibert (56) le 9 avril ; 15 au Curnic, 10 dans l'estuaire de la Loire (44) et 50 en baie d'Yffignac (22) le 11, etc... Les observations sur des plans d'eau intérieurs sont sans doute des indices du passage : 1 au lac de Murin/Massérac (44) le 17 avril ; 1 à Grand-Lieu (44) et 1 au Curnic/Brec'h (56) le 18 ; 1 à l'étang de la Musse/Baulon (35) le 2 mai ; 1 à Grand-Lieu le 9 mai.

Nidification : 3 ind. s'installent sur leur lieu de nidification à Boular-

do/Belle-Ile (56) dès le 14 avril ; 16 ind. au comportement nicheur dans les salines de Carnac (56) le 21 avril et alarme à St-Renan (29N) le même jour ; premières pontes à Rohellan/Erdeven (56) le 8 mai (3 pontes pour 9 couples) ; 1 seul oeuf à Meaban/Locmariaquer (56) le 8 mai ; 1 ponte à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 14 mai ; premiers poussins à Mauves (44) le 18 mai ; éclosion à la Grande-Paroisse/La Turballe (44) le 6 juin ; 3 poussins en rivière d'Etel (56) le 7 juin ; 4 oeufs et 1 poussin dans le même nid (ponte dans un nid de Goéland abandonné ?) en baie de Morlaix (29N) le 11 juin ; nombreux poussins sur Enez Kerlouan (29N) le 13 juin ; juvéniles volants à Kervillen/La Trinité-sur-Mer (56) le 1er juillet ; encore 2 poussins âgés à Belair/Penestin (56) le 15 juillet.

Plusieurs nouveaux sites de reproduction ont été découverts sur les côtes nord de la Bretagne et notamment sur les côtes du Tregor et du Goëlo où la dispersion des couples et des colonies semble atteindre son maximum : 20 couples le 25 juin à Roc'h ar C'hrouier (SH 3991)/Ploubazlanec (22) et 10 couples le même jour entre Roc'h Vras (SH 3870) et Ar Roc'ho (SH 3859)/Bréhat (22) ; 20 couples dans l'archipel de l'Île d'Er/Plougrescant (22) le 22 juin ; 14 nids à Levran (SH 10006)/St-Pol-de-Leon (29N) le 11 juin. Avec 125 nids le 16 juin, Ledenez Balaneg reste le dernier refuge important de l'espèce dans l'archipel de Molène (29N). Sur la côte morbihannaise, la colonie de Meaban a presque disparu (57 nids le 22 mai contre 513 en 1970 !), mais on assiste simultanément à un saupoudrage de petites colonies sur les marais côtiers et les îlots voisins : en rivière d'Etel, 3 nids sur un îlot proche du Pont-Lorois/Balz le 7 juin et une ponte de deux oeufs à l'étang de St-Jean le 14 mai ; dans les salines de Carnac-La Trinité-sur-Mer, 5 pontes pour 24 ad. présents le 19 mai ; dans le Golfe, 43 nids sur Vezid Bihan/Baden le 22 mai (premier cas connu de nidification sur un îlot du Golfe) et 4 ad. alarmant au marais de Penn en Toull/Larmor-Baden le 11 juin ; 2 ad. à comportement nicheur dans les marais d'Ambon le 14 mai ; 2 ad. à comportement nicheur à Betahon/Ambon le 1er mai. L'îlot de Belair, dans l'estuaire de la Vilaine, abrite toujours une colonie : le 15 juillet, plusieurs dizaines d'oiseaux (adultes, juvéniles nourris et 2 poussins âgés) y séjournaient encore. En Loire-Atlantique, 3 couples ont niché dans les salines de la Grande Paroisse, et 6 couples à Mauves. Enfin à St-Renan, localité intérieure du Leon, 1 couple alarmait les 21, 22 et 26 avril et le 11 mai ; il était toujours là le 2 juin mais aucune preuve de nidification n'a pu être recueillie.

Dispersion presque imperceptible au cours de cette période. 1 juvénile volant nourri par un adulte le 9 juillet à Trenvel/Treogat (29S) en constituant le seul indice.

STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisaea*). 4 données

7-8 le 2 mai à Tharon (44) ; 1 au Croisic (44) le 14 juillet.

Nidification : (1 couple présent et une ponte de 1 oeuf sur Banneg/Molène (29N) le 15 juin.

TERNE DE DOUGALL (*Sterna dougallii*). 22 données

Arrivée notée dans la seconde quinzaine d'avril : 1 le 16 avril à Kerisper/Arradon (56) ; 2 le 19 en rivière d'Auray ; 4 au Croisic (44), 1 à la pointe St-Gildas (44) et 2 au fond de l'Aber Wrac'h (29N) le 1er mai ; 1 à la pointe St-Gildas le 2 mai ; 10 au Croisic les 2 et 9 mai ; 4 dans le Balon (29S) le 13 mai.

Toutes les autres données proviennent du voisinage des sites de reproduction, y compris celles de Loire-Atlantique puisque des Sternes de Dougall (chiffre inconnu) nichent toujours sur Dumet.

Nidification : Une seule localité nouvelle : 1 couple sur Tivieg/St-Pierre (56) le 23 mai. Avec 214 nids sur Trevoc'h/St-Pabu (29N) et 1 couple sur Meaban (nous ne savons pas si l'espèce a niché cette année à Goulmedeg/Plomour-Bodou (22) et en baie de Morlaix (29N) et nous ne connaissons pas l'effectif de Dumet) les colonies de cette espèce sont en net déclin en Bretagne.

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*). 35 données

Arrivée et passage dans la seconde quinzaine d'avril : 1 à la pointe d'Erdeven (56) le 15 avril ; 5 en baie de Guissenay (29N) et 2 à Suscinio/Sarzeau (56) le 16 ; 3 en baie de Goulven (29N) le 17 ; 20 dans l'estuaire de la Laita (29S) le 18 ; 1 à Corsen/Plouarsel (29N) le 19 ; 1 ind. à l'étang du Moulin/La Forest-Landerneau (29N) le 21 ; 1 à St-Renan (29N) le 22 ; 3 vers le nord à Trevignon/Tregunc (29S) le 25 avril.

Aucune observation de cette date au 13 mai, la plupart des données suivantes provenant du voisinage des sites de reproduction connus, sauf : 1 dans les salines de Carnac (56) le 19 mai ; 8 dans l'Elorn (29N) le 22 mai ; 1 dans les marais de Guérande (44) et 1 en Penzé (29N) le 23 mai... puis 4 dans les marais de Séné (56) le 18 juin et 7 observations de 1 à 6 ind. dans l'estuaire de la Penzé du 4 au 15 juillet.

Nidification : Aucune nouveauté en ce qui concerne la répartition. La fréquence des observations en Penzé laisse penser qu'il existerait un site de reproduction non loin.

Une éclosion pour 26 nids trouvés sur Trevoc'h Vras/St-Pabu (29N) le 15 mai.

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*). 135 données

Le 22 mars, 2 en rivière d'Etel (56) ; le 23 mars, 1 à Carnac (56) et 5 en baie de St-Philibert (56) ; le 24 mars, 8 en baie de Plouharnel (56) ; le 25 mars, 2 à Kerpenhir/Loznariaquer (56), 1 à Landunvez (29N) et 1 dans l'anse de Portsall (29N)... Arrivée et passage s'intensifient alors : 15 à Quiberon (56) le 28 mars... 17 à Etel le 29... 13 à St-Philibert et 24 à Breneguy/Loznariaquer le 30... 18 au Kon-

gell/Quiberon le 5 avril... 32 vers le nord en 50 minutes à Feunteun Aod/Plogoff (29S) le 7 avril... 30 au Kongell et 20 à St-Philibert le 9... 50 à Binic (22) le 10... 200 en baie d'Yffignac le 11... 30 dans l'estuaire de la Laïta (29S) le 18... 80 à St-Gildas-de-Rhuys (56) le 21... 30 à Trevignon/Tregunc (29S) le 25... 30 à Tharon (44) et 50 à la pointe St-Gildas (44) le 2 mai...

Nidification : La colonie de Meaban en déclin depuis 1968 a subi une baisse catastrophique en 1971 : 830 nids contre 2 628 en 1970. Cette importante diminution n'est pas compensée par ailleurs : 197 nids à Trevoc'h (140 en 1970) ; 311 nids à la Colombière/St-Jacut (263 en 1970) ; implantation d'une colonie sur Belair/Penestin (56) où "de nombreux oeufs pourris ou brisés" étaient trouvés le 15 juillet. Les données nous manquent pour l'archipel de Glenen (29S), la baie de Morlaix (29N) et Ar Goulmedeg/Ploeumeur-Bodou (22).

Dispersion à partir de la deuxième semaine de juillet, avec nette augmentation des observations au large du cap Fréhel (22) et de la pointe du Croisic.

PINGOUIN TORDA (*Alca torda*). 28 données

Cinq données seulement se rapportent à la reproduction : toutes les autres concernent des isolés ou des groupes de 2 à 25 individus et sont étalées sur l'ensemble de la période : 5 à Penmarc'h (29S) le 27 avril... 25 entre l'archipel de Glenen (29S) et Enez Geot/Nevez (29S) le 13 mai... 5 vers le nord à St-Mathieu/Plougonvelin (29N) le 27 mai... 6 entre l'archipel de Glenen et Enez Geot le 24 juin... et 5 sur le même trajet le 15 juillet.

GUILLEMOT DE TROIL (*Uria aalge*). 25 données

Treize données réparties du 4 avril au 15 mai en dehors des lieux de reproduction : 6 entre Brest et Ouessant (29N) le 4 avril ; 13 en vol entre Quiberon et Belle-Ile (56) le 5 avril... 10 sur ce dernier trajet le 7 avril... et 7 le 10 avril... 8 entre l'archipel de Glenen (29S) et Enez Geot/Nevez (29S) le 13 mai... Toutes les données postérieures au 15 mai ont trait à la reproduction, sauf 17 de l'archipel de Glenen à Enez Geot le 24 juin.

Nidification : au cap Fréhel, maximum de 55 individus le 23 mai, mais le nombre réel de nicheurs (avec pontes ou poussins) n'est pas supérieur à 20-25 couples ; 8 oeufs fin-mai et quelques poussins à mi-juin. Effectifs stationnaires à la réserve Michel-Hervé JULIEN/Goulien (29S). Nidification possible sur Er Hardenn Vras/En Eidig (56) (observation du 3 juillet).

MACAREUX (*Fratercula arctica*). 13 données

Nidification : Toutes les données proviennent de sites de nidification. A Ar Youc'h/Ouessant (29N) 6 ind. sont présents le 6 avril et 9 au moins le 7 avril alors que 6 terriers au moins semblent occupés ; 30 ind. autour de l'Îlot le 5 juin. A Keller/Ouessant, maximum de 14 ind. le 18 mai. A Banneg (Roc'h Hir compris)/Molène (29N), maximum de 19 à la fois le 15 juin ; 1 adulte et 1 poussin sous une roche le même jour. Au cap Frahel (22) la nidification, quoique non prouvée, semble se confirmer : le 19 juin, 2 ind. pêchent entre l'Amas du Cap et la pointe du Jas ; le 10 juillet, 1 ind. se pose dans la falaise orientale ; le 13 juillet, 1 ind. est aperçu au vol.

GRUPE III, données non utilisées : PHALAROPE A BEC ETROIT (*Phalaropus lobatus*) : 1 donnée incertaine du Morbihan. GOELAND MARIN (*Larus marinus*) : 55 données, aucun fait marquant. ALCIDAE SP. : 5 données.

PIGEON BISET (*Columba livia*). Noté en groupes de 1 à 10 à Belle-Ile (56).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*). Les observations restent rares : 1 chanteur le 15 avril à Nouvoitou (35), 2 (chant) le 12 mai au Faouët (56), 1 nid/1 oeuf et 1 poussin le 16 juin à Lanroze/Quimper (29S), 1 à Portez/Locmaria-Plouzané (29N) le 20 juin.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*). Quelques bandes sont notées pendant toute la période : 35 à Pont-l'Abbé (29S) le 28 mars, 80 le 5 avril à Kerjean/Trebabu (29N), 50 le 12 avril au Bois-Trochu/Belle-Ile (56), 50 le 8 mai en rivière de Pont l'Abbé (29S), 25 le 31 mai à Goulven (29N), 30 le 28 juin à Noyal-Pontivy (56).

La reproduction sur l'île d'Ouessant est confirmée : 1 couple construit à Stang-ar-Merdy le 13 juin. (Quelques couples sont présents sur l'île de Groix -56-).

Des pontes sont signalées essentiellement du 7 avril à la première semaine de mai, puis de début-juin à mi-juillet.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*). Premières isolées à partir du 10 avril (1 à Saint-Pol-de-Léon -29N-), puis 2 à Belle-Ile (56) le 13, 1 chanteur au Faouët (56) le 14.

Les observations se multiplient à partir du 16 (2 à Saint-Etienne-de-Montluc -44-, 4 en migration à Suscinio/Sarzeau -56-, 2 au Vioreau (44) et 1 chanteur à Morlaix -29N-) ; premières à St-Renan (29N) et à Moëlan (29S) le 17, etc... Le gros afflux ne commence que dans les derniers jours d'avril et surtout début-mai ; c'est à cette époque que les couples se cantonnent, mais localement ils n'apparaissent que plus tard.

Première ponte le 8 mai à Ploujean (29N) (arrivée le 28 avril), mais seulement le 19 à Pleuven (29S), le 23 à Ploemeur (56), le 31 à Plougourvest (29N).

L'espèce est présente début-juillet dans l'archipel des Glénan (29S) (3 couples sur Penfret et 1 sur Saint-Nicolas).

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*). Distribution : pour la première fois, 1 oiseau est observé à Belle-Ile (56) (chant le 6 avril), cependant qu'à Quessant l'effectif semble diminuer. Quelques localités signalées pour la première fois (ce qui ne signifie nullement que la Tourterelle turque en était absente auparavant) : Rostrenen, Belle-Ile-en-Terre (22), Brignogan, Kersaint-Portsall (29N), Châteaulin (29S), Saint-Gonery (56), Clisson, La Turballe, Treillères (44). Bien des localités restent à coloniser : par exemple, dans le sud ouest de l'Ille-et-Vilaine (région de Redon), elle semble absente de Redon, Beslé, Langon, Sainte-Anne, Massérac, Brains, La Chapelle-Saint-Mélaine.

Un nid/2 juv. à l'envol le 11 mai à Brest, 1 nid/2 pulli à Quimper (29S) le 31 mai (dans un nid de Merle noir).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*). 150 données

Avant le 2 avril, trois données isolées dans le sud de la Bretagne : 1 chanteur à Belle-Ile (56) le 25 mars, 1 chanteur à Messac (35) le 31, 1 chanteur à Auray (56) le 1er avril.

Les 2 et 3 avril, 4 observations dans de nouvelles localités du sud (Nantes -44-, St-Gildas-de-Rhuys, Peaule et Muzillac -56-).

Le 4 avril, les premiers apparaissent en Cornouaille sud (Pont l'Abbé, Treguennec, Moëlan), cependant que de nouvelles localités sont occupées en Loire-Atlantique et Morbihan.

Les 5 et 6 avril, la situation n'évolue pas. On note 1 oiseau au Cap Sizun (29S) le 6.

Le 7, les observations proviennent des mêmes secteurs (Loire-Atlantique et bande côtière du Morbihan à la pointe du Raz), mais on note également une observation dans le centre de l'Ille-et-Vilaine (La Tournerais/Goven).

Le 8 et le 9, nette progression vers le nord : Le Faouët, Noyal-Pontivy, Silliac, Plouray, Cléguerec sont occupés dans le nord du Morbihan. Le point le plus au nord est le Yeun-Elez (29N) où 2 oiseaux sont notés le 9.

Jusqu'au 13, la progression se ralentit, les localités occupées se multiplient dans le Morbihan.

Le 13, des oiseaux sont notés dans les Monts d'Arrée (29N) et le Centre de l'Ille-et-Vilaine (Noyal-sur-Vilaine).

Le 14, nouvelle étape ; le Léon est atteint : Goulven, Plougourvest. On y note quelques oiseaux les jours suivants, mais peu avant le 20-25.

Le Trégor est atteint seulement le 17 (Louannec, Ploujean).

Des femelles de la forme "hépatique" ont été observées le 13 avril à Ambon (56), le 18 et le 23 en forêt de Rennes (35), le 25 à la Roche-Bernard (56), le 19 mai à Kergusno (56), le 20 à Brengall/Pont l'Abbé (295), le 23 à Quiberon (56), le 24 à Penestin, Ambon et Caden (56), le 29 à Auray et Belle-Ile (56), le 1er juillet à Hoëdic (56).

Parasitisme signalé aux dépens du Rougegorge au Faouët (1 pull. le 28 avril) et à Ploemeur (56) (juv. nourri le 28 juin), du Troglodyte à Ploemeur (juv. nourri le 27 juin) et à Groix (56) (pull. nourri le 9 juillet), du Pipit maritime à Groix (pull. nourri le 12 juillet).

*Derniers chants à Messac (35) et Tréflez (29N) le 16 juin, à Molène (29N) et la Roche-Bernard le 17, à Péaule (56) et Ouessant (29N) le 23.

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*). 2 données

Dans le marais de la Garenne/Langonnet (56), 1 le 11 avril. Nouvelle donnée sur la nidification dans le centre-Finistère : 1 juv. en duvet à Menez-Meur/Hanvec le 14 juillet.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*). 10 données

A Belle-Ile (56), 1 le 14 avril ; au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44), 2 le 1er mai ; dans le Yeun-Elez (29N), 3 observations d'isolés dans la dernière décade de juin et 1 à mi-juillet ; à Kervel/Hanvec (29N), 1 le 29 juin ; dans le marais de Plouray (56), 1 le 30 juin ; à Groix (56), 3 observations en juillet, mais la nidification, très probable en 70, n'a pas été prouvée.

HIBOU PETIT-DUC (*Otus scops*). 2 données

1 chanteur le 28 mars au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44), 1 chanteur le 5 avril à Bouaye (44).

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*). 45 données

A Roudouallec (295), 1 ♀ couve le 5 mai, le nid contient 2 poussins le 10 juin ; à Cancale (35), 1 nid/pull le 6 juin ; le 20 mai, transports de matériaux à Plouvorn (29N) ; le 30 mai, 1 nourrit à Beslé-sur-Vilaine (44) ; le 31 mai, 1 nid/2 pull à St-Congard (56). Notons qu'en juillet, la plupart des observations concernent des cadavres trouvés sur les routes.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*). 27 données

Sur 7 nichées contrôlées dans le nord-ouest du Morbihan (Le Faouët, Meslan, Lanvenegen) on enregistre un seul échec ; les six nids restants donnent 14 poussins bagués (4 pulli pour 4 oeufs dans 1 nid, 2 pulli vivants pour 4 oeufs dans un autre, 3 pulli dans un nid, 2 pulli dans 2 nids, 1 seul dans le dernier). Au bois de Cheffontaines/Fouesnant (29S), les 2 couvées trouvées (2 oeufs le 20 mars et 3 oeufs le 14 mars respectivement) sont dénichées. Les premiers poussins ont été notés à Meslan (56) le 2 avril, à Lanvenegen (56) le 9, etc...

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*). 12 données

Dans le nord-ouest du Morbihan, 6 nichées contrôlées ont donné 12 poussins (bagués) ; 2 ont échoué (ponte de 7 oeufs), une ponte de 5 oeufs n'a donné qu'un poussin, les autres nids ont donné respectivement 6, 3 et 3 pulli. Au Tronchet (35), 6 pulli le 10 avril ; au Stang/Plougourvest (29N), 4 oeufs le 4 mai. On note encore des poussins à Lanvenegen (56) le 1er juillet.

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*). 12 données

Comme d'habitude, l'espèce est peu observée, car peu recherchée. En forêt du Vioreau (44), 1 chanteur le 1er mai et le 30 mai ; à Saint-Etienne-de-Montluc (44), 5 chanteurs le 11 mai, plusieurs chanteurs le 2 juillet, 1 chanteur le 14 juillet ; à Saint-Mars-de-Coutais (44) et à Grandlieu (44), 1 chanteur le 15 mai ; à Guéméné-Penfao (44), 1 cadavre de ♂ sur une route le 18 mai ; à Massérac (44), 1 ♀ le 30 mai ; à Erdeven (56), 1 le 28 juin ; près de Bruz (35), 1 chanteur le 30 mai.

Deux nouvelles localités ont été trouvées dans le nord-Finistère, ce qui tend à prouver que l'Engoulevent est certainement très répandu mais avec des effectifs réduits : à Susicinio/Floujean, le chant est entendu plusieurs fois fin-mai ; dans le Yeun-Elez, 1 chanteur sur la rive sud du lac de Brennilis le 27 juin.

MARTINET NOIR (*Apus apus*). 130 données

Premières dates : Loire-Atlantique : 11 avril au Vioreau (15-20), 13 avril à Nantes (1 et 10 le 14). Morbihan : 13 avril à Ambon (1), 16 avril à Saint-Colombier (1). Nord-Finistère : 19 avril à Brest (4), 22 avril à Saint-Renan (2). Ille-et-Vilaine : 20 avril à Rennes (17). Côtes-du-Nord : 22 avril à Perros-Guirec, Lannion, Louannec.

Avant le 15 avril : petits groupes en Loire-Atlantique (Vioreau, Nantes) et 1 isolé dans le sud du Morbihan (le 13) à Ambon.

Du 16 au 18 : passage noté à Saint-Nazaire (5 le 18) et quelques oiseaux jusqu'au sud-est du Golfe du Morbihan (30 à Séné le 17).

Le 19 : Des groupes apparaissent au nord-ouest du Golfe du Morbihan, jusqu'à Lorient (20 à Auray, 50 à Crac'h) alors que de petits passages sont notés à Saint-Nazaire. Pointe jusqu'à Brest.

Les 20 et 21 : Les premiers atteignent le nord-ouest du Morbihan (le 21 au Faouët) et le centre de l'Ille-et-Vilaine (Rennes le 20), cependant que dans le Finistère, on ne note que quelques isolés à Brest.

Le 22 : Le littoral du nord-Finistère et des Côtes-du-Nord est atteint par quelques oiseaux (Saint-Renan, Guisseny, Bourg-Blanc, Perros-Guirec, Lannion, Louannec).

Dans la dernière semaine d'avril, les Martinets restent rares dans le Finistère, alors que le passage est déjà important dans le sud de la Bretagne (Morbihan notamment) : 60 le 26 à Kerizan/Crac'h, 400 le 27 à Banastère/Sarzeau, 150 le 30 à Séné ; on note aussi de grosses bandes en Ille-et-Vilaine dans les premiers jours de mai : des centaines le 1er à l'étang de Carcraon, 300-400 à La Musse/Baulon le 2.

Les premiers nicheurs ne s'installent que dans les derniers jours d'avril à Saint-Nazaire où l'effectif semble complet le 7 mai, à partir des 4 et 5 mai à Brest où la plupart n'arrivent que dans la seconde quinzaine du mois.

Passage encore sensible en mai et jusqu'à mi-juin (1 sur l'île Kellier/Ouessant le 18, commun à Ouessant dans la première quinzaine).

Nidification : Pulli au nid le 5 juin, à Ploujean (29N), le 13 juin au Faouët (56), le 22 juin à Pleuven (29S) ; 1 nid/3 oeufs le 13 juin au Faouët ; 1 nid/2 pulli le 11 juillet au Faouët.

Les premiers migrateurs sont notés dès les premiers jours de juillet : passage en mer le 3 à l'île Hoëdic (56), le 10 au Cap-Fréhel (22), le 11 dans le golfe du Morbihan.

MARTIN PECHEUR (*Alcedo atthis*). 45 données

Les hivernants du littoral semblent avoir disparu à mi-mars, la seule observation en mer étant faite le 17 avril au Sillon du Len/Louannec (22).

Au cours de la saison, des oiseaux sont signalés de 25 localités, la reproduction n'étant que rarement prouvée : nourrissages le 22 mai à Kerhuon (29N), pulli au nid le 1er juin à Lanvenegen (56), nourrissages le 15 juin à Noyal (56).

La dispersion se fait sentir dès la seconde semaine de juillet avec l'apparition d'oiseaux sur le littoral : le 8 au marais de Pléboulle (22), le 10 à Belle-Ile (56), le 12 à la pointe du Croisic (44)...

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*). 51 données

Une seule donnée concerne des oiseaux de

passage : 2 à Quessant le 4 avril.

Ailleurs, les premières sont observées le 1er avril à Nantes, le 5 au réservoir du Vioreau (44) (chant), le 6 à Sarzeau (56), le 7 à Feunteun-Aod/Plougoff (29S)...

Répartition : En Loire-Atlantique, signalée de Nantes, Fresnay-en-Retz, du Vioreau ; en Ile-et-Vilaine, la Huppe est très dispersée : forêt de Rennes, la Roussière et Tréguilly/Messac, Beslé-sur-Vilaine, Fougeray ; dans le Morbihan, elle est surtout signalée de localités côtières : dunes de Plouharnel, Erdevén, Plouhinec, région de Sarzeau, Le-Tour-du-Parc, Séné, Quiberon, Baden, Larmor-Baden, Ploemeur, Peaule, La Trinité-sur-Mer ; dans les Côtes-du-Nord, notée à Megrit et au Cap-Frêhel ; dans le Finistère, la côte sud jusqu'au Cap Sizun fournit comme d'habitude quelques observations : Feunteun-Aod, Trenvel/Tréogat, Penmarc'h, Goulien. Il faut surtout noter la présence de la Huppe dans les Monts d'Arrée (Loqueffret) et dans la région brestoise (Le Passage/Kerhuon).

PIC VERT (*Picus viridis*). A Kervigno/Ploemeur (56), nid achevé le 23 mai, 5 oeufs le 30, 5 pulli emplumés le 12 juin, 1 juv. à peine volant le 22 ; 5 oeufs dans un autre nid le 30 mai. A Pleuven (29S), pulli emplumés le 14 juin. A Lanvenegen (56), pulli au nid le 29 mai.

PIC CENDRE (*Picus canus*). 13 données

Toutes ces données proviennent d'Ile-et-Vilaine. Des chanteurs ont été entendus à Beaulieu/Rennes, La Tournerais/Goven, au bois de Chantepie, à Launay-Garnier/Bourgbarré, à l'étang de Bourgbarré, près de Nouvoitou, entre Aigné et Liffre, en forêt de Rennes, à l'étang de la Lande-d'Ousse, entre Chanteloup et Grévin, en forêt de Saint-Aubin.

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*). Notons seulement l'observation d'1 ind. sur Belle-Ile (56) le 9 mai.

PIC MAR (*Dendrocopos medius*). 1 chanteur à la Tournerais/Goven (35) et 1 chanteur en forêt de Baulon (35) le 2 mai. 1 ad. le 29 juin à Lann-Saint-Cornély/Plouhinec (56).

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*). 24 données

Localités signalées : Suscinio/Ploujean (29N), Kervoanec/Plougourvest (29N), Braspart (29N), Pleuven (29S), Grennec/Cast (29S), Matignon (22), Launay-Garnier/Bourgbarré (35), Beslé-sur-Vilaine (35), Noyal-Pontivy (56), Ambon (56), Auray (56), Le Faouët (56), Penhoët/Brec'h (56), Kerbois/Crac'h (56), Vioreau (44). Au Vioreau,

La densité semble en nette augmentation sans modification apparente du milieu (7 couples contre 2-3 en 1970 et 1 en 1969 sur le même secteur).

Nidification : Construction le 3 avril à Ploujean ; pulli au nid le 7 juin au Faouët, le 8 à Pleuven.

TORCOL POURMILLER (*Jynx torquilla*). Peu observé : en Loire-Atlantique, le chant est entendu les 9, 10 et 12 avril au réservoir du Vioreau, le 18 avril à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Dans le Morbihan, 1 le 6 juin à Locmariaquer. Espèce à rechercher absolument.

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*). Dans les dunes d'Erdeven (56), on note 7 chanteurs le 8 mai à Kerouriec ; dans celles de Plouhinec, voisines, 3 chanteurs au moins le 7 juin. L'espèce est aussi installée sur l'île Hoëdic (56) où 6 chanteurs (2 groupes de 3) sont observés le 2 juillet.

ALOUETTE CALANDRE (*Melanocorypha calandra*). Nouvelle apparition (la deuxième) en Bretagne le 28 mars : 1 au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44).

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*). 15 données

Les observations du Cochevis se font rares, en particulier sur les côtes nord de la Bretagne d'où il a presque disparu.

Finistère : 1 ad. en juillet sur le littoral de Cléder (29N).

Morbihan : Noté à Auray, dans les dunes d'Etel (4 couples le 29 mars), de Plouhinec (2 le 15 mai), au Fort-Bloqué/Ploemeur (2 le 4 avril), au Loc'h/Guidel (1 nid/3 oeufs le 20 mai). Dans l'intérieur, 1 le 25 mai au marais de Rieux.

Loire-Atlantique : Observé seulement à Saint-Nazaire.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*). 20 données

Toutes les observations concernent des chanteurs et proviennent pour la plupart du Morbihan.

Localités signalées : Sud-Finistère : Moustierlin/Fouesnant ; Morbihan : Sainte-Hélène, Branderion, Kerouriec/Erdeven, Plouhinec, Le Congel/Quiberon, Belz, Auray, Baden, Surzur, Noyalo, Carnac, Crac'h, Plouharnel ; Loire-Atlantique : lande de Sud-Aviation, Beslé ; Ille-et-Vilaine : gravière de Bruz, Bourgharré, étang de la Musse/Beaulon, Langon.

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*). 120 données

Les premières sont observées dans le nord de la Bretagne, essentiellement dans le Finistère : le 28 mars, 3 en migration vers le nord à la pointe du Grouin/Cancalle (35), 8 dans le Yeun-Elez (29N), 10 au Curnic/Guisseny (29N) et 2 à Trenval/Tréogat (29S) ; le 29 1 chanteur à Ménéham/Kerlouan (29N).

Dans le Morbihan, première à Suscinio/Sarzeau le 31 mars (2 ind.), le 4 avril à Guiscriff et à Dangan, le 6 à Belle-Ile ; en Loire-Atlantique, premières au réservoir du Vioreau le 6 ; en Ile-et-Vilaine, première le 13 avril à Bruz.

Le passage augmente nettement à partir du 10 avril : 80 le 12 au Vioreau, 100 le 14 à Ménéham et 80 au Curnic/Guisseny (29N) le 16, 1 000 à l'étang du Pont/Kerlouan, 200 à Ménéham, grosse arrivée à Saint-Renan le 19, 600-700 à l'étang du Pont le 22, nombreuses dans les marais de Redon le 26, 200 à Banastère/Sarzeau (56) le 27, passage très important en baie de Bourgneuf (44) le 30.

Nouveau passage dans le Léon à mi-mai : 800-900 à l'étang du Pont le 16.

Le passage semble se poursuivre dans la première quinzaine de juin, des petits groupes étant encore observés à Quessant où la nidification paraît peu probable.

Notons que l'espèce se reproduit sur l'île Hoëdic (56) (1 nid occupé le 2 juillet).

En juillet, 300-400 au marais de Kerbellen/Trébeurden (22) le 15.

Colonies signalées : moins de 10 nids : Kermadec/Sizun, Porsmilin, bois de Tréflez, Kerhoant/Saint-Pol-de-Léon, étang du Pont/Kerlouan, Trémobihan/Coat-Méal, La Digue/Kerlouan (29N), Ile Hoëdic et pointe du Bile (56) ; 10 à 50 nids : Kerurus/Plouneour-Trez, Vougo/Guisseny, Portez/Trégana, Porsmilin (29N), Sables-d'Or-les-Pins (22), Saint-Jacut, gravières de Bruz, Langon (35), Kerizan/Crac'h (56), Mauves (44) ; 50 à 100 nids : Mané-Justice/Crac'h (56) ; 100 à 200 nids : Saint-Renan (29N). Cette énumération peut paraître inutile, dérisoire même ; elle n'a pour but que de montrer l'ignorance où nous nous trouvons de l'emplacement (et des fluctuations) des grandes colonies, les petites étant souvent très mobiles et susceptibles de disparaître d'une année à l'autre.

HIRONDELLE DE CHEMINÉE (*Hirundo rustica*). Jusqu'au 2 avril, les observations ne concernent que le sud-

est de la Bretagne, dans une bande côtière allant de la région nantaise à la côte de Lorient ; quelques oiseaux atteignent le nord-est de la Loire-Atlantique et le centre de l'Ile-et-Vilaine le 27 mars : 1 à la Chapelle-Basse-Mer (44) le 19 mars, 1 à Briacé (44) le 23, 1 à Rennes (35), 3 au Vioreau (44), 2 à Penerf, 1 à Dangan et 1 à Kervoyal (embouchure de la

Vilaine -56-) le 27, 1 au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44) le 28, 1 dans le Golfe du Morbihan le 30, petit passage au Fort-Bloqué/Ploemeur (56), 1 au Cranic/Brec'h, 1 à Auray le 1er avril (ce même jour, grosse arrivée à Nantes). Le 2 avril, premières observations dans le Sud-Finistère (Quimper) et à Messac (sud de l'Ille-et-Vilaine). Le 3, première observation dans le Léon (29N) (3 à Landivisiau ; le 4, premières données pour le nord de l'Ille-et-Vilaine (étang du Boulet) et le nord-ouest du Morbihan (Priziac).

Grosses arrivées en Loire-Atlantique et sur les côtes sud de la Bretagne entre le 4 et le 12 avril, des oiseaux se cantonnant un peu partout. Le Nord-Finistère ne commence à se peupler qu'à partir du 11 environ ; c'est aussi à ce moment que les premières observations sont faites dans les Côtes-du-Nord : Loudéac le 10, Perros-Guirec le 11, région de Saint-Brieuc le 12.

Après la mi-avril, le passage n'est plus sensible ; on note cependant 2 ind. sur l'îlot de Keller/Quessant le 18 mai.

Des nids contenant des poussins sont notés à partir du 5 juin (Lan-gonnet -56- ; deuxième ponte de 5 oeufs en ce lieu le 10 juillet).

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*). Premières observations : 1 le 5 avril au Grand-Fougeray (35), 4 le 8 avril à Dinan (35), 2 au Vioreau (44), 1 à Questembert (56) et 1 à Saint-Renan (29N) le 11, 1 à Saint-Nazaire le 12, 1 au Curnic/Guisseny (29N) le 14, premières à Perros-Guirec, Lannion, Louannec (22) le 18, ... Le passage est surtout senti en fin-avril et début-mai : 150 à Kerjean/Tréhabu (29N) le 30 avril, 100 à Passay (44) le 8 mai, 200 au lac de Grand-lieu (44) le 9. C'est à cette époque que les premiers nicheurs apparaissent à Brest. Notons encore : 1 ind. sur l'îlot de Keller/Quessant le 18 mai.

PIPI DES ARBRES (*Anthus trivialis*). 72 données

Premières observations : 1 le 28 mars au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44), plusieurs couples cantonnés le 4 avril au Vioreau (44), 1 le 5 à Hanvec (29S), 2 chanteurs le 12 à Sainte-Hélène (56). Les observations deviennent nombreuses à partir du 12 avril (centre du l'Ille-et-Vilaine, monts d'Arrée, etc...).

Répartition : Loire-Atlantique : Vioreau, Sainte-Lumina-de-Clisson, Baslé-sur-Vilaine (1 nid/5 pullé le 30 mai) ; Ille-et-Vilaine : forêt de Chevré, gravières de Bruz, Bourgharré, la Lande d'Oué, la Musse/Baulon, étang de Taberge/Sainte-Anne-sur-Vilaine, forêt de Rennes, Lassy, Pouez ; Morbihan : Sainte-Hélène, Ambon, Larmor-Baden, Tehillac, Missillac, Le Tour-du-Parc, Noyal, Ploemel, Saint-Jean/Mendon, étier de Caden, Pluneret, Carnac, Crac'h, Penvins, Le Mezo, Sarzeau, Saint-Colombier, Surzur, Arzon, Belz, Boderhan, Baden, Auray, Vannes, Le Ludré, Cranic/Brec'h, Noyal-Pontivy, Séné ; Côtes-du-Nord : étang du Pont-Neuf/Plounerin, forêt de Loudéac, Pléneuf-val-André, Plévenon ; Finistère : Moëlan-sur-Mer, Hanvec, Ploujean.

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*).

Répartition : en Loire-Atlantique : à nouveau présent au réservoir du Vioreau (1 chanteur en avril et mai), plusieurs chanteurs dans les marais à l'est de Massérac, à la limite de l'Ille-et-Vilaine, en mai et juin ; également nicheur dans les marais de Guérande. En Ille-et-Vilaine, le Farlouse est loin d'être uniformément répandu ; on note, en plus du littoral, la région d'Acigné, Liffré, Ercé et Cosné (Nord-est de Rennes) où il est abondant dans les vallons humides, les landes de Las-sy où des nourrissages sont observés le 2 mai, l'aérodrome de Saint-Jacques-de-la-Lande (quelques chanteurs le 30 mai) ; dans les Côtes-du-Nord, 1 chanteur le 9 avril à l'étang de Loudéac ; dans le Morbihan : marais du Ludré/Saint-Armel (6 couples), Portivy/Saint-Pierre-Quiberon (construction le 1er mai), région de Crac'h, Ile Moëdic (nourrissages du 2 au 4 juillet). **Finistère ?**

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta spinoletta*). 14 données

Les derniers hivernants demeurent jusqu'à début-avril : à Séné (56), 2 le 19 mars, à Lampaul-Floudalmezeau (29N), 3 le 25 mars, au Curnic/Guisseny (29N), 2 le 25 mars, à Ménéham/Kerlouan (29N), plusieurs le 25 mars, à Saint-Renan (29N), au moins 1 jusqu'au 1er avril, à Kervigen/Plomodiern (29S), 6-10 le 3 avril. Enfin, sur un petit étang artificiel près de Loudéac (22), une série d'observations en fin-mars et début-avril semble démontrer qu'un passage se produit au printemps dans le centre de la Bretagne, les oiseaux alors observés étant vraisemblablement des hivernants du littoral : 3 le 21 mars, 2 le 27, 11 le 3 avril, 2 le 9 et 4 le 10. On peut noter que les 11 oiseaux du 3 avril ont un comportement tout à fait opposé à celui des hivernants, solitaires et défendant vigoureusement un "territoire de chasse" ; ceux-ci, au contraire, demeurent groupés, inactifs pour la plupart, et réagissent en groupe.

La dernière observation a été faite en un lieu inhabituel, le Roc'h Trévezel (Monts d'Arrée -29N-) le 13 avril.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*).

Motacilla flava thumbergi : 1 le 28 mars au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44).

Motacilla flava flava : les premiers oiseaux de la race type ne sont notés qu'à partir du 7 avril : 1 à Kerizan/Crac'h (56) les 7 et 11 avril, 3 à Ambon (56) le 13, 1 à Le Tour-du-Parc (56) le 14, 1 à Larmor-Baden (56) le 18, 1 au lac de Murin/Massérac (44) le 17... La grosse arrivée se produit fin-avril, mais on note déjà 30-40 couples à Séné (56) le 18. Quelques migratrices dans le Léon (29N) en mai : 1 ♀ à Saint-Renan le 3, 2 à Saint-Marc/Brest le 20.

Motacilla flava flavissima : arrivée tardive puisque les premières isolées ne sont notées que le 11 avril à Ménéham/Ker-

juin (29N), le 12 à Trenvel/Tréogat (29S), le 14 à Goulven (29N), le 16 au Curnic/Guisseny (29N), le 20 à Saint-Marc/Brest, le 21 à Saint-Renan, mais avant début-mai les effectifs sont partout très faibles. Quelques observations dans le Morbihan peuvent concerner des migrateurs : 1 à La Trinité le 21 avril, 1 à l'Étier de Caden le 27, 1 à Ambon le 24 mai.

Distribution :

Motacilla flava flava : en Loire-Atlantique, on note des nicheurs autour du lac de Grandlieu (Saint-Aignan, Pont-Saint-Martin, lande de Sud-Aviation/Passay), en Grande-Brière, à l'Île Pinette/Saint-Sébastien-sur-Loire, dans les marais de Guérande et de Vue, au lac de Murin et dans les marais à l'est de Massérac. 2 couples sont observés le 25 avril dans les marais de Rieux (56), et 1 ind. le 24 juin en plaine de Baud/Rennes (35). Un couple s'est vraisemblablement reproduit sur Ledenez Vraz de Molène (29N) (observé le 16 juin). Sur l'Île Hoëdic (56), 15 couples étaient comptés début-juillet.

Motacilla flava flavissima : nouvelle observée sur Ouessant (1 couple en mai-juin près du phare du Créac'h), dans le Yeun-Elez, mais aussi sur la palud bordant l'Elorn à Landerneau (29N). Dans les Côtes-du-Nord, observée en juillet en baie d'Yffiniac, à Saint-Jacut et au marais de Pléboulle. Plus étonnante est l'observation d'un mâle paradant le 13 juin dans les marais de Massérac (44).

Des couples mixtes (*flava* ≠ *flavissima*) sont à nouveau observés sur le littoral du Morbihan : 1 couple aux Salines de la Trinité, 1 couple au marais d'Ambon.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*). 5 données

En Loire-Atlantique, 1 couple le 28 mai et 1 ♂ le 4 juin à Saint-Etienne-de-Montluc ; 2 ♂, et 1 ♀ et 1 nid/5 oeufs le 22 mai dans le marais de Vue ; signalée sans plus de précisions des environs de Piriac-sur-Mer. Dans le Morbihan, la nidification est probable sur Groix où un couple était cantonné à Quelhuët en juillet.

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*). Les premiers sont observés à mi-avril : le 14 à Noyal-Muzillac (56), le 16 à Saint-Etienne-de-Montluc (44)...

Quelques migrateurs en avril et début-mai dans le Morbihan : 1 le 14 avril à Noyal-Muzillac, 1 le 19 à Locmariaquer, 1 le 27 à Suscinio/Sarzeau, 1 le 1er mai à Bétahon, 3 le 9 mai au barrage d'Arzal.

Répartition : en plus des localités déjà citées les années passées, (Saint-Etienne-de-Montluc, Yeun-Elez, marais de Massérac), on note les marais de Vue (44), (4 chanteurs le 22 mai), ceux de Mauves (44), Saint-Herbot (29N) où 1 couple alarme le 14 juillet, ainsi que l'Île de Groix (56) où le Tarier est assez commun en juillet (nourrissages).

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*). Premières observations nettement plus tardives que d'habitude : 1 ♂ le 25 mars au Vougo/Guisseny (29N), 1 ♂ le 29 à Plouhinec (56). Bien qu'on note déjà 12 ind. (dont 1 ♀) le 1er avril sur la côte de Landunvez (29N), le passage ne commence véritablement que le 4 dans l'ensemble de la Bretagne : réservoir du Vioreau (44), Belle-Ile et Dangan (56), Doëlan (29S), Quessant (29N). Jusqu'à mi-avril, les ♂ constituant la presque totalité des oiseaux observés.

Les données du littoral ne suffisent pas à situer le passage, mais quelques données dans l'intérieur fournissent de bonnes indications : 1 le 3 avril au Vioreau (44), 1 le 8 à Auray (56), 1 le 11 au Vioreau, 2 le 17 au Vioreau, 1 ♀ le 1er mai en forêt de Rennes (35).

Dès le 16 avril, 1 couple construit à Guidel (56) et le 25, un nid contient 4 oeufs à Etel (56).

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus oohruros*). Passage noté du 29 mars au 7 avril sur le littoral : 1 le 29 mars à Kerpape/Ploemeur (56), 3 le 4 avril à Yuzin/Quessant (29S), 1 ♀ le 4 avril à Doëlan (29S), 1 le 5 à Porz Kiny/Quessant, 5 observations (1 ou 2 ind.) en 5 points de Belle-Ile (56) du 4 au 7 avril.

Répartition : en Loire-Atlantique, nicheur à La Baule, Saint-Lumine-de-Clisson et Beslé-sur-Vilaine; en Ile-et-Vilaine, 2 nids à Dinan le 8 juin, nette diminution des effectifs à Beaulieu/Rennes (7 couples contre 12 en 1970) ; dans les Côtes-du-Nord, l'espèce niche toujours au Cap-Fréhel (1 nid/3 pulli dans un blockhaus le 30 mai, nourrissages dans une falaise le 8 juillet).

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*). Les premières arrivées n'ont pas été notées (seulement le 6 mai à Auray et en forêt de Rennes).

Répartition : peu de localités nouvelles. Notons seulement que l'espèce est rare autour de Langon et Beslé-sur-Vilaine (44), qu'elle est présente en forêt de Domaïche (44) et au Ter/Lorient (56).

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*). Premières observations à mi-avril : le 15 à Chantepie (35), le 16 à Saint-Etienne-de-Montluc (44), le 17 au Vioreau (44)...

Répartition : nouvelles localités signalées : en Loire-Atlantique : nombreux points autour du lac de Grandlieu; semble en augmentation au Vioreau (8-9 chanteurs le 1er mai). En Ile-et-Vilaine, forte densité dans le bois de Chantepie, près de Rennes (3-4 couples/ha) ; il semble d'ailleurs que Rennes soit à la limite de l'aire de distribution du Rossignol, puisqu'on ne trouve pas l'espèce au nord (forêts de Rennes, de

Chevré, etc...) ; on peut noter également la forte densité en bordure de l'aérodrome de Saint-Jacques-la-Lande et la présence d'1 chanteur à Langon. Une seule observation dans le Morbihan : 1 chanteur le 19 avril à Locmariaquer (localité la plus avancée vers le nord-ouest). Mais l'observation la plus intéressante provient des Côtes-du-Nord, où 1 couple est cantonné à Ploufragan (un peu au sud de Saint-Brieuc) depuis le 21 avril. Bien que l'observateur souligne l'extrême rareté du Rossignol dans ce secteur, il est probable que l'on puisse établir la jonction avec le centre de l'Ille-et-Vilaine, et peut-être même avec la région du Golfe du Morbihan.

GORGEBLEUE (*Luscinia svecica*). Toutes les observations concernent les nicheurs de la population atlantique, (*Luscinia svecica namnetum*) et n'apportent pas grand chose de nouveau : à Séné (56), 1 seul couple a été noté (1 nid/4 pulli de 5-6 jours le 7 mai), les autres localités se situent en Loire-Atlantique (salines de la presqu'île de Guérande et baie de Bourgneuf).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*). 15 données

Encore 50 le 19 et 30 le 21 mars à Saint-Etienne-de-Montluc (44), 14 le 28 dans le Yeun-Elez (29N).

Dernières observations sur le littoral du Morbihan : 3 le 12 avril à Belle-Ile, 2 le 14 à Le Tour-du-Parc, 2 le 15 à Loperhet/Erdeven.

Enfin, une donnée très tardive : 1 le 11 mai près de Ploumoguier (29N).

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*). Passage sur le littoral entre le 4 et le 16 avril, mais surtout le 6 et le 7 : 1 ♂ le 4 à Ouessant ; 1 ♂ à Kergaren/Plovon (29S), 1 à Belle-Ile (56), 5 ♂ et 2 ♀♀ à Ouessant le 6 ; 1 ♂ à Feunteun-Aod/Plogoff (29S), 1 au Conquet (29N), 1 au cap Fréhel (22) le 7 ; enfin 1 à Guidel le 16.

Pour la première fois, la nidification du Merle à plastron a été observée en Bretagne, 2 couples s'étant reproduits dans le Yeun-Elez (29N) (cf. AR VRAN 1972, IV (2) : 83-86)

GRIVE MAUVIS (*Turdus musicus*). Seulement 6 données après le 15 mars : dernières le 3 avril à Noyal-Pontivy (56), encore 25 le 5 à Ouessant (29N), 1 à Belle-Ile (56) le 6 avril.

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*). La répartition de la draine dans le Léon commence à être mieux connue. Localités citées : Lampaul-Ploudalmezeau, Coat-Meur/Landivisiau, Quillivant/Plou-

gourvest, Brignogan, Kernouës, Landivinoc/Loc Eguiner, Ménéham/Kerlouan, Suscinio/Ploujean, Lescoat/Plouigneau, Brennilis, Troérin/Plouvorn, Kerguedal/Plouvorn.

Pontes complètes le 4 avril au Faouët (56), le 14 à Kernouës (29N), le 15 en forêt de Rennes (35) ; pulli au nid le 17 avril à Ménéham/Kerlouan,...

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*). Dernières observations d'hivernants :
1 chanteur le 30 mars à Saint-Renan (29N), 1 le 1er avril à Lampaul-Ploudalmezeau (29N).

Répartition : (localités non encore citées) :

Loire-Atlantique : En presqu'île de Guérande, chanteurs notés à Piriac et sur la lande de la pointe du Croisic ; notons aussi les marais de Mauves-sur-Loire et différentes localités autour du lac de Grand-lieu (Saint-Mars de Coutais, bois de l'Arsangle...).

Ille-et-Vilaine : Dans le centre de l'Ille-et-Vilaine, on note l'étang de Montauban-de-Bretagne (2 chanteurs le 27 mars), Rennes (1 chanteur aux Gayeules le 18 avril, 1 chanteur en plaine de Baud le 24 juin), l'étang de Carcraon (1 chanteur le 1er mai), l'aérodrome de Saint-Jacques-la-Lande (plusieurs chanteurs le 30 mai). Il faut remarquer que de nombreuses localités favorables se sont révélées vides de Bouscarles tant à l'extérieur du périmètre tracé par ces localités que dans ce périmètre même. L'expansion dans ce secteur semble arrêtée depuis plusieurs années.

Morbihan : L'espèce est présente partout dans une bande côtière allant de la Vilaine à la "côte de Lorient" et l'énumération des localités est inutile. On peut cependant signaler la presqu'île de Quiberon (Saint-Julien et bois d'Amour). Dans l'intérieur, seule de vallée de la Vilaine est occupée : marais de Rieux, de Tehillac, de la Briandais/Missillac (6 chanteurs notés au total le 25 avril).

Côtes-du-Nord : Une seule localité signalée : Sables-d'Or-les-Pins où la nidification est prouvée (transports de nourriture le 10 juillet).

Finistère : Le Sud-Finistère ne fournit pas d'observations, mais ceci n'est du qu'à l'absence d'observateurs. Dans le Léon, deux localités sont à nouveau occupées : à Ménéham/Kerlouan, 3 ind. le 29 mars, puis 1 chanteur jusqu'au 7 juin ; à Coat-ar-Breignou/Bourg-Blanc, 1 chanteur le 3 juin (deuxième année consécutive en ce lieu très peu prospecté !).

LOCUSTELLE TACHETE (*Locustella naevia*). Les premiers chanteurs sont notés le 11 avril à Kérizan/Crac'h (56), le 13 à la pointe du Croisic (44) et à Ambon (56), le 15 à Carnac (56), le 16 à Trégarvan (29S), le 19 à Saint-Renan (29N).

Les observations à Saint-Renan, bien que concernant des chanteurs, permettent de situer le passage car l'espèce n'y niche pas : 3 les 19 et 21 avril, 1 le 22 avril, puis 2 le 2 mai et 1 le 18 mai. L'observation d'un chanteur le 30 mai au Vioreau (44) concerne également un oiseau de passage.

Localités signalées (non citées les années précédentes) :

Loire-Atlantique : Saint-Mars-de-Coutais (3 chanteurs le 15 mai), bois de l'Arsangle (2 chanteurs le 15 mai), lande de Sud-Aviation (1 chanteur le 16 mai).

Morbihan : Billion et Brouéli/Ambon, Keriaval/Carnac, La Trinité, Penn-an-Toul/Larmor-Baden, Kervran/Plouhinec, Kerpenbir/Locmariaquer, Arzon, Plouray (5-6 chanteurs le 30 mai), Crac'h, entre Auray et Belz, Saint-Colombier, entre Surzur et Noyal, Plouharnel.

Côtes-du-Nord : Plévénon et lande du Méné/Collinée.

Finistère : Kerfreval/Trégarvan, Loqueffret.

La répartition de l'espèce est en fait mal connue, et en tout cas sporadique. Les données sont particulièrement défaut en Ile-et-Vilaine.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (*Locustella luscinioides*). Premiers chanteurs le 6 avril à Banastère/Sarzeau (56), le 9 aux étangs de Kervran et Kerzine/Plouhinec (56), le 15 à Kerouriec/Erdeven (56), le 16 à Saint-Etienne-de-Montluc (44), à Penn-an-Toul/Larmor-Baden (56) et à Susicinio/Sarzeau (56).

Localités signalées (non citées les années précédentes) :

Loire-Atlantique : Plusieurs chanteurs le 18 avril à Saint-Lumine-de-Clisson, 3 chanteurs à Saint-Mars-de-Coutais et 1 au bois de l'Arsangle le 15 mai.

Morbihan : 1 chanteur le 21 mai à l'étang de Kerpont/Saint-Gildas-de-Rhuys le 21 avril, 2 chanteurs au Poulbéd/Erdeven le 8 mai, 1 chanteur sur En Eidig le 2 juillet, à nouveau observée à Noyal-Pontivy le 28 juin.

Finistère : Ménéhan/Kerlouan (1 chanteur en mai).

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*). Premières observations d'isolés dans le Léon

(29N) : 1 chanteur le 29 mars à Saint-Renan, 1 chanteur le 1er avril à Lampaul-Ploudalmezeau. Les premiers n'apparaissent que les 5 et 6 avril dans le Morbihan et en baie d'Audierne : Belle-Ile et Kergaŋ/Plovan le 5, Banastère et Saint-Vio le 6. L'arrivée commence le 9 avril dans le Morbihan (très nombreux chanteurs aux étangs de Kervran et Kerzine/Plouhinec) et bat son plein à la mi-avril : on note déjà plus de 40 chanteurs à Susicinio/Sarzeau le 16. C'est à cette époque que les premiers sont notés

dans le centre de l'Ille-et-Vilaine (le 13 à Bruz, le 15 à la Lande d'Oué, le 16 à Saulon). Dans le Léon, nettes arrivées les 17 et 18 avril, les effectifs de l'étang du Pont/Kerlouan passant de 2 chanteurs le 16 à 15 le 22. Vers le 20 avril, les effectifs semblent complets.

Dès le 30 avril, des oiseaux nourrissent à Kerzine (56) ; 1 nid/6 oeufs le 6 mai à Saint-Renan...

En ce qui concerne la répartition, on peut noter la présence de chanteurs à Ouessant en mai et juin.

ROUSSEROLLE EFFARVATE (*Acrocephalus scirpaceus*). Une observation précoce : chant le 14 avril à Goulven (29N).

Il faut ensuite attendre le 8 mai : 3 chanteurs à Kerouriec et 3 chanteurs au Poulbê/Erdeven (56), 3 chanteurs à Saint-Philibert (56). Le 9 mai, 30 chanteurs au lac de Grandlieu. Grosse arrivée à mi-mai.

Localités non citées dans les précédents rapports : Loire-Atlantique : marais de Vue, lac de Murin ; Ille-et-Vilaine : la Tournerais/Goven ; Côtes-du-Nord : Kerhellen/Trébeurden, marais de Pléboulle ; Morbihan : Saint-Jean/Mendon, Banastère ; Kerizan/Crac'h, Kervran et Kerzine/Plouhinec, Portivy/Saint-Pierre, Mostang, le Loc'h/Guidel, Lannec/Ploeneur, Kerouze/La Trinité, Belle-Ile, En Eidiq.

ROUSSEROLLE TURDOIDE (*Acrocephalus arundinaceus*). Uniquement en Loire-Atlantique : à Saint-Aignan-de-Grandlieu, 2 chanteurs le 15 mai ; au marais de Vue, 1 chanteur le 22 mai ; à Couëron, 1 chanteur le 28 mai ; à Saint-Etienne-de-Montluc, 4 chanteurs le 3 juin.

HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*). Une donnée précède les suivantes d'un mois : chant le 4 avril à l'Île-aux-Moines (Golfe du Morbihan).

En Loire-Atlantique, les premiers chanteurs ne sont entendus que le 1er mai à Tharon et au Vioreau. Ensuite, 3 chanteurs le 6 mai à Ploufragan (22) et 1 chanteur le 10 à Rennes (35).

Loire-Atlantique : au Vioreau, les effectifs montrent une augmentation sensible ; il semble en être de même à Tharon. Notons encore que l'espèce est bien représentée autour du lac de Grandlieu, dans le secteur de Beslé-sur-Vilaine, en forêt de Princé ; notée aussi à Pont-d'Armes/Assérac et à la Poitevinnière (9 ch.)

Ille-et-Vilaine : des chanteurs ont été notés à Rennes (Beaulieu, les Gayeules, Maurepas, plaine de Baud), à Saint-Sulpice (forêt de Rennes), en bordure de l'aérodrome de Saint-Jacques-la-Lande (très

abondante), près de Laillé (4 chanteurs sur 2 ha), dans les gravières de Bruz (1 couple).

Morbihan : nombreuses localités tout autour du Golfe : communes d'Arzon, Sarzeau (Brillac, Sarzeau, Duer, bois de Sarzeau, Calzac, Suscinio, Poulhors, Poulphan), Le Tour-du-Parc, St-Armel, Surzur (Kervaché, Surzur, Billaire), Le Hezo et Noyalo ; communes de Baden (Toulvern, Cellino), Larmor-Baden (Trevas), l'île-aux-Moines et le Bono ; communes d'Auray (Kerplouz), de C'ac'h (Kerdavid, Kerfourchard, Keratrap, Kergal, Kercado), de St-Philibert (Keriolet).

Côtes-du-Nord : noté à Sables-d'Or-les-Pins et à Ploufragan (3 couples).

Cette dernière localité, proche de Saint-Brieuc, établit le lien entre Plouha et les localités plus orientales du littoral.

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*). Seulement deux observations avant la fin-avril : 1 chanteur le 7 avril à Fresnay-en-Retz (44) et 1 le 13 à Nantes.

Ailleurs, il faut attendre les derniers jours d'avril : le 27 à Le Tour-du-Parc (56), le 29 en forêt de Rennes (35), le 30 à Plouhinec (56) et à Saint-Brandan (22), le 2 mai au Vioreau (44) et à Auray (56)...

✕ C'est surtout après le 5 mai que les observations se font nombreuses dans le Morbihan, alors que les premières ne sont entendues que les 12 et 13 mai dans le Léon (29N).

L'arrivée se poursuit dans la deuxième quinzaine de mai et l'on note encore un migrateur à Quessant le 8 juin.

Un nid est déjà achevé le 2 mai à la Tournerais/Goven (35) (ce qui implique une arrivée plus précoce que ne l'indiquent les quelques données d'Ille-et-Vilaine) ; 1 nid/2 oeufs le 19 mai à Plouvorn (29N).

FAUVETTE A TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*). Certaines données précoces peuvent concerner des hivernants, notamment dans les villes : chant à Auray (56) le 21 mars, 1 ♂ à Saint-Nazaire (44) le 23... chant à Saint-Armel (56) le 30, 1 ♂ à Quimper (29S) le 30, 1 ♂ à Perros-Guirec (22) le 3 avril.

Une arrivée est enregistrée au Vioreau (44) entre le 4 et le 12 avril ; à cette époque on note aussi les premiers oiseaux à Messac (35), le 4, à Saint-Hilari (22) le 6, à Belle-Île (56) le 7, à Amanlis (35) le 7, à Pleuven (29S) le 7, au Cranic/Brec'h (56) le 8. Un gros afflux se produit autour de la mi avril, en Ille-et-Vilaine notamment.

Répartition : nous ne retenons que les quelques localités léonardes : Suscinio/Ploujean, Brest, Guilers.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*). Premières observations : les 9 et 12 avril (3 chanteurs) au Vioreau (44), le 13 à Surzur (56), le 14 à Anbon et Le Tour-du-Parc (sud du Morbihan) ainsi qu'à Bourgbarré (centre de l'Ille-et-Vilaine), le 15 à Erdeven (56), le 16 à Sarzeau (56), le 18 en forêt de Rennes. Nous ne disposons pas de données sur l'arrivée dans l'ouest ni le nord de la Bretagne. L'essentiel des arrivées semble avoir lieu dans la deuxième quinzaine d'avril (au Vioreau, 10 à 15 couples le 1er mai).

1 nid/1 oeuf le 10 mai au Faouët (56).

Répartition : la Fauvette grisette niche probablement sur Ouessant (3 chanteurs les 10 et 11 juin).

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*).

Répartition : toutes les localités signalées sont citées.

Loire-Atlantique : lande de Sud-Aviation (1 alarmant le 15 mai) ; réservoir du Vioreau (1 couple alarmant le 31 mai).

Ille-et-Vilaine : notée à Laillé.

Côtes-du-Nord : commune sur la lande de Fréhel ; 1 alarmant à Kersalliec/Trédrez le 14 juillet ; notée sur la lande de Lanfains, près de Quintin ; 1 couple construit sur la lande de Saint-Brandan le 16 mai.

Morbihan : notée à Haut-Pérestin/Férestin ; 4 couples au bois de Sarzeau ; 5 couples à Bilaire et 4 couples à Kerlann/Surzur ; 1 à Séné le 4 juin ; 3 couples à Toulvern et 1 couple à Céline/Baden ; 1 à Trevas/Larmor-Baden le 11 juin ; 1 couple à Kerglaz/Brec'h ; chanteurs à Kerstrap, Kerhern et Kercado/Crac'h ; notée au Moustoir/Lozmariquer ; notée à Kernevest/St-Philibert ; 1 à Kerveranton/Ploemel le 7 juin ; 1 couple et 1 ind. à Boderhan et 1 chanteur à Kerbrevost/Belz ; 1 chanteur à Kerzine et 1 chanteur près de Pont-Lorois/Plouhinec ; 1 couple à Kervin/Ste-Hélène ; très commune à Groix et notée en différents points de Belle-Ile.

Finistère : commune dans les Monts d'Arrée (notée à Rumengol, Hanvec, Menex-Meur etc...) ; au bois de Santec, très forte densité, nombreuses familles début-juin ; au Port-Neuf/Cléder, 2 familles le 15 juillet.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*). 9 chanteurs le 28 mars au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44). Il est dommage que les marais de la baie d'Audierne (298) où l'espèce avait été notée l'été et l'automne précédents, n'aient pas été prospectés.

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*). Premiers chanteurs à Suscinio/Sarzeau (56) le 2 avril, au Vio-reau (44) le 4, à Bailleron (56) le 5, à Ouessant (29N) le 6, dans le centre de l'Ille-et-Vilaine le 7, dans le nord-ouest du Morbihan le 10.

L'arrivée se fait rapidement, essentiellement à partir du 6 avril dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine où l'espèce est partout présente à mi-avril. Dans le Léon (29N), il faut attendre les 13 et 14 avril pour observer les premiers.

Deux observations de chanteurs à Brest les 21 avril et 1er mai, semblent concerner des migrants.

Notons qu'un seul chanteur a été noté sur la bordure du lac de Grandlieu les 15 et 16 mai.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*). Des hivernants sont notés jusqu'à fin-mars (encore 10 le 28 à Ménéham/Kerlouan), mais le passage est déjà fort à partir du 24 et jusque dans la première semaine d'avril.

Un individu "gris", appartenant vraisemblablement à la sous-espèce *Ph. collybita tristis*, a été observé à Ménéham en fin-mars et le 16 avril.

Un chanteur à "l'accent pyrénéen" le 22 mai en forêt de Princé.

Une nette diminution des effectifs a été constatée en forêt de Rennes (par rapport à 1970).

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*). Premiers chanteurs notés le 11 avril au Vio-reau (44), le 15 à Saint-Fiacre (44), le 29 en forêt de Rennes (35).

Loire-Atlantique : observé en forêt du Vio-reau (9 chanteurs le 1er mai), de Princé (8 chanteurs le 22 mai), de Donnaiche (7 chanteurs le 23 mai), de la Poitevinière (1 chanteur le 29 mai), ainsi qu'à Tharon-Plage (1 chanteur le 1er mai dans pins maritimes) et à Saint-Lumine-de-Clisson (1 chanteur début-juillet).

Ille-et-Vilaine : en forêt de Rennes, 3 chanteurs notés ; à la Tournerais/Goven, 1 couple le 2 mai.

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*). Premiers chanteurs le 18 avril en forêt de Lorges (22), le 22 en forêt de Rennes (35), le 1er mai en forêt du Vio-reau (44).

Peu de localités signalées : en Loire-Atlantique, forêts de Vio-reau, de Donnaiche (1 chanteur le 23 mai) ; en Ille-et-Vilaine, forêt de Rennes, bois de Pouez, bois entre Chanteloup et Grevin, bois de Laillé (abondant) ; dans les Côtes-du-Nord, forêt de Lorges et Landroanec/Mur-de-Bretagne.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*). Espèce négligée et pourtant très commune localement par exemple dans le Léon ou l'Ille-et-Vilaine. Aucune donnée de Loire-Atlantique.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*). Très peu observé après le 15 mars : 1 au Cranic/Brec'h (56) le 22, 1 à Saint-Philibert (56) le 23, 1 à Kerousseau/Queven (56) le 9 avril.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*). Quelques données espacées dans la première quinzaine de mai : le 2 à l'étang de la Musse/Baulon (35), le 8 à Rennes, le 13 en forêt de Rennes, le 17 à Messac (35). Les observations deviennent plus fréquentes après le 20 mai, et surtout début juin.

Quelques migrateurs les 4 et 8 juin sur Ouessant.

1 nid/4 oeufs le 5 juin à Lannion (22), nourrissages le 14 juin à Tréflaouénan (29N).

MESANGE A MOUSTACHES (*Parus biarmicus*). De nouvelles localités ont été occupées ce printemps, mais les lieux de reproduction déjà connus ont été un peu négligés :

- En baie d'Audierne, l'espèce est simplement notée le 5 avril à Loc'h Kergaran.
- A l'étang de Kervran/Plouhinec (56), 3 le 29 mars, 1 ad. et 1 juv. le 22 mai.
- A l'étang du Poulbé/Erdeven (56), 1 le 15 avril.
- A Suscinio/Sarzeau, nombreuses le 31 mars, 3-4 couples au moins le 16 avril.
- Au lac de Grandlieu (44), 1 ♀ a été observée le 18 avril et en juillet à Saint-Aignan.

MESANGE NOIRE (*Parus ater*).

Ille-et-Vilaine : en forêt de Rennes, 5 couples localisés en mai ; isolés notés à Messac les 23, 24, 28 et 30 avril.

Côtes-du-Nord : 2 chanteurs en avril-mai dans le bois de Saint-Brandan.

Morbihan : 1 chanteur le 9 avril à Kerousseau/Queven ; 1 le 11 avril et 3-4 le 30 juin à Kervigno/Ploemeur.

Finistère : 2 le 11 avril en forêt d'Huelgoat ; 1 couple le 12 avril à Brengall/Pont-l'Abbé ; chant et construction dans une paroi rocheuse le 14 avril à Coat-Pehen/Plougastel-Daoulas ; 2 couples nicheurs (nids découverts) sur le domaine de Suscinio/Ploujean.

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*). A Ouessant, on note dans la première quinzaine de juin :

1 famille à Penn ar Land, 1 famille à Stang-ar-Merdy, 1 chanteur à Prad ar Roue et 2 chanteurs à Prad-Meur.

SITELLE TORCHEPOT (*Sitta europaea*). Deux observations dans le Léon :
1 le 26 avril à Kerjean/Trébabu,
1 le 27 avril au Relecq-Kerhuon.

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*). Nous n'avons retenu que les données nouvelles.

Morbihan : - Pénestin : 1 chanteur les 9 et 10 juillet au Haut-Pénestin.

- En Eïdig : Nombreux chanteurs début juillet.
- Saint-Gildas-de-Rhuys : 1 chanteur le 24 avril ; 3 à Ker-vest le 2 avril.
- Sarzeau : 3 chanteurs à Suscinio.
- Saint-Armel : 1 chanteur au Ludré.
- Arzon : 1 chanteur le 2 juin entre le Net et Tuniac.
- Baden : 2 chanteurs le 11 juin à Toulvern.
- Locmariaquer : 3 chanteurs aux Pierres-Plates, 1 chanteur à Kerhelle.
- La Trinité : 3 chanteurs à Kerdual et 1 chanteur aux marais salants.
- Carnac : 2 chanteurs à la saline.
- Plouharnel : 1 chanteur à Sainte-Barbe.
- Quiberon : 2 chanteurs au bois d'Amour, 1 chanteur à l'aérodrome, 1 chanteur à Portivy, 1 chanteur à Kerné.
- Erdeven : 1 chanteur à Kerhilio, 3 chanteurs au Poulbé, 2 chanteurs à Loperhet, 1 chanteur à Keravéon, 5 chanteurs à Lenn er Gaulec.
- Guidel : 1 chanteur le 11 avril à Kerhop (localité intérieure sur le bord de la Laïta).

Finistère : - Dunes de Plougouln : 1 chanteur en juillet.
- Guissény : 1 chanteur au Curnic.
- Enez Penfret/Glénan : 1 chanteur le 1er juillet.
- Trégunc : 5 chanteurs le 8 avril à Trévignon.

Deux localités sont à considérer à part, toutes deux étant situées dans l'intérieur : d'abord, les marais à l'est de Massérac, à la limite de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique, où 1 chanteur est entendu dans la 2ème quinzaine de mai et le 12 juin ; la nidification est tout-à-fait possible et il faudrait alors envisager une pénétration par la vallée de la Vilaine ; ensuite, la lande de Lanfains, dans les Côtes-du-Nord, où 1 chanteur est observé le 11 juillet ; cette observation est d'ailleurs unique dans ce secteur situé très loin des autres régions de reproduction et il faut considérer cet oiseau comme en erratisme, d'autant que le littoral des Côtes-du-Nord ne fournit à nouveau aucune donnée.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirius*). Nous ne retenons que les données léonardes : 2 couples à Lampaul-Ploudalnézeu, 2 à Penfeld le 4 avril, 1 chanteur à Lesneven le 13 mai, 1 chanteur à Keroual/Guilers le 3 juin, 1 chanteur au Kernic/Plouescat le 7 juin, 1 chanteur en plein Brest le 7 juin, 1 chanteur au Pouldu/Roscoff le 14 juin, 1 juv. à peine volant à Portez-Tréganna le 20 juin, 1 chanteur à Porsmilin en juillet.

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*). Une observation sans lendemain à Ouessant : 1 chanteur le 7 juin à Penn ar Land (l'espèce ne niche pas sur l'île).

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*). 2 le 18 mars à Rennes, isolés les 15, 18, 20 et 22 mars à Messac (35), 5 le 16 et 40 le 20 mars à Kerizan/Crac'h (56), 5 le 27 mars à Suscinio/Sarzeau (56), passages à Vannes du 27 mars au 4 avril, puis les 9 et 10 avril (plusieurs centaines).

SERIN CINI (*Serinus serinus*). Les nicheurs se cantonnent essentiellement après le 20 mars, l'arrivée se poursuivant en avril (limites impossibles à préciser).

Loire-Atlantique : une localité intérieure : Beslé-sur-Vilaine.

Morbihan : partout présent sur le littoral, pas de données pour l'intérieur. Notons 1 à Belle-Ile le 9 juin.

Ille-et-Vilaine : Outre Rennes, Messac, Bruz, déjà signalés, on relève encore quelques localités intérieures : étang de Bélouze/Baulon, environs de Lassy, Saint-Denis-la-Forêt (lisière de la forêt de Rennes).

Côtes-du-Nord : Sur la côte, noté à St-Hilan, Sables-d'Or-les-Pins, Saint-Michel-en-Grèves, pointe du Dourven/Trédrez, Ile-Grande et pointe du Bihit/Trébeurden ; dans l'intérieur : Moncontour.

Sud-Finistère : Noté à Fouesnant, en plusieurs points de Quimper et à Bénodet.

Nord-Finistère : Outre Brest (plusieurs points) on relève : Le Pouldu/Roscoff (2 chanteurs le 14 juin), Kerhoant/Saint-Pol-de-Léon (2 chanteurs en juin-juillet), bois de Santec (nicheur abondant), le Kernic/Plouescat (2 couples), Kerezza (7 couples minimum), mais les données (ou l'oiseau) manquent toujours sur la côte ouest du Léon.

GROS-BEC (*Coccothraustes coccothraustes*). Deux observations près du lac de Grandlieu : 1 ♂ le 7 avril au bois de Saint-Aignan, 1 le 9 avril au bois de l'Halbrandière.

Dans le Morbihan, 1 ♂ tenu en cage le 5 avril au château du Plessis-Kaër (rivière d'Auray) y avait été trouvé blessé une semaine auparavant. Une observation incertaine en forêt de Rennes demande à être confirmée.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*). Localités signalées (les localités déjà signalées ne sont pas citées).

Loire-Atlantique : Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Lumine-de-Clisson, La Chapelle-des-Marais, Beslé-sur-Vilaine (peu répandu).

Ille-et-Vilaine : Cesson, Nouvoitou, Epron, Bourgbarré, Chantepie; gravières de Bruz (nids garnis le 13 avril), Rennes.

Morbihan : Auray, Asben, Guidel (2 nids garnis le 16 avril à Beg Kenez et 1 nid/5 oeufs le 16 mai à Saint-Mathieu), Piriac (1 nid/5 oeufs le 14 mai), Vannes, Peillac.

Côtes-du-Nord : Pléhérel (2 le 10 juillet).

Finistère : 4 au Curnic/Guissény le 25 mars.

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domestique*). Trois autres colonies rupestres sont signalées : falaise de Deolen/Plouzané (29N), Fort-Lost-Kah et Bourhig/Belle-Ile (56).

LORIOT (*Oriolus oriolus*). 12 données.

Loire-Atlantique : 3 chanteurs dans le bois de la Halbrandière et 2 chanteurs dans celui de l'Arsangle (Grandlieu) le 16 mai ; 2 chanteurs aux rochers de Mauves le 20 mai ; 1 chanteur à Sainte-Luce et 1 à l'Île Moron le 20 mai ; 1 chanteur en forêt de Domaiche le 23 mai ; 1 chanteur en forêt d'Ancenis le 31 mai ; 1 chanteur à Champtoceaux le 10 juillet.

Ille-et-Vilaine : 1 couple en forêt de Rennes le 6 mai.

Morbihan : 1 chanteur à Kerzine/Plouhinec le 7 juin.

Sud-Finistère : 1 nid le 7 juin en forêt de Clohars-Carnoët.

CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*). L'effectif de Belle-Ile et celui d'Ouessant n'ont pas été précisés. On note à nouveau 2 couples nichant à Corsen/Plou-arzel (29N).

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*). La recherche des colonies est négligée : 50 nids à Kerjean/Saint-Vougry (29N), petite colonie à Plouvorn (29N). Rien ailleurs !!

Notons 2 ind. toujours présents à Belle-Ile les 12 et 13 avril.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*). A Ouessant, 4 le 6 avril, 1 couple les 7 et 10 juin près de Lampaul.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*). Alors qu'une seule aire était connue jusqu'à présent à Belle-Ile, 3 ont été trouvées occupées cette année, 5 couples pouvant avoir niché.

Autre fait intéressant, la présence de l'espèce au centre des Monts d'Arrée : 1 le 2 mai au sud du Yeun-Elez et 1 le 6 juin au Roc'h Trévezel.

On peut aussi noter la présence de 2 oiseaux sur les étangs de la baie d'Audierne dans la première semaine d'avril.

Alors qu'à Ouessant, le jeune vole dès le 5 avril, les 2 derniers ne quittent le nid que le 9 mai au Cap Fréhel (éclosion le 15 mars, 4 jeunes élevés).

Enfin, notons une troupe de 14 le 14 juillet sur l'île de Groix.