

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

DU 16 MARS 1985 AU 15 JUILLET 1985

Par Laurent GAGER : du Plongeon au Harle huppé ; Jacques HENRY : du Milan royal au Foulque macroule ; Jean-Claude LINARD : de l'Huitrier-pie au Macareux moine ; Guillaume DELINAUD : du Pigeon colombin à la Grive litorne ; Fanch PUSTOCH : de la Bouscarle au Bruant proyer.

Les présentes actualités ont été rédigées, sauf erreur ou omission, à partir des notes de :

P. ABRAHAM, G. E. et F. ALLAIN, G. ALLAND, JP. ANNEZ, Y. AUTRET, JM. BALLOT, B. BARGAIN, H. et M. BARON, N. BARON, R. BASQUE, M. BEAUFILS, P. BECHET, D. BELLIER, MP. BENNETT, JP. BEON, Y. BERTAULT, P. BERTRAND, F. BIGRET, M. BOND, J. BOSSARD, E. BOUCART, J. BOUENO, Y. BOURGAUT, J. CALVEZ, R. CARUS, P. CARIQU, B. CARTEAU, JL. CHATEIGNER, GL. CHOQUENE, L. CHOZEL, JP. COCHIN, M. COCHU, S. COURRIC, P. CRENN, P. CAVAIRE, D. DASKE, G. DECOIX, F. DE KERGARIOU, B. DEWINTER, B. DURIEUX, F. FEREC, P. FORTUNE, A. FROUET, JY. FREMONT, L. GAGER, O. GANNE, J. GAROCHÉ, G. DELINAUD, L. GONIER, J. GURMELEN, E. GRANDSERRE, X. GREMILLET, S. GUIGNEN, Y. GUIOMARD, P. HAFRAY, J. HAMON, P. HAMON, J. HENRY, G. HOFF, L. et X. HUE, F. HIEF, B. JEZEQUEL, S. JOANNIS, JM. JOLY, G. JONCOUR, L. KERAUTRET, L. LAMBERT, B. LAUTREDRI, F. LECORNET, M. LEDARD, P. LE FLOCH, P. et C. LE GUEN, J. LE LANNIC, Y. LE NOZIER, D. LE RAY, R. LE ROY, A. LE TOUQUIN, C. LEVER, D. et C. LINARD, R. MAHED, J. MANACH, J. MAUT, A. MAUDION, M. MELOU, P. MEVEL, P. MIGOT, D. MURELET, T. NICOL, G. OLDSO, J. PENSTIVY, A. et R. PERON, J. PETIT, P. PHILIPON, JP. PIGEARD, JP. PLOUGUEN, F. PUSTOCH, M. QUAINTEME, L. QUENO, B. QUIDEAU, JM. RADU, S. et C. REALLAN, JM. RICHALLAN, G. RINGELLE, A. SCHIER, A. TEXIER, C. THERAUD, A. THOMAS, E. THOMELIN, B. TILLOU, E. VERDES, F. VIAL.

et les observateurs du GOLA : B. BARON, Y. BERTAULT, P. BERTHELOT, G. BRETACHE, D. BROCHET, JC. CERTIN, JP. CHARRIER, JL. CHATEIGNER, Y. CHEPEAU, F. CHICHE, F. CROSSOUD, P. DEGRASSAC, R. DE HARGUES, JL. DUPONT, C. DURAND, JY. FREMONT, A. GERNIGON, P. GURLIAT, F. HARDY, P. HAREL, M. HAROUET, JP. JARDON, J. LE BAIL, B. et M. LEFRANC, G. LERLAIS, M. LECORRE, JP. et M. LEFRANC, G. LERAY, JL. MAILLARD, JP. MEROT, P. MONIER, D. NOEL, P. NOEL, JP. OUFIX, N. OLIVIER, D. PLANTARD, G. RAFTSTEDT, R. RECORDET, P. ROUSSE, C. ROZE, N. SACQUIN, H. THORIE, Y. TREVOUX, JL. TRIMBEAU, JL. VIGNEAU, M. VIOLEAU.

et les observateurs du centre ornithologique d'Quessant : S. ANDERSEN, C. BALANCA, JM. BALLOT, B. BARGAIN, N. BARON, S. BEAUVALLÉ, Y. BEAUVALLÉ, JM. BELIARD, A. BERNARD, Y. BERTAULT, D. BERTRAND, JJ. BLANCHON, C. CHAPALAIN, H. CORRE, M. CUSSE, C. DRONNEAU, C. DUPET, P. DUROIS, E. ENEVOLDSEN, M. FASOL, D. FLOTTE, P. FREDBOURG, JY. FREMONT, L. GAGER, G. DELINAUD, JC. GIGAUT, T. GIPARD, D. ROY, D. GRAFFUILLE, C. GRIFFIN, P. DEGRASSAC, GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE TOURAINE.

Y. GUERMEUR, A. GUYOT, J. HAMON, P. HAMON, M. HEGARD, B. ILLIQU, D. INGREMEAU, G. JARRY, D. KOWALDZYK, G. LABIDOIRE, B. LACCORE, P. LAFRENZ, A. LAMAUD, L. LAMBERT, P. LE FLOCH, JP. LEFRANC, P. LE MARECHAL, JL. LUCHEST, J. MADUT, X. MONBAILLU, P. NIDOLAU-GUILLAUMET, J. NISSEP, M. PANIVELLO, PATRIMOND, J. PIGEON, JC. ROLANDEZ, AJ. ROSS, B. ROUSSEAU, SAND FRICH, JP. SIRLET, M. SMITH, JL. TARDIVO, A. TEXIER, C. THEBAUD, A. THOMAS, E. THOUMELIN, C. TIVOLLIER, D. TOSTAIN, Y. TREVOUX, P. YESOU.

Nous remercions vivement la SSNOF de nous avoir autorisé à utiliser leurs observations parues dans son bulletin.

Nous remercions particulièrement la SEPNE pour nous avoir autorisé à utiliser les résultats en provenance de ses réserves.

ERRATUM

Tome XI, fascicule 2 :

Canard chipeau (*Anas strepera*) : la phrase concernant la nidification a été tronquée : lire : " Elle a été prouvée à Grandlieu en 1973 ".

Busard cendré (*Circus cyaneus*) : l'individu observé au château des Rochers/Vitré le 3 juin est un Busard sp. (*Circus* sp.).

Tome XII, fascicule 2 :

Flamant rose (*Phoenicurus ruber*) : l'individu observé à l'étang du Boulet/Feins est en fait un Flamant du Chili.

Tome XII, fascicule 2 :

Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*) : l'observation de Varades est du 30 janvier et non du 20.

Grue cendrée (*Grus grus*) : 3 (et non 1) oiseaux à Padoz (44) le 16 janvier.

LES FAITS MARQUANTS DU PRINTEMPS

ONT ETE LES SUIVANTS :

- Une nouvelle espèce nicheuse pour la Bretagne : la fauvette babillarde *Sylvia curruca*.
- Une nouvelle espèce pour l'avifaune bretonne : le petit Puffin ou Puffin semblable *Puffinus aestivus*.
- Des progressions spectaculaires pour certaines espèces : le grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* ou le Pic noir *Dryocopus martius*, ou sensibles pour d'autres : le Fulmar *Fulmarus glacialis*, le Puffin des anglais *Puffinus puffinus*, l'Aigrette garzette *Actitis hypoleucos*, l'Hypolaïs polyllotte *Hypolaïs polyllotta*, le Crabe Pyrrhocore *Pyrrhocore* qui semble s'être réinstallé sur le lagon continental, le grand Corbeau *Corvus corax*.
- Une chute proche de l'éradication pour la Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*.
- Concernant la reproduction on peut remarquer la redécouverte de l'Eider à duvet *Somateria mollissima* dans l'archipel d'Hoat, le bon nombre d'observations de Bondrée apivore *Pernis ptilorhynchus*, la présence de mouettes mélanocéphales *Larus melanocephalus* dans une colonie de mouettes rieuses *Larus ridibundus*, une bonne reproduction du Hibou moyen-duc *Nyctalex noctua*, le maintien d'une petite population de Cochevis huppé *Galerida cristata* à St-Brieuc, la nidification d'un couple mixte de Bergeronnette grise type et Bergeronnette grise de Yarrell *Motacilla alba* (2ème cas pour la Bretagne).
- Quelques observations inhabituelles : 1 Percnoptère d'Egypte *Neophron percnopterus* dans le Mor Bras, 1 Mouette atricilla *Larus atricilla* en Loire-Atlantique, 1 Hibou petit-duc *Nyctalex noctua* chanteur durant l'été à Belle-Ile, 1 Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* à Quessant, 1 ♂ et 1 ♀ de Bruant fou *Beberiza cinerea* (avec chant !) en Loire-Atlantique.
- Notons par ailleurs que dans l'ensemble l'arrivée des passereaux migrants est apparue tardive cette année et que la faucon pèlerin *Falco peregrinus* a alarmé sur deux sites littoraux annonçant peut-être sa prochaine réinstallation dans notre région.

PLONGEON SP. (*Gavia sp.*) 12 données

2 observations tardives sont à signaler : 10 le 2 mai au large du Croisic (44) et 1 le 10 juin à Roscoff (29N).

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) 6 données

1 le 31 mars dans le petit traict du Croisic (44) ; 2 le 3 avril à Merkel/Mesquer (44) ; 3 en vol le 4 à l'île de Banneg/Archipel de Molène (29N) ; 2 vers l'ouest le 8 à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22) ; 2 le 14 à Erdeven (56) et 3 le 2 mai au large du Croisic (44).

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) 5 données

1 le 23 mars à Kerhillio/Erdeven (56) ; 1 le 25 à Ste-Evette/Esquibien (29S) ; 2 en plumage nuptial le 31 à Plougastel-Decoules (29N) ; 1 le 2 mai au large du Croisic (44) et 1 en plumage nuptial le 1^{er} juin à Porsguen/Plougastel-Decoules.

L'observation de juin est la plus tardive reçue à ce jour.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*) 10 données

A Quessant (29N) : 1 à Prat du 19 mars au 6 avril ; à Erdeven (56) : 1 le 23 mars, 3 dont 1 en plumage nuptial le 31 et 3 en plumage nuptial le 14 avril.

Ailleurs : 4 le 30 mars à Portivy/St-Pierre-Quiberon (56) ; 2 le 4 avril au Zorn/Plouguerneau (29N) et le dernier le 11 mai en baie de Quiberon (56).

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*) 35 données

Les derniers hivernants disparaissent le 24 mars : 6 à St-Adrien/Plougastel-Decoules (29N), ensuite les observations concernent essentiellement des reproducteurs.

Localités déjà citées dans les fascicules précédents d'AR VRAN (1967-1974 et 1964):

Côtes-du-Nord :

1 au Marais de Kerhelen/Trébeurden le 22 juin.

Finistère :

1 couple à Quessant ; 1 couple (chant) le 22 avril dans la carrière du Moulin du Roz/Guipavas ; 4-5 individus le 16 juin à Trévignon/Trégunc ; 1 couple parade le 1^{er} juillet au Stangalard/Brest ; 3-4 juvéniles le 9 juillet sur l'étang de Leoual/Plogoff.

Morbihan :

1 couple et 1 chanteur le 9 avril à Kercadoret/Le Trinité-sur-Mer.

Loire-Atlantique :

1 chanteur le 26 mai dans le marais guérandais.

Localités nouvelles :

Ille-et-Vilaine :

1 le 20 mars à la Bézardière/Hédé ; 1 le 1^{er} mai dans le marais de Gannedel/Le Chapelle-de-Brain ; 3 couples le 22 juin dans l'étang de Châtillon-en-Vendelais ; 1 adulte nourrit le 11 juillet dans l'étang du Moulin de Beauvais/Bourgbarré.

Côtes-du-Nord :

1 couple avec 2 juvéniles le 5 juin à la Poterie/Lamballe ; 1 couple parade le 10 juin en forêt de Beaucourt/St-Nicolas-du-Fels.

Finistère

2 couples (chants) le 1^{er} mai et 1 juvénile le 3 mai au Guic/Guerlesquin.

Morbihan :

1 chanteur le 30 mars à Kerdual/Le Trinité-sur-Mer.

Loire-Atlantique :

1 couple du 21 au 25 avril au pont de l'Guic/Haute-Goulains ; 1 couple le 25 avril dans le marais de Beaulieu/Couëron ; 1 couple avec 3 pulli le 24 juin sur l'étang de la Cour au Loup/Merbignac ; noté au marais de Grés/Ancenis, à l'étang du Pin et à l'étang de la Pourlière/Le Chapelle-Glain.

1 donnée à rapporter à la dispersion : 1 le 8 juillet dans la station d'épuration de Piestin-les-Grèves (22).

Il serait souhaitable que toutes les données de nidification de cette espèce, peu abondante, soient transmises.

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) 38 données

Des bandes stationnent jusqu'à la mi-avril :

25 le 19 mars à la Blisière/Juigné-des-Moutiers (44), 22 le 20 mars à Bazouges-sous-Hédé (35), 15 le même jour à la Bézardière/Hédé (25), 26 le 26 mars dans le secteur " la Piblais-Moulin d'Apigné " /Rennes (35), 14 le 1^{er} avril au Cronio/Brech (56).

Des observations maritimes tardives sont enregistrées :

1 le 3 avril à Port Pican/Cascale (35), 1 le 11 mai à Molène (29B) et 22 le 3 juin à Cremenac'h/Dangan (56). Dans ce dernier cas il s'agit d'estivage.

NIDIFICATION

Ille-et-Vilaine :

Étang de Châtillon-en-Vendelais* : 20 adultes et 8 nids le 25 mai ; l'étang des Roches/Chelun : 2 nids le 12 mai ; gravières du sud de Rennes : 4 adultes et 5 pulli le 21 mai à Lillion, 1 couple et 3 jeunes le 31 à la Bretonnière, 1 couple et 2 jeunes le 31 à la Piblais, 1 couple et 3 jeunes le 31 au Pré Namet, 1 couple et 2 jeunes le 20 juin à la Cheise ; la Villecartier/Bazouges-la-Pérouse* : 1 couple et 3 jeunes le 14 juin ; Val d'Izé : 4-5 couples et 6 jeunes le 22 juin.

Finistère :

Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern* : 2 couples le 28 avril ; Irévigon/Irégunc* : 1 couple avec 2 juvéniles le 29 mai (1ère nidification certaine).

Morbihan :

Cronio/Brech : 3-4 couples ont tenté, vainement semble-t-il, de nicher sur ce plan d'eau situé près d'un élevage de visons.

Loire-Atlantique :

Vioreau/Joué-sur-Erdre : 20 individus et 5 nids occupés le 18 mai, 32 individus le 7 juillet, 6 couples le 13 juillet ; Bois Joalland/St-Nazaire* : 1 couveur le 1^{er} mai ; marais de Grée/Ancenis* : 1 nid occupé le 4 juin mais cette tentative échoue.

(° = site nouvellement signalé dans AR VRAN)

L'inventaire des sites de Basse-Bretagne s'impose pour cette espèce en expansion.

GREBE JOUGRIS (*Podiceps grisaeigens*) 4 données

1 individu jusqu'au 27 mars dans les marais de Goulaine, 1 le 5 juin à Grandlieu (44) et 1 adulte en plumage nuptial du 16 au 18 juin en baie de Morlaix (29N).

Les deux dernières données sont les plus tardives qui nous soient parvenues.

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) 2 données

1 en plumage nuptial le 29 mars sur le petit traict du Croisic (44) et 7 (5 en plumage nuptial) le 30 mars à Penthievre/St-Pierre-Quiberon (56).

GREBE A COL NOIR (*Podiceps nigricollis*) 6 données

3 le 22 mars et 3-4 le 1^{er} avril au Cranic/Brech (56) ; 5 le 31 mars à Plougastel-Daoulas (29N) ; 3 le 2 avril à la pointe du Bil/Séné (56) ; 2 les 13 à Pen Bron/La Turballe (44) et 1 le 14 dans le port du Croisic (44).

PETREL FULMAR (*Puffinus glacialis*) 71 données

REPRODUCTION

Cap Fréhel (22) : 42 couples mais seuls 11 semblent incuber en juin.

Falaises de Plouha (22) : 1 quinzaine de couples entre la plage Bonaparte et la pointe de la Tour où la reproduction est prouvée pour la première fois (R. LE ROY com. or.).

Sept-Iles (22) : 26 couples à Rouzic et 2-3 à Melben. Il s'agit d'un recensement très partiel puisque 60 sites étaient occupés en 1980 (J. HENRY - JY. MONNIAT : Oiseaux marins de la façade Atlantique Française - 1981).

Quessant (29N) : 12 posés le 3 avril à Keller Vraz, 2 posés avec occupation le 9 mai à Roch Mell, 1 posé le 27 avril à Bec'houl, 4 posés le 28 avril au nord-est de Keller Vihan.

Tas de Pois (29S) : au moins 12 couples sur Bern C'hiaz.

Le Guern/Crozon (29S) : 1 ponte le 29 mai. Il s'agit de la 1ère certitude de reproduction pour ce site.

Cap Sizun (29S) : 10 pontes et 3 envois à Goulien, 3 pontes sans succès sur un nouveau site à Penharn/Ciédén-Cap-Sizun, 2 posés le 24 mai à Castelmeur/Ciédén-Cap-Sizun, 1 posé le 24 mai à la pointe du Raz/Plogoff, 2 pontes sans succès à Faunteun Aod/Plogoff, 15-20 posés le 9 avril à Poulbich/Plogoff.

Groix (56) : 4 posés au maximum. Pas de reproduction.

Belle-Ile (56) : 9 posés le 4 avril à St-Marc/Locmaria et 8 posés le 27 mai à Koh Kastell/Sauzon. Pas de reproduction.

Vouloir estimer un effectif global à partir des données dont nous disposons n'est pas chose aisée, faute d'unité dans les techniques de recensement utilisées. On peut toutefois penser que 160 à 200 sites sont occupés au total, ce qui traduit une poursuite de la progression de cette espèce (143-144 sites en 1980 - J. HENRY - JY. MONNIAT op cité).

Cet essor devrait se poursuivre car des prospections ont été notées sur d'autres secteurs : île des Landes/Cencale (35), Run Glaz/Guinaec (29N), Pen Du/Panneg (29N), Bourhic/Bengor (56).

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*) 81 données

NIDIFICATION

45 couples aux Sept-Iles/Perros-Guirec (22) : 5-10 couples à Banneg/Archipel de Molène (29N) : 1 terrier occupé dans l'archipel d'Houat (56).

Une localité nouvelle : le Yorc'h Korz/Duessant (29N) où un cadavre de poussin est découvert.

MOUVEMENTS

Les premiers ne sont observés à Duessant qu'à partir du 22 mars, ailleurs à partir du 10 avril.

Le passage est fort entre le 10 et le 15 avril : 166/th le 12 à Duessant ; les mouvements se calment ensuite jusqu'au début de mai : 156N/20 en à Duessant et 50 à Molène (29N) le 10.

Les mouvements sont ensuite moins remarquables à l'exception d'individus en pêche au Cap Fréhel (22) : 100+ le 7 juin, 300-400 le 9 juin.

Le phénomène le plus intéressant concerne la mise en évidence d'une disjonction des aires d'estivage des 2 sous-espèces de Puffin des anglais dans le sud Bretagne :

La race type (*Puffinus puffinus puffinus*) fréquente essentiellement les eaux situées au nord et à l'ouest de Belle-Ile (56) alors que la race des Baléares (*Puffinus puffinus mauretanicus*) se concentre dans les eaux situées au sud et à l'est de cette île.

Le phénomène déjà décrit par HEMERY (Etude de la répartition géographique des oiseaux de mer - rapport annuel 1980-81 CREPO-Mer - 1982) et YESOU (Nouvelles données sur la race de *Puffinus puffinus mauretanicus* - ORFO Volume 55 n°3) a été confirmé par les sorties en mer du GOLA (B. RECORBET-missions en mer pour l'étude de la répartition des oiseaux marins - GOLA n°6-1986) et par les observations de JP. ANNEZO en mission entre Brest (29N) et l'estuaire de la Vilaine (56).

Bien sûr cette disjonction n'est pas absolue, témoins ces puffins des Baléares (*P. p. mauretanicus*) observés à Goulien (29S) où à Quessant (29N) en faible nombre il est vrai.

PETIT PUFFIN (*Puffinus assimilis*) 2 données

Les observations proviennent d'Quessant (29N) : 1 ou 2 (*Puffinus assimilis baroli*) NW le 12 avril, 1 NW le 11 juin.

Il s'agit des deux premières données bretonnes et apparemment les 9ème et 10ème données françaises (DUBOIS et YESOU - Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France - 1985).

Cette espèce nicheuse sur les îles du sud-est de l'Atlantique Nord est mal connue. Signalons simplement que de 1981 à 1983 au moins un individu a chanté sur une colonie galloise de Puffin des anglais (*Puffinus puffinus*) (British birds-79-1-1986).

PETREL TEMPETE (*Hydrobatas pelagicus*) 6 données

4 données en mer : 2 le 11 mai entre Port Haliguen/Duiberon et Nében/Arzon (56) ; 2 le 5 juin à Batz (29N) ; 1 NW le 11 juin à Porz Doun/Quessant (29N) ; 1 oiseau affaibli recueilli le 18 juin toujours à Quessant.

NIDIFICATION

Présence signalée à Ar Gest/Camaret-sur-Mer (29S), Youc'h Koz/Quessant et Banneg/Archipel de Molène (29N).

FOU DE BASSAN (*Sula bassana*) 102 données

La grande majorité des observations vient d'Quessant (29N) où l'on remarque un passage important dans la 1ère quinzaine de mai.

A remarquer le pourcentage d'adultes : 81,6% fin mars ; 79,7% début-avril ; 97% fin-avril ; 53,2% en mai ; 26% en juin ; 21,5% en juillet.

NIDIFICATION

4160 couples aux Sept-Iles/Perros-Guirec (22).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) 86 données

Sur les dortoirs : 38 le 22 mars à Kerhuon (29N) puis 32 le 8 mai ; 40 le 23 mars à Rohellan/Erdeven (56) puis 35 le 14 avril ; 55 le 17 avril sur l'île Perdue/Dudon (44).

Quelques données d'estivage : 3 le 14 juin sur Fourch Vras/Lampaul-Plouarzel (29N) ; 1 le 16 juin sur le Guic/Guerlesquin (29N) ; 1 immature le 3 juillet sur Banneg/Archipel de Molène (29N) ; 1 le 15 juillet à St-Sébastien-sur-Loire (44).

NIDIFICATION

Ile des Landes/Cancalle (35).....	32-40 couples
Le Chatellier/Cancalle (35).....	40 couples
Rocher de Cancalle (35).....	65-70 couples
Verdelet/Pléneuf (22).....	12 couples

et deux nouveaux sites :

Le Grand Chevret/St-Coulomb (35) :	3 couples
Ile Ricard/Carentec (29N).....	6 couples

soit au total : 157-170 couples compte non tenu de l'éventuelle reproduction à Grandlieu.

Le secteur de Cancalle n'a pas retrouvé les 193 couples de 1983 mais a tout de même augmenté ses effectifs (35-40 nids en 1984).

A remarquer le spectaculaire saut vers l'ouest de l'espèce qui atteint désormais la baie de Morlaix (29N). Nous ne serions pas surpris que le "vide" existant entre cette colonie et celle du Verdelet soit comblé à l'avenir, si ce n'est déjà fait, compte tenu du nombre de sites favorables en Goëlo et Trégor. Des recherches s'imposent dans ces secteurs.

CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*) 34 données

NIDIFICATION

Ile-et-Vilaine :

A Cancale : 5-10 couples sur le Herpin, près de 10 sur le Chatelier, 10-15 sur le rocher de Cancale et 160-170 sur l'Ile des Landes.

Côtes-du-Nord :

19 couples au Verdelet/Pléneuf et 56 dans les falaises de Plouha. Un recensement très partiel donne 85 couples aux Sept-Iles.

Finistère :

Pas de reproduction notée sur la Méloine/Plougasnou ; 18 nids au moins sur les Roches Jaunes/Plougasnou ; 120 couples dans la réserve de la baie de Morlaix ; 8-10 couples sur le Youch/Duessant ; 3 couples à Banneg/Archipel de Molène ; 313 couples aux Tas de Pois et 97 sur Ar Gest/Comeret-sur-Mer ; 215 couples à la réserve M. JULIEN/Goulien ; 52 nids sur Brilinet/Glénan..

A noter 1,72 jeune par couple à Goulien.

Morbihan :

50+ nids sur la réserve de Croix ; 18 couples sur Rohellan/Erdeven ; 7 nids à Koh Kastell/Souzon ; 229 couples dans l'archipel d'Houat.

TOTAL = 1472-1494 couples alors que l'effectif total excède les 3000 couples.

BUTOR ETOILE (*Botaurus stellaria*) 3 données

Trois chanteurs le 17 mai dans le marais de Machecoul (44) puis 2 le 26 mai ; 1 chanteur le 23 mai dans le marais de Prinquiau (44).

HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*) 3 données

2 le 22 mai à St-Sébastien-sur-Loire (44) ; 1 du 22 au 28 dans le marais de Ste-Luce (44) ; 1 le 26 à Trévaly/Le Turballe (44).

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) 34 données

Quelques données d'avril à l'ouest de la région : 8 à Goulven (29N) le 4, 1 le 10 à Béniguet/Archipel de Molène (29N), 1 le 20 au Kernic/Plonévez-Lochrist (29N), 1 les 28 et 30 à Quessant (29N).

A Kerdual/Le Trinité-sur-Mer, la présence est régulière : 1 individu jusqu'au 10 juin, 3 le 15, 10 le 8 juillet et 6 le 15.

NIDIFICATION

110 nids au Haut Villeneuve/Guérande (44). Un nouveau site : l'Île Réno/Baden (56).

L'espèce semble avoir bien surmonté ses pertes hivernales, mais un décompte précis des colonies s'impose.

GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*) 1 donnée

1 du 17 au 19 mars à l'étang de la Blisière/Juigné-des-Moutiers (44). Il s'agit de l'individu précédemment signalé en ce site.

HEPOTON CENDRE (*Ardea cinerea*) 72 données

L'observation d'isolés est chose fréquente dans toute la région. Notons tout de même quelques groupes :

Au Franic/Brech (56) : 16 le 22 mars, 11 le 1^{er} avril ; à Kerdual/Le Trinité-sur-Mer (56) : 5 le 25 mai ; à Ancenis (44) : 18 le 1^{er} juin, 33 le 4, 58 le 19 ; à Corsen/Piouarzel (29N) : 7 le 13 juin ; à Bannez/Archipel de Molène (29N) : 7 le 15 juin ; au Cap Fréhel (22) : 5 le 17 juin ; à Châtillon-en-Vendelois (35) : 8 le 22 juin.

Les observations de juin correspondent à la dispersion des juvéniles.

NIDIFICATION

Ille-et-Vilaine :

60 nids dans le marais de Gannedel/Le Chapelle-de-Brain ; 7-10 couples (1 en 1984) sur l'îlot de Champcors/Bruz.

Loire-Atlantique :

5 nids dans le bois de Ouifistre/St-Molf ; 140 couples au Gros Fossés/Brière ; 12 nids à l'Île Chevalier/Le Chapelle-Launoy ; 202 nids au Haut Villeneuve/Guérande ; 83 couples à Laveu ; 2-3 nids à l'Île du Mascareau/Frossey.

HERON POURPRE (*Ardea purpurea*) 7 données

Quelques données du secteur de Grandlieu (44), site de nidification :
1 le 12 avril à l'Halbrandière/St-Aignan-de-Grandlieu, 2 les 21 et 28
avril à l'Arsengle/La Chevrolière. En juillet, 2 près du lac.

Ailleurs : 1 le 25 mai sur le grand réservoir du Vioreau/Joué-sur-
Erdre (44) ; 1 le 1^{er} juin sur les rives du Don/Conquereuil
(44) et enfin, 2 immatures le 17 juin dans le marais de Gannede/La
Chapelle-de-Brain (35).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) 4 données

1 E le 18 avril à Quessant (29N) ; 1 en mai au lac de Grandlieu (44) ;
1 le 29 juin à Assérac (44).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) 12 données

En rivière de Pont l'Abbé (29S) 1 individu poursuit son hivernage jus-
qu'au 10 mai.

Le passage pré-nuptial est bien groupé du 17 au 25 avril : à Bindre/
Séné (56), 4 le 17, 1 le 18, 3 le 25 ; à Falguérec/Séné, 3 le 21, 4 le
22 ; à Trenvel/Tréogat (29S), 1 le 24.

La dispersion ou l'estivage sont notés à Lavau (44) (1 le 29 juin), à
Falguérec/Séné (2 le 8 juillet) et à St-Jean/Lochal-Mendon (56) (1 le
11 juillet).

CYGNE DE DEWICK (*Cygnus bewickii*) 2 données

6 jusqu'au 21 mars au marais de Grée/Ancenis (44) ; 1 à Sougnol (35) du
17 mars jusqu'au 2 avril.

OIE SP. (*Anser sp.*) 1 donnée

3 W le 26 avril à la réserve PH. JULIEN/Goulien (29S).

OIE CENDREE (*Anser anser*) 1 donnée

Le passage, faible, décroît rapidement et disparaît fin-mars.

BERNADIE CRAVANT (*Branta bernicla*) 12 données

Les départs sont massifs fin-mars et début-avril, il ne reste guère d'oiseaux en avril : 4 en baie du Mont St-Michel (35), 5 en baie de la Fresnaye (22), 27 à Yffiniac (22), 6 dans l'estuaire du Jaudy (22), 6 en Penzé (29N), 2 en baie de Quiberon (56), 28 dans le golfe du Morbihan (56), 3 en baie de Vilaine (56), 9 dans les traicts du Croisic (44), 248 en baie de Bourgneuf (44).

Trois observations plus tardives : 1 le 11 mai dans le marais de Guérande (44), quelques individus le 31 mai à St-Maurice/Morieux (22) et 1 individu apte au vol en juillet dans le golfe du Morbihan.

TADORNE DE BELON (*Idornis tadorna*) 155 données

NIDIFICATION

Ille-et-Vilaine :

15-20 couples à l'île des Landes où 1 nid de 10 oeufs est découvert le 22 mai ; 1 couple alarme le 3 juin à la pointe du Méneq/St-Foulomb.

Côtes-du-Nord :

Taden : 1 couple alarme le 2 juin ; estuaire du Gouessant/Morieux : reproduction notée ; Jaudy : 4 adultes et 6 juvéniles le 4 juin ; île Plate/Sept-Îles : 3 couples ; Île Grande/Pleumeur-Bodou : nidification probable ; station d'épuration/Plestin-les-Grèves : 1 famille avec 8 juvéniles le 8 juillet.

Finistère :

Baie de Morlaix : 8-10 familles minimum (la 1ère est repérée le 23 mai) ; Penzé : 6-7 familles minimum ; Goulven : 1 couple (+) le 16 mai ; Quessent : 1ère reproduction avec 1 jeune à l'envol ; archipel de Molène : 1 couple à Banneg, 9 à Balaneg, 1 à Molène, 2 à Trielen ; Kerjean/Le Conquet : 1 couple ; ZIP/Brest : 4 couples ; le Fret/Crozon : 1 couple ; Lespoul/Pont-Croix : 1 ♀ + 1♂ ; rivière de Pont l'Abbé : 2 familles le 29 juin ; anse de Conchrit : 1 famille le 22 juin ; Goulven/Quimper : 4 couples ; Penfret/Îles Glénan : 1 couple.

Morbihan :

Rivière d'Étel : 1 famille ; St-Jean/Locoal-Mendon : 1 famille ; Kerdual/
La Trinité-sur-Mer : 1 couple ; Séné : quelques crèches observées.

Loire-Atlantique :

Îlot de la Pierre Percée/La Baule : 1 couple ; marais de St-Molf : 4 mâles
le 21 mai ; marais de Guérande : 1 famille le 26 mai ; marais de Prinquiau :
3 couples ; St-Étienne-de-Montluc (Loire) : 4 couples ; réserve des
Baraons/Couëron : 1 couple (+) ; baie de Bourgneuf : 1 couple (+) ;

et une localité intérieure : le marais du Petit Mars avec 1 couple les 28
avril et 5 mai.

Signalons que la reproduction en eau douce a déjà été signalée en Bretagne
sur le réservoir du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (29S). Cette tendance à
la colonisation des eaux douces devrait s'intensifier à l'avenir.

A rapprocher, peut-être, de ce mouvement l'étonnante observation d'un adulte
le 22 avril dans une carrière de Guipavas près de Brest (29N).

Les recensements dont nous disposons sont trop parcellaires pour que nous
puissions préciser la population bretonne. Des décomptes exhaustifs s'impo-
sent.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) 7 données

6 les 17 et 18 mars à Nérizelec/Plovan (29S) ; 20 le 16 dans l'anse du
Pouldor/Coebrit (29S) ; 42 le 19 dans le marais de Grée/Ancenis (44) ; 20
le 1^{er} avril à St-Jean/Locoal-Mendon (56) ; 4 le 18 à Châtillon-en-Vendelois
(35) ; 1 ♂ le 21 au Vioreau/Joué-sur-Erdre (44).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) 9 données

6 observations en mars : 6 le 16 au Petit Vioreau/Joué-sur-Erdre (44) ; 5
le 19 dans le marais de Grée/Ancenis (44) ; 3 le
20 à Yffiniac (22) ; 2♂ et 2♀ les 22 et 30 dans le marais de Gannedel/La
Chapelle-de-Brain (35) et 12 le 23 au Varguez/Erdeven (56).

Une seule observation en avril, dans un secteur de nidification : 3 ♂ le
16 à Nérizelec/Plovan, en baie d'Audierne (29S).

En mai l'observation de deux couples isolés peut laisser espérer la nidi-
fication en deux autres secteurs : à l'Halbrandière/St-Aignan-de-Grandlieu
(44) le 5 et dans le marais de Gannedel le 27.

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) 16 données

En mars, quelques bandes sont encore notées :

65 le 16 dans le marais de Grée/Ancenis (44) ; 22 le 23 au Moulin Neuf/Plounérin (22) et 10 le 26 aux Ponts Neufs/Hillion (22).

En avril, les données se raréfient :

4 le 1^{er} à St-Jean/Lochal-Mendon ; 5 couples le 9 à Kerdroukhanvet/Lescauet-Gouarec (22) (site de nidification) et 1 ♂ + 1 ♀ le 18 à Quessent (29N).

En mai :

Encore 1 ♂ le 8 à Quessent ; 1 ♂ du 7 au 12 à Laspoul/Pont-Croix (29S), il semble s'agir de migration tardive ou d'estivage. Par contre sont sûrement nicheurs les 2 individus vus le 30 mai au Moulin du Roy/Berrien (29N) et peut-être le ♂ aperçu le 8 à Châtillon-en-Vendelois (35).

La Sarcelle d'hiver devra faire l'objet de recensements précis à l'avenir.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) 114 données

Les bandes disparaissent rapidement et les quelques regroupements rencontrés en avril concernent probablement des nicheurs.

NIDIFICATION

1 ♀ et 6 pulli dès le 28 avril au Ruic/Guerlesquin (29N) ; 1 ponte le 10 avril à Béniguet/Archipel de Molène (29N) ; 1 ♀ et 6 pulli du 1^{er} au 7^{er} mai à la station d'épuration de Carantec (29N) ; 8 familles le 8 à Châtillon-en-Vendelois (35) ; 1 famille le 11 à Plougouven (29N) ; 1 famille le 17 à Lillion/St-Jacques-de-la-Lande (35) ; 2 familles (13 et 9 pulli) le 18 au Cranic/Brech (58) ; 1 ♀ et 5 pulli le 31 à Poulguidou/Plouhinec (29S) ; 2 familles le 8 juin à Traon ar Chost/Plougasnou (29N) ; 1 ♀ et 5 pulli le 14 sur l'étang de Kerhuon (29N) (1 ♀ et 5 pulli le 21) ; 1 ♀ et 4 pulli le 17 au Moulin du Roz/Guipavas (29N).

A noter par ailleurs 10 couples sur les îlots de la baie de Morlaix (29N) ; 5 nichées à Quessent (29N) et 2 nids sur des huttes de chasse dans le marais de Goulaine (44).

Les premiers rassemblements sont notés en Loire-Atlantique dès le début-mai : 47 le 7 à la Poitevinière/Riaillé. Plus tard, 83 le 1^{er} juin sur le même site, 51 le 25 à Varades (44), 50 le 29 à Trielan/Archipel de Molène et 29 le 11 juillet à St-Jean/Lochal-Mendon (58).

CANARD NOIRATRE (*Anas platyrhynchos*) 4 données

1 individu est observé du 24 au 28 mai à la station d'épuration de Pont Croix (29S).

Il s'agit de la deuxième donnée bretonne et de la 3ème donnée française. (DUBOIS et YESOU - Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France - 1986).

CANARD PILET (*Anas acuta*) 8 données

En mars, encore des indices de passage :

50 le 18 dans l'anse de Pouldon/Combrit (29S) ; 81 le 19 dans le marais de Grée/Ancenis (44) ; 1 ♂ le 23 à Plounérin (22) ; 740 ♀ Scuzel (35) le 23 ; 3 ♂ le 24 au Pouldon ; 3 ♂ le 30 à Falguérec/Séné (56).

En avril, deux observations seulement :

14 le 1^{er} à St-Jean/Loccal-Mendon (56) et 1 ♂ du 22 au 26 dans le marais de Grée.

De récents cas de nidification, notamment en Bretagne sud, nous amènent à attirer l'attention des observateurs sur cette espèce.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*) 30 données

Les premiers ont été notés en mer au large du Croisic (44) dès le 24 février.

En mars, le passage est nettement ressenti :

1 ♂ le 18 mars au Vougot/Guisseny (29N) ; 27 le 19 au marais de Grée/Ancenis (44) ; noté le 22 au marais de Gennedel/La Chapelle-de-Brain (35) ; 36 le 26 au marais de Grée ; 1 ♂ le 31 à Falguérec/Séné (56) et un autre à la Roche-Sèche/Erdeven (56).

En avril :

1 ♂ le 1^{er} aux Ponts Neufs/Hillion (22) ; 1 ♂ les 14 et 18 à Falguérec/Séné (56) ; 4 le 17 à Goulven (29N) ; 1 ♀ le 21 à Trévignon/Trégunc (29S) ; 2 ♀ le 21 au marais de Goulaine (44) ; 1 ♂ les 22 et 26 au Violeau/Joué-sur-Erdre (44) (non revu par la suite) ; 4 ♀ et 1 ♂ le 22 au marais de Grée (puis 1 ♂ le 27).

En mai :

3 ♂ le 1^{er} au marais de Gennedel (1 ♂ le 27) ; 4 ♂ et 1 ♀ le 1^{er} au marais de Grée ; 1 ♂ le 7 à Lespoul/Pont-Croix (29S) ; 2 ♂ et 1 ♀ le 13 au marais de Méron/St-Herblon (44) ; 2-3 ♀ le 25 à Châtillon-en-Vendelais (35).

En juin :

4 ♂ le 1^{er} au marais de Grée et 1 ♀ le 16 à Trévignon/Trégunc.

En Loire-Atlantique des données de mâles non circonstanciées proviennent des marais de Beaulieu/Couëron, marais de Machecoul, des Baracons/Couëron, de Varades, du marais de Bray/Montrelais et de la Grande Vallée/Bouguenais.

Comme à l'accoutumée les preuves de reproduction manquent ; une attention particulière doit être portée à cette espèce qui se reproduit essentiellement dans le sud de la région et notamment en Loire-Atlantique.

CANARD SOUDET (*Anas platyrhynchos*) 23 données

L'essentiel du passage doit se dérouler avant le 15 avril :

3 le 18 mars à Nérizelec/Plovan (29S) ; 9 le 20 à Bazouges-sous-Hédé (35) ; 37 dont 25 ♂ le 22 au Cranic/Brech (56) ; noté les 22 et 30 au marais de Gannedel/Le Chapelle-de-Brain (35) ; 3 le 23 à Plounerin (22) ; 40 le 30 à Mindin/St-Nazaire (44) ; 20 le 1^{er} avril au Cranic ; 25 le 4 à Ménéham/Kerlouan (29N) puis 8 le 16.

Peuvent concerner des nicheurs les données suivantes :

2 le 15 avril à Mercillat-Robert (35) ; 2 ♂ et 4 ♀ le 16 à Nérizelec ; 2 ♂ le 17 au Guic/Guerlesquin (29N) (1 le 28) ; 3 ♂ et 2 ♀ le 21 à Lillion/St-Jacques-de-la-Lande (35) ; 5 ♀ le 21 à Trévignon/Trégunc (29S) ; 1 ♂ le 25 au marais de Beaulieu/Couëron (44) ; 1 ♀ le 25 au marais de Goulaine (44) ; 1 ♀ du 26 au 4 mai (parades le 1^{er} juin) au marais de Grée/Ancenis (44) ; 1 ♂ le 25-mai à Châtillon-en-Vendelais (35) ; 1 ♂ le 29 à Trévignon puis 1 ♀ le 16 juin.

Reproduction prouvée au Kérhelen/Tréheurden (22) : 1 couple.

Les preuves de reproduction manquent pour cette espèce également. À rechercher.

FILIGULE MILQUIN (*Aythya ferina*) 24 données

Les hivernants sont notés jusqu'au début d'avril :

80 le 16 mars au grand Vioreau/Joué-sur-Erdre (44) ; 150 le 20 à la Bézardière/Hédé (35) ; 80 le 22 au Cranic/Brech (56) puis 80 le 1^{er} avril.

A partir de la mi-avril des individus sont notés sur les sites potentiels de nidification :

3 le 28 au Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (295) (1 ♂ le 4 juin). En mai : 1 ♂ le 4 au lac de Murin/Assérac (44) ; 1 ♂ le 12 à l'étang de Lombelle (22) ; 1 ♀ le 12 dans le marais de Goulaine (44) ; 1 le 18 au Cranic/Brech (56) ; 1 ♂ le 29 à Trévignon/Trégunc (295). En juillet : 1 ♂ le 11 sur Grandlieu.

NIDIFICATION (2 sites ont été contrôlés)

- Etang du Pin (44) : 5 ♀ le 1^{er} mai, 7 ♂ + 2 ♀ le 11, 1 ♀ + 8 pulli de 1-2 semaines et 1 ♀ avec 5 pulli le 28 juin.
- Châtillon-en-Vendelais (35) : 8 ♂ + 4 ♀ dont 1 avec 7 pulli le 8 mai, 8 ♂ + 2 ♀ avec 1 pulli le 25 mai, 10-15 ♂ le 22 juin.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) 28 données

Le schéma est identique à celui du Milouin (*Aythya ferina*) avec le départ des hivernants en mars et au tout début d'avril :

14 du 15 au 21 mars à Lespoul/Pont-Croix (295) ; 10 le 17 à Gourvaux/St-Gilles-du-Vieux-Marché (22) ; 12 le 19 à la Blisière/Juigné-des-Moutiers (44) ; 79 le 19 au parc paysager de St-Nazaire (44) ; 32 le 20 à Bazouges-sous-Hédé (35) ; 8 le 20 à la Bézardière/Hédé (35) ; 87 le 22 à Kerhuon (29N) ; 30 le 22 au Cranic/Brech (56) ; 18 le 28 sur les gravières de la Piblais et du Moulin d'Apigné/St-Jacques-de-la-Lande (35) ; 21 le 1^{er} avril au Cranic ; 13 le 1^{er} au marais de Grée/Ancenis (44).

En période de NIDIFICATION

2 ♀ le 21 avril à Trévignon/Trégunc (295) (revu les 29 mai et 8 juin) ; 15 le 28 à l'étang du Fourneau/Perret (22) ; 4 ♀ le 28 au Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (295) ; 1 ♂ le 1^{er} mai dans les gravières de St-Jacques-de-la-Lande ; 1 ♀ le 4 dans le lac de Murin/Assérac (44) ; 1 ♀ le 7 à Longchamps/Rennes (35) ; 5 ♂ et 3 ♀ le 8 à Châtillon-en-Vendelais (35) (puis 3 ♀ et 2 ♂ le 25) ; 1 ♀ le 18 au Cranic ; 1 ♂ le 21 à Lillion/St-Jacques-de-la-Lande. En juin : 5-10 ♂ le 22 à Châtillon-en-Vendelais. En juillet enfin : 2 ♀ le 11 au Cranic.

NIDIFICATION

Uniquement prouvée au Pin (44) avec 1 ♀ et 5 pulli de moins d'une semaine le 28 juin.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya marila*) 4 données

1 ♂ le 17 mars aux Ponts Neufs/Hillion (22) ; 1 ♀ les 17 et 18 à Nérizalec /Piovan (295) et 1 ♂ le 19 mai en ce dernier lieu (cette observation tardive est régulière en baie d'Audierne).

EIDER A DUVET (*Somateria mollissima*) 15 données

Les observations proviennent toutes du littoral sud de notre région :

Finistère :

Réserve M. JULIEN/Goulven : 3 ♂ + 3 ♀ le 27 mai, 1 ♀ les 28 mai, 3 et 16 juin, 1 ♂ immature le 5 juin.

Morbihan :

Kerhillio/Erdeven : 4 ♀ le 23 mars, 1 ♂ immature le 19 avril ; archipel d'Houat : 1 oeuf dans un nid de Goéland marin (*Larus marinus*) garni de duvet(!); golfe du Morbihan : 1 ♀ le 13 juillet.

Loire-Atlantique :

Merquel/Mesquer : 1 couple le 8 avril ; baie de Bourgneuf : 15 le 15 avril ; Pornichet : 10+ le 11 mai ; Ile Baguenaud/La Baule : 30 le 15 mai ; les Evens/La Baule : 1 couple tente de nicher pour la troisième année consécutive.

La petite population du Morbréz se maintient, l'événement étant constitué par la " redécouverte " de l'espèce près de Houat où elle avait niché en 1964 et 1969. Par contre aucune nouvelle de l'autre zone de reproduction : le côte du Trégor.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) 26 données

Des stationnements sont notés jusqu'à la mi-avril :

160 le 23 mars à la pointe de Tréfeuntec/Plonévez-Forzey (295) ; 100 le 23 à Kerhillio/Erdeven (56) ; 30 le 30 à Penthièvre/St-Pierre-Quiberon (56) ; 200 le 30 à la pointe St-Gildas/Préfaillies (44) ; 350 le 5 avril entre Belle-Ile et Houat (56) ; 40 le 10 à Pont Rousault/Planguenoual (22) ; 80 à la mi-avril en baie de Quiberon (56).

Des déplacements sont notés en mars-avril :

95 N le 25 mars dans le raz de Sein (295) ; 45 M/4an le 26 à Duessant (29N) ; 100 N le 31 à la pointe du Croisic (44)... 2 N/30an le 28 avril au Croisic.

Une donnée intérieure en mai :

1 ♂ + 1 ♀ le 15 aux Bougrières/St-Jacques-de-la-Lande (35).

Quelques données sont relatives à l'estivage :

Le Baule (56) : 18 le 2 mai, 25-30 le 17 juin ; Cromenach/Drengan (56) : 6 le 3 juin ; pointe du Croisic : 10/30m le 9 juin.

GARROT A DEIL D'OR (*Bucephala clangula*) 5 données

1 ♂ le 15 mars à Lillion/St-Jacques-de-la-Lande (35) ; 4 ♀/immatures le 17 à la Blisière/Juigné-des-Moutiers (44) ; 3 le 22 mars dans les traicts du Croisic (44) ; 4 le 1^{er} avril à St-Jean/Loceol-Mendon (56).

Remarquons qu'un ♀/immature a stationné dans le marais de Goulaine (44) jusqu'au 25 avril.

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*) 6 données

Toutes les données proviennent de Loire-Atlantique :

1 ♂ + 4 ♀ le 17 mars à la Poitevinière/Riaillé ; 2 ♂ + 4 ♀ le 18 puis 1 ♂ + 3 ♀ le 19 à la Blisière/Juigné-des-Moutiers ; 1 ♀/immature le 1^{er} avril au marais de Grée/Ancenis ; 1 ♂ le 31 mai sur la Loire à St-Sébastien et 1 ♀/immature le 27 juin sur l'étang du Pont de Fer/Asséroc où il semble avoir estivé.

L'abondance et le caractère tardif des observations sont à mettre en relation avec l'efflux hivernal consécutif aux coups de froid.

HARLE HIPPE (*Mergus serrator*) 18 données

Jusqu'à la mi-avril les observations concernent des groupes en fin d'hivernage :

6 ♂ + 21 ♀ le 24 mars en rivière de Pont l'Abbé (29S) ; 6 le 30 à la grande plage/Carnac (56) ; 8 le 31 à Plougastel-Deoules (29N) ; 12 le 31 dans le petit traict du Croisic (44) ; 140 dans le golfe du Morbihan (56) et 15 en baie de Quiberon (56) à la mi-avril ; 3 les 13 et 14 au Croisic ; 5 le 14 à Sissable/Guérande (44).

Par la suite, ne sont observés que des isolés :

1 ♀ le 14 avril à Fort Cazon/Landéda (29N) ; 1 ♀ le 21 dans l'estuaire du Gouessant/Morieux (22) ; 1 ♂ du 27 avril au 6 mai à Bindre/Séné (56) ; 2 ♂ le 11 à St-Goustan/Le Croisic ; 2 N le 12 au Croisic ; 1 ♀/immature le 24 au Croisic.

HARLE BIEVRE (*Nerpes merganser*) 2 données

1 ♂ le 23 mars à Plounérin (22) et 2 ♀ le 1^{er} avril à St-Jean/Lochal-Mendon (56).

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*) 36 données

Ille-et-Vilaine :

1 couple le 20 mai à l'étang du Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen ; 1 le 8 juin à Bain-de-Bretagne ; 1 le 22 juin au bois de Beaufeu/Val d'Izé.

Côtes-du-Nord :

1 le 4 mai au Bois Meur/Boqueho ; 1 le 12 mai à la Vallée/Langast ; 1 le 24 mai en forêt de St-Aubin ; 3 le 25 mai au bois de Quélénec/St-Gilles-du-Vieux-Marché ; 1 le 13 juin entre St-Donan et Plouvara ; 1 le 15 juin dans la vallée du Léguer/Plounévez-Moëdec ; 1 ponte de 2 oeufs le 22 juin en forêt de Coetquen ; 1 le 23 juin en forêt de Lorge ; 1 le 7 juillet à la Ville Dry/Erquy ; 1 le 10 juillet au Plesris-Tréhen/Pluduno.

Finistère :

Parades les 19 mai et 3 juin au Nêvet/Kerlaz ; 1 le 29 mai à Goarem an Nabat/Argol ; 1 le 30 mai à la réserve MH. JULIEN/Coulisan ; 3 le 30 mai à Kervorn/Laz ; 1 couple le 1^{er} juin à Plougastel-Daoulas ; 1 le 1^{er} juin à Coatlosquet/Plounéour-Ménez.

Morbihan :

1 couple le 27 mai à Lesturgant/Malguenac ; 2 le 27 mai à Segleïn (2 sites) ; 1 le 3 juin à St-Jean/Lochal-Mendon.

Loire-Atlantique :

1 le 16 avril dans le marais de Goulaine ; 1 le 21 mai à St-Etienne-de-Montluc ; 1 le 21 mai à St-Molf ; 1 couple le 27 mai en forêt du Vioreau ; 1 couple le 1^{er} juin en forêt d'Ancenis ; 2 couples le 1^{er} juin dans la partie nord de la forêt du Gavre ; 2 couples dont 1 parade le 1^{er} juin au bord du Don/Quénéné-Penfao ; 1 couple le 1^{er} juin à Conquereuil ; 1 couple le 1^{er} juin en forêt de Seffré ; 1 couple le 1^{er} juin à l'étang du Pont de Fer/Assérac ; 1 le 2 juin au bois d'Indre/Derval ; 1 le 3 juin à St-Julien-de-Concelles.

Par ailleurs : 1 couple à la Poitevineière/Rsaillé.

Nous enregistrons un nombre de données record pour une période printanière. Cet effort de prospection permet de révéler un certain nombre de sites en particulier dans les Côtes-du-Nord et en Loire-Atlantique.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) 23 donnéesIlle-et-Vilaine :

1 à le Guittonais/Ercé-en-Lande le 17 avril ; 1 immature à l'étang de Châtillon-en-Vendelais le 22 juin.

Finistère :

1 à Corroach/Conbrit le 7 mai ; 1 à Bourg-Blanc fin mai.

Morbihan :

1 au Cranic/Brech le 1^{er} avril ; 1 à Barac'h/Ploerdut le 26 mai ; 1 à Noyalo les 6 et 11 juin ; 1 à Falguêrec/Séné le 27 juin ; 4 dont 2 juvéniles volants au Cranic le 11 juillet ; 1 à Lann Blad/Locoal-Mendon le 11 juillet.

Loire-Atlantique :

Le premier est noté le 12 mars à la Blisière/Juigné-des-Moutiers ; 6 au Vioreau/Joué-sur-Erdre le 7 avril ; plusieurs en Grande Brière le 11 mai ; 1 couple reproducteur à Villeneuve/Guérande le 16 mai (2 oeufs et 1 jeune à l'envol) ; 1 couple cantonné dans le marais de Guérande le 28 mai ; 6 en forêt de Machecoul le 7 juillet ; 2 aires à St-Philbert-de-Grandlieu.

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) 2 données

1 immature à Erquy (22) le 27 mai et 1 au Petit Mars (44) le 28 mai.

PERCROPTERE D'EGYPTE (*Neophron percnopterus*) 1 donnée

Le 2 juin 1 adulte venant du sud passe au-dessus d'Hocor et se dirige vers Houat (56).

CIRCAETE (*Circus galliœus*) 1 donnée

1 au nord-ouest des monts d'Arrée début-juillet.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) 40 données

Ille-et-Vilaine :

Au marais de Gennedul/La Chapelle-de-Brain. 2 ♂ et 2 ♀ le 22 mars. 3-4 ♂ et 1 ♀ le 15 juin ; 2 à Marcillé-Robert le 15 avril, 1 le 29 mai et 1 immature le 23 juin ; 1 à Goven le 1^{er} juin.

Côtes-du-Nord :

1 à la réserve de Clesseven le 26 avril ; 1 ♂ à Kermorvan/Plévin le 26 mai.

Finistère :

1 ♀ immature à Ouessant le 7 mai ; 1 à Trévignon/Trégunc le 16 juin ; reproduction à Ménéham/Kerlouan et au Vougot/Quisseny.

Morbihan :

Reproduction à Belle-Ile (2 couples) où la première preuve de reproduction a été notée en 1983 ; reproduction également à la Trinité-sur-Mer (nouvelle localité), à St-Jean/Loceol-Mendon (2 juvéniles à l'envol) et à Pénestin ; 1 couple à Hoëdic le 2 juin.

Loire-Atlantique :

1 couple au marais de Goulaine le 18 avril ; 2 couples à l'étang du Pont de Fer/Assérac le 1^{er} juin.

La progression de l'espèce se poursuit, la prochaine colonisation devrait se situer dans le secteur de côte compris entre Plouneour-Trez et Ploescat (29N).

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) 36 données

Ille-et-Vilaine :

1 ♂ à la Cambrée/St-Senoux le 23 mars ; 1 ♂ à la Gauthrais/Penec le 30 mars ; 1 ♂ à St-Guinoux le 11 mai ; 1 près de la forêt de la Guerche le 18 mai ; 1 en forêt du Theil le 19 mai ; 1 à la Corbinière/Langon le 23 juin.

Côtes-du-Nord :

1 à l'Armor/Pordic le 26 mai.

Finistère :

Dans les Monts d'Arrée, le St-Martin semble devenu au moins aussi nombreux que le Busard cendré (*Circus pygargus*). Dans les Montagnes noires, le Busard St-Martin a peut-être disparu à la suite de très fortes dégradations subies par les landes de reproduction (incendies, défrichements).

En début de période, les observations proviennent essentiellement de localités où l'espèce ne niche pas : 1 à Nérizélec/Ploven le 18 mars ; 1 au Moulin

de Callac/Plonéour-Lanvern le 21 mars ; 1 à Languidou/Ploven le 3 avril ; 1 à Kératry/Douarnenez le 9 avril ; 1 à Poulguidou/Plouhinec le 19 avril ; 1 ♂ à la réserve M. JULIEN/Goulien le 22 avril (1 le 25 mai).

Toutes les données de reproduction proviennent des Monts d'Arrée et des landes avoisinantes ; nous en retiendrons : 5 pulli au Crapou/Plougonven le 10 juillet ; 1 q alame à Lannamarou/St-Rivoal début-juillet.

Morbihan :

1 q à Bindre/Séné le 28 mars et 1 le 7 juin : 1 ♂ transportant une proie au camp de Meucon le 2 juin ; 1 à Beg Melen/Croix le 2 juin ; 1 ♂ à Neuron le 7 juillet.

Loire-Atlantique :

3 ♂ et 2 q en forêt du Vioreau le 5 mai ; 2 ♂ aux alentours de la forêt de Saffré le 1^{er} juin ; 1 ♂ au bois de Bouru/Treffieux le 2 juin ; nicheur probable en forêt de Domnaiche/Lusanger.

BUSARD CENDRE (*Circus pygmaeus*) 26 données

Finistère :

4 données à Duessent : 1 q + 1 mélanique le 7 avril, 1 q les 16 avril et les 20 et 21 mai.

A l'exception d'1 ♂ le 16 juin à Run Braz/Dinéault, toutes les autres observations proviennent des secteurs de nidification des Monts d'Arrée où la reproduction a été prouvée au Roc'h Cléguer/Brespars (1 juvénile volant), au Crapou/Plougonven (2 couples dont 1 avec 4 pulli), à la Briche St-Barnabé/Le Cloître-St-Thégonnec (cuvée dévorée par 1 renard).

Morbihan :

1^{er} le 1^{er} avril à St-Jean/Loceol-Mendon.

Loire-Atlantique :

2 couples dans le marais de Machecoul.

Par ailleurs : 3 le 19 avril en forêt du Gavre ; 1 q/immature le 29 avril à la Grande Vallée/Bouguenais ; 3 q dans le marais de Bourgneuf le 5 mai ; 1 ♂ le 3 juin au Brunet/St-Lyphard ; 1 q aux marais salants de Ratz-sur-Mer le 28 juin et 2 q le 29 juin à Fresnaye-en-Retz.

BUSARD " culblanc " (*Circus cyaneus/pygmaeus*) 1 donnée

1 entre Pont l'Abbé et Quimper (295) le 3 juin.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) 8 donnéesFinistère :

1 immature à Pont l'Abbé le 26 avril ; 1 en forêt de Carnoët en avril-mai.

Loire-Atlantique :

2 en forêt de Donnaiche les 24 mars, 27 et 30 avril ; 1 mâle à l'
Arsangle/La Chevrolière le 28 avril ; 1 en forêt du Vioreau le 27 mai.

Quelques localités nouvelles pour une espèce en progression.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) 136 données

La remontée de l'espèce se confirme avec les très nombreuses données de reproduction certaines qui nous sont parvenues. Pour l'instant la grande majorité de ces preuves concerne la Basse-Bretagne, l'épervier étant même assez rarement noté en Loire-Atlantique.

Dans un certain nombre de secteurs du Finistère, l'épervier est devenu plus commun que le faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*), atteignant parfois des densités remarquables : 5 nids au moins sur les 2000ha de l'ancienne commune de Ploujean/Morlaix (29N).

Un inventaire des couples nicheurs est actuellement en cours sur la base d'une prospection systématique à l'intérieur d'une zone témoin : la commune ou plutôt le canton. Les premiers résultats permettent d'estimer la population du Finistère et des Côtes-du-Nord à plusieurs centaines de couples pour chacun de ces départements. C'est sans doute le cas également pour le Morbihan. Par contre nous manquons d'éléments pour l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique.

BIOLOGIE

- Distance minimale entre 2 nids : 200m
- Ponte : à partir du 12 mai
- Poussins : à partir du 13 juin
- Production : 4,44 jeunes/couple pour 8 sites contrôlés dans le Cap Sizun.

A signaler que l'épervier se reproduit dans deux nouvelles îles : Eréix (56) et Batz (29N) où 2 couples se partagent 305 ha de terres !

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) 138 données

Les preuves de reproduction sont nombreuses et proviennent de l'ensemble des départements. Il serait intéressant d'obtenir des densités estimées à partir de la prospection systématique de zones témoins : commune ou plutôt canton.

BIOLOGIE

- Distance minimum entre 2 nids : 300m
- Nid occupé : 1^{er} dès le 9 avril
- Pullus signalés seulement à partir du 31 mai
- Familles : 1 jeune (7 cas) ou 2 jeunes (3 cas).

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*) 3 données

1 au barrage du Gouet/Ploufragan (22) le 19 avril (l'oiseau y séjourne une semaine); 1 en baie du Mont St-Michel (35) le 19 mai ; 1 le 1^{er} juin à Assérac (44).

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*) 83 données

Beaucoup de données de reproduction sont relatives à des couples installés dans des carrières, sans doute plus faciles à découvrir. En ces lieux la cohabitation avec le grand corbeau (*Corvus corax*) ne semble guère poser de problème : en un site du Nord-Finistère un couple de crécerelle couve le 27 avril dans une ancienne aire de corbeau à moins de 20m de la nouvelle où se trouvent des pulli.

Nombreux sont les observateurs qui font état d'une diminution de l'espèce. Une prospection semblable à celle proposée pour l'épervier ou la buse devrait permettre de préciser les choses.

ETIOLOGIE

- Pulli : 1^{er} le 16 mai - 2 nids garnis découverts avec 3 et 4-5 jeunes.

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*) 2 données

1 à Belle-Ile (56) le 4 avril ; 1 à Botmeur (29N) le 5 avril.

FAUCON HOBREAU (*Falco subbuteo*) 32 données

Ille-et-Vilaine :

1 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais le 8 mai ; 1 couple à l'étang du Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen le 20 mai ; 1 à St-Laurent/Rennes le 29 mai ; 1 à la pointe du Meinga/St-Coulomb le 30 mai ; 1 sur les landes de la Roche du Teil/Redon le 8 juin ; 1 en forêt de Rennes le 15 juin ; 1 dans les marais de Gennedel/La Chapelle-de-Brain les 16 et 17 juin ; 1 à l'aérodrome de St-Jacques-de-la-Lande le 17 juin ; 1 à la Corbinière/Langon le 23 juin.

Côtes-du-Nord :

1 nid avec 3 oeufs à St-Solen/Lanvalley le 22 juin (il y aura 2 jeunes à l'envol).

Finistère :

1 à Guessant les 4 et 6 avril ; 1 à Keremma/Iréfler le 10 mai ; 1 au Cragou/Plougonven les 1^{er} et 2 juin.

Morbihan :

1 à Falguérec/Séné les 4 mai, 22 mai et 11 juillet (2 au même endroit le 21 mai).

Loire-Atlantique :

1 au bois du Rocher de la Vierge/Orvault le 14 avril ; 6 au marais de Goulaine le 16 avril, 4 le 28 avril au même endroit et 2 jusqu'au 28 juin au moins ; 6 à Malsaine/St-Lumine-de-Coutais le 28 avril ; au moins 2 couples dans la partie nord de la forêt du Givre le 1^{er} juin ; 1 ♂ sur les bords du Don/Guéméné-Penfao le 1^{er} juin ; 1 au bois d'Indre/Derval le 2 juin ; 1 au bois de Bauru/Treffieux le 2 juin.

Nicheur certain en forêt du Givre

Le cas de nidification des Côtes-du-Nord est intéressant ; il concerne un département où aucune preuve certaine n'avait pu être apportée lors de l'Atlas 1970-75). De fait il constitue le point nord-ouest de l'aire principale de l'espèce en Bretagne. Nous n'avons toujours aucune preuve de reproduction dans les Monts d'Arrée.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) 15 données

Ille-et-Vilaine :

1 à l'île des Landes/Cancals le 3 avril ; il s'agit vraisemblablement du même individu que celui observé depuis le 14 novembre 1984.

Côtes-du-Nord :

1 alarme dans une falaise littorale en avril.

Finistère :

2 à la réserve PH. JULIEN/Goulien le 27 mars (1 le 29 mars, 1 les 9, 10, 11, 12 avril, 1 les 10 et 13 juillet) ; 1 à Quessant les 1^{er}, 2 et 4 avril et 2 le 3 avril ; 1 au port de commerce/Brest le 30 mai ; 1 couple alarme dans une falaise littorale les 18 et 19 juin.

La recrudescence des observations et l'audition d'alarmes dans deux sites sont sans doute l'annonce d'une prochaine nidification (si ce n'est pas déjà fait...). Rappelons que l'espèce avait disparu de notre avifaune nicheuse dans les années 80.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) 7 données

Ille-et-Vilaine :

2 au marais de Gannedel/Le Chapelle-de-Brain le 30 mars ; 1 à la Pomeraie /Le Sel-de-Bretagne le 20 juin.

Morbihan :

Nidification prouvée à Pleugriffet.

Loire-Atlantique :

1 à Vallet le 23 mars ; 1 à Geneston le 17 avril ; 2 à la Hervinière/Pannecé le 1^{er} mai ; 1 couple au bois de la Noé/Vallet le 8 mai.

A remarquer la reproduction de Pleugriffet située légèrement en dehors de l'aire de répartition de l'espèce de l'Atlas (1970-75), il est possible que cette nidification soit due à des lâchers.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) 7 données

Espèce négligée. Notée sur les communes de Rennes (35), Kerpert (22), Plouyé (29N), Fouldergat (29S), Séné (56), Pannecé (44).

Une seule donnée intéressante, d'origine cynéristique: 13 couples à Plozévent (29N - Léon) dont la superficie est de 1962 ha. Cette densité, très faible, serait à comparer avec celles de région moins " défavorisées ". Une concertation avec les milieux de la chasse serait profitable.

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*) 6 données

Ille-et-Vilaine :

1 chanteur au Haut-Pays/St-Coulomb le 30 mai ; 1 chanteur à Ercé-en-Lamée le 8 juin.

Côtes-du-Nord :

Nidification à Plouguenast le 7 juin et à Plédéliac le 15 juin (9 juvéniles).

Finistère :

2 chanteurs à Trenvel/Tréogat le 30 juin.

Morbihan :

1 chanteur à Kerguêna/Carnac le 30 juin.

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) 3 données

Rien à signaler.

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) 16 données

Nous ne retiendrons que les données de mai-juin ainsi que celles concernant des chanteurs :

Ille-et-Vilaine :

2-3 chanteurs au marais de Gannedel/Le Chapelle-de-Brain le 16 juin.

Finistère :

2-3 couples nicheurs à Quessant.

Morbihan :

1 chanteur à Kervillen/Le Trinité-sur-Mer les 30 mars et 12 avril ; 2 chanteurs à Kerdual/Le Trinité-sur-Mer le 30 mars ; 1 chanteur à Kerminehy/Erdeven le 1^{er} juin ; 1 chanteur à l'étang de la Forêt/Brandivy le 7 juin.

Loire-Atlantique :

2 chanteurs à l'Arsangle/Le Chevrolière le 30 avril ; 5 chanteurs au marais de Goulaine le 18 mai ; 2 individus au marais de Grée/Ancenis le 25 juin.

RALE DES GENETS (*Crex crex*) 3 données

1ère observation le 22 avril en Loire-Atlantique.

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) 39 données

Rien à signaler

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) 26 données

NIDIFICATION sur les sites suivants :

Châtillon-en-Vendelais (27 nids le 8 mai), Lillion/St-Jacques-de-la-Lande (35) ; Kerhélen/Irébeurden, probablement au Beffou/Loguivy-Plougras (1 couple le 20 avril) (22) ; Kerhuon, Lanniron/Quimper, Trévignon/Irégunc (6 familles) (28) ; le Hézo/Noyalo, Cranic/Brech (170 le 11 juillet dont 40-50 % juvéniles), St-Jean/Loceal-Mendon (56) ; Montrelais, l'étang de la Fourlière et l'étang de la Motte/Le-Chapelle-Glain, marais de Grée/Ancenis et Sion-les Mines (44).

HUITRIER-PIE (*Haematopus ostralegus*) 98 données

Les quelques mouvements d'avril font apparaître des populations encore importantes sur les sites d'hivernage :

En baie de Morlaix (29N) : 700 les 13 et 18 avril ; baie de Quiberon (56) : 135 et baie de Vilaine (56) : 275 le 15.

En mai et juin les effectifs diminuent :

Baie du Quiberon : 135 en mai ; baie de Vilaine : 245 en mai et 151 en juin ; Goulven (29N) : 100 le 5 mai ; Morlaix (22) : 500 le 5 mai ; baie de Morlaix (29N) : 150 le 7 juin ; Yffiniac (22) : 300 le 15 juin ; Ile Plate/Sept-îles (22) le 14 juin.

L'augmentation des effectifs " postnuptiaux " se produit en juillet en baie de Morlaix : 230 le 14.

NIDIFICATION

Ile-et-Vilaine :

Ile des Landes/Cencale : 2 couples.

Côtes-du-Nord :

La Colombière/St-Jacut-de-la-Mer : 1 nid ; Cap Fréhel : 2 couples ; Malben/Sept-Iles : 3 couples ; Rouzic/Sept-Iles : 5 couples.

Finistère-Nord :

Ilots de la baie de Morlaix : 21 couples ; Enez ar Prad/Batz : 1+ couple ; Trévoch/St-Pabu : 9+ couples ; Ar Youc'h/Quessant : 2 couples ; Lédenez/Quessant : 4 couples ; entre Ar Youc'h et Porz Arland/Quessant : 1 couple ; Youc'h Korz/Quessant : 1 couple ; Porz Coret/Quessant : 1 couple ; Benneq/Archipel de Molène : 3 couples ; Balenq/Archipel de Molène : 10 couples ; Trielen/Archipel de Molène : 20 couples ; ile de Trébéron/Roscanvel : 8 nicheurs.

Finistère-Sud :

Brillieg/Les Glénen : 2 couples.

Morbihan :

Rohellan : 1 couple ; Koh-Kastell/Belle-Ile : 2+ couples ; ilots de l'archipel d'Houat : 5 couples ; ilots des Poulains/Sauzon : 1 couple.

La population des Sept-Iles a beaucoup régressé depuis les recensements précédents, la cause semble en être la présence de rats.

EDHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) 14 données

Le premier individu est noté plus tôt que l'en passé à Falguérec/Séné (56), le 26 mars ; le premier accouplement a lieu le 1^{er} avril et le premier couple construit dès le 3 avril.

Une femelle est notée à l'étang de Poulguidou/Plouhinec (295) le 6 avril alors que le 1^{er} couple apparaît dans les marais de Guérande (44) le 11 avril. Les effectifs nicheurs sont d'une dizaine de couples minimum sur ce dernier site avec 6 nids occupés aux salines du Grand Bal.

Dans les marais de Séné 3 couples se sont reproduits à Falguérec et 2 Bindre.

TOTAL BRETAGNE : 15* couples (23-24 en 1984).

AVOCETTE ELEGANTE (*Recurvirostra avosetta*) 13 données

Marais de Guérande (44) : 5 le 11 avril ; golfe du Morbihan (56) : 48 au recensement de la mi-avril ; étang de Lambelle (22) : 3 individus de passage le 23 avril ; les Bougrières/St-Jacques-de-la-Lande (35) : 2 le 15 mai ; Sussinio/Serzeau (56) : 4 le 23 mai.

NIDIFICATION

Falguérec/Séné (56) : 28 individus, dont certains couvent, le 18 avril ; 42 individus présents le 22 avril, 10 couples se sont reproduits. Bindre/Séné : 2 + 2 poussins à l'envol en juin.

Sur l'ensemble des marais de Séné, la progression est de 13 à 14 couples par rapport à 1984 (10 en 84, 23-24 en 85).

Sissable/Guérande (44) : 1 couple noté le 25 mai ; saline du Grand Bal/Guérande : 17 nids sont occupés.

TOTAL BRETAGNE (partiel) : 41-42* couples (56 en 1984)

(Il est dommage que les données de Loire-Atlantique soient incomplètes, compte tenu de l'évolution positive constatée dans le Morbihan).

OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oedicanus*) 4 données

Les 20 et 23 avril, 2 puis 1 individu vu à Margatière/Le Pin (44) ; la reproduction est quasi certaine sur ce site d'après un agriculteur (les oeufs étant trouvés certaines années). Les 20 avril et 5 mai, 2 puis 1 au bois de Varades (44). 2 le 9 puis 1 le 11 mai à la Bigonnet/St-Herblon (44) ; le 11 mai, 1 à Bignon/St-Herblon.

Aucune nouvelle de la population morbihannaise.

PETIT GRAVELOTT (*Charadrius dubius*) 37 données

Les données reçues pour cette année 1985 concernant cette espèce sont trop fragmentaires pour que l'on puisse dégager les pics de passage des migrants ou estimer les effectifs des niches.

Ille-et-Vilaine :

Etang des Longchamps/Rennes : 3 le 30 mars.

Finistère :

Porz Corret/Quessant : 1 le 1^{er} avril ; Porz Noan/Quessant : 1 le 22 avril ; ZIP/Brest : 1 le 8 avril.

Morbihan :

Falguérec/Séné : 1 individu les 2 et 6 avril puis 2 le 3 mai ; Bindre/ , Séné : 2 le 18 avril.

Loire-Atlantique :

Merais de Couffron : 3 le 21 mars ; 10 le 1^{er} mai dans le marais du Petit Mars.

NIDIFICATION

Ille-et-Vilaine :

Le Boët/St-Erblon : 3 individus avec chant, poursuites et parades le 18 mai ; la Mine/St-Erblon : 2 individus-paradent les 6 et 16 juin ; Luzard/Pont-Péan : 2 le 5 juillet ; enceinte de la foire-exposition de Rennes - St-Jacques-de-la-Lande : 2 alarmant le 14 juillet.

Côtes-du-Nord :

Route de St-Brieuc/Plaintel : 5 individus (2 juvéniles et 3 adultes) le 8 juillet.

Finistère :

Kerjean/Plouigneau : 1 couple cantonné le 14 avril, ponte à 2 oeufs le 5 mai et à 4 oeufs le 8 mai, éclosion le 1^{er} juin de 4 pulli ; carrière du Moulin du Roz/Guipavas : 1 couple ; Pont Corff/Guilers : 1 couple avec jeunes ; ZIP/Brest : 3-5 couples.

Loire-Atlantique :

Forêt de Saffré : 1 couple au bord d'un petit étang asséché ; sur la Loire de Anetz à Varades : 11 couples le 4 mai ; sur la Loire à la Chapelle-Basse-Mer : 2-3 couples * le 28 mai.

GRAND GRAVELOT (*Chrodrifus hiaticula*) 111 données

Très peu de données en mars sur le passage pré-nuptial ; retenons quelques données intéressantes des recensements d'avril :

200-250 à Goulven (29N) le 4 ; baie de Quiberon (56) : 118 ; baie de Vilaine (56) : 84 ; Sissable/Marais de Guérande (44) : 100+ le 11 avril.

A signaler aussi : la Roche-Sèche/Erdeven (56) : 10 le 2 avril ; Séné (56) : 28 le 18 avril ; en mai : marais du Petit-Mars (44) : 20 le 1^{er}, 15 le 5 ; Traac'h er Goued/Houat (56) : 50 le 2 ; Goulven : 250 le 5 et encore 90 le 18 ; Penvis/Serzeau (56) : 100+ le 8 ; Sissable/Marais de Guérande : environ 50 le 16 ; le Dourduff/Plouézoch (29N) : 25 le 19 ; Felguérec/Séné (56) : 15 le 23 ; 1 donnée en juin ; 4 dans les marais salants de Guérande le 13.

NIDIFICATION

Côtes-du-Nord :

Sillon du Talbert/Ploubihan : 4 individus le 20 avril ; île Ziliac/Penvenen : 1 couple (aile cassée) le 24 juin ; sillon du Len/Louannec : recherches négatives le 22 juin ; île Canton/Pleumeur-Bodou : 1 couple le 18 juin ; île Losquet/Pleumeur-Bodou : 1 couple le 18 juin.

Finistère :

Poullier de Kernéléhen/Plougasnou : 5-6 couples ; Trodibon/Plouézoch : 1 couple ; Locquénoilé : 1 couple ; St-Julien/Taulé : 1 couple ; la Groue/St-Pol-de-Léon : 1 couple ; Porz er Requeven/Batz : 1 couple ; Quessant : 7 couples ; archipel de Molène : 5+ couples.

Aucune autre donnée de nidification ne nous est parvenue.

PONTE

Ponte à 4 oeufs le 18 avril à Banneg/Archipel de Molène ; 4 oeufs à St-Julien/Taulé le 30 avril ; 4 oeufs à Kernéléhen/Plougasnou le 18 mai ; 4 oeufs le 18 mai à Plouézoch.

POUSSIN

3 le 11 mai à Banneg/Archipel de Molène.

Voir l'article d'Ewen de Kergaricou page 107.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) 27 données

Quelques bandes en avril :

70-100 à Goulven (29N) le 4 ; 10 au Mousker/St-Philibert (56) le 9 ; 10+ à Sissable/Guérande (44) le 11 ; 20+ à Erdeven (56) le 14.

Aucune donnée sur l'installation des nicheurs et très peu de données de nidification mais des nouveaux sites sont signalés :

Côtes-du-Nord :

2 individus le 20 avril sur le sillon du Talbert/Plaubian.

Finistère-Nord :

La Groue/St-Fol-de-léon : 1 couple (3 oeufs) le 21 juin ; Porz Aveziz/Batz : 1 couple ; Trégueiller/Plouneour-Trez : 4 couples ; Kéridaouen/Plouguerneau : 2 couples ; Trevoch/St-Pabu : 2 couples.

Finistère-Sud :

Penfret/Glénan : * niche au Thonnier et deux autres couples au sud de l'île * ; Kerdalle/Trégunc : 1 couple (alarme).

Morbihan :

Dunes d'Erdeven : 3 individus (2 ♂ et 1 ♀) le 3 juin ; la Roche-Sèche/Erdeven : 3-4 couples ; Susciniac/Sarzeau : 1 couple ; Treach-er-Gouret/Houat : alarmes le 2 mai.

Loire-Atlantique :

Loire/Varades : 1 ♂ les 4 et 5 mai ; marais salants entre Batz-sur-Mer et Congor/Guérande : 19 couples.

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*) 24 données

8 données seulement concernent des observations * continentales *, les 16 autres ont été faites à Quessant (29N).

- Sur le continent : la Taillée/Lavau-sur-Loire (44) : 30 le 16 mars ; St-Etienne-de-Montluc (44) : 80 le 17 ; étang de Kergalen/Plovan (29S) : 170 le 17 ; Mauvesson (44) : 30 le 18 ; Sougeal (35) : 353 le 23 ; marais de Gannedel/Le Chapelle-de-Brain (35) : 1 individu en plumage nuptial le 30 ; Goulven (29N) : 1 le 4 avril ; marais du Petit Mars (44) : 6 le 1^{er} mai ; Irenval/Tréogat (29S) : 1 le 12 juillet - première donnée relative au passage postnuptial -.

- Sur Quessant : un premier petit passage est sensible jusqu'au 2 avril, un autre est ressenti du 21 avril au 22 mai. Un dernier individu alarme le 5 juin.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis aquatarola*) 41 données

Ille-et-Vilaine :

Etang de Châtillon-en-Vendelais : 1 le 8 mai.

Côtes-du-Nord :

Bout de Ville/Languèux : 10 le 8 avril ; Porz Gelen/Pleumeur-Bodou : 10 le 18 mai ; Ile Canton/Ile Grande : 2 en plumage nuptial le 25 mai.

Finistère :

Locquénolé : 1 en plumage nuptial le 11 mai ; estuaire de la Penzé : 90 à la mi-avril ; Ti Sazon/Platz : 4 le 13 juin ; Goulven : 300 le 4 avril, 50 les 16 et 17 avril, 100 le 5 mai, 10 le 16 mai et 2 le 18 mai ; Porz Doun/Quessant : 12 le 18 mars, 8 le 19 mars, 5 le 25 mars, 4 le 27 mars, 6 le 28 mars, 1 le 18 avril ; Porz Coret/Quessant : 4 le 18 mars, 1 le 29 mars, 5 le 1^{er} avril, 2 le 18 avril, 1 le 23 avril ; Kéjou/Quessant : 1 les 18 et 19 mars ; Yusin/Quessant : 1 le 25 mars ; phare du Créonh/Quessant : 2 le 15 avril ; Banneg/Archipel de Molène : 1 en plumage d'hiver les 3 et 17 mai ; Elorn maritime : 2 le 21 avril.

Morbihan :

Baie de Quiberon : 52 en avril et 18 en mai ; golfe du Morbihan : 95 en avril et 55 en mai ; Falguérec/Séné : 8 le 30 avril ; baie de Vilaine : 52 en avril et 140 en mai.

Loire-Atlantique :

Marais du Petit Mars : 8 le 30 avril.

Comme à l'habitude les hivernants disparaissent dans la 1^{re} quinzaine d'avril. En mai un passage est ressenti.

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) 51 données

Aucune donnée de grande concentration à la mi-mars ; de petits groupes sont observés à St-Thégonnec (29N) : 25 le 17 mars, à Plounérin (22) : 10 le 23 mars et dans le marais de Grée/Ancenis (44) : 300 le 23 mars, 5-10 le 1^{er} avril.

Par contre des données postnuptiales sont intéressantes : 27 dans les landes de Phanton (22) le 30 juin ; 180 à Goulven (29N) le 7 juillet ; 7 W au Vergem/Scrignac (29N) le 10 juillet.

NIDIFICATION

Les couples sont construits dès le 18 mars au Vaugot/Cuissery (29N) et la première ponte y est signalée le 1^{er} avril (3 oeufs). Des ébauches de nids sont trouvées le 21 avril aux étangs de Trévignon/Tréguen (29S). Le 1^{er} poussin est signalé le 1^{er} mai à Falguérec/Séné (56).

Ille-et-Vilaine :

Les seules données concernent Sougeal et l'étang de Châtillon-en-Vendelais où le 8 mai, 11 adultes alarmant alors que 2 plumées semblent imputables au faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) ; 5 adultes sont vus le 25 mai et environ 30 le 22 juin - pas d'autres " indices de nidification ". A Sougeal (90+ individus le 26 avril) la reproduction semble avoir échoué en grande partie (pas de pull observé).

Côtes-du-Nord :

Moulin Neuf/Plounérin : 1 individu vu les 10 et 20 avril mais aucun indice de reproduction sur ce site traditionnel ; Kerdroukhanvet (Prat ar Hell/Lescouët-Gouarec : 0 le 26 avril (5 couples en 1984).

Finistère :

Le Vougot/Guisseny : 3 couples ; Langazel/Tréneaguezon : 4 peradent le 24 mars mais l'espèce est absente des sites de nidification des années passées ; Trévignon/Trégunc : 3-4 couples.

Morbihan :

Kerminihy/Erdeven : 7-8 couples ; Keravel/Erdeven : 2-3 couples ; Moustoir-lan/Malguénac : 4-5 couples et 3 juvéniles le 26 mai ; Bodelann/Sauzon : 8 couples ; Kervellan/Sauzon : 3 couples ; Falguérec/Séné : 5-6 couples ; marais de Séné : 9 couples.

Loire-Atlantique :

Un nouveau site de nidification aux Chateliers/Belligné.

Les populations de Vanneau du nord-ouest de la Bretagne ont souffert des rigueurs climatiques de l'hiver précédent. Peut-être en est-il de même ailleurs mais les maigres données transmises sont insuffisantes pour conclure.

DECASSEAU MAUBECHE (*Coliadris cornuta*) 22 données

Finistère :

Locquémele : 2 en plumage nuptial le 11 mai ; le Dourduff/Piquézech : 15 le 18 mai et 15 le lendemain ; Penzé : 8 le 30 avril, 5P quittant le site le soir en direction du N le 8 mai ; Goulven : 3 le 4 avril, 3 les 16 et 17 avril, 2 le 5 mai, 10 le 16 mai ; Sein : 1 le 25 mars ; anse du Poul-don/Combrit : 2 le 10 mai.

Morbihan :

Falguérec/Séné : 1 le 4 juin ; baie de Quiberon : 41 en mai ; golfe du Morbihan : 42 en mai ; baie de Vilaine : 235 en mai et 5 en juin.

Loire-Atlantique :

Sissable/Maraie de Guérande : plusieurs individus le 11 avril, même chose le 19 mai.

Deux données intérieures : 5 le 5 mai à Varades et 3 le 12 au Grand Pré de Varades.

Le passage de mai est particulièrement bien ressenti.

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) 22 données

Finistère :

Goulven : 150-200 le 4 avril, 1 le 5 mai ; Korz/Duessant : 1 le 9 mai ; Porz Doun/Duessant : 4 le 23 mai et 9 le 25 mai ; Banneg/Archipel de Molène : 5 le 16 mai ; Trielen/Archipel de Molène : 5 le 26 mai ; plage de Tréguennec : 55 le 16 avril.

Morbihan :

La Roche-Sèche/Erdeven : 40 le 14 avril ; baie de Quiberon : 110 en avril et 930 en mai ; Penvins/Serzeau : 8 le 19 avril et 50 le 23 mai ; baie de Villedieu : 480 en mai ; plage de Bronzais/Pénestin : 23 le 16 mai.

Loire-Atlantique :

Plage de Pen Bron/La Turbelle : 15 le 16 mai, 57 le 1^{er} juin ; marais salants de Guérande : 36 le 17 mars ; Sissable/Guérande : 11 le 11 avril ; plage de Pornichet : 7 le 18 mai.

Le passage pré-nuptial atteint son maximum en mai, surtout durant la deuxième quinzaine.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) 3 données

Faiguërec/Séné (56) : 3 le 3 mai et 1 le 16 mai ; pointe du Croisic (44) : 5 le 19 mai.

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) 4 données

Faiguërec/Séné (56) : 1 du 29 avril au 1^{er} mai ; Saillat/Guérande (44) : 2 le 21 juin.

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*) 40 données

L'espèce a essentiellement été notée dans l'archipel Quessant-Molène : quatre observations proviennent du sud-Bretagne.

Finistère :

Porz Dour/Quessant : 8 le 18 mars, 4 le 19, 5 le 25, 26 le 27, 15 le 29, 14 le 31, 12 le 3 avril, 15 le 14, 7 le 18, 8 le 22, 6 le 23, 10 le 24, 3 le 2 mai, 15 le 6, 12 le 7, 6-7 le 9, 17 le 10, 18 le 21, 13 le 23, 7 le 25, 1 le 29 et 1 le 30 mai (dernière donnée de la période) ; Pern/Quessant : 1 le 27 mars ; Créach/Quessant : 4 le 31 mars, 3 le 1^{er} avril, 1 le 17 avril ; Kadoran/Quessant : 5 le 3 avril ; Porz Arland/Quessant : 5 le 7 mai ; Banneg/Archipel de Molène : 2-8 le 10 avril, 10 les 11 et 12 mai, 6-7 le 17 mai, 4 le 26 mai ; Balaneg/Archipel de Molène : 3 le 27 avril ; Molène : 4-10 le 11 mai ; Trielen/Archipel de Molène : 5-10 le 12 mai ; Flémiau/Port de Douarnenez : 6 le 12 avril ; Sein : 2 le 25 mars.

Morbihan :

La Roche-Sèche/Erdeven : 5-10 le 2 avril et 3 le 14 avril.

Loire-Atlantique :

Pointe du Croisic : 1 le 12 mai.

A Quessant (29N) les hivernants s'en vont début-avril. Un passage est sensible en mai.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) 80 données

Ille-et-Vilaine :

Etang des Longchamps/Rennes : 1 le 23 mars.

Côtes-du-Nord :

Ils Grands/Pleumeur-Bodou : 30 le 18 mai.

Finistère-Nord :

Locquénoalé : 9 le 23 mai, 4-5 le 9 juillet, 30 le 14 juillet ; baie de Morlaix : 3 le 13 avril, 9 le 24 avril, 300 le 11 mai, 200 les 18 et 19 mai ; estuaire de la Penzé : 350 à la mi-avril ; Porz ar Bacuenn/Batz : 3-4 régulièrement vus début-juin ; Grèves Blanches/Batz : 51 le 4 juin ; Goulven : 300-350 le 5 mai, 200 le 18 mai, 3 le 13 juin et 100 le 7 juillet ; Fort Côté/Landéda : 17 le 14 avril ; Quessant : 4 le 20 avril, 6 le 21, 6 le 22, 14 le 23, 9 le 24, 3 le 25 avril, 2 le 2 mai, 1 le 6, 1 le 21, 2 le 23, 5 le 25, 1 le 29, 1 le 30, 5 le 31 mai, 1 les 5 et 11 juin ; Banneg/Archipel de Molène : 4 le 17 mai, 3 le 26 mai ; Molène : 10 le 12 avril ; ZIP/Brest : 20

les 18 et 19 avril, 50+ le 16 mai ; Elorn maritime : 2 en plumage nuptial
le 21 avril ; étang de St-Adrien/Plougastel : 18 le 24 mars.

Finistère-Sud :

Nérizélec/Plovan : 51 le 19 mai, 15 le 8 juillet, 15 le 12 juillet.

Morbihan :

Bele de Quiberon : 160 en avril, 190 en mai ; golfe du Morbihan : 190 en
avril, 180 en mai ; Pierres-Plates/Loomariaquer : 150 le 17 mars ;
Falguérec/Séné : 224 le 21 mars, 34 le 23 mars, 8 le 4 avril, 100 le 10 a-
vril, 10 le 18 avril, 70 le 21 avril, 50 le 25 avril, 60 le 1^{er} mai, 100
le 3 mai, environ 350 le 5 mai, 13 le 16 mai, 40 le 18 mai ; bain de Vi-
laine : 520 en avril, 2080 en mai et 3 en juin.

Loire-Atlantique :

Marais de St-Molf : 150-200 le 2 mai ; Sissable/Guérande : 147 le 4 mai
150 le 16 ; Saillie/Guérande : 40 le 26 mai.

Le passage culmine aux alentours des 5-10 mai alors que les retours débun-
tent le 7 juillet.

COMBATANT (*Philomachus pugnax*) 33 données

Ille-et-Vilaine :

Marais de Gannedel/Le Chapelle-de-Brain : des ♂ et des ♀ le 1^{er} mai.

Côtes-du-Nord :

Etang de Lamballe : 1 ♀ le 23 avril.

Finistère :

Penzance/Carantec : 1 le 20 avril ; Grèves Blanches/Batz : 2 le 4 juin ;
Goulven : 1 le 4 avril, 28 le 16 avril ; Stang Pour/Duessant : 1 les
2 et 4 avril ; Stang Leandroun/Duessant : 5 ♂ et 4 ♀ en vol le 18 avril ;
Kun/Duessant : 1 le 20 avril ; ZIP/Brest : 5 le 19 avril ; Nérizélec/
Plovan : 1 le 8 juillet.

Morbihan :

Dunes d'Erdeven : 4 le 3 juin ; Falguérec/Séné : 2 le 28 mars, 12 le 3 a-
vril, 11 le 4 avril, 52 le 17 avril, 50+ le 18 avril, 25 le 25 avril, 37
le 27 avril, 15 le 1^{er} mai ; Bindre/Séné : 17 le 12 avril, 12 le 15 avril,
40 le 26 avril, 3 le 10 mai.

Loire-Atlantique :

Maraîs salants de Guérande : 1 q le 19 mai ; marais de Coultron : 10 le 17 mars ; marais de Grée/Ancenis : 25 le 19 mars, 51 le 22 avril, 153 le 26 avril, 30 le 28 avril ; marais du Petit Mars : 10 le 1^{er} mai ; marais de Grée/Ancenis : 14 le 4 mai.

Le passage est, comme l'an passé, concentré sur la deuxième quinzaine d'avril. Il ne semble pas y avoir eu d'estivage cette année dans le sud de la région.

BECASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*) 1 donnée

Congor/Maraîs salants de Guérande (44) : 5 le 16 mars.

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) 73 données

Beaucoup plus de données que l'an passé (19) mais la moitié des contacts sont en provenance de Quessant (29N). Le passage est fort fin-mars et durant la 1^{ère} décade d'avril. Il diminue rapidement ensuite.

Maraîs de Grée/Ancenis (44) : 56 le 23 mars ; étang des Longchamps/Rennes (35) : 6 le 24 mars ; Ménéhan/Kerlouan (29N) : 30 le 4 avril ; Falguérec /Séné (56) : 10 le 4 avril et 6 le lendemain ; Grand Prés de Varades (44) : 56 le 5 avril ; Botsorhel (29N) : 15 le 10 avril ; Banneg/Archipel de Molène (29N) : 2 le 10 avril et 2 le lendemain ; Bindre/Séné (56) : 6 le 12 avril ; Kerminihy/Erdevan (56) : 1 le 14 avril ; Saffré (44) : 12 le 19 avril.

A Quessant en mars : 1 le 16, 2 le 19, 10 le 20, 5 le 22, 13-14 le 25, 17 le 26, 21 le 27, 1 le 28, 1 le 29 ; en avril : 1 le 2, 3 le 3, 8 le 5, 1 N le 6, 12 le 6, 3 le 9, 4 le 16, 3-4 le 25.

NIDIFICATION

Ille-et-Vilaine :

Étang de Châtillon-en-Vendelais : 3 le 6 mai, 2 le 22 juin.

Côtes-du-Nord :

Kerdroukhaenyet Lescoult-Gouerec : 10 individus + chevrottements le 8 avril, 1 o^u chanteur le 27 avril, 1 le 28 avril ; Classeven/Dionel : 1 couple (chant au sol le 27 avril) ; Montorien/Plouguenast : 2 le 14 mai.

Finistère-Nord :

Quilloguès/Plounéour-Ménez : 1 le 8 avril ; le Vougot/Quisseny : chevrote-
ments le 17 avril ; zone artisanale du Launay/St-Martin-des-Champs : 1 cou-
ple alarme le 1^{er} mai ; Maner el Lann/Guiclan : 1 parade le 3 mai et 1 alar-
me le 10 juin ; Moulin du Roy/Berrien : 1 alarme le 30 mai ; Langazel/
Trénaouézan : 1 couple.

— — — — —
Morbihan :

Bindra/Séné : chevrotements le 16 avril.

La découverte d'un couple de Bécassine dans une minuscule prairie humide
enclavée dans une zone industrielle montre à l'évidence que cette espèce dis-
crète doit être recherchée à peu près partout du moment que l'eau ne fait
pas défaut et que le couvert végétal soit suffisant.

Les données de cette année confirment la prédominance du quart nord-ouest de
la région pour cette espèce.

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) 3 données

1-2 en forêt de Vioreau (44) jusqu'au 27 mars ; Langazel/Trénaouézan (29N) :
1 à Pâques ; Plounévez-Quintin (22) : 1 le 26 mai.

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) 29 données

Le passage s'effectue jusqu'au 3 juin avec un premier pic d'abondance du-
rant la deuxième décade de mars.

Marais de Grée/Ancenis (44) : 12 le 16 mars, 240 le 18, 11 le 22 avril ; ma-
rais du Petit Mars (44) : 42 le 16 mars ; Lavau (44) : 45 le 16 mars ; Rohars
/Bouée (44) : 25 le 16 mars ; Falguérec/Séné (56) : 1 le 19 mars, 5 le 26, 8
le 29, 36 le 30, 18 le 4 avril, 14 le 5, 11 le 21, 2 le 18 mai ; baie de
Moriaix (29N) : 11 le 23 mars, 10 le 29, 1 le 13 avril ; Sougeal (35) : 582
le 27 mars, 3 le 8 mai, 9 le 6 juin, 3+ le 16 ; Goulven (29N) : 1 le 5 avril ;
Bindra/Séné (56) : 15 le 15 avril ; marais de Couëron (44) : 60 le 16 avril ;
Balaneg/Archipel de Molène (29N) : 1 le 27 avril ; Kernélehen/Plouézoch (29N) :
2 le 1^{er} mai ; Xerdual/La Trinité-sur-Mer (56) : 4 le 4 mai ; salines de Pont
d'Ames/Assérac (44) : 9 le 3 juin.

Aucune donnée de nidification certaine sur les sites des années précédentes
mais quelques observations sont faites en juillet d'oiseaux reproducteurs lo-
caux ou déjà en migration postnuptiale : baie de Morlaix (29N) : 1 en plumage
nuptial les 6 et 11 juillet ; étang de Nérizéloc/Plovan (29S) : 3 le 8 et 6
le 12 juillet ; Falguérec/Séné : 4 le 7 et 8 le 9 juillet.

BARGE ROUSSE (*Larus lapponicus*) 52 données

Pratiquement toutes les observations sont faites durant avril et mai. Seules 2 données de juin se singularisent. Quelques rassemblements importants sont notés à Goulven (29N), à Trébeuntec/Plonévez-Porzay (29S), et à Sissable/Guérande (44). L'essentiel du flot s'écoule de la mi-avril à la mi-mai.

Côtes-du-Nord :

Fontevren/Hillion : 10 le 24 avril.

Finistère-Nord :

Baie de Morlaix : 9 N le 21 avril, 9 le 11 mai, 1 le 19 mai, 3 le 23 mai ; estuaire de la Penzé : 25 à la mi-avril, 30 le 28 mai ; Goulven : 100 le 4 avril, 150 le 17 avril, 150 le 5 mai, 120-130 le 16 mai et 15 le 18 mai ; Aber-Benoit : 1 le 21 avril ; Quessent : 2 les 20 et 21 avril, 24 le 22, 5 le 23, 3 le 24, 4 le 25, 1 en plumage d'hiver à Porz Douc les 30 et 31 mai ; Banneg/Archipel de Molène : 1 les 2 et 3 mai ; Trielen/Archipel de Molène : 5 le 25 et 15 le 26 mai ; ZIP/Brest : 1 en plumage nuptial le 19 avril.

Finistère-Sud :

Trenvel/Tréogat : 20 N le 27 avril, 1 le 8 juin ; pointe de Trébeuntec/Plonévez-Porzay : 122 en vol migratoire se posant au bord de l'eau le 27 avril ; anse du Pouldon/Combrit : 16 le 10 mai.

Morbihan :

Baie de Quiberon : 4 en avril et 65 en mai ; golfe du Morbihan : 47 en mai ; Palguérec/Séné : 1 les 22 et 28 avril, 2 les 28 avril et 5 mai, 3 le 7 mai, 1 le 12 mai ; Suscinio/Sarzeau : 12 le 23 mai ; baie de Vilaine : 5 en avril, 117 en mai et 18 en juin.

Loire-Atlantique :

Sissable/Marais salants de Guérande : plus de 100 en plumage nuptial le 11 avril ; St-Goustan/Le Croisic : 24 le 28 avril ; pointe du Croisic : 1 N/30m le 12 mai.

COURLIS SP. (*Numenius* sp.) 6 données

Banneg/Archipel de Molène (29N) : 2 le 10 avril, +4 le 27 avril, 1 le 15 mai, 4 le 26 mai et 7 le 3 juillet ; Salaneg/Archipel de Molène : 4 le 26 avril ; le Conquet (29N) : 1 le 13 avril ; île de Trébérion/Roscanvel (29N) : 4 le 10 mai.

COURLIS CORLIEU (*Merula phaeopus*) 137 données

92 des 138 données proviennent de Quessant où les observations sont réparties du 18 mars à la fin-juin.

Côtes-du-Nord :

Fonteven/Hillion : 13 le 16 avril ; Porz Bugale/Plougrescant : 10 le 4 mai ; les Brienteis/Lancieux : 3 le 6 juillet.

Finistère-Nord :

Pen ar Vely/Guiclan : 10 le 25 avril ; Locquénolé : 2 le 24 avril, 1-2 le 11 mai ; Kernéléhen/Plouézoch : 45 le 1^{er} mai ; baie de Morlaix : 2 le 13 avril, 30-40 le 19 avril, 5-10 les 13 et 14 juillet ; Penzé : 1 le 30 avril ; Grèves Blanches/Batz : 18 le 4 juin ; Langazel/Trénaouezan : 3-4 le 24 mars ; Curnic/Guisseny : 15 le 21 avril ; Aber Wrach : 2-3 le 21 avril ; Aber Benoît : 2 le 21 avril ; Banneg/Archipel de Molène : 1 le 18 mai, 3 le 26 mai, 2 le 1^{er} juin, 1 le 9 juin, 1 le 15 juin ; Trilien/Archipel de Molène : espèce notée le 11 mai, 100+ le 29 juin, Quessant : les gros passages se font dans la troisième décade d'avril : 82 le 23, 88 le 24, 54 le 25, 22 le 27, 15 le 2 mai, 1 du 5 au 25 juin ; le Conquet : 5 le 13 avril ; Plouzané : 1 le 13 avril ; goulet /Rade de Drest : 23 entrent en rade le 17 avril ; ZIP/Brast : 0 le 18 avril ; Elorn maritime : 6 le 21 avril.

Finistère-Sud :

Kérisit/Coulien : 20 le 25 avril ; pointe de Feunteun Aod/Plogoff : 9 le 21 avril ; Kerdrennu/Mahalon : 17 N le 22 avril ; Trenvel/Tréogat : 200 N le 27 avril ; anse du Pouldon/Combrit : 5-10 le 10 mai.

Morbihan :

Kerouriec/Erdeven : 4 le 14 avril ; baie de Quiberon : 4 en avril, 22 en mai ; golfe du Morbihan : 125 en avril, 90 en mai ; Séné : 15 dans un champ le 30 mai, plus de 15 certains jours de juillet ; Falguérec/Séné : 1 le 18 mars ; Pierres Plates/Loarmorlaquer : 10 le 1^{er} mai ; le Duer/Serzeau : 5 le 13 avril ; Fervins/Serzeau : 5 le 19 avril ; île d'Houët : 4 le 2 mai ; baie de Vilaine : 75 en avril, 35 en mai, 6 en juin.

Loire-Atlantique :

Herbignac : 25 le 28 avril ; Assérac : 25 le 28 mai ; marais de Guérande : 10+ le 11 avril ; l'Angle/St-Etienne-de-Montluc : 85 le 17 mars ; marais de Couëron : environ 45 le 5 mai ; baie de Bourgneuf : passage le 30 mars.

L'essentiel du passage se situe dans la deuxième quinzaine d'avril et se poursuit faiblement en mai. Quelques individus estivent sur les îles du Ponant (Quessant, Banneg) alors que les retours sont évidents dès le 29 juin (100+ à Trilien).

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) 103 données

Cette année, aucun passage important n'est noté : les effectifs les plus importants sont vus aux Pierres Plates/Locmariaquer (56) : 30 le 17 mars ; dans l'anse d'Yffiniac (22) : 300 le 8 avril ; à Lanveur/Plouvien (29N) : 70 le 27 avril ; dans l'anse du Pouldou/Combrit (29S) : 30 le 10 mai ; à Trielen/Archipel de Molène (28N) : 22 le 25 mai.

A retenir également à la pointe de Tréfeuntec/Plonévez-Porzay (28S) : 16 le 23 mars ; baie de Morlaix (29N) : 15 le 13 avril ; rivière de Douglas (29N) : 6 le 13 avril ; Locquénolé (29N) : 7 le 24 avril ; Golfe du Morbihan (56) : 54 en avril, 8 en mai ; baie de Vilaine (56) : 15 en avril, 4 en mai ; Kernéléhen/Plouézoch (29N) : 4 le 1^{er} mai ; Locquénolé (29N) : 10 le 11 mai.

Les retours s'effectuent dès la fin-mai : Banneg/Archipel de Molène : 2 le 26 ; Quessant (29N) : 1 le 29, 1-3 quotidiennement en juin..., Goulven (29N) : 4-5 le 7 juillet ; St-Efflam/Pléstin-les-Grèves (22) : 15 le 8 juillet ; Locquénolé : 4 le 9 juillet ; baie de Morlaix (29N) : 75-80 le 14 juillet.

NIDIFICATION

Côtes-du-Nord :

Landes de Lanfains : 1 couple le 24 mars avec 4 oeufs le 8 mai ; Kerdroukhanvet/Lescouët-Gouarec : 2 couples avec chant et alarme les 27 et 28 avril ; Clesseven/Glomeil : espèce notée mais sans preuve de reproduction ; landes du Méné : 1 nid avec 4 oeufs à Plémy le 7 juin.

Finistère :

Roche St-Barabé/Le Cloître St-Thégonnec : 1 chanteur et 1 individu le 28 avril, 2 couples et 1 albinos le 19 mai ; Cragou/Plougonven : 2 chanteurs le 8 mai, 3 couples dont 1 avec 1 pullus le 19 mai, 1 alarme le 2 juillet ; Vergem/Scrignec : 2 couples et une ponte (2 oeufs) le 11 mai, alarmes le 25 mai ; Langazet/Ploudaniel : 1 couple (3 oeufs) ; Roc Trévél/Comana : 1 couple (manoeuvres de diversion) le 30 mai ; Castel Ruphel/St-Goazec : 1 couple cantonné (parade en avril et contact le 31 mai).

Les observations de cette année dans ces deux départements ne permettent pas de se faire une idée des effectifs nicheurs.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) 24 donnéesIlle-et-Vilaine :

Sougeal : 2 le 18 avril

Finistère-Nord :

Goulven : 6 le 5 avril ; étang de Goulven : 12 le 17 ; baie de Goulven : 8 en plumage nuptial le 20.

Morbihan :

St-Jean/Lochal-Mendon : 16 le 11 juillet ; Petit-Falgu  rec/S  n   : 5 le 21 juin ;

   la r  serve de Falgu  rec/S  n   :

MOIS	MARS		AVRIL							MAI	JUIN	JUL
Jour	19	26	2	4	6	12	18	21	26	7	22	7
Effectif	4	16	15	14	11	7	70	20	35	56	9	17

Loire-Atlantique :

Merais de Gu  randa - salines de la Turballe : 80 le 27 avril ; merais du Petit-Mars : 15 le 31 avril, 5 le 1   mai ; merais de Gr  e/Ancenis : 9 le 1   mai ; Congor/Gu  randa : 4 le 21 juin.

Le suivi du stationnement de l'esp  ce dans les merais de S  n   permet de d  gager un pic lors de la troisi  me d  cade d'avril et de la premi  re d  cade de mai. Les retours interviennent d  s le 21 juin.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) 57 donn  es

Le passage pr  nuptial est mieux suivi que l'en pass   : Sougeal : 2 le 17 mars, 8+ le 18 avril ; Pierres Plates/Locmariaquer (56) : 17 le 17 mars ; Porz Doun/Quessant (29N) : 13 le 16 mars ; merais de Gr  e/Ancenis (44) : 30 les 21 et 23 mars ;   tang de St-Adrien/Plougastel-Daoulas (29N) : 4 le 24 mars ; anse d'Yffiniac (22) : 150 le 8 avril ; baie de Morlaix (29N) : 4 le 13 avril ; Fort C  zon/Land  da (29N) : 7 le 14 avril ; merais de Cou  ron (44) : 10 le 16 avril ; Quessant (29N) : quelques ois  aux en migration nocturne au Cr  ch le 16 avril, 1 au Kun le 17 avril puis plus aucune observation jusqu'au 17 juin ; ZIP/Brest (29N) : 15 les 18 et 19 avril ; Elorn maritime (29N) : 20 le 21 avril ; estuaire de la Penz   (29N) : 4 le 21 avril ; merais de Gr  e/Ancenis (44) : 51 le 26 et 50 le 27 avril ;   tang de N  r  z  lec/Ploven (29S) : 5 le 27 avril ; merais du Petit Mars (44) : 85 le 30 avril, 30 le 1   mai ; baie de Vilaine : 18 en avril, 1 en mai ; golfe du Morbihan (56) : 2 en mai ;   tang de Ch  tillon-en-Vend  lais (35) : 5 le 8 mai ; estuaire de la Penz   (29N) : 1 le 1   juin.

Les premiers retours sont not  s    la mi-juin    Quessant : 1    Porz Doun du 17 au 24 ; en baie de Morlaix : 10 le 21 juin, 71 le 9 juillet et 10 le 14 juillet ; au Guillec/Plougoulm (29N) : 1 le 26 juin ;    Goulven (29N) : 12 le 7 juillet ;    St-Efflam/Plestin-les-Gr  ves (22) : 1 le 8 juillet et au merais de Kerdual/La Trinit  -sur-Mer (56) : 1 le 15 juillet.

MIOIFICATION

Morbihan :

Marais de Séné (hors Falguérec) : 14 couples environ ; Falguérec/Séné : 8-10 couples, un accouplement y est noté dès le 18 avril.

Loire-Atlantique :

Salines de Pont d'Armes/Assérec : 5-6 couples élaement et paradent.

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) 25 données

Passages préuptiaux (observations faites jusqu'au 3 mai) :

Ille-et-Vilaine :

Sougeal : 5 le 18 avril ; marais de Gannedel/La Chapelle-de-Brain : 1 le 29.

Finistère :

Bois de Morlaix : 1 le 13 avril ; Goulven : 20 le 5 avril ; Kun/Quessant : 2 le 18 avril puis 1 du 19 au 23 avril ; Elorn maritime : 2 le 21 avril ; étang de Nérizélec/Ploven : 1 le 16 avril.

Morbihan :

Falguérec/Séné : 7 le 30 avril ; Bindre/Séné : 2 le 12 avril, 15 le 17 avril, 15 le 3 mai.

Loire-Atlantique :

Marais salants de Guérande : 1 le 11 avril, 20 le 21 avril, 30 le 27 avril ; marais de Grée/Ancenis : 43 le 26 avril, 25 le 27 ; Malsaine/St-Lumine-de-Coutais : 29 le 28 avril ; marais du Petit Mars : 38 le 30 avril.

Passages postuptiaux : Kergoff/Quessant : 1 en vol le 5 juin ; sillon du Len/Louannec (22) : 1 le 22 juin ; Falguérec/Séné : 2 le 8 juillet.

Pour cette espèce la remontée est concentrée sur la deuxième quinzaine d'avril.

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) 19 données

Côtes-du-Nord :

Ponts Neufs/Hillion : 1 le 1^{er} avril ; Bosméléac/Allineuc : 1 le 8 mai ; station d'épuration de Plestin : 2 le 8 juillet.

Finistère :

Keranroux/Morlaix : 1 le 28 mars ; réservoir amont/Duessant : 3 le 17 avril ; Kejou/Duessant : 1 le 25 avril ; aérodrome/Duessant : 1 le 25 avril ; Moulin de Callac/Pionécour-Lanvern : 1 le 27 avril ; Poulguidou/Pont-Croix : 2 le 12 juillet.

Morbihan :

Kerzo/Brech : 1 le 1^{er} avril ; Faiguërec/Séné : 1 le 10 avril, 2 le 27 juin, 4 le 9 juillet ; Bindre/Séné : 2 le 18 avril, 1 le 25 avril, 1 le 18 juin, 3 le 29 juin ; Kervillen/Le Trinité-sur-Mer : 1 le 5 mai ; la Roche-Sèche/Erdeven : 1 le 1^{er} juin.

Entre le 8 mai et le 18 juin, 1 seule donnée du 1^{er} juin à Erdeven.

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) 2 données

Maraie du Petit-Mars (44) : 3 le 1^{er} mai ; Poulguidou/Pont-Croix (295) : 1 le 12 juillet.

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*) 61 données

Les derniers passages se font en fin de deuxième décade du mois de mai et les premiers retours vers le 6-8 juillet.

Ille-et-Vilaine :

Étang des Longchamps/Rennes : 1 le 3 avril ; plaine de Baud/Rennes : 2 le 26 avril ; étang de Châtillon-en-Vendelois : 1 le 8 mai et 4 le 25 mai ; étang des Roches/Chelun : 1 le 12 mai ; les Bougrières/St-Jacques-de-la-Lande : 2 le 14 mai, 1 le 15 mai, 2 le 21 mai et 1 le 31 mai.

Côtes-du-Nord :

Barrage du Gouet/Ploufragan : 5 le 21 avril ; étang de Guebriant : 3 le 12 mai ; le Quillo : 4 le 23 mai ; le Guelinec/St-Gildas : 1 le 25 juin ; étang de Prat : 1 le 8 juillet.

Finistère :

Le Conquet : 1 le 13 avril ; réservoirs/Duessant : 2 les 16 et 17 avril ; 3 le 18, 12 le 27 et 1 le 22 mai ; rivière de Pont l'Abbe : 2 le 17 avril ; autres sites d'Duessant : 1 les 18, 20, 21, 22 avril, 5 le 24 avril.

1 le 25 avril, 1 le 2 mai, 1 le 6 mai, 1 le 10 mai ; Elorn maritime : 7-8 le 21 avril ; Balaneg/Archipel de Molène : 4 le 27 avril ; Ile de Trébéron/Roscanvel : 1 le 29 avril ; Guic/Guerlesquin : 2 le 1^{er} mai, 3 le 3 mai et stationnement jusqu'au 10 mai ; Locquénolé : 10 le 6 juillet ; Nérizélec/Plovan : 1 le 12 juillet ; rivière de Morlaix : 1 le 13 juillet ; étang de Kervardez/Plovan : 3 le 14 juillet.

Morbihan :

Kerdual/La Trinité-sur-Mer : 1 le 4 mai ; Beaufort/Josselin : 2 le 15 juillet.

Loire-Atlantique :

Mers de Guérande : 4 le 27 avril, 1 le 19 mai ; sur la Loire de Nantes à Ste-Luce : 10-11 le 29 avril ; sur la Loire de Thouaré à la Chapelle-Basse-Mer : 6 le 2 mai ; Varades : 7 le 4 mai ; la Chapelle-Basse-Mer : 5-6 le 13 juin.

Le passage, bien marqué fin-avril-début-mai se poursuit, jusqu'au 31 mai. Après une donnée de Loire-Atlantique datée du 13 juin et concernant peut-être des estivants, les retours débutent le 25 juin.

TOURNEPIERRE A COLLIER (*Arenaria interpres*) 105 données

Côtes-du-Nord :

Sillon du Talbert/Ploubihan : 30 le 20 avril ; sillon du Lan/Louannec : 10 le 21 juin.

Finistère :

Locquénolé : 60 le 24 avril, 115 le 11 mai ; estuaire de la Penzé : 480 à la mi-avril ; Primal/Plougasnou : 14 le 24 avril ; baie de Morlaix : 45 le 13 avril, 1 le 14 juillet ; le Dourduff/Plouézoch : 40 le 18 mai ; Lilia/Plouguerneau : 5 le 21 avril ; Fort Cézou/Landéda : 70 le 14 avril ; Banneg/Archipel de Molène : 16 le 11 avril, 5 le 27 avril, 30 le 12 mai, 10 le 17 mai, 10 le 26 mai, 5 le 4 juillet ; Balaneg/Archipel de Molène : 5 le 27 avril ; Molène : 50 le 12 avril ; Plougonvelin : 1 le 11 mai.

De très nombreuses observations sont faites à Quessant et entre autres sur les deux sites de Porz Doux et Porz Coret : 80 le 18 mars, 64 le 3 avril, 73 le 18 avril, 45 le 21 avril, 88 le 23 avril, 75 le 2 mai, 92 le 6 mai, 45 le 23 mai, 19 le 30 mai, 7 le 20 juin ; à signaler aussi à Porz Doux : 50 le 27 mars, 11 immatures le 23 juin ; à Porz Paol : 15 le 19 mars, 29 le 21 mars, 16 le 25 mars, 22 le 29 mars, 27 le 24 avril, 30 le 27 avril, 41 le 9 mai, 14 le 21 mai ; à Porz Noen : 20-25 le 22 avril, 20 le 6 mai.

Morbihan :

La Roche-Sèche/Erdeven : 25 le 2 avril ; baie de Quiberon : 110 en avril,

170 en mai ; Koh Kastell/Souzon : 8 le 3 avril ; Pierres Plates/Locmariaquer : 20 le 17 mars, 40 le 1^{er} mai ; le Mousker/St-Philibert : 5 le 9 avril ; Faiguërec/Séné : 4 le 1^{er} mai ; Penvins/Sarzeau : 80 le 19 avril, 200 le 4 mai ; baie de Vilaine : 55 en avril, 190 en mai.

Loire-Atlantique :

Sissable/Batz-sur-Mer : présent le 11 avril, 8 le 14 avril ; port de la Turballe : 30 le 13 avril ; côte du Croisic : 20 le 6 mai ; pointe du Croisic : 2 N/30m le 12 mai puis 2 S et 4 N/30m le 19.

Il est difficile de cerner le pic d'abondance du passage : il doit intervenir entre la mi-avril et la mi-mai. Les retours débutent fin-juin.

PHALAROPE A BEC LARGE (*Phalaropus fulicarius*) 3 données

Réserve MH. JULIEN/Goulien (29S) : 1 le 18 mars ; saline Plinet/Guérande (44) : 1 les 9 et 10 avril.

C'est la première fois que cette espèce est notée en avril, depuis le début des actualités ornithologiques bretonnes.

LABBE SP. (*Stereorarius* sp.) 4 données

St-Nazaire (44) : 1 le 12 mai ; ile de Batz (29N) : 2 en phase sombre 5 (immature parasiticus ou pomarinus) le 12 juin ; plage du Moulin-Blanc/Le Relocq-Kerhuon (29N) : 1 (immature parasiticus ou pomarinus) le 5 juillet ; pointe du Croisic (44) : 1 le 14 juillet.

LABBE POMARIN (*Stereorarius pomarinus*) 1 donnée

Roc'h Hir/Quessant (29N) : 1 individu W/1h le 7 mai.

LABBE PARASITE (*Stereorarius parasiticus*) 9 données

Porz Doun/Quessant (29N) : 1 NW le 4 avril ; Roc'h Hir/Quessant : 1 W le 2 mai ; espèce notée le même jour et le 4 mai en passage à Banneg/Archipel de Molène (29N) ; Penvins/Sarzeau (56) : 1 en phase sombre le 5 mai ; Port Haliguen/Quiberon (56) : 3 + 2 NW le 11 mai ; Lédenez Quémenez/Archipel de Molène : 1 N

le 11 mai ; Molène (29N) : 1 N le 11 et 1 N le 12 mai ; pointe du Croisic (44) : 1 N/30m le 12 mai.

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) 4 données

Entre Banneg/Archipel de Molène et le phare de la Jument/Duessant : 1 NW le 22 avril ; entre Belle-Ile, Hoëdic et Houat (56) : 3 le 5 avril ; pointe du Croisic (44) : 1 les 31 mars et 5 mai.

MOUETTE MÉLANOCEPHALE (*Larus melanocephalus*) 10 données

Pas d'observations cette année, tant à Douarnenez (29S) que le long du littoral.

Estuaire de la Penzé (29N) : 1 adulte le 27 mars ; plage du Ris/Douarnenez : 10 le 28 mars ; Koh Kastell/Sauzon (56) : 1 " deuxième été " 5 le 3 avril ; le Bronzais/Pénestin (56) : 5 (3 de 2ème été + 2 adultes) le 7 avril, 2 de 2ème été le 8 avril ; plage du Ris : 1 de 1ère année, 2 de 2ème année et un adulte le 8 avril ; étang des Roches/Chelun (35) : 1 subadulte le 14 avril, 1 adulte et 1 subadulte le 17 avril dans une colonie de mouettes rieuses *Larus ridibundus* mais pas de mélanocéphales le 18 avril.

Ensuite pas d'observations avant le 14 juillet : 1 subadulte parmi 150 mouettes rieuses à Kerdalle/Trégunc (29S).

Les observations de Chelun sont peut-être annonciatrices de l'installation de l'espèce dans notre région en tant que nicheuse.

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*) 32 données

Pas de grands rassemblements comme l'an passé mis à part ceux de Toulon/La Turballe (44) à la mi-mars et de Trenvel/Tréogat (29S) au début mai.

Retenons en mars : Congor/Guérande (44) : 40 le 16 ; Toulon/La Turballe : 150 le 16, 200-300 le 22 ; Lillion/St-Jacques-de-la-Lande (35) : 5 le 26 ; marais de Grée/Ancenis (44) : 4 le 30 et 1 le 31 ; Falguërec/Séné (56) : 6 le 31.

En avril : marais de Guérande (44) : 2 immatures et 1 adulte le 11 ; brèche de Trenvel/Tréogat : 18 dont 6 adultes le 16 ; marais de Goulaine (44) : 60-80 le 19 ; Perwins/Sarzeau (56) : 4 en plumage nuptial le 19 ; étangs de Trévignon/Trégunc (29S) : 4 le 21 ; Trenvel : 50 le 25 et 60 le 27 ; marais de Guérande : 6 adultes le 27.

En mai : Trenvel : 500 NE le 3 ; étang de Châtillon-en-Vendelais (35) : 1 adulte et 2 immatures le 8 mai ; marais de Guérande : 6 dont 2 adultes le 12 et 2 immatures le 19.

En juin : Trenvel : 8 le 8 ; Forz ar Reouenn/Batz (29N) : 1 subadulte le 11.

Pas d'observations en Nord-Bretagne en dehors de l'île de Batz ; notons aussi les deux observations inhabituelles faites en Ille-et-Vilaine à Châtillon-en-Vendelais et St-Jacques-de-la-Lande et en Loire-Atlantique à Haute-Goulaine.

MOUETTE DE SABINE (*Xema sabini*) 1 donnée

Comme l'an passé, cette espèce est observée à Quessant (29N) où 1 adulte se dirige vers le nord-ouest à Porz Doun le 21 juin.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) 41 données

Quelques données prénuptiales intéressantes dont des observations de grands rassemblements :

Le Moulin d'Apigné/Rennes (35) : 1000+ le 28 mars ; Bindre/Séné (58) : 1500 immatures le 7 avril lors d'une inondation exceptionnelle ; Aber Benoît (29N) : 200 le 14 avril ; étang des Roches/Chelun (35) : 100+ (dont 32 adultes) le 14 avril, environ 100 le 17 avril et 30 - dont 28 adultes paradedent - le 18 avril ; étang de Châtillon-en-Vendelais (35) : 300 adultes et immatures le 8 mai et 50 le 25 mai ; à Quessant (29N) des adultes sont observés jusqu'au 22 avril, avant que ne soient effectués des observations isolées : 1 adulte le 28 mai, 1 adulte + 5 immatures le 30 mai, 1 immature le 4 juin.

Les premiers retours sont signalés début-juin à Porz-ar-Raouenn/Batz (29N) : 6 (5 adultes et 1 immature) le 5 juin ; à Locquénolé (29N) : quelques dizaines d'adultes le 8 juin ; Gennedel/Le Chapelle-de-Brain (35) : 1 adulte le 16 juin ; étang de Châtillon-en-Vendelais : environ 50 dont un juvénile volant le 22 juin ; sur la Loire (44) : premiers juvéniles le 1^{er} juillet ; Bindre/Séné (58) : 1^{er} juvénile le 4 juillet ; en rivière du Féou (29N) : 35 le 9 juillet et sur les toits de Brest (29N) : 4 le 12 juillet.

Peu de données concernant la NIDIFICATION et la REPRODUCTION

Étang des Roches/Chelun (35) : 20 nids le 12 mai ; Lespoul/Pont-Croix (29S) : 1^{er} œuf le 2 juin, nid contenant 5 œufs qui seront couvés jusqu'au 15 juillet puis abandonnés.

GOELAND A BEC CERCLE (*Larus delawarensis*) 2 données

1 adulte le 28 mars sur la plage du Ris/Douarnenez (29S). Une suite d'observations d'un 1^{er} été du 13 juin au 15 juillet dans les marais de Batz-sur-Mer (44) et le grand traict du Croisic (44).

GOELAND CENDRE (*Larus canus*) 5 données

Marais salants de Guérande (44) et traicts du Croisic (44) : 350-400 le 29 mars ; marais de Grée/Ancenis (44) : 7 le 31 mars, 33 le 1^{er} avril ; Penzance/Cerantec (29N) : 1 le 27 avril ; marais de Batz (44) : présence de 2 adultes et 2 immatures du 13 juin au 5 juillet.

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) 29 données

Le passage est évident à la charnière de mars et d'avril :

Korz/Duessant (29N) : 77 adultes et 6 immatures (tous *intermedia* apparemment) le 19 mars ; les Bougrières/St-Jacques-de-la-Lande (35) : 4 le 22 mars ; étang de Kerhuon (29N) : 13 le 22 mars ; Puel/Duessant (29N) : 130 adultes le 25 mars ; Korz/Duessant : 39 adultes le 27 mars ; réservoirs/Duessant : 35 adultes le 27 mars, 30 adultes le 28, 24 adultes le 2 avril, 90-100 le 9 avril ; Plouneventer (29N) : 170 sur des labours le 31 mars ; St-Thonan (29N) : 15 sur des labours le 1^{er} avril ; carrière Moulin du Roz/Guipavas (29N) : 120 le 22 avril.... brèche de Trenvel/Tréogat (29S) : environ 450 presque tous adultes le 8 juillet.

NICIFICATION

L'Herpin/Cancal (35) : 4-5 couples ; île des Landes/Cancal (35) : 10 couples maximum ; île Bonno/Sept-Iles (22) : 30+ couples - totalité des Sept Iles ; Perros-Guirec (22) : 43+ couples ; île Losquet/Pleumeur-Bodou (22) : 5 couples ; îlots de la baie de Morlaix (29N) : 44 couples ; Enez ar Prad/Batz (29N) : 15 couples - en augmentation - ; Trevoch/St-Pabu (29N) : 3 couples ; Lédenez/Duessant (29N) : 14-16 nids ; Youc'h/Duessant : au moins 12 nids ; Ranneg/Archipel de Molène (29N) : 1486 couples ; Tas de Pois/Cameret (29S) : quelques couples sur Dahoué Vihan, Ben Chlaz, Bern Ed mais absent sur Ar Chelod et Ar Gwest ; Cap Sizun/Goulion (29S) : 13 couples ; Penfret/Glénan (29S) : 15-20 couples ; Giantek/Glénan : environ 30 couples ; réserve de Groix (56) : 30 couples ; Rohellan (56) : 42-45 couples ; Er Lannic (56) : 80 couples.

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) 40 données

NICIFICATION

île-et-Vilaine :

L'Herpin/Cancal : 10-15 couples.

Côtes-du-Nord :

Cathédrale de St-Brieuc : 2 nids, un avec 2 pulli et un avec 2 grisards les 4 et 8 juillet ; Sept-Iles : 2800 couples ; Ile Losquat/Pleumeur-Bodou : +75 couples.

Finistère-Nord :

Méloine/Plougasnou : 5 nids le 2 juin ; Kerreg en Ti/Plougasnou : 8-10 pulli le 2 juin ; pointe de Prizel/Plougasnou : 1 pullus le 2 juin ; pointe du Diben/Plougasnou : 2 nids + 5 pulli le 12 juillet ; Ile Louet/Carantec : plusieurs dizaines de couples ; baie de Morlaix : 1200 couples ; Trevoch/St-Pabu : 45 couples ; Quessant : +800 couples ; Banneg/Archipel de Molène : 771 couples ; rue Branda/Brest : 1 couple nicheur sur les toits ; rue V. Hugo/Brest : 2 juvéniles non-volants (20-25 jours) le 13 juillet ; roches de Camaret : +565 couples ; criée de Douarnenez : 9 nids (vides le 15 juillet) sur les toits et 5 (vides) sur les toits avoisinants ; toits du Guilvinec : 73 couples minimum, probablement 100 couples ; les Moutons/Glénan : 5 nids le 13 mai ; Penfret/Glénan : 100 couples ; Giantek/Glénan : environ 250 couples.

Morbihan :

Réserve de Groix : 350-400 couples ; Rohellan : 378-405 couples ; Er Lannic : 65 couples ; toits de la Citadelle/Le Palais : 1 couple.

Loire-Atlantique :

Maraix de Batz-sur-Mer : 2 couples avec 1 nid et 1 oeuf ; les Evens/La Baule : 63 nids ; banc de Bilho/St-Nazaire : plusieurs dizaines de couples.

GOELAND LEUCORHÉE (*Larus cachinnans/michaëllis*) 4 données

St-Marc/Bangor (56) : un adulte apparié à un goéland argenté ; Kerdual/La Trinité-sur-Mer (56) : 1 adulte le 25 mai ; Koh Kastell/Belle-Ile (56) : 1 de 4ème année cantonné le 27 mai ; marais de Kerdual/La Trinité-sur-Mer : 1 adulte le 15 juillet.

La reproduction prouvée à Grandlieu (44) récemment est à rechercher dans l'archipel d'Houat (56) et à Belle-Ile (56).

GOELAND A AILES BLANCHES (*Larus glaucopterus*) 1 donnée

Etang de la Poitevineière/Rioillé (44) : 1 " 1er hiver " le 17 mars.

GOELAND BOURGEMESTRE (*Larus hyperboreus*) 4 données

Molène (28N) : 1 " 4ème année " le 12 avril ; Korbillio/Erdeven (56) : 1 " 1er

hiver " le 14 ; Permach (295) : 1 adulte le 5 mai ; Cap Fréhel (22) : 1 en vol le 7 juin.

GOELAND MARIN (*Larus marinus*) 20 données

NIDIFICATION

Ille-et-Vilaine :

L'Herpin/Cancale : 2-3 couples ; ile des Landes/Cancale : 30-35 couples.

Côtes-du-Nord :

Cap Fréhel : 8 couples ; Verdelet/Pléneuf : 3 couples ; ile Houric : 25-30 couples ; totalité Sept-Iles : 35 couples ; ile Losquet/Pleumeur-Bodou : 3 couples ; Morvil/Pleumeur-Bodou : 2 couples.

Finistère :

Ilots de la baie de Morlaix : 80 couples ; ile Louet/Carentec : 1 couple ; Perz ar Raouenn/Batz : 1 couple ; Trevoch/St-Pabu : 1 couple ; Enez Cros/Lampaul-Ploudalmézeau : 1 couple ; Duessant : 250 couples ; Banneg/Archipel de Molène : 132 couples ; roches de Camaret : 48 couples ; Cap Sizun/Goulien : 17 couples ; Giantek/Glénan : environ 15 couples.

Morbihan :

Réserve de Croix : 2 couples ; Rohellän : 2 couples ; Koh Kastell/Belle-Ile : 2 couples.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) 56 données

Très nombreux passages relevés à Duessant (40 données) avec deux pics à mi-avril et début-mai. A retenir aussi à Koh Kastell/Belle-Ile (56) : 30 posés sur l'eau le 3 avril mais aucune dans la falaise ; port de la Turballe (44) : 4 le 8 avril, 2 immatures le 13 avril et 3 adultes le 12 mai ; Kermorvan/Le Conquet (29N) : environ 50 dont 40 posées le 24 mai et 10 le 1^{er} juin ; pointe du Croisic (44) : 2 adultes le 9 juin.

NIDIFICATION

Cap Fréhel (22): 238-248 couples ; Sept-Iles (22) : 29+ couples ; Benn Ch'laz/Tas-de-Pois - Camaret (295) : 8 couples ; Ar Guest/Toulinguet - Camaret :

12 couples : Cap Sizun/Goulien (29S) : 951 couples : pointe du Raz (29S) : 101 couples : réserve de Groix (56) : 18 nids + 6 sites et 25 nids extérieurs
- à la réserve : Koh Kastell/Belle-Ile (56) : 88-130 couples.

La population bretonne est estimée à 1600 couples (A. THOMAS - Annuaire des réserves bretonnes et normandes - SEPMB-GON - 1985). Les 2 colonies principales recensées, le Cap Sizun et Belle-Ile, sont en décroissance.

MOUETTE ATRICILLE (*Larus atricilla*) 1 donnée

Toulan/La Turballe et Roffiat/Batz-sur-Mer (44) : 1 oiseau de 1er hiver du 16 au 31 mars.

Cette observation est au moins la 5ème donnée française depuis 1900 (Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France par DUBOIS et YESOU - 1985).

Par trois fois au moins, cette espèce nord-américaine a fréquenté le littoral breton : 1 adulte le 22 avril 1965 à Brélès (29N), 1 immature le 4 août 1968 à Quiberon (56) et 1 adulte le 17 septembre 1975 à St-Efflam/Plestin-les-Grèves (22). Cette espèce hiverne normalement de la Caroline du Nord au Brésil.

STERNE CASPIENNE (*Hydroprogne caspia*) 1 donnée

1 oiseau en vol SW à la Turballe (44) le 27 juin.

Cette espèce est occasionnelle sur le littoral breton : les dernières observations parvenues à la Centrale datent de juillet 1975, 1 adulte dans les marais d'Assérac (44) : du 5 août 1978, 1 individu à Porsall/Ploudalmézeau (29N) ; du 10 août 1979, 1 individu en baie d'Audierne (29S) et du 24 septembre 1984, 2 individus dans le petit traict du Croisic (44) (GOLA n°4 - 1985).

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*) 84 données

En mars, signalons au petit traict du Croisic (44), 16 le 29 ; à Penhièvre/St-Pierre-Quiberon (56) : 30 le 30 ; en avril, à Pors Gelen/Pleumeur-Bodou (22) : 12 le 1^{er} ; ...à la pointe de Lervily/Esquibien (29N) : 28 en vol W le 3 ; ...à Carnac-plage/Carnac (56) : 52 le 7 ; ...Sissable/Marois de Guérande (44) : 10 le 11 et le même jour, au Men Du/La Trinité-sur-Mer (56) : 15-20, ...Erdeven (56) : 400 NW/1h le 14 ; à la place du Ris/Bouarnenez (29S) : 31 posées le 23, ... à Banner/Archipel de Molène (29N) : 19 qui alertent mais ne nichent pas le 27 avril, ... en baie de Lampaul/Duessant (29N) : 20 le 2 mai ; ...pointe du Meinga/St-Coulomb (35) : 2 le 26 juin, ...

NIDIFICATION

1117-1267 couples minimum

Côtes-du-Nord :

La Colombière/St-Jacut-de-la-Mer : 72 couples ; pas de données concernant l'île Losquet/Pleumeur-Bodou.

Finistère :

Baie de Morlaix : 430 couples, en hausse ; Trevoch/St-Pabu : 130 couples avec 100 jeunes volants ; Fourn Cros/Ploudalmézeau : 250 couples, en augmentation ; Trielen/Archipel de Molène : 150 couples avec pontes le 12 mai, 50 seulement le 19 mai, tout est détruit sans causes apparentes le 25 mai ; les Moutons/Glénan : 2 pontes (avec 1 oeuf chacune) le 13 mai ; Moelez/Glénan : 30 couples.

Morbihan :

Rivière d'Étel : 195 couples.

La population bretonne est estimée à 1300 couples (A. THOMAS - Annuaire des réserves bretonnes et normandes - SEPMB-GON - 1985).

IERNE DE DOUGALL (*Sterna dougalli*) 8 données

Pointe du Van/Plougoff (29S) : 1 le 3 mai.

NIDIFICATION

La Colombière/St-Jacut-de-la-Mer (22) : 2 couples (oeufs le 2 juin) ; Baie de Morlaix (29N) : 20-25 couples ; le Cerf/Baie de Morlaix (29N) : 1 couple avec poussins non volants le 14 juillet ; Trevoch/St-Pabu (29N) : 2-3 couples qui ont échoué dans leur reproduction ; Fourn Cros/Ploudalmézeau (29N) : 40 couples ; marais de Guérande (44) : 2 11 couple ?) paraissant cantonnés dans une colonie de pierregarins (*Sterna hirundo*) début-juin.

Le total est d'environ 65-71 couples ce qui représente une baisse d'environ 15 % des effectifs par rapport à l'an passé - 77-83 couples - ; l'île aux Moutons/Glénan a été cette année encore abandonnée.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) 66 données

La première observation provient de Plougastel-Douglas (29N), le 31 mars ;

à retenir également : sur la Loire/Basse-Indre (44) : 2 le 7 avril ; sur la Loire/Varades (44) : 5 le 8 avril ; au port de la Turballe (44) : 20 le 9 avril ; dans le marais de Couéron (44) : 20 le 13 avril ; à Trenvel/Tréogat (29) : 100 N le 27 avril,... aux Bougrières/St-Jacques-de-la-Lande (35) : 2 le 14 mai,... à l'étang de Châtillon-en-Vendelois (35) : 1 adulte le 22 juin.

NIDIFICATION

Comme l'an passé le site de Lespoul/Pont-Croix (29) a été bien suivi : dès le 19 avril 1 oiseau est observé rejoint le 14 mai par un individu ; le 27 mai, 2 couples sont cantonnés ; le 29 mai la première ponte est observée, la deuxième femelle pond le 2 juin ; le premier couple a 3 poussins le 22 juin - durée d'incubation de 24 jours - et le deuxième a 2 poussins le 28 juin -. Pendant le nourrissage, les adultes apportent des lançons, des éperlans, des crevettes,... 4 poussins s'envoleront.

Le début de la nidification est noté vers le 4 mai à Varades (44)

612 couples se sont reproduits le long du littoral comme suit :

Côtes-du-Nord :

La Colombière/St-Jacut-de-la-Mer : 90 couples ; île Ziliac/Penvenan : 1 couple ; île Mervil/Pleumeur-Bodou : 12 couples ; île Losquet/Pleumeur-Bodou : 20 couples.

Finistère :

Ilots de la baie de Morlaix : 120 couples ; Enez Vei/Baie de Morlaix : 1 couple ; Trevoch/St-Pabu : 25 couples ; Fourn Cros/Ploudalmézeau : 40 couples ; Lannéon/Lanrivaroé : 2 couples dont 1 avec 1-2 pulli sur un nichoir à colvert (*Anas platyrhynchos*) le 19 juin ; Balaneg/Archipel de Molène : 18 couples, pontes le 26 mai, échoueront, tout ayant disparu le 6 juillet ; Trielen/Archipel de Molène : 1 nid avec ponte, échec ; Lespoul/Pont-Croix : 2 couples ; Moelez/Glénan : 10 couples.

Morbihan :

Rivière d'Étel : 134 couples ; Falgûnec/Séné : 6 couples.

Loire-Atlantique :

Sissable/Marais de Guérande : 2 couples minimum ; Grand Bal/Marais de Guérande : 115 couples ; Pierre Percée/Pornichet : 7 couples ; Loire/Varades : 4 couples le 2 juillet sur l'île Maquard (3 pontes de 2-3 oeufs + 1 pullus de 3-5 jours) ; 4 couples parquent le 28 mai à la Chapelle Basse-Mer, 2 couvent le 13 juin.

STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisaea*) 9 données

Côte de la Turballe (44) : 16 S le 13 avril ; Balaneg/Archipel de Molène (29) :

1 le 16 mai, 2 le 25 mai, 1 le 3 juillet mais aucune preuve de nidification sur ce site fréquenté l'année dernière.

STERNE COMIC (*Sterna hirundo/paradisaea*) 9 données

Erdeven (56) : 600+ passent dans la matinée du 14 avril et seules les pierregarins (*Sterna hirundo*) sont identifiées ; une série d'observations de sea-watching à la pointe du Croisic (44) d'oiseaux se dirigeant vers le nord : 8/30mn le 13 avril, 20/30mn le 14 puis 12, 3 le 28 avril, 97 le 12 mai/30mn puis 97 en milieu d'après-midi en 30mn.

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*) 20 données

Aber de Tresseny/Guisseny (29N) : 1 le 1^{er} avril ; Tréguier/Goulven (29N) : 2 le 4 avril, 6 le 5 avril ; Sissable/Marais de Guérande (44) : 3 le 11 avril ; petit traict du Croisic (44) : 30 le 13 avril ; pointe du Croisic (44) : 7 N/30mn le 14 avril et le même jour à Erdeven (56) : 14 NW ; Goulven : 3 le 17 avril ; plage du Ris/Douarnenez (29S) : 10 posées le 23 avril ; Locquénolé (29N) : 4 le 24 avril ; Benneg/Archipel de Molène (29N) : 2 le 16 mai ; ZIP/Brest (29N) : 2 le 16 mai ; Locmariaquer (56) : 1 le 25 mai ; Bindre/Séné (56) : 1 le 7 juin ; rivière d'Etel (56) : 1 le 15 juin.

NIDIFICATION

52 couples répartis comme suit :

Béniguet/Archipel de Molène (29N) : 40 couples ; la Chapelle-Basse-Mer (44) : 1 couveur le 13 juin ; Bel Abord/Varades (44) : 10 couveurs le 16 juin ; le Bridon/Dudon (44) : 1 couple avec 2 jeunes volants le 23 juin.

A noter l'absence de reproduction pour la 3ème année consécutive sur Trevoch/St-Pabu (29N).

GUILFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) 10 données

Première le 24 avril dans le marais de Grée/Anzonis (44).

En mai, l'espèce est notée dans les gravières de St-Jacques-de-la-Lande (35) : 1 le 1^{er} ; sur la Loire à Anzonis (44) : 11 le 1^{er} ; au large de la Baule : 17 le 2 ; à l'étang du Bois Jaillard/St-Nozair (44) : 6 le 8 ; à l'étang de Châtillon-en-Vendelois (35) : 1 le 8 ; aux Bougrières/St-Jacques-de-la-Lande : 1 adulte le 14 ; à l'étang de Kergalan/Plovan (29S) : 3 le 19 ; à la Piblais/St-Jacques-de-la-Lande : 1 adulte le 21.

En juin 1 N le 2 en baie de Morlaix et 1+ est présent le 22 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais.

Cette année encore, aucune donnée précise sur la reproduction ne nous est parvenue.

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*) 2 données

Grand réservoir/Vioreau (44) : 2 le 25 mai ; Loire à Oudon (44) : 3 le 11 juin.

Nidification à rechercher en Loire-Atlantique.

GUILLEMOT DE TROIL (*Uria aalge*) 36 données

A noter : ...Port Haliguen/Quiberon (56) : 25 le 11 mai ; Mésiban/Arzon (56) : 6 le 11 mai, ... canal de Roscoff (29N) : 2 immatures le 10 juin.

NIDIFICATION

Pas d'estimation d'effectifs au Cap Fréhel (22) pour cette année ; Rouzic/Sept-Iles (22) : 20+ couples ; Tas de Pois/Camaré (29S) : 9 couples ; réserve MH. JULIEN/Goulien (29S) : 67 couples reproducteurs - sur Kastell ar Roch, la date moyenne de ponte est le 27-28 avril, la durée moyenne de séjour du poussin sur la falaise est de 21-22 jours et la production de 0,91 jeune/adulte pour l'ensemble de la colonie -.

PINGUIN TORDA (*Alea torda*) 19 données

...Port Haliguen/Quiberon (56) : 15 le 11 mai.

NIDIFICATION

Pas d'estimation d'effectifs au Cap Fréhel (22) - 22-24 couples l'en passé - ; Malban/Sept-Iles (22) : 6 couples ; Rouzic/Sept-Iles (22) : 8 couples ; Tas de Pois/Camaré (29S) : 1-2 couples ; réserve MH. JULIEN/Goulien (29S) : 1 couple - pas de reproduction -.

MACAREUX MOINE (*Fratercula arctica*) 22 données

NIDIFICATION

Malban/Sept-Iles (22) : 85+ terriers occupés ; Rouzic/Sept-Iles (22) : 40+ terriers occupés (environ 400 oiseaux sont vus les 31 mai et 1^{er} juin) ; îlots de la baie de Morlaix (29N) : 13-15 couples (1^{er} le 28 mars) ; îlots d'Quessent (29N) : 3 couples sur Youc'h (1^{er} le 4 avril) ; Banneg/Archipel de Molène (29N) : 1 couple, avec 1 poussin le 24 mai.

PIGEON BISET (*Columba livia*) 1 donnée

1 individu cantonné à Koh Kastell/Sauzon (56) le 27 mai.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) 29 données

2 migrateurs à Quessent (29N) le 28 mars.

NIDIFICATION (ne sont retenues que les nouvelles localités)

Ille-et-Vilaine :

1 chanteur à la Motte/Antrain le 23 juin.

Côtes-du-Nord :

1 couple + 1 individu à la carrière de Tressignaux le 30 avril.

Finistère :

1 chanteur + 1 cavité visitée à Kervallon/Brest le 25 mars ; le 28, 1 ♂ + 1 chanteur à Keranroux/Morlaix, 1 chanteur à Coatcongarr/Morlaix et 1 couple parade dans la carrière de Penaneach/St-Martin-des-Champs ; 5+ à Keruzoret/Plouvorn le 29 ; 1 le 22 avril dans la carrière du Moulin du Roz/Guipavas ; 1 chant à Runavel/Plougastel-Deoules le 1^{er} mai ; 1 en forêt de Lannuzouarn/Plouénan le 3 mai ; 1 couple à Keraudren/Brest le 6 ; 1 chant à Kercadoret/Plouézec le 23 ; 1 couple + 1 chant à Kerjean/St-Vougay le 29.

Loire-Atlantique :

1 couple à la Chapelle-Passe-Mer le 22 avril ; 1 couple à Basse-Goulaine le 6 mai ; 3 à la Hervinière/Pannecé le 15 mai ; 10 dans les marais de Machecoul le 6 juillet. Noté également à Mauves et Carquefou.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) 15 données

1 individu couve le 29 mars à Plouvern (29N) ; plus de 15 couples sur l'île de Trébéron/Roscanvel (29N) le 13 mai ; semble en augmentation à Batz (29N) ; 11 couples à Quessant (29N).

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia turtur*) 31 données

Aucun fait marquant.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia decussata*) 51 données

Premières observations, tardives, dans la dernière décade d'avril : 1 le 20 à Bellignô (44) ; le 23, 1 à Scripnac (29N) et 2 à Quessant (29N). Arrivées importantes début mai : le 1^{er} à Locmariaquer (56), le 3 à Plouénan (29N), St-Servais (29N) et Banneg/Archipel de Molène (29N) A Quessant, le passage est maximal du 21 mai au 7 juin, avec encore quelques attardées les 14, 17, 21 et 26 juin.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) 58 données

Les premiers chanteurs sont notés le 25 mars à Plufur (22), le 30 à Brach (56) et le 2 avril à Belle-Ile (56) et à Vallét (44).

A Quessant (29N) où les observations débutent tardivement le 17 avril, plusieurs vagues d'arrivées semblent se dégager : une première fin avril puis une forte augmentation du 22 au 26 mai.

Femelles rousses : notées le 21 avril à l'île Vardon/Le Landreau (44), les 25 et 27 mai à Quessant, le 1^{er} juin en forêt du Gavre (44), 1 le 2 juin à Jans (35), début-juin à Lagetier/Camaret (29S) et régulièrement à Felguérec/Séné (56).

REPRODUCTION

Premier jeune le 23 juin à Landéda (29N) sur la même commune, un jeune parasite des grives musiciennes (*Luscinia philomelos*) le 30 juin ; 1 nourrissage par un Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) le 6 juillet dans les landes de Fréhel (22) ; un parasitage d'Accenteur mouchet (*Prunella modularia*) est noté début-juillet à St-Herblain (44).

Un départ massif est constaté à Guessant le 21 juin ; très peu d'observations ensuite. Dernier chanteur le 4 juillet au Prétanné/Morieux (22).

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*) 37 données

REPRODUCTION

1 oeuf le 27 mars à la gare du Kerneur/Plougonven (29N) ; à Séné (56), 1 oeuf le 25 avril, 1 adulte couve 6 oeufs le 17 mai, nourrissage le 27 juin ; à la Chapelle St-Pierre/Plogonnec (29S), 1 sur le nid le 28 avril, 2 poussins le 10 juin ; 4 jeunes à Rostrenen (22) les 25 et 28 avril ; 1 jeune volant à Quindivalch/Berrien (29N) le 27 avril ; 2 jeunes à Kerivin/St-Martin-des-Champs (29N) en mai ; jeunes volants le 15 juin à Baulon (35) ; 1 adulte + 1 pullus mort le 22 juin à Kererieu/Trébeurden (22) ; 6 pulli le 22 à Kerlecun/Plouezet-Guerand (29N) ; 6 jeunes volants (sans précision de date) à Plourin-les-Morlaix (29N) ; 2 adultes + 4 juvéniles fin-juin à la Parcarie/Joué-sur-Erdre (44).

HIBOU PETIT-DUC (*Otus scops*) 1 données

1 individu s'installe début-juin à Porh Gwen/Le Palais (56). Il semble être resté seul toute la saison.

CHOUETTE CHEVEUE (*Athene noctua*) 29 données

Les observations demeurent encore très sporadiques ; des recherches plus systématiques seraient nécessaires pour apprécier les effectifs de cette espèce et leur dynamique.

Ille-et-Vilaine :

Sembler assez bien représentée autour de Rennes : 2 chanteurs route de St-Grégoire/Cesson-Sévigné le 20 avril, 1 chanteur au Pré Namet et 3 individus à la Haie-des-Cognets/St-Jacques-de-la-Lande le 5 juin, 2 chanteurs en forêt de Rennes le 20 juin.

Situation identique sur les bords de la Rance : 1 chanteur à St-Lunaire le 29 juin (cf aussi Ar Vran, Tome XI-fascicule 2) et dans le sud du département : 1 chanteur à Rodineux/St-Ganton le 16 juin et à la Corbinière/Lançon le 17 ; 3 sites à la Bosse-de-Bretagne comme l'an passé et 1 site à Teillac.

D'autre part : 1 chanteur à Miniac-sous-Bécherel le 28 avril (1^{re} observation sur le site depuis 1981).

Côtes-du-Nord :

Nidification probable à Ploufragan : observée à Morieux, Plémy, Plouguenast, St-Brorden.

Finistère :

1 cantonnée les 18 et 20 juin à Woallas/Plouézec : 1 reposoir fréquenté le 1^{er} juillet au Rellecq-Kerhuon.

Morbihan :

Assez fréquente en région d'Auray : 1 à Plunéret le 1^{er} avril ; 2 contacts à Locmariaquer le 3 juin ; 1 au Bono et 1 à Mané Kerplouz/Baden le 29 juin ; 1 à Kergueno/Carnac le 30 juin ; 1 famille au Moustoir/Locoal-Mendon le 1^{er} juillet. Signalons aussi : 1 reposoir dans une carrière à Locmalo le 26 mai et 1 individu à Contanc/Bubry le 9 juin.

Loire-Atlantique :

2 adultes + 3 juvéniles à la Mercerie/Joué-sur-Erdre en juin-juillet.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) 40 données

1 chant diurne le 20 avril en forêt de Rennes (35).

REPRODUCTION

1 nid avec 3 oeufs le 18 mars à Trélat/Iaden (22) ; 1 oeuf tombé au sol le 20 avril à Concoret (56) ; 1 couve dans un nid de Buse (*Buteo buteo*) le 27 avril en forêt de Huelgoat (29N) ; 3 nids en forêt de Coet uen (22) le 17 juin. Premières familles : le 4 avril au parc Oberthur/Rennes (35) et le 27 avril au Rellecq/Plounéour-Ménez (29N). Pour 9 familles dont le nombre de jeunes est signalé : 2X1 jeune, 5X2 jeunes et 2Y4 jeunes.

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) 41 données

Année faste pour la reproduction de l'espèce ; y a t'-il eu plus de campagnols qu'en 1984 ?

Ille-et-Vilaine :

1 adulte les 7 et 11 avril à St-Christophe-de-Valains ; 1 adulte les 1^{er} et 18 mai et 23 juin à Ercé-en-Lanée ; 2 familles (2+3 juvéniles) à l'aérodrome de St-Jacques-de-la-Lande le 15 juin ; 3 juvéniles à la Rehaudais/Coven le 15 juin.

Côtes-du-Nord :

1 nid avec 3 jeunes et 2 autres individus cantonnés à Callac le 13 avril ; 1 ♀ couve à la Landette/Plouguenast le 30 avril ; 1 adulte et 3 pulli dans un vieux nid d'Epervier (*Accipiter nisus*) à la Garenne/Le Vieux-Marché le 15 juin ; le même jour, 2 nids à Trégon mais les jeunes sont déjà envolés ; reproduction au beau milieu de la forêt de Beffau, le Moyen-Duc ayant là aussi utilisé un nid d'Epervier.

Finistère :

1 aire occupée à la gare de Plouneour-Trez le 4 avril ; présent à Lanvotel /Trénaouezan le 30 ; 2 pulli dans un nid d'Epervier à la lande/Lanarvily le 20 mai ; au terrain des sports du Cloître-St-Thégonnec : 5 jeunes au nid le 27 mai, envolés le 1^{er} juin ; sur un autre site de cette commune, 1 œuf brisé et des pelotes le 13 ; présence notée à Perros/Plouguerneau le 18.

Morbihan :

4 familles entre Plunérat et Plescop le 28 juin ; 1 famille à la Salette/Arradon le 28 ; 3 juvéniles + 2 familles à Locool-Pendon le 1^{er} juillet ; 1 famille à Penê er Hoet/Plomel le 3.

Loire-Atlantique :

3 couples en forêt du Vioreau ; 3 juvéniles le 3 juin, 4 juvéniles à la mi-juin ; 3 juvéniles le 10 juillet au Collet/Bourgneuf-en-Retz.

Dans tous les cas, il serait intéressant, de préciser les milieux occupés et les relations existent avec la Chouette hulotte (*Strix aluco*), concurrente potentielle du Moyen-Duc ainsi que de suivre la régularité de l'occupation des sites.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) 11 données

Derniers hivernants ou migrants : le 17 mars, 1 dans les landes de Lochec (22) ; le 18 mars, 1 au Vougot/Guisanry (29N) et 4 à Aigrefeuille-sur-Maine (44) ; 1 le 20 à Boyenne/Vay (44) ; 1 les 24 et 31 en forêt du Vioreau (44) ; 2 le 26 à l'aérodrome de St-Jacques-de-la-Lande (35) ; 1 le 7 avril à Pré-Château/St-Lumine-de-Coutais (44) et enfin 2 le 26 juin au marais de Grée/Ancenis (44).

Les 3 observations suivantes correspondent peut-être à des nicheurs et sont faites dans des sites où la reproduction a déjà été suspectée : 1 chasse dans un dortoir d'hirondelles (*Iridoprocne*) à Irenvel/Irenogat (29S) le 4 mai ; 1 dans les marais de Guérande (44) les 8 et 9 juin.

ENGULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) 39 données

Depuis la création d'Ar Vran, l'espèce a généralement été peu recherchée et

le plus souvent à partir de la fin-mai ; aussi les dates d'arrivées demeurent-elles fort imprécises et s'étalent de la mi-mars à la mi-mai. Il serait bon de rechercher l'espèce plus tôt en saison afin de mieux définir son séjour en Bretagne.

Cette année, premiers chanteurs à Plunéret (56) le 27 avril.

Ille-et-Vilaine :

Assez répandu dans le sud du département : dans le marais de Gannedal/La Chapelle-de-Brain, 2 le 1^{er} juin, 1 le 16 posé sur une route ; le 1^{er} juin : 1 chanteur au Vieux-Bourg/St-Just, 3 chanteurs entre Renac et Langon, 3 chanteurs à la Corbinière/Langon.

Côtes-du-Nord :

1 chanteur entre St-Guen et St-Gilles-du-Vieux-Marché le 27 mai ; 1 chanteur au nord-est de la forêt de Lorge le 13 juillet ; 2 chanteurs et 3 individus paradant au bois de Coron/St-Alben le 15.

Finistère :

Au Cragou/Scrignec : 1 chanteur les 1^{er} et 30 juin.

Morbihan :

Retenons seulement les nouveautés : le 27 mai à Malguénac, 1 chanteur et 2 couples dans 2 sites, 1 chanteur dans le sud de la forêt de Quénécan ; 2-3 chanteurs à Kerlescan/Carnac le 1^{er} juin ; le 3, 1 chanteur à Kergolven/Lommariaquer et 1 autre à Kerzuc/St-Philibert ; 1 chanteur au Ter/Baden le 29 ; sur Crach : 14-15 chanteurs en 10 sites les 30 juin et 1^{er} juillet.

Loire-Atlantique :

L'espèce semble localement abondante dans les forêts et les landes du nord du département. Le 1^{er} juin, 2 chanteurs en forêt du Gavre et au moins 3 à Guénéné-Penfao ; 10 dont 5-6 chanteurs en forêt du Vieureau le 13 juillet.

MARTINET NOIR (*Apus apus*) 50 données

Premières observations : le 13 avril dans le marais de Gouleine (44), le 17 à Rennes (35) et Séné (56). Les Côtes-du-Nord et le Finistère sont atteints le 22 (Million, Tréogat, Brest).

L'arrivée des nicheurs locaux est signalée le 26 à Vannes (56) le 30 à Rennes et le 4 mai à Miniac-sous-Bécherel (35).

A Quessant (29N) où les 2 premiers sont notés le 7 mai, le passage, peu sensible, " culmine " du 20 mai au 4 juin alors que l'espèce est déjà très abondante dans la région.

MARTIN-PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) 20 données

Cette espèce est insuffisamment documentée ; le suivi des nicheurs sur des rivières-témoins donnerait des indications précieuses sur de possible diminution suite à un hiver rigoureux.

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*) 28 données

Après l'observation du 26 février à Sein (285), 10 observations de migrants sont faites à Quessant (28N) du 1^{er} au 26 avril ; elles concernent en général des oiseaux isolés, hormis 2 à Pern le 20.

Toutes les autres données proviennent de sites classiques de reproduction :

Ille-et-Vilaine :

1 à Ercé-en-Lanée le 27 avril ; 1 à l'étang des Longchamps/Rennes le 30 avril ; 1 à la Pommeraie/Le Sel-de-Bretagne le 4 juillet.

Finistère :

4 à Poulguen/Guillivenc le 20 avril et 2 à Lesconil le 2 mai.

Morbihan :

2 sites sur les dunes de Plouharnel-Erdeven ; chant noté régulièrement à Keriapert/Le Trinité-sur-Mer et au Crélin/Brach.

Loire-Atlantique :

1 à Thouaré le 5 avril ; 1 à Orvault le 14 ; le 1^{er} mai, 1 couple au Collet/Bourgneuf-en-Retz et 1 chanteur à la Goupillière/Pont St-Martin ; 1 le 9 juillet à Arthon-en-Retz.

TORCOL FOURMILIER (*Upupa torquilla*) 8 données

Première observation à une date normale : 1 le 3 avril à Nantes (44), 2 migrants à Quessant (28N) le 16 avril.

REPRODUCTION

L'espèce est toujours aussi rare et signalée uniquement d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique : 1 en forêt d'Ancenis (44) le 20 avril ; 1 à la gare de Basse-Indre (44) les 25 et 26 ; deuxième site pour Nantes (44) : 1 au vieux quartier le 30 ; 1 dans les marais de Couffron (44) le 8 mai et enfin 1 chanteur à St-Jacques-de-la-Lande (35) le 28 juin.

PIC CENDRE (*Picus catus*) 15 données

Retenons : 3 couples en forêt d'Ancenis (44) le 15 mars ; 2 chanteurs au bois du Rocher Bidaine/Châtillon-en-Vendelais (35) le 8 mai ; 1 chanteur au bois de Ciccé/Bruz (35) le 23 mai et 2 le 4 juin ; 1 le 1^{er} juin à Pledran (22) ; 1 au bois de Beaufeu/Val d'Izé (35) le 22 juin.

Une donnée plus particulièrement intéressante provient du sud-ouest du département des Côtes-du-Nord : 1 mâle tambourine le 26 mai à Kerminor/Gouerec. Cette donnée repousse un peu plus à l'ouest la limite de l'aire de répartition de cette espèce en Bretagne centrale.

PIC VERT (*Picus viridis*) 13 données

Des indications de densités seraient les bienvenues.

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) 11 données

En forêt d'Ancenis (44) un couple se manifeste par ses vocalines et ses tambourinages jusqu'au 30 mars. Seul le mâle est observé le 20 avril. Le couple sort d'une loge le 5 mai. Au Vioreau (44) 1 couple est observé du 24 mars au 8 avril et 1 individu le 5 mai.

Cette fois, la nouveauté vient d'Ille-et-Vilaine où l'espèce occupe les forêts de Haute-Sève, Liffré, Rennes et Chevré : 1 individu entendu le 8 avril en forêt de Rennes ; en forêt de Haute-Sève, réponse à la repasse le 3 avril, la 15 découverte de 2 loges dans lesquelles rentrent 2 individus (m + f) en juin ; 1 individu pendant tout le printemps en forêt de Chevré.

L'espèce est également signalée au bois de Maunusson (44).

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*) 15 données

REPRODUCTION

Jeunes au nid : le 24 avril à l'Ecole Normale/Rennes (35) ce qui est très précoce ; le 30 mai à Coatane/Douarnenez (295) ; le 2 juin à la Gourmerie/St-Herblain (44) ; le 5 juin à Kervihan/Carnac (56) ; le 7 à Coat Bréz Huella/St-Thégonnec (29N) ; le 8 à Kerprigent/St-Jean-du-Doigt (29N) ; le 14 au Coty/Kerlaz (295).

Jeunes volants : enco le 13 juin à Brech (56) et Douarnenez ; 1^{re} famille du Nord-Finistère le 16 à Barnenez/Plouézoch.

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) 10 données

Proviennent de quatre sites maintenant classiques : les forêts de Rennes (35), du Givre (44), de Beffou (22) et Keronic/Pluvigner (56).

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) 34 données

Des chants et tambourinages sont notés durant toute la période.

Retenons : à Coatener/Douarnenez (29S) : alarmes du 9 au 16 avril, creusement d'une loge le 19, 2 poussins morts au sol le 17 mai.

COQUEVIS HUPPE (*Galerida cristata*) 11 données

1 le 12 mai à la Croix St-Lambert/St-Brieuc (22). Cette localité est la seule du nord de la région où une petite population se maintienne (P. BÉCHET - com. orale).

Par ailleurs des citations nous proviennent de Loire-Atlantique : à Nantes, Préfaillies, Clisson, St-Herblain, St-Brévin-les-Pins et Orvault où 3 pulli sont au nid le 1^{er} juillet.

Il serait intéressant que les dénombrements soient faits dans les secteurs de reproduction de cette espèce afin de vérifier l'état de la population bretonne estimée à 100 couples en 1975 (Y. GUERMEUR - JM. MONNAT - Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne - 1980 - AR VIVAN Tome VIII).

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) 19 données

Légère diminution du nombre d'observations par rapport à l'an passé (27), avec en prime une donnée négative dans les landes de St-Just (35) site pourtant habité les années précédentes. faut-il y voir l'influence de l'hiver rigoureux ?

Pour le reste, rien de bien nouveau : toutes les données proviennent de zones habituelles d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) 3 données

3-4 chanteurs seulement le 31 mars entre Bécherel (35) et Dinan (22) soit 21 km. 1^{ère} famille le 12 juin au sillon du Len/Louannec (22).

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) 49 données

Arrivée tardive :

10 le 28 mars à St-Jacques-de-la-Lande (35) ; 2 le 30 dans le marais de Grés/Anconis (44) ; notée le 31 à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22),...

Fort passage à la mi-avril : 200 le 13 dans les marais de Guérande (44) ; le 14, 15 au Pelecq-Kerhuon (29N) et 50 à Guérande ; 30 le 16 à Kerlouen (29N),... C'est à ce moment que débutent les observations à Quessant (29N) où elles y sont particulièrement peu nombreuses cette année : 8 données de 1-2 individus du 17 avril au 25 juin mais surtout dans la dernière décade d'avril.

REPRODUCTION

15 colonies sont signalées, les plus importantes se situent en Loire-Atlantique : 40 couples sur l'île Héron/St-Sébastien-sur-Loire le 9 mai ; 20 couples sur l'île Arpoux/St-Julien-de-Concelles le 9 juillet. A Trégunc (29S) une colonie encore occupée en 1983 est abandonnée.

Regroupements sur les bords de Loire (44) : 100-200 à la Chapelle-Basse-Mer le 24 avril ; 150-200 à St-Sébastien-sur-Loire le 24 juin ; 100-150 entre Ste-Luce et St-Sébastien-sur-Loire le 15 juillet.

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Bimota rustica*) 72 données

Net décalage des premières observations entre le sud-est et le nord-ouest de la région.

	44	35	56	22	29	Quessant
1 ^{re} donnée	17 mars	22 mars	28 mars	29 mars	31 mars	2 avril
Localité	Riaillé	Rennes	Séné	Plouguenest	Plénour-Lanvern	

L'espèce est déjà abondante sur le littoral du Morbihan le 5 avril, avec 2 couples formés au Palais alors que le 26, 1 seul individu se trouve aux Geyeulles/Rennes (35) et que le 28, 1 ♂ se forme à Miniac-sous-Bécherel (35).

Des arrivées importantes ont encore lieu à cette époque : 500-600 sur la Loire entre Ste-Luce et St-Sébastien-sur-Loire (44) le 29 avril, et plusieurs milliers à Ste-Luce et Basse-Goulaine (44) le 2 mai.

Derniers migrants le 26 mai à Benneq/Archipel de Molène (29N).

1 colonie rupestre à la ZIP/Brest (29N) le 3 juin.

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*) 41 données

Les arrivées sont notées tardivement et sont, de plus, très étalées. Première le 7 avril à St-Renan (29N).

Ensuite seulement 4 données jusqu'au 20 : le 9 à Anetz (44), le 17 à Bazouges-sous-Hédé (35) et Quessant (29N), le 19 à Ploujean/Morlaix (29N) avec visite au nid. A cette date, les observations deviennent régulières, les arrivées se généralisant début-mai. A remarquer les plusieurs milliers sur la Loire entre Ste-Luce et Basse-Goulaine le 9 mai.

Une nouvelle colonie rupestre de 18 nids au Cap Fréhel (22). 48 nids occupés à la Trinité-sur-Mer (56) le 11 juillet.

Première ponte le 8 juin au Pont Rouault/Planguenoual (22).

PIPI DES ARBRES (*Anthus trivialis*) 36 données

Premier le 31 mars entre Bécherel (35) et Dinan (22). Une arrivée massive fin-avril - début-mai se traduit par des observations en de nombreux points du continent et 2 de migrateurs à Quessant (29N) les 17 avril et 6 mai.

Signalons quelques localités nouvelles du Finistère : à Plourin-les-Morlaix, 2 le 24 avril à Penlan (chants + vols nuptiaux) et 1 chanteur le 2 mai à Longuz ; 1 chanteur à Goarem en Abet/Argol le 29 mai ; 5 couples au Cragou/Plougonven le 2 juin.

Dernier chanteur le 13 juillet à Collerec (29N).

Nourrissages les 28 mai et 13 juin en Loire-Atlantique.

PIPI FARLOUSE (*Anthus pratensis*) 12 données

A Quessant (29N), 2 groupes de migrateurs sont observés dans le 2ème quintaine de mars : 15 le 19 et 40 le 26. Au même moment, le 23 : 60 au marais de Grée/Ancenis (44).

A remarquer qu'à Quessant l'installation des nicheurs se poursuit jusqu'à début-mai.

La première famille est notée le 11 mai à Vergam/Scrignac (29N).

PIPI SPIONCELLE (*Anthus spinoletta spinoletta*) 3 données

1 en plumage nuptial à Sissabie/Quérone (44) le 22 mars ; 1 le 23 au Moulin Neuf/Plounérin (22) et 4 dont 1 en plumage nuptial le 31 mars à Kervalet/Batz-sur-Mer (44).

PIPIIT MARITIME (*Anthus spinoletta*) 8 données

1 juvénile volant le 11 mai à Molène (29N). Au sud de la Loire où l'espèce est plus localisée, des chanteurs sont signalés entre Ste-Marie-sur-Mer/Pornic et Préfaillies (44).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*) 28 données

Sous-espèce *flava* : arrivée début-avril : 1 le 1^{er} dans les marais de Grée/Ancenis (44) ; 1 le 2 dans les marais de Couëron (44),... puis 35 le 10 à Bindre/Séné (56) ; 4-6 à Erdeven (56) le 14,... Migrateurs : 1 le 8 mai à l'étang de Châtillon-en-Vandelois et le 31 à Quessant (29N).

Sous-espèce *flavissima* : arrivée plus tardive : 1 le 8 avril à la ZIP/Brest (29N) ; 1 le 16 à Irenvel/Iréogat (29S). Passage important à la fin de ce mois et début-mai confirmé par les observations de Quessant : 8-10 le 20 au Verger/Cancalle (35) ; à l'étang des longchamps/Rennes (35) : 50 les 24 et 25, 7 le 3 mai ; à Quessant, isolées les 23 et 24 avril, 6 et 7 mai.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) 12 données

Deux migratrices à Quessant (29N) les 26 et 27 mars puis le 27 avril.

L'espèce semble s'être raréfiée, peut-être à cause des coups de froid de janvier-février. Elle n'a pas été retrouvée sur le canal d'Ille-et-Rance près de Hédé (35), à l'étang de la forêt/Brandivy (56) et seulement avec difficulté dans la région de Malguénac (56) pourtant riche en rivières favorables.

En Loire-Atlantique où l'espèce est localisée, 1 à Gorges près de Clisson le 5 mai.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) 25 données

Dernière Yarell (*Motacilla alba yarelli*) le 1^{er} avril à Quessant (29N). Des migratrices de la sous-espèce type (*Motacilla alba alba*) y sont observées assez régulièrement du 25 mars au 2 mai : 1 d'attardé le 31 mai.

1 famille le 28 mai sur les bords de la Loire à Mauves (44).

Le 4 juin, une famille dont le d'appartient à la sous-espèce Yarell est repérée à la ZIP/Brest (29N). Il s'agit du deuxième cas de reproduction "mixte" de Bretagne, le 1^{er} ayant été noté il y a quelques années à Goulven (29N) (Y. GUERMEUR - com. personnelle).

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) 9 données

Chronique des îles : 3 couples à Balaneg et 1 chanteur à Bennez/Archipel de Molène (29N) le 27 avril ; présent à l'île des Landes/Cancal (35) le 22 mai ; poussins dans la cabane de l'île de Trébéron/Roscavel (29S) 6 juin.

Première famille le 26 mai à Kerguelen/St-Gilles-Pligeaux (22).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) 6 données

1 chanteur sur l'île de Trébéron/Roscavel (29S) le 13 mai ; présent sur l'île des Landes/Cancal (35) le 22.

1 transport de nourriture le 18 avril à Rennes (35). Première famille le 7 mai au Relecq-Kerhuon (29N).

ROUGEGORGE (*Erithacus rubecula*) 4 données

1^{er} jeune volant le 16 mai à Plougastel-Daoulas (29N).

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*) 20 données

Les premiers chanteurs sont notés le 8 avril à St-Mars-de-Coutais et Cordemais (44).

Nous retiendrons de ce printemps la découverte de nouvelles localités (dans le sud-ouest de l'Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan) et quelques observations de forte densité, conséquence possible d'une plus grande abondance cette année.

Ille-et-Vilaine :

10 chanteurs repérés dans les gravières de Rennes et St-Jacques-de-la-Lande entre le 27 avril et le 8 juin. Le 1^{er} juin, découverte nocturne de chanteurs à la Chapronnais et à Port-de-Rocher/Langon et à la Doubrie/Guignen. Chanteurs isolés au Lizard/Bruz le 5 juin et dans les fours à chaux de Chartres-de-Bretagne le 15.

Morbihan :

1 chanteur à Falguérec/Séné à partir du 12 mai. L'espèce serait à rechercher dans le sud-est du département.

Loire-Atlantique :

Signalons seulement 13 chanteurs sur 4 km à Dudon le 14 mai.

GORGELEUE (*Luscinia svecica*) 11 données

léger regain dans le Morbihan cette année : dans le marais de Séné : 1 ♂
à Pont-Lys à partir du 23 mars
puis au moins 1 couple le 8 mai ; au moins 3 couples à Bindre dont 2 se
reproduisent avec succès ; à Falguères : 1 couple même à bien sa nichée ;
à la Roche-Sèche/Erdeven : 1 couple le 14 avril ; à Kerzo/Brech : 3 chan-
teurs le 27 avril ; au Bronzais/Pénestin : 4 couples le 2 juin dont 1 nour-
rit 4 jeunes.

En Loire-Atlantique : 1^{er} le 22 mars à Guérande ; 8 contacts le 11 mai tou-
jours à Guérande ; 1 couple nourrit le 21 mai dans les
marais salants de St-Molf.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus phoenicurus*) 42 données

A Guessant (29N), le passage se déroule du 25 mars au 2 avril, avec encore
un erratique le 17 juin.
Ailleurs : la migration semble s'achever le 11 avril avec 1 individu à
Banneg/Archipel de Molène (29N). Soulignons que des oiseaux chantent au
cours de haltes migratrices : le 2 avril à Guessant et le 4 à Prinel/
Plougasnou (29N).

NOTIFICATION

* St-Laurent/Pennes (35) : premier chant le 1^{er} avril, 1 couple le 2 qui ré-
ussit 3 nichées successives avec 1 juvénile le 26 mai, transport de sacs
fécaux le 21 juin puis 1 juvénile le 22 août.
3 pulli au nid le 24 mai au Sacré Coeur/Vannes (56) ainsi qu'à la ZIP/Brest
(29N) le 30 mai ; juvéniles volants le 8 juin à Landerneau (29N) et du 7 au
10 juillet à Miniac-sous-Bécherel (35).

* "Nouvelles localités" :

Ille-et-Vilaine :

1 au Levran/Iffendic le 16 juin, village en lisière de la forêt de Paimpont.

Côtes-du-Nord :

1 ♂ dans la carrière des Mines/Tremuson le 10 avril ; nicheur possible à
Tréguen.

Finistère :

Des preuves de reproduction sont obtenues à Brest et Landerneau (cf ci-dessus) et à Douarnenez : 2 juvéniles + 1 chanteur à Porh Rhu le 17 juin.

Morbihan :

1 ♂ à Guégon le 3 avril.

Loire-Atlantique :

1 couple à la Houssaie/Le Landreau ; 1 couple nicheur à Batz-sur-Mer le 13 juin.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) 7 données

La première observation est assez précoce : 1 ♂ le 9 avril à Basse-Goulaine (44) mais la migration est sensible surtout à la fin de ce mois : à Quessant (29N) 1 ♂ les 19 et 25 ; 2 le 20 à Belligné (44) ; 1 chanteur le 21 à Oberthur/Rennes (35) ; 1 ♂ le 25 au Prétanné/Morieux (22).

Peu de nouveautés dans la répartition des nicheurs : à Chantenay/Nantes (44) 1 chanteur du 20 avril au 6 mai puis le 10 juin ; 1 o au Vioreau (44) le 23 avril ; 3 chanteurs en forêt de Cavors (56) le 28 ; 2 chanteurs en forêt d'Ancenis (44) le 5 mai ; 1 chanteur au Rocher Guignard/L'Hermitage-Lorge (22) le 17 ; 1 couple à Carquefou (44) le 23 ; 2 couples en forêt du Givre (44) le 25 ; 1 chanteur en forêt de Rennes (35) le 28 ; 2 en forêt de Haute-Sève (35) le 7 juillet et 2 couples à la Guitonais/Ercé-en-Lamée (35) tout au long de la période.

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*) 19 données

Arrivée précoce en Loire-Atlantique : 1 les 24 et 27 mars au marais du Petit-Mars.

A Quessant (29N), la migration est notée du 19 avril au 8 mai, mais culmine le 23 avec 6-7 individus. Au même moment des observations sont faites sur le continent : 2 le 24 à St-Aeron (22), 2 les 24 et 25 aux Longchamps/Rennes (35) ; encore 1 migrateur le 11 mai à Molène (29N) et le 25 à Erquy (22).

Peu de renseignements nous parviennent des nicheurs cette année :

Ille-et-Vilaine :

1 ♂ le 1^{er} mai à Gannedel/Le Chapelle-de-Brain (35) ; 1 couple au sud de Redon le 1^{er} juin.

Loire-Atlantique :

Marais de Couëron : 1 couple le 13 avril ; le Fort-la-Roche/Machecoul : 1 couple le 21 avril ; marais de Couëron à St-Etienne-de-Monluc : 18 chanteurs sur 6 km² le 30 avril ; Grand Pré/Varades : 15 ♂ le 5 mai ; le Grand Patis/St-Mars-du-Désert : 3 couples le 18 mai ; prairie de la Sauterelle/Thouaré : 4 couples le 28 mai, 5 couples avec nourrissage le 13 juin.

Aucune donnée ne nous est parvenue de la petite population des Monts d'Arrée.

TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*) 17 données

Sur Quessant (29N), 23-24 couples contre 56-59 en 1984, et sur Batz (29N), les effectifs ont visiblement chuté après l'hiver rigoureux.

REPRODUCTION

1^{er} chanteur le 16 mars à Besse-Goulaine (44) ; 1 ♂ parade le 21 mars à Trédrez (22) ; 1 couple nourrit le 23 avril à Kervénec/Plougonven (29N) ; 1^{re} famille le 6 mai à Besse-Goulaine.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) 53 données

Les premiers sont observés le 24 mars au Petit-Mars (44) et le 25 à Groix (56). L'arrivée a lieu le 27 mars à Quessant (29N). Le passage y est sensible jusqu'au 25 mai, avec un pic à la fin-avril où l'espèce est notée abondante sur toute l'île.

Soulignons 2 données de la sous-espèce *Oenanthe oenanthe leucorrhoa* : 1 ♀ le 23 avril et 1 ♂ le 24.

À cette époque, des migrateurs sont notés en divers points du centre-Bretagne : 2 les 24 et 25 aux Longchamps/Rennes (35), 1 le 26 en plaine de Baud/Rennes,.... 1 ♀ le 1^{er} mai à Gannedel/Le Chapelle-de-Brain (35).

MERLE A PLASTRON (*Sylvia torquatus*) 13 données

La migration qui se déroule du 3 avril au 8 mai est surtout ressentie à Quessant (29N).

1 ♀ à St-Laurent/Rennes (35) du 3 au 10 avril, accompagnée d'1 ♂ à partir du 8 ; 2 le 15 au Cap d'Erquy (22) ; 1 le 18 avril au centre de l'île de Groix (56) ; 1 le 25 à St-Nicolas-des-Grénan (29S) ; à Quessant, 2 ♂ le 4 avril, 1 le 17, 2 le 18, 1 le 25, 1 ♂ et 1 ♀ le 1^{er} mai (le ♂ est observé jusqu'au 9, date où il chante dans des fourrés).

MERLE NOIR (*Turdus merula*) 10 données

Les premiers nourrissages sont signalés le 1^{er} avril à Rennes (35) et le 3 à Morlaix (29N). Le 1^{er} juvénile volant est noté le 16 avril à Nantes (44).

2 couples sur Balaneg/Archipel de Molène (29N) le 11 avril.

A Morlaix le contraste est saisissant entre la population de Merle noir qui s'est plutôt bien sorti de l'hiver et celle de la Grive musicienne (*Turdus philomelos*).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) 10 données

Des isolées sont notées à Quessant (29N) jusqu'au 24 avril : 1 au Pin (44) le 20 avril.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) 11 données

Premiers nourrissages le 28 avril en Loire-Atlantique.

Une forte diminution, consécutive à la rigueur de l'hiver est enregistrée dans divers secteurs : Léon (29N), Morieux (22), Ercé-en-Lanée (35) et dans certaines zones de Loire-Atlantique.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) 11 données

L'espèce est d'observation régulière à Quessant (29N) jusqu'au 28 mars. Dernier passage nocturne le 1^{er} avril à Plunéret (56). Enfin, à la 7 avril à la Gournerie/St-Herblain (44).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) 36 données

1 migratrice le 19 mars à Quessant (29N).

1^{er} juvénile le 26 avril à Clesseven/Glomez (22).

L'espèce est nettement plus commune dans le Léon (29N) qu'il y a 10-15 ans.

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) 52 données

L'essentiel des données provient du littoral ou de l'arrière pays, exception faite de celles provenant d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique. Après le très rude hiver 1984-85, la seule région où l'on ait noté une diminution des effectifs est le Finistère-Nord : baisse à Ste-Anne-du-Portzic/Brest, 1 seul contact à Morlaix, disparition au Band/Henvic et au Vergem/Scrignec.

À Stang Korz/Ouessant (29N) où l'espèce ne niche pas une ♀ est capturée le 26 avril. Notons également 1 chanteur à Groix (56) le 25 mars et 3 chanteurs à Houat (56) le 2 mai.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) 13 données

Cette espèce à affinités méditerranéennes a beaucoup souffert des conditions météorologiques du dernier hiver. Les 11 données printanières proviennent en effet exclusivement du sud de la région et essentiellement du littoral : 1 le 21 mars à Bindre/Séné (56), 1 à St-Merblain (44) le 13 avril, 1 chanteur à Mazerolles (44) en avril, 3 chanteurs le 21 avril et 1 autre le 27 avril dans les marais salants de Guérande (44), 1-2 le 15 mai à la Grande Vallée/Bouguenais (44), 3 couples le 17 mai dans les marais de Bourgneuf (44), 1 chanteur le 11 juin à la Citadelle du Palais/Belle-Ile/56) et 1 autre le 13 juin à Kervilahouen/Bangor (Belle-Ile/56), 1 le 16 juin au Collet/Bourgneuf, 4 chanteurs les 28 et 30 juin dans les marais Guérandais (44).

La Cisticole n'a pas été retrouvée dans nombre de sites où elle était fort commune : région d'Erdeven-Plouhinec (56), baie d'Audierne (29S) etc,...

Deux autres observations sont réalisées en fin de période : l'espèce est notée au lac de Grandlieu (44) le 11 juillet et un chanteur est entendu le 15 juillet à Coulven (29N). Au moins pour ce dernier cas il semble s'agir d'un jeune d'en dispersion postnuptiale.

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) 20 données

Premiers chants : le 7 avril à Kerdelidec/Plourin-les-Morlaix (29N) et le 14 avril à la Roche Sèche/Erdeven (56), ce qui est conforme au schéma habituel de l'espèce : arrivée dans la première quinzaine d'avril. Ces deux données concernent des migrants.

À la lumière des observations qui nous ont été rapportées, il apparaît que les milieux utilisés sont différents suivant la région : marais et semis forestiers dans le sud et l'est de la région, grandes landes (sèches et humides) en basse-Bretagne. La cause en est peut-être l'abondance relative

de ces milieux, différente selon la région, mais il est tout de même curieux de constater que l'espèce ne fréquente aucune des grandes zones humides du littoral finistérien.

LOCUSTELLE LUSCINOIDE (*Locustella luscinioides*) 6 données

Premier chant : le 3 avril à Languidou/Ploven (29S), ce qui correspond aux habitudes de l'espèce dans notre région.

PHRAGITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) 21 données

Premiers chants : le 3 avril à Languidou/Ploven (29S) et le 4 avril à Ménéhan/Kerlouan (29N), ce qui n'est pas particulièrement précoce puisque les arrivées ont généralement lieu à partir du 20 mars (cf actualités Ar Vran).

A Quessant (29N) où l'espèce ne niche pas un chanteur est entendu le 25 avril à Stang Korz et 5 individus présentant une forte adiposité sont capturés entre le 26 avril et le 8 mai.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE (*Acrocephalus palustris*) 1 donnée

1 individu émettant le chant imitatif caractéristique de l'espèce est entendu le 31 mai au vallon d'Arland/Quessant (29N).

Rappelons qu'elle avait déjà été signalée en Brière (44) et dans le sud-est du Morbihan au début des années 1970, mais que ces observations n'avaient jamais été confirmées, une confusion avec des rousserolles effarvates (*Acrocephalus scirpaceus*) à chant imitatif (cas signalés en Grande Bretagne) restant possible. Il faut toutefois signaler que cette rousserolle à répartition nord-orientale en France est actuellement en pleine expansion, notamment sur le littoral de la Manche, et qu'elle atteint d'ores et déjà la rive nord-est de la baie du Mont St-Michel (50) (G. DESBOUT - GOMm, com. or.).

ROUSSEROLLE EFFARVATE (*Acrocephalus scirpaceus*) 36 données

Le premier individu est observé le 22 avril à Ste-Luce-sur-Loire (44), puis à Tréneuf/Tréneat (29S) le 24 et à Stang Korz/Quessant (29N) le 25, ces dates sont légèrement tardives pour cette espèce qui peut arriver dès la fin mars, en tout cas dans la première quinzaine d'avril.

Toutes les observations proviennent de l'aire de nidification de l'espèce telle que nous la connaissons depuis l'Atlas de 1975.

ROUSSEROLLE TURDOIDE (*Acrocephalus arundinaceus*) 7 données

Toutes les observations proviennent de Loire-Atlantique, seul département breton où niche régulièrement cette espèce :

Basse Loire : Grande Vallée/Bouguenais : 2 chanteurs le 15 mai ; les Baracons/Couéron : 5-6 chanteurs le 17 mai, 7 chanteurs le 21 ; l'Angle/St-Etienne-de-Montluc : 1 chanteur le 20 mai ; l'Acilue de Vair/St-Etienne-de-Montluc : 1 le 21 mai ; la Bosse de Gicquelais/St-Etienne-de-Montluc : 2 le 21 mai,
Marais de Machecoul : 8-9 chanteurs au Port-la-Roche le 17 mai.

HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hippolaïs polyglotta*) 41 données

Premiers chants : le 14 avril à Ercé-an-Lande (35), le 22 avril à Thouaré (44). Généralement, chez cette espèce, les premiers individus arrivent aux alentours du 10 de ce mois.

Des indices de migration sont notés : le 24 avril un chanteur au parc Oberthur/Rennes (35) (où l'espèce ne niche pas) et 2 le 8 mai à Quessant (29N).

Au niveau de la répartition, quelques observations confirment une légère progression dans l'ouest du Morbihan et pour le moins une consolidation des positions de l'espèce dans cette région : le 26 mai 1 chanteur à St-Aignan (barrage de Guerlédan) ; le 27 mai 1 chanteur au bourg de Malguénec et 1 autre à Gueltas/Malguénec ; le 16 juin 1 chanteur Kervégant/Pont-Scorff, 1 couple avec des juvéniles volants dans le lotissement de Pont-Scorff, 1 chanteur dans la Z.I. de Plouay et 1 autre dans la Z.A. de Gestel. Par rapport à l'Atlas de 1975 (cf Histoire et Géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne) ce sont deux nouvelles cartes au 1/50000e qui sont ainsi atteintes : Pontivy et Plouay.

Remarquons également la prédilection que manifeste souvent l'Hypolaïs polyglotte pour les zones suburbaines, et notamment à la limite de son aire de répartition.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) 50 données

Comme tous les insectivores sédentaires le pitchou souffre lors des hivers rudes avec enneigement prolongé. Ainsi elle n'a pas été retrouvée à la Grée Gallière/Ercé-an-Lande (35), lande durement touchée par le gel. De même dans les Côtes-du-Nord ses effectifs sont notés en baisse. Mais l'important effondrement auquel on s'attendait ne s'est pas manifesté et l'espèce a été retrouvée dans la plupart de ses sites traditionnels, notamment ceux de l'intérieur : rochers du Cragou/Plougonven (29N) ; gorges du Douilas/Laniscat, St-Branden, Locarn et St-Gilles-Pligeaux (22) ; Lochalo et Malguénec (56) ; lande de Tellé/St-Erblon, forêt du Theil, landes de St-Just,

la Chambre au Loup/Iffendic, landes de la Roche du Teil/Redon (35) ; forêt de Domnaiche, forêt du Gavre, forêt de Vioreau, Guéméné-Penfao, châ-teau-Bougon/Bouguenais (44).

A Quessant (29N) Y. GUERMEUR estime à 15-20 couples la population nicheuse de l'île.

Les premiers nourrissages sont observés le 28 mai en forêt de Theil (35) et les premiers juvéniles le 6 juin à Stang Meur/Quessant

FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*) 30 données

La reproduction de cette espèce, soupçonnée depuis quelques années, a enfin été établie : 1 ♂ est observé nourrissant à St-Cast (22) le 20 juillet. Son expansion vers l'ouest, le long des côtes de la Manche, devient plus évidente chaque année. Le printemps 85 a vu la généralisation des observations sur les côtes nord de notre région : pointe du Meinva/St-Coulomb (35) avec 1 chanteur du 30 mai au 11 juillet, les Briantaïs/Lancieux (22) avec 1 chanteur les 30 mai et 26 juin, pointe de St-Cast déjà citée, St-Quay-Portrieux (22) avec 2 chanteurs le 27 mai, Plouha (22) avec 1 chanteur le 9 juin, Barnenez/Plouézoch (29N) avec 1 chanteur les 23 mai et 8 juin, Arlond/Quessant (29N) avec 1 couple cantonné du 24 avril au 5 juin et Pout Salaun/Quessant avec 1 couple cantonné du 31 mai au 17 juin.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) 48 données

Premières données : 1 le 5 avril à Batz-sur-Mer (44), 1 à Falgüerrec/Séné (56) le 7, 1 le 8 à la Borderie/St-Mars-de-Coutais (44) et 10-15 le 9 à Basse-Goulaine (44). Cette dernière observation démontre que le passage est d'emblée important en Bretagne sud, alors qu'il ne débute que le 23 avril à Quessant (29N).

Quelques données de ce printemps viennent mettre en évidence certaines particularités déjà notées chez cette espèce. Le 1^{er} juin, lors d'une sortie concertée, l'espèce n'a pu être contactée dans la région de Guéméné-Penfao (44) alors qu'elle l'a été à 4-5 reprises dans la région de Saffré (44). La Grisette est en effet réputée pour présenter une mosaïque de zones d'abondance et de zones de rareté, sans que les milieux diffèrent notablement.

D'autre part le 2 juin, 4 chanteurs sont notés au Burgo/Granchamp (56) sur un parcours où 15-20 chanteurs étaient décelés en 1984, mettant ainsi en évidence l'instabilité de ses effectifs.

Les premiers juvéniles sont observés le 20 juin à la Rabine/Bruz (35).

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) 50 données

Premiers chanteurs : le 10 avril au Pont Rouault/Planguenoual (22) et le 16 avril parc Oberthur/Rennes (35).

La première famille est observée le 25 mai à Coat an Do/Bringole (22).

A Quessant (29N) la population nicheuse se monte à 8 couples.

FAUVETTE A TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) 64 données

Quelques données de nidification : 1 couple construit le 5 avril au Costour/Brest (29N) ; premiers nourrissages à Kerdroukhanvet/Lescouët-Gouerec (22) le 28 avril ; première famille le 6 mai à Ste-Anne-du-Portzic/Brest.

A Quessant (29N), 5-6 couples nicheurs sont dénombrés, 1 année après la conquête de l'île par l'espèce.

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) 4 données

Les premiers chanteurs sont notés en forêt de Gavre (44) le 19 avril, avec au moins deux semaines de retard sur les dates d'arrivée classiques de l'espèce : première décade d'avril, voire dernière de mars.

Aucune nouveauté quant à la répartition.

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) 29 données

Les premiers chanteurs sont entendus le 21 avril en forêt de Rennes (35) et à l'Arsangle/La Chevrolière (44) ; ceci est tardif, l'espèce étant souvent notée dès la première quinzaine d'avril.

Mais l'arrivée massive a lieu dans les derniers jours du mois : le 27 avril à la Coudraie/Huelgoat (29N), le 28 avril au Costa Noir/Plounéour-Ménez (29N), en forêt de Camors (56) et à Coët Fournio/Baud (56). Ce même jour un migrateur est entendu à Nauregas en pleine ville de Rennes. Un autre migrateur est également observé le 22 mai à Park Raden/Quessant (29N).

Données de nidification : 1 alarme le 25 mai au bois du Quennec/St-Gilles-du-Vieux-Marché (22) et un nourrissage au bois d'Indra/Derval (44) le 2 juin.

Répartition : l'espèce est observée dans quelques sites de Loire-Atlantique où elle est localisée : forêt de Domaiche/Lusanges, bois de la Foie et forêt d'Ancenis, la Meilleraye-de-Bretagne, forêt du Parc/Plessé, et surtout la Chevrolière, au sud de la Loire.

1 chanteur dans une pinède léonarde (29N), à Maner al Lann/Guiclien le 3 mai. Sur ce site l'espèce s'est maintenue en dépit de l'anéantissement de la futaie de feuillus.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*) 61 données

Des indices de passage sont notés sur les îles : 2 à Balaneg/Archipel de Molène (29N) le 27 avril, 3+2 à Banneg/Archipel de Molène le 11 mai. A Quessant (29N) il est difficile de faire la part des migrateurs et des nicheurs locaux (41-43 couples dénombrés ce printemps). Mais, sur 20 individus capturés et bagués à Arland et au Korz du 2 au 25 avril, seul un a été contrôlé ce qui traduit un renouvellement important des oiseaux présents.

En ce qui concerne la reproduction on peut retenir les faits suivants : 1 individu construisant le 24 avril à Mesqueau/Plougasnou (29N), premier nourrissage le 29 avril à Lendhuet/St-Brandan (22), des poussins le 12 mai à Roscarvel (29S) et première famille à l'envol le 29 mai au Moulin du Bant/Plouzévédé (29N).

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) 91 données

Les premiers individus sont notés le 27 mars à Nantes (44), le 31 mars à Oudon (44) et le 1^{er} avril au Cranic/Brech (56), à Douvez/Brignogan-Plages (29N) et à Cesson-Sévigné (35), dates tout à fait normales.

De nombreux indices de mouvements sont relevés, chez cette espèce chantant volontiers en migration.

Au Cranic/Brech 3 chanteurs sont présents le 1^{er} avril, seulement 1 le lendemain. Dans d'autres sites où l'espèce ne niche pas, des chanteurs se font entendre, quelque fois pendant plusieurs jours, puis disparaissent : 1 les 4 et 6 avril à St-Laurent/Rennes (35), 1 le 5 avril à Miniac-sous-Bécherel (35) 1 les 16, 17, 19 avril, 1^{er} et 3 mai au parc Oberthur/Pennes, 1 le 21 avril rue Danton/Rennes, 1 le 23 avril aux Gayeulles/Rennes.

A Quessant (29N) où 16 couples nicheurs sont recensés le problème se pose dans les mêmes termes que pour le Véloce (*Phylloscopus collybita*). Au Korz, sur 29 oiseaux capturés du 9 au 26 avril aucun n'a été repris. Le passage qui a débuté le 9 avril, semble s'estomper à partir du 26 avril, les effectifs observés diminuant sensiblement.

Quelques indices de reproduction sont notés : un transport de matériaux à Arland/Quessant le 2 mai, toujours à Quessant un nourrissage à Pont Ar Rodez le 11 juin et un autre à Arland le 19 juin : une famille à Lescoat/

Plouigneau (29N) le 12 juin et une autre à la pointe Robert/Poscanvel (29S) le 23 juin.

En outre un cas d'albinisme partiel (tête blanche) est observé : Kerdzhavet/Lescouët-Gouarec (22) le 28 avril.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*) 5 données

Premier nourrissage à Rosnoën (29S) le 1^{er} juin et première famille à Cobalen /Toulé (29N) le 9 juin.

Deux données intéressantes la Loire-Atlantique où l'espèce est rare : 1 chanteur à la Lombarderie/Nantes le 25 avril et 1 autre le 14 mai au Cellier.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) 17 données

Des hivernants et erratiques sont encore notés en début de période : à Arlond /Quessant (29N) 3 le 19 mars et 1 le 22 mars ; 1 à l'étang du Relecq-Kerhuon (29N) les 22 et 23 mars.

À Morlaix (29N), dans un site où l'espèce a niché en 1983 et 1984, le dernier chant se fait entendre le 19 avril.

Des chants sont entendus régulièrement jusqu'au 16 juin ; deux d'entre eux concernent la région nantaise, seul bastion de l'espèce en Loire-Atlantique.

Aucun indice de reproduction certain n'a été rapporté.

GOËMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) 40 données

La première observation est faite le 10 mai aux Marais/Hillion (22), avec un mois de retard sur la norme.

Dans le même ordre d'idée, aux Gayeulles/Rennes (35), dans un site particulièrement bien suivi, le couple habituel est entendu pour la première fois le 20 mai (en 1984 : le 2 mai).

Au Crélin/Brech (56), un couple arrive le 27 mai ; à Quessant (29N), où des migrants étaient notés du 1^{er} mai au 8 juin en 1984, les observations ne débutent que le 23 mai. Enfin 2 migrants à Molène (29N) le 11 mai.

MIGRIFICATION

Deux alarmes le 27 mai à Caradec/Bécherel (35) et le 29 juin à Nantes (44) ; 1 ponte de 4 oeufs le 2 juillet à Plouguenast (22) ; 4 familles le 15 juin à Plouaret (22), le 23 à Gausson (22), le 30 à Plémy (22) et le 2 juillet à Anetz (44).

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) 18 données

Le record des données printanières est à nouveau battu. Un fort passage a lieu dans la dernière décade d'avril (15 données) avec jusqu'à 5 individus à Quessant (28N) le 25 avril.

Seules 3 données se singularisent quant à la date : 1 ♂ le 5 avril au parc de la Noë/Vallet (44), 1 ♂ à Molène (29N) le 11 mai et 1 ♂ également en mai à Landivisiau (28N).

MESANGE A MOUSTACHES (*Parus biarmicus*) 6 données

Des hivernants ou erratiques sont encore notés en début de période : 1-2 les 23 mars et 2 avril à la Roche-Sèche/Erdeven (56) et 4 le 4 avril à Ménéham/Kerlouan (29N).

Les autres données proviennent de Loire-Atlantique : marais guérandais et marais de St-Mars/Sucé-sur-Erdre où 5-6 individus sont observés le 1^{er} mai.

MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caedatus*) 17 données

A Névet/Kerlaz (29S) : 4 nids sont découverts entre le 6 et le 28 avril. Les distances séparant ces nids sont respectivement de 40m, 200m et 800m. 1 ponte le 30 avril à Langazel/Trémoquézen (29N).

La première famille est observée le 19 mai à Kerquistou/Plouigneau (29N). En outre, à Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35), 20 individus regagnent ensemble un dortoir le 16 juin.

MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*) 14 données

7 pulli dans un nichoir en mai à St-Brandan (22). Première famille le 28 mai au Moulin de Kérouter/Sta-Tréphine (22).

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*) 16 données

1 couple même à bien une couvée entre le 6 avril et le 22 mai à Coataner/Douarnenez (29S).

Par ailleurs : nourrissage le 28 avril à Classeven/Glonel (22) ; une famille le 19 mai à Kerguistou/Plouigneau (29N) dont les parents construisent à nouveau.

MESANGE NOIRE (*Parus ater*) 22 données

Un oiseau construit en forêt de Rennes (35) le 30 avril ; un nid est découvert le 16 mai à Dizez/Tréfléz (29N) ; nourrissages le 1^{er} juin à la Beauchère/Duessoy (22) ; des familles sont observées le 2 juillet à Ploukuenast (22), le 8 juillet aux Curés/Plestin-les-Grèves (22) et le 9 juillet en forêt de Beffou/Locquivy-Plougras (22).

A noter un chanteur le 3 avril au jardin des plantes/Nantes (44).

MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) 16 données

Un nichoir a abrité une nichée entre le 9 avril et le 23 mai aux Quatre Vents/Douarnenez (29S), deux autres abritent 8 et 9 pulli à St-Brandan (22) le 17 mai.

Par ailleurs : construction à Clisson (44) le 15 avril, couvaison le 4 mai toujours à Clisson ; nourrissages au nid à Coataner/Douarnenez (29S) le 20 mai ; nourrissage au sol d'un pulli à Keraël/Poullan-sur-Mer (29S) le 6 juin et première famille le même jour à Locquénolé (29N).

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*) 60 données

Aux Gayeulles/Rennes (35), après une accalmie, une recrudescence des chants est notée à partir du 25 mai, correspondant vraisemblablement à une seconde nichée.

Données de nidification : construction les 31 mars et 2 avril à Clisson (44) ; apport de matériaux dans un nid de Pic épeiche (*Dendrocopos major*) de 1984 à Coataner/Douarnenez (29S) le 6 avril ; à Quessant (29N) transport de nourriture les 23 avril et 6 mai ; nid avec oeufs à Clisson le 4 mai, à Roscanvel (29S) le 12 mai ; première famille le 20 mai à St-Ilan/Lanueux (22).

A Quessant, où la charbonnière est la seule mésange nicheuse, 14 à 15 couples ont été recensés.

SITELLE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) 19 données

Un nid est occupé en forêt d'Huelgoat (29N) le 27 avril et les premiers nourrissages sont notés le 23 mai à Pen an Toul/Le Relecq-Kerhuon (29N).

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) 9 données

Première famille le 15 mai à Richeville/Plouguenast (22).

MESANGE REMIZ (*Remiz pendulinus*) 1 donnée

3 individus à la Roche-Sâche/Erdeven (56) le 23 mars, observation concluant cette longue période d'hivernage commencée le 3 novembre 1984 en ce même lieu.

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) 40 données

Première observation le 20 avril à Gétigné (44)

Le 24 mai un chanteur en migration est noté à Beaucemaine/Ploufragan (22).

Un recensement effectué dans la basse vallée du Couesnon entre Antrain (35) et le Mont St-Michel (50) a permis de découvrir un minimum de 5 couples nicheurs certains (familles observées en juillet) ; ceci permet d'estimer à 15-20 couples minimum l'effectif total des grandes zones humides bordant au sud la baie du Mont St-Michel.

Deux observations sont effectuées dans l'est des Côtes-du-Nord, à la limite ouest des grandes zones précitées : 1 chanteur à Port St-Hubert/Plouer-Langrolay-sur-Pance le 15 mai et 1 chanteur à Evran le 21 mai. S'agit-il de migrants ou des nicheurs locaux ? Dans ce dernier cas cela traduirait une légère expansion de l'espèce, peu surprenante si l'on considère l'augmentation spectaculaire du nombre des données, notamment en Ile-et-Vilaine et en Loire-Atlantique.

PIE-GRIECHE ECRIOCHEUR (*Lanius collurio*) 8 données

A Duessant (29N) le 26 avril, 1 ♂ à l'aérodrome et le 27 mai 1 autre au lavoir du Miou, 1 autre migrateur (♀) le 25 juin à Treffin (22).

En Loire-Atlantique, quelques données à rapporter à la nidification : 1 couple dans le marais du Petit-Mars/Sucé-sur-Erdre, 3 couples à la Gicquelais/St-Etienne-de-Montluc, 1 couple + 1 ♂ à Basse-Goulaine, 2 ♀

cantonnés en mai dans le marais de Couëron.

PIE-GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*) 2 données

Le 8 avril 1 individu vole vers l'ouest au Clos/Plouneour-Ménez (29N) et 1 autre le même jour, toujours volant vers l'ouest, est observé au Roch Trédudon/Le Feuillée (29N). Ces deux sites étant distants seulement de quelques kilomètres, il est possible qu'il s'agisse du même individu.

GEAI DES CHENES (*Garrulus glandarius*) 19 données

Première famille le 27 avril au Goasp/Scrignac (29N).

PIE BAVARDE (*Pica pica*) 13 données

Première famille le 8 avril à Deux Yev/Taulé (29N). Une o couve dans un nid sans toit place des Halles en plein centre ville de St-Brieuc (22) le 10 mai.

CRABE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) 21 données

La nouvelle importante de ce printemps est la confirmation de la reproduction d'au moins 1 couple dans l'ouest du Léon : 2 individus, dont 1 transportant des matériaux pénètrent dans une grotte à la pointe de Corsen/Plouarzel (29N) le 14 avril.

À Quessant (29N), où la population nicheuse est estimée à 10-12 couples, quelques bandes sont observées : maximum de 15 les 26 mars et 5 juin....

l'Archipel de Molène (29N) est toujours régulièrement visité : 2 le 11 mai à Balaneg, 2 les 11 et 25 mai, 1^{er} et 8 juin et 6 juillet à Banneg.

En presqu'île de Crozon : 4 au maximum à Pen Hir/Camarret (29S) entre le 2 et le 14 juin : 2 autres le 6 avril au château de Dinan/Crozon (29S).

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) 19 données

Premières parades le 7 avril à Plestin-les-Grèves (22) et à Lannear (29N) ; premières constructions le 13 avril à Plougashou (29N) et premiers nourrissages le 29 mai à Kerjean/St-Vougay (29N) ; 4 nids dont 1 avec 5 pulli le 1^{er} juin à Ancenis (44).

A Keroual/Guilers (29N) 3 couples construisent dans des trous d'arbres du parc le 15 avril. Rappelons que l'utilisation de ce type de sites n'a jamais été signalée que du Léon (29N), région de Bretagne où l'espèce connaît sa plus forte densité.

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) 13 données

Toutes les données s'inscrivent parfaitement dans le schéma que l'on connaît depuis l'Atlas de 1975.

L'espèce est citée du Léon (29N) (30 nids à Kérucoret/Plouvorn le 29 mars), de Cornouaille (1 individu à Plomeur/29S le 13/5), du golfe du Morbihan (20 individus à Kérizan/Crach/56 le 14 avril), du bassin de Rennes (30 nids aux Loges/Bruz (35) et enfin de Loire-Atlantique où des corbeautières sont signalées à St-Julien-de-Concelles, Thouaré, St-Sébastien, Machecoul, Nantes, Carquefou, Vallée et près de Vay où 2 juvéniles volants sont observés. Dans ce département une certaine tendance à l'expansion est relevée.

Notons enfin que la corbeautière de Penzé/Guiclan (29N), éradiquée en 1984, n'a pas été réoccupée en 1985.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*) 21 données

12-14 couples nichent sur Duessant (29N) et 1 sur Banneg/Archipel de Molène (29N).

Les premiers nourrissages sont notés le 31 mars à Bécherel (35) et le 14 avril à Barnenez/Plouézoch (29N) et les premiers juvéniles à l'envol le 11 juin à Duessant.

A la Ville Pêan/Cadrec (35), 50-100 individus ayant séjourné tout l'hiver s'éclipsent à partir du 15 avril. D'autres rassemblements sont observés çà et là : 30 en dortoir à Clesseven/Glennel (22) le 26 avril, 100 à Languz/Plourin-les-Morlaix (29N) le 2 mai et 200 au Quinquis/Bodilis (29N) le 16 mai.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) 28 données

Quelques observations sont faites hors des sites de reproduction : le 13 mai 1 aux Vire Court/Plomelin (29S), le 3 juin 1 à Tremvel/Tréogat (29S).

NIDIFICATION

1985 a vu le nombre de sites intérieurs passer à 10 : ce sont en effet quatre nouvelles carrières qui se sont révélées être occupées dont une dans le centre des Côtes-du-Nord. Il va sans dire que la visite systématique des carrières et autres falaises favorables de l'intérieur de la région reste d'actualité.

De plus les prémices d'installation signalées des Montagnes Noires en 1984 se sont soldées par une reproduction cette année, le couple ayant élevé 2 jeunes.

Signalons également que 2 sites maritimes ont été découverts dans les Côtes-du-Nord : pour l'un d'entre eux il s'agit d'un nouveau couple.

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) 8 données

Première famille le 13 mai à Morlaix (29N).

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) 3 données

1 individu albinos à Guilers (29N) le 23 avril.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) 23 données

Peu de nouveauté par rapport à ce que l'on connaît de la répartition de l'espèce depuis l'Atlas de 1975, si ce n'est la " découverte " de l'espèce sur la carte au 1/50000e de Lamballe (22).

Signalons simplement que la population léonarde se maintient : 2 couples sont observés et un nid est découvert à Couffon/Guisseny (29N) le 13 juin.

Par ailleurs le premier nourrissage est noté le 27 mai à Pontivy (58).

PINSON DES ARBRES (*Pringilla oolebs*) 10 données

Première construction le 17 avril au Relecq-Kerhuon (29N), premiers nourrissages au Quinquis/Bodilis (29N) le 16 mai, première famille à Barnenez/Pleuëzuch (29N) le 6 juin. Quelques oiseaux de passage à Quessant (29N) jusqu'au 7 juin.

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) 1 donnée

Environ 10 individus sont encore observés le 8 avril en forêt du Geyre (44).

SERIN CINI (*Serinus serinus*) 14 données

1 chanteur à Souzon/Belle-Ile (56) du 10 au 15 juin, une famille à Kériduouen/Plouguerneu (29N) le 18 juin.

A remarquer : plus de 50 chanteurs le 25 juin au Val André/Pléneuf (22).

VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*) 24 données

Quelques bandes sont encore observées : 35 à Roch en Red/Plufur (22) le 25 mars ; 90 au Pont de l'Ouen/Haute-Goulaine (44) le 27 mars ; 35 à Len Vian/Sta-Sève (29N) le 31 mars ; 40 à Anetz (44) le 1^{er} avril ; 120 à Kergalan/St-Thégonnec (29N) le 6 avril et 28 au Pont Rouault/Planguenoual (22) le 9 avril.

Première famille à l'envol à Guerboubon/Le Guillio (22) le 25 mai.

CHARDONNET ELEGANT (*Carduelis carduelis*) 25 données

Environ 30 couples sont dénombrés sur Ouessant (29N) où le premier nourrissage est noté le 5 juin et la première famille le 19 juin.

Un rassemblement d'une centaine d'individus au Viarsau/Joué-sur-Erdre (44) le 6 avril.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) 4 données

15 dont des chanteurs paradent en forêt de Rennes (35) le 19 mars ; 1 ♂ chanteur + 1 ♀ à Maurepas/Rennes le 20 mars.

Dernières observations le 10 avril avec 5 à Orvault (44) et 6 à Crech Goulard/Penvenan (22).

LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*) 25 données

Un passage sensible a lieu fin-avril - début-mai : sur la piste de l'aérodrome à Quessant (29N) : 2 le 6 avril, 25 le 15, 60 le 18 et 80-100 le 23 ; à Balaneg/Archipel de Molène (29N) : 20 le 27 avril et 2 le 11 mai ; à Bonneg/Archipel de Molène : 50 le 3 mai ; à Feunteun Aod/Plagoff (29S) : 30 le 21 avril.

NIDIFICATION

Première construction le 19 avril à Kerarmel/Plouézach (29N) ; première famille à Lescoet/Plouigneau (29N) le 12 juin ; 5 pulli au nid le 23 juin à la Croix Denis/Tréguen (22) alors qu'un couple construit encore à Bernenez/Plouézach le 5 juillet.

BECCOISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) 2 données

25 dont des juvéniles le 6 juillet en forêt de Rennes (35) et 4 en vol au Roch Cléguer/Braspart (29N) début-juillet. C'est la deuxième année consécutive que l'espèce est signalée dès juillet.

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) 11 données

Première famille le 3 mai à Menor al Lann/Guiclan (29N).

GROSBEC (*Coccothraustes coccothraustes*) 6 données

En forêt Pavée/Moisdon-la-Rivière (44) : 5-6 le 24 mars ; au parc Oberthur/Rennes (35) : 2 les 5, 16 et 17 avril ; à la Gobinière/Drvault (44) : 2 le 17 avril ; au Plessis/Drvault : 4 le 20 avril ; à Cesson-Sévigné (35) : 1 couple le 1^{er} mai ; au bois de la Belangeraie/Nozay (44) : 1 le 2 juin.

BRIANT LAPON (*Galierius lapponicus*) 1 donnée

1 d'est observé à Parluchen/Quessant (29N) le 3 mai, ce qui constitue la nouvelle date la plus tardive pour le Bretagne.

BRIANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*) 1 donnée

1 ♂ en plumage nuptial au Diben/Plougasnou (29N) le 8 juin, ce qui représente et de très loin, la date la plus tardive pour l'espèce dans notre région, le précédent "record" étant un 19 avril.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) 4 données

Cette espèce qui n'est plus connue comme nicheuse à Quessant (29N) et Belle-Ile (56) semble en déclin ; elle mérite donc toute notre attention et des indications concernant nidification et densité seraient les bienvenues.

BRUANT ZIZI (*Emberiza ciris*) 5 données

Première famille le 15 juin au Prétanné/Morieux (22) alors que le 5 juillet les pulli de la 2ème ponte sont proches de l'envol en ce lieu.

BRUANT FOU (*Emberiza cia*) 1 donnée

1 ♂ chanteur et 1 ♀ sont observés à Clégrevac/Vay (44) le 27 avril.

C'est à notre connaissance la première mention récente de cette espèce montagnarde concernant notre région. Rappelons pour mémoire qu'elle avait coutume à la fin des années 1950 de passer l'hiver aux rochers de Mauves-sur-Loire (44) (KOMALSKY - Avifaune de la région nantaise - Bulletin SSNOFF n°68 - 1971).

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) 7 données

Premier nourrissage le 14 mai au Guic/Guerlesquin (29N).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) 15 données

A Quessant (29N), où l'espèce est mentionnée nicheuse dans l'Atlas de 1975, deux observations sont réalisées : 1 individu le 9 avril à Parluchen et 1 autre le 10 à Cost ar Reun. Malgré cela il semble qu'il n'y ait plus de reproduction en ce lieu.

De même l'espèce est signalée à l'île de Batz (29N) le 6 mai. De plus, 4 données parviennent de la côte léonarde : le 13 juin 1 chanteur à la pointe de Corsen /Plouarzel et 2 chanteurs à la pointe de St-Mathieu/Plougonvelin ; le 18 juin

1 chanteur à Kéridaouen/Plouguerneau : le 26 juin. 1 chanteur au Duillec/Plougoum.

Tout ceci témoigne de la stabilité de l'espèce dans l'extrême nord-ouest de notre région.

Les nouveautés (par rapport à l'Atlas 1975) sont également confirmées : maintien des populations des Montagnes Noires à Castel Ruphel/St-Goazec (29S) et des rives de la baie de St-Brieuc à Planguenoual (22).

Plus intéressant encore : dans les Côtes-du-Nord, deux nouvelles localités sont découvertes : 1 chanteur le 11 mai au Breuil/Merléac et 1 autre à Boqueho le 4 juillet,